



ΕΥΑΓΓΩΡΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ

Ανθρωπολογία β/γ

Ανθρωπολογία

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



002
ΚΛΣ
ΣΤ2Β
1846

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1970

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

E ^A BΛΓ

Τανγκόρη (Ειδογένεα, μ.)

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ



ΔΩΡΕΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

E 6^A

ΒΑΤ

(ΕΥΑΓΟΡΑ Μ.) ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ

Ταντελούρη (Ευάγορα Μ.)

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1970

002
LNE
ET2B
1846

ΑΙΓΑΛΟΠΩΣΙΑ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Τὸ κύτταρον. Εἰς τὴν Φυσικὴν Ἰστορίαν τοῦ προηγουμένου ἔτους ἐμελετήσαμεν γενικῶς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, δηλ. τὰ φυσικὰ σώματα, τὰ ὅποια ἔχουν ζωὴν (ἔμβια ὅντα). Χαρακτηριστικὸν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔμβιων ὅντων εἶναι, ὅτι ἀποτελοῦνται ἀπό κύτταρα, καὶ μάλιστα ἄλλα μὲν ἀπὸ ἓν μόνον (μονοκύτταροι ὄργανισμοί), ἄλλα δὲ ἀπὸ πολλὰ (πολυκύτταροι ὄργανισμοί).

Εἰς τὸ μικροσκόπιον διακρίνομεν εὐθὺς ἀμέσως τρία μέρη εἰς τὸ κύτταρον: τὴν κυτταρικὴν μεμβράνην, ἡ ὅποια τὸ περιβάλλει, τὸ κυτταρόπλασμα καὶ τὸν πυρῆνα (εἰκ. 1).

Τὸ κυτταρόπλασμα καὶ ὁ πυρῆνας ἀποτελοῦν ώς πρὸς τὴν σύστασιν δύο μορφὰς τοῦ πρωτοπλάσματος. Τὸ πρωτόπλασμα δὲν ἔχει ἀπλῆν σύνθεσιν, ἄλλα συνίσταται κυρίως ἀπὸ ποικίλα λευκώματα, λίπη, ύδατάνθρακας καὶ υδωρ (80%).

Τὸ λευκὸν τοῦ ὡοῦ εἶναι κοινὸν παράδειγμα οὐσίας ἀποτελουμένης ἐκ λευκωμάτων. Ἡ κυτταρικὴ μεμβράνη εἰς τοὺς ζωϊκοὺς ὄργανισμούς εἶναι καὶ αὐτὴ λεπτὴ στοιβὰς πυκνότερου πρωτοπλάσματος, ἡ ὅποια προστατεύει τὸ κύτταρον.

Ἐντὸς τοῦ κυτταροπλάσματος διακρίνονται εἰς τὰ μικροσκοπικὰ παρασκευάσματα διάφορα σωματίδια, τὰ ὅποια ἐπιτελοῦν εἰδικὰς λειτουρ-



Εἰκ. 1. Σχηματικὴ παράστασις κυττάρου. Π. Πυρῆν. Πρ.—Πυρηνίσκος.—π.Μ. Πυρηνικὴ μεμβράνη.—κ.Μ. Κυτταρικὴ μεμβράνη.—Μ.χ. Μιτοχόνδρια.—Κ.Π. Κυτταρόπλασμα.—Κ. Κενοτόπιον. Εἰς τὸ σχῆμα τοῦτο, πλὴν τῶν ἀνωτέρω, παρίστανται καὶ διάφορα ἄλλα μορφολογικὰ στοιχεῖα τῶν ζωϊκῶν κυττάρων.

γίας, δπως τὸ κεντροσωμάτιον, τὰ ἴνιδια, τὰ μιτοχόνδρια, τὰ χρυσοτόπια, οἱ κρύσταλλοι, τὰ ἐκκριτικὰ κοκκία, τὰ κοκκία χρωστικῆς καὶ ἄλλα.

Τὸ κυτταρόπλασμα ζῶντος κυττάρου εύρισκεται εἰς μίαν διαφρῆ ροήν ἐντὸς αὐτοῦ. Ἡ κίνησις αὗτη τοῦ πρωτοπλάσματος δύναται νὰ παραπηρῆῃ καλῶς εἰς κινηματογραφικὰς ταινίας, αἱ ὅποιαι ἔχουν ληφθῆ ἀπὸ τὴν ζωὴν μονοκυττάρων ὄργανισμῶν, ώς εἶναι ἡ ἀμοιβᾶς κ.ἄ.

Ἐντὸς τοῦ πυρῆνος εύρισκεται ἕνας ἀπλοῦς ἥ πολλαπλοῦς πυρηνίσκος, ἡ λινίνη, ὁ πυρηνικὸς ὄπτος καὶ τὰ χρωματικὰ κοκκία. Ὁ πυρήνης εἶναι τὸ σπουδαιότερον συστατικὸν τοῦ κυττάρου, εἶναι τὸ κέντρον τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὑλῆς καὶ ὁ φορεὺς τῶν κληρονομικῶν ιδιοτήτων. Ὄταν τὸ κύτταρον πρόκειται νὰ διαιρεθῇ, τὰ χρωματικὰ κοκκία σχηματίζουν ἔν νῆμα (σπείραμα), τὸ ὅποιον τελικῶς τέμνεται εἰς τμῆματα καλούμενα χρωματοσώματα. Τὰ κύτταρα κάθε εἶδους ζώου χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὡρισμένον ἀριθμὸν χρωματοσωμάτων, τὰ ὅποια εἶναι ἀνὰ δύο ὅμοια. Ὁ ἄνθρωπος π.χ., δπως ἀπεδείχθη τελευταίως, ἔχει 23 τοιαῦτα ζεύγη χρωματοσωμάτων εἰς κάθε κυττάρον τοῦ σώματός του.

Τὰ συστατικὰ τοῦ ζῶντος κυττάρου, μὲ τὴν ἐπίδρασιν κυρίως τοῦ ὀξυγόνου, διασπῶνται εἰς ἀπλουστέρας ἐνώσεις καὶ οὕτω ἀπελευθεροῦνται ἐνέργεια ὑπὸ μορφὴν κινήσεως, θερμότητος κτλ. (ἀνάλυσις). Ἐξ ἄλλου τὸ κύτταρον προσλαμβάνει θρεπτικὰς ούσιας, τὰς ὅποιας μετατρέπει εἰς ούσιας, ώς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅμοιας πρὸς τὰ συστατικά του (ἀφομοίωσις). Οὕτως αὔξανεται καὶ ἀναπληρώνει τὰς διασπωμένας ούσιας (ἀνταλλαγὴ τῆς ὑλῆς).

Ἐντὸς τοῦ κυττάρου τελοῦνται ὅλαι αἱ λειτουργίαι, αἱ ὅποιαι χαρακτηρίζουν τοὺς ζῶντας ὄργανισμούς, ἥτοι ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς ὑλῆς καὶ τῆς ἐνεργείας, ἡ κίνησις, ἡ διεγερσιμότης καὶ τέλος ἡ ἀναπαραγωγή.

Οἱ ιστοί. Εἰς τοὺς πολυκυττάρους ὄργανισμοὺς τὰ κύτταρα δὲν ἔκτελοῦν ὅλα τὰς ίδιας ἐργασίας. Εἰς τοὺς ὄργανισμοὺς τούτους αἱ ἐργασίαι εἶναι καταμερισμέναι. Ἐκ τῶν διαφόρων κυττάρων ἄλλα π.χ. ἀναλαμβάνουν τὴν προστασίαν τοῦ ὄργανισμοῦ ἀπὸ τὰς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος (κύτταρα τοῦ δέρματος), ἄλλα τὴν

παραγωγήν ώρισμένων ούσιῶν (κύτταρα τῶν ἀδένων) κ.ο.κ. "Ολα τὰ κύτταρα, τὰ ὅποια ἔχουν διαμορφωθῆ κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὡστε νὰ ἐκτελοῦν τὴν αὐτὴν ἐργασίαν, ἀποτελοῦν ἕνα ἵστον. Π.χ. τὰ κύτταρα, τὰ ὅποια καλύπτουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, ἀποτελοῦν τὸν ἐπιθήματος, ὁ ὅποιος περιλαμβάνει τὸ καλυπτήριον καὶ τὸ ἀδενικὸν ἐπιθήλιον. "Αλλα εἰδη ἴστῶν εἰναι ὁ ἑρειστικός (συνδετικός, χονδρικός, δστίτης, αίμα, λέμφος), ὁ μυϊκός καὶ διαφόρους ούσιας μεταξὺ τῶν κυττάρων (ἄλατα τῶν δστῶν).

"Εκαστος ἴστος, ἐκτὸς τῶν ζώντων κυττάρων του, δύναται νὰ περιλαμβάνῃ καὶ κύτταρα ἡλιοιωμένα (ἐπιδερμίς), ἥ καὶ νεκρὰ κύτταρα, καθὼς καὶ διαφόρους ούσιας μεταξὺ τῶν κυττάρων (ἄλατα τῶν δστῶν).

Εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ὡς καὶ τῶν ἀνωτέρων ζώων καὶ φυτῶν, δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν μέρη, τὰ ὅποια περιλαμβάνουν διάφορα εἰδη ἴστῶν, καὶ εἰναι κατάλληλα δι' ὡρισμένην ἐργασίαν. Τὰ τμήματα αὐτὰ καλοῦνται ὁργανικοί (στόμαχος, καρδία, ὀφθαλμὸς κτλ.). Ἀθροίσματα ὀργάνων συνεργαζομένων πρὸς ἐκτέλεσιν μιᾶς φυσιολογικῆς λειτουργίας ἀποτελοῦν τὰ ὄργανα της συστήματος (πεπτικὸν σύστημα, νευρικὸν σύστημα κ.ο.κ.).

Ο ἀνθρωπος. 'Ἐφέτος θὰ μελετήσωμεν ἰδιαιτέρως τὸν ὄργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα ἀπὸ ὅλον τὸν ἔμβιον κόσμον διαθέτει μὲ τὰς ίκανότητάς του, τὴν νόησιν καὶ τὸν πολιτισμόν, τὸν ὅποιον ἐδημιούργησε.

Εἰς τὰς γενικὰς γραμμὰς διαφοράς τοῦ ἀνθρώπου διαφέρει πρὸς τὸν ὄργανισμὸν τῶν λοιπῶν Θηλαστικῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἀνωτέρων ἔξι αὐτῶν, τῶν Πρωτεύοντων. Παρουσιάζει δύως ἡ κατασκευὴ τοῦ σώματος του καὶ σημαντικὰς διαφορὰς πρὸς αὐτά, αἱ ὅποιαι ἔχουν μεγάλην σπουδαιότητα διὰ τὴν ἔξαιρετικήν της, τὴν διαφοράν την ἡκολούθησεν διαφοράς. Εἰς τὴν περιγραφὴν τῶν διαφόρων συστημάτων τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ θὰ μᾶς διθῆ ἡ εὐκαιρία νὰ παρατηρήσωμεν ώρισμένας ἐκ τῶν διαφορῶν τούτων καὶ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν σημασίαν των.

Τὸ βιβλίον αὐτὸν θέλει νὰ συντροφεύσῃ τὸ 'Ελληνόπουλον τῆς Β' Γυμνασίου κατὰ τὴν ὥραν τῆς μελέτης του. "Εχει σκοπὸν να βοηθήσῃ τὸν μαθητήν, διὰ νὰ ἐπαναλάβῃ καὶ νὰ ἀφομοιώσῃ διαδιδάχθη εἰς τὴν τάξιν. Ούτω θὰ ἀποκτήσῃ διαθητής μίαν σαφή ιδέαν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Τὰ μαλακὰ μέρη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, δῆπος καὶ τοῦ σώματος τῶν ἄλλων Σπονδυλωτῶν, στηρίζονται ἐπάνω εἰς σκληρά μέρη, τὰ ὅποια καλοῦνται ὡστα. Τὰ ὄστα χρησιμεύουν ἀκόμη καὶ διὰ νὰ περικλείουν ὡρισμένα εὐπαθῆ ὄργανα καὶ νὰ ἐκτελοῦν, ἐλκόμενα ὑπὸ τῶν μυῶν, διαφόρους κινήσεις.

Τὸ κύριον συστατικὸν τῶν ὄστῶν εἶναι ὁ ὄστίτης ιστός, ἐνῷ ἡ μεσοκυττάριος ούσια αὐτῶν εἶναι ἐμπεποτισμένη ὑπὸ ἀνοργάνων ἀλάτων, τὰ ὅποια προσδίδουν σκληρότητα καὶ στερεότητα. Οὔτως ἡ σύστασις τῶν ὄστῶν εἶναι 35% ὄργανικαὶ καὶ 65% ἀνόργανοὶ ούσιαί.



Εἰκ. 2. Μικροσκοπική τομὴ
όστοῦ.

Τὰ ὄστα τοῦ ἐμβρύου εἶναι ἀρχικῶς ύμενώδη. Κατόπιν ἄλλα μὲν ἔξ αὐτῶν μετατρέπονται εἰς χόνδρινα καὶ ἐν συνεχείᾳ λαμβάνουν τὴν τελικὴν σκληρὰν μορφὴν ἔξ ὄστίτου ιστοῦ, ἄλλα δὲ (τὰ ὄστα τοῦ κρανίου) λαμβάνουν ἀπ' εὐθείας τὴν τελικὴν αὐτὴν σκληρὰν μορφὴν. Τὰ πρῶτα καλοῦνται χονδρογενῆ καὶ τὰ δεύτερα ύμενογενῆ ἢ δερματογενῆ ὄστα.

Κατὰ τὴν ἐμβρυϊκὴν ἡλικίαν μερικὰ κύτταρα τῶν ύμένων καὶ τῶν χόνδρων

διαφοροποιοῦνται εἰς εἰδικὰ κύπταρα, τοὺς ὀστεοβλάστας, οἱ ὄποιοι ἐκκρίνουν μίαν μαλακήν ὁργανικήν οὔσιαν, τὴν ὄστεον η ν. Διὰ τοῦτο τὰ ὀστᾶ τῶν μικρῶν παιδιῶν εἶναι μαλακὰ καὶ εὔκαμπτα. ‘Οσον δῆμως προχωρεῖ ἡ ἡλικία τὸ αἷμα προσκομίζει καὶ ἀποθέτει διάφορα ἀλατα. Οὕτω τὰ ὀστᾶ καθίστανται σκληρότερα, συγχρόνως δῆμως καὶ περισσότερον εὐθραυστα. Μέχρι τοῦ είκοστοῦ περίπου ἔτους τῆς ἡλικίας ἡ ἀποστέωσις αὕτη συμπληρώνεται καὶ ἡ αὔξησις τῶν ὀστῶν σταματᾷ πλέον.

‘Ωστε, ἂν παρατηρήσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον μίαν τομὴν ὀστοῦ (εἰκ. 2), θὰ διακρίνωμεν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ διαφόρους ὄπας, αἱ ὄποιαὶ εἶναι αἱ τομαὶ τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων. Περὶ αὐτὰς θὰ παρατηρήσωμεν, συγκεντρωτικῶς τοποθετημένας, πολλὰς μικροτέρας ὄπας, αἱ ὄποιαὶ εἶναι αἱ θέσεις τῶν κυττάρων. ‘Ο λοιπὸς χῶρος κατέχεται ἀπὸ τὴν ὄστείνην, ἡ ὄποια ἔχει σκληρυνθῆ διὰ τῆς ἀποθέσεως τῶν ἀλάτων ἀσβεστίου, μαγνησίου καὶ ἄλλων.



Τὰ μέρη τῶν ὀστῶν ἄλλα μὲν εἶναι συμπαγῆ, ἄλλα δὲ σπιραγῆ γαδὴ. Γενικῶς εἶναι συμπαγῆ τὰ τοιχώματα τῶν μακρῶν κοίλων ὀστῶν, ἐνῷ τὰ μικρὰ καὶ πλατέα ὀστᾶ, καθὼς καὶ τὰ ἀκραῖα τμήματα τῶν μακρῶν ὀστῶν, εἶναι σπιραγῶδη.

Εἰς τὰ διάκενα τῶν σπιραγῶδῶν ὀστῶν καὶ εἰς τὰς κοιλότητας τῶν μακρῶν ὀστῶν εὑρίσκεται ἔνας μαλακὸς ὑπέρυθρος ἰστός, διπυελός τῶν ὀστῶν. Κατὰ τὴν γεροντικήν ἡλικίαν, λόγῳ τῆς ἀποθέσεως λίπους, διμελός τῶν ὀστῶν ἀποκτᾷ ὑποκίτρινον χρῶμα. ‘Η ἐπιφάνεια τῶν ὀστῶν καλύπτεται ἀπὸ ἓν λεπτὸν ὑμενῶδες περιόστεον μὲν πολλὰ αἱμοφόρα ἀγγεῖα καὶ νεῦρα. ‘Ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας πολλῶν ὀστῶν διακρίνομεν δύπας, διὰ τῶν δοπιών διέρχονται αἱμοφόρα ἀγγεῖα, καλούμενα τρίματα, διαφόρους ἔξογκώσεις, καλούμενα φύματα, καὶ διαφόρους προεκτάσεις, καλούμενα ἀποφύσεις, ἀκάνθας κτλ.

2. ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Σχεδὸν δλα τὰ ὀστᾶ τοῦ σώματος εἶναι συνηρμολογημένα μεταξύ των, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἓν ἐνιαῖον σύνολον, τὸν σκελετὸν (εἰκ. 3 καὶ 4). ‘Η σύνδεσις δύο ὀστῶν δύναται νὰ γίνῃ κατὰ δύο τρόπους. ‘Ο πρῶτος καλεῖται συνάρθρωσις καὶ δὲν ἐπιτρέπει






Εικ. 4. Ακτινογραφία όλοκλήρου τοῦ σκελετοῦ.

Εικ. 3. Ο σκελετός τοῦ άνθρωπίνου σώματος.— 1. Κεφαλή. — 2. Σπονδυλική στήλη. — 3. Τὸ στέρνον. — 5. Βραχιόνιον δστοῦν. — 6. Ἡ λεκάνη. — 7. Κερκίς. — 8. Ὀλένη. — 9. Οστᾶ τῆς ἄκρας χειρός. — 10. Μηριαῖον δστοῦν. — 11. Περόνη. — 12. Κνήμη. — 13. Ἐπιγονατίς. — 14. Οστᾶ τοῦ ἄκρου ποδός. — 15. Τροχιλία. — 16. Κόνδυλος. — 17. Ακρώμιον.

τὴν κίνησιν τῶν συνδεομένων ὄστῶν. Ὁ δεύτερος ἐπιτρέπει τὴν κίνησιν καὶ καλεῖται διάρθρωσις (εἰκ. 5) αἱ ἐφαπτόμεναι ἐπιφάνειαι τῶν ὄστῶν καλύπτονται μὲν ἐν στρῶμα ἀρθρικοῦ χόνδρου. "Ολη ἡ διάρθρωσις περιβάλλεται ἀπὸ ἴνωδη σάκκου, σχηματιζόμενον ὑπὸ τοῦ περιοστέου καὶ ταινιῶν συνδετικοῦ ὄστου. Ὁ σάκκος οὗτος καλεῖται ἀρθρικὸς θύλακος καὶ χρησιμεύει διὰ τὴν συγκράτησιν τῶν ὄστῶν τῆς διαρθρώσεως. Οἱ ἀρθρικοὶ χόνδροι διαβρέχονται ἀπὸ ἐν ὑγρόν, καλούμενον ἀρθρικὸν ύγρον, τὸ ὅποιον διευκολύνει τὴν ὀλίσθησιν τῶν ὄστῶν.



Εἰκ. 5. Διάρθρωσις τοῦ ὕμου.

4. Τομὴ τῆς ὠμοπλάτης.—5. Τομὴ τοῦ βραχιονίου ὄστου.—'Αρθρικὸς θύλακος.

3. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Εἰς τὸν σκελετὸν διακρίνομεν τὰ ἔξι τμήματα: τὸν σκελετὸν τῆς κεφαλῆς, τὸν σκελετὸν τοῦ κορμοῦ καὶ τὸν σκελετὸν τῶν ἄκρων.

I. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Ο σκελετὸς τῆς κεφαλῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο διαδικτυαῖς ὄστῶν: τὰ ὄστα τοῦ κρανίου καὶ τὰ ὄστα τοῦ προσώπου.

Τὰ ὄστα τοῦ κρανίου εἰναι λεπτὰ καὶ πλατέα καὶ σχηματίζουν μίαν κλειστὴν κοιλότητα, τὴν κρανιακὴν κοιλότητα.

Τὰ ὄστα τοῦ προσώπου σχηματίζουν τὰς δύο ὀφθαλμικὰς κόγχας, τὴν ρινικὴν κοιλότητα καὶ τὴν στοματικὴν κοιλότητα.


Ἐξ ὀλῶν τῶν ὄστῶν τῆς κεφαλῆς μόνον τὸ ὄστον τῆς κάτω σιαγόνος εἶναι κινητόν, συνδεόμενον διὰ διαρθρώσεως πρὸς τὰ ἄλλα.

Λεπτομερέστερον, ή δόνομασία, ή μορφή καὶ ἡ θέσις τῶν ὀστῶν τῆς κεφαλῆς (εἰκ. 6 καὶ 7) ἔχουν ως ἔξης:

A') ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

1) **Τὸ μετωπιαῖον.** Τοῦτο κατέχει τὸ πρόσθιον καὶ ἄνω τοίχωμα τῆς κρανιακῆς κοιλότητος καὶ σχηματίζει ἐπάνω ἀπὸ κάθε ὀφθαλμὸν μίαν ἐλαφρὰν ύπεγερσιν, τὸ ὑπερόφρυνον τόξον.

2) **Τὰ δύο βρεγματικὰ** (ἀριστερὸν καὶ δεξιόν). Ταῦτα ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ θόλου τῆς κρανιακῆς κοιλότητος καὶ συναρθροῦνται κατὰ τὸ μέσον πρὸς ἄλληλα, ἐμπρὸς πρὸς τὸ μετωπικόν, διπλά πρὸς τὸ ἴνιακόν καὶ πλαγίως πρὸς τὸ σφηνοειδές καὶ τὸ κροταφικόν.




Εἰκ. 6. Ὁ σκελετὸς τῆς κεφαλῆς.

- 1. Μετωπικόν. — 2. Βρεγματικόν. — 3. Κροταφικόν. — 4. Σφηνοειδές. — 5. Ἰνιακόν. — 6. Ζυγωματικόν. — 7. Ἀνω γναθικόν. — 8. Κάτω γναθικόν. — 9. Ρινικόν. — 10. Μαστοειδῆς ἀπόφυσης τοῦ κροταφικοῦ. — 11. Βελονοειδῆς ἀπόφυσης τοῦ κροταφικοῦ. — 12. Ἀκουστικὸς πόρος.

3) **Τὸ ἴνιακόν.** Τοῦτο συμπληρώνει τὸν θόλον τοῦ κρανίου πρὸς τὰ διπλά τοῦ κρανίου φέρει τὸ ἴνιακόν τρῆμα, διὰ τοῦ διποίου ἐπικοινωνεῖ ἡ κρανιακὴ κοιλότης μετὰ τοῦ σπονδυλικοῦ σωλήνος. Ἐκατέρωθεν τοῦ τρήματος ὑπάρχει ἀνὰ ἓν ἔξογκωμα, καλούμενον ἴνιακός καὶ δυλιός. Διὰ τῶν ἴνιακῶν κονδύλων στηρίζεται ἡ κεφαλὴ ἐπὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

4) **Τὰ δύο χροταφικὰ** (ἀριστερὸν καὶ δεξιόν). Ταῦτα σχηματίζουν μετὰ τοῦ



Εἰκ. 7. Τὰ ὄστα τῆς κεφαλῆς.

1. Μετωπικόν.—2. Βρεγματικόν.—3. Ἰνιακόν.—4, 5. Κροταφικόν.—
6. Σφηνοειδές.—7. Ἡθμοειδές.—8. Ζυγωματικόν.—9. Ἀνω γναθικόν.—
10. Κάτω γναθικόν.—11. Υνίς.—12. Ρινικόν.—13. Δακρυϊκόν.

σφηνοειδοῦς τὰς πλευρὰς τῆς κρανιακῆς κοιλότητος. Ἐκαστον κροταφικὸν συναρθροῦται ὅπίσω πρὸς τὸ Ἰνιακόν, ἐπάνω μὲ τὸ ἀντίστοιχον βρεγματικὸν καὶ ἐμπρὸς μὲ τὸ σφηνοειδές. Πρὸς τὰ κάτω παρουσιάζει μίαν ἔλευθέραν ἀπόφυσιν, τὴν μαστοειδῆ ἀπόφυσιν, μίαν ἀπόφυσιν συνδεομένην μὲ τὸ ζυγωματικόν, τὴν ζυγωματικὴν ἀπόφυσιν, καὶ μίαν μικρὰν κοίλην ἐπιφάνειαν, πρὸς τὴν ὅποιαν ἀρθροῦται ἡ κάτω γνάθος. Κατὰ τὴν βάσιν καὶ πρὸ τῆς μαστοειδοῦς ἀπόφυσεως, φέρει ἐκαστον κροταφικὸν τὴν κοιλότητα, ἐντὸς τῆς ὅποιας εύρισκονται τὰ ὄργανα τῆς ἀκοῆς.

5) Τὸ σφηνοειδές. Είναι ἐσφηνωμένον εἰς τὴν βάσιν τοῦ κρανίου, ἔχον ὅπισθεν αὐτοῦ τὴν βάσιν τοῦ Ἰνιακοῦ ὄστου, καὶ ἐμπροσθεν τὸ ἡθμοειδές. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν δριζόντιον τμῆμα, τὸ ὅποιον κατέχει τὸ μέσον τῆς βάσεως τοῦ κρανίου καὶ δύο πτέρυγας, αἱ ὅποιαι συμμετέχουν εἰς τὸν σχηματισμὸν τῶν πλευρικῶν τοιχωμάτων τῆς κρανιακῆς κοιλότητος.

6) Τὸ ἡθμοειδές. Τοῦτο ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ ἐν δριζόντιον καὶ τρία κάθετα πρὸς τὰ κάτω τμήματα. Ἐκ τούτων τὸ δριζόντιον συμπληρώνει πρὸ τοῦ σφηνοειδοῦς τὴν βάσιν τῆς κρανιακῆς κοιλότητος, τὴν ὅποιαν χωρίζει ἀπὸ τὴν ρινικήν. Τὰ δύο ἀκραῖα κάθετα πέταλα μαζὶ μὲ τὰς δύο ρινικὰς κόγχας ἀποτελοῦν τὰ πλάγια τοιχώματα τῆς ρινικῆς κοιλότητος (εἰκ. 7), τὴν ὅποιαν χωρίζουν ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχον ὀφθαλμικὴν κόγχην. Τὸ μεσαῖον πέταλον συμμετέχει εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος.

Β') ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1) Ήνιες. Αὗτη εἶναι ἐν τετράπλευρον ὀστέινον πέταλον, τὸ ὅποιον, μαζὶ μὲ τὸ κάθετον μεσαῖον τμῆμα τοῦ ἡθμοειδοῦς, σχηματίζει τὸ ρινικὸν διάφραγμα. Μὲ τὸ ἄνω καὶ τὸ ὅπισθιον χειλός του συναρθροῦται πρὸς τὸ ἡθμοειδές, καὶ τὸ σφηνοειδὲς μὲ τὸ κάτω χειλός ἀκουμβᾶ εἰς τὴν ὄροφήν τῆς στοματικῆς κοιλότητος.

2) Τὰ δύο ρινικά. Ταῦτα εἶναι μικρὰ τετράπλευρα πετάλια, τὰ δύοια σχηματίζουν τὴν ράχιν τῆς ρινός.

3) Αἱ δύο κάτω ρινικαὶ κόγχαι. Λεπτὰ ύπόκυρτα ὀστέινα πέταλα εύρισκονται εἰς τὰ πλάγια τοιχώματα τῆς κοιλότητος τῆς ρινός.

4) Τὰ δύο δακρυϊκά. Καὶ αὐτὰ εἶναι μικρὰ πετάλια, τὰ δύοια εύρισκονται ἀνὰ ἐν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοίχωμα ἐκάστης ὀφθαλμικῆς κόγχης.

5) Τὰ δύο ζυγωματικά (δεξιὸν καὶ ἀριστερόν). "Ἐκαστον σχηματίζει ἀπὸ τοῦ κροταφικοῦ μέχρι τοῦ ἄνω γναθικοῦ ἐν ὀστέινον τόξον παράλληλον πρὸς τὸ πλευρικὸν τοίχωμα τῆς κρανιακῆς κοιλότητος. Τὰ τόξα ταῦτα, καλούμενα ζυγωματικὰ τόξα, σχηματίζουν τὰ λεγόμενα μῆλα τοῦ προσώπου, τὰ δύοια ἔχουν περισσότερον εἰς τὰς μογγολικὰς φυλάς.

6) Αἱ δύο ἄνω γνάθοι. Ἔνούμεναι εἰς τὸ μέσον ἀποτελοῦν τὸ κυριώτερον μέρος τοῦ σκελετοῦ τοῦ προσώπου καὶ συμπληρώνουν τὰ τοιχώματα τοῦ στόματος, τῆς κοιλότητος τῆς ρινός, τῶν ὀφθαλμικῶν κογχῶν καὶ φέρουν τὰ φατνία διὰ τὴν στερέωσιν τῶν δόδοντων.

7) Τὰ δύο ὑπερωϊα. Ταῦτα εἶναι δύο ὀστέινα πέταλα, τὰ δύοια εύρισκονται εἰς τὸ ὅπισθεν μέρος τῆς ρινός καὶ παρεμβάλλονται

μεταξύ τῆς ἄνω γνάθου καὶ τοῦ σφηνοειδοῦς δόστοῦ, συμβάλλουν δὲ εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ ἔξω τοιχώματος τῆς ρινικῆς κοιλότητος, τῆς ὀπισθίας δόστείνης ὑπερώας καὶ τῶν ὀφθαλμικῶν κογχῶν.

8) **Ἡ κάτω γνάθος.** Τοῦτο εἶναι τὸ ἴσχυρότερον καὶ τὸ μόνον κινητὸν δόστοῦν τῆς κεφαλῆς. Διακρίνομεν εἰς αὐτὸν ἀφ' ἐνὸς ἐν πεταλοειδές σῶμα, τὸ δόποιον εἰς τὸ ἄνω χειλός του φέρει ἐπίστης σειρὰν φατνίων, καὶ ἀφ' ἑτέρου δύο κλάδους. Οἱ κλάδοι οὗτοι κατευθύνονται πρὸς τὰ ἄνω καὶ διχάζονται ἕκαστος εἰς δύο ἀποφύσεις, διὰ τῶν δόποιών γίνεται διάρθρωσις τῆς κάτω γνάθου πρὸς τὰ δόστα τῆς κεφαλῆς.

9) **Τὸ ὑοειδὲς δόστοῦν.** Τοῦτο δὲν συνδέεται πρὸς τὰ ἄλλα δόστα καὶ εὑρίσκεται κατὰ τὴν βάσιν τῆς γλώσσης, ἐπάνω ἀπὸ τὸν θυρεοειδῆ χόνδρον τοῦ λάρυγγος. Ἐχει σχῆμα ἀνοικτοῦ ὑψιλον.

II. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

‘Ο σκελετὸς τοῦ κορμοῦ (εἰκ. 8) περιλαμβάνει τὴν σπονδυλικὴν στήλην στήλην καὶ τὰς πλευρὰς μετὰ τοῦ στέρνου.


A') ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

‘Η σπονδυλικὴ στήλη εἶναι μία σειρὰ μικρῶν δόστῶν, τῶν σπονδύλων, ἡ δόποια ἀρχίζει ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ κρανίου καὶ διατρέχει κατὰ τὸ μέσον τῆς ράχεως τὸν κορμόν. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 33 σπονδύλους, ἐκ τῶν δόποιών οἱ πρῶτοι ἐπτά καλοῦνται αὔχενικοί, οἱ ἐπόμενοι δώδεκα θωρακικοί καὶ οἱ ἐπόμενοι πέντε ὁσφικοί. Ἐκ τῶν ὑπολοίπων, οἱ πέντε συνενοῦνται καὶ σχηματίζουν ἐν πλατύτερην κόκκυγα, ὁ δόποιος κατέχει τὸ ἄκρον τῆς σπονδυλικῆς στήλης (εἰκ. 13). Μεταξύ τῶν σωμάτων τῶν σπονδύλων παρεμβάλλονται λεπταὶ πλάκες χόνδρου, οἱ μεσοσπονδύλιοι χόνδροι, προσδιδόντες εύκαμψίαν καὶ ἐλαστικότητα.

Εἰς κάθε σπόνδυλον (εἰκ. 9) διακρίνομεν ἐν κυλινδρικὸν σῶμα καὶ ἐν τόξον, μεταξύ δὲ τούτων παραμένει διάκενον, καλούμενον τρῆμα τοῦ σπονδύλου. Τὸ τόξον φέρει διαφόρους ἀποφύσεις,

αἱ ὅποιαι χρησιμεύουν ἄλλαι μὲν διὰ τὴν στήριξιν τῶν σπονδύλων μεταξύ των, ἄλλαι δὲ διὰ τὴν πρόσφυσιν μυῶν καὶ τὸν περιορισμὸν τῶν κινήσεων τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Εἰς τοὺς πλείστους σπονδύλους μεγαλυτέρα ἀπόφυσις εἶναι ἡ ἀκανθώδης, ἡ ὁποία εύρισκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ τόξου καὶ κατευθύνεται πρὸς τὰ ὄπιστα.

“Ολοι οἱ σπόνδυλοι δὲν εἶναι ἀπολύτως ὅμοιοι μεταξύ των. Π.χ. οἱ δύο πρῶτοι (ὁ ἀτλασ καὶ ὁ ἐπιστροφεύς) δὲν ἔχουν ἀνεπτυγμένον σῶμα καὶ ὁμοιάζουν πρὸς δακτυλίους (εἰκ. 11).



Εἰκ. 8. Ὁ σκελετὸς τοῦ κορμοῦ
καὶ τῶν ἄνω ἄκρων.

Αἱ ἀποφύσεις των εἶναι διαμορφωμέναι κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ διευκολύνουν τὴν στήριξιν καὶ περιστροφὴν τῆς κεφαλῆς. Ὁ ἐπιστροφεύς φέρει ἴσχυρὰν ὀδοντοειδῆ ἀπόφυσιν, περὶ τὴν ὄποιαν στρέφεται ὁ ἀτλας μετὰ τῆς κεφαλῆς. Εἰς τοὺς θωρακικοὺς σπονδύλους πάλιν παραστηροῦμεν, ὅτι αἱ ἀκανθώδεις ἀποφύσεις κατευθύνονται ὅχι μόνον πρὸς τὰ ὄπιστα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ κάτω, παρεμποδίζουσαι οὕτω τὴν ἔκτασιν τῆς σπονδυλικῆς στήλης πέραν ἐνὸς δρίου.

“Οσον προχωροῦμεν πρὸς τοὺς τελευταίους ὀσφυϊκούς, συναντῶμεν σπονδύλους ὀλοέντησχυροτέρους, καταλλήλους διὰ νὰ βαστάσουν μεγαλύτερον βάρος.


Τὰ τρήματα τῶν σπονδύλων εύρισκονται τὸ ἐν κάτωθεν τοῦ ἄλλου καὶ ἀποτελοῦν ἔνα συνεχῆ νωτιαῖον σῶλην, ἐντὸς τοῦ ὄποιου εύρισκεται ὁ νωτιαῖος μυελός.

Ἡ σπονδυλικὴ στήλη δὲν εἶναι εὐθεῖα, ἀλλὰ κυρτοῦται εἰς μὲν τὴν αὐχενικὴν καὶ ὁσφυϊκὴν μοῖραν πρὸς τὰ ἐμπρός, εἰς δὲ τὴν θωρακικὴν καὶ Ἱερὰν πρὸς τὰ ὄπίσω. Τὰ δύο πρῶτα κυρτώματα δὲν ὑπάρχουν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ διαμορφώνονται, ὅταν ἀρχίζῃ τὸ βρέφος νὰ βαδίζῃ καὶ νὰ κάθηται, ἐνῷ τὰ δεύτερα διαμορφοῦνται κατὰ τὴν ἐμβρυϊκὴν ἡλικίαν διὰ τὴν στήριξιν τῶν σπλάγχνων.


Β') Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ

Πρὸς τὰς πλαγίας ἀποφύσεις τῶν θωρακικῶν σπονδύλων ἀρθροῦνται αἱ πλευραί. Αὗται, 12 ἐν ὅλῳ ζεύγη, ἥτοι ἕν ζεύγος δι’ ἕκαστον θωρακικὸν σπόνδυλον, εἶναι ἐπιμήκη τοξοειδῆ ὀστᾶ, τὰ ὅποια μετὰ τῶν σπονδύλων καὶ τοῦ στέρνου περικλείουν τὴν θωρακικὴν κοιλότητα. Τὰ πρῶτα ἐπτά ζεύγη συνεχίζονται ἐμπρὸς μὲν χόνδρινα τμῆματα,

τὰ ὅποια ἔνώνονται μὲν τὸ στέρνον. Τοῦτο εἶναι ξιφοειδὲς ὀστοῦν, τὸ ὅποιον εὔρισκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ προσθίου τοιχώματος τοῦ θώρακος. Τὰ χόνδρινα τμῆματα τῶν ἐπομένων τριῶν ζευγῶν δὲν φθάνουν μέχρι τοῦ στέρνου, ἀλλὰ ἀπολήγουν εἰς τὸ χόνδρινον τμῆμα τοῦ ἐβδόμου ζεύγους (νόθοι πλευραί). Τέλος, τὰ δύο τελευταῖα ζεύγη πλευρῶν



Εἰκ. 10. Οι δύο πρῶτοι αὐχενικοί σπόνδυλοι. Ἀνω δάτλας, κάτω δὲπιστροφεύς.



Εἰκ. 9. Σχῆμα σπονδύλων.

1. Σῶμα τοῦ σπονδύλου.
2. Τόξον τοῦ σπονδύλου.
3. Τρῆμα τοῦ σπονδύλου.
4. Ἀκανθώδης ἀπόφυσις.
5. Μεσοσπονδύλιος χόνδρος.

λιναι ἀτροφικὰ καὶ δὲν ἔχουν χόνδρινα τμήματα (νόθοι ἀσύντακτοι πλευραί).

III. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ

Θά ἔξετάσωμεν ίδιαιτέρως τὸν σκελετὸν τῶν ἄνω ἄκρων καὶ τῶν ὅμων καὶ τὸν σκελετὸν τῶν κάτω ἄκρων καὶ τῆς λεκάνης.


A') Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (ΧΕΙΡΩΝ)

"Ἐκαστον ἐκ τῶν δύο ἄνω ἄκρων ἀρθροῦται πρὸς τὰ ὄστα τοῦ ἀντιστοίχου ὅμου. Τὰ ὄστα ταῦτα εἶναι δύο, ἡ κλεῖς καὶ ἡ ὡ μοπλάτη.

"Ἡ κλείς εἶναι ἐπίμηκες ὄστοῦν, τὸ ὅποιον ἐκτείνεται ὥριζοντίως ἀπὸ τὸ ἄνω ἄκρον τοῦ στέροντος μέχρι τῆς ὡμοπλάτης.

"Ἡ ὡμοπλάτη (εἰκ. 11) εἶναι πλατὺ ὄστοῦν, τὸ ὅποιον κατέχει τὸ ἄνω καὶ ἔξω ἄκρον τῆς ραχιαίας ἐπιφανείας τοῦ θώρακος. Ἐχει σχῆμα τριγώνου, τοῦ ὅποιού ἡ βάσις εἶναι σχεδὸν παράλληλος πρὸς τὴν δευτέραν πλευράν, ἡ δὲ κορυφὴ φθάνει τὴν ἔβδομην πλευράν. Πρὸς τὰ ἔξω σχηματίζει ἡ ὡμοπλάτη μίαν ἀπόφυσιν, καλουμένην ἄκρω μιον, πρὸς τὴν ὄποιαν ἀρθροῦται τὸ ἄκρον τῆς κλειδός.

"Ἐκαστον ἄνω ἄκρον περιλαμβάνει τρία τμήματα: τὸν βραχίονα, τὸν πηχυνὴν ἡ ἀντιβραχίονα καὶ τὴν ἄκραν ἡ κυρίως χειρα (εἰκ. 3, 4, 8).



Εἰκ. 11. Ἡ ὡμοπλάτη
(ἐκ τῶν ὄπισθεν).
1. Τὸ ἄκρωμιον.

"Ο σκελετὸς τοῦ βραχίονος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν μακρὸν ὄστοῦν, τὸ βραχίονα. Τοῦτο εἶναι κοῖλον ἐσωτερικῶς καὶ εἰς τὸ ἄνω ἄκρον του ἀπολήγει εἰς μίαν σφαιρικὴν κεφαλήν, ἡ ὄποια χρησιμεύει διὰ τὴν ἀρθρωσιν εἰς μίαν κοιλότητα τῆς ὡμοπλάτης, καλουμένην ὡμογλήνην καὶ κειμένην πλησίον τοῦ ἄκρωμίου. Εἰς τὸ κάτω ἄκρον τὸ βραχιόνιον ἀπολήγει εἰς δύο ὄγκώματα, ἐκ τῶν ὄποιών τὸ ἐν πρὸς τὰ ἔξω εἶναι μικρότερον καὶ καλεῖται κόνδυλος, τὸ δὲ πρὸς τὰ ἔσω εἶναι μεγα-

λύτερον καὶ καλεῖται τροχιλία.
Τὰ ὄγκωματα αὐτὰ χρησιμέουν διὰ
τὴν διάρθρωσιν τοῦ βραχιονίου πρὸς
τὰ δύο ὀστᾶ τοῦ πήχεως.

Ο σκελετὸς τοῦ πήχεως περιλαμ-
βάνει δύο ὀστᾶ, τὴν κερκίδαν καὶ
τὴν ὠλένην. Ταῦτα ἀρθροῦνται
ἀφ' ἐνὸς μὲν πρὸς τὸ βραχιόνιον (ἡ
κερκίδα διὰ τοῦ κονδύλου καὶ ἡ ὠλένη
διὰ τῆς τροχιλίας), ἀφ' ἑτέρου δὲ
πρὸς τὴν ἄκραν χειρα. Τὸ κάτω ἄ-
κρον τῆς ὠλένης εἶναι λεπτότερον τοῦ
ἄνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μι-
κρὸν δάκτυλον τῆς χειρός. Ἀντι-
στρόφως, εἰς τὴν κερκίδα τὸ κατώ-
τερον ἄκρον εἶναι ὄγκωδέστερον τοῦ
άνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μέ-
γαν δάκτυλον. Η ὠλένη εἶναι ὀ-
λίγον μακροτέρα τῆς κερκίδος.


Ο σκελετὸς τῆς κυρίως χειρὸς
σχηματίζεται ἀπὸ τρεις ὁμάδας ὀστῶν: τὰ
μετακαρπίου καὶ τῶν δακτύλων (εἰκ. 12).
Τὰ ὀστᾶ τοῦ καρποῦ εἶναι ὀκτὼ μικρὰ ὀστάρια, περίπου στρογ-
γύλα, διατεταγμένα εἰς δύο στοίχους ἀνὰ τέσσαρα, τὰ δέντρα καὶ
τὰ κάτω.

Τὰ ὀστᾶ τοῦ μετακαρπίου εἶναι πέντε, ἐπιμήκη,
διαρθρούμενα ἀφ' ἐνὸς μὲν τὰ ὀστᾶ τοῦ καρποῦ καὶ ἀφ' ἑτέρου μὲ
τὰς φάλαγγας τῶν δακτύλων.


Ο σκελετὸς ἑκάστου δακτύλου ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία διαδοχικά
ἐπιμήκη ὀστάρια, τὰς φάλαγγας, πλὴν τοῦ ἀντίχειρος, ὃ
ὅποιος περιλαμβάνει δύο φάλαγγας.

Β') Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΠΟΔΩΝ)

Τὰ ὀστᾶ τῆς λεκάνης (εἰκ. 13) χρησιμέουν ἀφ' ἐνὸς διὰ τὴν
στερέωσιν τῶν κάτω ἄκρων καὶ ἀφ' ἑτέρου διὰ τὴν ὑποστήριξιν



Εἰκ. 12. Ο σκελετὸς τῆς ἄκρας χειρός. 1. Οστᾶ τοῦ καρποῦ.—
2-6. Οστᾶ τοῦ μετακαρπίου.—
7-20. Άι φάλαγγες τῶν δακτύλων.



Eik. 13. 'Ο σκελετός τῆς λεκάνης.

1. Ιερὸν ὄστοῦν. — 5. Κόκκυς. — 2. Ἀνώνυμον ὄστοῦν. — 3. Ἡβικὴ σύμφυσις. — 6. Στόμιον τῆς λεκάνης. — 4. Θυρεοειδὲς τρῆμα. — 7. Κοτύλη.


φυσιν. Μεταξύ τῶν ὄστῶν τῆς λεκάνης παραμένει ἐν εὐρύ διάκενον, τὸ στόμιον τῆς λεκάνης. "Έκαστον ἀνώνυμον ὄστοῦν φέρει κατὰ τὸ πρόσθιον ἄκρον του ἐν τρῆμα, τὸ ὅποιον καλεῖται θυρεοειδὲς τρῆμα. Τοῦτο εἰς μὲν τὸν ἄρρενα είναι ὡοειδὲς εἰς δὲ τὸ θῆλυ τριγωνικόν. Παρὰ τὸ θυρεοειδὲς τρῆμα ὑπάρχει ἐν κοιλωματείαι τῆς λεκάνης ἐπιφάνειαν ἔκαστου ἀνωνύμου ὄστοῦ. Τὸ κοιλωματείαι τοῦτο, καλούμενον κοτύλη, χρησιμεύει διὰ τὴν ἀρθρωσιν τοῦ μηριαίου ὄστοῦ.

Εἰς ἔκαστον πόδα διακρίνομεν τρία τμήματα: τὸν μηρόν, τὴν κνήμην καὶ τὸν ἄκρον πόδα (εἰκ. 3).

'Ο σκελετός τοῦ μηροῦ σχηματίζεται ἀπό ἐν μακρὸν ὄστοῦν, τὸ μηριαῖον. Τοῦτο ἔχει μῆκος ὅσον ὁ πῆχυς καὶ ἡ ἄκρα χείρ ὁμοῦ καὶ είναι τὸ μακρότερον ὄστοῦν τοῦ σώματος. Εἰς τὸ ἀνώτερον ἄκρον του ἀπολήγει εἰς μίαν κεφαλήν, ἡ ὅποια διαρθροῦται πρὸς τὴν κοτύλην τοῦ ἀνωνύμου ὄστοῦ, πρὸς τὰ κάτω δὲ συνδέεται μετὰ τῆς κνήμης.

'Η κνήμη περιλαμβάνει δύο μακρὰ ὄστᾶ: πρὸς τὰ ἔσω καὶ ἐμπρὸς τὴν κνήμην καὶ ἔκτος καὶ ὅπίσω τὴν περόνην. 'Ἐκ τούτων τὴν κνήμην είναι τὸ ἰσχυρότερον καὶ διὰ μὲν τοῦ ἀνωτέρου ἄκρου τῆς

τῶν σπλάγχνων. 'Η κοιλότης τῆς λεκάνης σχηματίζεται ἀπὸ τὸ ιερὸν ὄστοῦν καὶ ἀπὸ τὰ δύο ἀνώνυμα ὄστᾶ. Ταῦτα είναι πλαστέα καὶ ἴσχυρά καὶ συνενοῦνται ἀκινήτως μὲ τὸ ιερὸν ὄστοῦν. Πρὸς τὰ ἐμπρὸς συνενοῦνται μεταξύ των καὶ σχηματίζουν τὴν ἡβικὴν σύμ-



Εἰκ. 14. Ὁ σκελετὸς τοῦ ἄκρου ποδός. 1—7. Ὁστᾶ τοῦ ταρσοῦ. — 8—12. Ὁστᾶ τοῦ μεταταρσίου. — 13—26. Φάλαγγες τῶν δακτύλων.

ἀρθροῦται πρὸς τὸ μηριαῖον ὁστοῦν διὰ δὲ τοῦ κατωτέρου πρὸς τὸν ἀστράγαλον. Ἡ περόνη εἶναι ὁστοῦν λεπτότερον καὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς δὲν φθάνει μέχρι τοῦ μηροῦ, ἀλλὰ εἶναι πρασκεκολλημένον ἐπὶ τῆς κυνήμης. Μὲ τὸ κατώτερον ἄκρον τῶν ἀρθροῦνται πρὸς τὸν ἀστράγαλον.

Ἐμπροσθεν τῆς ἀρθρώσεως τοῦ γόνατος ὑπάρχει ἐν μικρὸν φακοειδὲς ὁστοῦν, ἥ ἐπιγονατίς.

Οἱ σκελετὸς τοῦ ἄκρου ποδὸς ἀποτελεῖται ἐξ 26 ὁστῶν καὶ περιλαμβάνει, ὅπως καὶ τῆς ἄκρας χειρός, τρία τμήματα: τὰ ὁστᾶ τοῦ ταρσοῦ, τοῦ μεταταρσίου καὶ τῶν δακτύλων (εἰκ. 14 καὶ 15).



Εἰκ. 15. Ἀκτινογραφία τοῦ ἄκρου ποδός.

‘Ο ταρσὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπτὰ δόστάρια, τοποθετημένα εἰς τρεῖς σειράς. ‘Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει δύο ίσχυρά δόστάρια, ἐκ τῶν δόπιοίν τοῦ ἐσωτερικὸν εἶναι ὁ ἀστράγαλος, τὸ δὲ ἄλλο ἡ πτέρνα, ἡ δόπιοία προεκτείνεται πρὸς τὰ δόπισω καὶ ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

Τὸ μετατάρσιον, διτιως καὶ τὸ μετακάρπιον, περιλαμβάνει πέντε ἐπιμήκη δόστάρια, ἀρθρούμενα ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὰ δόστα τοῦ ταρσοῦ καὶ ἀφ’ ἵτερου μὲ τὰς φάλαγγας τῶν δακτύλων.

Ἐκαστος τῶν πέντε δακτύλων περιλαμβάνει τρεῖς φάλαγγας, πλὴν τοῦ μεγάλου, ὁ δόπιος περιλαμβάνει δύο μόνον.

‘Ο ἄκρος ποὺς στηρίζεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὴν πτέρυναν καὶ ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὸ ἄκρον τοῦ μετατάρσιου καὶ τοὺς δακτύλους.

Τὸ ὑπόλοιπον μέρος δὲν ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἀλλὰ σχηματίζει ἐλαφρὸν κύρτωμα, τὴν καμάραν τοῦ ἄκρου ποδός.

4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὰ δόστα τοῦ σκελετοῦ πρὸ τῆς στερεοποίησεως εἶναι ἄλλα μὲν χόνδρινα, ἄλλα δὲ μεμβρανώδη, σκληρύνονται δὲ δι’ ἐναποθέσεως ἀνοργάνων ἀλάτων. Διακρίνομεν:

- α’) τὸν σκελετὸν τοῦ κορμοῦ (σπονδυλικὴ στήλη, πλευραί, στέρνον).
- β’) τὸν σκελετὸν τῆς κεφαλῆς (κρανίον, πρόσωπον).
- γ’) τὸν σκελετὸν τῶν ἄκρων (ἄμοι καὶ χείρες).
- δ’) τὸν σκελετὸν τῶν κάτω ἄκρων (λεκάνη καὶ πόδες).

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) ‘Ο λόγος τοῦ μεγίστου πλάτους πρὸς τὸ μέγιστον μῆκος τοῦ κρανίου καλεῖται κεφαλικὸς δείκτης. Π.χ. ἂν τὸ μῆκος τοῦ κρανίου εἴναι 20 ἔκ. καὶ τὸ πλάτος 15 ἔκ., ὁ κεφαλικὸς δείκτης εἶναι $15/20 = 0,75$ ἢ ἀπλῶς: 75. Οἱ ἔχοντες ἐπίμηκες κρανίους (δηλ. μικρὸν δείκτην κάτω τοῦ 75) καλοῦνται δολιχοκέφαλοι, οἱ δὲ ἔχοντες μεγάλον δείκτην (ἄνω τοῦ 83) καλοῦνται βραχυκέφαλοι (εἰκ. 16). Μεταξύ τούτων ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι ἐνδιάμεσοι κατηγορίαι.

2) Ἀποχωρισμὸς τῆς ὄργανικῆς ούσίας καὶ τῶν ἀνοργάνων, αὐτῶν τῶν δόστῶν.

Πειραματίζονται δύο τεμάχια δόστῶν ζώου τινός, ἐν δοχεῖον μὲ ὑδροχλωρικὸν δέρνεται, εἰς λύχνος καὶ συρμάτινον πλέγμα.

Αφήνομεν τὸ ἐν τεμάχιον δόστοῦ ἐντὸς τοῦ δέξεος ἐπὶ 1 - 2 ἡμέρας καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι ἀπομένει μία μᾶλακὴ μᾶζα. Αὕτη είναι ἡ ὀργανικὴ ούσια τοῦ δόστοῦ, ἐνῷ τὰ ἀνόργανα ἄλατα διελύθησαν. Ἐπίσης διαπυροῦμεν ἐπὶ τοῦ πλέγματος τὸ ἄλλο τεμάχιον καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι ἀπομένει τέφρα. Αὕτη ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἀνόργανα ἄλατα, ἐνῷ ἡ ὀργανικὴ ούσια ἔχει καῆ.

3) Αποχώρισε τὸ περιόστεον ἀπὸ ἐν δόστοῦ ζώου. Ἐπίσης, παρατήρησε ἔνα ἀρθρικὸν θύλακον καὶ τὸν ἀρθρικὸν χόνδρον.

4) Σχεδίασε τὰς κάμψεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐνὸς τετραπόδου.

5) Σχεδίασε τὴν φορὰν τῶν μηρῶν καὶ τῶν κνημῶν διαφόρων ἀτόμων.


6) Ἀνυπόδητος καὶ μὲ βρεγμένον πόδα πάτησε τὸ πάτωμα. Κάμε τὸ ἴδιον καθήμενος, καθὼς καὶ ὅρθιος καὶ κρατῶν ἐν βάρος. Σύγκρινε τὰ ἵχνη τοῦ ποδός σου εἰς τὸ πάτωμα.

7) Παρατήρησε ὅτι οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν σου δὲν ἀκουμβοῦν δλόκληροι εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ σχηματίζουν καὶ αὐτοὶ μίαν μικρὰν καμάραν.

8) Παρακολούθησε εἰς τὸν ἀντιβραχίονα τὴν φορὰν τῆς κερκίδος καὶ τῆς ὠλένης, ὅταν ἡ παλάμη είναι ὑπτία καὶ ὅταν είναι πρηνής. Πρόσεξε, ὅτι εἰς τὴν πρηνή θέσιν τὰ δύο δόστα διασταυροῦνται. (Μνημονικὸς κανὼν: 'Η κερ-κις ἀπολήγει εἰς τὸν μέγαν δάκτυλον, ἔχοντα δύο φάλαγγας. 'Η ω-λέ-νη εἰς τὸν μικρόν, ὁ δόποιος ἔχει τρεῖς φάλαγγας).

9) Καθόρισε εἰς τὸ σῶμα τὴν θέσιν τῶν κυριωτέρων δοτῶν.

10) Είναι πολὺ σπουδαῖον τὸ γεγονός τῆς ὀρθίας στάσεως



Εἰκ. 16. Ο κεφαλικός δείκτης. $\left(\frac{\gamma\delta}{\alpha\beta} \right)$

Δεξιά: δολιχοκέφαλος.

*Αριστερά: βραχυκέφαλος.

τοῦ ἀνθρώπου ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν στάσιν τῶν λοιπῶν Πρωτευοντῶν. Ποία ὁμοταξία Σπονδυλωτῶν παρουσιάζει ἐπίσης στήριξιν ἐπὶ τῶν ὅπισθίων μόνον ἄκρων;

11) Σύγκρινε τὸ σχῆμα τῆς τομῆς τοῦ ἀνθρωπίνου θώρακος καὶ ἑνὸς ἄλλου θηλαστικοῦ. Ἐπίσης σύγκρινε τὴν φορὰν τῶν πλευρῶν. Ποία εἶναι ἡ αἰτία τῶν παρατηρουμένων διαφορῶν;

12) Πῶς χρησιμοποιοῦν οἱ πίθηκοι τὰ πρόσθια ἄκρα των καὶ πῶς ὁ ἀνθρωπός; Ποῖον εἶναι τὸ μέγεθος τῶν προσθίων ἄκρων εἰς τὰς ἀνωτέρω κατηγορίας ἐν σχέσει πρὸς τὸ σῶμα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΟΙ ΜΥΕΣ. ΑΙ ΜΥ·Ι·ΚΑΙ ΙΝΕΣ


Μύες είναι τὰ ὅργανα, διὰ τῶν ὅποίων γίνονται αἱ κινήσεις τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ σώματος. Οἱ μύες ἐφαρμόζουν ἐπὶ ὁστῶν ἢ εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν μαλακῶν ὅργάνων τοῦ σώματος. Ἀνέρχονται εἰς 300 περίπου καὶ ἀποτελοῦν σχεδὸν τὸ ἥμισυ τοῦ βάρους τοῦ σώματος.

Τὰ μυϊκὰ κύτταρα είναι σχετικῶς μακρὰ καὶ ἐλαστικὰ καὶ καλοῦνται μυϊκαὶ Ἰνεσ, ἔχουν δὲ τὴν ἱκανότητα νὰ συστέλλωνται. Πολλαὶ μυϊκαὶ Ἰνεσ συνενοῦνται μεταξύ των μὲ τὸ ἐνδομύιον (συνδετικὸς ἴστος) καὶ ἀποτελοῦν μίαν μυϊκὴν δέσμην. Διὰ τῆς συστολῆς τῶν μυϊκῶν ἵνῶν ὅλος ὁ μῆν βραχύνεται, ἐνῷ κατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ (γαστὴρ τοῦ μυὸς) διογκοῦνται. Διακρίνουν γραμμάτων καὶ λεισμούς.

2. ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΜΥΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Οἱ γραμμωτοὶ μύες καλοῦνται οὔτω, διότι μέγα μέρος τοῦ πρωτοπλάσματός των ἀποτελεῖται ἀπὸ λεπτὰ Ἰνίδια (μυϊκὰ Ἰνίδια), εἰς τὰ ὅποια ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον διακρίνονται γραμμώσεις. Λόγω τῆς ἀφθονίας τῶν αἵμοφόρων ἀγγείων, οἱ γραμμωτοὶ μύες παρουσιάζουν ζωηρὸν ἐρυθρωπὸν χρῶμα.

Οἱ μύες οὕτοι καταφύονται ἐπὶ τῶν ὁστῶν καὶ, συστελλόμενοι, ἔλκουν αὐτά. Τὰ ἄκρα των, διὰ τῶν ὅποίων στερεοῦνται ἐπὶ τῶν ὁστῶν, συνίστανται ἀπὸ σκληρὸν λευκὸν ἴστον καὶ καλοῦνται τένοντες τῶν μυῶν. Αἱ κινήσεις τῶν γραμμωτῶν μυῶν τελοῦνται κατὰ τὰς ἐπιταγὰς τῆς βουλήσεως.



Εἰκ. 17. Μοχλοί σχηματιζόμενοι υπό τῶν ὀστῶν καὶ τῶν μυῶν,
οἱ ὅποιοι προσφύονται εἰς αὐτά.


Οἱ μύες σχηματίζουν μετὰ τῶν ὀστῶν, ἐπὶ γῶν ὅποίων προσφύονται, μοχλούς (εἰκ. 17). Π.χ. οἱ μύες τοῦ τραχήλου, οἱ ὅποιοι συγκρατοῦν τὴν κεφαλήν, καὶ ἡ κεφαλή, ἀποτελοῦν μοχλὸν πρώτου εἴδους μὲν ὑπομόχλιον τὴν σπονδυλικὴν στήλην. Όμοίως, οἱ μύες τῆς κυήμης, οἱ καταφύόμενοι εἰς τὴν πτέρναν καὶ οἱ ὅποιοι ὑψώνουν τὸν πόδα, ἀνήκουν εἰς μοχλὸν δευτέρου εἴδους. Οἱ μύες τοῦ βραχίονος, οἱ προσφύόμενοι εἰς τὸν ἀντιβραχίονα, ἀνήκουν εἰς μοχλὸν τρίτου εἴδους.

3. ΟΙ ΛΕΙΟΙ ΜΥΕΣ

Αντιθέτως πρὸς τοὺς γραμμωτούς, οἱ λεῖοι μύες δὲν καταφύονται ἐπὶ ὀστῶν, ἀλλ’ εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν σπλάγχνων καὶ τῶν ἄγγείων. Τὰ μυϊκὰ Ἰνίδια αὐτῶν δὲν παρουσιάζουν ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον γραμμώσεις. Λειτουργοῦν ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως καὶ ἐκτελοῦν τὰς κινήσεις τῶν σπάγχνων καὶ τῶν ἄγγείων. Οἱ μύες τῆς καρδίας ἐνεργοῦν καὶ αὗτοὶ ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως, εἶναι ὅμως, κατ’ ἔξαρτεσιν, γραμμωτοί.

4. Ο ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ

Ἐγνωρίσαμεν ἀνωτέρω δύο ἴδιότητας τῶν μυῶν, τὴν συσταλτικότηταν καὶ τὴν ἐλαστικότηταν αὐτῶν. Μία ἄλλη σπουδαία ἴδιότης τῶν εἶναι ὁ μυϊκὸς τόνος. Οὕτω καλεῖται ἡ ἴδιότης τῶν μυῶν νὰ μὴ χαλαροῦνται τελείως, ἀλλὰ νὰ παραμέ-



Εἰκ. 18. Αἱ διαδοχικαὶ φάσεις τῆς βαδίσεως.

νουν διαρκῶς εἰς μίαν μετρίαν ἡ πολὺ μικρὰν σύσπασιν. Λόγω τοῦ μυϊκοῦ τόνου, ὁ στόμαχος π.χ., καὶ ὅταν δὲν περιέχῃ τροφάς, δὲν εἶναι συρρικνωμένος, ως ἔνας κενὸς ἀσκός. Ὄμοιώς κρατεῖται ἡ κεφαλὴ ὅρθια, κλίνει δὲ μόνον, ὅταν ἀποκοιμηθῇ κανείς. Γενικῶς, ὁ τόνος δίδει εἰς τὸ σῶμα μίαν ὅψιν ζωηράν, ἡ ὅποια ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν ὅψιν τοῦ νεκροῦ σώματος.

5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Οἱ μύες περιλαμβάνουν μυϊκὰς δέσμας, αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦνται ἀπό μυϊκὰς Ινας. Χαρακτηριστικαὶ ιδιότητες τῶν μυῶν εἶναι ἡ συσταλτικότης, ἡ ἐλαστικότης καὶ ὁ μυϊκὸς τόνος. Διακρίνομεν γραμμωτούς καὶ λείους μύες. Οἱ πρῶτοι καταφύονται ἐπὶ τῶν δστῶν καὶ κινοῦν αὐτὰ κατὰ τὴν θέλησίν μας. Οἱ λείοι εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν σπλάγχνων καὶ τῶν ἀγγείων καὶ ἐνεργοῦν ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως.

6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 1) Καθόρισε μερικά παραδείγματα μοχλῶν εἰς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα.
- 2) Μέτρησε μὲν ἔνα δυναμόμετρον τὴν δύναμιν τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ καὶ σύγκρινε τὰς δύο μετρήσεις.
- 3) Παρατήρησε εἰς τὸ βρασμένον κρέας τὰς μυϊκὰς δέσμας, αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦν ἔνα μῦν.
- 4) Ἡ ἐργασία ἔνδος μυὸς δύναται νὰ γίνῃ ἐντονωτέρα, ὅταν τὸ ὀστοῦν, ἐπὶ τοῦ ὅποιου οὗτος καταφύεται, μένη ἀκίνητον. Διὰ τοῦτο, διὰ νὰ ἀνυψώσωμεν μέγα βάρος «κρατοῦμε τὴν ἀναπνοή μας», ὥστε τὰ ὀστᾶ τοῦ κορμοῦ (ἀμοιβλάτη, πλευραὶ κλπ.) νὰ παραμείνουν ἀκίνητα.
- 5) Παρακολούθησε καὶ καθόρισε, βοηθούμενος καὶ ἀπὸ τὴν εἰκόνα 18, τὰς διαφόρους φάσεις τοῦ βαδίσματος.
- 6) Καθόρισε πῶς κινεῖται κατὰ τὴν βάδισιν δὲ κορμὸς (ἄν ἀνυψύται καὶ πότε, ἄν κλίνῃ, πότε καὶ πρὸς ποιὸν σκέλος, ἄν στρέφεται καὶ πότε). Ἐπίσης, πῶς κινοῦνται αἱ χεῖρες. Δοκίμασε νὰ βαδίσῃς ταχέως μὲν ἀκίνητους χεῖρας.
- 7) Κατὰ τὴν βάδισιν πάντοτε τὸ ἔνα πόδι ἀκουμβᾷ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Κατὰ τί διαφέρει, ὡς πρὸς τοῦτο, ἡ βάδισις ἀπὸ τὸ ἄλμα καὶ τὸν δρόμον;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΑΙ.
ΑΙ ΚΑΥΣΕΙΣ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

1. ΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

Έκ πείρας γνωρίζομεν, ότι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ζῶντες ὄργανισμοί, οὕτω καὶ ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμός, διὰ νὰ συντηρηθῇ καὶ νὰ ἀναπτυχθῇ, καταναλίσκει ὡρισμένας ὕλας, τὰς ὃποιας λαμβάνει ἀπὸ τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον, τὰς τροφάς. Αἱ χρησιμοποιούμεναι ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου τροφαὶ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸ ζωϊκὸν καὶ φυτικὸν βασίλειον καὶ μόνον τὸ ὕδωρ καὶ ὡρισμένα ἄλατα ἀπὸ τὴν ἀνόργανον φύσιν.

Εἰς τὰς τροφὰς εύρισκει ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμὸς χρησίμους δι’ αὐτὸν ούσιας, ἐκ τῶν ὃποιών ἄλλαι μὲν εἶναι ἀνόργανοι, ἄλλαι δὲ ὄργανικαί. Αν ύργανοι μὲν καλοῦνται αἱ ούσιαι, αἱ ὃποιαι δὲν ἔχουν τὸν ἄνθρακα ὡς κύριον στοιχεῖόν των, δργανικαὶ δὲ ἀντιθέτως ὅσαι ἔχουν τὸν ἄνθρακα ὡς τὸ κύριον στοιχεῖόν των. Αἱ χρήσιμοι αὗται θρεπτικαὶ ούσιαι εἶναι ὕδωρ καὶ ἀνόργανα ἄλατα, ύδατάνθρακες, λιπαραὶ ούσιαι καὶ λευκώματα. Τέλος εἶναι ἀπαραίτητοι καὶ αἱ βιταμῖναι, τὰς δηποίας ἐπίσης ἀνευρίσκει ὁ ὄργανισμὸς εἰς τὰς τροφάς.

2. ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΆΛΑΤΑ

Τὸ ὕδωρ εἶναι συστατικὸν τῶν ίστων τοῦ σώματος εἰς μεγάλην ἀναλογίαν καὶ ἀποτελεῖ τὸ μέγιστον μέρος τοῦ αἵματος (90%). Επίσης, ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ τὸ ἐλεύθερον ὕδωρ εἶναι ἀπαραίτητον διὰ τὰς χημικὰς μεταβολὰς τῶν ούσιῶν, αἱ ὃποιαι γίνονται κατὰ τὰς λειτουργίας τοῦ ὄργανισμοῦ. Υπολογίζουν, ὅτι τὰ 60% τοῦ βάρους τοῦ σώματος ἀποτελοῦνται ἐξ ὕδατος. Τὸ ὕδωρ πίνεται αὐτούσιον,

ἀλλὰ μεγάλαι ποσότητες αὐτοῦ εἰσάγονται καὶ διὰ τῶν τροφίμων. Τὰ χόρτα π.χ. περιέχουν 85% υδωρ, τὸ κρέας 70%, ὁ ἄρτος 36%.

Διάφορα ἀνόργανα ἄλατα είναι επιτοξικά, εἰς μικράς σμως ποσότητας, διὰ τον ὄργανισμόν. Τὸ αἷμα π.χ. περιέχει 0,6% μαγειρικὸν ἄλας, τὰ δὲ ὅστα είναι σκληρά, λόγῳ τῶν ἀλάτων ἀσβεστίου, τὰ ὅποια περιέχουν. Συνήθως αἱ τροφαὶ καὶ τὸ ὑδωρ περιέχουν ἐπαρκῆ ποσότητα ἀλάτων. Αὐτούσιον προσθέτει εἰς τὰς τροφὰς ὁ ἀνθρωπὸς τὸ μαγειρικὸν ἄλας.

3 ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΣ

Οι ύδατά νθρακες είναι μία κατηγορία όργανικων ουσιών έξι έκεινων, αι όποιαι περιέχουν άνθρακα ήνωμένον με όξυγόνον και ύδρογόνον. Σπουδαιότεροι ύδατάνθρακες είναι τα σάκχαρα και τό άμυλον. Τροφαὶ μὲ πολλὰ σάκχαρα είναι οἱ καρποί, τὸ μέλι, τὰ γλυκύσματα. Τροφαὶ μὲ πολὺ άμυλον είναι τὰ γεώμηλα, τὰ ἄλευρα, τὰ σπριτα κλπ.

Οι ύδωτάνθρακες ἔχουν τὴν ἴδιότητα νὰ ἐνοῦνται μὲ τὸ ὀξυγόνον ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ. Τὸ ὀξυγόνον εἶναι ἐν ἀέριον, τὸ δποῖον προσλαμβάνει δὲ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν διὰ τῆς ἀναπνοῆς. "Ἡ ἔνωσις μιᾶς οὐσίας μὲ ὀξυγόνου καλεῖται καῦσις καὶ προκαλεῖ τὴν παραγωγὴν θερμότητος." Οταν, ὅπως συμβαίνει εἰς τὸν ὄργανισμόν, ἡ καιομένη οὐσία περιέχῃ ἄνθρακα, τότε παραγεται καὶ τὸ ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἀνθρακού.

Μὲ τούς ύδατάνθρακας λοιπὸν καὶ τὸ δέγυόνον γίνονται ἐντὸς τοῦ σώματος καύσεις. Ἡ παραγομένη θερμότης χρησιμοποιεῖται διὰ τὰς κινήσεις τῶν μυῶν καὶ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος (ζωϊκὴ θερμότης).

4. ΑΙ ΛΙΠΑΡΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

Αἱ λιπαραὶ οὐσίαι, αἱ διποῖαι περιέχονται εἰς τὰς τροφάς, εἶναι διάφορα λίπη καὶ ἔλαια. Χρησιμοτοιοῦνται καὶ αὗται ὑπὸ τοῦ δρυγνισμοῦ, ὅπως καὶ οἱ ὕδατανθράκες, διὰ τὰς καύσεις. "Οταν πλεονάζουν, ἀποτίθενται ὑπὸ μορφὴν λίπους κάτωθεν τοῦ δέρματος καὶ μεταξὺ τῶν ιστῶν. Τὰ 12% τοῦ βάρους μέσου ἀνθρώπου ἀποτελοῦνται ἀπὸ λίπος, τὸ διποῖον ἀποδίδεται κατὰ τὴν ἀσιτίαν.

5. ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Τὰ λευκώματα είναι δργανικαὶ ἐνώσεις, αἱ ὅποιαι περιέχουν πάντοτε καὶ ἄζωτον, ἀποτελοῦν δὲ συστατικὰ τοῦ πρωτοπλάσματος τῶν ζωϊκῶν καὶ φυτικῶν κυττάρων Τροφαὶ μὲ πολλὰ λευκώματα είναι τὰ κρέατα, τὰ ώά, τὸ γάλα, τὰ ὅσπρια κλπ.

Μετὰ τὴν διάσπασιν τῶν λευκωμάτων τὸ μεγαλύτερον τμῆμά των μετατρέπεται ἐντὸς τοῦ ἡπατος εἰς ὑδατάνθρακας διὰ τὴν παραγωγὴν ἐνεργείας ἕνα δὲ μικρὸν μέρος ἀφομοιώνεται πρὸς τὰ συστατικὰ τοῦ κυττάρου.

6. ΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ

Βιταμίναι είναι ὥρισμέναι δργανικαὶ ἐνώσεις, τὰς ὅποιας εύρισκει ὁ δργανισμὸς εἰς τὰς τροφάς, εἰς ἐλαχίστας ποσότητας. Ἐν τούτοις, είναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κανονικὴν θρέψιν τοῦ δργανισμοῦ καὶ ἡ ἔλλειψις αὐτῶν προκαλεῖ διαφόρους ἀσθενείας, καλουμένας ἀβιταμίνωσης.

Αἱ ἀβιταμινώσεις θεραπεύονται διὰ τῆς χρήσεως τροφῶν, αἱ ὅποιαι περιέχουν τὴν κατάλληλον βιταμίνην, ἢ διὰ τῆς χρήσεως βιταμινῶν, τὰς ὅποιας παρασκευάζουν σήμερον οἱ χημικοί. Ἀπὸ τὸ ἡπαρ π.χ. ἐνὸς ἰχθύος, τοῦ ὀνίσκου, ἔξαγεται τὸ γνωστόν μας μουρουνέλαιον. Τοῦτο περιέχει κυρίως δύο βιταμίνας, αἱ ὅποιαι καλοῦνται βιταμίνη Α ἢ ἀντιξηροφθαλμική καὶ βιταμίνη Δ ἢ ἀντιρραχιτική.

Ἐλλειψις τῆς βιταμίνης Α ἐλασττώνει τὴν ἀντοχὴν τοῦ δργανισμοῦ, δύναται δὲ νὰ προκαλέσῃ τὴν νόσον ξηροφθαλμίαν, ἢ διποία καταστρέφει τὸν κερατοειδῆ χιτῶνα τοῦ δρφαλμοῦ. Ἡ βιταμίνη Α δὲν εἰσάγεται πάντοτε ἐτοίμη εἰς τὸν δργανισμόν. Πολλάκις εἰσάγεται διὰ τῶν τροφῶν (λαχανικά κλπ.) μία ἄλλη ούσια, ἡ διποία είναι, ὡς λέγουν, ἡ προβιταμίνη Α. Ἐχει δηλαδὴ ἡ ούσια αὕτη τὴν ιδιότητα νὰ μετατρέπεται ἐντὸς τοῦ δργανισμοῦ εἰς βιταμίνη Α.

Ἡ βιταμίνη Δ διευκολύνει τὴν πρόσληψιν ἀνοργάνων ούσιῶν καὶ τὴν χρησιμοποίησίν των διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν δστῶν. Καὶ ἡ βιταμίνη αὕτη παρασκευάζεται, καὶ ἐντὸς τοῦ δργανισμοῦ, ἀπὸ μίαν ἀντίστοιχον προβιταμίνην, τὴν ἐργοστερίνην, διὰ τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. Διὰ τοὺς λόγους τούτους καὶ τὸ μουρουνέ-

λαιον καὶ αἱ ἡλιακαι ἀκτῖνες ἔχουν μεγάλην χρησιμότητα ὡς προφυ-
λακτικὰ καὶ θεραπευτικὰ μέσα κατὰ τῆς ραχίτιδος.

Μὲ τὸ γράμμα Β χαρακτηρίζουν διάλογοι τῶν δημητριακῶν. ‘Η αἱ ὄποιαι ἀφθονοῦν κυρίως εἰς τοὺς φλοιούς τῶν δημητριακῶν. ‘Η Ἑλλειψίς τῆς βιταμίνης Β προκαλεῖ τὴν νόσον Beri - beri. (διαταραχὴ τοῦ νευρικοῦ συστήματος, τῆς κυκλοφορίας, διάρροια (κλπ.). ‘Η νόσος αὕτη ἔξεδηλώθη πολὺ εἰς τὴν “Απω Ανατολήν, ὅταν εἰσήχθη ἐκεῖ ἡ συνήθεια νὰ ἀποφλοιώνεται τὸ ρύζι.

‘Η βιταμίνη C ἀφθονεῖ εἰς τὰ γεώμηλα, τὴν σταφίδα, τὸ γάλα, τὰ νωπά λαχανικὰ καὶ εἰς τοὺς χυμούς τῶν ἐσπεριδοειδῶν. ‘Η ἐλλειψίς της προκαλεῖ τὸ σκορβοῦτον. ‘Η πάθησις αὕτη ἦτο συνήθης ἀλλοτε εἰς τοὺς ναυτικούς, οἱ ὄποιοι ἐπὶ μακρὸν ἐτρέφοντο μὲ διατηρημένα τρόφιμα. Τὸ σκορβοῦτον χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰς συχνὰς καὶ ἐπώδυνους αίμορργιας τοῦ δέρματος, τοῦ στόματος καὶ τῶν ἐσωτερικῶν μερῶν τοῦ σώματος.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω βιταμινῶν ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι, ὅπως ἡ Ε (ἀντιστειρωτική), ἡ Η (βιοτίνη), ἡ Κ (ἀντιαιμορραγική) κ.ἄ.

7. ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

‘Η συντήρησις καὶ ἡ αὔξησις τοῦ ὄργανισμοῦ ἔξασφαλίζεται χάρις εἰς μίαν μεγάλην λειτουργίαν, ἡ ὄποια καλεῖται ἀνταλλαγὴ τῆς ὕλης καὶ περιλαμβάνει τὰς ἔξῆς ἐπὶ μέρους λειτουργίας:

α') Τὴν ἀναπνοήν, κατὰ τὴν ὄποιαν τὸ αἷμα δεσμεύει ὁξυγόνον ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Συγχρόνως τὸ αἷμα ἀποδίδει εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν τὸ ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ ὄποιον προϊλθεν ἀπὸ τὰς καύσεις καὶ εἶναι ἐπιβλαβές διὰ τὸν ὄργανισμόν.

β') Τὴν πέψιν, κατὰ τὴν ὄποιαν ὁ ὄργανισμὸς ἀποχωρίζει ἀπὸ τὰς τροφὰς καὶ διασπᾷ τὰς θρεπτικὰς ούσιας.

γ') Τὴν ἀπομόνωσιν καὶ ἀφομοίωσιν, κατὰ τὰς ὄποιας ὁ ὄργανισμὸς ἀπορροφᾷ τὰ προϊόντα τῆς πέψεως καὶ συνθέτει ἐξ αὐτῶν τὰς χρησίμους διὰ τὰς ἀνάγκας του ούσιας.

δ') Τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος, διὰ τῆς ὄποιας αἱ θρεπτικαὶ ούσιαι καὶ τὸ ὁξυγόνον μεταφέρονται εἰς τοὺς ιστούς.

ε') Τὴν ἀπέκκρισιν, διὰ τῆς ὄποιας τὰ ἀχρηστά προϊόντα τῶν καύσεων ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν ὄργανισμόν.

Τὰς ἀνωτέρω λειτουργίας καὶ τὰ ὅργανα τοῦ σώματος, διὰ τῶν τῶν δποίων αὔται τελοῦνται, θὰ γνωρίσωμεν λεπτομερέστερον εἰς ἐπόμενα κεφάλαια.

8. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Αἱ θρεπτικαὶ ούσιαι, τὰς δποίας ὁ ὄργανισμὸς δινευρίσκει εἰς τὰς τροφάς, εἶναι ὕδωρ, ἀνόργανα ἀλοτα, ὑδατάνθρακες, λιπαραὶ ούσιαι καὶ λευκώματα. Ἀπαραίτητοι εἶναι ἀκόμη καὶ αἱ βιταμῖναι, εἰς μικροτάτας ποσότητας (ἀβιταμίνώσεις).


Ἡ μεγάλη λειτουργία, διὰ τῆς διτοίας ἔξασφαλίζεται ἡ συντήρησις καὶ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ὄργανισμοῦ, εἶναι ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς ὑλῆς καὶ περιλαμβάνει ὥρισμένας ἄλλας ἐπὶ μέρους λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ. ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

1 Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΣ

‘Η κοιλότης αὕτη περικλείεται ἀπὸ τὰ ὄστα τῆς κάτω γνάθου, τῆς ἄνω γνάθου καὶ τὰ ὑπερώϊα. Συγκοινωνεῖ πρὸς τὰ ἔξω διὰ τῆς στοματικῆς σχισμῆς, ἢ ὅποια φράσσεται ὑπὸ τῆς ὁδοντοστοιχίας καὶ τῶν χειλέων. Τὸ δάπεδον τῆς κοιλότητος κατέχεται ὑπὸ τῆς



Εἰκ. 19. Τομή, διὰ τοῦ προσώπου. 1. Ρινική κοιλότης. — 4. Σκληρά ύπερωά (ύπερωίου δόστοῦν). — 3. Μαλακή ύπερωφά ἀπολήγουσα εἰς τὴν κινίδα. — 2. Ἡ γλῶσσα. — 5. Ἡ ἐπιγλωττίς. — 6. Τὸ ύσειδές δόστοῦν. — 7. Ὁ θυρεοειδῆς χόνδρος τοῦ λάρυγγος. — 8. Κρικοειδῆς χόνδρος. — 9. Λάρυγξ. — 10. Ἀρυταινοειδῆς. — 11. Οισφάγος. — 12. Φάρυγξ.

λείεται ἀπὸ τὰ ὄστα τῆς κατώ γναους,
οὐαῖα. Συγκοινωνεῖ πρὸς τὰ ἔξω διὰ τῆς
ία φράσσεται ὑπὸ τῆς ὁδοντοστοιχίας
ὸν τῆς κοιλότητος κατέχεται ὑπὸ τῆς
μυώδους καὶ εὔκινήτου γλώσσης. Τὸ
πρόσθιον ἄκρον τῆς γλώσσης εἶναι ἐλεύ-
θερον, τὸ δὲ ὅπίσθιον στερεοῦται ἐπὶ τοῦ
δαπέδου καὶ τοῦ νοειδοῦς ὄστου. Διὰ
τῶν κινήσεών της καὶ διὰ τῶν αἰσθητι-
κῶν σωματίων, τὰ ὅποια φέρει, ἔχου-
ρετεὶ ἡ γλώσσα τὴν γεῦσιν, τὴν μάστι-
σιν, καὶ τὴν ὄμιλίαν.


‘Η όροφή τοῦ στόματος καλεῖται
ὑπερώφατος ὡς αἱ χωρίζει τοῦτο ἀπὸ τὴν
ρινικὴν κοιλότητα. Τὸ πρόσθιον καὶ τὸ
μεγαλύτερον μέρος τῆς ὑπερώφατος σχημα-
τίζεται ἀπὸ τὸ ἄνω γναθικὸν καὶ τὰ
ὑπερώφατα ὁστᾶ, καλεῖται δὲ σκληρὰ
ὑπερώφατα. Τὸ ὅπισθιον τμῆμα εἶναι
σαρκῶδες (μαλακὴ ὑπερώφατα) καὶ
ἀπολήγει εἰς μίαν προεξοχήν, τὴν στα-
φυλὴν ἢ κιονίδα.

Εἰς τὸ βάθος τοῦ στόματος ὑπάρχει ἄνοιγμα, ὃ ἰσθμὸς τοῦ φάρυγγος, διὰ τοῦ ὅποιου φέρεται τὸ φαγητὸν εἰς τὸν φάρυγγα κατὰ τὴν κατάποσιν. Ὁ φάρυγξ


έπικοινωνεῖ μετὰ τῆς ρινὸς διὰ τῶν χο-
ανῶν, μετὰ τοῦ μέσου ὡτὸς διὰ τῶν ἀ-
κουστικῶν ἢ εὐσταχιανῶν σαλπίγγων
καὶ πρὸς τὰ κάτω μετὰ τοῦ οἰσοφάγου,
διὰ τοῦ ὅποίου κατέρχονται αἱ τροφαὶ
καὶ τοῦ λάρυγγος, διὰ τοῦ ὅποίου διέρ-
χεται ὁ ἄηρ.

Κατὰ τὴν κατάποσιν τοῦ βλωμοῦ
ἢ ρινική κοιλότης φράσσεται ὑπὸ τοῦ
ὑπερῷου ἰστίου καὶ ὁ λάρυγξ ὑπὸ τῆς
ἐπιγλωττίδος. Κατὰ τὴν εἰσπνοήν, ἀντι-
θέτως, ἡ ἐπιγλωττὶς ἀφήνει ἀνοικτὸν τὸν λάρυγγα, ὁ δὲ φάρυγξ δὲν
είναι ἀνάγκη νὰ ἀποφραχθῇ, καθ' ὅσον δὲν δημιουργεῖται πρὸς αὐ-
τὸν ρεῦμα ἀέρος.

Εἰς τὸ στόμα χύνεται ὁ σίαλος ἀπὸ τρία ζεύγη βιτρυοειδῶν
όργάνων, τὰ ὅποια καλοῦνται σιαλογόνοι ἀδένες. Ἐκ τού-
των τὸ ἐν ζεῦγος εύρισκεται εἰς τὰς παρειὰς (παρωτίδες),
τὰ δὲ δύο ἄλλα εύρισκονται κάτωθεν τῆς γλώσσης (ὑπογλώσ-
σιοι καὶ ὑπογνάθιοι) (εἰκ. 20).



Εἰκ. 20. Οἱ σιαλογόνοι ἀδέ-
νες. 1. Παρωτίδες. 2. - 'Υπο-
γλώσσιοι. - 3. 'Υπογνάθιοι.




Εἰκ. 21. Τομὴ ὀδόντος.
1. 'Αδαμαντίνη. - 2. 'Ο-
δοντίνη. - 3. Πολφικὴ κοι-
λότης. - 4. 'Οστείνη. -
5. Γναθικὸν ὀστοῦν.

2. ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

Οὗτοι είναι μικρὰ ὀστᾶ στερεούμενα
ἐντὸς μικρῶν κοιλοτήτων τῶν γναθικῶν
ὅστῶν, τῶν φατνίων. Εἰς ἕκαστον ὀ-
δόντα διακρίνομεν τὰ ἔξης τμῆματα: α') τὴν
μύλην, δηλαδὴ τὸ ἐλεύθερον τμῆμα,
β') τὸν αύχένα, περιβαλλόμενον ἀπὸ
τὰ οὐλα, γ') τὴν ρίζαν, ἡ ὅποια εἰσδύει
ἐντὸς τοῦ φατνίου, καὶ δ') τὴν πολφικὴν
κοιλότητα, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν
τοῦ ὀδόντος. Ἡ πολφικὴ κοιλότης περι-
λαμβάνει ἀγγεῖα καὶ νεῦρα, πληροῦται δὲ
ὑπὸ μαλακοῦ ἰστοῦ, καλουμένου πολφοῦ.

Εἰς μίαν τομὴν ὀδόντος παρατηροῦμεν,
ὅτι οὗτος δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν μόνον



Εἰκ. 22. Ἡ ὀδοντοστοιχία τῆς ἀνω γνάθου. 1, 2. Τομεῖς. — 3. Κυνόδους. — 4, 5. Προγόμφιοι. — 6, 7, 8. Γομφίοι (8. Σωφρονιστήρ).

διακρίνονται εἰς τὰς ἔξης κατηγορίας:

α') Το μεῖς. Οὗτοι παρουσιάζουν μίαν ρίζαν και ἀπολήγουν εἰς λεπτήν ἐπιμήκη μύλην· β') Κυνόδοντες. Χαρακτηρίζονται ἀπὸ μίαν ρίζαν και ἀπὸ τὸ κωνικὸν σχῆμα τῆς μύλης· γ') Προγόμφιοι. Ἐχουν μίαν ρίζαν και πλαστεῖαν μύλην μὲ δύο φύματα· δ) Γομφίοι ή τραπεζίται. Ἡ ρίζα των εἶναι διπλῇ ή τριπλῇ, ή δὲ πλαστεῖα ἐπιφάνειά των φέρει τέσσερα φύματα.

Κατὰ τὴν νηπιακήν ἡλικίαν ἔκφύεται ή πρώτη ὀδοντοφυία, ἀποτελουμένη ἐξ εἰκοσιν ὀδόντων, καλουμένων νεογιλούς. Οἱ νεογιλοὶ ὀδόντες εἶναι τοποθετημένοι ἀνὰ δέκα εἰς κάθε γνάθον ὡς ἔξης: Τέσσαρες τομεῖς εἰς τὸ μέσον τῆς γνάθου, ἀνὰ εἰς κυνόδους δεξιὰ και ἀριστερὰ τῶν τομέων και δύο προγόμφιοι ὅπισθεν ἑκάστου κυνόδοντος.

Κατὰ τὴν παιδικήν ἡλικίαν

ούσίαν (εἰκ. 21). Ἡ πολφική κοιλότης περιβάλλεται ὑπὸ στρώματος σκληρᾶς ούσίας, τῆς ὃ δοντίνη καλύπτεται εἰς μὲν τὸν αὐχένα και τὴν ρίζαν ὑπὸ ὄστείν ης, εἰς δὲ τὴν μύλην ὑπὸ στρώματος τῆς σκληροτάτης ὃ δαμαντίνης.

Εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀνωτέρα ἐπιφάνεια ὅλων τῶν ὀδόντων εὑρίσκεται σχεδὸν εἰς τὸ ἴδιον ὕψος. Διαφέρουν ὅμως οἱ ὀδόντες μεταξύ των κατὰ τὸ σχῆμα και τὸ μέγεθος (εἰκ. 22) και



Εἰκ. 23. Ἀκτινογραφία ὀδόντων. Διακρίνονται οἱ μόνιμοι ὀδόντες, οἱ ὅποιοι ἀναπτύσσονται και θάντικαταστήσουν τούς νεογιλούς.

οί νεογιλοί ἀντικαθίστανται ὑπὸ τῶν μονίμων ὁδόντων (εἰκ. 23). Οὗτοι περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον τῶν νεογιλῶν ὅκτὼ γομφίους, ἀνὰ δύο ὅπισθεν τῶν προγομφίων. Τέλος, μετὰ τὸ 19ον ἔτος, ἐκφύονται καὶ οἱ τέσσαρες τελευταῖοι γομφίοι, οἱ ὅποιοι καλοῦνται σωφρονιστὴ ρεσ. Οὕτω συμπληροῦται ἡ μόνιμος ὁδοντοφυΐα, ἀποτελουμένη ἐκ τριάκοντα δύο ὁδόντων.

Σημείωσις. Εἰς τὴν βάσιν τῆς γλώσσης καὶ εἰς τὸ ὅπισθιον καὶ τὰ πλάγια τοιχώματα τοῦ φάρυγγος εύρισκονται ἀθροίσματα λεμφαδένων, τὰ ὅποια καλοῦνται ἀμυγδάλαι. Αἱ εύρισκόμεναι εἰς τὰ πλάγια τοιχώματα τοῦ φάρυγγος φαρυγγικαὶ ἀμυγδάλαι είναι γνωστότεραι, διότι συχνὰ ἐρεθίζονται.

3. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Ἐπανάλαβε τὴν κίνησιν τῆς καταπόσεως πολλάκις καὶ πρόσεξε τὴν θέσιν τῆς γλώσσης καὶ τὴν κίνησιν τοῦ λάρυγγος.

2) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην (καθαρὰ χέρια!) τὰ διάφορα εἶδη τῶν ὁδόντων σου. Εἰς ἔξαχθέντας ὁδόντας παρατήρησε τὴν ρίζαν καὶ τὴν πολφικήν κοιλότητα. Γράψε τὸν ὁδοντικὸν τύπον τοῦ ἀνθρώπου (παιδίου ἢ ἐνηλίκου).

3) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην τὸ ὑπερώϊον ἰστίον καὶ τὴν κιονίδα, εἰς τὴν ὅποιαν τοῦτο ἀπολήγει.

4) Παρατήρησε ἀν κατὰ τὴν σύγκλεισιν τῶν ὁδόντων οἱ ἄνω τομεῖς εύρισκονται πρὸ τῶν κάτω ἢ ὅπισθεν αὐτῶν. Παρατήρησε τὸ ἴδιον καὶ εἰς ἄλλα ἀτομα.

4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ο. Η στοματικὴ κοιλότης συγκοινωνεῖ πρὸς τὸν φάρυγγα διὰ τοῦ ισθμοῦ. Ο. Η στοματικὴ κοιλότης συγκοινωνεῖ μὲ τὴν κοιλότητα τῆς ρινός, μὲ τὸ ἔσω οὖς, μὲ τὸν οἰσοφάγον καὶ μὲ τὸν λάρυγγα. Η γλῶσσα, τὰ χειλὶα καὶ οἱ ὁδόντες ἔχουν προτερεῖ τόσον τὴν μάστησιν δύνανται τὴν δηλίλιαν. Η στοματικὴ σχισμὴ φράσσεται ὑπὸ τῶν χειλέων καὶ τῶν ὁδόντων. Οἱ ὁδόντες τῆς μὲν πρώτης ὁδοντοφυΐας (νεογιλοί) είναι εἴκοσι, τῆς δὲ δευτέρας ὁδοντοφυΐας (μόνιμοι) τριάκοντα δύο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
ΠΕΨΙΣ, ΑΠΟΜΥΖΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ

1. Η ΠΕΨΙΣ. Ο ΠΕΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝ

Ἡ πέψις εἶναι μία σειρὰ μηχανικῶν καὶ χημικῶν μεταβολῶν,

τὰς ὅποιας ὑφίστανται αἱ τροφαὶ ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ. Διὰ τῶν μεταβολῶν τόύτων ὁ ὄργανισμὸς ἀποχωρίζει τὰς θρεπτικὰς οὐσίας καὶ τὰς διασπῆς εἰς ἀπλουστέρας ἔνώσεις, αἱ ὅποιαι εἶναι εὐδιάλυτοι, δύνανται ν' ἀπορροφηθοῦν καὶ νὰ ἀφομοιωθοῦν.

Ἡ πέψις τῶν τροφῶν ἀρχίζει εἰς τὸ στόμα καὶ συμπληρώνεται εἰς τὰ διάφορα τμήματα τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος. Ο πεπτικὸς οὖτος σωλὴν περιλαμβάνει τὰ ἔξης κατὰ σειρὰν τμήματα: Τὴν στοματικὴν κοιλότητα, τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγον, τὸν στόμαχον, καὶ τὸ ἔντερον (εἰκ. 24). Κατωτέρω θὰ γνωρίσωμεν τὴν κατασκευὴν τῶν τμημάτων τούτων καὶ τὰς μεταβολὰς, τὰς ὅποιας ὑφίστανται αἱ τροφαὶ ἐντὸς ἐκάστου ἔξ αὐτῶν.



Εἰκ. 24. Τὸ πεπτικὸν συστῆμα.

1. Οἰσοφάγος. — 2. Στόμαχος.—
3. Δωδεκαδάκτυλον. — 4. Πάγκρεας.—
- 5, 6, 7, 8, 9. Παχὺ ἔντερον. — 11. Λεπτὸν ἔντερον. — 12. Σκωληκοειδῆς ἀπόφυσις.— 13. Ἡπαρ. — 14. Χοληθόχος κύστις.

2. ΣΤΟΜΑ. ΜΑΣΗΣΙΣ. ΣΙΑΛΟΣ.

ΚΑΤΑΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΒΛΩΜΟΥ

Εἰς τὸ στόμα ἡ τροφὴ κατατεμαχίζεται καὶ κατατρίβεται διὰ

τῶν ὁδόντων. Ἡ κατεργασία αὕτη τῆς τροφῆς καλεῖται μάσησις. Προσέτι εἰς τὸ στόμα ύφισταται ἡ τροφὴ καὶ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ σιάλου, δὲ ὅποιος μεταβάλλει τὸ ἄμυλον εἰς σάκχαρον. Διὰ τοῦτο αἱ ἀ-μυλώδεις τροφαὶ ἀποκτοῦν εἰς τὸ στόμα γλυκεῖαν γεῦσιν. Ὁ σίαλος χύνεται εἰς τὴν στοματικὴν κοιλότητα ἀπὸ τὰ γνωστά μας τρία ζεύγη σιαλογόνων ἀδένων (εἰκ. 20).

Ἄφοῦ ὑποστῇ τὰς ἀνωτέρω κατεργασίας, λαμβάνει ἡ τροφὴ διὰ τῶν κινήσεων τῆς γλώσσης τὸ σχῆμα μιᾶς μικρᾶς σφαίρας, ἡ ὅποια καλεῖται βλωμὸς (μπουκιά). Ὁ βλωμὸς οὗτος διὰ τῆς καταπόσεως εἰσέρχεται εἰς τὸν φάρυγγα.

3. ΦΑΡΥΓΞ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ. ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΟΝ ΥΓΡΟΝ

‘Ο φάρυγξ εἶναι, ώς εἴπομεν, χῶρος διὰ τοῦ ὅποίου διέρχονται αἱ τροφαὶ καὶ ὁ ἀήρ διὰ νὰ κατανεμηθοῦν κατόπιν εἰς τὸν οἰσοφάγον καὶ τὸν λάρυγγα. Ὁ βλωμὸς μετὰ τὸν φάρυγγα διατρέχει τὸν οἰσοφάγον. Οὗτος εἶναι μυώδης σωλήν, ὁ ὅποιος διαπερᾷ τὸν θώρακα ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ ἀπολήγει εἰς τὸν στόμαχον.

‘Ο στόμαχος εἶναι μυώδης ἀσκός, ὁ ὅποιος εὐρίσκεται εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς κοιλίας. Τὸ ἐσωτερικὸν στρῶμα τοῦ τοιχώματός του, τὸ ὅποιον καλεῖται βλεννογόνος χιτών, περιλαμβάνει ἀδένας, οἱ ὅποιοι ἔκκρινουν βλέψιν καὶ γαστρικὸν ύγρον. Διὰ τῶν κινήσεων τοῦ μυώδους τοιχώματος ἡ τροφὴ ἀναμιγνύεται καλῶς μὲ τὸ γαστρικὸν ύγρόν. Τοῦτο ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ προσβάλῃ τὰ λευκώματα τῆς τροφῆς καὶ νὰ τὰ διασπᾷ εἰς ἀπλουστέρας ἐνώσεις.

Τὸ γαστρικὸν ύγρὸν περιέχει ύδροχλωρικὸν ὀξύ (0,4%—0,5%), πεψίνην, πυτίαν καὶ λιπάσην, διὰ τῆς ὅποίας διασπᾷ τὰ λίπη.

4. ΛΕΠΤΟΝ ΕΝΤΕΡΟΝ. ΠΑΓΚΡΕΑΣ. ΗΠΑΡ. ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ

Τὸ ἔντερον εἶναι μακρὸς σωλήν (8 $\frac{1}{2}$ μ. περίπου) «κουλουριασμένος» ἐντὸς τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ πρῶτον τμῆμά του, τὸ ὅποιον περιλαμβάνει τὰ $\frac{3}{4}$ περίπου τοῦ ὅλου μήκους του, καλεῖται λεπτὸν-ἔντερον καὶ ἔχει διάμετρον 3—5 ἑκ. Συνέχεια αὐτοῦ εἶναι τὸ παχὺ ἔντερον, τὸ ὅποιον εἶναι χονδρότερον καὶ ἀπολήγει εἰς τὸν πρωκτόν.

Τὸ ἀρχικὸν τμῆμα τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου είναι κεκαμμένον πεταλοειδῶς καὶ στερεοῦται ἐπὶ τοῦ ὅπισθίου τοιχώματος τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ τμῆμα τοῦτο καλεῖται δωδεκάκτυλον.

Εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον εἰσέρχεται ἡ τροφὴ διὰ συστολῶν τοῦ κατωτέρου στομάχου, τὸ ὅποιον καλεῖται πυλωρός.

Εἰς τὸ ἐντερον συνεχίζεται ἡ πέψις τῆς τροφῆς διὰ τῶν ὑγρῶν, τὰ ὅποια χύνονται εἰς αὐτό. Ἐξ αὐτῶν τὸ μὲν παγκρεατικὸν ὑγρὸν καὶ ἡ χολὴ χύνονται εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον, τὸ δὲ ἐντερικὸν ὑγρὸν εἰς τὸ ὑπόλοιπον ἐντερον.

α') **Τὸ παγκρεατικὸν ὑγρόν.** Τοῦτο παράγεται ἀπὸ τὸ πάγκρεατον. Οἱ ἔπιμήκης οὔτος ἀδήν ἐκτείνεται δριζοντίως ἀπὸ τοῦ δωδεκαδάκτυλου μέχρι τοῦ σπληνός. Μὲ τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν ἀκουμβᾶται ἐπὶ τοῦ στομάχου καὶ μὲ τὴν ὅπισθίαν ἐπὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης καὶ τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ. Ἐκβάλλει εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον μὲ δύο ἐκφορητικοὺς ἀγωγούς. Ἐκ τούτων ὁ εἰς ἐνώνεται μὲ τὸν ἀγωγὸν τῆς χολῆς. Ἡ ήμερησία παραγωγὴ τοῦ παγκρεατικοῦ ὑγροῦ ἀνέρχεται εἰς 1,2—1,5 λίτρα. Τοῦτο συμβάλλει εἰς τὴν πέψιν τῶν λευκωμάτων διὰ τῆς θρεψίνης καὶ τῶν ὑδατανθράκων διὰ τῆς ἀμυλάσης.

β') **Τὸ ἐντερικὸν ὑγρόν.** Τοῦτο παράγεται ἀπὸ τοὺς ἀδένας τοῦ βλεννογόνου χιτῶνος τοῦ ἐντέρου καὶ συμπληρώνει τὴν πέψιν τῶν λευκωμάτων, τῶν λιπῶν καὶ τῶν ὑδατανθράκων.

γ') **Ἡ χολὴ.** Αὕτη είναι ἐν κιτρινοπράσινον ὑγρόν, τὸ ὅποιον παράγεται εἰς τὸ ἡπαρ (συκώτι) καὶ συναθροίζεται εἰς τὴν χολητικόν καὶ στομάχον, ἀπὸ τὴν χοληδόχον κύστιν ἡ χολὴ χύνεται εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον καὶ είναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν πέψιν τῶν λιπῶν.

Τὸ ἡπαρ είναι ὁ μεγαλύτερος ἀδήν τοῦ σώματος, φθάνων μέχρι βάρους 2 χλγ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο λοιβούς καὶ εύρισκεται, ίσοϋψῶς μὲ τὸν στόμαχον, εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς κοιλίας.

Μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀνωτέρω ὑγρῶν συμπληρώνεται εἰς τὸ λεπτὸν ἐντερον ἡ διάσπασις ὅλων τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν τῶν τροφῶν, δηλ. τῶν λευκωμάτων, τῶν ὑδατανθράκων καὶ τῶν λιπῶν. Αἱ ἀπλούστεραι ἐνώσεις, αἱ ὅποιαι προκύπτουν καὶ τὰς ὅποιας θάκαλοῦμεν προϊόντα τῆς πέψεως, είναι εύδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ καὶ δύνανται νὰ ἀπορροφηθοῦν ὑπὸ τοῦ ἐντέρου.


5. ΑΠΟΜΥΖΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ἡ ἀπορρόφησις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως γίνεται διὰ τοῦ τοιχώματος πολυπληθῶν, μικρῶν, μικροτάτων προεξοχῶν τοῦ βλεννογόνου τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου, αἱ ὅποιαι καλοῦνται λάχναι. Αἱ λάχναι εἰναι εὐκίνητοι, ἔχουν λεπτότατον τοίχωμα καὶ περιλαμβάνουν αίμοφόρα καὶ λεμφικὰ ἄγγεια (εἰκ. 25). Τὰ προϊόντα τῆς πέψεως διέρχονται τὸ τοίχωμα τῶν λαχνῶν τούτων καὶ εἰσέρχονται εἰς τὰ ἄγγεια. Τὰ μὲν λευκώματα καὶ οἱ ὑδατάνθρακες εἰσέρχονται εἰς τὰ αίμοφόρα ἄγγεια καὶ διὰ τῆς πυλαίας φλεβὸς ἔρχονται εἰς τὸ ἡπαρ, τὰ δὲ λίπη εἰς τὰ λεμφικὰ ἢ λεμφοφόρα ἄγγεια. Τὰ ἄγγεια ταῦτα ἐνώνονται καὶ σχηματίζουν ἐν ἄγγειον, τὸν θωρακικὸν πόρον, δ ὅποιος χύνει τὸ λίπος εἰς τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος.

6. ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ

Ἄπὸ τὰ προϊόντα αὐτὰ τῆς πέψεως, τὰ ὅποια ἀπορροφᾶ, σχηματίζει ὁ ὄργανισμὸς τὰ λίπη, τὰ λευκώματα καὶ τοὺς ὑδατάνθρακας τοῦ ἴδικοῦ του σώματος. Τὰ συστατικὰ αὐτὰ τοῦ σώματος του διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα συστατικὰ τοῦ σώματος ζώου ἄλλου εἴδους. Πρὸ παντὸς τὸ λεύκωμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως καὶ παντὸς ζώου, παρουσιάζει σημαντικήν διαφορὰν ἀπὸ τὸ λεύκωμα ζώου, ἄλλου εἴδους.

Ο σχηματισμὸς τῶν συστατικῶν τῶν ιστῶν ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς πέψεως καλεῖται ἀφομοίωσις τελεῖται ἐν μέρει μὲν εἰς τὸ ἡπαρ, κυρίως ὅμως εἰς τὰ ἴδια τὰ κύτταρα τῶν ιστῶν. Δηλαδὴ τὰ διάφορα κύτταρα ἐκλέγουν ἀπὸ τὸ αἷμα τὰ ἀ-



Εἰκ. 25. Σχῆμα εντερικῆς λάχνης

1. Βλεννογόνος. — 2. Λεια μυϊκή στοιβάς. — 3. Ἀρτηρία. — 4. Φλέψ. — 5. Λεμφικὸν ἄγγειον.

ναγκαϊα προϊόντα τῆς πέψεως καὶ ἐξ αὐτῶν παρασκευάζουν μόνα τὰ λευκώματά των.

7. ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ

Μετὰ τὴν ἀπορρόφησιν τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν μένουν εἰς τὸ ἔντερον τὰ στερεὰ ὑπολείμματα τῶν τροφίμων, ὕδωρ καὶ πεπτικὰ ύγρά. "Ολα αύτὰ διὰ τῶν συστολῶν τοῦ ἔντερου προχωροῦν εἰς τὸ τελευταῖον τμῆμά του, τὸ παραχύνεν τερον. 'Εδῶ γίνεται ἀκόμη μία μικρὰ ἀπορρόφησις, ιδίως ὕδατος, καὶ τέλος τὰ ὑπολείμματα ἀποβάλλονται ἐκ τῆς ἔδρας ὡς περιττά ματα. Εἰς τὸ παχὺ ἔντερον ἀναπτύσσονται καὶ ὥρισμένα εἴδη μικροοργανισμῶν (βακτηριδίων). Τὰ βακτηρίδια ταῦτα δὲν προξενοῦν βλάβην εἰς τὸν ὄργανισμόν. 'Αντιθέτως μάλιστα τὸν ὥφελον, διότι παρεμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξιν ἐντὸς τοῦ ἔντερου ἄλλων μικροβίων, παθογόνων. Μέρος τῶν βακτηριδίων τούτων ἔξερχεται ἐκάστοτε μετὰ τῶν περιττωμάτων.

8. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΞΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

'Ως εἶδομεν, τὰ λευκώματα ἐκάστου ζώου καὶ τοῦ ἀνθρώπου διαφέρουν ἀπὸ τὰ λευκώματα ζώου ἄλλου εἶδους. Δι' αὐτὸ δόργανισμὸς δὲν δέχεται ξένα λευκώματα, τὰ ὅποια εἰσάγονται εἰς αὐτὸν ἀπ' εὐθείας, χωρὶς δηλ. νὰ διασπασθοῦν εἰς τὸν πεπτικὸν σωλήνα. 'Εὰν τοιαῦτα λευκώματα εἰσχωρήσουν εἰς τοὺς ίστούς, δόργανισμὸς βλάπτεται καὶ παρουσιάζει συμπτώματα δηλητηριάσεως.

Τοῦτο π.χ. συμβαίνει, ὅταν δόργανισμὸς μολυνθῇ, ὅταν δηλαδὴ ἀναπτυχθοῦν ἐντὸς τῶν ίστῶν του μικρόβια. 'Απὸ τὰ καταστρεφόμενα μικροβιακὰ κύτταρα ἐλευθερώνονται μέσα εἰς τὸ αἷμα λευκώματα, τὰ δόποια εἶναι ξένα διὰ τὸν ὄργανισμόν.

Εἰς τοῦτο ὥφελονται ἐν μέρει τὰ συμπτώματα, τὰ δόποια παρατηροῦνται μετὰ τὴν μόλυνσιν (πυρετὸς κλπ.).

9. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ο πεπτικός σωλήνη περιλαμβάνει κατά σειράν ἀπό τοῦ στόματος τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγον, τὸν στόμαχον, τὸ λεπτὸν καὶ τὸ παχὺ ἔντερον. Εἰς τὸν πεπτικὸν σωλήνην χύνονται α') ἡ βλέννα καὶ τὸ γαστρικὸν ύγρὸν εἰς τὸν στόμαχον, β') τὸ παγκρεατικὸν ύγρὸν καὶ ἡ χολὴ εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον καὶ γ') τὸ ἔντερικὸν ύγρὸν εἰς τὸ ύπόλοιπον ἔντερον. Ή πέψις ἀρχίζει ἀπὸ τὸ στόμα (μάσησις, σίαλος) καὶ συμπληροῦται μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀνωτέρω ύγρῶν.

Τὰ προϊόντα τῆς πέψεως ἀπομιζῶνται διὰ τῶν λαχνῶν τοῦ λεπτοῦ ἔντερου καὶ ἀφομοιώνονται πρὸς τὰ συστατικὰ τῶν ἀνθρωπίνων ιστῶν.




ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΩΝ

Η ΑΝΑΠΝΟΗ

1. ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Έμάθομεν ότι ό δργανισμός προσλαμβάνει άπό τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἄέρα τὸ διηγόνον, τὸ δποῖον χρεάζεται διὰ τὰς καύσεις. Ή δέσμευσις τοῦ διηγόνου γίνεται ὑπὸ τοῦ αἵματος εἰς τοὺς πνεύμονας, τὰ κυριώτερα δργανα τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.



Εἰκ. 26. Τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα.

1. 'Ο θυρεοειδής χόνδρος τοῦ λάρυγγος. —
2. Θυρεοειδής ἀδήν. — 3. Τραχεῖα. — 4. Βρόγχοι. — 5. Τομὴ διὰ τοῦ πνεύμονος. — 6. Οἰσοφάγος. — 7. Διάφραγμα. — α. 'Αριστερὸς πνεύμων. — δ. Δεξιὸς πνεύμων.

'Ολόκληρον τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα περιλαμβάνει δύο τμήματα: α') τὴν ἀναπνευστικὴν δόν, διὰ τῆς δποίας κυκλοφορεῖ μέχρι τῶν πνευμόνων δ ἄέρ, καὶ β') τοὺς πνεύμονας (εἰκ. 26).

Η ἀναπνευστικὴ δόδος εἶναι ἔνας σωλήν, δ δποῖος ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ρινικὴν κοιλότητα καὶ προχωρεῖ κατὰ μῆκος τῆς προσθίας ἐπιφανείας τοῦ λαιμοῦ. 'Ο σωλήν οὗτος σχηματίζεται ἀπὸ ἀλλεπαλλήλους χονδρίνους δακτυλίους καὶ ἐσωτερικῶς καλύπτεται ἀπὸ βλεφαριδωτὸν βλεννογόνον. Τὸ πρόσθιον μέρος τοῦ σωλῆνος τούτου εἶναι ἰδιαιτέρως διαμορφωμένον διὰ

τὴν παραγωγὴν τῆς φωνῆς καὶ καλεῖται λάρυγξ. Τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα, ἡ τραχεῖα, δταν φθάσῃ εἰς τὸ ὑψος τοῦ στέρνου, διχάζεται εἰς δύο κλάδους, οἱ ὅποιοι καλοῦνται βρόγχοι καὶ οἱ ὅποιοι εἰσέρχονται ἀνὰ εἰς εἰς ἕκαστον πνεύμονα.

Οἱ πνεύμονες κατέχουν τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς θωρακικῆς κοιλότητος. Ἐντὸς αὐτῶν οἱ βρόγχοι διακλαδίζονται εἰς ἀπειρίαν μικρῶν κυστίδων, τὰς κυψελίδας. Εἰς τὰ τοιχώματα τῶν κυψελίδων τούτων διακλαδίζονται τριχοειδῆ σίμοφόρα ἄγγεια. "Ωστε τί μᾶζα τῶν πνευμόνων ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ βρόγχια, τὰ ἄγγεια, τὰς κυψελίδας καὶ ἀπὸ συνδετικὸν ίστόν. Ο δεξιὸς πνεύμων εἶναι τρίλοβος, ὁ δὲ ἀριστερὸς εἶναι μικρότερος (δίλοβος), ἀφήνων χῶρον καὶ διὰ τὴν καρδίαν εἰς τὸ ἀριστερὸν ἥμισυ τοῦ θώρακος.

"Οπως θὰ ἴωμεν καὶ ἀργότερον, ἀπὸ τὴν καρδίαν (καὶ μάλιστα τὴν δεξιὰν κοιλίαν αὐτῆς) ἀρχίζει ἐν μεγάλῳ ἄγγειον, ἡ πνευμονικὴ ἀρτηρία. Αὕτη διχάζεται εἰς ἐν ἄγγειον διὰ κάθε πνεύμονα καὶ τοῦτο διακλαδίζεται περαιτέρω καὶ δίδει τὰ τριχοειδῆ ἄγγεια τῶν πνευμόνων. Διὰ τῆς πνευμονικῆς ταύτης ἀρτηρίας προσάγεται ἀπὸ τὴν καρδίαν αἷμα εἰς τοὺς πνεύμονας. Ἐδῶ τοῦτο συναντᾶται μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ὁ ὅποιος διὰ τῆς ἀναπνευστικῆς ὁδοῦ εἰσέρχεται εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ πληροῖ τὰς κυψελίδας.

Διὰ μέσου τῶν λεπτοτάτων τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν τὸ δξυγόνον τοῦ ἀέρος διεισδύει (διαπιδύει) εἰς τὰ ἄγγεια καὶ δεσμεύεται ὑπὸ τοῦ αἵματος. Ἀντιστρόφως, ἐκ τοῦ αἵματος διαπιδύει εἰς τὸν ἀέρα τῶν κυψελίδων τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος. "Ωστε γίνεται μία ἀνταλλαγὴ ἀερίων μεταξὺ αἵματος καὶ ἀέρος. Δι' αὐτῆς τὸ αἷμα πλουτίζεται εἰς δξυγόνον καὶ καθαρίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, τὸ ὅποιον προκύπτει ἐκ τῶν καύσεων. Μετὰ τοῦτο τὸ αἷμα ἐπιστρέφει εἰς τὴν καρδίαν (τὸν ἀριστερὸν κόλπον αὐτῆς) διὰ τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν. Ἐξ ὅλου ὁ φορτισμένος μὲ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος καὶ πτωχὸς πλέον εἰς δξυγόνον ἀπὸ τῶν κυψελίδων ἔκδιώκεται ἀπὸ τοὺς πνεύμονας.

Αἱ πολυπληθεῖς κυψελίδες παρέχουν, ὅλαι μαζί, μίαν μεγάλην ἐπιφάνειαν, εἰς τὴν ὅποιαν τὸ αἷμα καὶ ὁ ἀπὸ ἔρχονται εἰς ἐπαφήν. Ὑπολογίζουν, ὅτι ἡ ἐπιφάνεια αὐτῆς ἀνέρχεται περίπου μέχρι τῶν 130 τ.μ.

2. ΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

‘Η εἰσοδος τοῦ ἀέρος μέχρι τῶν πνευμόνων καὶ κατόπιν ἡ ἔξοδος αὐτοῦ ἔξασφαλίζονται διὰ τῶν ἀναπνευστικῶν κινήσεων. Αὗται τελοῦνται εἰς δύο χρόνους: πρῶτον, αἱ πλευραὶ κινοῦνται πρὸς τὰ ἔξω καὶ τὸ διάφραγμα πρὸς τὰ κάτω. Οὕτως ἡ θωρακικὴ κοιλότης εὔρυνται καὶ οἱ πνεύμονες, διογκούμενοι, ἀποκτοῦνται μεγαλυτέραν χωρητικότητα. Τότε ρεῦμα ἀέρος διὰ τῆς ρινός ἡ τοῦ στόματος εἰσέρχεται εἰς τὴν ἀναπνευστικὴν δόδον καὶ φθάνει μέχρι τῶν κυψελίδων (εἰσπνοή). Δεύτερον, διὰ χαλαρώσεως τῶν μυῶν τῶν πλευρῶν καὶ τοῦ διαφράγματος ἡ θωρακικὴ κοιλότης ἐπανακτᾶ τὸν προηγούμενον ὅγκον της. Οὕτως οἱ πνεύμονες πιέζονται καὶ ὁ ἄηρ, ὁ δόποιος εἰσῆλθε κατὰ τὴν εἰσπνοήν, ἐκδιώκεται ἐξ αὐτῶν (ἐκπνοή). ‘Η συμπίεσις ὅμως τῶν πνευμόνων δὲν εἶναι τελεία καὶ πάντοτε παραμένει ἐντὸς αὐτῶν μικρὰ ποσότης ἀέρος.

Σημείωσις. Κατὰ τὴν ἀναπνοήν δὲ ὄργανισμὸς ἀποδίδει, πλὴν τοῦ διειδίου τοῦ ἄνθρακος, καὶ μίαν ποσότητα ύδρατμῶν. Διὰ τοῦ· τρόπου τούτου ἀποβάλλεται καὶ μέρος τῆς θερμότητος τοῦ σώματος.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ


Χάρις εἰς τὰς ἀναπνευστικὰς κινήσεις κυκλοφορεῖ διὰ τῆς ἀναπνευστικῆς δόδοῦ μέχρι τῶν πνευμόνων ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἄηρ. Ἐξ ἄλλου, διὰ τῶν ἀγγείων φέρεται μέχρις αὐτῶν τὸ αἷμα. Διὰ μέσου τῶν τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν γίνεται ἀνταλλαγὴ ἀερίων, διὰ τῆς δόποιας τὸ αἷμα πλουτίζεται εἰς ὀξυγόνον καὶ καθαρίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) ‘Η ἐπιφάνεια τῶν κυψελίδων ὑπολογίζεται μέχρι 130 τ.μ. Παρατήρησε ἐπὶ τοῦ ἐδάφους μίαν ἵσην ἐπιφάνειαν.

2) Κατὰ τὴν ἥρεμον ἀναπνοήν ὁ ἄνθρωπος εἰσάγει 500 κυβ. ἔκ. ἀέρος εἰς τοὺς πνεύμονας. Δεδομένου ὅτι εἰς κάθε 1' ἐκτελεῖ 16 ἀναπνοάς, πόσον ὅγκον ἀέρος εἰσπνέει εἰς μίαν ὥραν, εἰς ἓν ἡμερονύκτιον; Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν αἱ ἀναπνοαὶ εἶναι περισσότεραι, ἀνερχόμεναι εἰς 25–30 κατὰ 1'.

3) ‘Ο εἰσπνεόμενος ἄηρ, διερχόμενος διὰ τῆς ρινός, ὅχι μόνον



Εἰκ. 27. Οι τρεῖς ἀναπνευστικοὶ τύποι.

καθαρίζεται, ἀλλὰ καὶ θερμαίνεται. Παρατήρησε τοῦτο εἰσπνέων μίαν φοράν διὰ τῆς ρινὸς καὶ μίαν διὰ τοῦ στόματος.

4) Εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα ὁ εἰσπνεόμενος ἀήρ καθαρίζεται ἀπὸ τὴν σκόνην καὶ τὰ μικρόβια. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τραχεῖαν αἱ βλεφαρίδες τοῦ ἐπιθηλίου τῆς, διὰ τῶν κινήσεών των, ἀναγκάζουν κάθε μόριον σκόνης, τὸ ὅποιον τυχὸν εἰσέδυσε, νὰ ἔξελθῃ. Υπολογίζουν, ὅτι εἰς τὸ ὑπαιθρὸν αἰωροῦνται 1000 μικροσκοπικὰ μόρια σκόνης εἰς 1 κυβ. ἑκατοστ., εἰς δὲ τὰς πόλεις 100.000—500.000.

5) Παρατήρησε κατὰ τὴν ἡρεμον ἀναπνοὴν τοὺς ἔξης τρεῖς «ἀναπνευστικοὺς τύπους»: α') Κατωτέρα πλευρικὴ (διαφραγματικὴ) ἀναπνοή, συνήθης εἰς τοὺς ἄνδρας· β') Ἀνωτέρα πλευρικὴ (θωρακικὴ) ἀναπνοή, συνήθης εἰς τὰς γυναῖκας· γ') Κοιλιακὴ ἀναπνοή, συνήθης εἰς τὰ παιδία (εἰκ. 27).




ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Ο ΛΑΡΥΓΞ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

1. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Ἐξετάζοντες τὴν κατασκευὴν τοῦ ἀναπνευστικοῦ σωλῆνος, παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ ἀνώτερον μέρος του, ὁ λάρυγξ, σχηματίζεται ἀπὸ χόνδρινα τμήματα, παρουσιάζοντα ἴδιαίτερον, σχῆμα καὶ μέγεθος (εἰκ. 19, 26). Ἐκ τῶν χόνδρων τούτων μεγαλύτερος είναι ὁ θυρεοειδῆς, κάτωθεν τοῦ ύοειδοῦς ὀστοῦ. Εἰς τὴν ὀπισθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ λάρυγγος, κάτωθεν τοῦ ύοειδοῦς ὀστοῦ. Εἰς τὴν ὀπισθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ λαρυγγοῦ εὑρίσκονται δύο μικρότεροι χόνδροι, οἱ ἀρυταῖνοειδεῖς. Κάτωθεν τοῦ θυρεοειδοῦς εύρισκεται ὁ κρικοειδῆς χόνδρος. Τέλος ὁ λάρυγξ δύναται νὰ κλεισθῇ ὑπὸ ἐνὸς ἄλλου χόνδρου, τῆς ἐπιγλωττικοῦ, οἱ δύο τατιδοῖς, ή ὀποία εύρισκεται εἰς τὴν βάσιν τῆς γλώσσης.

Μεταξὺ τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου καὶ τῶν ἀρυταινοειδῶν ἐκτείνονται δύο ζεύγη σαρκωδῶν πτυχῶν, αἱ ὀποῖαι καλοῦνται φωνητικαὶ χορδαί.



Εἰκ. 28. Τομὴ διὰ τοῦ λάρυγγος.—1. Ἀνώτεραι φωνητικαὶ χορδαί. — 2. Κατώτεραι φωνητικαὶ χορδαί. — 3. Φωνητικὴ σχισμή. — 5. Θυρεοειδῆς. — 4. Κρικοειδῆς.

Ἐκ τούτων μόνον αἱ κατώτεραι ἔχουν σημασίαν διὰ τὴν παραγωγὴν τῆς φωνῆς καὶ κυρίως αὐτὰς θὰ ἔννοοῦμεν ὡς φωνητικὰς χορδάς. Αὗται ἀφήνουν μεταξύ των τὴν φωνητικὴν σχισμὴν, μήν, διὰ τῆς ὀποίας διέρχεται ὁ ἀήρ (εἰκ. 28).

Διὰ τῶν διαφόρων μυῶν είναι δυνατὸν αἱ δύο κατώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ νὰ ἐκταθοῦν καὶ ἡ φωνητικὴ σχισμὴ νὰ ἀποστενωθῇ. Οἱ ἐκπνεόμενος τότε ἀήρ, διερχόμενος διὰ τῆς στενῆς σχισμῆς, θέτει εἰς παλμικὰς κινήσεις τὰς δύο χορδάς, καὶ οὕτω παράγεται ἡ φωνή.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ. ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΦΘΟΓΓΟΥΣ. ΛΟΓΟΣ

"Οπως εις κάθε ήχον, διακρίνομεν καὶ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φωνὴν τρεῖς χαρακτῆρας: τὸ ὑψός (βαρειὰ ἡ ψιλὴ φωνή), τὴν ἐν τασὶν (δυνατὴ ἡ ἀσθενής) καὶ τέλος τὸ ποιὸν τῆς φωνῆς. Διὰ τοῦ ποιοῦ τῆς φωνῆς ἀναγνωρίζομεν τὸ πρόσωπον, τὸ δόποῖον παράγει αὐτήν, ἔστω καὶ ἂν δὲν βλέπομεν αὐτό.

Τὸ ὑψός τῆς φωνῆς ἔξαρταται ἀπὸ τὴν τάσιν τῶν χορδῶν καὶ ἀπὸ τὸ μῆκος τοῦ λαιμοῦ. Ἡ ἔντασις ἔξαρταται ἀπὸ τὴν δύναμιν τῆς ἐκπνοῆς. Τὸ ποιὸν τέλος ἔξαρταται ἀπὸ τὴν ἰδιαιτέραν κατασκευὴν τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς στοματικῆς κοιλότητος ἐκάστου ἀτόμου.

Ἡ φωνή, ἡ δόποια παράγεται εἰς τὸν λάρυγγα, φθάνει εἰς τὸ στόμα, ὅπου ἀρθροῦται, δηλ. μετατρέπεται εἰς φθόγγους. Οἱ διάφοροι φθόγγοι προκύπτουν ἀναλόγως τῆς θέσεως, τὴν δόποιαν λαμβάνει ἡ γλῶσσα, οἱ δόδοντες καὶ τὰ χείλη. Διὰ τῶν φθόγγων σχηματίζονται αἱ λέξεις.

'Ο λόγος εἶναι ἔξαιρετικὸν προνόμιον τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐν ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα μέσα, τὰ δόποια ἔκαμαν δυνατὴν τὴν διανοητικὴν ἀνάπτυξιν αὐτοῦ.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ἡ φωνὴ παράγεται, ὅταν αἱ κυρίως φωνητικαὶ χορδαὶ ἐκταθοῦν καὶ ὁ ἐκπνεόμενος ἀτὴρ θέσῃ αὐτὰς εἰς παλμικὴν κίνησιν. Εἰς τὸ στόμα ἡ φωνὴ ἀρθροῦται εἰς φθόγγους, ἐκ τῶν δόποιων σχηματίζονται αἱ λέξεις.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Κατὰ τὸ 12ον ἔτος περίπου τῆς ἡλικίας παρατηρεῖται μία ταχυτέρα αὔξησις τοῦ λάρυγγος καὶ τοῦτο προκαλεῖ τὴν ἀλλαγὴν τῆς φωνῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην (μετάπλασις τῆς φωνῆς). Ἐπειδὴ τὸ ἄτομον δὲν συνθήζει ἀμέσως εἰς τὰς νέας συνθήκας, παρατηροῦνται κατὰ τὴν περίοδον ταύτην δυσκολίαι εἰς τὴν προφοράν.

2) Πρόσεξε καὶ καθόρισε τὴν θέσιν τῆς γλώσσης κατὰ τὴν προφορὰν τῶν ἔξῆς φθόγγων: 1) π, 2) φ, β, 3) θ, δ, 4) τ, 5) κι, χι, 6) κα, 7) α, 8) ι, καὶ 9) ου.

3) Έκτὸς τοῦ ἀνθρώπου ποία κατηγορία ζώων ἔχει ἀνεπτυγμένην φωνητικὴν συσκευήν; Πῶς χρησιμοποιεῖ ἡ κατηγορία αὐτῇ τὰ πρόσθια ἄκρα, πῶς δὲ ἀνθρωπός καὶ πῶς τὰ ὅλλα τετράποδα;

4) Εἰς τὸν ἄνδρα τὸ μῆκος τοῦ λάρυγγος εἶναι μεγαλύτερον παρὰ εἰς τὴν γυναῖκα. Ὁμοίως αἱ φωνητικαὶ χορδαὶ εἶναι μακρότεραι. Ποία διαφορὰ εἰς τὴν φωνὴν παρατηρεῖται διὰ τοῦτο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΥ. Η ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ

1. ΤΟ ΑΙΜΑ

Εις ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος διακλαδίζονται λεπτά σωληνάρια μὲ ἰνώδη, ἔλαστικὰ καὶ συσταλτικὰ τοιχώματα, τὰ αἱ μοφόρα ἀγγεῖα, ἐντὸς τῶν ὅποιων κυκλοφορεῖ τὸ αἷμα.

Τὸ αἷμα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν ύγρον, καλούμενον πλάσμα, καὶ ἀπὸ κύτταρα, τὰ ὅποια αἰωροῦνται μέσα εἰς τὸ ύγρὸν αὐτό, καλούμενα αἱ μοσφαίρια. Τὸ πλάσμα ἔχει χρῶμα ἀνοικτοκίτρινον καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὕδωρ (90%) καὶ οὔσιας διαλελυμένας ἐντὸς αὐτοῦ. Αἱ οὔσιαι εἰναι διάφοροι ἐνώσεις ἀνόργανοι καὶ δρανικαί.

Τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου 70 κιλῶν εἰναι 4—5 λίτρα.

Τὰ αἱμοσφαίρια διακρίνονται εἰς ἑρυθρά καὶ λευκά.

Τὰ ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια εἰναι κύτταρα, τὰ ὅποια ἔχασαν τὸν πυρῆνά των, τὰ μιτοχόνδρια καὶ τὸ κεντροσωμάτιον, δὲν πολλαπλασιάζονται καὶ ζοῦν μέχρι τὸ πολὺ 120 ἡμέρας, καταστρεφόμενα εἰς τὸν σπλήνα ἥ τὸ ήπαρ. Εἰναι ἀμφίκοιλα δισκία, μαλακά, ἔλαστικὰ καὶ εύκαμπτα διὰ νὰ διέρχωνται εὐκόλως ἀπὸ τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα. Περιέχουν αἱμοσφαιρίνην, μίαν ἐνωσιν σιδηροῦχον, ἥ ὅποια προσδίδει εἰς αὐτὰ καὶ τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα. Τὰ ἐρυθρὰ αὐτὰ αἱμοσφαίρια, φθάνοντα εἰς τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα τῶν πνευμόνων, ἔρχονται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Τότε ἡ αἱμοσφαιρίνη δεσμεύει τὸ δξυγόνον, τὸ ὅποιον διαπιδύει διὰ τῶν τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν ἀπὸ τὸν ἀέρα καὶ μετατρέπεται εἰς μίαν χαλαρὰν ἐνωσιν, τὴν δξαιμοσφαιρίνην. Τὸ δξυγόνον, τοῦτο διὰ τῆς κυκλοφορίας, μεταφέρεται εἰς τοὺς ἴστούς.


Τὰ λευκὰ αἱμοσφαίρια, ἀντιθέτως πρὸς τὰ ἐρυθρά, διατηροῦν τὸν πυρῆνά των καὶ ἔχουν σχῆμα σφαιρικὸν. Ἰδιαιτέραν σημασίαν

ἔχει μίαν κατηγορία λευκῶν αίμοσφαιρίων, τὰ λευκά ρα, τὰ όποια φέρονται ύπό τοῦ ρεύματος τοῦ αἵματος, ἀλλὰ δύνανται νὰ κινοῦνται καὶ μόνα των ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων τῶν ἄγγείων. "Όταν τυχὸν εἰσέλθουν μικρόβια, τὰ λευκοκύτταρα προστρέχουν, τὰ περικλείουν καὶ τὰ διαλύουν ἐντὸς τοῦ κυτταρικοῦ των σώματος, ὅπως ἡ ἀμοιβὰς τὴν τροφήν της. Τὰ λευκοκύτταρα δύνανται νὰ εἰσέρχων-

ται καὶ διὰ τοῦ τοιχώματος τῶν ἄγγείων καὶ οὕτω π.χ. ἀνευρίσκονται εἰς τὸ πύον.

"Ἐν κυβ. χιλιοστόμετρον αἵματος ὑγιοῦς ἀνθρώπου περιέχει περίπου $4\frac{1}{2}$ —5 ἑκατομμ. Ἐρυθρὰ αίμοσφαιρία καὶ μόνον 6—8 χιλ. λευκά.

'Ἐὰν τὸ αἷμα ἔξελθῃ ἀπὸ τὰ ἄγγεια διὰ τινος πληγῆς, πήγνυται συντομώτατα καὶ δημιουργεῖ τὸν πλακοῦντα καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ αίμοσφαιρία καὶ ἀπὸ ἕνα δίκτυον καλούμενον ἢ νῶδες. 'Ἐπάνω ἀπὸ τὸν πλακοῦντα μένει ἔν κιτρινωπὸν ὑγρόν, δόρος, ἀποτελούμενον κυρίως ἀπὸ τὸ πλάσμα.



Εἰκ. 29. Σχῆμα τῆς καρδίας. 1 καὶ 2. *Ανω καὶ κάτω κοιλιαὶ φλέβες.—3. Τριγλῶχιν βαλβίδα.—4. Νήματα συγκρατοῦντα τὴν βαλβίδα, ὥστε αὐτῇ νὰ μή δύναται νὰ ἀντιστραφῇ.—5. Μηνοειδεῖς βαλβίδες.—6. Πνευμονική ἀρτηρία.—7, 8, 9, 10. Αἱ τέσσαρες πνευμονικαὶ φλέβες, ἀπολήγουσαι εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον.—11. Διγλῶχιν βαλβίδα.—12. Μηνοειδεῖς βαλβίδες.—13. *Ανιοῦσα ἀρτή.

2. Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ

Η καρδία είναι τὸ κεντρικὸν ὄργανον, τὸ όποιον, διὰ τῶν κινήσεών του, κανονίζει τὴν ροήν τοῦ αἵματος. Εύρισκεται εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ θώρακος, μεταξὺ τῶν δύο πνευμόνων καὶ ἀριστερὰ


τοῦ στέρνου. Ἐχει μέγεθος πυγμῆς καὶ τὸ τοίχωμά της ἀποτελεῖται ἀπὸ γραμμωτούς μῆς.

Ἡ καρδία (εἰκ. 29 καὶ 30) χωρίζεται εἰς τέσσαρας χώρους. Οἱ δύο ἀνώτεροι χῶροι καλοῦνται κόλποι ποι, οἱ δύο δὲ κατώτεροι κοιλία. Ὁ ἀριστερὸς κόλπος καὶ ἡ ἀριστερὰ κοιλία συγκοινωνοῦν δι’ ἐνὸς πόρου, δὲ διποῖς ἀνοιγοκλείει μὲ μίχν βαλβίδα (μιτροειδής ἢ διγλώχιν βαλβίδης).

Κατὰ τὸν ᾔδιον τρόπον συγκοινωνεῖ καὶ διποῖς κόλπος μὲ τὴν δεξιὰν κοιλίαν (μηνοειδής ἢ τριγλῶχιν βαλβίδης).

Αἱ κοιλίαι ἔχουν ἴσχυρότερον τοίχωμα παρὰ οἱ κόλποι, καὶ τοῦτο διότι, ὡς θὰ ᾔδωμεν, ἀποστέλλουν τὸ αἷμα εἰς μακρὰν ἀπόστασιν. Ἀντιθέτως, οἱ κόλποι τὸ διοχετεύουν ἀπλῷ ἕκαστος εἰς τὴν ἀντίστοιχον κοιλίαν. Ἐκ δὲ τῶν κοιλιῶν ἴσχυροτέρα εἰναι ἡ ἀριστερά, ἡ διποία ἀποστέλλει τὸ αἷμα εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος, ἐνῷ ἡ δεξιὰ τὸ ἀποστέλλει μόνον εἰς τοὺς πλησίους πνεύμονας.

Ἄπὸ τὴν καρδίαν ἀρχίζουν μεγάλα ἀγγεῖα, τὰ διποῖα ἔξαπλοῦνται εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος καὶ διακλαδίζονται τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ. Ὅσα ἀγγεῖα ἀρχίζουν ἀπὸ τὰς δύο κοιλίας τῆς καρδίας καλοῦνται ἀρτηρίαι καὶ ἐντὸς αὐτῶν τὸ αἷμα κινεῖται κατεύθυνόμενον πρὸς τὴν καρδίαν. Εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον, διὰ τεσσάρων φλεβῶν, καλουμένων πνευμονικῶν φλεβῶν, προσάγεται τὸ αἷμα ἀπὸ τοὺς πνεύμονας, ἐμπλουτισμένον εἰς ὁξυγόνον. Ἐκ τοῦ




Εἰκ. 30. Ἡ καρδία καὶ τὰ ἔξ αὐτῆς ἀρχίζοντα ἀγγεῖα.
1. Ἀριστερὸς κόλπος. — 2. Πνευμονικὴ ἀρτηρία. — 3. Ἀνιοῦσα ἀρτηρία. — 9. Δεξιὰ κοιλία. — 10. Ἀριστερὰ κοιλία. — 8. Δεξιὸς κόλπος. — 5, 7. Πνευμονικαὶ ἀρτηρίαι.

κόλπου τούτου τὸ αἷμα μεταβαίνει εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν καὶ κατόπιν εἰσέρχεται εἰς μίαν μεγάλην ἀρτηρίαν, ἡ ὅποια ὀνομάζεται ἀνιοῦσα ἀօρτή. Αὕτη διακλαδίζεται εἰς μικρότερα ἀγγεῖα καὶ τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ, τὰ ὅποια ἀποδίδουν εἰς τοὺς ιστοὺς τὸ πλούσιον εἰς ὄξυγόνον καὶ θρεπτικάς ούσίας αἷμα.

Τὸ αἷμα διέρχεται διὰ τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων, δίδει εἰς τοὺς



Εἰκ. 32. Ἀκτινογραφία, εἰς τὴν ὁποίαν διακρίνονται οἱ σύρητῆρες καὶ αἱ πύλειοι τῶν νεφρῶν.



Εἰκ. 31. Τὸ ἀπεκκριτικὸν σύστημα.
1. Νεφρός.—3. Τομὴ οὐροφόρων σωληναριών.—5. Φλέψ.—6. Ἀρτηρία.—7. Ούρητήρ.—8. Ούροδόχος κύστις.—2. Ἐπινεφρίδιον.

ιστούς θρεπτικάς ούσίας καὶ ὄξυγόνον καὶ παραλαμβάνει τὰ πρειόντα τῶν καύσεων. Ἐξ αὐτῶν αἱ μὲν διαλυταὶ ούσιαι παραλαμβάνονται ἀπὸ τὸ πλάσμα, τὸ δὲ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος ἀπὸ τὰ ἐρυθρὰ αἷμοσφαίρια. Κατόπιν τὸ αἷμα παραλαμβάνεται ἀπὸ τὰς φλέβας, αἱ ὅποιαι ἔνώνονται εἰς δύο μεγάλας, τὴν ἀνω καὶ τὴν κάτω κοιλην φλέβα, καὶ ἐπανέρχεται εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον τῆς καρδίας.

Τὸ ἐπιστρέψαν εἰς τὴν καρδίαν αἷμα κατέρχεται ἀπὸ τὸν δεξιὸν κόλπον εἰς τὴν δεξιὰν κοιλίαν. Ἐξ αὐτῆς εἰσέρχεται εἰς τὴν πνευμονικὴν ἀρτηρίαν, ἡ ὅποια τὸ ὄδηγει εἰς τοὺς πνεύμονας. Εἰς τοὺς πνεύμονας τὸ αἷμα, διὰ μέσου τῶν λεπτοτάτων τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων ἔρχε-

ταὶ εἰς ἐπαφήν μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ἀποδίδει τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ δεσμεύει νέον δύνγονον. Μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦτον ἐπιστρέφει πάλιν εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον κ.ο.κ.

Εἰς τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρτηρῶν ὑπάρχουν αἱ μηνοειδεῖς βαλβίδες διὰ νὰ ἐμποδίζουν τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ αἵματος εἰς τὰς κοιλίας ὅταν διαστέλλονται αὗται διὰ νὰ δεχθοῦν τὸ αἷμα ἐκ τῶν κόλπων.

3. ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ. ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ

Τὸ αἷμα κατὰ τὴν διαδρομήν του διέρχεται διὰ τῶν νεφρῶν (εἰκ. 31 καὶ 32). Οὗτοι εἶναι δύο ὅργανα, τὰ δόποια ἔχουν σχῆμα φασολιοῦ καὶ μέγεθος 10 ἑκατοστῶν περίπου (εἰκ. 31), εύρισκονται δὲ ἀμέσως πρὸ τοῦ ὅπισθίου τοιχώματος τῆς κοιλίας, ἀνὰ εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῶν πρώτων ὁσφυϊκῶν σπονδύλων. Ἡ ἀρτηρία, ἡ δόποια εἰσέρχεται εἰς ἕκαστον νεφρόν, διακλαδίζεται ἐντὸς αὐτοῦ εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ. Διὰ τοῦ τοιχώματος τούτων ἔχερχονται ἀπὸ τὸ αἷμα ὕδωρ καὶ ὥρισμέναι ἄχρηστοι οὐσίαι. Ἐχέρχονται ἀκόμη καὶ διάφορα ἄλστα ἡ σάκχαρον, ὅταν ταῦτα πλεονάζουν εἰς τὸν ὅργανον.

Μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦτον, τὸ αἷμα συναθροίζεται ἐξ ἑκάστου νεφροῦ εἰς μίαν φλέβα, ἡ δόποια ἀπολήγει εἰς τὴν κάτω κοίλην φλέβα.

“Ολαι αἱ κατακρατηθεῖσαι εἰς τὸν νεφρὸν οὐσίαι συναθροίζονται εἰς λεπτὰ σωληνάρια, τὰ δόποια περιέχει ὁ νεφρός, καὶ οὕτω συγκρατίζονται τὰ οὖρα. Ἔνας μακρὸς σωλήν ἐξ ἑκάστου νεφροῦ, καλούμενος οὐρὴ τήρη, φέρει τὰ οὖρα κατὰ σταγόνας εἰς τὴν οὐροδόχον κύστιν, ἡ δόποια εύρισκεται εἰς τὸ πρόσθιον μέρος τῆς λεκάνης. Ὁταν ἡ κύστις πληρωθῇ, τὰ οὖρα ἀποβάλλονται τοῦ σώματος.

Εἰς 24 ὥρας 1500 λίτρα αἵματος διέρχονται διὰ τῶν νεφρῶν καὶ ἀποβάλλονται ἐξ αὐτῶν 1,5 λίτρα οὖρων περίπου.


Ἡ ἀνωτέρω λειτουργία, διὰ τῆς δόποιας οἱ νεφροὶ συγκρατοῦν ἀπὸ τὸ αἷμα ἄχρηστους οὐσίας καὶ τὰς ἀποβάλλουν τοῦ σώματος, καλεῖται ἀπεκκριτικὴ ὅργανα.

‘Ως ἐμάθομεν, ἀπεκκριτικὴν λειτουργίαν ἔκτελοῦν καὶ οἱ πνεύμονες, οἱ δόποιοι ἀπομακρύνουν τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Τέλος

θά ιδωμεν ἀργότερον. ὅτι καὶ ἀπὸ τὸ δέρμα ἀποβάλλονται, εἰς μήκαν ὅμως ποσότητα, μερικαὶ ἄχρηστοι διὰ τὸ σῶμα ούσιαι.

4. ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

"Οπως ἐμάθομεν εἰς τὸ κεφάλαιον περὶ πέψεως, τὰ προϊόντα τῆς πέψεως, διερχόμενα τὸ τοίχωμα τοῦ ἔντερου, εἰσδύουν εἰς τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἔντερου. Τὰ αἱ μοφόρα ἀγεῖα παραλαμβάνουν κυρίως τοὺς ὑδατάνθρακας καὶ τὰ λευκώματα. Τὰ λίπη παραλαμβάνονται πρὸ παντὸς ἀπὸ τὰ λεμφικὰ ἀγεῖα, τὰ διόποια θὰ γνωρίσωμεν ἀργότερα.



Εἰκ. 33. Σχηματική παράστασις τῆς κυκλοφορίας.
π. Πνεύμονες. — α, β, γ.
'Οδοι τῆς μεγάλης κυκλοφορίας: διὰ τοῦ ἔντερου καὶ τοῦ ἡπατος, διὰ τῶν νεφρῶν καὶ διὰ τῶν ιστῶν.

'Απὸ τὸ ἔντερον τὰ αἱμοφόρα ἀγγεῖα δὲν ἔρχονται ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν κοίλην φλέβα, ἀλλὰ προηγουμένως διέρχονται ἀπὸ τὸ ἡπατο (συκώτι). 'Εντὸς αὐτοῦ γίνεται ἡ ἀφομοίωσις ἐν μέρει μὲν τῶν λευκωμάτων, πρὸ παντὸς ὅμως τῶν ὑδατάνθρακων.

Κατὰ τὴν ἀφομοίωσιν αὐτὴν σχηματίζεται εἰς σύνθετος ὑδατάνθραξ, καλούμενος γλυκόγόνον. Τοῦτο ἀποθηκεύεται εἰς τὸ ἡπατο καὶ, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν, ἀποστέλλεται διὰ τῆς κυκλοφορίας εἰς τοὺς μῆτρας, ὅπου ἔχοδεύεται μαζὶ μὲ τὸ δέινυόνον διὰ τὰς καύσεις.

Οἱ πλεονάζοντες ὑδατάνθρακες μετατρέπονται εἰς λίπη, τὰ διόποια ἀποθηκεύονται εἰς διάφορα μέρη τοῦ σώματος διὰ νὰ ἀποδοθοῦν κατὰ τὴν ἀσιτίαν διὰ τὰς καύσεις.

'Η ίκανότης τοῦ δργανισμοῦ νὰ ἀποθηκεύῃ ὑδατάνθρακας ὑπὸ μορφὴν γλυκογόνου εἰς τὸ ἡπατο είναι περιωρισμένη (400 γραμ.).' Αντιθέτως είναι ἀπεριόριστος ἡ ποσότης λίπους, ἡ διόποια δύναται νὰ ἐναποτεθῇ εἰς τὸ σῶμα.

Διὰ τῆς πυλαίας ἐπίστης φλεβὸς ἔρχεται εἰς τὸ ἡπαρ καὶ τὸ αἷμα τοῦ στομάχου, τοῦ παγκρέατος καὶ τοῦ σπληνός.

Εἰς τὸ ἡπαρ τὸ αἷμα ἀπαλλάσσεται ἐν μέρει καὶ ἀπὸ διάφορα μικρόβια καὶ δηλητηριώδεις ούσιας. Τὸ ἡπαρ παράγει, ὡς ἐμάθομεν, καὶ τὴν χολήν.

Ἄφοῦ διέλθουν ἀπὸ τὸ ἡπαρ, τὰ αἵμοφόρα ἀγγεῖα συναθροίζονται εἰς μίαν φλέβα, τὴν ἡπατικὴν φλέβα, ἡ ὅποια ἀπολήγει εἰς τὴν κάτω κοιλην φλέβα.

5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (εἰκ. 33)

Κατὰ τὰ προηγούμενα, διακρίνομεν τὴν μικρὰν καὶ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος. Μικρὰ κυκλοφορία καλεῖται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν δεξιὰν κοιλίαν τῆς καρδίας εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸ ἀριστερὸν κόλπον. Μεγάλη δὲ κυκλοφορία καλεῖται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν εἰς τὰς διάφορα μέρη τοῦ σώματος καὶ ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον. 'Ως εἴδομεν, κατὰ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν ὑπάρχουν τρεῖς ὄδοι, τὰς ὅποιας ἀκολουθεῖ τὸ αἷμα: α') διέρχεται ἀπὸ τὸ τοίχωμα τῶν ἐντέρων καὶ ἀπὸ τὸ ἡπαρ, ἐμπλουτισμένον εἰς θρεπτικὰς ούσιας, β') διέρχεται ἀπὸ τὸν εφρόνιο, ὅπου καθαρίζεται ἀπὸ ἀχρήστους ούσιας, καὶ γ') διασκορπίζεται εἰς τοὺς ιστούς τοῦ σώματος καὶ τρέφει τὰ ἀκίνητα καὶ ειδικευμένα κύτταρα τῶν ιστῶν.

Δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν τὰς ἐργασίας, τὰς ὅποιας ἐκτελεῖ τὸ αἷμα, ὡς ἔξῆς:

α') Μεταφέρει τὰς θρεπτικὰς ούσιας καὶ τὰς διαμοιράζει εἰς τοὺς ιστούς.

β') Μεταφέρει τὸ δύγυρόν τοῦ εἰς τοὺς ιστούς.

γ') 'Αποκομίζει τὰς ἀχρήστους ούσιας, αἱ ὅποιαι παράγονται κατὰ τὰς καύσεις. 'Εκ τῶν ούσιῶν τούτων τὸ μὲν ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος τὸ ἀποδίδει διὰ τῶν πνευμόνων, τὰς δὲ λοιπὰς διὰ τῶν νεφρῶν.

δ') Καταπολεμεῖ τὰ μικρόβια διὰ τῶν λευκοκυττάρων του.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω, τὸ αἷμα ἐκτελεῖ καὶ ἄλλας ἐργασίας. Μεταφέρει π.χ. τὰς ὁρμόνας, ὡρισμένας δηλ. ούσιας ἀπαραιτήτους διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ, αἱ ὅποιαι παράγονται ὑπὸ

εἰδικῶν ἀδένων. Τέλος, διὰ τῆς κυκλοφορίας του συντελεῖ τὸ αἷμα καὶ εἰς τὴν ὄμοιόμορφον κατανομὴν τῆς θερμότητος εἰς τὸ σῶμα.

6. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

‘Η ἀδιάκοπος ροή τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων, ἀκόμη καὶ ἀντιθέτως πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῆς βαρύτητος, ἔξασφαλίζεται διὰ τῶν ρυθμικῶν συστολῶν καὶ διαστολῶν τῆς καρδίας.

Εἰς τὰς κινήσεις αὐτὰς διακρίνομεν δύο χρόνους. Κατὰ τὸν πρῶτον χρόνον διαστέλλονται αἱ κοιλίαι καὶ δέχονται τὸ αἷμα ἐκ τῶν κόλπων. Πρὸς τοῦτο ὀλίγον συμβάλλει καὶ ἡ συστολὴ τῶν κόλπων.

Κατὰ τὸν δεύτερον χρόνον συστέλλονται αἱ κοιλίαι καὶ ὡθοῦν τὸ αἷμα πρὸς τὴν ἀρτηρίαν (ἡ ἀριστερὰ κοιλία) καὶ πρὸς τὴν πνευμονικὴν ἀρτηρίαν (ἡ δεξιὰ κοιλία) καὶ ἐνῷ συγχρόνως εἰς τοὺς κενωθέντας κόλπους εἰσέρχεται νέον αἷμα ἀπὸ τὰς φλέβας.

‘Ακολουθεῖ μία στιγμὴ ἡρεμίας καὶ μετ’ αὐτὴν ἐπαναλαμβάνονται αἱ ἴδιαι κινήσεις τῆς καρδίας κ.ο.κ. ‘Απὸ τὰς κοιλίας τὸ αἷμα δὲν δύναται νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τοὺς κόλπους, διότι ἐμποδίζεται ὑπὸ τῶν κολποκοιλιακῶν βαλβίδων. Μία διαστολὴ τῶν κοιλιῶν, μία συστολὴ τούτων καὶ μία παῦλα ἀποτελοῦν ἔνα καρδιακὸν παλμόν.

Εἰς πᾶσαν συστολὴν τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας ἔξακοντάζεται τὸ αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας, αἱ ὅποιαι, λόγω τῆς ἐλαστικότητός των, ἔξογκοῦνται εἰς τὸ σημεῖον εἰς τὸ ὅποιον ἔρχεται τὸ αἷμα. Κατόπιν παύει ἡ πίεσις καὶ τὰ τοιχώματα τῶν ἀρτηριῶν, λόγω τῆς ἐλαστικότητός των, κατέρχονται καὶ πιέζουν τὸ αἷμα, τὸ ὅποιον ὥθεῖται πρὸς τὰ ἐμπρός (ἡ ὀπισθοδρόμησις εἶναι ἀδύνατος λόγω τῶν βαλβίδων). ‘Εκεī πάλιν ἔξογκοῦνται τὰ τοιχώματα τῶν ἀρτηριῶν, τὰ ὅποια ἐν συνεχείᾳ συστέλλονται. Οὕτω διὰ κυμάτων διατηρεῖται συνεχῆς ἡ ροή τοῦ αἵματος. Τὰ κύματα γίνονται αἰσθητὰ εἰς τὰς ἀρτηρίας διὰ τῆς ἀφῆς καὶ λέγονται σφυγμοί. Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ σφυγμοὶ κατὰ λεπτὸν εἶναι ὅσοι καὶ οἱ παλμοὶ (75 περίπου).

‘Η κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων γίνεται μὲ τόσην ταχύτητα, ὥστε τοῦτο νὰ ἐπανέρχεται εἰς τὴν καρδίαν, ἀνὰ 8–9'' ἀπὸ τοὺς πνεύμονας καὶ ἀνὰ 23'' περίπου ἀπὸ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν. Μὲ τὴν ταχύτητα αὐτὴν προφθάνουν οἱ ίστοι τοῦ σώματος νὰ ἀνεφοδιάζωνται ἐπαρκῶς μὲ δύσγόνον καὶ νὰ ἀπαλλάσσωνται

ἀπὸ τὰς ἀχρήστους ούσιας. "Οταν οἱ μύες ἐργάζωνται ἐντατικῶς καὶ ἐπομένως αἱ ἀνάγκαι εἰς δόξυγόνον εἶναι μεγαλύτεραι, ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ ἀναπνοὴ ἐπιταχύνονται (λαχάνιασμα). Ἐὰν μ' ὅλα ταῦτα αἱ ἀχρηστοὶ ούσιαι παραμείνουν εἰς τοὺς μῆνας, προκαλεῖται ὁ κάμπτος αὐτῶν, ὁ ὅποιος παρέρχεται, ὅταν αἱ ούσιαι αὗται τέλος ἀπομακρυνθοῦν.

7. Η ΛΕΜΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πλὴν τοῦ αἵματος, καὶ ἔν ἄλλῳ ὑποκίτρινον ύγρόν, ἡ λέμφη μόνος, κυκλοφορεῖ ἐντὸς ἴδιαιτέρων ἀγγείων, τὰ ὅποια ἐπίσης διακλαδίζονται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Τὰ λέμφη μόνο φόρα ταῦτα ἡ γεῖα βαίνουν παραλλήλως πρὸς τὰς φλέβας, ἡ λέμφης κινεῖται ἐντὸς αὐτῶν βραδέως καὶ κατευθύνεται μόνον πρὸς τὸ κέντρον, δηλ. τὴν καρδίαν.

Ἐκ τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων τοῦ αἵματος ἔξερχεται τὸ πλάσμα, τὸ ὅποιον περιλούει τὰ κύτταρα καὶ προσφέρει εἰς αὐτὰ θρεπτικὰς ούσιας. Μετὰ τὰς καύσεις καὶ τὴν ἀφομοίωσιν, ἕνα μέρος τοῦ πλάσματος καὶ τῶν προϊόντων τῆς καύσεως παραλαμβάνεται ὑπὸ τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων, ἐνῷ τὸ ὑπόλοιπον παραλαμβάνεται ὑπὸ τῶν λεμφοφόρων ἀγγείων καὶ ἀποτελεῖ τὴν λέμφην. Κατὰ τὴν ἐπιστροφήν των τὰ λεμφοφόρα ἀγγεῖα διέρχονται διὰ τῶν λεμφαδένων καὶ λεμφογαγγλίων, ἀπὸ τὰ ὅποια παραλαμβάνουν τὰ λεμφοκύτταρα. Ἐκεῖ γίνεται ἐπίσης κατακράτησις γηρασμένων λεμφοκυττάρων καὶ ξένων σωματίων παραγόντων μολύνσεως.

Τελικῶς τὰ ἀγγεῖα ἐνώνονται εἰς ἔνα μεγαλύτερον ἀγγεῖον, καλούμενον θωρακικὸν πόρον, τὸ ὅποιον χύνεται εἰς τὴν ἀνωκοίλην φλέβα. Ὡστε ἡ λέμφης κινεῖται ἐντὸς τῶν λεμφαγγείων μόνον ἀπὸ τὴν περιφέρειαν πρὸς τὸ κέντρον καὶ διὰ τοῦ θωρακικοῦ πόρου χύνεται εἰς τὸ κυκλοφοροῦν αἷμα.

Οὔτως εἰσάγονται εἰς τὸ αἷμα νέα λεμφοκύτταρα. Προσέτι τὰ λεμφοφόρα ἀγγεῖα παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου τὰ λίπη καὶ, χωρὶς νὰ διέλθουν ἀπὸ τὸ ήπαρ, τὰ φέρουν εἰς τὴν κυκλοφορίαν. Αὕτη ἡ λέμφης τοῦ ἐντέρου εἶναι δύο περίπου λίτρα κατὰ είκοσιτετράωρον.

8. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

‘Ως ειδομεν ἀνωτέρω, τὰ λεμφοκύτταρα παράγονται εἰς τοὺς λεμφαδίους. Τὰ ἄλλα λευκά αίμοσφαίρια, καθώς καὶ τὰ ἐρυθρά, παράγονται κυρίως εἰς τὸν μυελόν των ὀστῶν. Κατὰ τὴν νεαρὰν ἡλικίαν, καθώς καὶ τὴν ἐμβρυϊκήν, ἐρυθρά αίμοσφαίρια παράγονται ἐπίσης εἰς τὸν σπλαγχνόν καὶ τὸ ξηπάρ.

‘Ο σπλήν **ἔχει** διαστάσεις περίπου $12 \times 8 \times 3$ ἑκ. καὶ βάρος 150–300 γραμμαρίων. Εύρισκεται ὅπισθεν τοῦ στομάχου καὶ ἄνωθεν τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ. ‘Ο σπλήν είναι ἐπίσης δεξιαμενή αἷματος, τὸ δόποιον ἀποδίδεται εἰς ὡραν ἀνάγκης.

Τὰ αίμοσφαίρια διαρκῶς φθείρονται. Συχνὰ π.χ. καταστρέφονται λεμφοκύτταρα εἰς τὸν ἀγῶνα των κατὰ τῶν μικροβίων. Τὸ πλασμώδιον τῆς ἐλονοσίας καὶ ἄλλα μικρόβια καταστρέφουν τὰ ἐρυθρά αίμοσφαίρια. ‘Εκτὸς ὅμως τῶν τοιούτων περιπτώσεων, τὰ αίμοσφαίρια καταστρέφονται καὶ φυσιολογικῶς, ὅταν φθάνουν εἰς ὥρισμένην ἡλικίαν. ‘Η ἡλικία αὕτη είναι π.χ. διὰ τὰ ἐρυθρά αίμοσφαίρια 3–8 ἔβδομάδες. ‘Η καταστροφὴ τῶν αίμοσφαιρίων γίνεται κυρίως εἰς τὸν σπλήνα καὶ εἰς τὸ ξηπάρ.

Τὰ φθειρόμενα αίμοσφαίρια ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἄλλα σχηματιζόμενα εἰς τὰ προαναφερθέντα αίμοποιητικὰ ὅργανα, δηλ. κυρίως τὸν μυελὸν τῶν ὀστῶν καὶ τοὺς λεμφικούς ἀδένας.

9. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ αἷμα, ἀποτελούμενον ἀπὸ τὸ πλάσμα καὶ τὰ αίμοσφαίρια (ἐρυθρά καὶ λευκά), διατρέχει δύο κυκλοφορίας. α') Μεγάλη κυκλοφορία: ἀπὸ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν διὰ τῆς ἀρτῆς εἰς τοὺς Ιστούς τοῦ σώματος (τρεῖς δρόμοι!) καὶ ἐπιστροφὴ διὰ τῆς ἀνω καὶ κάτω κοιλης φλεβὸς εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον καὶ β') Μικρὰ κυκλοφορία: ἀπὸ τὴν δεξιάν κοιλίαν διὰ τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ἐπιστροφή, διὰ τῶν τεσσάρων πνευμονικῶν φλεβῶν, εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον.

Ἐντός Ιδιαιτέρων ἀγγείων, τὰ ὅποια κατευθύνονται μόνον πρὸς τὸ κέντρον καὶ ἀπολήγουν εἰς τὰ αίμοφόρα, κυκλοφορεῖ καὶ ἡ λέμφος. Αὗτη περιλούει ἐπίσης καὶ δια τὰ κύτταρα τῶν Ιστῶν.

10. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Παρατήρησε εἰς πηγμένον αἷμα ζώου τὸν πλακοῦντα καὶ τὸν υρρόν.

2) Μέτρησε τοὺς σφυγμούς σου ἐν ἡρεμίᾳ καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἔντονον μυϊκὴν ἔργασίαν.

3) Ὁ σφυγμὸς μετρεῖται διὰ πιέσεως μιᾶς ἀρτηρίας (δχι φλεβός). Διὰ νὰ γίνη αἱσθητός, πρέπει ἡ ἀρτηρία αὗτη νὰ εύρισκεται πλησίον τῆς ἐπιφανείας τοῦ δέρματος. Δοκίμασε τοῦτο εἰς τὸν καρπὸν καὶ εἰς τὸν λαιμόν.

4) Ἡ ὀρθία στάσις τοῦ ἀνθρώπου καθιστᾶ δυσκολωτέραν ἥ εὔκολωτέραν τὴν λειτουργίαν τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀγγείων ἀπὸ τῶν λοιπῶν θηλαστικῶν καὶ διατί;

5) Ἡ κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν φλεβῶν πρὸς τὴν καρδίαν ὑποβοηθεῖται σημαντικῶς καὶ ἀπὸ τὴν πίεσιν, τὴν δόποίαν ἀσκοῦν ἐπ' αὐτῶν οἱ μύες. Π.χ. ἡ βάδισις ὑποβοηθεῖ τὰς φλέβας τῶν κάτω ἄκρων, αἱ δόποιαι πρέπει ν' ἀναβιβάσουν τὸ αἷμα μέχρι τοῦ ὕψους τῆς καρδίας. Ἀντιθέτως, ἡ ὀρθοστασία ἥ ἡ βραδυτάτη βάδισις προκαλοῦν στάσιν τοῦ αἵματος εἰς τὰς φλέβας τῶν κάτω ἄκρων καὶ ἐπιφέρουν κούρασιν.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ


Ο κορμός περιλαμβάνει δύο μεγάλας κοιλότητας, τήν θωρακικήν καὶ τήν κοιλιακήν, ἐντὸς τῶν ὅποιών εύρισκονται τὰ σπλάγχνα (εἰκ. 34, 35).

Η θωρακικὴ κοιλότης περικλείεται ἀπὸ τὰς πλευρὰς καὶ χωρίζεται ἀπὸ τήν κοιλιακήν δι' ἐνὸς μυϊκοῦ πετάλου, τοῦ διαφράγματος. Εἰς τήν κοιλότητα ταύτην περιέχονται οἱ πνεύμονες, ἡ καρδία καὶ ὁ οἰσοφάγος. Εἰς διπλοῦς ὑμήν, ὁ πεζωκῶς, διὰ τοῦ ἐνὸς μὲν πετάλου του ἐπενδύει τὰ θωρακικὰ τοιχώματα, διὰ τοῦ ἄλλου δὲ καλύπτει τήν ἐπιφάνειαν τῶν πνευμόνων. Μεταξὺ τῶν δύο πετάλων τοῦ ὑπεζωκότος ὑπάρχει ἐν ὑγρόν, τὸ ὅποιον ἐμποδίζει τήν τριβὴν τῶν πνευμόνων ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων. Η καρδία δὲν περιβάλλεται ὑπὸ τοῦ ὑπεζωκότος, ἀλλ' ὑπὸ ιδιαιτέρου ὑμένος, τοῦ περικαρδίου.

Η κοιλιακὴ κοιλότης περιλαμβάνεται μεταξὺ τοῦ διαφράγματος, τῆς λεκάνης καὶ τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων. Ἐντὸς αὐτῆς συναντῶνται



Εἰκ. 34. Σχηματική παράστασις τῆς θωρακικῆς καὶ κοιλιακῆς κοιλότητος. 1. Έγκέφαλος. — 2. Παρεγκεφαλίς. — 3. Προμήκης. — 4. Λάρυγξ. — 5. Φάρυγξ. — 6. Πνεύμονες. — 7. Καρδία. — 8. Στέρνον. — 9. Διάφραγμα. — 10. Ήπαρ. — 11. Στόμαχος. — 12. Σπλήν. — 13. Νεφρός. — 14. Τόπος επιπλούν. — 15. Μεσεντέριον. — 16. Τομή τοῦ λεπτοῦ έντερου. — 17. Ούρητήρ. — 18. Τομή τοῦ παχέος έντερου. — 19. Κύστις.



Εικ. 35. Η θωρακική και η κοιλιακή κοιλότης. 1. Πνεύμονες. — 2. Καρδια. — 3. Θυρεοειδής χόνδρος. — 4. Θυρεοειδής άδην. — 5. Τραχεία. — 6. Διάφραγμα. — 7. Στόμαχος. — 8. Σπλήν. — 9. Ήπαρ. — 10. Χοληδόχος κύστις. — 11, 12, 13. Παχύ έντερον. — 14. Σκωληκοειδής άπόφυσις του παχέος έντερου. — 15. Ούροδόχος κύστις. — 16. Λεπτόν έντερον.

ό στόμαχος, τὸ ἡπαρ, τὸ πάγκρεας, ὁ σπλήν, τὸ ἔντερον, οἱ νεφροὶ καὶ τὸ γεννητικὸν σύστημα. Τὰ σπλάγχνα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πάγκρεας, τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ γεννητικὸν σύστημα, περιβόλλονται ἀπὸ ἕνα ὑμένα, καλούμενον περιτόναιον. Τοῦτο δίδει δύο πέταλα, ἐκ τῶν ὅποιών τὸ ἔξωτερικὸν ἐπενδύει τὰ τοιχώματα τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ περιτόναιον σχηματίζει προσέτι τὸ μεσεντέριον, τὸ ὅποιον συγκρατεῖ τὸ ἔντερον. Τέλος τὸ ἐπίπλον καλύπτει τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τῆς ὅλης μάζης τῶν ἔντερων ὡς μία ποδιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΑΙ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ

1. ΑΔΕΝΕΣ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

‘**Αδένες** καλοῦνται ώρισμένα ὅργανα τοῦ σώματος, τὰ ὅποια παρασκευάζουν, μέσα εἰς τὰ κύτταρά των, ώρισμένας ούσίας, τὰς ὅποιας ἀποδίδουν εἰς τὸν ὄργανισμόν. Μέχρι τώρα ἐγνωρίσαμεν τοὺς σιαλογόνους καὶ ἄλλους ἀδένας τοῦ πεπτικοῦ συστήματος (πάγκρεας, ἀδένας τοῦ στομάχου κλπ.). “Ολοὶ αὗτοὶ ἀποδίδουν τὰς ούσιας τὰς ὅποιας παράγουν, δι’ ἐνὸς ἐκφορητικοῦ ἀγωγοῦ, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος. Ἀργότερον θὰ γνωρίσωμεν καὶ ἀδένας, τῶν ὅποιων τὰ ἐκκρίματά ἀποδίδονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δέρματος (ἰδρωτοποιοὶ κλπ.).

‘Υπάρχουν ὅμως καὶ ἀδένες στερούμενοι ἐκφορητικοῦ ἀγωγοῦ, τῶν ὅποιων τὸ ἐκκριμα παραλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ αἵματος. Οὗτοι καλοῦνται ἐν δοκρινεῖς ή ἔσω ἐκκρίσεως ἀδένες, τὰ δὲ ἐκκρίματά των δρόμον αι.

Κάθε ἐνδοκρινής ἀδήνη παράγει, εἰς ἐλαχίστας ποσότητας, ώρισμένας ὄρμόνας, αἱ ὅποιαι είναι ούσιαι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. ‘Εκάστη ὄρμόνη ἔχει τὴν ίδιότητα νὰ ἐνισχύῃ ή νὰ ἔξασθενῃ ώρισμένην λειτουργίαν ή ώρισμένα ὅργανα, ὡστε δῆλαι μαζὶ αἱ ὄρμόναι ρυθμίζουν τὴν λειτουργίαν καὶ ἀνάπτυξιν ὀλοκλήρου τοῦ ὄργανισμοῦ.


‘Εάν ἔνας ἐνδοκρινής ἀδήνη ὑπολειτουργῇ ή ὑπερλειτουργῇ, παρουσιάζονται διάφοροι παθήσεις.

‘Η ἐκκρισις ἐκάστης ὄρμόνης ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰς ὄρμόνας ἄλλων ἀδένων, ὡστε δῆλοι οἱ ἐνδοκρινεῖς ἀδένες εύρισκονται εἰς στενὴν συνεργασίαν καὶ λειτουργικὴν ἀλληλεξάρτησιν. Δι’ αὐτὸν ὅταν πάσχῃ ἔνας ἀδήνη συμπάσχουν καὶ οἱ ἄλλοι.

Μερικοὶ ἀδένες είναι συγχρόνως ἐνδοκρινεῖς καὶ ἔξωκρινεῖς. Τὸ πάγκρεας π.χ. δὲν παράγει μόνον τὸ παγκρεατικὸν ύγρόν, τὸ ὄποιον χύνεται εἰς τὸ ἔντερον, ἀλλὰ προσέτι παράγει καὶ μίαν ὄρμόνην, ή ὅποια χύνεται εἰς τὸ αἷμα. ‘Η ὄρμόνη αὕτη, καλουμένη

ἰνσούλινη, ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ ρυθμίζῃ τὴν κατεργασίαν τοῦ σακχάρου ύπὸ τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἐὰν ἡ ποσότης τῆς ίνσουλίνης εἴναι ἀνεπαρκής (ύπολειτουργία τοῦ παγκρέατος), ὁ ὄργανισμὸς δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ σάκχαρον τῶν τροφῶν. Τοῦτο παραμένει εἰς τὸ αἷμα καὶ προκαλεῖται οὕτω ἡ νόσος διαβήτης.

2 ΑΔΕΝΕΣ ΕΣΩ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ



Εἰκ. 36. Σχηματικὴ παράστασις δεικνύουσα τὴν θέσιν τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων. 1. Ἐπίφυσις.— 2. Ὑπόφυσις.— 3. Θυρεοειδῆς.— 4. Παραθυρεοειδῆς.— 5. Θύρασις.— 6. Ἐπινεφρίδια.— 7. Πάγκρεας.— 8. Ωσθῆκαι. (Χαρακτηρίζουν τὰ θήλεα ἀτομα).— 9. Ἀρρενεῖς γεννητικοὶ ἀδένες. (Χαρακτηρίζουν τὰ ἄρρενα ἀτομα).

Ἐνδοκρινεῖς ἀδένες εἶναι οἱ ἔξης κυρίως (εἰκ. 36):

α') **Ο θυρεοειδῆς ἀδήν.** Οὕτος εὑρίσκεται ὀλίγον κάτωθεν τῆς προσθίας ἐπιφανείας τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου. Ἐκκρίνει ἡμερησίως ἐν ἑκατοστὸν τοῦ γραμμαρίου θυροξίνης. Ἡ ύπερλειτουργία τοῦ ἀδένος τούτου προκαλεῖ τὴν ἐμφάνισιν τῆς λεγομένης νόσου τοῦ B a s e d o w. Ἐξωτερικὰ συμπτώματα χαρακτηριστικὰ τῆς νόσου εἶναι ἡ ἔξωφθαλμία, ἡ βρογχοκήλη καὶ ἡ ταχυκαρδία. Ἡ νόσος αὕτη προκαλεῖ νευρικότητα καὶ ἔξαντλησιν του ἀσθενοῦς. Ἀντιστρόφως ἡ ύπολειτουργία τοῦ θυρεοειδοῦς προκαλεῖ πτῶσιν τῆς θερμοκρασίας, βραδύτητα εἰς τὰς λειτουργίας τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ σταμάτημα τῆς ἀναπτύξεως, τόσον τῆς σωματικῆς ὅσον καὶ τῆς πνευματικῆς. Κρετινισμὸς (εἰκ. 37) εἶναι μία ἀσθένεια, τῆς ὅποιας ἐν τῶν αἰτίων θεωρεῖται ἡ ύπολειτουργία τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος.



Eik. 37. Κακή ἀνάπτυξις λόγω κρετινισμοῦ.

νεαράν ήλικίαν είναι άπαραίτητος διὰ τὴν κανονικήν ἀνάπτυξιν τοῦ σώματος. Κατὰ τὴν ὥριμον, τέλος, ήλικίαν, ὅταν ἡ ἀνάπτυξις ἔχῃ συντελεσθῇ, ὁ θύμος συρρικνοῦται καὶ ἔξαφανίζεται.

ε') **Η ἐπίκρυσις.** Αὕτη εύρισκεται εἰς τὸν ἐγκέφαλον καὶ κατὰ τὴν νεαράν ήλικίαν συνεργάζεται μὲ τὸν θύμον. Μετὰ τὸ δέκατον ἔτος ἐκφυλίζεται βαθμιαίως.

ζ') Εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἐπίσης εύρισκεται ἡ **ὑπόφυσις**, ἡ ὅποια συντελεῖ εἰς τὴν ρύθμισιν τῆς ἀναπτύξεως τοῦ σώματος, τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὑλῆς καὶ τῆς ὥριμάνσεως τῶν γεννητικῶν ἀδένων. Εἶναι ὡς σπουδαιότερος τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων, διότι δι' αὐτοῦ ρυθμίζεται καὶ ἡ κανονικὴ λειτουργία τῶν λοιπῶν ἀδένων. Αἱ παραγόμεναι ὑπ' αὐτῆς ὄρμόναι είναι πολλαῖ.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν ἀδένας ἐν δοκρινεῖς, οἱ ὅποιοι παράγουν ὄρμόνας, τὰς ὅποιας παραλαμβάνει τὸ σίμα, καὶ ἀδένας ἐξωκρινεῖς ἀποδίδουν τὸ ἔκκριμά των εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος ἢ τοῦ δέρματος. Ἡ διαταραχὴ τῆς λειτουργίας τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων προκαλεῖ σαβαρὰς ἀνωμαλίας εἰς τὴν ἀνάπτυξιν καὶ λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ


Εις τὸν ἔξωτερικὸν κέσμον διαρκῶς συμβαίνουν διάφοροι παροδικαὶ μεταβολαί. Π.χ. διάφορα ἀντικείμενα κινοῦνται, ἀλλάσσει φωτισμὸς ἢ ἡ θερμοκρασία, τὸ σῶμα μᾶς ψαύει διάφορα ἀντικείμενα κ.ο.κ. Προσέτι καὶ ἐντὸς τοῦ σώματός μᾶς συμβαίνουν τοιαῦται μεταβολαί, ὡς π.χ. μετακινήσεις τῶν σπλαγχνῶν κ.ἄ.

Ολαι αὐταὶ αἱ μεταβολαὶ ἐπιδροῦν ἐπὶ εἰδικῶν κυττάρων τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ παράγουν τὰ ἐρεθίσματα. Τὰ κύτταρα αὗτά, τὰ δόποια δέχονται τὰ ἐρεθίσματα, καλοῦνται αἱ σθητικὰ κύτταρα καὶ ἀνήκουν εἰς ἐν σύστημα ὄργάνων, τὸ δόποιον καλεῖται νευρικὸν σύστημα.

Εις τὰ ἐρεθίσματα ἀπαντᾷ ὁ ὄργανισμὸς μὲ κινήσεις κυρίως, τὰς ὃποιας ἐκτελεῖ κατὰ βούλησιν ἢ καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς βούλήσεως. Π.χ. ἀν κινήσωμεν πρὸ τῶν βλεφάρων ἐν ἀντικείμενον, προκαλεῖται ἀκούσιον κλείσιμον τῶν βλεφάρων, ἀν ἐγγίσωμεν ἐν καίον σῶμα, αὐτομάτως τότε ἀποσύρεται τὸ χέρι μᾶς κ.ο.κ. Αἱ ἐνέργειαι αὗται καλοῦνται ἀντιδράσεις εἰς τὰ ἐρεθίσματα.

Αἱ ἀντιδράσεις ρυθμίζονται ἀπὸ τὰ κεντρικὰ τμήματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὡς π.χ. εἶναι ὁ ἐγκέφαλος. Εἰς τὰ κεντρικὰ αὗτα τμήματα ἔρχονται τὰ ἐρεθίσματα διὰ τῶν νεύρων.

Τὰ νεῦρα δομοιάζουν πρὸς λεπτὰ λευκὰ νήματα, τὰ δόποια διακλαδίζονται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. "Ἐκαστὸν νεῦρον ἀποτελεῖται ἀπὸ νευρικὰς ίνας, δηλ. μικρὰς πρωτοπλασματικὰς ἀποφυάδας νευρικῶν κυττάρων. 'Ἐκάστη νευρικὴ ἵς περιβάλλεται ἀπὸ λευκὸν περιβλήμα, καλούμενον μυελικὴ θήκη. 'Ἐπίσης ὅλον τὸ νεῦρον περιβάλλεται ἀπὸ ἄλλο περιβλήμα, τὸ νευρείλημα. Διὰ τῶν νεύρων συνδέονται τὰ αισθητικὰ κύτταρα μὲ τὸ κεντρικὸν νευ-



Εἰκ. 38. Σχηματική τομή διὰ τοῦ ἔγκεφάλου.

η. Ἡμισφαίρια τοῦ ἔγκεφάλου.—γ. Τρίτη κοιλία.—δ. Τετάρτη κοιλία.—πα. Παρεγκεφαλίς.—πι. Προμήκης.—μ. Νωτιαῖος μυελός.—α. Ἔγκεφαλικά νεῦρα.

ἔδημιούργησεν ἀνθρωπος τὸν πολιτισμόν, ὁ ὅποιος τόσον τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον ζωϊκὸν βιωσίλειον. Πῶς ὅμως τελοῦνται αἱ νοητικαὶ λειτουργίαι εἰς τὸν ἔγκεφαλον, δὲν εἶναι, σήμερον τούλαχιστον, γνωστόν.

‘Ολόκληρον τὸ νευρικὸν σύστημα τοῦ ἀνθρώπου διακρίνεται εἰς τὰ ἔξης τμῆματα: α’) τὸ ἐγκεφαλικόν μεταβατικόν μεταβατικόν νευρικὸν σύστημα καὶ β’) τὸ φυτικὸν νευρικὸν σύστημα.

2. ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τοῦτο περιλαμβάνει ἐν κεντρικὸν καὶ ἐν περιφερικὸν τμῆμα:

α') **Τὸ κεντρικὸν τμῆμα.** Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελὸν (εἰκ. 38).

‘Ο ἔγκεφαλος περικλείεται ἐντὸς τοῦ κρανίου, ὁ δὲ νωτιαῖος μυελὸς εἶναι συνέχεια τοῦ ἔγκεφάλου καὶ περικλείεται ἐντὸς τοῦ νωτιαῖου σωλῆνος τῆς σπονδυλικῆς στήλης, φθάνων μέχρι τῶν πρώτων ὀσφυϊκῶν σπονδύλων.

Εἰς τὸν ἔγκεφαλον διακρίνομεν τρία τμήματα. Οὕτω τὸ πρόσθιον τμῆμα του εἶναι ὀγκῶδες καὶ χωρίζεται μὲν βαθεῖαν πτυχὴν εἰς

ρικὸν σύστημα καὶ τοῦτο μὲν τοὺς μῆνας, οἱ ὅποιοι πραγματοποιοῦν τὰς ἀντιδράσεις εἰς τὰ ἔρεθίσματα.


Ωστε διὰ τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὁ ἀνθρωπος λαμβάνει γνῶσιν τῶν μεταβολῶν, αἱ ὅποιαι γίνονται εἰς τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον ἥ καὶ εἰς τὸ σῶμά του, καὶ ἀντιδρᾶ εἰς αὐτάς.

’Ιδιαιτέραν σπουδαιότητα ἔχει τὸ πρόσθιον τμῆμα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὁ ἐγκέφαλος, διότι εἰς αὐτὸν γίνονται ὅλαι ἐκεῖναι αἱ κατεργασίαι, αἱ ἀπαραίτητοι διὰ τὸν συνειρμόν τῶν λαμβανομένων παραστάσεων, διὰ τὰς λειτουργίας τῆς νοήσεως καὶ τὴν ἐκδήλωσιν τῶν ψυχικῶν φαινομένων. Διὰ τῆς νοήσεως ἔδημιούργησεν ἀνθρωπος τὸν πολιτισμόν, ὁ ὅποιος τόσον τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον ζωϊκὸν βιωσίλειον. Πῶς ὅμως τελοῦνται αἱ νοητικαὶ λειτουργίαι εἰς τὸν ἔγκεφαλον, δὲν εἶναι, σήμερον τούλαχιστον, γνωστόν.

Καὶ τὸν νωτιαῖον μυελὸν διακρίνεται ἀπὸ τὸν ἐγκεφαλικόν μεταβατικόν νευρικὸν σύστημα καὶ τὸ φυτικὸν νευρικὸν σύστημα.

δύο μέρη, καλούμενα ἡ μισφαίρη
και τοῦ ἐγκεφάλου. Ἀμέσως μετά
τὰ ἡμισφαίρια συναντῶμεν τὴν
παρεγκεφαλίδα καὶ μετ' αὐτὴν τὸν προμήκη μυελόν.
Οὗτος φθάνει μέχρι τοῦ ἴνιακοῦ
τρήματος, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἀρχεται
ὁ νωτιαῖος μυελός. Εἰς τὸ ἑσωτε-
ρικὸν τοῦ ἐγκεφάλου ὑπάρχει ἔνας
αὐλός, δὲ ὅποιος χωρίζεται εἰς διά-
φορά τμήματα, καλούμενα κοι-
λίαι. Ὁ αὐλός οὗτος συνεχί-
ζεται καὶ εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν.
Ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου πα-
ρουσιάζει πλῆθος ἐλικοειδῶν αὐ-
λῶν, διὰ τῶν ὅποιων ἐπαυ-
ξάνεται ἡ ἐπιφάνειά του. Τὸ ἑσω-
τερικὸν στρῶμα τοῦ ἐγκεφάλου ἀ-
ποτελεῖται ἀπὸ νευρικὰ κύτταρα
καὶ βραχείας ἀποφυάδας αὐτῶν,
λόγῳ δὲ τοῦ χρώματός του κα-
λεῖται φαιὰ οὔσια. Τὸ ἑσωτε-
ρικὸν ἀντιθέτως ἀποτελεῖται ἀπὸ
τὰς μακρὰς ἀποφυάδας, τὰ δένδρα,
τὰ ὅποια περιβάλλονται ἀπὸ λευ-
κὸν νευρείλημα. Διὰ τοῦτο τὸ
στρῶμα τοῦτο καλεῖται λευκή
οὔσια.

Εἰς τὸν νωτιαῖον μυελὸν ἀντι-
θέτως ἡ φαιὰ ούσια εἶναι εἰς τὸ
κέντρον, περὶ τὸν κεντρικὸν αὐλόν, ἡ δὲ λευκὴ περιβάλλει τὴν φαιάν.
Διὰ νὰ μὴ προσκρούουν ἐπὶ τῶν ὀστῶν, ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νω-
τιαῖος μυελός, περιβάλλονται ἀπὸ τρεῖς ὑμένας, οἱ ὅποιοι καλοῦνται
μήνιγγες. Ἡ ἑσωτερικὴ εἶναι ἡ σκληρὰ μήνιγξ, ἡ με-
σαία εἶναι ἡ ἀραχνοειδής, ἡ ὅποια σχηματίζει δύο πέταλα,



Εἰκ. 39. Ἀπομονωμένον περιφ. νευρικὸν
σύστημα καὶ νωτιαῖος μυελός.

καὶ ἡ ἐσωτερικὴ εἶναι ἡ χοριοειδής, ἡ ὅποια φέρει αἱμοφόρα ἀγγεῖα.

Ἐντὸς τῶν κοιλιῶν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ κεντρικοῦ αὐλοῦ καὶ μεταξὺ τῆς ἀραχνοειδοῦς καὶ τῆς χοριοειδοῦς μήνιγγος ὑπάρχει τὸ ἐγκεφαλονωτιαῖον ὑγρόν.

β') Τὸ περιφερικὸν νευρικὸν σύστημα (ἐγκεφαλικὰ καὶ νωτιαῖα νεῦρα) (εἰκ. 39). Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ διακλαδίζονται εἰς τὸ σῶμα. Τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον, καλοῦνται ἐγκεφαλικά καὶ εἶναι δώδεκα ζεύγη, ἑκατένα δὲ τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καλοῦνται νωτιαῖα καὶ εἶναι τριάκοντα καὶ ἑννεάζεύγη. Ἐκ τῶν νεύρων τούτων ὡρισμένα μεταφέρουν τὰ ἐρεθίσματα ἐκ τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων εἰς τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ καλοῦνται αἴσθητικά, ἄλλα δὲ προκαλοῦν τὴν ἀντίδρασιν τῶν μυῶν καὶ καλοῦνται κινητικά. Τέλος, ὑπάρχουν καὶ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔκτελοῦν καὶ τὰς δύο αὐτὰς λειτουργίας, καλούμενα διὰ τοῦτο μικτά. Τὰ νωτιαῖα νεῦρα εἶναι ὅλα μικτά.

γ') **Ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐρεθίσματος.** Τὸ ἐρεθίσμα παράγεται εἰς τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τὰ ὅποια εύρισκονται εἰς τὰ αἰσθητήρια ὅργανα ἡ εἶναι διεσκορπισμένα εἰς τὸ δέρμα. Τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἀπολήγουν εἰς τὰ αἰσθητικὰ αὔτα κύτταρα, παραλαμβάνουν τὸ ἐρεθίσμα καὶ τὸ μεταφέρουν εἰς τὸ κεντρικὸν σύστημα. Καὶ τὰ μὲν ἐγκεφαλικὰ νεῦρα μεταφέρουν τὸ ἐρεθίσμα ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν ἐγκέφαλον, τὰ δὲ νωτιαῖα μεταφέρουν αὐτὸ πρῶτον εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν, ἔξ αὐτοῦ δὲ κατόπιν τὸ ἐρεθίσμα διαβιβάζεται πάλιν εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Τοῦτο ὅμως δὲν συμβαίνει πάντοτε. Ὑπάρχουν ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια, καταφθάνοντα εἰς τὸν νωτιαῖον μυελὸν ἡ ἔνα κέντρον τοῦ ἐγκεφάλου, διαβιβάζονται ἀμέσως ἔξ αὐτῶν διὰ τῶν κινητηρίων νεύρων εἰς περιφερικὸν ἐκτελεστικὸν ὅργανον (μῆσ, ἀδένας). Αἱ προκαλούμεναι οὕτω κινήσεις καλοῦνται ἀντανακλαστικῶς πλέον (κολύμβησις, βάδισις, παίξιμον ὁργάνων κλπ.).

Εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὅπου καταφθάνουν τὰ διάφορα ἐρεθίσματα,


δημιουργοῦνται αἱ ἐντυπώσεις ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου, συνδυάζονται αὗται καὶ γενικῶς τελεῖται ἡ λειτουργία τῆς σκέψεως. Τέλος, γεννᾶται ἡ ἀντίδρασις εἰς τὰ ἐρεθίσματα, ἡ ὅποια ρυθμίζεται ὑπὸ τῶν κινητικῶν καὶ μικτῶν νεύρων. Ταῦτα ἀπολήγουν εἰς τοὺς γραμμωτοὺς μῆς, τῶν ὅποιων τοιουτοτρόπως αἱ κινήσεις διέπονται ὑπὸ τῆς βουλήσεως.

Εἰς τὸν φλοιὸν τοῦ ἔγκεφάλου εύρισκονται τὰ κέντρα τῶν ἐνσυνειδήτων καὶ ψυχικῶν φαινομένων (παραστάσεις, μνήμη, σκέψις, βούλησις). Εἰς τὴν παρεγκεφαλίδα εύρισκονται τὰ κέντρα τῆς ἰσορροπίας καὶ τῆς κινητικότητος. Εἰς τὸν προμήκη μυελὸν τέλος εύρισκονται τὰ κέντρα τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῆς κυκλοφορίας καὶ τὰ ἀντανακλαστικὰ κέντρα τοῦ βιτχός, τοῦ πταρμοῦ, τῆς συγκλίσεως τῶν βλεφάρων, τῆς ἐκκρίσεως τῶν δακρύων, τῆς καταπόσεως, τοῦ θηλασμοῦ (εἰς τὰ βρέφη), τῆς ἐκκρίσεως τοῦ στάλου, τοῦ ἐμέτου καὶ ἄλλα.

3. ΤΟ ΦΥΤΙΚΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

α') **Τὸ συμπαθητικόν.** Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ νεῦρα, τὰ ὅποια ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν ἔγκεφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ ἀπολήγουν εἰς τοὺς λείους μῆς τῶν σπλάγχνων, τῶν ἀγγείων, τῶν ἀδένων, τῆς καρδίας κτλ. Πρίν ὅμως φθάσουν εἰς αὐτούς, διακόπτονται εἰς τὰ συμπαθητικά γάγγλια, ἀπὸ τὰ ὅποια ἀρχονται νέα νεῦρα, διὰ τῶν ὅποιων αἱ διεγέρσεις φέρονται εἰς τὰ ὄργανα τῆς φυτικῆς ζωῆς. Ἐκατέρωθεν τῆς σπονδυλικῆς στήλης ὑπάρχουν τὰ 22–23 παρασπονδυλικά γάγγλια, τὰ ὅποια συνδέονται καταλλήλως μεταξύ των διὰ νεύρων καὶ ἀποτελοῦν τὰ συμπαθητικὰ στέλέχη (εἰκ. 40). Ὁλίγα ἐν τούτοις συμπαθητικὰ γάγγλια δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὰς σειρὰς αὐτὰς καὶ εύρισκονται μακρότερον εἰς ὥρισμένα μέρη τῆς κοιλίας.

*Ωστε τὸ συμπαθητικὸν συνδέεται μὲ τὸ



Εἰκ. 40. Σχῆμα τῶν συμπαθητικῶν γάγγλιων.—ν.ν. Νωτιαῖον νεύρον.—γ.γ. Συμπαθητικά γάγγλια.—Σ. Σπονδυλικὴ στήλη.

κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα στενῶς.

β') **Τὸ παρασυμπαθητικόν.** Τὰ γάγγλια τοῦ παρασυμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος εύρισκονται ἐγγὺς τῶν ὄργανων τῶν νευρουμένων ὑπ' αὐτῶν καὶ διὰ τοῦτο αἱ ἀντιδράσεις τούτων εἰναι ἐντοπισμέναι, ἐνῷ τῶν συμπαθητικῶν εἰναι ἔκτεταμέναι.

Τὰ νεῦρα τοῦ παρασυμπαθητικοῦ συστήματος ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ ἀπὸ τὸ κάτω ἄκρον τοῦ νωτιαίου μυελοῦ. Μὲ τὰ νεῦρα αὐτὰ τοῦ παρασυμπαθητικοῦ συστήματος συνεργάζεται καὶ ἐν ἐγκεφαλικὸν νεῦρον, τὸ πνευμονικόν τρικόν, τὸ ὅποιον διακλαδίζεται εἰς τὸν θώρακα, τὸν στόμαχον κλπ. Δι' αὐτὸν καλεῖται τοῦτο καὶ παρασυμπαθητικόν νεῦρον. Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἐγκεφαλικὰ νεῦρα περιλαμβάνουν καὶ παρασυμπαθητικάς ίνας.

Τὰ συμπαθητικὰ καὶ παρασυμπαθητικὰ νεῦρα ρυθμίζουν τὰς κινήσεις τῶν σπλάγχνων καὶ ἀνταγωνίζονται πρὸς ἄλληλα. Π.χ. ἐνῷ τὰ συμπαθητικὰ νεῦρα ἐπιταχύνουν τὰς κινήσεις τῆς καρδίας καὶ ἐπιβραδύνουν τὰς κινήσεις τοῦ ἐντέρου, ἀντιθέτως τὰ παρασυμπαθητικὰ ἐπιβραδύνουν τὰς κινήσεις τῆς καρδίας καὶ ἐπιταχύνουν τὰς τοῦ ἐντέρου. Διὰ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τούτου ἔξασφαλίζεται ἡ ἀναγκαία ἰσορροπία διὰ τὴν κανονικήν λειτουργίαν τῶν σπλάγχνων.

Τὰ συμπαθητικὰ καὶ παρασυμπαθητικὰ νεῦρα λαμβάνουν τὰς διεγέρσεις ἀπὸ τὰ γάγγλια καὶ διὰ τοῦτο δροῦν ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν αἱ κινήσεις τῶν λείων μυῶν καὶ τῆς καρδίας γίνονται ἀσυναισθήτως. Ἐν τούτοις ὅμως, ἐπειδὴ τὰ νεῦρα αὐτὰ συνδέονται, ὡς εἶδομεν, καὶ μὲ τὸν ἐγκέφαλον, συμβαίνει ὥστε νὰ συνδυάζωνται, νὰ συντονίζωνται, ὡς λέγουν, αἱ κινήσεις τῶν λείων μυῶν καὶ σπλάγχνων, καθὼς καὶ τῶν μυῶν τῆς καρδίας, μὲ τὰς κινήσεις τῶν γραμμωτῶν μυῶν. Οὕτω λ.χ., ὅταν διὰ τῆς βουλήσεως θέτῃ τις εἰς ἐντατικὴν ἐργασίαν τοὺς γραμμωτοὺς μῆς τοῦ σώματος (δρόμος, ἐργασία κλπ.), τότε καὶ ἡ καρδία καὶ τὰ ἀναπνευστικὰ ὄργανα ἐργάζονται ἐντατικώτερον, ὅν καὶ νευροῦνται ἀπὸ τὸ συμπαθητικὸν καὶ παρασυμπαθητικὸν νευρικὸν σύστημα.

4. Ο ΥΠΝΟΣ

'Ο ὑπνος εἰναι μία κατάστασις, εἰς τὴν ὅποιαν διέρχεται ὁ ἀνθρωπος τὸ ἐν τρίτον καὶ πλέον τῆς ζωῆς του. Κατὰ μέσον ὅρου, τὸ βρέφος κοιμᾶται κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ζωῆς του ἐπὶ 18 ὥρας

τὸ εἰκοσιτετράωρον, τὸ παιδίον κατὰ τὸ 2ον—5ον ἔτος κοιμᾶται ἐπὶ 14 ὥρας, κατὰ τὸ 5ον—6ον ἔτος ἐπὶ 12 ὥρας καὶ κατὰ τὸ 7ον—14ον ἔτος ἐπὶ 10 ὥρας. Κατὰ τὴν ἐφηβικήν καὶ ὡριμον ἡλικίαν συνήθως διατίθενται διὰ τὸν ὑπνον 8 ὥραι. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ ὥραι τοῦ ὑπνου ἐλαττοῦνται περισσότερον.

Κατὰ τὸν ὑπνον οἱ μύες, οἱ ἔξαρτώμενοι ἐκ τῆς βουλήσεως γενικῶς, δὲν ἐργάζονται, καθ' ὃσον δὲν διαβιβάζονται εἰς αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου ἐρεθίσματα. Οἱ μύες τῶν σπλάγχνων ὅμως, καθὼς καὶ μερικοὶ ἄλλοι (ὡς οἱ κλείοντες τὰ βλέφαρα), συνεχίζουν τὴν ἐργασίαν των. Εἰς τινα ζῶα μάλιστα κατὰ τὸν ὑπνον ἐργάζονται πλεῖστοι μύες, ως οἱ τῶν πιοδῶν εἰς τὰ ζῶα τὰ κοιμώμενα δρθια (ἴππος κλπ.) ἢ κρατούμενα ἐπὶ κλάδων (πτηνὰ κλπ.).

Οἱ ἐρεθισμοὶ ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι κατὰ τὸν ὑπνον περιωρισμένοι, διότι τὰ βλέφαρα εἶναι κλειστά, ὁ τόπος συνήθως ἡσυχος καὶ ἡ προσοχὴ δὲν διεγείρεται πλέον ἀπὸ τὸ περιβάλλον. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια παρ' ὅλα αὐτὰ τυχὸν παράγονται, δὲν δημιουργοῦν ἐντυπώσεις εἰς τὸν ἐγκέφαλον, παρὰ μόνον ἂν εἶναι, ἀναλόγως καὶ τῆς βαθύτητος τοῦ ὑπνου, ἀρκετὰ ἔντονα. Ἀκριβῶς τοῦτο χαρακτηρίζει τὸν ὑπνον, ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ἐν μέρει ἀδρανεῖ καὶ δὲν ἐπεξεργάζεται τὰ ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια τυχὸν καταφθάνουν εἰς αὐτόν. Οὕτως ὁ ὑπνος ἐπιφέρει τὴν ἀνάπτασιν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ γενικῶς τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Οἱ ἐπαρκής ὑπνος εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὸν ὀργανισμόν, ἢ δὲ στέρησις αὐτοῦ εἶναι βλαβερά. Πειραματικῶς παρετηρήθη ἐπὶ πτνίας, ὅτι ἡ στέρησις τοῦ ὑπνου προκαλεῖ, μετά τινας ἡμέρας ἀυζώνων, τὸν θάνατον.

5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ νευρικὸν σύστημα περιλαμβάνει: α') τὸ ἐγκέφαλον ωτιαῖον σύστημα (κεντρικὸν τμῆμα ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νωτιαῖος μυελός, περιφερικὸν τὰ 12 ζεύγη τῶν ἐγκεφαλικῶν νεύρων καὶ τὰ 31 τῶν νωτιάων): β') τὸ φυτικὸν νευρικὸν σύστημα (τὸ συμπαθητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἰνας, αἱ ὄποιαι ἐκφύονται ἀπὸ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ, πρὶν διακλαδισθοῦν εἰς τὰ σπλάγχνα, ἐκατέρωθεν τῆς σπονδυλικῆς στήλης, διέρχονται ἀπὸ τὰ συμπαθητικὰ γάγγλια, τὸ δὲ παρασυμπαθητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἰνας ἐκφυομένας ἐπίστης ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ πνευμονογαστρικοῦ κυρίως ἐγκεφαλικοῦ νεύρου: τὸ συμπαθητικὸν καὶ τὸ παρασυμπαθητικὸν ἀνταγωνίζονται πρὸς ἀλληλα.

Διὰ τὴν ἀνάπτασιν τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ὑπνος, μία κατάστασις, κατὰ τὴν ὃποιαν οὕτος μερικῶς ἀδρανεῖ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

ΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

1 ΑΙΣΘΗΣΙΣ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ


Εις τὸ κεφάλαιον περὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἔμάθουμεν, ὅτι τὰ ἐρεθίσματα προσλαμβάνονται ἀπὸ εἰδικὰ αἱ σθητικὰ κύτταρα, εἰς τὰ ὅποια ἀπολήγουν τὰ αἰσθητικὰ νεῦρα. Ἐκεῖθεν μεταφέρονται εἰς τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ οὕτως ἀντιλαμβάνομεθα τὰς μεταβολάς, αἱ ὅποιαι τὰ προκαλοῦν. Ἡ λειτουργία αὐτῆς, διὰ τῆς ὅποιας προσλαμβάνομεν τὰ διάφορα ἐρεθίσματα καὶ ἀντιλαμβανόμεθα τὰ φυινόμενα, τὰ ὅποια τὰ προκαλοῦν, καλεῖται αἱ στηθοτικά. Τὰ ὅργανα τοῦ σώματος, τὰ ὅποια περιλαμβάνουν τὰ αἰσθητικά κύτταρα καὶ είναι καταλλήλως διαμορφωμένα διὰ τὴν ύποδοχὴν τῶν ἐρεθισμάτων, καλοῦνται αἱ στηθοτικά ὅργανα.

Εις τὸ δέρμα είναι διεσκορπισμένα διάφορα τοιοῦτα ἀπλὰ ὄργανα (αἱ σθητικὰ σωμάτια), χρησιμεύοντα διὰ τὴν αἰσθησιν τῆς θερμότητος, τοῦ ψύχους, τοῦ πόνου καὶ τῆς πιέσεως (ἀφή). "Ἐκαστον τοιοῦτον αἰσθητικὸν σωμάτιον ἀποτελεῖται ἀπὸ μερικὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τὰ ὅποια περιβάλλουν τὴν ἀπόληξιν ἐνὸς αἰσθητικοῦ νεύρου (βλ. εἰκ. 51, 12).



Εἰκ. 41. Σχῆμα μιᾶς θηλῆς φερούστης γευστικούς κάλυκας.

1. Γεωτικὸς κάλυξ. — 2. Νευρικὴ ἰσ.




Eik. 42. Γεωτικὸς καλυψός
ἐν μεγεθύνσει.

2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΣ


Τὴν γεῦσιν μιᾶς ούσίας ἀντιλαμβανόμεθα, ἃν ἡ ούσία αὐτὴ ἔλθῃ, ἐν διαλύσει, εἰς ἐπαφὴν καὶ ἐρεθίσῃ τὰ αἰσθητικὰ σωμάτια τῆς γεύσεως. Τὰ σωμάτια αὐτὰ καλοῦνται γευστικοί κάλυκες καὶ εὑρίσκονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γλώσσης, ἴδιως εἰς τὸ πρόσθιον καὶ ὄπισθιον μέρος αὐτῆς (εἰκ. 41 καὶ 42).

3. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ

Τὴν δόσμὴν μιᾶς ούσίας ἀντιλαμβανόμεθα, ἐὰν λεπτότατα μόρια αὐτῆς παρασυρθοῦν ὑπὸ τοῦ εἰσπνεομένου ἀέρος εἰς τὴν ρινικὴν κοι-



Εἰκ. 43. Τομὴ ἐγκαρσία διὰ τοῦ προσώπου. 1, 2, Άι δύο ἀνώτεραι ρινικαὶ κόγχαι. — 8. Κάτω ρινικὴ κόγχη. — 6. Ρινικὸν διάφραγμα. — 5. 'Οφθαλμικὴ κόγχη. — 7. "Υνις.



Εἰκ. 44. 'Οσφρητικὰ κύτταρα.

1. Ἰνίδια τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων. — 2. 'Επιθηλιακὰ κύτταρα τῶν βλεννογόνων. — 3. Νευρικαὶ Ἰνες.

λότητα καὶ ἐρεθίσουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα τῆς ὀσφρήσεως. Τὰ κύτταρα αὐτὰ εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ βλεννογόνου τῆς ρινικῆς κοιλότητος καὶ ἴδιως εἰς τὴν ἀνωτέραν κόγχην (εἰκ. 43 καὶ 44)

4. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ

Διὰ τῆς ὀράσεως ἀντιλαμβανόμεθα τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας, τὰς ὅποιάς ἐκπέμπουν τὰ διάφορα ἀντικείμενα, τὴν ἀπόστασιν, τὴν μορφὴν καὶ τὸ σχῆμα τῶν ἀντικειμένων τούτων.

Τὰ δύο αἰσθητικὰ νεῦρα, τὰ ὅποια χρησιμέύουν διὰ τὴν ὄρασιν (ἀπτικὰ νεῦρα), ἀπολήγουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν αἰσθητηρίων

δργάνων τῆς όράσεως, δηλ. τῶν δύο ὁ φ θ α λ μῶν. Τὸ ἀριστερὸν ὄπτικὸν νεῦρον ἀπολήγει εἰς τὸν δεξιὸν ὄφθαλμὸν καὶ τὸ δεξιὸν εἰς τὸν ἀριστερὸν ὄφθαλμόν.


Κατασκευὴ τῶν ὄφθαλμῶν. "Ἐκαστος ὄφθαλμὸς ὁμοιάζει μὲν σφαιρικὸν θάλαμον, ὃ ὅποιος ἔχει ἀδιαφανῆ τοιχώματα καὶ καλεῖται βολβός. Εἰς τὸ πρόσθιον μόνον μέρος τὰ τοιχώματα τοῦ βολβοῦ γίνονται διαφανῆ καὶ ἀφήνουν τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας νὰ εἰσέλθουν.

Τὸ τοιχώμα τοῦ βολβοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία τοιχώματα, τὰ ὅποια καλοῦνται χιτῶνες (εἰκ. 45). Ὁ ἔξωτερικὸς χιτὼν καλεῖται σκληρωτικός. Εἶναι ἀδιαφανής καὶ λευκός καὶ εὔκολα δυναμέθα νὰ τὸν παρατηρήσωμεν (ἀστράδι τοῦ ματιοῦ). Εἰς τὸ ἐμπρόσθιον μόνον μέρος τοῦ βολβοῦ, ἐν κυκλικὸν τμῆμα τοῦ σκληρωτικοῦ χιτῶνος εἶναι διαφανές. Τὸ τμῆμα τοῦτο καλεῖται κερατοειδῆς χιτώνας καὶ εἶναι κυρτότερον ἀπὸ τὸν σκληρωτικόν.

Κάτω ἀπὸ τὸν σκληρωτικὸν εἶναι ὁ χοριοειδῆς χιτὼν. Οὗτος εἶναι μέλας καὶ ἀγγειοβριθής, ἀφήνει δὲ ἀκάλυπτον τὸ μέρος κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.

Τέλος, μέσα ἀπὸ τὸν χοριοειδῆ εύρισκεται ὁ ἀμφιβλητὸς χιτὼν, εἰς τὸν ὅποιον εἶναι διακλαδισμένον τὸ ὄπτικὸν νεῦρον. Καὶ αὐτὸς διακόπτεται κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.

Κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ καὶ χωρὶς νὰ ἀκουμβᾶ ἐπ' αὐτοῦ εύρισκεται ἐν διάφραγμα μυῶδες, ἡ Ἱρίς. Τὸ διάφραγμα τοῦτο ἀφήνει εἰς τὸ κέντρον μίαν ὄπήν, ἡ ὅποια καλεῖται κόρη τοῦ ὄφθαλμοῦ. Ἀμέσως ὅπισθεν τῆς Ἱρίδος ὑπάρχει ὁ διαφανῆς ἀμφίκυρτος φακός. Οὗτος συγκρατεῖται καὶ συσφίγγεται ἀπὸ μίαν μυϊκὴν ζώνην, ἡ ὅποια τὸν περιβάλλει.



Εἰκ. 45. Σχῆμα τοῦ ὄφθαλμοῦ.

1. Σκληρωτικὸς χιτὼν.— 2. Χοριοειδῆς.— 3. Ἀμφιβληστροειδῆς.— 4. Ὁχρὰ κηλίς.— 5. Ὁπτικὸν νεῦρον.— 6. Κερατοειδῆς χιτώνας. 7. Ἱρίς.— 8. Φακός.— 9. Χῶρος κατεχόμενος ἀπὸ τὸ ὑδατῶδες ύγρον.— 10. Χῶρος κατεχόμενος ἀπὸ τὸ ὑαλῶδες σῶμα.

‘Ο χῶρος μεταξύ τοῦ κερατοειδοῦς καὶ τῆς ἕριδος εἶναι πλήρης ἐνὸς διαφανοῦς ρευστοῦ, τὸ ὅποιον καλεῖται ύδατος γρόντας. Οἱ ὅπισθεν τῆς ἕριδος καὶ τοῦ φακοῦ χῶρος τοῦ βολβοῦ εἶναι πλήρης ἀπὸ ἐν ἄλλῳ διαφανὲς ρευστόν, τὸ ὅποιον καλεῖται ύδατος σῶμα μ.α.

Τὸ ὅπτικὸν νεῦρον εἰσέρχεται εἰς τὸν βολβὸν ἀπέναντι τῆς κόρης καὶ διακλαδίζεται ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς. Πλησίον τῆς εἰσόδου τοῦ ὅπτικοῦ νεύρου εύρισκεται: τὸ πλέον εὐάσθητον σημεῖον τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς. Τὸ σημεῖον τοῦτο καλεῖται ὡς χράκη λίστα.

Τὸ σημεῖον τῆς εἰσόδου τοῦ νεύρου δὲν ἔχει εὔασθησίαν καὶ λέγεται τυφλὴ καὶ λίστα.


Οἱ βολβὸι κινεῖται δι’ ἑξ μυῶν, οἱ δόποιοι ἐφαρμόζουν ἐπ’ αὐτοῦ.

Σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου. Αἱ φωτειναὶ ἀκτίνες, αἱ δόποιαι ἀναχωροῦν ἀπὸ τὰ διάφορα ἀντικείμενα, διέρχονται τὸν κερατοειδῆ χιτῶνα, τὸ ὑδατῶδες ύγρον, τὸν φακὸν καὶ τὸ ύαλῶδες σῶμα (εἰκ. 46).

Ως εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Φυσικῆς, ἐὰν ἀκτίνες, αἱ δόποιαι προέρχονται ἀπὸ ἐν σημεῖον, συναντήσουν ἐνα φακὸν ἀμφίκυρτον, θὰ συγκεντρωθοῦν ὅλαι εἰς ἐν ἄλλῳ σημεῖον, ὅπισθεν τοῦ φακοῦ. Τοῦτο γίνεται δι’ ὅλα τὰ σημεῖα ἐνὸς ἀντικειμένου καὶ οὕτω σχηματίζεται ὅπισθεν τοῦ φακοῦ τὸ εἰδώλον τοῦ ἀντικειμένου τούτου.

Τὸ εἰδώλον τοῦτο, ἀναλόγως τῆς ἀποστάσεως αὐτοῦ, εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον.

Τὸ ἴδιον γίνεται καὶ μὲ τὸν φακὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ. Οὕτω σχηματίζεται εἰς τὸ βάθος τοῦ βολβοῦ ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τὸ εἰδώλον τῶν ἔξωτερικῶν ἀντικειμένων (εἰκ. 46). Τὸ εἰδώλον αὐτὸν εἶναι



Εἰκ. 46. Πορεία τῶν ἀκτίνων καὶ σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου ἀνεστραμμένου.

μικρὸν καὶ ἀνεστραμμένον καὶ σχηματίζεται συγχρόνως καὶ εἰς τοὺς δύο ὁφθαλμούς.

Τὰ φωτεινὰ εἶδωλα, τὰ ὅποια οὕτω σχηματίζονται, ἐρεθίζουν τὰ ὄπτικὰ νεῦρα καὶ τὰ ἐρεθίσματα αὐτὰ μεταβιβάζονται εἰς τὸν ἔγκεφαλον. Ἐφ' ὅσον οἱ δύο ὁφθαλμοὶ εύρισκονται εἰς τὴν κανονικήν τῶν θέσιν, τὰ δύο εἶδωλα γίνονται ἀντιληπτὰ ὡς ἐν. Ἐὰν δῆμως πιέσωμεν τὸν ἑνα βολβόν, ὥστε οὗτος νὰ μετατοπισθῇ ὀλίγον, τότε τὰ ἀντικείμενα μᾶς φαίνονται διπλᾶ.


Προσαρμογὴ τοῦ ὁφθαλμοῦ. Ἡ μυϊκὴ ζώνη, ἡ ὅποια περιβάλλει τὸν φακόν, δύναται νὰ χαλαρωθῇ, ὅπότε ὁ φακὸς γίνεται κυρτότερος καὶ ἐπομένως σχηματίζει τὸ εἶδωλον πλησιέστερον. Τοῦτο γίνεται, ὅταν παρατηροῦμεν ἀντικείμενα εύρισκόμενα πολὺ πλησίον, τῶν ὅποιών τὸ εἶδωλον ἄλλως, θὰ ἐσχηματίζετο πολὺ μακρὰν τοῦ φακοῦ. Οὔτως ἐπιτυγχάνεται νὰ σχηματίζεται τὸ εἶδωλον πάντοτε ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ νὰ ἐρεθίζεται τὸ ὄπτικὸν νεῦρον. Ἡ ἄλλαγή της κυρτότητος τοῦ φακοῦ καλεῖται προσαρμογὴ τοῦ ὁφθαλμοῦ. Ὁ ὁφθαλμὸς δὲν δύναται νὰ προσαρμοσθῇ διὰ νὰ ἴδῃ ἀντικείμενα εύρισκόμενα πλησιέστερον τῶν 25–30 ἑκ.

Προστασία τοῦ ὁφθαλμοῦ. Ὁ ὁφθαλμὸς είναι εύπαθες ὅργανον καὶ ἔχει ἀνάγκην προστασίας. Πρὸς τοῦτο οἱ βολβοὶ εύρισκονται καὶ κοιλώματα, σχηματιζόμενα ὑπὸ τῶν ὀστῶν τοῦ προσώπου, τὰς ὁφθαλμικὰς κόγχας. Ἐπάνω ἀπὸ αὐτὰς τὸ μετωπικὸν ὀστοῦν παρουσιάζει δύο ἐπάρματα, τὰ ὑπερόφρυνα τόξα. Εἰς τὴν ἴδιαν θέσιν φύονται ἐπὶ τοῦ δέρματος τὰ «φρύδια». Ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἀπιφάνειαν τοῦ βολβοῦ κινοῦνται τὰ βλέφαρα. Ταῦτα ἐσωτερικῶς καλύπτονται ἀπὸ ἑνα βλεννογόνον, τὸν ἐπιπεφυκότα, μὲ ἀφθόνους ἀδένας, καὶ εἰς τὰ χείλη των φέρουν τὰς βλεφαρίδας.

Ἡ ἐλευθέρα ἐπιφάνεια τοῦ βολβοῦ διατηρεῖται λεία καὶ καθαρὰ μὲ τὸ δάκρυ, τὸ ὅποιον ἐκκρίνεται ἀπὸ ἑνα δακρυγόνον ἀδένα, εύρισκόμενον ὅπισθεν τοῦ ἀνω βλεφάρου. Τὸ περισσεῦον δάκρυ ἔρχεται εἰς τὴν ρινικήν κοιλότητα διὰ τῶν δακρυϊκῶν ἀγωγῶν, εἰς τὴν ρινικήν κοιλότητα διὰ τῶν δακρυϊκῶν ἀγωγῶν, (δαοὶ ὅποιοι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν ἄκρον τῶν βλεφάρων (δακρυϊκοὶ πόροι).

Ἀνωμαλίαι τῆς ὄράσεως. Αἱ κυριώτεραι ἀνωμαλίαι τῆς ὄράσεως είναι αἱ ἔξτις:

α) Ἀλλοιασμός. Άλλοιθωροι καλοῦνται οἱ ὁφθαλμοὶ



Εἰκ. 47. Ἀνωμαλία τῆς
όρασεως.

β. Κανονικός ὄφθαλμός
πρὸς σύγκρισιν.

έλάττωμα τοῦ φακοῦ, ἀλλ' εἰς τὸ ὅτι ὁ βολβὸς εἶναι βραχύτερος τοῦ κανονικοῦ (ύπερμετρωπία) (εἰκ. 47, γ).

γ) Μνωπία. ‘Η ἀνωμαλία αὕτη ὑπάρχει, ὅταν τὸ εἰδωλον τῶν μακρὰν ἀντικειμένων σχηματίζεται πρὸ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, ὅπότε πάλιν τὸ ὁπτικὸν νεῦρον δὲν ἐρεθίζεται. ’Οφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὁ φακὸς δὲν δύναται νὰ προσαρμοσθῇ ἢ εἰς τὸ ὅτι ὁ βιολβός εἶναι μεγαλύτερος τοῦ κανονικοῦ. ’Ο μύωψ, διὰ νὰ ἔδῃ τὰ μακρὰν ἀντικείμενα, βοηθεῖται μὲν ὄμματούάλια μὲν ἀμφικοίλους φακούς. Οἱ φακοὶ οὗτοι, ἀντιθέτως πρὸς τοὺς ἀμφικύρτους, φέρουν τὸ εἰδωλον, ὥστε νὰ σχηματίζεται τοῦτο ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς.

δ) Ἀστιγματισμός. Κατ' αὐτὸν τὸ εἴδωλον σημείου δὲν εἶναι σημεῖον, ἀλλ' ἔχει σχῆμα ἐπίμηκες. Ὁφείλεται εἰς ἀνωμαλίαν κυρίως τοῦ κερατοειδοῦς χιτῶνος.

ένος ἀτόμου, ὅταν αἱ κόραι δὲν βλέπουν καὶ αἱ δύο ἀκριβῶς παραλλήλως. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὥρισμένοι μύες ἔξ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι συγκρατοῦν καὶ κινοῦν τὸν βολβόν, εἰναι ἀσθενέστεροι τῶν ἄλλων. Οἱ ἀλλοίθωροι θὰ ἔπρεπε νὰ βλέπουν διπλᾶ τὰ ἀντικείμενα, ἀλλὰ ἔχουν συνηθίσει νὰ προσέχουν τὸ ἔν μόνον εἰδωλον.

β') Πρεσβυτέροις πάνω στην αρχή της εκκλησίας, μεταξύ των οποίων οι πρεσβύτεροι που διαδέχονται την προεδρία της εκκλησίας. Οι πρεσβύτεροι είναι μέρος της εκκλησίας και συγχρόνως από την προστασία της εκκλησίας στην προστασία των πιστών.

5. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ


Αἰσθησις τῆς ἀκοῆς εἶναι ἔκείνη, διὰ τῆς ὁποίας ἀντιλαμβανόμεθα τοὺς ἥχους. Ὡς εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Φυσικῆς, οἱ ἥχοι παράγονται, ὅταν ἐν σῶμα τεθῇ εἰς παλμικὴν κίνησιν, καὶ μεταδίδονται διὰ κυμάνσεων τοῦ ἀέρος.

Αἰσθησιν τοῦ χώρου καλοῦμεν ἔκείνην, διὰ τῆς ὁποίας συναίσθανόμεθα τὴν στάσιν τοῦ σώματος καὶ τηροῦμεν κατὰ τὴν κίνησιν τὴν ἴσορροπίαν.

Τὰ αἰσθητήρια ὅργανα τῆς ἀκοῆς καὶ τοῦ χώρου εἶναι τὰ ὡτα, τὰ ὁποῖα εύρισκονται ἐντὸς κοιλοτήτων τῶν κροταφικῶν δόστῶν. Εἰς ἕκαστον οὓς διακρίνομεν τρία τμήματα, τὸ ἔξω, τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσω οὓς (εἰκ. 48).


Ἐξω οὖς. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ πτερύγιον καὶ τὸν ἀκουστικὸν πόρον. Τὸ πτερύγιον εἶναι χόνδρινον καὶ φέρει διαφόρους πτυχάς. Ὁ ἀκουστικὸς πόρος εἶναι ἔνας σωλήνης ἐντὸς τοῦ κροταφικοῦ δόστου, δ ὁποῖος ἀρχίζει ἀπὸ τὸ πτερύγιον καὶ εἰς τὸ βάθος φράσσεται ἀπὸ μίαν μεμβράνην καλουμένην τύμπανον (εἰκ. 48).

Μέσον οὖς. Τοῦτο εἶναι συνέχεια τῆς κοιλότητος τοῦ κροταφικοῦ δόστου καὶ συγκοινωνεῖ μὲ τὴν στοματικὴν κοιλότητα δι' ἐνὸς στενοῦ σωλῆνος, τῆς εὔσταχιανῆς σάλπιγγος. Ἀπὸ τὸν ἀκουστικὸν πόρον τὸ μέσον οὖς χωρίζεται διὰ τῆς μεμβράνης τοῦ τυμπάνου. Ἡ κοιλότης τοῦ μέσου ὠτὸς συγκοινωνεῖ μὲ τὴν κοιλότητα τοῦ ἔσω ὠτὸς διὰ δύο μικρῶν δόπῶν τῶν δόστῶν, τῆς στρογγύλης καὶ τῆς φοειδοῦς θυρίδος, οἵ ὁποῖαι καλύπτονται ὑπὸ μεμβρανῶν. Ἀπὸ τοῦ τυμπάνου μέχρι τῆς φοειδοῦς θυρίδος ἐκτείνεται μία σειρὰ ἀπὸ τρία δόστάρια ἐφαπτόμενα πρὸς ἄλληλα, τὴν σφυραν, τὸν ἄκμονα καὶ τὸν ἀναβολέα (εἰκ. 49).



Εἰκ. 48. Σχῆμα τοῦ ὅργανου τῆς ἀκοῆς.

- 1. Πτερύγιον τοῦ ὠτός.
- 2. Τύμπανον.
- 3. "Ἐξω ἀκουστικὸς πόρος.
- 4. Κοιλότης τοῦ μέσου ὠτός.
- 5. Εὐσταχιανή σάλπιγξ.
- 6. "Ἐσω οὖς.



Εἰκ. 50. Τομή διὰ τοῦ κοχλίου.
1. Δάπεδον τοῦ ύμενώδους κοχλίου.—2. Νεύρον.—6. Αισθητικά κύτταρα.

έκαστος παρουσιάζει μίαν διεύρυνσιν, τὴν λήκυθον ἡ λάγηνον.

γ') Τὸν κοχλίαν. Οὗτος εἶναι τυφλὸς σωλήν τριγωνικῆς τομῆς, περιειλιγμένος εἰς $2\frac{1}{2}$ σπείρας ἐντὸς ἀντιστοίχου σωλήνος τοῦ κροταφικοῦ ὅστοῦ, δὲ ὁποῖος καλεῖται ὀστεῖνος κοχλίας. Ὁ κοχλίας συγκοινωνεῖ μὲν τὸ σφαιρικὸν κυστίδιον.


Τὰ ἀνωτέρω ύμενώδη ὄργανα, τὰ ὁποῖα, ὡς εἴδομεν, συγκοινωνοῦν μεταξύ των, πληροῦνται ὑπὸ ύγροῦ, καλουμένου ἐν δολύμφῃ. Τὰ αἰσθητικά κύτταρα τῆς ἀκοῆς εύρισκονται εἰς τὸ δάπεδον τοῦ ύμενώδους κοχλίου (εἰκ. 50).

“Οταν τὰ ἡχητικὰ κύματα φθάσουν εἰς τὴν μεμβράνην τοῦ τυμπάνου, μεταδίδουν εἰς αὐτὴν παλμικὴν κίνησιν. Ἡ κίνησις αὕτη διὰ τῶν ὀσταρίων τοῦ μέσου ὡτός μεταδίδεται εἰς τὴν μεμβράνην τῆς ὠσειδοῦς θυρίδος. Ἐξ αὐτῆς, περαστέρω, διὰ τῆς ἔξωλύμφης, μεταδίδεται εἰς

“Εσω οὖς. Εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ ἔσω ὡτός (εἰκ. 49), ἡ ὁποία εἶναι πλήρης ἐνὸς ύγροῦ, τῆς ἐξωλύμφης, παραστηροῦμεν:

α') Δύο κυστίδια συγκοινωνοῦνται καὶ καλούμενα ἐλλειπτικὸν καὶ σφαιρικὸν κυστίδιον.

β') Τρεῖς ἡμικυκλίους σωλήνας. Οὗτοι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ ἐλλειπτικὸν κυστίδιον καὶ ἐπιστρέφουν πάλι, εἰς αὐτό, εύρισκονται δὲ ἐπὶ τριῶν καθέτων ἐπιπέδων. Εἰς τὴν ἀρχήν του



Εἰκ. 49. Τομὴ διὰ τοῦ ὡτός.
1. Τύμπανον.—2. Σφύρα.—3. Ἀκμῶν.—4. Ἀναβολεὺς ἀκουμβᾶν ἐπὶ τῆς μεμβράνης τῆς ὠσειδοῦς θυρίδος.—5. Στρογγύλη θυρίς.—6. Ἐλλειπτικὸν κυστίδιον.—7. Λήκυθος.—8. Ἡμικύκλιοι σωλήνες.—9. Σφαιρικὸν κυστίδιον.—10. Κοχλίας.—11. Εύσταχιανή σάλπιγξ.—12. Ἔξω ἀκουστικὸς πόρος.

τὰ τοιχώματα τῶν κυστίδων καὶ εἰς τὴν ἐνδολύμφην. Αἱ κυμάνσεις, τέλος, τῆς ἐνδολύμφης ἐρεθίζουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τῶν δόποιών τὸ ἐρεθίσμα παραλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ἀκουστικοῦ νεύρου.

Ἡ κίνησις τῆς ἔξωλύμφης ἐντὸς τοῦ κλειστοῦ ὁστείνου χώρου θὰ ἥτο ἀδύνατος ἐὰν δὲν ὑπῆρχεν ἡ στρογγύλη θυρίς, τῆς δόποιας ἡ μεμβράνη ὑποχωρεῖ πρὸς τὰ ἔξω ὅταν ἡ ἔξωλύμφη πιεζεται ὑπὸ τοῦ ἀναβολέως εἰς τὴν ώσειδη θυρίδα.

Ἡ αἰσθησις τοῦ χώρου ἔξασφαλίζεται μὲ τοὺς τρεῖς ἡμικυκλίους σωλήνας. Ἀναλόγως τῆς στάσεως τοῦ σώματος ἡ ἐνδολύμφη φθάνει ἐντὸς αὐτῶν εἰς διάφορον σημεῖον καὶ τοῦτο προκαλεῖ ἀνάλογα ἐρεθίσματα, τὰ δόποια μεταβιβάζονται εἰς τὸν ἐγκέφαλον δι' ἐνὸς νεύρου (τοῦ αἰθουσαίου).

6. ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

“Ολοι γνωρίζομεν τὸ ἴδιάζον τοῦτο δυσάρεστον αἰσθημα. Συνήθως προκαλεῖται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος μαζὶ μὲ ἰσχυρὰ ἐρεθίσματα θερμότητος, πιέσεως κλπ. Ἐν τούτοις τὸ αἰσθημα τοῦ πόνου προκαλεῖται ὅχι εἰς τὰ γνωστά μας αἰσθητικὰ σωμάτια, ἀλλὰ εἰς ἄλλα σημεῖα τοῦ δέρματος. Εἰς τὰ σημεῖα ταῦτα ἀπολήγουν Ἱνες τῶν αἰσθητικῶν νεύρων, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν εἰδικὰ αἰσθητικὰ κύτταρα. Δέχονται δηλαδή, ὅτι δὲ πόνος προκαλεῖται ἀπὸ τὸν ἐρεθίσμὸν ἐλευθέρων ἀπολήγεων τῶν αἰσθητικῶν νεύρων. Πόνος προκαλεῖται ὅχι μόνον εἰς τὸ δέρμα, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐσωτερικὰ ὅργανα (στόμαχος, μύες κλπ.). Χαρακτηριστικὸν διὰ τὸν πόνον, ἴδιως τὸν προκαλούμενον εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ σώματος, εἶναι, ὅτι δὲν δυνάμεθα πάντοτε νὰ καθορίσωμεν τὸ μέρος, ἐκ τοῦ δόποιον προέρχεται. Συχνὰ νομίζομεν, ὅτι δὲ πόνος προέρχεται ἀπὸ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος, τὰ δόποια εὐρίσκονται μακράν, εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἀντιστοίχων νεύρων. Οὕτω συμβαίνει π.χ. ἀτομα, τῶν δόποιών ἀπεκόπη ἐν ἄκρον, νὰ αἰσθάνωνται μετὰ τὴν ἔγχειρησιν πόνον καὶ νὰ νομίζουν, ὅτι οὗτος προέρχεται ἀπὸ τὸ μέρος, ὅπου εὐρίσκετο τὸ ἀποκοπὲν ἄκρον.

‘Ο πόνος εἶναι χρησιμωτάτη αἰσθησις, διότι εἰδοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον περὶ βλαβερῶν ἐπιδράσεων καὶ παθήσεων. Ἐκτὸς τούτου δὲ ἄνθρωπος, φοβούμενος τὸν πόνον, προφυλάσσεται ἀπὸ τοιαύτας βλαβερὰς ἐπιδράσεις.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Κάθε αίσθησις πραγματοποιείται διὰ τοῦ ἐρεθισμοῦ τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων. Ταῦτα εὑρίσκονται διεσκορπισμένα ἢ συγκεντρωμένα εἰς τὰ αἰσθητήρια ὅργανα. Περιεγράψαμεν τὰ αἰσθητικά σωμάτια τοῦ δέρματος, τούς γευστικούς κάλυκας, τὰ αἰσθητικὰ τῆς ὀσφρήσεως κύτταρα, τούς ὄφθαλμούς, τὰ δῶτα. Ὁ πόνος τέλος προκαλεῖται ἀπὸ ἐρεθισμὸν ἐλευθέρων ἀπολήξεων τῶν αἰσθητικῶν νευρικῶν ἴνῶν.

8. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Τὰ διάφορα αἰσθητικὰ σωμάτια εἰναι ἀνίσως διαμοιρασμένα εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο ὡρισμένα μέρη εἰναι περισσότερον εὐαίσθητα ἀπὸ ἄλλα διὰ τὸ αὐτὸν ἐρεθισμα. Π.χ. διὰ τὴν ἀφὴν εἰναι ιδιαιτέρως εὐαίσθητα τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων. (Πῶς δοκιμάζεις τὴν ὑφὴν τοῦ χαρτιοῦ, τοῦ ὑφάσματος κλπ.). Παρατήρησε, ὅτι μερικαὶ γυναῖκες συνηθίζουν νὰ δοκιμάζουν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὕδατος μὲ τὸν ἀγκῶνα ἢ τοῦ σιδήρου, κατὰ τὸ σιδέρωμα, πλησιάζουσαι αὐτὸν εἰς τὰς παρειάς.

2) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην (καθαρὰ χέρια!) τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γλώσσης. Εἰς δὲν τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν θὰ ἰδῃς πολλὰς μικρὰς θηλάσ, αἱ ὅποιαι χρησιμεύουν διὰ τὴν αἰσθησιν τῆς θερμότητος, τῆς πιέσεως κλπ. καὶ προσδίδουν χνοῶδη ὅψιν εἰς τὴν γλῶσσαν. Εἴς τὸ δόπισθιον τμῆμα ὑπάρχουν αἱ θηλαὶ μὲ τοὺς γευστικούς κάλυκας, αἱ ὅποιαι εἰναι μεγαλύτεραι καὶ σχηματίζουν ἔνα Λ (γευστικὸν λάμβδα). Πλὴν αὐτῶν καὶ εἰς ἄλλα τμήματα τῆς γλώσσης ὑπάρχουν θηλαὶ μὲ γευστικούς κάλυκας.

3) Δοκίμασε μὲ διαφόρους ούσιας εἰς ποια σημεῖα ἢ γλῶσσα εἰναι περισσότερον εὐαίσθητος εἰς τὰ διάφορα ἐρεθίσματα.

4) Σχεδίασε ἀπὸ πλησίον ἔνα κύβον, ὅπως ἀκριβῶς τὸν βλέπεις μὲ τὸ ἔνα μάτι, κατόπιν μὲ τὸ ἄλλο, καὶ τέλος καὶ μὲ τὰ δύο. Σύγκρινε τὰ σχέδια.

5) Παρατήρησε (μὲ καθαρὰ χέρια!) εἰς τὸν καθρέπτην τοὺς δακρυϊκούς πόρους. "Οταν κλαίῃ κανεὶς πολύ, πρόσεξε, ὅτι κάθε λίγο «ρουφᾶ τὴ μύτη του». Διατί;

6) Ἀν ἐρεθισθῇ ὁ ὄφθαλμος ὅχι μὲ φῶς, ἄλλα μὲ ἄλλο ἐρεθίσμα (πίεσιν π.χ.), προκαλεῖται πάλιν φωτεινὸν αἴσθημα. Δι' αὐ-

τὸ λέγουν ὅτι ἀπὸ ἔνα κτύπημα «ἄστραφον τὰ μάτια μου». Τὸ ἀνάλογον συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἄλλα αἰσθητήρια.

7) Πρόσεξε ὅτι τὸ βράδυ (λυκόφως) ὅὲν διακρίνει κανεὶς χρώματα, ἀλλὰ μόνον λευκὸν καὶ μαῦρο.

8) Γνωρίζεις διατὶ «τρίβομε τὰ μάτια μας» τὸ πρωΐ; Διὰ νὰ πιέσωμεν τοὺς δακρυϊκούς ἀδένας, οἱ ὅποιοι ἀδρανοῦν κατὰ τὸν ὕπνον, ὥστε μὲ τὸ δάκρυ νὰ ὑγράνουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ βολβοῦ.

9) *Οπισθεν τοῦ βολβοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ ὑπάρχει λίπος, τὸ ὄποιον συμπληρώνει τὸν χῶρον τῆς ὀφθαλμικῆς κόγχης. Ὁταν ἀδυνατίσῃ κανεὶς, τὸ λίπος αὐτὸ ἔξαντλεῖται καὶ τότε τὰ μάτια «μπαίνουν μέσα στὶς κόγχες τους».

10) Κάποτε θὰ ἔτυχε νὰ πάρουσιασθῇ εἰς τὸ μάτι σου «κριθαράκι». Τοῦτο σχηματίζεται, ὅταν οἱ ἀδένες τοῦ ἐπιπεφυκότος ἀποφραχθοῦν.

11) Ο βλεννογόνος τῆς ρινὸς διατηρεῖ πάντοτε μίαν ὑγρασίαν, χωρὶς τὴν ὄποιαν δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ὄσφρησις. Διὰ νὰ προκληθῇ ἡ αἰσθησις μιᾶς ὄσμης, πρέπει τὰ λεπτότατα τεμάχια τῆς ούσιας, τὰ ὄποια ἔφθασαν εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα, νὰ διαλυθοῦν.




ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΟ ΔΕΡΜΑ

1. ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΙΣΤΟΣ. ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

Τὸ δέρμα, τὸ ὅποιον καλύπτει τὸ σῶμα ἔξωτερικῶς, προστατεύει τοὺς λοιποὺς ιστοὺς ἀπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίδρασιν τοῦ περιβάλλοντος (ψῦχος κλπ.). ‘Υπὸ τὸ μικροσκόπιον, εἰς μίαν κάθετον τομὴν τοῦ δέρματος διακρίνονται αἱ ἔγης στοιβάδες (εἰκ. 51):

α') **‘Η ἐπιδερμίς**, ἀποτελουμένη ἀπὸ πολλὰ στρώματα κυττάρων. Ἐκ τούτων τὰ ἔξωτερικὰ ἔχουν ύποστη κερατινοποίησιν, δηλ. ἀπεξηράνθησαν, καὶ τὸ πρωτόπλασμά των ἀντικτεστάθη διὰ κερατίνης. ‘Ωστε ἡ ἐπιδερμίς περιλαμβάνει δύο μικροτέρας στοιβάδας: 1) τὴν κερατίνην στοιβάδα, ἡ ὅπεις ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα κερατινοποιημένα καὶ νεκρά, καὶ 2) τὴν κατωτέραν μαλπιγιανήν στοιβάδαν, ἡ ὅποια περιλαμβάνει ζῶντα καὶ ἀνανεούμενα διαρκῶς κύτταρα.



Εἰκ. 51. Σχηματικὴ τομὴ διὰ τοῦ δέρματος. 1. Κερατίνη στοιβάς. — 2. Μαλπιγιανή στοιβάς. — 3. Χόριον. — 4, 5. Ἀδρωτοποιός ἀδήν. — 6. Λιπώδης ιστός. — 7. Ἀρτηρία. — 8. Φλέψ. — 9 Τομὴ τριχός. — 10. Συμγυματογόνος ἀδήν. — 11. Μυϊκὴ ἵς τῆς τριχός. — 12. Ἀπτικὸν σωμάτιον.

‘Η κερατίνη στοιβάς συνεχῶς ἀποπίπτει κατὰ μικρὰ λέπια, ἀντικαθίσταται δὲ ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς μαλπιγιανῆς, τὰ ὅποια βαθμηδόν καὶ αὐτὰ κερατινοποιοῦνται.

β') **Τὸ χόριον**. Τοῦτο εύρισκεται κάτωθεν τῆς ἐπιδερμίδος καὶ είσδιει ἐντὸς αὐτῆς ὑπὸ μορφὴν θηλῶν. Εἰς κάθε θηλὴν ἀπολήγουν λεπτὰ αίμοφόρα ἀγγεία. Τὸ χόριον περιλαμβάνει μεταξὺ τῶν κυττάρων του ἐλαστικὰ ἴνιδια.

γ') 'Ο ύποδόριος ίστός. Οὗτος εύρισκεται κάτωθεν του χορίου και ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν στρῶμα ἀπὸ συνδετικὸν ίστόν, ὃ ὅποιος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ και λίπος. Κάτωθεν του στρώματος τούτου συναντῶνται τὰ μεμβρανώδη περιβλήματα τῶν μυῶν. Ταῦτα εἶναι ἡ περιτονία, ἡ ὅποια καλύπτει ὅλην τὴν μυϊκὴν μᾶζαν, και τὸ περιμύτιον ἔκαστου μυός.

2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ

Αἱ τρίχες ἔχουν τὴν ρίζαν τῶν εἰς τὸ χόριον καί, διερχόμεναι τὴν ἐπιδερμίδα, φθάνουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν του σώματος. Εἰς τὴν ρίζαν ἔκαστης τριχὸς ἀπολήγει εἰς λεῖος μῆς, ὃ ὅποιος κινεῖ αὐτήν. Αἱ τρίχες σχηματίζονται ἀπὸ τὸ δέρμα διὰ κερατινοποιήσεως και δι' αὐτό, εἰς μίαν κάθετον τομὴν τριχός, διακρίνονται ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον στρώματα ἀντίστοιχα πρὸς τὰς στοιβάδας τοῦ δέρματος.

Εἰς τὸ δέρμα συναντῶμεν και τοὺς ἰδρῳποιοὺς και τοὺς σματογόνους ἀδένας. Οἱ πρῶτοι εἶναι συνεσπειρωμένοι και ἀπολήγουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Οἱ δεύτεροι γενικῶς ἀπολήγουν εἰς τὰς ρίζας τῶν τριχῶν και ἀποδίδουν τὸ λιπαρὸν σμῆγμα, τὸ ὅποιον διατηρεῖ τὴν ἐλαστικότητα τοῦ δέρματος και τῶν τριχῶν. Ἀλλοι ἀδένες τοῦ δέρματος εἶναι οἱ κυψελιδοποιοὶ τοῦ ὥτος και οἱ γαλακτικοὶ ἀδένες τῶν θηλαστικῶν.

Οἱ ὄνυχες εἶναι πλάκες κεράτινοι, προερχόμεναι ἀπὸ τὴν ἐπιδερμίδα και καλύπτουσαι τὸ ἄκρον τῆς ἀνω ἐπιφανείας τῶν δακτύλων. Εἰς ἔκαστον ὄνυχα διακρίνομεν: 1) τὴν κορυφὴν, ἡ ὅποια εἶναι ἐλευθέρα· 2) τὸ σῶμα, τὸ ὅποιον εἶναι προσκολλημένον εἰς τὸ χόριον και δι' αὐτὸν φαίνεται ροδόχρουν, και 3) τὴν ρίζαν, ἡ ὅποια εἶναι λευκὴ και ἀπὸ τὴν ὅποια αύξανεται ὁ ὄνυξ.

Τὸ δέρμα περιλαμβάνει ἀκόμη διάφορα αἰσθητικὰ σωμάτια διὰ τὴν ἀφὴν και τὴν θερμότητα.

Τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος και τῶν τριχῶν, καθὼς και τῆς ἵριδος τοῦ ὀφθαλμοῦ, ὀφείλεται εἰς μίαν χρωστικήν, ἡ ὅποια ὑπάρχει ἐντὸς ἡ και μεταξὺ τῶν κυττάρων τῆς ἐπιδερμίδος. Ἡ ἀπόχρωσις τοῦ δέρματος, ιδίως ὅταν τοῦτο εἶναι λεπτὸν και ἐπομένως μᾶλλον διαφανές, ἔξαρταται ἀκόμη και ἀπὸ τὰ αίμοφόρα ἀγγεῖα και τὸ ὑποδό-

ριον λίπος. "Οταν ἡ ἀνωτέρω χρωστικὴ εύρισκεται εἰς τὰς τρίχας ἄφθονος αὗται παρουσιάζουν χρῶμα μαῦρον. "Οταν εύρισκεται εἰς μικροτέραν ποσότητα, καστανὸν καὶ κατόπιν ξανθόν, καὶ ὅταν τέλος είναι ἐλαχίστη, αἱ τρίχες ἔχουν χρῶμα πυρρόν. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς λευκαίνονται, λόγῳ καταστροφῆς τῆς χρωστικῆς.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.

Τὸ δέρμα περιλαμβάνει: α') τὴν ἐπιδερμίδα (κερατίνη καὶ μαλπιγιανὴ στοιβάς); β') τὸ χόριον καὶ γ') τὸν ὑποδόριον ιστόν. Ἐκ τοῦ δέρματος ἐκφύονται διάφορα ἔξαρτήματα (τρίχες καὶ ὄνυχες). Ἐπίστης περιλαμβάνει τὸ δέρμα ὁδένας (σμηγματογόνους, ιδρωτοποιούς, γαλακτικούς, κυψελιδοποιούς) καὶ αἰσθητικά σωμάτια (ἀφή, θερμοκρασία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΥΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ

(Παραδείγματα αίμορραγίας και διατηρήσεως τῆς θερμοκρασίας).

Διὰ νὰ μελετήσωμεν τὸν ἀνθρώπινον ὄργανισμόν, ἔξητάσαμεν ξεχωριστὰ εἰς προηγούμενα κεφάλαια κάθε λειτουργίαν του καὶ κάθε σύστημα ὄργάνων του. Εἰς τὴν ζωὴν ὅμως τοῦ ὄργανισμοῦ τὰ διάφορα συστήματα συνεργάζονται μεταξύ των καὶ κάθε λειτουργία ἔξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὰς ὑπολοίπους. Π.χ. διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς πέψεως ἀπαιτεῖται ἡ συνεργασία: α') τοῦ νευρικοῦ συστήματος (αὐτονόμου καὶ συμπαθητικοῦ), β') τοῦ μυϊκοῦ συστήματος (λείων καὶ γραμμωτῶν μυῶν), γ') διαφόρων αἰσθητικῶν σωματίων (γεῦσις, πεῖνα κλπ.) καὶ δ') τῶν διαφόρων ἀδένων τοῦ πεπτικοῦ συστήματος κ.ο.κ. 'Ομοίως, ἡ ὅλη θρέψις ἔξασφαλίζεται πάλιν διὰ τῆς συνεργασίας διαφόρων συστημάτων τοῦ ὄργανισμοῦ.

"Ἄσ παρακολουθήσωμεν μίαν περίπτωσιν συνεργασίας διαφόρων συστημάτων πρὸς ἀντιμετώπισιν ἐνὸς τυχαίου γεγονότος, π.χ. μιᾶς αίμορραγίας. Λόγῳ τῆς αίμορραγίας, ὁ ὅγκος τοῦ αἵματος καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν αἵμοσφαιρίων μειοῦνται. Θ' ἀνέμενε κανεὶς ἐκ τούτου, ὅτι ἡ πίεσις τοῦ αἵματος θὰ καταπέσῃ καὶ ὅτι τὰ ἐρυθρὰ αἵμοσφαιρία δὲν θὰ ἐπαρκοῦν πλέον, διὰ νὰ δεσμεύουν ἀρκετὸν δξυγόνον. Τὰ βλαβερὰ ὅμως αὐτὰ ἀποτελέσματα τῆς αίμορραγίας ἀποτρέπονται διὰ τῆς συνεργασίας διαφόρων συστημάτων. Τὸ νευρικὸν σύστημα συστέλλει τὰ ἀγγεῖα καὶ ἐπομένως ἡ πίεσις τοῦ αἵματος, παρὰ τὴν ἐλάττωσιν τοῦ ὅγκου, διατηρεῖται σταθερά. Μετὰ τὴν ἐπείγουσαν αὐτὴν τακτοποίησιν, ὁ ὄργανισμὸς φροντίζει, ὥστε νὰ ἐπανέλθῃ ὁ ὅγκος καὶ ἡ σύστασις τοῦ αἵματος εἰς τὸ κανονικόν. Πρὸς τοῦτο λέμφος εἰσδύει εἰς τὰ ἀγγεῖα ἀπὸ τοὺς ιστούς, ἀποθηκευμένον αἷμα

εἰσέρχεται ἀπὸ τὸν σπλῆνα καὶ τὸ ἡπαρ εἰς τὰ ἀγγεῖα καὶ ὁ ἀσθενής, αἰσθανόμενος μεγάλην δίψαν, πίνει πολὺ ύδωρ. Ὁ μυελὸς τῶν δστῶν, ἔξ ἄλλου, παράγει μεγάλας ποσότητας ἐρυθρῶν αἵμοσφαιρίων πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν ἀπολεοθέντων διὰ τῆς αἵμορραγίας.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα, συνέβη μία μεταβολὴ (ἀπώλεια ἐνὸς ὅγκου αἵματος), ἡ ὅποια θὰ ἡδύνατο νὰ διαταράξῃ τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀργανισμοῦ. Διότι, ἐάν ἡ πίεσις τῶν ἀγγείων κατέπιπτε πολύ, θὰ διεκόπτετο ἡ κίνησις τοῦ αἵματος. Ἐπίσης, ἂν ὁ ἀριθμὸς τῶν αἵμοσφαιρίων παρέμενε μικρός, δὲν θὰ ἐπήρκει διὰ νὰ δεσμεύσῃ τὴν ἀναγκαίαν ποσότητα ὀξυγόνου. Ὁ ὀργανισμὸς ἐν τούτοις κατέβαλεν ὡρισμένας προσπαθείας καὶ κατώρθωσε νὰ συνεχίσῃ τὴν λειτουργίαν του.

Ἡ τοιαύτη προσπάθεια, τὴν ὅποιαν καταβάλλει ὁ ὀργανισμὸς διὰ νὰ ἔξασφαλίσῃ τὴν λειτουργίαν του, παρὰ τὰς τυχόν συμβαινούσας μεταβολάς, αἱ ὅποιαι δύνανται νὰ διαταράξουν αὐτήν, καλεῖται προσαρμοστικὴ λειτουργία. Μεταβολαὶ ὡς αἱ ἀνωτέρω δύνανται νὰ συμβοῦν ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ (π.χ. ἐλάτωσις τοῦ αἵματος) ἢ εἰς τὸ περιβάλλον (π.χ. ἀλλαγὴ κλίματος).

Αναφέρομεν ἀκόμη ἐν παράδειγμα, εἰς τὸ ὅποιον διαφαίνεται ἡ προσαρμοστικὴ ίκανότης τοῦ ὀργανισμοῦ.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀέρος μεταβάλλεται. Ἐπίσης ἐντὸς τοῦ σώματος διὰ τῶν καύσεων παράγεται διάφορον ἑκάστοτε ποσὸν θερμότητος. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ θερμοκρασία τοῦ ὑγιοῦς ἀνθρώπου διατηρεῖται σταθερά. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται ὡς ἔξης:

“Οταν ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, ἐκ τῶν καύσεων καὶ ἐκ τοῦ περιβάλλοντος, τείνῃ νὰ αὔξησῃ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματος, παρατηροῦνται ὡρισμένα φαινόμενα ἀποτρέποντα τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο. Αἱ ἀναπνευστικαὶ κινήσεις ἐπιταχύνονται, ἥτοι γίνεται μεγαλυτέρα ἔξατμισις ὕδατος καὶ συχνοτέρα ἐπαφὴ τοῦ αἵματος πρὸς τὸν ἀέρα εἰς τοὺς πνεύμονας. Τὰ ἀγγεῖα τοῦ δέρματος διαστέλλονται καὶ ἐπομένως περισσότερον αἷμα κυκλοφορεῖ εἰς αὐτὰ καὶ ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἀέρα. (Λέγουν τότε «κοκκίνισα ἀπὸ τὴν ζέστη»). “Ολα αὐτὰ προκαλοῦν μίαν ἀπώλειαν θερμότητος ἀπὸ τὸ αἷμα. Τέλος καὶ ὁ ἴδρως, ὁ ὅποιος ἐκκρίνεται, ἔξατμιζόμενος, ἀφαιρεῖ θερμότητα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος.

Ἐὰν ἀντιθέτως ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος πέσῃ σημαντικῶς παρατηροῦνται φαινόμενα ἐμποδίζοντα τὴν πτῶσιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος. Τὰ ἀγγεῖα τοῦ δέρματος συστέλλονται, ὥστε δλιγώτερον αἷμα νὰ ἔρχεται εἰς ἐπαφήν μὲ τὸν ψυχρὸν ἀέρα. (Λέγουν τότε «κιτρίνισα ἀπὸ τὸ κρύο»). Ἀντιθέτως, εἰς τὰ ἑσωτερικὰ ὅργανα κυκλοφορεῖ περισσότερον αἷμα καὶ οὕτω ἀφ' ἐνὸς μὲν διαφυλάσσει τὴν θερμότητά του, ἀφ' ἐτέρου δὲ αὔξανει τὰς καύσεις. Ἐπίσης διάφοροι μύες τίθενται εἰς κίνησιν μὲ σκοπὸν πάλιν τὴν αὔξησιν τῶν καύσεων. Τοιαῦται εἰναι π.χ. οἱ μύες τῶν τριχῶν (λέγουν τότε «ἀνατρίχιασα ἀπὸ τὸ κρύο»), καθὼς καὶ οἱ μύες οἱ κινοῦντες τὴν γνάθον («κτυποῦν τὰ δόντια μου ἀπὸ τὸ κρύο»). Ἀκριβῶς διὰ νὰ αὐξήσωμεν τὰς καύσεις, θέτομεν εἰς λειτουργίαν καὶ ἕκουσίως τοὺς μῦς «γιὰ νὰ ζεσταθοῦμε».

Μετὰ τὰ προηγούμενα παραδείγματα κατανοοῦμεν καλύτερον, ὅτι αἱ διάφοροι μεταβολαὶ εἰς τὸ σῶμα ἢ τὸ περιβάλλον προκαλοῦν, διεγείρουν, ὡς λέγομεν, τὴν προσαρμοστικὴν λειτουργίαν τοῦ ὅργανισμοῦ. Ἡ λειτουργία αὕτη τελείται ὑφ' ὅλου τοῦ ὅργανισμοῦ, δηλ. διάφορα συστήματα ἐργάζονται πρὸς ἀντίμετώπισιν ἀπὸ κοινοῦ τῶν ἀποτελεσμάτων κάθε μεταβολῆς.

Ἡ προσαρμοστικὴ λειτουργία ἐπιτυγχάνει τὸν σκοπὸν της, ἐφ' ὅσον αἱ συμβαίνουσαι μεταβολαὶ δὲν ὑπερβοῦν ὀρισμένα ὅρια.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΙΑ.

(Παράδειγμα ζωῆς εἰς ὑψηλά μέρη).

Ἡ ἀνάγκη τῆς προσαρμογῆς ὑποχρεώνει διάφορα συστήματα νὰ ἐργάζωνται ζωηρότερον καὶ ἐντατικότερον. Ἄσ τὸ προθέσωμεν π.χ., ὅτι εἰς ἀνθρώπινος ὅργανισμὸς πρέπει νὰ ζήσῃ εἰς μέγα ὑψος ἐπί τίνος ὑψηλοῦ ὅρους. Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀπὸ εἰς τὸ ὑψος τούτο εἶναι ἀραιός, ἐπομένως, διὰ νὰ δεσμεύῃ ὁ ὅργανισμὸς τὸ ἀναγκαῖον δξυγόνον, πρέπει νὰ εἰσάγῃ εἰς τοὺς πνεύμονας μεγαλύτερον δύκον ἀέρος. Πρὸς τοῦτο ἡ ἀναπνοὴ γίνεται βαθυτέρα, οἱ μύες τοῦ θώρακος ἐργάζονται περισσότερον, ἡ θωρακικὴ κοιλότης εύρυνεται. Ἐξ ἄλλου παράγονται περισσότερα ἔρυθρὰ αἷμοσφαίρια. Ἐὰν ἀργότερον ὁ ἴδιος ὅργανισμὸς ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν πεδιάδα, ὁ ἀριθμὸς τῶν αἱ-

μοσφαιρίων κατέρχεται καὶ πάλιν, δπωσδήποτε ὅμως ἡ ζωὴ εἰς τὸ ύψηλὸν ὅρος ἀφήνει τὰ ἔχνη της. Ἡ ἀναπνοὴ παραμένει βαθεῖα, διθώραξ καλύτερον ἀνεπτυγμένος, τὸ μυϊκὸν σύστημα, τὸ κυκλοφορικὸν καὶ τὰ αίμοποιητικὰ ὄργανα ἔχουν συνηθίσει νὰ ἐργάζωνται καλύτερον. Ἀποτέλεσμα τῆς ἔξασκήσεως αὐτῆς είναι, ὅτι τὰ διάφορα συστήματα ἐνδυναμώνονται καὶ ὅλος ὁ ὄργανισμὸς τονώνεται καὶ ἀποκτᾷ μεγαλυτέραν ἀντοχὴν.

Ἐάν λοιπὸν ὑποβάλλωμεν τὸν ὄργανισμὸν εἰς ἐντατικὴν ἐργασίαν καὶ τὸν ἀφήνωμεν ν' ἀντιμετωπίσῃ μὲ τὰς ἴδικὰς του δυνάμεις τὰς μεταβολὰς τοῦ περιβάλλοντος, διεγείρεται ἡ προσαρμοστικὴ λειτουργία καὶ αὔξανεται ἡ ἀντοχὴ καὶ ἡ ζωηρότης του. Τοιαύτη. είναι ἡ ἐπίδρασις π.χ. τῆς ἀγροτικῆς καὶ τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς.

Είναι ὅμως φανερόν, ὅτι ἡ σκληραγωγία δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ ὥρισμένα ὅρια. Τὰ ὅρια αὐτὰ είναι διάφορα δι' ἕκαστον ὄργανισμόν. Είναι γνωστόν, ὅτι ἄλλοι ἀντέχουν εἰς ἐντατικὴν προσπάθειαν ἡ εἰς τὰς ἀσθενείας, ἐνῷ ἄλλοι κουράζονται ἡ ἀσθενοῦν εύκόλως. Ἰδιαιτέρα μάλιστα προσοχὴ ἀπαιτεῖται κατὰ τὴν νεαρὰν ἥλικιαν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔξακολουθεῖ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ σώματος καὶ ὁ ὄργανισμὸς είναι εύπαθής.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ σώματος καὶ τοῦ περιβάλλοντος ἐπέρχονται ἐνίστει μεταβολαί, αἱ ὅποιαι θὰ ἡδύναντο νὰ δυσκολεύσουν τὴν ὁμαλὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἀλλὰ τὰ διάφορα ὄργανικὰ συστήματα ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ συνεργάζωνται καὶ διὰ κοινῆς προσπάθειας ν' ἀντιμετωπίζουν τὰς νέας συνθήκας ζωῆς. Τούτο ἀποτελεῖ τὴν προσαρμοστικὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. "Οταν τὰ ὄργανικὰ συστήματα ὑποβάλλωνται συχνά εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς προσαρμογῆς εἰς δυσκολωτέρους ὅρους, τὰ συστήματα ταῦτα ἔξασκοῦνται καὶ ἐνδυναμώνονται καὶ ὁ ὄργανισμὸς ἀποκτᾷ μεγαλυτέραν ἀντοχὴν καὶ ζωηρότητα (σκληραγωγία).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Εις τὴν Φυτολογίαν ἐμάθομεν, ὅτι, γενικῶς, διὰ νὰ σχηματισθῇ ἐν νέον φυτόν, πρέπει νὰ ἔνωθοῦν δύο διάφορα γεννητικὰ κύτταρα. Τὸ ἐν ἑξ αὐτῶν, καλούμενον σπερματοζωάριον, εύρισκεται εἰς τὸν κόκκον τῆς γύρεως, τὸ δὲ ἄλλο, καλούμενον ωάριον, εύρισκεται ἐντὸς τῆς ωοθήκης. "Οταν δέ κόκκος τῆς γύρεως πέσῃ ἐπὶ τοῦ ὑπέρου, τὰ δύο αὐτὰ κύτταρα, συναντώμενα, ἐνώνονται (γονιμοποιούμενον πλέον ωάριον ἔχει τὴν ίκανότητα νὰ τμηθῇ καὶ νὰ σχηματίσῃ δύο κύτταρα, τὰ δόποια ὁμοίως τέμνονται καὶ δίδουν τέσσαρα, ὀκτὼ κ.ο.κ. Τὰ δημιουργούμενα τοιουτοτρόπως κύτταρα σχηματίζουν τὸ ἐμβρύον τοῦ νέου φυτοῦ. Τὸ ἐμβρυον τοῦτο μένει ἐντὸς τοῦ σπόρου ἐν ἡρεμίᾳ ἐπὶ μῆνας ἢ καὶ ἔτη. Τέλος, ὅταν εὑρεθῇ εἰς καταλήλους συνθήκας, αὐξάνεται σχηματίζει ρίζας καὶ ἀναπτύσσεται εἰς τὸ νέον φυτόν (βλάστησις),

'Αναλόγως καὶ εἰς τὰ ζῶα, μετὰ τὴν συνένωσιν τῶν δύο γεννητικῶν κυττάρων, σχηματίζεται πάλιν τὸ ἐμβρυον. Τοῦτο ἀναπτύσσεται εἰς ἄλλα μὲν ζῶα ἐκτὸς τοῦ σώματος τῆς μητρὸς (ωοτόκα), εἰς ἄλλα δὲ ἐντὸς αὐτοῦ (ζωοτόκα).

2. ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Εις τὰ θηλαστικά, τὰ δόποια, ὡς γνωστόν, είναι ζωοτόκα, ἢ ἀνάπτυξις τοῦ ἐμβρύου τελεῖται ἐντὸς τοῦ μυώδους, ἀσκοειδοῦς ὄργανου, τῆς μήτρας. Αὕτη εύρισκεται εἰς τὴν κοιλότητα τῆς λεκάνης καὶ συγκοινωνεῖ πρὸς τὰς ωοθήκας. Τὸ ἐμβρυον συγκρατεῖται ὑπὸ τῶν λαχνῶν τοῦ βλεννογόνου τῆς μήτρας, αἱ δόποιαι ἀποτελοῦν τὸν πλακοῦντα. Αἱ λάχναι αὗται είναι πλούσιαι εἰς αίμοφόρα ἀγγεῖα, τὰ δόποια προσάγουν θρεπτικάσ ούσιάς ἀπὸ τὴν κυκλοφορίαν τῆς μητρὸς πρὸς διατροφὴν τοῦ ἐμβρύου. Διὰ νὰ προστα-


τεύεται καὶ τὸ ἔμβρυον καὶ ἡ μήτηρ ἀπὸ ἀποτόμους μετατοπίσεις τοῦ ἐμβρύου, τοῦτο εύρισκεται ἐντὸς σάκκου πλήρους ύγρου. "Οταν ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ἐμβρύου συμπληρωθῇ, τὸ ἔμβρυον ἔχερχεται ἀπὸ τὸ μητρικὸν σῶμα (τοκετὸς) καὶ ἀρχίζει τὴν ἀνεξάρτητον ζωὴν του.

Εἰς τὸν ἀνθρωπὸν, ὁ ὄποιος ἀνήκει ἐπίσης εἰς τὰ Θηλαστικά, ἡ ἐμβρυϊκὴ ἀνάπτυξις, ἀπὸ τῆς στιγμῆς κατὰ τὴν ὄποιαν ἀρχίζει τὸ ὥαριον νὰ τέμνεται μέχρι τοῦ τοκετοῦ, διαρκεῖ περίπου 280 ἡμέρας. "Οσον προχωρεῖ ἡ ἀνάπτυξις, τόσον τὸ ἔμβρυον τελειοποιεῖται καὶ τέλος φθάνει εἰς τὴν μορφὴν τοῦ ἀνθρωπίνου νεογνοῦ.

3. ΑΙ ΗΛΙΚΙΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τὸ νεογνὸν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὄποιον ἔχει μέγεθος περίπου 50 ἑκ., μόλις ἔξελθη τοῦ μητρικοῦ σώματος ἀρχίζει νὰ ἀναπνέῃ καὶ νὰ κραυγάζῃ. Κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἡλικίας του τὸ βρέφος τρέφεται διὰ τοῦ θηλασμοῦ, αὔξανει δὲ περίπου κατὰ 25 ἑκ. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους ἀναφαίνονται οἱ πρῶτοι τομεῖς ὀδόντες Τὸ 2ον καὶ 3ον ἔτος τῆς ζωῆς ἀποτελοῦν τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν, κατὰ τὴν ὄποιαν δὲ ἀνθρωπὸς ἀρχίζει νὰ βαδίζῃ, νὰ κάθηται καὶ νὰ δηλᾶ. Κατὰ τὸ 2ον ἔτος παραστηρεῖται αὔξησις κατὰ 10 περίπου ἑκ., συμπληροῦται δὲ καὶ ἡ πρώτη ὀδοντοφυία ἐξ 20 νεογιλῶν ὀδόντων. Κατὰ τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου ἀφήνουν μεταξύ των μεμβρανώδη διάκενα, καλούμενα πηγάσ, διὰ νὰ μὴ ἐμποδίζεται ἡ αὔξησις τοῦ ἐγκεφάλου (εἰκ. 52.) Γενικῶς δὲ τὰ ὀστᾶ τοῦ νηπίου εἶναι πολὺ εὔπλαστα.

Τὴν νηπιακὴν διαδέχεται ἡ παιδικὴ ἡλικία. Ἔνω γενικῶς




Εἰκ. 52. Αἱ πηγαὶ τοῦ κρανίου: α') νεογνοῦ, β') εἰς ἡλικίαν 9 μηνῶν, γ') εἰς ἡλικίαν ἐνὸς ἔτους, δ') εἰς ἡλικίαν τριῶν ἔτων.

ἡ ἐτησία αὔξησις τοῦ σώματος φθάνει τὰ 5 ἔκ., ύπαρχουν δύο περίοδοι τῆς παιδικῆς ἡλικίας, κατὰ τὰς ὅποιας ἡ ἀνάπτυξις τελεῖται γοργότερον. Ἡ πρώτη τοιαύτη περίοδος συμπίπτει μὲ τὸ δον ἢ 7ον ἔτος, ἡ δὲ δευτέρα μὲ τὸ τέλος τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ἀποπίπτουν βαθμιαίως οἱ νεογιλοὶ δόδοντες, ἐκφύονται δὲ οἱ μόνιμοι, πλὴν τῶν τρίτων γομφίων.

Ἐκ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων λειτουργοῦν ἐντατικώτερον ὁ θύμος, ἡ ὑπόφυσις καὶ ἡ ἐπίφυσις. Ἐκ τούτων ἡ ἐπίφυσις μετὰ τὸ 10ον ἔτος καταστρέφεται. Ἀπὸ τοῦ 12ου μέχρι τοῦ 14ου ἔτους τὰ θήλεα, δύο δὲ περίπου ἔτη ἀργότερον τὰ ἄρρενα, εἰσέρχονται εἰς τὴν ἐφιβικήν ἡλικίαν. Κατ' αὐτὴν τὰ θήλεα δὲν αὔξανουν σχεδὸν καθόλου, ἐνῷ τὰ ἄρρενα ἔξακολουθοῦν νὰ αὔξανουν μέχρι τοῦ 21ου ἔτους. Ο σκελετὸς καὶ τὸ μυϊκὸν σύστημα ἴσχυροποιοῦνται. Ἔνῳ ὑποχωρεῖ ἡ λειτουργία τοῦ θύμου καὶ τῆς ἐπιφύσεως, ἐντείνεται ἡ λειτουργία ἄλλων ἐνδοκρινῶν ἀδένων, ως π.χ. τοῦ θυρεοειδοῦς. Γενικῶς ἡ ἐφιβικὴ ἡλικία εἶναι τὸ στάδιον, κατὰ τὸ ὅποιον ὁ ἀνθρωπός τείνει νὰ φθάσῃ εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ ὥριμου ἀνδρὸς ἢ τῆς ὥριμου γυναικός.

Κατὰ τὴν ὥριμον ἡλικίαν, ἡ ὅποια διαδέχεται τὴν ἐφιβικήν, δὲν γίνεται πλέον αὔξησις καθ' ὑψος τοῦ σώματος, τὸ ὅποιον ἀποκτᾷ τὴν ὀριστικήν του ἀνάπτυξιν, καὶ τὰς ὀριστικάς του ἀναλογίας (εἰκ. 53). Τέλος, τὴν ὥριμον ἡλικίαν ἀκολουθεῖ τὸ γῆρας, τὸ ὅποιον δύναται νὰ παραταθῇ ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Κατ' αὐτὸ διάφορα ὅργανα ἀρχίζουν νὰ ἀτροφοῦν καὶ γενικῶς ὁ ὀργανισμὸς ἔχασθενεῖ.



Εἰκ. 53. Ἡ μεταβολὴ τῶν ἀναλογιῶν τοῦ σώματος. α') Ἐμβρυον. β') Παιδίον, γ') "Ωριμος ἀνήρ.

4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

‘Ο ἄνθρωπος γεννᾶται ἐπειτα ἀπὸ κύησιν 280 ἡμερῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς τρέφεται δι’ οὐσιῶν, τὰς ὁποίας παραλαμβάνει ἀπὸ τὸ κυκλοφορικὸν σύστημα τῆς μητρός. Τὸν 1ον ἔτος ἀπὸ τῆς γεννήσεως ἀνήκει εἰς τὴν βρεφικὴν ἡλικίαν, τὸ 2ον καὶ 3ον εἰς τὴν νηπιακήν. Ἀκολουθεῖ ἡ παιδικὴ ἡλικία μέχρι τοῦ 12ου—14ου ἔτους, δῆτα ἡ ἐφηβική, τὴν ὁποίαν πάλιν διαδέχεται ἡ ὥριμος ἡλικία. Ἐπὸ τῆς γεννήσεως, ἡ αὔξησις τοῦ σώματος ἔξακολουθεῖ μέχρι τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας εἰς τὰ θήλεα, εἰς τὰ ἄρρενα δὲ συνεχίζεται καὶ μέχρι τῆς ὥριμου.

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Κάμνε κάθε χρόνο τὴν ιδίαν ἡμέραν (π.χ. τῶν γενεθλίων) μίαν ἀκριβῇ μέτρησιν τοῦ ἀναστήματος καὶ τοῦ βάρους σου καὶ σημείωνε τί εύρισκεις. Κάμνε τὸ ἴδιο καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς σου.

2) Λόγω ωρισμένων μικρῶν διαφορῶν μεταξὺ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ σώματος, είναι ἀδύνατον νὰ βαδίσῃ κανεὶς μὲ κλειστούς ὀφθαλμούς κατ’ εύθειαν γραμμήν. Δοκίμασέ το εἰς μίαν δύμαλην ἕκτασιν, προσπαθῶν νὰ φθάσης, μὲ κλειστούς ὀφθαλμούς, κατ’ εύθειαν ἀπὸ ἐν σημεῖον εἰς ἄλλο.

3) Καὶ τὸ πρόσωπον παρουσιάζει γενικῶς μίαν μικρὰν ἀσυμμετρίαν εἰς τὰς διαστάσεις καὶ τὴν «μιμικήν» τῶν δύο τμημάτων του. Παρατήρησε εἰς μίαν φωτογραφίαν τὸ ἀριστερὸν μέρος ἐνὸς πρώτου, καλύπτων τὸ δεξιόν, καὶ ἀντιστρόφως.

4) Μέτρησε καὶ σύγκρινε τὰς ἔξης διαδοχικὰς ἀποστάσεις: κορυφὴ κρανίου—ἄκρον ρινὸς—ἀρχὴ στέρνου—τέλος τοῦ στέρνου—όμφαλὸς—ἡβικὴ σύμφυσις—πέλμα.



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΦΥΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κάθε ἄνθρωπος ζῆται εἰς ἓνα τόπον τῆς γῆς, δέ όποιος παρουσιάζει ώρισμένα γεωγραφικά γνωρίσματα, ώρισμένον κλίμα καὶ ώρισμένον φυτικὸν καὶ ζωϊκὸν κόσμον. Αύτὰ ὅλα ἀποτελοῦν τὸ φυσικὸν περιβάλλον. Ἐξ ἄλλου, κάθε ἄνθρωπος εἶναι καὶ μέλος μιᾶς κοινωνίας, ή ὅποια ἔχει ώρισμένον πολιτισμὸν καὶ ή ὅποια ἀποτελεῖ τὸ κοινωνικὸν περιβάλλον.

Μὲ τὸ φυσικὸν περιβάλλον δέ όργανισμὸς ἔρχεται εἰς ἐπικοινωνίαν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος, τόσον τῆς ἔξωτερηκῆς ὅσον καὶ τῆς ἐσωτερικῆς. Καὶ ή μὲν ἔξωτερικὴ ἐπιφάνεια ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ δέρμα, ή δὲ ἐσωτερικὴ ἀπὸ τοὺς βλεννογόνους, οἱ όποιοι ὑπενδύουν τὰς κοιλότητας τοῦ σώματος καὶ τοῦ πεπτικοῦ καὶ ἀναπνευστικοῦ σωλῆνος. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ δέρμα, οἱ βλεννογόνοι στεροῦνται κερατίνης στοιβάδος καὶ ἐπομένως δύνανται οὐσίαι ἐκ τοῦ περιβάλλοντος νὰ διέλθουν δι' αὐτῶν. Τέλος, δέ όργανισμὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ περιβάλλον καὶ διὰ τῶν αἰσθητηρίων του ὄργάνων.

Δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν τὰς σχέσεις, εἰς τὰς δημοσίας ἔρχεται διὰ τῶν ἀνωτέρω ἐπιφανειῶν δέ όργανισμὸς πρὸς τὸ περιβάλλον, ὡς ἔξης:

α') Μεταξὺ όργανισμοῦ καὶ περιβάλλοντος γίνεται ἀνταλλαγὴ διαφόρων οὔσιῶν.

β') Τὸ σῶμα ὑφίσταται διὰ τῆς ἐπιφανείας του τὴν ἐπίδρασιν τῶν φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος (θερμοκρασία, φῶς κλπ.).

γ') 'Ο όργανισμὸς ἔρχεται εἰς βιολογικὰς σχέσεις μὲ τὸν ἄλλον

όργανικὸν κόσμον. Ἰδίως διάφοροι μικροοργανισμοὶ ἀσκοῦν σπουδαιοτάτην ἐπίδρασιν ἐπ’ αὐτοῦ.

δ') Διὰ τῶν αἰσθητηρίων καὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος δέχεται δό όργανισμὸς διαρκῶς ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου ἐρεθίσματα καὶ δημιουργεῖ ἐν τυπώσεις.

2. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας δό όργανισμὸς προσλαμβάνει τὸ δέξυγόνον. Τοῦτο εἰς τὸ κατώτερον λεπτὸν στρῶμα τῆς ἀτμοσφαίρας, ἐντὸς τοῦ δόποιου ζῆται ὁ ἄνθρωπος, ὑπάρχει ὑπὸ σταθεράν ἀναλογίαν (21%). Διὰ τοπικοὺς λόγους (ἔλη, πόλεις, σπήλαια κλπ.) εἶναι δυνατὸν δό ἀτμοσφαιρικὸς ἀτῆρ νὰ περιέχῃ διαφόρους ἐπιβλαβεῖς προσμίξεις εἰς μίαν μικράν περιοχὴν (σκόνη, διάφορα ἀέρια κλπ.).

Κατὰ τὰς λειτουργίας τῆς θρέψεως δό όργανισμὸς προσλαμβάνει ὕδωρ καὶ θρεπτικὰς ούσιας. Ἡ σύστασις τοῦ ὕδατος καὶ τὸ εἶδος τῶν τροφῶν ἔχει ταπεττᾶται ἐν μέρει ἀπὸ τὸ φυσικὸν περιβάλλον, διότι οἱ διάφοροι πληθυσμοὶ χρησιμοποιοῦν κυρίως τρόφιμα παραγόμενα εἰς τὸν τόπον των. Τοῦτο ισχύει περισσότερον διὰ τοὺς ἀγροτικοὺς πληθυσμούς, οἱ δόποιοι εἶναι οἱ ἴδιοι παραγωγοί, καὶ δι' ἀπομεμονωμένους πληθυσμούς. Διὰ τοῦτο συμβαίνει εἰς τινας τόπους ἡ διατροφὴ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ νὰ εἶναι μονομερής. Π.χ. εἰς τὴν "Απωλετὴν" κυρία τροφὴ μεγάλων μαζῶν εἶναι τὸ ρύζι, οἱ δὲ Ἐσκιμῶοι τρέφονται σχεδὸν ἀπὸ ψάρια καὶ κυνήγιον.

Εἶναι φανερόν, ὅτι διὰ τοῦ τρόπου τούτου τὸ ἄμεσον φυσικὸν περιβάλλον ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐν τούτοις, ἡ ἐπίδρασις αὔτη τοῦ περιβάλλοντος ἔχει ἐλαττωθῆδιὰ τοῦ πολιτισμοῦ. Διότι, χάρις εἰς τὸ ἐμπόριον, τὰ προϊόντα τῶν διαφόρων χωρῶν κυκλοφοροῦν εἰς δόλον τὸν κόσμον, αἱ δὲ συνήθειαι τῶν ἀνθρώπων τείνουν νὰ ἔξοιωθοῦν.

3. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἡ θερμοκρασία μεταβάλλεται εἰς ἓνα τόπον ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς, τῆς ὥρας τοῦ ἡμερονυκτίου, τῆς νεφώσεως κλπ. Ἐπίσης ἀπὸ

τόπου εἰς τόπον διαφέρει ή θερμοκρασία ἀναλόγως τῆς γεωγραφικῆς θέσεως.

Γνωρίζομεν ἡδη, πῶς ὁ ὑγιής ὄργανισμὸς κατορθώνει, παρ' ὅλα αὐτά, νὰ διατηρῇ σταθερὰν τὴν θερμοκρασίαν του. Ἐὰν ἐν τούτοις ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος ἔξελθῃ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς του, ή λειτουργία τοῦ ὄργανισμοῦ διαταράσσεται καὶ παρουσιάζονται διάφοροι παθήσεις (θερμοπληξία).

Αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες ὥφελοιν τὸν ὄργανισμόν. Διὰ τοῦτο μάλιστα καὶ χρησιμοποιοῦνται πρὸς ἐνδυνάμωσίν του καὶ πρὸς θεραπείαν ὡρισμένων παθήσεων, ίδιᾳ τῶν ὀστῶν καὶ τοῦ δέρματος (ἡλιοθεραπεία). Εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀκτίνων τούτων ἀπαντᾷ ὁ ὄργανισμὸς διὰ τοῦ σχηματισμοῦ χρωστικῆς εἰς τὸ δέρμα. Ἡ χρωστικὴ αὔτη δυσκόλως σχηματίζεται εἰς τὰ ξανθὰ καὶ ἀνοικτόχρωμα ἄτομα. Διὰ τοῦτο αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες προκαλοῦν εἰς τὸ ἀπροστάτευτον δέρμα τῶν ἀτόμων τούτων εὔκόλως ἐγκαύματα (φυσαλίδες, ξεφλούδισμα).

Εἰς τοὺς διαφόρους τόπους τῆς γῆς ἡ λιοφάνεια δὲν εἶναι ἡ αὐτὴ καὶ τοῦτο ἔχει ἐπίσης σημασίαν διὰ τὸν ὄργανισμόν. Εἰς τὴν Ἀγγλίαν π.χ., ὅπου ἐλάχισται ἡμέραι ἡλιοφανείας ὑπάρχουν, εἶναι συχνὴ ἡ ραχίτις (ἀγγλικὴ νόσος).

Ἐκ τῶν ἄλλων φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος μεγάλην ἐπίδρασιν ἔπι τοῦ ὄργανισμοῦ ἀσκεῖ ἡ μοσφαιρικὴ πίεσις. Αὕτη, ὅσον ἀνερχόμεθα καθ' ὑψος, ἐλαττοῦται, λόγῳ τῆς ἀραιώσεως τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. Ἔνῷ εἰς μικρὰς μεταβολὰς τῆς πιέσεως ὁ ὄργανισμὸς προσαρμόζεται, αἱ μεγάλαι μεταβολαὶ προκαλοῦν εἰς αὐτὸν σοβαρὰς βλάβας. Διάφοροι τοιαῦται παθήσεις παρατηροῦνται εἰς τοὺς ὀρειβάτας καὶ τοὺς ἀεροπόρους, οἱ δποῖοι ἀνέρχονται εἰς μεγάλα ὑψη, καθὼς καὶ εἰς τοὺς δύτας, οἱ δποῖοι ὑφίστανται ἐντὸς τοῦ ὄντος ἰσχυροτάτας πιέσεις.

4. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διάφοροι μικροοργανισμοί ἐπιζητοῦν νὰ ἐγκατασταθοῦν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ νὰ τρέφωνται ἀπὸ τοὺς ιστούς του. Τοιοῦτοι ὄργανισμοὶ εἶναι διάφορα ἔντομα καὶ ἀκάρεα



(ψώρα κλπ.). Ἀλλα ἔντομα ἀπομυζοῦν αἷμα καὶ μάλιστα δύνανται διὰ τοῦ τρόπου τούτου νὰ μεταδώσουν καὶ διαφόρους ἀσθενείας (κώνωπες κλπ.).

Μερικοὶ ὄργανισμοὶ ἐγκαθίστανται ἐντὸς τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπορρέωφοῦν θρεπτικάς ούσιας. Τοιαῦτα παράσιτα εἶναι ἡ ταινία, αἱ ἀμοιβάδες κλπ. Τέλος, ἄλλοι μικροοργανισμοὶ εἰσδύουν ἐντὸς τῶν ιστῶν τοῦ σώματος, ἀναπτύσσονται ἐκεῖ καὶ προκαλοῦν τὰς μολυσματικὰς ἀσθενείας. Οἱ ὄργανισμοὶ οὗτοι ὑπάγονται εἰς τὰ βακτήρια ἢ τὰ πρωτόζωα ἢ τοὺς μύκητας, ἐνίστε ὅμως εἶναι καὶ ἀνώτερα ζῶα, ως ὁ ἔχινόκοκκος.

Κατὰ τῶν ἀνωτέρω παθογόνων μικροοργανισμῶν ἀμύνεται ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμὸς διὰ τῶν λευκῶν αἷμοσφαιρίων, διὰ διαφόρων ούσιῶν (ἀντιοξεῖναι), τὰς δόποιας πρὸς τοῦτο παράγει, καὶ δι’ ἄλλων μέσων. Ἡ ἔξετασις τοῦ τρόπου, μὲ τὸν δόποιον δύναται νὰ ἐνισχυθῇ δ ὄργανισμὸς εἰς τὸν ἀγῶνα του τοῦτον, ἀποτελεῖ θέμα τῆς Ἰατρικῆς.

5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ φυσικὸν περιβάλλον ἐπιδρᾷ ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοὺς ἔχῆς τρόπους: α’) διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς ούσιῶν, ἡ δόποια γίνεται μεταξύ τούτου καὶ τοῦ ὄργανισμοῦ (ἀήρ, τροφαί· β’) διὰ τῶν φυσικῶν συνθηκῶν τοῦ περιβάλλοντος (ἡλιακαὶ ἀκτίνες, πίεσις κλπ.)· καὶ γ’) διὰ τῶν ὄργανισμῶν, οἱ δόποιοι ἔρχονται εἰς σχέσεις μὲ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα (παράσιτα, μικρόβια).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΦΥΛΑΙ


I. ΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

Έκ πείρας διακρίνομεν τούς ἀνθρώπους εἰς φυλάς, στηριζόμενοι εἰς διάφορα σωματικά γνωρίσματα, τὰ δόποια παρουσιάζουν οὗτοι. Είναι ὅμως δυνατὸν νὰ παρατηρήσωμεν σημαντικάς διαφοράς μεταξὺ ώρισμένων ἀτόμων καὶ ἐν τούτοις νὰ μὴ τὰς λάβωμεν ὑπ' ὅψιν, διὰ νὰ κατατάξωμεν τὰ ἄτομα εἰς διαφόρους φυλάς. Τοιαῦται διαφοραὶ εἰναι ὅσαι ὀφείλονται εἰς τὸ φῦλον καὶ τὴν ἡλικίαν (σύγκρισις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, νεαρῶν καὶ ἐνηλίκων ἀτόμων τῆς αὐτῆς φυλῆς). Έπίσης δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὅψιν ὅσα σωματικά γνωρίσματα ἔδημιουργήθησαν ἀπὸ τὸν τρόπον τῆς ζωῆς (ἐπάγγελμα κλπ.) ἢ ἀπὸ τυχαία γεγονότα (ἀσθένεια κλπ.).

Διαφοραὶ ὡς αἱ ἀνωτέρω ὑπάρχουν ἐντὸς κάθε φυλῆς. Διὰ νὰ διακρίνωμεν ἐπομένως τὰς φυλάς, πρέπει νὰ στηριχθῶμεν εἰς ἄλλα γνωρίσματα, τὰ δόποια νὰ παρουσιάζωνται ὁμοιομόρφως ἐντὸς ἑκάστης φυλῆς. Ἀκόμη πρέπει τὰ γνωρίσματα αὐτὰ νὰ εἰναι κληρονομικά. Βεβαίως τὰ γνωρίσματα αὐτὰ δὲν θὰ παρουσιάζωνται κατὰ τὸν αὐτὸν ἀκριβῶς βαθμὸν ἀνεπτυγμένα εἰς ὅλα τὰ ἄτομα, αἱ παρατηρούμεναι ὅμως διαφοραὶ θὰ εἰναι μικραί.

Ἐάν ἔχωμεν ὑπ' ὅψιν τὸ ἀνωτέρω, δυνάμεθα νὰ καθορίσωμεν μὲ μεγαλυτέραν ἀκριβειαν τί ἐννοοῦμεν μὲ τὸν ὄρον φυλή. Φυλὴ εἶναι μία μεγάλη συνήθως δμάς ἀνθρώπων, τὴν δόποιαν διακρίνομεν ἀπὸ τὰς ὅλας, διότι παρουσιάζει ἐν σύνολον ίδικῶν της γνωρισμάτων, τὰ γνωρίσματα δὲ αὐτὰ εἰναι κληρονομικά καὶ παρουσιάζονται μὲ μικρὰς μόνον διαφορὰς μεταξὺ τῶν ἀτόμων τῆς φυλῆς.

Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἐπρότειναν διαφόρους διακρίσεις τῶν ἀν-



Εικ. 54. Οι τρεις μεγάλαι περιοχαὶ τῆς Εύρωποσίας.

θρωπίνων φυλῶν. Π.χ. ὁ Blumenbach διέκρινε 5 μεγάλας φυλάς, τὰς ἔξης: 1) τὴν Λευκὴν ἢ Καυκασίαν φυλήν, 2) τὴν Μογγολικήν ἢ Κιτρίνην, 3) τὴν Αἰθιοπικήν ἢ Μαύρην, 4) τὴν Ἀμερικανικήν ἢ Ἐρυθρόδερμον καὶ 5) τὴν Μαλαιϊκήν φυλήν.

Κατωτέρω θὰ περιγράψωμεν τὰς σημερινὰς ἀνθρωπίνας φυλὰς συμφώνως πρὸς νεωτέρας διακρίσεις.

2. ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΑΣΙΑΣ.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΦΥΛΩΝ

"Ας φέρωμεν μίαν γραμμήν διά τῶν Ἰμαλαῖων ὄρέων καί, διαγωνίως πρὸς αὐτήν, μίαν ἄλλην διά τῆς ὄροσειρᾶς τοῦ Γιὲν Σὰν καὶ τῶν Ἀλταῖων μέχρι τοῦ Βεριγγείου πορθμοῦ. Αἱ γραμμαὶ αὗται ξεχωρίζουν τρεῖς μεγάλας περιοχὰς εἰς τὴν Εύρωποασίαν. Ἡ βόρειος περιοχὴ περιλαμβάνει τὴν Εύρωπην καὶ τὴν Βόρειον Ἀσίαν, ἡ ἀνατολικὴ περιλαμβάνει τὴν Κεντρικήν Ἀσίαν καὶ τὰς γειτονικὰς νήσους καὶ ἡ νότιος περιοχὴ περιλαμβάνει τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Ἀσίας καὶ τὰς πλησίους νήσους. Εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς σημερινῆς γεωλογικῆς ἐποχῆς, ὅταν ἥρχισε νὰ ἀναπτύσσεται ὁ ἀνθρωπός, αἱ τρεῖς αὗται περιοχαὶ ἔχωριζοντο μεταξύ των, περισσότερον παρὰ σήμερον, ἀπὸ τὰ ὅρη καὶ τὰς θαλάσσας, καθώς καὶ τοὺς παγετῶνας καὶ τὰς ἐρήμους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (εἰκ. 54).

Οὔτως, εἰς ἑκάστην τῶν ἀνωτέρω περιοχῶν ἀνεπτύχθησαν φυλαί, αἱ δοποῖαι ὁμοιάζουν μεταξύ των, διαφέρουν δὲ πολὺ ἀπὸ τὰς φυλὰς τῶν ἄλλων περιοχῶν. Τὰ τρία αὗτὰ μεγάλα ἀθροίσματα τῶν φυλῶν, τὰ ὅποια ἀνεπτύχθησαν εἰς τὰς περιοχὰς αὗτάς, καλοῦνται κλάδοι ἀδοι φυλῶν.

3. Ο ΜΟΓΓΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

"Ο κλάδος οὗτος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ ὅποιαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν ἀνατολικὴν περιοχὴν, ἀργότερα δὲ ἐξηπλώθησαν καὶ εἰς τὴν Ἀμερικήν.

Γενικῶς τὰ σωματικὰ γνωρίσματα τῶν φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου (εἰκ. 55) εἶναι τὰ ἔξις: βραχυκεφαλία καὶ ἀνάστημα μέτριον ἢ μικρόν. Ἡ κόμη εἶναι μαύρη, λεία καὶ ἀραιά, τὸ δὲ τρίχωμα εἰς τὸ σῶμα εἶναι σπάνιον. Τὸ δέρμα ἔχει χρῶμα κιτρινωπόν, οἱ ὀφθαλμοὶ



Εἰκ. 55. "Ατομον μὲ ἔντονα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου. Γυνὴ ἐκ Μαντζουρίας.



Εἰκ. 56. Κινέζος.

είναι λοξοί καὶ στενοί, ἀπέχουν πολὺ μεταξύ των καὶ τὰ βλέφαρα εύρισκονται ύψηλά. Τὸ πρόσωπον είναι ἐπίπεδον καὶ τὸ μέτωπον λοξόν. Ὡς ὅμως θὰ ἴδωμεν, τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ δὲν παρουσιάζονται εἰς ὅλας τὰς φυλὰς τοῦ κλάδου τούτου μὲ τὴν ίδιαν ζωηρότητα.

Αἱ κύριαι φυλαί, τὰς ὅποιας διακρίνουν εἰς τὸν κλάδον τοῦτον, είναι αἱ ἔξῆς:

1) **Σιβηρίδαι.** Οὗτοι ζοῦν εἰς τὰ δάση τῆς Σιβηρίας καὶ ἔχουν ἔλθει εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν εύρωποιδῆ κλάδον. Διὰ τοῦτο δὲν παρουσιάζουν πολὺ ἔντονα τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά.

2) **Τουγκιδαι.** Οὗτοι είναι οἱ γνωστοὶ ως κυρίως Μογγόλοι. Ζοῦν νομαδικῶς εἰς τὰς ἑρήμους τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας. Παρουσιάζουν τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικὰ ἐντόνως ἀνεπτυγμένα. Ἀλλοτε ἐσάρωναν ως ἐπιδρομεῖς ὅλην τὴν Εύρωπην καὶ τὴν Ἀσίαν. (Τσεγγίς Χὰν—ΙΓ' αἰών, Ταμερλάνος—ΙΔ' αἰών).

3) **Σινίδαι** (εἰκ. 56). Εἰς αὐτούς ὑπάγονται οἱ Κινέζοι, οἱ ὅποιοι δόμοιάζουν πρὸς τοὺς Εύρωπαίους περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην μογγολοειδῆ φυλήν. Παρουσιάζουν τὴν μεγαλυτέραν ἀναλογίαν ἀτόμων μὲ δγκώδεις κρανίον (1400 κυβ. ἑκατ. καὶ ἅνω). Ἀνέπτυξαν τὸν ἀρχαιότερον πολιτισμὸν καὶ ἡ ιστορία τῆς αὐτοκρατορίας των ἀρχίζει είκοσι δύο αἰώνας π.Χ.

Οἱ Ἰάπωνες είναι ἔθνος, τὸ ὅποιον προῆλθεν ἐκ τῆς ἀναμίξεως διαφόρων γειτονικῶν φυλῶν.

4) **Παλαιομογγολίδαι.** Οὗτοι είναι οἱ νεώτεροι τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου καὶ ζοῦν εἰς τὸ Σιάμ καὶ τὰς νοτιοανατολικὰς νήσους τῆς Ἀσίας.

5) **Ινδιανίδαι.** Είναι τὸ τμῆμα τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου, τὸ δποῖον ἐπέρασεν εἰς τὴν Ἀμερικήν. Ἀλλοτε εἶχον ἀναπτύξει ἐκεῖ ἰσχυρὰ κράτη, τὰ δποῖα κατεστράφησαν τελειωτικῶς ὑπὸ τῶν ἀποικῶν τῆς Ἀμερικῆς. Σήμερον βαίνουν οἱ Ινδιανίδαι πρὸς τὴν ἔξακτην ποφάνισιν, μὴ δυνάμενοι νὰ προσαρμοσθοῦν εἰς τὸν εύρωπαϊκὸν πο-

λιτισμόν. Εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικὴν καλοῦνται συνήθως Ἐρυθρόδερμοι (εἰκ. 57) καὶ ζοῦν ἀκόμη νομαδικῶς.

Σημείωσις. Δευτερεύουσα φυλὴ τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου θεωροῦνται καὶ οἱ Ἐσκιμώοι, οἱ δποῖοι κατοικοῦν εἰς τὴν βόρειον ἀρκτικὴν περιοχὴν (εἰκ. 58).

4. Ο ΝΕΓΡΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ο κλάδος οὗτος περιλαμβάνει φυλάς, αἱ δποῖαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν νοτίαν μεγάλην περιοχὴν τῆς Εὐρωποασίας. Σήμε-



Εἰκ. 57. Ἐρυθρόδερμος.



Εἰκ. 58. Ἐσκιμώος.

ρον εἶναι ἔξηπλωμένος ὁ κλάδος οὗτος εἰς τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Μελανησίαν.

Εἰς τὸν κλάδον τοῦτον παρουσιάζονται ποικίλα ἀναστήματα. Οὕτως ὡρισμέναι φυλαὶ τῆς Ἀφρικῆς παρουσιάζουν τὸ ὑψηλότερον ἀνάστημα, ἐνῷ ἄλλαι τὸ βραχύτερον (Πυγμαῖοι κάτω τῶν 140 ἑκ.). Χαρακτηρίζουν τὸν νεγροειδῆ κλάδον (εἰκ. 59) τὸ μαῦρον χρῶμα τοῦ δέρματος, τὰ χονδρὰ προέχοντα χείλη κλπ.

Αἱ κύριαι φυλαὶ τοῦ κλάδου τούτου εἶναι αἱ ἔξης:

1) **Αἰθιοπίδαι.** Ἡ φυλὴ αὕτη ἔποτε λείπει τὸν κύριον πληθυσμὸν



Εικ. 59. "Ατομα νεγρικής φυλής.

λίας. Αἱ ἀνωτέρω δύο φυλαὶ χαρακτηρίζονται ὡς δευτερεύουσαι φυ-
λαὶ τοῦ νεγροειδοῦς κλάδου.

5. Ο ΕΥΡΩΠΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

'Ο Εύρωποειδής τέλος κλάδος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ ὅποιαι
ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν βορειοδυτικὴν περιοχὴν τῆς Εύρωποασίας.
Πρὸς τὴν Εύρωπην ἔξηπλώθη διὰ δύο διευθύνσεων: διὰ μέσου τῆς
Σιβηρίας καὶ διὰ μέσου τῆς Πρόσω Ασίας. Εἰς τοὺς νεωτέρους χρό-
νους ἔξηπλώθη εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὰς ἄλλας ἡπείρους καὶ πρωτο-
στατεῖ εἰς τὸν πολιτισμόν.


τῆς Ἀβησσουνίας. Λόγω τῆς μα-
κρᾶς ἐπαφῆς τῆς μὲ τὸν εὐρωποει-
δῆ κλάδον, μέσω τῆς Ἀραβίας καὶ
τῆς Αιγύπτου, δὲν παρουσιάζει
ἐντονα τὰ νεγροειδῆ χαρακτηρι-
στικά.

2) Φυλαὶ τῶν σαβανῶν.

Εἰναι ἔξηπλωμέναι εἰς τὴν ζώνην
τῶν σαβανῶν, μεταξὺ τῶν ἑρή-
μων τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ τοῦ
τροπικοῦ δάσους.

3) Παλαινεγρίδαι. Οὗτοι ζοῦν εἰς τὴν τροπικὴν ζώνην.

4) Μελανήσιδαι. Οὗτοι κα-
τοικοῦν ἐκτὸς τῆς Ἀφρικῆς, εἰς
τὰς νήσους ΝΑ τῆς Ἀσίας. Προσέ-
τι εἰς τὸν νεγροειδῆ κλάδον τάσ-
σονται καὶ δύο ἀκόμη φυλαί, αἱ
ὅποιαι παρουσιάζουν τὰ ἀτελέ-
στερα χαρακτηριστικὰ καὶ τείνουν
νὰ ἐκλείψουν, οἱ Πυγμαῖοι καὶ οἱ
Αὔστραλίδαι. Οἱ πρῶτοι διατη-
ροῦνται ἀκόμη εἰς τὸ ἐσωτερικὸν
τῶν τροπικῶν δασῶν καὶ cī δεύ-
τεροι εἰς τὰς ἑρήμους τῆς Αὔστρα-



Εἰκ. 60. Σχηματική παράστασις τῶν τριῶν ζωνῶν ἔξαπλώσεως τῶν φυλῶν τοῦ εὐρωποειδοῦς κλάδου. Α. Βόρειος ζώνη: 1. Βόρειος φυλή, 2. Ἀνατολικοευρ- παϊκή.-Β. Κεντρική ζώνη: 3. Ἀλπική φυλή, 4. Διναρική, 5. Ἀρμενική, 6. Τουρα- νική.-Γ. Νοτία ζώνη: 7. Μεσογειακή φυλή, 8. Ἀνατολική 9. Ἰνδική φυλή.

Διακρίνομεν τρεῖς ζωνας φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου (εἰκ. 60):

Α') τὴν ζώνην τῶν ἀνοικτοχρώμων βορείων φυλῶν. Αὕτη περι- λαμβάνει δύο φυλάς: α') τὴν Βόρειον φυλήν καὶ β') τὴν Ἀνατο- λικοευρωπαϊκήν.

Β') τὴν κεντρικήν ζώνην τῶν βραχυκεφάλων. Αὕτη περι- λαμβάνει τέσσαρας φυλάς: α') τὴν Ἀλπικήν, β') τὴν Διναρικήν, γ') τὴν Ἀρμενικήν καὶ δ) τὴν Τουρανικήν.

Γ') τὴν ζώνην νοτίων Εύρασιατικῶν φυλῶν. Αὕτη πε- ριλαμβάνει τρεῖς φυλάς: α') τὴν Μεσογειακήν, β') τὴν Ἀνατολικήν καὶ γ') τὴν Ἰνδικήν.

Α') Η ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΧΡΩΜΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΦΥΛΩΝ

α') **Βόρειος φυλή.** Τὰ χαρακτηριστικά τῆς φυλῆς αὐτῆς είναι τὰ ἔξης: Δέρμα καὶ κόμη πτωχά εἰς χρωστικήν, ὥστε τὸ δέρμα είναι λευκὸν καὶ ἡ κόμη ξανθή ἢ πυρρόχρωμος καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ γαλανοί.

Πρόσωπον ώσειδες καὶ μύτη εὐθεῖα καὶ στενόμακρος. Ἡ σιαγών προεξέχει καὶ τὸ μέτωπον κυρτοῦται κανονικῶς. Κρανίον δολιχοκέφαλον καὶ ἀνάστημα ὑψηλόν.

Διακρίνομεν ἐντὸς τῆς φυλῆς ταύτης τρεῖς τύπους: τὸν Τευτόβροειον, ἴσχνὸν μὲ ξανθὴν κόμην, τὸν Δανο-βρόειον, μὲ βαρύ σῶμα, πυρρὰν κόμην καὶ πλατύτερον πρόσωπον καὶ τέλος τὸν Φιννο-βρόειον, λεπτόν, μὲ πυρρὰν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτοχρώμους ὁφθαλμούς.

Ἡ Βόρειος φυλὴ εἶναι ἔξηπλωμένη κυρίως εἰς τὴν Βόρειον Εὐρώπην καὶ ἀνέκαθεν, λόγω τῆς ἀγονίας τοῦ ἑδάφους, παρουσιάζει μετακινήσεις. Εἶναι γνωσταὶ ἐκ τῆς Ἰστορίας αἱ πολλαὶ ἐπιδρομαὶ τῶν βορείων πρὸς τὴν Νότιον Εὐρώπην. Οὕτω π.χ. κατῆλθον τὰ Ἰνδογερμανικὰ ἔθνη μέχρι τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δώδεκα περίπου αἰῶνας π.Χ. "Ἐν τοιοῦτον φῦλον ἡσαν οἱ Δωριεῖς. Τὸν δον αἰῶνα π.Χ. κατέρχονται οἱ Κέλται εἰς τὴν Ἰβηρικὴν Χερσόνησον. Τὸν 3ον καὶ 4ον αἰῶνα μ.Χ. βόρεια ἔθνη κατέρχονται μέχρι τῆς Βαλκανικῆς, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Ἰταλίας (Γότθοι).

Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους τὰ βόρεια ἔθνη ἰδρυσαν τὰς μεγαλύτερας ἀποικίας καὶ ἔξηπλώθησαν εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικήν, τὴν Αύστραλίαν, τὴν Νέαν Ζηλανδίαν κλπ.

β') **Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ φυλὴ.** Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς αὐτῆς εἶναι: Ἀνάστημα συνήθως μέτριον, χρῶμα στακτόξανθον εἰς τὴν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτὸν εἰς τὸ δέρμα καὶ τοὺς ὁφθαλμούς, ἡ ρίς εἶναι μικρὰ καὶ ἀνεγείρεται κατὰ τὸ ἄκρον, τὸ δὲ στόμα εἶναι σχετικῶς μεγάλον καὶ τὸ ὄλον πρόσωπον στρογγύλον. Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν τὰ Σλαβικά ἔθνη, τὰ ὅποια κατοικοῦν τὴν Ἀνατολικὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Βόρειον Ἀσίαν, δηλαδὴ μίαν περιοχὴν εύφορον, πεδινὴν καὶ πλουσίαν εἰς δάση καὶ ἔλη.

Ἡ Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ εἶναι ἡ γονιμωτέρα φυλὴ τοῦ εὐρωποειδοῦς κλάδου, ἀριθμοῦσα σήμερον περίπου 230 ἑκατομμύρια ψυχῶν.

B') Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΩΝ

α') **Ἀλπικὴ φυλὴ.** Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς ταύτης εἶναι τὰ ἔξης: ἀνάστημα μέτριον, σῶμα συχνὰ παχύ, κεφαλὴ στρογγύλη. Ἡ ρίς εἶναι μικρά, ἡ ἀπόστασις δὲ μεταξὺ τῶν ὁφθαλμῶν

μεγάλη. Κρανίον βραχυκέφαλον καὶ χρῶ-
μα κόμης ὄρφνον.

‘Η Ἀλπικὴ φυλὴ κατοικεῖ εἰς τὴν ὄρεινήν
καὶ δασώδη Κεντρικὴν Εύρωπην. Τμῆμα τῆς
φυλῆς ταύτης εἶναι καὶ οἱ Λάπωνες, οἱ
όποιοι, ἀποχωρισθέντες αὐτῆς, ζοῦν νομαδι-
κῶς εἰς τὴν Βόρειον Σκανδιναύιαν (εἰκ. 61).

β') Διναρικὴ φυλὴ. Αὕτη εἶναι ἔξηπλω-
μένη ἀνατολικῶς τῆς προηγουμένης, κυρίως
εἰς τὰς ὄρεινὰς περιοχὰς τῶν Διναρικῶν Ἀλ-
πεων. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλότατον ἀνά-
στημα καὶ ἰσχυράν βραχυκεφαλίαν. Τὸ κρα-
νίον πρὸς τὰ ὄπίσω εἶναι ἐπίπεδον καὶ ἡ ρίς
κυρτή. Τὸ χρῶμα τῶν τριχῶν καὶ τοῦ δέρμα-
τος εἶναι βαθὺ (εἰκ. 2).

γ') Ἀρμενικὴ φυλὴ. Αὕτη παρουσιάζει ὁμοιότητα μὲ τὴν Δινα-
ρικὴν καὶ μὲ τὴν ἐπομένην Τουρανικὴν φυλὴν. Παρουσιάζει ἀνάστημα
μέτριον, μέτωπον ἀπότομον καὶ ρίνα μεγάλην καὶ κεκαμμένην.

δ') Τουρανικὴ φυλὴ. Αὕτη εἶναι ἔξηπλωμένη εἰς τὴν περιοχὴν
τῆς Ἀνατολίας. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, βραχυκεφαλίαν,
μέτωπον ἀπότομον. Τὰ ζυγωματικὰ τόξα προεξέχουν. Τρίχωμα
ἰσχυρὸν καὶ χειλη στενά.



Εἰκ. 62. *Ατομον τῆς Δινα-
ρικῆς φυλῆς.



Εἰκ. 61. Λαππωνίς.

Γ') Η ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΑ- ΣΙΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

α') Μεσογειακὴ φυλὴ (εἰκ. 63). Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον ἡ μικρόν,
πρόσωπον ὥοειδές καὶ κρανίον δολιχοκέ-
φαλον. Δέρμα μελαχροινὸν καὶ κόμη ἐλα-
φρῶς κυματοειδῆς. Σωματικὰ ἀναλογίαί
ὁμοιάζουσαι μὲ τὰς τῆς Βορείου φυλῆς.

‘Η φυλὴ αὕτη εἶναι ἔξηπλωμένη
εἰς τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Εύ-
ρωπης, ιδίως εἰς τὴν Ἰβηρικήν. Συναν-
τάται ἐπίσης καὶ εἰς πολλὰς ὅλλας πε-
ριοχάς, χωρὶς ὅμως συνοχήν.

Τοιαῦται περιοχαὶ εἰναι ἡ Ἰρλανδία, ἡ Οὐαλλία, ἡ Ρουμανία, ἡ Νότιος Γαλλία, ἡ Βόρειος Ἀφρική. Διὰ τῶν Ἰσπανικῶν καὶ Πορτογαλικῶν ἀποικιῶν ἔξηπλώθη εἰς τὴν Νότιον καὶ Κεντρικὴν Ἀμερικὴν. Εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειον ἔχει ἀναμιχθῆ μὲ πλείστας φυλάς.

β) Ἀνατολικὴ φυλή. Αὕτη εἰναι κυρίως ἔξηπλωμένη εἰς τὰς ξηρὰς περιοχὰς τῆς Πρόσω Ασίας (Ἀραβία, Μεσοποταμία, Συρία κλπ.). Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν καὶ οἱ Ἀραβεῖς καὶ οἱ Ἐβραῖοι.

γ) Ἰνδικὴ φυλή. Αὕτη εἰναι ἔξηπλωμένη εἰς τὸ Ἀφγανιστάν καὶ τὰς Ἰνδίας. Μερικὰ ἐκ τῶν χαρακτηριστικῶν της εἰναι: χρῶμα δέρματος βαθὺ καὶ ἐνίστε ἀραβοσιτόχρουν, μέτωπον στενόν, κνῆμαι καὶ ἀντιβραχίονες λεπτοί.

Σημείωσις. Εἰς τὸν εύρωποιδῆ κλάδον τάσσονται καὶ ώρισμέναι δευτερεύουσαι φυλαί. Ἐκ τούτων ἀνσφίρομεν τὴν φυλὴν Ἀινώ, ἡ ὅποια ζῇ εἰς τὰς βορείους νήσους τῆς Ιαπωνίας.

6. ΦΥΛΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΞΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ἀνωτέρω ἀναφέραμεν τοὺς τρεῖς κλάδους ἀνθρωπίνων φυλῶν καὶ εἴδομεν • ὅτι ἕκαστος ἔξ αὐτῶν περιλαμβάνει ώρισμένας κυρίας φυλάς, τὰς ὅποιας περιεγράψαμεν, καὶ ἐγνωρίσαμεν τὰς γενικὰς γραμμὰς τῆς γεωγραφικῆς κατανομῆς των. Πλὴν τούτων ἕκαστος κλάδος εἴδομεν ὅτι περιλαμβάνει καὶ ώρισμένας δευτερευούσας φυλάς, αἱ ὅποιαι γενικῶς εἰναι ἀριθμητικῶς μικραί. Ἐκ τῶν δευτερευουσῶν τούτων φυλῶν μερικαὶ ἀποτελοῦν διαμέσους τύπους μεταξὺ τῶν διαφόρων κλάδων.

Τὰς ἀνωτέρω περιγραφείσας φυλάς δὲν συναντῶμεν μόνον εἰς τὰς ἀντιστοίχως ἀναφερθείσας περιοχάς. Ἀντιθέτως σήμερον καὶ ἐκτὸς τῶν περιοχῶν τούτων ἀνευρίσκομεν πολυπληθεῖς ὁμάδας τῶν διαφόρων φυλῶν. Ἀπὸ τὰς ἀρχικὰς περιοχὰς τῶν διαφόρων φυλῶν



Εἰκ. 63. Ἀτομον τῆς Μεσογείακης φυλῆς.

μέγας ἀριθμὸς ἀτόμων ἔχει μεταφερθῆ ἀλλοῦ. ‘Ως διδάσκει ἡ Ἱστορία, ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν διαφόρων φυλῶν εἶναι ζωηρὰ καὶ γίνεται εἴτε δι’ εἰρηνικούς σκοπούς (μεταναστεύσεις κλπ.), εἴτε διὰ πολεμικούς (ἐπιδρομαί, κατακτήσεις κλπ.).

Οὕτω π.χ. εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικὴν ύπαρχουν σήμερον ἑκατομμύρια Κινέζων καὶ Νέγρων, οἱ δὲ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἔξηπλωμένοι εἰς τὰ περισσότερα μέρη τῆς γῆς.

Ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν διαφόρων φυλῶν ἐπέφερε τὴν μῖξιν αὐτῶν. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθησαν ποικίλοι ἀνθρωπολογικοὶ τύποι, ἐκτὸς τῶν τυπικῶν φυλῶν.

Διὰ τοῦτο γενικῶς εἰς μίαν χώραν, ἵδιως ἔχουσαν μακρὰν Ἱστορίαν, δὲ πληθυσμὸς δὲν παρουσιάζει πλήρη φυλετικὴν ὁμοιομορφίαν. Ἐπομένως τὰ ἔθνη δὲν περιλαμβάνουν ἄτομα ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ μόνον ἀνθρωπολογικοῦ τύπου.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν τὰς φυλὰς μεταξύ των, διότι ἐκάστη παρουσιάζει ἐν σύνολον γνωρισμάτων, τὰ ὅποια εἶναι κληρονομικὰ καὶ ἐμφανίζονται εἰς δῆλα τὰ ἄτομα τῆς φυλῆς, μὲν μικράς διαφοράς.

Εἰς ώρισμένον τόπον δὲν κατοικοῦν πάντοτε ἄτομα καταγόμενα ἀπό γονεῖς οἱ ὅποιοι ἀνήκουν καὶ οἱ δύο εἰς τὴν αὐτήν φυλήν. Διὰ τοῦτο δὲ πληθυσμὸς ἐνὸς τόπου δὲν παρουσιάζει, γενικῶς, φυλετικὴν ὁμοιομορφίαν.

Γενικωτάτη διάίρεσις δύναται νὰ γίνῃ εἰς τρεῖς κλάδους : α') τὸν Εὐρωποειδῆ· β') τὸν Μογγολοειδῆ καὶ γ') τὸν Νεγροειδῆ. “Ἐκαστος κλάδος περιλαμβάνει ώρισμένας κυρίας φυλάς, αἱ ὅποιαι δύνανται πάλιν καὶ περαιτέρω νὰ ύποδιαιρεθοῦν.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Κεφ. Α'.—Ο σκελετός τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος

1.-Σχηματισμός και ύψη των δόστων.-2.Σύνδεσις των δόστων.-3.Μέρη του σκελετού. I. 'Ο σκελετός της κεφαλής: α') "Οστά του κρανίου, β') Τά δόστα του προσώπου. II. 'Ο σκελετός του κορμού: α) Σπονδυλική στήλη, β') 'Ο σκελετός του θώρακος III. 'Ο σκελετός των ἄκρων: α') 'Ο σκελετός των ὀμών και των ἀνών ἄκρων (χειρῶν) · β') 'Ο σκελετός της λεκάνης και των κάτω ἄκρων (ποδῶν) 4. Περιλήψις.-5. Διάφοροι παρατηρήσεις και ἀσκήσεις.

Κεφ. Β'.—Οι μάνες τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος 25

1. Οι μύες, αἱ μυῖκαι ἵνες.—2. Γραμμωτοὶ μύες καὶ τρόπος τῆς ἔργασίας αὐτῶν.—3. Οἱ λειοὶ μύες.—4. Ὁ μυῖκὸς τόνος.—5. Περιληψις.—6. Διάφοροι παραστηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.

Κεφ. Γ'. — Αἱ προσλαμβανόμεναι ὑπὸ τοῦ ὄργανισμοῦ οὐσίαι. Αἱ καύσεις. Ἀνταλλαγὴ τῆς ὕλης καὶ ἐνέργειας. 29

1. Αἱ θρηπτικαὶ οὐσίαι.—2. Ὑδωρ καὶ ἀνόργανα ἄλστα.—3. Ὑδατάνθρακες καὶ καῦσις.—4. Αἱ λιπαραὶ οὐσίαι.—5. Λευκώμαστα.—6. Αἱ Βιταμῖναι.—7. Αἱ λειτουργίαι τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὑλῆς.—8. Περιλήψις.

Κεφ Δ'.—Μορφολογική έπισκόπησις τῆς στοματικῆς κοιλότητος. Οι
άδαντες 34

1. Ή στοματική κοιλότης.—2. Οι όδόντες.—3. Διάφοροι παραστηρήσεις και ύσκρησις.—4. Περίληψις.

Κεφ. Ε' — Πέψις. Ἀπομύζησις καὶ ἀφομοίωσις τῶν προιόντων τῆς πέψεως

¹ Ή πέντις ή πεπτικός σωλήνας; Στόμα μάγνησης σίδηρος κατάποσης

τοῦ βλαμοῦ.—3. Φάρυγξ καὶ οἰσοφάγος. Στόμαχος καὶ γαστρικὸν ύγρον.—4. Λεπτὸν ἐντερον, πάγκρεας, ἡπαρ, χοληδόχος κύστις. Συμπλήρωσις τῆς πέψεως.—5. Ἀπομύζησις τῶν προιόντων τῆς πέψεως διὰ τῶν λαχνῶν τοῦ ἐνέρου.—6. Ἀφομίωσις τῶν προιόντων τῆς πέψεως.—7. Παχὺ ἐντερον, βακτηρίδια τοῦ ἐντέρου, περιττώματα.—8. Ἐπίδρασις ξένων λευκωμάτων ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ.—9. Περιληψις.	44
Κεφ. Σ'.—Ἡ ἀναπνοὴ	
1. Τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα.—2. Αἱ ἀναπνευστικαὶ κινήσεις.—3. Περιληψις.—4. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	48
Κεφ. Ζ'.—Ο λάρυγξ καὶ ἡ παραγωγὴ τῆς φωνῆς	
1. Ἡ κατασκευὴ τοῦ λάρυγγος. Τρόπος παραγωγῆς τῆς φωνῆς. 2. Χαρακτῆρες τῆς φωνῆς. Ἀρθρωσις αὐτῆς εἰς φθόγγους. Λόγος.—3. Περιληψις.—4. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	51
Κεφ. Η'.—Ἡ κυκλοφορία τοῦ αἷματος καὶ τῆς λέμφου. Ἡ ἀπέκκρισις	
1. Τὸ αἷμα.—2. Ἡ καρδία καὶ τὰ ἀγγεῖα.—3. Διόδος τοῦ αἵματος διὰ τῶν νεφρῶν. Ἀπέκκρισις.—4. Διόδος τοῦ αἵματος διὰ τοῦ ἡπατοῦ.—5. Ἡ ασκόπησις τῆς μικρᾶς καὶ τῆς μεγάλης κυκλοφορίας.—6. Ἡ κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων.—7. Ἡ λέμφος καὶ τὸ λεμφικὸν σύστημα.—8. Σχηματισμὸς καὶ καταστροφὴ τῶν αἱμοσφαιρίων.—9. Περιληψις.—10. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	62
Κεφ. Θ'.—Μορφολογικὴ ἀνασκόπησις τῆς θωρακικῆς καὶ τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος	
1. Ἀδένες. Ἐνδοκρινεῖς ἀδένες. Ἀδένες διπλῆς λειτουργίας.—2. Αδένες ἔσω ἐκκρίσεως.—3. Περιληψις.	64
Κεφ. Ι'.—Αἱ ἔκκρισεις	
1. Ἀδένες. Ἐνδοκρινεῖς ἀδένες. Ἀδένες διπλῆς λειτουργίας.—2. Αδένες ἔσω ἐκκρίσεως.—3. Περιληψις.	67
Κεφ. ΙΑ'.—Τὸ νευρικὸν σύστημα	
1. Ἐρεθίσματα, ἀντιδράσεις. Τὰ νεῦρα. Τὰ τμῆματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος. Ἡ ιδιαιτέρα σημασία τοῦ ἐγκεφάλου.—2. Τὸ ἐγκεφαλονωτιστικόν νευρικὸν σύστημα: α') τὸ κεντρικὸν τμῆμα, β') τὸ περιφερικὸν τμῆμα, γ') ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐρεθίσματος.—3. Τὸ φυτικὸν νευρικὸν σύστημα.—4. Ὁ ὑπνος.—5. Περιληψις.	75
Κεφ. ΙΒ'.—Αἱ αἰσθήσεις	
1. Αἰσθητικὰ σωμάτια τοῦ δέρματος.—2. Αἰσθητήριον τῆς γεύσεως.—3. Τὸ αἰσθητήριον τῆς ὁσφρήσεως.—4. Τὸ αἰσθητήριον δργανῶν τῆς δράσεως. Κατασκευὴ τῶν ὁφθαλμῶν. Σχηματισμὸς τοῦ εἰδῶλου. Προσαρμογὴ τοῦ ὁφθαλμοῦ. Προστασία τοῦ ὁφθαλμοῦ. Ἀνωμαλίαι τῆς δράσεως.—5. Τὸ αἰσθητήριον τῆς ἀκοῆς καὶ τοῦ χώρου. Ἔξω οὖς. Μέσον οὖς. Ἐσω οὖς.—6. Τὸ αἰσθημα τοῦ πόνου.—7. Περιληψις.—8. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	75

Κεφ. ΙΓ'.— Τὸ δέρμα.	86
1. Στοιβάδες τοῦ δέρματος. Ὑποδόριος ίστος. Περιτονία.—2. Ἐξαρτή- ματα τοῦ δέρματος. Χρῶμα τοῦ δέρματος και τῶν τριχῶν.—3. Περίληψις.	
Κεφ. ΙΔ'.— Ἡ συνεργασία τῶν διαφόρων συστημάτων καὶ ἡ προσαρμο- στικὴ λειτουργία τοῦ ὁ γανισμοῦ	89
1. Ἡ συνεργασία τῶν συστημάτων τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἡ προσαρμογή εἰς τὰς ἐπισυμβαίνουσας μεταβολάς. (Παραδείγματα αἱμορραγίας και διατηρήσεως τῆς θερμοκρασίας).—2. Ἀποτέλεσμα τῆς συχνῆς διεγέρ- σεως τῆς προσαρμοστικῆς λειτουργίας. Σκληραγωγία. (Παράδειγμα ζωῆς εἰς ὑψηλά μέρη).—3. Περίληψις.	

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. Γενικὰ περὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰς τὰ φυτὰ και τὰ ζῶα.—2. Ἐμ- βρυικὴ ἀνάπτυξις. — 3. Αἱ ἡλικίαι τοῦ ἀνθρώπου. — 4. Περίληψις.	
5. Διάφοροι παρατηρήσεις και ἀσκήσεις	93

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Φυσικὸν και κοινωνικὸν περιβάλλον. Ἐπικοινωνία τοῦ ὄργανισμοῦ και τοῦ περιβάλλοντος.—2. Ἐπίδρασις ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ λόγω τῆς προσλήψεως ούσιῶν ἐκ τοῦ περιβάλλοντος.—3. Ἐπίδρασις ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ τῶν φυσικῶν συνθηκῶν τοῦ περιβάλλοντος.—4. Ἐπίδρασις ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ διαφόρων μικροοργανισμῶν.—5. Περίληψις.	97
---	----

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΦΥΛΑΙ

1. Ποια γνωρίσματα χρησιμεύουν διὰ τὴν διάκρισιν τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν. Ἔννοια τῆς φυλῆς. 2. Αἱ τρεῖς μεγάλαι περιοχαὶ τῆς Εύρωπος- σίας. Τρεῖς μεγάλοι κλάδοι φυλῶν.—3. Ὁ Μογγολοειδῆς κλάδος. Αἱ φυλαί, τὰς ὅποιας περιλαμβάνει. 4. Ὁ Νεγροειδῆς κλάδος. 5. Ὁ Εύ- ρωποειδῆς κλάδος:: α') Ἡ ζώνη τῶν ἀνοικτοχρωμάτων βορείων φυ- λῶν' β') Ἡ κεντρική ζώνη τῶν βραχυκεφάλων γ') Ἡ ζώνη τῶν ιο- τίων Εύρασιστικῶν φυλῶν — 6. Φυλαὶ και ἔθνη. Ἐπικοινωνία και μίξις τῶν φυλῶν.—7. Περίληψις	98
---	----

ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΑΙΩΝΗ

ΕΛΛΑΣ



21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ



0020557947

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

*Έκδοσις ΙΘ' 1970 (V) - *Άντιτυπα 90.000 - Σύμβασις 2028/9-4-70

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ : Ι. ΔΙΚΑΙΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ - ΚΟΥΚΙΑΣ



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής