

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής





Δ 2 ΜΜ 1

Νικολάου (Νικ. Β.)

ΝΙΚΟΛ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άριστοβαθμίου διδάκτορος και πρώην καθηγητού των Μαθηματικών εν τῇ προτύπῳ
Βαρβακίῳ Σχολῇ τοῦ Λυκείου τῆς Μ. Ἐκπαιδεύσεως

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΕΚΔΟΣΙΣ Γ'

Ἡ μόνη ἐγκριμένη διὰ τὴν πενταετίαν 1932 - 1937

« Ἀποτελεῖ δὲ τοῦτο πλήρες
καὶ χρησιμώτατον ἐφόδιον διὰ
τοὺς ἐν τοῖς Πρακτικοῖς Λυ-
κείοις φοιτῶντας μαθητάς ».

(Ἐκ τῶν ἐκθέσεων τῶν κ. κ.
Εισηγητῶν)

ΕΔΩΡΗΣΑΤΟ

Ἐπιθ. Οἶκος Ἰάκωβ Δελαγραμμάτικα
αὐξ. ἀριθ. εἰσαγ. 1280 τοῦ ἔτους 1932

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΔΗΜ. ΤΖΑΚΑ, ΣΤΕΦ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ & ΣΙΑ
81 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 81
1932

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ωλ
KΛΣ
ΣΤΒΒ
23'82

Πάν γνήσιον αντίτυπον φέρει τήν ὑπογραφήν τοῦ
συγγραφέως καί τήν σφραγίδα τῶν ἐκδοτῶν.



Handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Σ. Τζακας'.

Handwritten text in purple ink, possibly a date or reference number, including '1980'.

ΤΥΠΟΙΣ: ΑΝΑΣΤ. Κ. ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ 20 ΑΘΗΝΑΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Κ. ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

«Διαπραγματευομένη την ύλην τῆς Τριγωνομετρίας εὐρύτερον ἢ ἡ τοῦ Γυμνασίου, ἀκολουθοῦσα τὴν ὀρθὴν ἀπὸ μεθοδικῆς καὶ γλωσσικῆς ἀπόψεως ὁδὸν δύναται νὰ ἐπαρκέσῃ εἰς τὰς ἀνάγκας τοῦ προγράμματος».

ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ

«Ἡ ὕλη τοῦ βιβλίου τούτου εἶναι καλῶς καὶ μεθοδικῶς διατεταγμένη καὶ διεξαγομένη. Ἀποτελεῖ δὲ τοῦτο πλῆρες καὶ χρησιμώτατον ἐφόδιον διὰ τοὺς ἐν τοῖς Πρακτικοῖς Λυκείοις φοιτῶντας μαθητάς».

Γ. ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

«Διάταξις ὕλης μεθοδική. Περιέχει τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀπαιτεῖ τὸ πρόγραμμα τῶν Λυκείων».

Α. ΚΝΙΘΑΚΗΣ

«Αἱ παρατηρήσεις ὅμως αὗται, αἱ περισσότεραι τῶν ὁποίων εἶναι ἐπουσιώδεις, δὲν μειώνουν τὴν πραγματικὴν ἀξίαν τοῦ βιβλίου ὡς καὶ τὴν ἐπαινετὴν προσπάθειαν τοῦ συγγραφέως, ὅπως παρουσιάσῃ τὸ ὑπὸ κρίσιν βιβλίον, ὅσον τὸ δυνατὸν ἀρτιώτερον δεδομένου, ὅτι τὴν ὕλην ἀρκετὰ καλῶς διαπραγματεύεται ἀπὸ τε μεθοδικῆς καὶ γλωσσικῆς ἀπόψεως, τὰς δὲ ἀσκήσεις μετὰ περισσοῦς ἐπιμελείας ἐξελέξατο».

Θ. ΠΑΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Κ. ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

...αποφασιστικότητά της όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων...
...από την άποψη της αποτελεσματικότητας...
...από την άποψη της αποτελεσματικότητας...

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

...Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική...
...και απαιτείται η συνεργασία όλων των φορέων...
...και η υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων...

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

...Η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται...
...από την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων...

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

...Η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται...
...από την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων...
...και η υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων...
...και η υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων...
...και η υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων...

ΕΠΙΛΟΓΕΣ


ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


§ 1 **Πρόβλημα Αον.** Τριγώνου τινός μία γωνία είναι $\frac{1}{2}$ δευτέρας γωνίας, αι δὲ πλευραὶ αὐτῆς ἔχουσι μῆκος $0,025^μ$ ἢ μὲν καὶ $0,04^μ$ ἢ ἄλλη. Πόσον εἶναι τὸ μῆκος τῆς τρίτης πλευρᾶς καὶ τὸ μέγεθος ἑκατέρας τῶν ἄλλων γωνιῶν αὐτοῦ ;

Λύσις. Κατασκευάζομεν τρίγωνον $ΑΒΓ$ (Σχ. 1) ἔχον $Α = \frac{1}{2}$ δευτ., $(ΑΒ) = 0,025^μ$ καὶ $(ΑΓ) = 0,04^μ$. Μετροῦντες εἶτα τὴν πλευρὰν $ΒΓ$ καὶ τὰς γωνίας $Β$ καὶ $Γ$ αὐτοῦ εὐρίσκομεν ὅτι $(ΒΓ) = 0,028^μ$, $Β = 95^ο$ καὶ $Γ = 40^ο$.

Πρόβλημα Βον. Τριγώνου $ΑΒΓ$ μία πλευρὰ ἔχει μῆκος $6400^μ$, αὐτὴν γωνία εἶναι $45^μ$ ἢ μὲν καὶ $36^ο$ ἢ ἄλλη. Πόσον εἶναι τὸ μῆκος ἑκατέρας τῶν ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ ;



(Σχ. 1)



(Σχ. 2)

Λύσις. Κατασκευάζομεν τρίγωνον $αβγ$ (Σχ. 2) τοιοῦτον ὥστε $(βγ) = 6400^μ \cdot \frac{1}{100000} = 0,064^μ$, $β = 45^ο$ καὶ $γ = 36^ο$ · μετροῦντας εἶτα τὰς ἄλλας πλευρὰς αὐτοῦ εὐρίσκομεν ὅτι $(αβ) = 0,0375^μ$ καὶ $(αγ) = 0,046^μ$. Ἐπειδὴ δὲ τὰ τρίγωνα $ΑΒΓ$ καὶ $αβγ$ εἶναι ὁμοια, ἔπεται ὅτι :

$$(ΑΒ) = 0,0375^μ \times 100000 = 3750^μ$$

$$\text{καὶ } (ΑΓ) = 0,046^μ \times 100000 = 4600^μ.$$

§ 2. **Σκοπὸς τῆς Τριγωνομετρίας.** — Ἡ γραφικὴ αὕτη μέθοδος, τὴν ὁποίαν μετεγερθεὶς ἔσθηνμεν διὰ τὴν λύσιν τῶν προηγουμένων χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

προβλημάτων, ἅτινα ὡς παραδείγματα ἐλάβομεν, ἀγεί εἰς ἐξαγόμενα ἐνέχοντα σημαντικὰ πολλάκις σφάλματα. Ταῦτα προέρχονται τὸ μὲν ἐκ τῆς ἀτελείας τῶν γεωμετρικῶν ὀργάνων, ὧν γίνεται χρῆσις, τὸ δὲ καὶ ἐξ ἀδεξίας τυχόν αὐτῶν χρήσεως περὶ τὴν κατασκευὴν καὶ μέτρησιν. Ἐνισχύονται δὲ ταῦτα σημαντικῶς, ὅταν γίνηται χρῆσις ὁμοίων σχημάτων. Οὕτω π. χ. ἂν τὸ μήκος τῆς αγ (Σχ. 2) εὐρέθη μὲ σφάλμα 0,001", τὸ μήκος τῆς ΑΓ θὰ ἔχη σφάλμα $0,001 \times 100000 = 100''$.

Διὰ τὴν ἀποφυγὴν τῶν τοιούτων σφαλμάτων ἐξητήθη καὶ ἀνευρέθη μέθοδος καθαρῶς λογιστικῆ, διὰ τῆς ὁποίας ὀρίζονται, μεθ' ἱκανῆς προσεγγίσεως, αἱ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων στοιχείων τριγώνου, ὅταν ἱκανὰ πρὸς τοῦτο στοιχεῖα αὐτοῦ δοθῶσιν. Ἡ ἐκθεσις τῆς μεθόδου ταύτης ἀποτελεῖ τὸν σκοπὸν τῆς Τριγωνομετρίας. Ὡστε :


Σκοπὸς τῆς Τριγωνομετρίας εἶναι ὁ διὰ λογισμοῦ προσδιορισμὸς τῶν ἀγνώστων στοιχείων τριγώνου, ὅταν ἱκανὰ πρὸς τοῦτο στοιχεῖα αὐτοῦ δοθῶσι.

Σημ. Ἐπειδὴ πᾶν ἄλλο εὐθ. σχῆμα ἀναλύεται εἰς τρίγωνα, δύναται νὰ ἐπεκταθῆ ὁ σκοπὸς τῆς Τριγωνομετρίας καὶ εἰς τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἀγνώστων στοιχείων παντὸς εὐθ. σχήματος, ὅταν ἱκανὰ πρὸς τοῦτο στοιχεῖα αὐτοῦ δοθῶσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'ον

ΑΝΥΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΕΠΙ ΑΞΟΝΑ

§ 3. **Ὅρισμὸς καὶ στοιχεῖα ἀνύσματος.** Ἐπὶ εὐθείας τιμῆς χ'χ (Σχ.3) ἔστωσαν δύο σημεῖα Α καὶ Β. Κινητὸν τι σημεῖον, ὅπερ ἀναχωροῦν ἐκ τοῦ Α καὶ ἐπὶ τῆς χ'χ κινούμενον σταματᾷ εἰς τὸ Β,



(Σχ. 3)

διαγράφει τὸν δρόμον ΑΒ, τὸν ὅποιον καλοῦμεν **ἀνύσμα**. Τὸ σημεῖον Α καλεῖται **ἀρχή**, τὸ Β **τέλος** καὶ ἀμφότερα **ἄκρα** τοῦ ἀνύσματος ΑΒ καλοῦνται. Ἡ δὲ ἐκ τοῦ Α πρὸς τὸ Β φορά, καθ' ἣν γίνεται ἢ προρρηθεῖσα κίνησις καλεῖται, **φορὰ** τοῦ ἀνύσματος ΑΒ.

Ὅμοιος, ἂν κινητὸν τι σημεῖον ἀναχωροῦν ἐκ τοῦ Δ καὶ ἐπὶ τῆς χ'χ κινούμενον σταματᾷ εἰς τὸ Γ, ὅπερ

ἔχει ἀρχὴν τὸ Δ, τέλος τὸ Γ καὶ φορὰν τὴν ἐκ τοῦ Δ πρὸς τὸ Γ.
Ὡστε :

Ἄνυσμα καλεῖται τμήμα εὐθείας, τὸ ὁποῖον νοεῖται διαγραφὴν ὑπὸ σημείου κινουμένου ἐπ' αὐτῆς κατὰ τινα φορὰν.

Ἀρχὴ ἀνύσματος καλεῖται τὸ σημεῖον, ἐξ οὗ ἤρξατο κινούμενον τὸ κινητὸν σημεῖον, ὅπως διαγράψῃ τὸ ἄνυσμα τοῦτο.

Τέλος ἀνύσματος καλεῖται τὸ σημεῖον, εἰς ὃ κατέληξε τὸ κινητὸν, ὅπερ διέγραψε τὸ ἄνυσμα τοῦτο.

Ἄκρα ἀνύσματος καλοῦνται ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος αὐτοῦ.

Φορὰ ἀνύσματος καλεῖται ἡ φορὰ, καθ' ἣν κινεῖται τὸ κινητὸν, διὰν διέγραφεν αὐτό.

Κατὰ ταῦτα εἰς ἕκαστον ἄνυσμα διακρίνομεν ἀρχὴν, τέλος καὶ φορὰν.

Ἐκαστον ἄνυσμα ὀνομάζομεν διὰ τῶν γραμμάτων τῶν ἀκρῶν αὐτοῦ προτάσσοντες πάντοτε τὸ γράμμα τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ. Συνήθως δὲ ὑπεράνω τῶν γραμμάτων τούτων χαράσσομεν ὀριζόντιον εὐθ. τμήμα. Οὕτω τὸ σύμβολον \overline{AB} δηλοῖ τὸ ἄνυσμα, ὅπερ ἔχει ἀρχὴν Α, τέλος Β καὶ φορὰν τὴν ἐκ τοῦ Α πρὸς τὸ Β.

§ 4. Ἄξων — Διευθύνον ἄνυσμα ἄξονος — Θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ ἀνύσματα. — Ἐπὶ εὐθείας χ'χ. (Σχ. 3) κινητὸν τι σημεῖον δύναται γὰρ κινηθῆν εἴτε κατὰ τὴν ἐκ τοῦ χ' πρὸς τὸ χ, εἴτε κατὰ τὴν ἀντίθετον ταύτης φορὰν. Ἴνα διακρίνωμεν ταύτας ἀπ' ἀλλήλων, καλοῦμεν τὴν μὲν μίαν θετικὴν, τὴν δὲ ἄλλην ἀρνητικὴν φορὰν. Πρὸς καθορισμὸν τῆς θετικῆς φορᾶς ἐπὶ εὐθείας τίνος χ'χ λαμβάνομεν ἐπ' αὐτῆς κατὰ βούλησιν ἄνυσμά τι ΟΘ, ὅπερ θεωροῦμεν ὡς μονάδα τῶν ἀνυσμάτων, τὰ ὁποῖα κείνται ἐπ' αὐτῆς ἢ ἐπὶ ἄλλης παραλλήλου εὐθείας. Ἡ φορὰ τοῦ ἀνύσματος τούτου ΟΘ καλεῖται θετικὴ φορὰ τῆς εὐθείας, ἐφ' ἣς κείται τοῦτο καὶ πάσης παραλλήλου ταύτης.

Πᾶσα εὐθεῖα, ἐφ' ἣς εἶναι ὠρισμένη ἡ θετικὴ, κατ' ἀκολουθίαν δὲ καὶ ἡ ἀρνητικὴ φορὰ, καλεῖται ἄξων.

Τὸ ἄνυσμα ΟΘ ἄξονός τινος χ'χ, ὅπερ λαμβάνεται ὡς μονὰς τῶν ἀνυσμάτων καὶ δι' οὗ ὀρίζεται ἡ θετικὴ φορὰ ἐπ' αὐτοῦ, καλεῖται διευθύνον ἄνυσμα τοῦ ἄξονος τούτου καὶ παντὸς ἄλλου παραλλήλου αὐτῷ.

Ἐκαστον ἄνυσμα ἄξονός τινος καλεῖται θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν, καθ' ἕσπον ἔχει θετικὴν ἢ ἀρνητικὴν φορὰν.

Ἡ ἀρχὴ Ο τοῦ διευθύνοντος ἀνύσματος ἄξονός τινος διαιρεῖ αὐτὸν εἰς δύο μέρη ἀπέραντα κοινὴν ἔχοντα ἀρχὴν τὸ Ο. Ἐκ τούτων

τὸ μὲν περιέχον τὸ διευθύνον ἄνυσμα $ΟΘ$ καλεῖται *θετικὸς ἡμιάξων* τὸ δ' ἕτερον ἀρνητικὸς ἡμιάξων. Οὕτως $Οχ$ (Σχ. 3) εἶναι ὁ θετικὸς ἡμιάξων καὶ $Οχ'$ ὁ ἀρνητικὸς ἡμιάξων τοῦ ἀξονος $χ'χ$.

§ 5. Ἄνύσματα ὁμόροπα, ἀντίροπα, ὁμορόπως ἴσα, ἀντιρόπως ἴσα, ἀντίθετα. — Τὰ ἀνύσματα $ΑΒ$ καὶ $ΓΔ$ (Σχ. 3), ἅτινα κείνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἢ ἐπὶ παραλλήλων ἀξόνων καὶ ἔχουσι τὴν αὐτὴν φορὰν, καλοῦνται *ὁμόροπα* ἀνύσματα. Τὰ δὲ $ΑΒ$ καὶ $ΔΓ$ ἔχοντα ἀντίθετον φορὰν καλοῦνται *ἀντίροπα* ἀνύσματα. Ὡστε;

Τὰ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἢ παραλλήλων ἀξόνων κείμενα ἀνύσματα καλοῦνται ὁμόροπα μὲν, ἂν ἔχωσι τὴν αὐτὴν φορὰν, ἀντίροπα δέ, ἂν ἔχωσιν ἀντίθετον φορὰν.


Συνήθως τὰ ἀντίροπα ἀνύσματα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὰ αὐτὰ ἄκρα, καλοῦνται ἀντίθετα ἀνύσματα. Τοιαῦτα π. χ. εἶναι τὰ $\overline{ΑΒ}$ καὶ $\overline{ΒΑ}$ (Σχ. 3)

Ἐὰν δύο ἀνύσματα εἶναι ὁμόροπα καὶ ἐφαρμοσίμα, καλοῦνται *ὁμορόπως ἴσα*· ἔαν δὲ εἶναι ἀντίροπα καὶ ἐφαρμοσίμα, καλοῦνται *ἀντιρόπως ἴσα*.

§ 6. Διαδοχικὰ ἀνύσματα. — *Συνισταμένη αὐτῶν.* — Τὸ ἄνυσμα $ΒΓ$ (Σχ. 3) ἔχει ἀρχὴν τὸ σημεῖον $Β$, τὸ ὁποῖον εἶναι τέλος τοῦ $\overline{ΑΒ}$. Διὰ τοῦτο τὰ $\overline{ΑΒ}$ καὶ $\overline{ΒΓ}$ λέγονται *διαδοχικὰ* ἀνύσματα. Τοιαῦτα εἶναι καὶ τὰ $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΓΔ$ (Σχ. 3), ὁμοίως δὲ καὶ τὰ $ΕΖ$, $ΖΗ$, $ΗΘ$, $ΘΚ$ (Σχ. 4).

Γενικῶς: *Δύο ἢ πλείονα ἀνύσματα λέγονται διαδοχικά, ἔαν ἀρχὴ ἐκάστου (πλὴν τοῦ α') εἶναι τὸ τέλος τοῦ προηγουμένου.*

Κινητὸν διαγράφων κατὰ σειρὰν τὰ $\overline{ΕΖ}$, $\overline{ΖΗ}$, $\overline{ΗΘ}$, $\overline{ΘΚ}$, (Σχ. 4)



(Σχ. 4)

μεταβαίνει ἐκ τοῦ $Ε$. εἰς τὸ $Κ$. Εἶναι δὲ εὐνόητον ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο ἐπέρχεται καὶ ἂν διὰ μιᾶς διαγράψῃ τὸ ἄνυσμα $ΕΚ$, ὅπερ ἔχει ἀρχὴν μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου, τέλος δὲ τὸ τέλος τοῦ τελευταίου τῶν ῥηθέντων ἀνυσμάτων. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον τὸ $ΕΚ$ καλεῖται *συνισταμένη ἢ γεωμετρικὸν ἄθροισμα* τῶν

$\overline{ΕΖ}$, $\overline{ΖΗ}$, $\overline{ΗΘ}$, $\overline{ΘΚ}$. Ὅμοίως τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΓΔ$, (Σχ. 3) συνισταμένη εἶναι τὸ $\overline{ΑΔ}$.

Ὅστε : **Συνισταμένη ἢ γεωμ. ἄθροισμα διαδοχικῶν ἀνυσμάτων καλεῖται τὸ ἄνυσμα, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀρχὴν μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου, τέλος δὲ τὸ τέλος τοῦ τελευταίου τῶν ἀνυσμάτων τούτων.**

Τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα ἀνυσμάτων σημειοῦμεν θέτοντες μεταξὺ τῶν παριστάντων ταῦτα συμβόλων τὸ σημεῖον $\#$. Οὕτως ἡ παράστασις $\overline{EZ} \# \overline{ZH} \# \overline{HO} \# \overline{OK}$ δηλοῖ τὸ γεωμ. ἄθροισμα τῶν ἐν αὐτῇ ἀνυσμάτων, ἦτοι τὸ \overline{EK} .

Τοῦτο δὲ δηλοῦμεν συνήθως οὕτω :


$$\overline{EZ} \# \overline{ZH} \# \overline{HO} \# \overline{OK} \equiv \overline{EK}.$$

2HM. — Ἐὰν τὸ τέλος τοῦ τελευταίου τῶν προστιθεμένων διαδοχικῶν ἀνυσμάτων συμπίπτῃ μὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου, ἡ συνισταμένη αὐτῶν εἶναι σημεῖον.

§ 7. Γινόμενον ἄνυσματος ἐπὶ ἀριθμὸν.—

Α'. Ἐστω τυχὸν ἄνυσμα \overline{AB} κείμενον ἐπὶ τινος ἄξονος $\chi\chi'$ (Σχ. 5), ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ ἢ ἐπὶ ἐτέρου παραλλήλου ἄξονος ἔστωσαν τρία ἄνυσματα $\overline{\Gamma\Delta}$, καὶ $\overline{\Delta\epsilon}$ καὶ \overline{EZ} διαδοχικὰ καὶ ὁμορρόπως ἴσα τῷ \overline{AB} . Ἡ συνισταμένη $\overline{\Gamma Z}$ τούτων καλεῖται γινόμενον τοῦ \overline{AB} ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν 3. Ὁμοίως ἡ συνισταμένη $\overline{\Gamma\epsilon}$ τῶν $\overline{\Gamma\Delta}$ καὶ $\overline{\Delta\epsilon}$ καλεῖται γινόμενον τοῦ \overline{AB} ἐπὶ 2.

Γενικῶς : **Γινόμενον ἄνυσματος ἐπὶ ἀκέραιον καὶ θετικὸν ἀριθμὸν μ καλεῖται ἡ συνισταμένη μ ἀνυσμάτων ὁμορρόπως ἴσων αὐτῷ.**



(Σχ. 5)


Ἐκαστον τῶν μ τούτων ἀνυσμάτων (ἢ ἄλλο ἄνυσμα ὁμορρόπως ἴσον ἐκάστῳ τούτων) καλεῖται $\frac{1}{\mu}$ τῆς συνισταμένης αὐτῶν.

Οὕτω τὸ \overline{AB} εἶναι $\frac{1}{3}$ μὲν τοῦ $\overline{\Gamma Z}$, $\frac{1}{2}$ δὲ τοῦ $\overline{\Gamma\epsilon}$.

Β'. Τὸ ἄνυσμα $\overline{\Gamma\eta}$ (Σχ. 6) εἶναι συνισταμένη τῶν διαδοχικῶν ἀνυσμάτων $\overline{\Gamma\Delta}$, $\overline{\Delta\epsilon}$, \overline{EZ} , \overline{ZH} . Τούτων τὰ μὲν $\overline{\Gamma\Delta}$ καὶ $\overline{\Delta\epsilon}$ εἶναι ὁμορρόπως ἴσα τῷ \overline{AB} , τὸ \overline{EZ} εἶναι ὁμορρόπως ἴσον πρὸς τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ \overline{AB} καὶ τὸ \overline{ZH} εἶναι ὁμορρόπως ἴσον πρὸς τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ \overline{AB} .

Τὸ ἄνυσμα τοῦτο $\overline{\Gamma\eta}$ καλεῖται γινόμενον τοῦ \overline{AB} ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν

$(1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4})$. Όμοίως, ἂν ἄνυσμά τι εἶναι συνισταμένη τριῶν ἄνυσμάτων ὁμορρόπως ἴσων τῷ \overline{AB} , δύο ἄνυσμάτων ὁμορρόπως ἴσων τῷ $\frac{1}{10}$ τοῦ \overline{AB} καὶ ἑνὸς ἄνυσματος ὁμορρόπως ἴσου



(Σχ. 6)

πρὸς τὸ $\frac{1}{100}$ τοῦ \overline{AB} , καλεῖται γινόμενον τοῦ \overline{AB} ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν

$$(1+1+1+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{100}).$$

Εἰς ἀμφότερα τὰ παραδείγματα ταῦτα ἡ συνισταμένη τῶν θεωρηθέντων ἄνυσμάτων γίνεται ἐκ τοῦ \overline{AB} καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ, ὡς ὁ πολ)τῆς γίνεται ἐκ τῆς ἀκέραιας μονάδος καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο συμβαίνει καὶ ὅταν ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι ἀκέραιος ἔπεται ὅτι :

Γινόμενον ἄνυσματος ἐπὶ ἀριθμὸν θετικὸν καλεῖται τὸ ἄνυσμα, ὅπερ γίνεται ἐξ αὐτοῦ καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ, ὡς ὁ ἀριθμὸς γίνεται ἐκ τῆς ἀκέραιας μονάδος καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς.

Κατὰ ταῦτα τὸ γινόμενον ἄνυσματος ἐπὶ θετικὸν ἀριθμὸν ἀποτελεῖται ἐξ ἄνυσμάτων διαδοχικῶν καὶ ὁμορρόπων πρὸς αὐτό. Εἶναι ἄρα ἄνυσμα ὁμόρροπον αὐτῷ.

Γ'. Τὸ ἄνυσμα \overline{EG} (Σχ. 6) εἶναι γινόμενον τοῦ \overline{BA} ἐπὶ τὸν 2. Τὸ ἄνυσμα τοῦτο \overline{EG} καλοῦμεν καὶ γινόμενον τοῦ \overline{AB} ἐπὶ (-2). Όμοίως τὸ ἄνυσμα \overline{ZG} , ὅπερ εἶναι γινόμενον τοῦ \overline{BA} ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν $(1+1+\frac{1}{2})$, καλεῖται καὶ γινόμενον τοῦ \overline{AB} ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν $-(1+1+\frac{1}{2})$.

Ὡστε : **Γινόμενον ἄνυσματος ἐπὶ ἀρνητικὸν ἀριθμὸν καλεῖται τὸ γινόμενον τοῦ ἀντιθέτου ἄνυσματος ἐπὶ τὸν ἀντίθετον τοῦ πολ)στοῦ ἀριθμὸν.**

Κατὰ ταῦτα τὸ γινόμενον ἄνυσματος ἐπὶ ἀρνητικὸν ἀριθμὸν ἀποτελεῖται ἐξ ἄνυσμάτων διαδοχικῶν καὶ ἀντιρρόπων πρὸς αὐτό· εἶναι ἄρα ἄνυσμα ἀντίρροπον αὐτῷ.

§ 8. Λόγος ἄνυσματος πρὸς ἄλλο ἄνυσμα.—Τὸ ἄνυσμα \overline{FE} (Σχ. 6) εἶναι γινόμενον τοῦ \overline{AB} ἐπὶ 2. Ὁ ἀριθμὸς 2 λέγεται

λόγος τοῦ $\overline{ΓΕ}$ πρὸς τὸ $\overline{ΑΒ}$. Ὁμοίως, ἐπειδὴ $\overline{ΓΗ} = \overline{ΑΒ} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)$, ὁ ἀριθμὸς $\left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = 2\frac{3}{4}$ καλεῖται λόγος τοῦ $\overline{ΓΗ}$ πρὸς τὸ $\overline{ΑΒ}$. Δι' ὅμοιον λόγον ὁ (-2) καλεῖται λόγος τοῦ $\overline{ΕΓ}$ πρὸς τὸ $\overline{ΑΒ}$ (Σχ. 6).

Ὡστε: **Λόγος ἀνύσματος πρὸς ἄλλο ἀνυσμα κείμενον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἢ παραλλήλου ἄξονος καλεῖται ὁ ἀριθμὸς, ἐφ' ὃν πρέπει νὰ πολυθῇ τὸ δεύτερον ἀνυσμα, ἵνα προκύψῃ τὸ πρῶτον.**

Εἶναι εὐνόητον (§ 7) ὅτι ὁ λόγος ἀνύσματος πρὸς ἄλλο ἀνυσμα εἶναι θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς, καθ' ὅσον τὰ ἀνύσματα ταῦτα εἶναι ὁμόρροπα ἢ ἀντίρροπα.

Ὁ λόγος ἀνύσματος τινος $\overline{ΓΕ}$ πρὸς ἄλλο $\overline{ΑΒ}$ σημειοῦται οὕτω $\frac{\overline{ΓΕ}}{\overline{ΑΒ}}$ ἢ καὶ οὕτω $\frac{\overline{ΓΕ}}{\overline{ΑΒ}}$.

§ 9. Μήκος ἀνύσματος. — Ἐστω $\overline{ΓΔ}$ τυχὸν ἀνυσμα κείμενον ἐπὶ τινος ἄξονος $\chi'\chi$ (Σχ. 6) καὶ $\overline{ΟΘ}$ τὸ διευθύνον αὐτοῦ ἀνυσμα. Ὁ λόγος τοῦ $\overline{ΓΔ}$ πρὸς τὸ $\overline{ΟΘ}$ καλεῖται μήκος τοῦ $\overline{ΓΔ}$. Ὁμοίως ὁ λόγος $\frac{\overline{ΕΒ}}{\overline{ΟΘ}}$ καλεῖται μήκος τοῦ $\overline{ΕΒ}$.

Ὡστε: **Μήκος ἀνύσματος τινος καλεῖται ὁ λόγος αὐτοῦ πρὸς τὸ διευθύνον ἀνυσμα τοῦ ἄξονος, ἐφ' οὗ κεῖται.**

Τὸ μήκος ἀνύσματος τινος $\overline{ΓΔ}$ σημειοῦται συντόμως οὕτω $(\overline{ΓΔ})$.

$$\text{ὥστε } \frac{\overline{ΓΔ}}{\overline{ΟΘ}} = (\overline{ΓΔ}).$$

Τὸ μήκος ἀνύσματος εἶναι θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς, καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι ὁμόρροπον ἢ ἀντίρροπον πρὸς τὸ διευθύνον ἀνυσμα, ἦτοι καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν ἀνυσμα (§ 4).

Τὰ ὁμορρόπως ἴσα ἀνύσματα ἔχουσι ἴσα μήκη, τὰ δὲ ἀντίρροπως ἴσα ἔχουσιν ἀντίθετα μήκη. Κατὰ ταῦτα τὰ ἀντίθετα ἀνύσματα $\overline{ΑΒ}$ καὶ $\overline{ΒΑ}$ ἔχουσιν ἀντίθετα μήκη, ἦτοι

$$(\overline{ΑΒ}) + (\overline{ΒΑ}) = 0.$$

§ 10. Σχέσεις τῶν μηκῶν διαδοχικῶν ἀνυσμάτων τοῦ αὐτοῦ ἄξονος πρὸς τὸ μήκος τῆς συνισταμένης αὐτῶν.


Α'. Ἐστωσαν πρῶτον δύο διαδοχικὰ ἀνύσματα $\overline{ΑΒ}$ καὶ $\overline{ΒΓ}$ κείμενα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄξονος (Σχ. 7).

Ἐὰν τὸ σημεῖον Β κεῖται μετὰ τῶν ἄλλων Α καὶ Γ (Σχ. 7α'), τὰ ἀνύσματα $\overline{ΑΒ}$, $\overline{ΒΓ}$, $\overline{ΑΓ}$ εἶναι ὁμόρροπα καὶ κατ' ἀκολουθίαν οἱ ἀριθμοὶ $(\overline{ΑΒ})$, $(\overline{ΒΓ})$, $(\overline{ΑΓ})$ εἶναι ὁμόσημοι· ἀληθεύει ἄρα προφανῶς ἡ ἰσότης.

$$(\overline{AB}) + (\overline{B\Gamma}) = (\overline{A\Gamma}) \quad (1)$$

Ἐὰν τὸ σημεῖον Γ κεῖται μεταξὺ τῶν ἄλλων (Σχ. 7, β'), ἀληθεύει ἡ ἰσότης $(\overline{A\Gamma}) + (\overline{B\Gamma}) = (\overline{AB})$.

Ἐὰν δὲ εἰς ἀμφοτέρωτα τὰ μέλη αὐτῆς προσεθεῖ ὁ ἀριθμὸς $(\overline{B\Gamma})$, προκύπτει ἡ ἰσότης $(\overline{A\Gamma}) + (\overline{B\Gamma}) + (\overline{B\Gamma}) = (\overline{AB}) + (\overline{B\Gamma})$. Ἐπειδὴ δὲ $(\overline{B\Gamma}) + (\overline{B\Gamma}) = 0$ (§ 9), ἡ προηγούμενη ἰσότης γίνεται $(\overline{A\Gamma}) = (\overline{AB}) + (\overline{B\Gamma})$, ἣτοι ἰσχύει πάλιν ἡ ἰσότης (1).



Ἐὰν τέλος τὸ Α κεῖται μεταξὺ τῶν ἄλλων (Σχ. 7, γ'), ἀληθεύει ἡ ἰσότης $(\overline{BA}) + (\overline{A\Gamma}) = (\overline{B\Gamma})$, ἐξ ἧς διὰ προθέσεως εἰς ἀμφοτέρωτα τὰ μέλη τοῦ ἀριθμοῦ (\overline{AB}) προκύπτει πάλιν ἡ ἰσότης (1).

Β'. Νοήσωμεν ἤδη ὁσαοῦντο σημεῖα Α, Β, Γ, Ι, Κ, Λ, κεῖμενα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄξονος καθ' ὁμοιότητα τάξιν. Ἐὰν ἐφαρμόσωμεν τὴν προηγούμενως ἀποδειχθεῖσαν ἰσότητα (1) ἐπὶ τῶν ἀνυσμάτων, τὰ ὁποῖα ὀρίζονται ὑπὸ τῶν σημείων α') Α, Β, Δ, β') Β, Γ, Δ, γ') Γ, Δ, Λ, καὶ τέλος ὑπὸ τῶν Ι, Κ, Λ, προκύπτουσιν αἱ ἀκόλουθοι ἰσότητες

$$(\overline{AB}) + (\overline{B\Lambda}) = (\overline{A\Lambda})$$

$$(\overline{B\Gamma}) + (\overline{\Gamma\Lambda}) = (\overline{B\Lambda})$$

$$(\overline{\Gamma\Delta}) + (\overline{\Delta\Lambda}) = (\overline{\Gamma\Lambda})$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$(\overline{IK}) + (\overline{K\Lambda}) = (\overline{I\Lambda}).$$

Ἐὰν δὲ προσεθεῖται τὰ ἀντίστοιχα μέλη τῶν ἰσοτήτων τούτων καὶ ἀφαιρεθῶσιν εἴτα οἱ κοινοὶ εἰς ἀμφοτέρωτα τὰ προκύπτοντα ἴσα ἀθροίσματα προσθετοῖ, προκύπτει ἡ ἰσότης

$$(\overline{AB}) + (\overline{B\Gamma}) + (\overline{\Gamma\Delta}) + \dots\dots\dots + (\overline{IK}) + (\overline{K\Lambda}) = (\overline{A\Lambda}). \quad (2)$$

Αἱ ἰσότητες (1) καὶ (2) ἐκφράζουσι τὴν ἀκόλουθον ιδιότητα.

Τὸ ἀθροισμα τῶν μηκῶν διαδοχικῶν ἀνυσμάτων τοῦ αὐτοῦ ἄξονος ἰσοῦται πρὸς τὸ μῆκος τῆς συνισταμένης αὐτῶν.

Ἀσκήσεις. 1) Τῶν σημείων Α, Β, Γ, Λ, Μ ὁποσοῦντο κεκλιμένω ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄξονος, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\Psi\eta\phi\iota\sigma\mu\acute{o}\nu\tau\omega\sigma\tau\epsilon\ \overline{(\overline{AB})} + \overline{(\overline{BC})} + \dots + \overline{(\overline{LM})} = \overline{(\overline{AM})}$$

2) Τῶν σημείων Α, Β, Γ ὁποσδήποτε κειμένων ἐπὶ ἄξονος καὶ Μ ὄντος τοῦ μέσου τοῦ (\overline{AB}) , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$(\overline{GA}) + (\overline{GB}) = 2 (\overline{GM})$$

3) Τῶν σημείων Α, Β, Γ, ὁποσδήποτε κειμένων ἐπὶ ἄξονος καὶ Μ ὄντος τοῦ μέσου τοῦ \overline{BG} νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι : $(\overline{AB}) \cdot (\overline{BG}) = (\overline{AM})^2 - (\overline{BM})^2$.

4) Ἐάν τὰ σημεία Ο, Α, Β κείνται ὁποσδήποτε ἐπὶ ἄξονος καὶ ἕτερον σημείον Μ ἔχῃ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄξονος τοιαύτην θέσιν ὥστε νὰ ἀληθεύῃ ἡ

ἰσότης $\frac{\overline{AM}}{\overline{BM}} = -\frac{\mu}{\nu}$, ν' ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$(\mu + \nu) (\overline{OM}) = \nu (\overline{OA}) + \mu (\overline{OB}).$$

5) Τῶν σημείων Α, Β, Γ, Δ ὁποσδήποτε κειμένων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄξονος, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$(\overline{BG}) (\overline{AD}) + (\overline{GA}) (\overline{BD}) + (\overline{AB}) (\overline{GD}) = 0.$$

§ 11. Ὄρθῃ προβολῇ σημείου καὶ ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα.— Ἐστω Α τυχὸν σημεῖον κείμενον ἐκτὸς ἄξονός τινος χ'χ (Σχ.8) καὶ α ὁ πῦς τῆς ἐκ τοῦ Α ἐπὶ τὸν χ'χ ἀγομένης καθέτου. Ὁ πῦς α καλεῖται ὀρθῇ προβολῇ τοῦ σημείου Α ἐπὶ τὸν ἄξονα χ'χ, ἡ δὲ κάθετος Αα καλεῖται προβάλλουσα τοῦ σημείου Α. Ὁμοίως ὁ πῦς ὁ τῆς καθέτου Ββ εἶναι ὀρθῇ προβολῇ τοῦ Β ἐπὶ τὸν ἄξονα χ'χ καὶ ἡ Ββ εἶναι ἡ προβάλλουσα αὐτοῦ.

Ὡστε : Ὄρθῃ προβολῇ σημείου ἐπὶ ἄξονα καλεῖται ὁ πῦς τῆς καθέτου, ἣν ἀγειται ἐξ αὐτοῦ εἰς τὸν ἄξονα τοῦτον.

Ὁ ἄξων, ἐφ' οὗ κείνται αἱ προβολαί, καλεῖται ἰδιαιτέρως προβολικὸς ἄξων.

Προβάλλουσα σημείου καλεῖται ἡ ἐξ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν προβολικὸν ἄξονα ἀγομένη κάθετος.

Εἶναι εὐνόητον ὅτι ἕκαστον σημεῖον τοῦ προβολικοῦ ἄξονος συμπίπτει μετὰ τῆς προβολῆς αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα τοῦτον.

ΣΗΜ. Χάριν συντομίας τὴν ὀρθὴν προβολὴν θέλομεν πολυλάκις καλεῖν καὶ ἀπλῶς προβολὴν.


Τὸ ἄνυσμα αβ τοῦ ἄξονος χ'χ (Σχ. 8) ἔχει ἀρχὴν τὴν προβολὴν τῆς ἀρχῆς καὶ τέλος τὴν προβολὴν τοῦ τέλους τοῦ ἀνύσματος ΑΒ. Τὸ ἄνυσμα αβ καλεῖται ὀρθῇ προβολῇ τοῦ \overline{AB} ἐπὶ τὸν ἄξονα χ'χ. Ὁμοίως τὸ δβ εἶναι προβολὴ τοῦ \overline{DE} καὶ τὸ ζη προβολὴ τοῦ \overline{ZH} .

Γενικῶς : Ὄρθῃ προβολῇ ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα καλεῖται τὸ ἄνυσμα τοῦ ἄξονος τούτου, ὃπερ ἔχει ἀρχὴν μὲν τὴν προβολὴν τῆς ἀρχῆς, τέλος δὲ τὴν προβολὴν τοῦ τέλους τοῦ ἀνύσματος τούτου.

Τὸ διευθύνον ἄνυσμα ΟΘ ἄξονός τινος ψ'ψ (Σχ 9) ἔχει πρὸ ἕτερον ἄξονα χ'χ προβολὴν ἄνυσμά τι οθ. Τούτου τὸ μήκος, ἦτοι,

ὁ ἀριθμὸς (\overline{ov}) , καλεῖται συντελεστὴς προβολῆς τοῦ ἄξονος $\psi'\psi$ πρὸς τὸν ἄξονα $\chi'\chi$ (1)

Συντελεστὴς δὲ προβολῆς ἀνύσματος πρὸς ἄξονα καλεῖται ὁ πρὸς




(Σχ. 8)

τὸν αὐτὸν ἄξονα συντελεστὴς προβολῆς τοῦ περιέχοντος τὸ ἀνύσμα ἄξονος.

Ὄψτω τοῦ ἀνύσματος \overline{AB} (Σχ. 9) συντελεστὴς προβολῆς πρὸς

τὸν ἄξονα $\chi'\chi$ εἶναι ὁ ἀριθμὸς (\overline{ov}) , ὅστις εἶναι καὶ συντελεστὴς προβολῆς τοῦ $\psi'\psi$ πρὸς τὸν $\chi'\chi$.

§ 12. Προβολικαὶ ἰδιότητες ἀνυσμάτων. — Α'. Ἐστωσαν \overline{AB} καὶ $\overline{\Gamma\Delta}$ δύο ἀνύσματα τοῦ αὐτοῦ ἄξονος $\psi'\psi$ (Σχ. 8) καὶ $\overline{a\beta}$, $\overline{\gamma\delta}$ αἱ



(Σχ. 9)

προβολαὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸν ἄξονα $\chi'\chi$. Ἐπειδὴ αἱ εὐθεῖαι $\psi'\psi$ καὶ $\chi'\chi$ τέμνονται ὑπὸ τῶν παραλλήλων εὐθειῶν $A\alpha$, $B\beta$, $\Gamma\gamma$, $\Delta\delta$, ἔπεται ὅτι

(1) Ὑπενθυμίζομεν ὅτι (\overline{ov}) εἶναι ὁ λόγος τοῦ \overline{ov} πρὸς τὸ διευθύνον ἀνύσμα τοῦ ἄξονος $\chi'\chi$, ὅπερ δύναται νὰ εἶναι τυχὸν ἀνύσμα τοῦ ἄξονος $\chi'\chi$ κατὰ βούλησιν ἡμῶν ὀριζόμενον. (§ 9.)

τέμνονται εις μέρη ανάλογα, ἤτοι ἰσχύει μεταξὺ τῶν τμημάτων πᾶ τῶν ἀπολύτως θεωρουμένων ἢ ἰσότης

$$\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ τῶν ἀνυσμάτων AB καὶ ΓΔ ὄντων ὁμορρόπων ἢ ἀντιρρόπων καὶ αἱ προβολαὶ αὐτῶν εἶναι ὁμόρροπα ἢ ἀντίρροπα ἀνύσματα, ἢ ἰσότης (1) ἀληθεύει καὶ ὅταν εἰς τὰ εὐθ. τμήματα AB, ΓΔ, αβ, γδ δοθῶσι τὰ προσήκοντα σημεῖα (§ 8), ἤτοι ἀληθεύει αὕτη καὶ διὰ τὰ ἀνύσματα AB, ΓΔ αβ, γδ, ὥστε :

$$\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \quad (2)$$

Ἐστῶσαν ἔτι δύο ἀνύσματα AB καὶ Γ'Δ' κείμενα ἐπὶ παραλλήλων ἀξόνων ψ'ψ καὶ z'z (Σχ. 8) καὶ αβ, γδ αἱ προβολαὶ αὐτῶν ἐπὶ τινι ἀξονα χ'χ. Ἐστω δὲ ΓΔ τὸ ἀνυσμα τοῦ ἀξονος ψ'ψ, ὅπερ περιέχεται μεταξὺ τῶν προβαλλουσῶν Γ'γ καὶ Δ'δ· εἶναι φανερόν ὅτι τὰ ἀνύσματα ΓΔ καὶ Γ'Δ' ἔχουσι τὴν αὐτὴν προβολὴν γδ ἐπὶ τὸν χ'χ καὶ εἶναι ἴσα. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἰσότητι (2) τεθῆ ἀντὶ τοῦ ΓΔ, τὸ Γ'Δ' προκύπτει ἢ ἰσότης.

$$\frac{AB}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \quad (3)$$

Αἱ ἰσότητες (2) καὶ (3) ἐκφράζουσιν ὅτι :

Ὁ λόγος δύο ἀνυσμάτων κειμένων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἢ ἐπὶ παραλλήλων ἀξόνων ἰσοῦται τῷ λόγῳ τῶν προβολῶν αὐτῶν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀξονα.

B'. Ἐκ τῆς ἰδιότητος ταύτης ἔπεται εὐκόλως ὅτι :

Τῶν ὁμορρόπως ἢ ἀντιρρόπως ἴσων ἀνυσμάτων αἱ προβολαὶ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀξονα εἶναι ἀνύσματα ὁμορρόπως ἢ ἀντιρρόπως ἴσα.

Γ'. — Ἐφαρμόζοντες τὴν πρώτην τῶν προηγουμένων ἰδιοτήτων εἰς ἀνυσμά τι AB καὶ τὸ διευθύνον ἀνυσμα OΘ τοῦ ἀξονος ψ'ψ, ἐφ' οὗ κεῖται τὸ AB (Σχ. 9), εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα $\frac{AB}{(O\Theta)} = \frac{\alpha\beta}{o\theta}$ ἐξ ἧς προκύπτει εὐκόλως ἢ ἰσότης $(\overline{AB}) = \frac{\overline{\alpha\beta}}{o\theta}$, ὅθεν

$$(\overline{\alpha\beta}) = (\overline{AB}) (\overline{o\theta}).$$

Ἄρα. Τὸ μήκος τῆς ἐπὶ ἀξονα προβολῆς ἀνύσματος ἰσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ μήκους αὐτοῦ ἐπὶ τὸν συντελεστὴν προβολῆς τοῦ ἀνύσματος τούτου πρὸς τὸν προβολικὸν ἀξονα.

Ἀσκήσεις. 6) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι αἱ προβολαὶ ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονας παραλλήλους εἶναι ἀνύσματα ὁμορρόπως ἴσα.

7) Δεδομένων τῶν ἐπὶ ἄξονα προβολῶν α καὶ β τῶν ἄκρων ἀνύσματος AB , νά εὐρεθῇ ἡ προβολὴ τοῦ μέσου αὐτοῦ.

8) Δεδομένων τῶν ἐπὶ ἄξονα προβολῶν α καὶ δ τῶν ἄκρων ἀνύσματος AB , νά εὐρεθῇ ἡ προβολὴ τοῦ σημείου M τοῦ \overline{AB} , δι' ὃ εἶναι $\frac{\overline{AM}}{\overline{BM}} = \frac{1}{4}$

9) Ἄνυσμα μήκους $0,12\mu$ ἔχει πρὸς ἄξονα $\chi'\chi$ συντελεστὴν προβολῆς $0,05\mu$. Πόσον εἶναι τὸ μήκος τῆς προβολῆς αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα $\chi'\chi$;

10) Ἄνυσματος μήκους $1,20\mu$, ἡ προβολὴ ἐπὶ ἄξονά τινα ἔχει μήκος $0,6\mu$. Ποῖος εἶναι ὁ συντελεστὴς προβολῆς τοῦ ἀνύσματος τούτου πρὸς τὸν προβολικὸν ἄξονα;

11) Ποῖος εἶναι ὁ συντελεστὴς προβολῆς ἄξονος πρὸς ἕτερον ἄξονα παράλληλον αὐτῷ;

12) Ποῖος εἶναι ὁ συντελεστὴς προβολῆς ἄξονος πρὸς ἕτερον κάθετον ἐπ' αὐτόν;

13) Δεδομένων τῶν ἐπὶ ἄξονα προβολῶν τῶν κορυφῶν τριγώνου νά εὐρεθῇ ἡ προβολὴ τοῦ κοινοῦ σημείου τῶν διαμέσων αὐτοῦ.


§ 13 Προβολὴ τεθλασμένης γραμμῆς ἐπὶ ἄξονα. — **Προβολικαὶ ἰδιότητες τῶν τεθλασμένων γραμμῶν.** — Ἐστω $AB\Gamma\Delta E$ (Σχ. 10) τυχοῦσα τεθλασμένη γραμμὴ καὶ AE ἡ συνισταμένη αὐτῆς, ἥτοι ἡ συνισταμένη τῶν πλευρῶν αὐτῆς ὡς ἀνυσμάτων θεωρουμένων.

Ἡ ἐπὶ τυχόντα ἄξονα $\chi'\chi$ προβολὴ \overline{ae} τῆς συνισταμένης \overline{AE} καλεῖται **προβολὴ** τῆς τεθλασμένης ταύτης γραμμῆς ἐπὶ τὸν $\chi'\chi$. Ὅμοίως τὸ ἀνυσμα ζ εἶναι προβολὴ τῆς τεθλασμένης γραμμῆς $ZH\Theta I$ (Σχ. 10).

Γενικῶς: **Προβολὴ τεθλασμένης γραμμῆς ἐπὶ ἄξονα** καλεῖται ἡ **προβολὴ τῆς συνισταμένης αὐτῆς ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα.**

Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τούτου ἔπονται εὐκόλως αἱ ἑξῆς ἰδιότητες.

Α'. — **Δύο τεθλασμέναι γραμμαὶ τὰ αὐτὰ ἔχουσαι ὁμώνυμα ἄκρα ἔχουσι τὴν αὐτὴν προβολὴν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα.**



(Σχ. 10)

Β'. Ἡ ἐπὶ ἄξονα προβολὴ κλειστῆς τεθλασμένης γραμμῆς εἶναι σημεῖον.

Γ'. — Ἐπειδὴ $\overline{αε} \equiv \overline{αε} \neq \overline{εγ} \neq \overline{γδ} \neq \overline{δε}$, ἔπεται (§ 10) ὅτι
 $(\overline{αε}) = (\overline{αε}) + (\overline{εγ}) + (\overline{γδ}) + (\overline{δε})$. Ἄρα.

Τὸ μῆκος τῆς προβολῆς τεθ. γραμμῆς ἐπὶ ἄξονα ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν μηκῶν τῶν προβολῶν τῶν πλευρῶν αὐτῆς ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα.

Ἀσκήσεις. 14) Τρία ἀνύσματα AB, ΒΓ, ΓΑ συνιστῶσι τὴν περίμετρον τριγώνου ABΓ. Νὰ ὀρισθῇ ἡ προβολὴ τῆς περιμέτρου ταύτης ἐπὶ ἄξονα διερχόμενον διὰ τῆς κορυφῆς Α, ἣτις θεωρεῖται ἀρχὴ τοῦ πρώτου ἀνύσματος.


15) Ἐάν $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ εἶναι κατὰ σειρὰν οἱ συντελεσταὶ προβολῆς τῶν πλευρῶν AB, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ τετραπλεύρου ABΓΔ πρὸς τινὰ ἄξονα, ἔχ' ἤ γὰ ἀποδείχθῃ ὅτι :

$$(\overline{AB})\lambda_1 + (\overline{ΒΓ})\lambda_2 + (\overline{ΓΔ})\lambda_3 + (\overline{ΔΑ})\lambda_4 = 0$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βον

ΤΟΞΑ. -- ΓΩΝΙΑΙ

§ 11. Μέτροις τόξου. — Μέτρον τόξου. — Ἐστω AB τυχόν τόξον τῆς περιφερείας Κ (Σχ. 11) καὶ AM ἕτερον τόξον τῆς αὐτῆς (ἢ ἄλλης ἴσης) περιφερείας, ὅπερ λαμβάνεται ὡς μονὰς τῶν τόξων.



(Σχ. 11)

Ἡ σύγκρισις τοῦ τόξου AB πρὸς τὸ \overline{AM} , ἦτοι ἡ εὕρεσις τοῦ λόγου $\frac{\overline{AB}}{\overline{AM}}$ κα-

λεῖται **μέτροις** τοῦ τόξου AB. Ὁ δὲ λόγος $\frac{\overline{AB}}{\overline{AM}}$ καλεῖται **μέτρον** τοῦ τόξου

AB καὶ παρίσταται συντόμως οὕτω (\overline{AB}) . Ὀμοίως ὁ ἀριθμὸς $\frac{\overline{ΓΔ}}{\overline{AM}} = (\overline{ΓΔ})$

εἶναι τὸ μέτρον τοῦ $\overline{ΓΔ}$.

Γενικῶς : **Μέτρον τόξου καλεῖται ὁ λόγος αὐτοῦ πρὸς τὴν μονάδα τῶν τόξων :**

§ 12. Μονάδες τόξων. — Αἱ συνήθεις μονάδες τῶν τόξων εἶναι αἱ ἀκόλουθοι.

α'. Ἡ **μοῖρα** (^ο), ἦτοι τὸ $\frac{1}{360}$ τῆς περιφερείας. Ἐκάστη μοῖρα

διαίρεται εἰς 60 πρώτα λεπτά (') καὶ ἕκαστον πρῶτον λεπτὸν εἰς 60 δεύτερα λεπτά (").

β'. Ὁ βαθμὸς, ἦτοι τὸ $\frac{1}{400}$ τῆς περιφερείας. Ἐκαστος βαθμὸς

διαίρεται εἰς 100 πρώτα λεπτά καὶ ἕκαστον πρῶτον λεπτὸν εἰς 100 δεύτερα λεπτά.

Συνήθως ἀνωθεν καὶ δεξιὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὅστις δηλοῖ βαθμοῦς, τίθεται τὸ γράμμα γ' ὅπου 25' σημαίνει τόξον 25 βαθμῶν.

γ'. Τὸ ἀκτίνιον, ἦτοι τόξον, ὅπερ ἔχει μῆκος ἴσον πρὸς τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τῆς περιφερείας, εἰς ἣν τοῦτο ἀνήκει.

Ἐὰν α εἶναι τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος, τὸ μῆκος τῆς περιφερείας εἶναι, ὡς γνωστὸν, 2π, τὸ δὲ τοῦ ἀκτινίου εἶναι α. Τὸ μέτρον ἄρα τῆς περιφερείας εἶναι $\frac{2\pi\alpha}{\alpha} = 2\pi$. Ὁμοίως εὐρίσκουμεν ὅτι μέτρον τῆς

ἡμιπεριφερείας εἶναι π, τοῦ τετρατημορίου περιφερείας εἶναι $\frac{\pi}{2}$

τοῦ ὀγδόου αὐτῆς $\frac{\pi}{4}$ κλπ.

ΣΗΜ. Ἐὰν ληφθῇ ὡς μονὰς \widehat{AM} τόξων ἢ μοῖρα καὶ εἶναι π χ.

$(\widehat{AB}) : (\widehat{AM}) = 30$, μέτρον τοῦ τόξου \widehat{AB} εἶναι ὁ ἀριθμὸς 30. Ἐπειδὴ ὁμοίως τὸ \widehat{AB} γίνεται ἐκ τῆς μοῖρας \widehat{AM} τριακοντάκις ληφθείσης, λέγομεν ὅτι τὸ τόξον \widehat{AB} εἶναι τριακοντα μοιρῶν (30°). Τοῦτο ἰσχύει οἰαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ μονὰς τῶν τόξων, ἦτοι τόξον τι εἶναι π. χ. 25ν, ἂν ὁ λόγος αὐτοῦ πρὸς τὸν βαθμὸν εἶναι 25· ὁμοίως τόξον τι εἶναι π. χ. 40 ἀκτινίων, ἂν ὁ λόγος αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀκτίνιον τόξον εἶναι 40.

§ 16 Σχέσεις τῶν μέτρων τοῦ αὐτοῦ τόξου — Ὑποθετίσθω ὅτι τόξου τινὸς \widehat{AB} (Σχ. 11) μέτρα εἶναι οἱ ἀριθμοὶ μ, β, α, καθ' ὅσον ὡς μονὰς τῶν τόξων λαμβάνεται ἡ μοῖρα, ὁ βαθμὸς ἢ τὸ ἀκτίνιον τόξον· τῆς ἡμιπεριφερείας \widehat{ABE} μέτρα εἶναι, ὡς γνωστὸν, 180, 200 καὶ π. Ἐπειδὴ δὲ ὁ λόγος δύο ὁμοειδῶν μεγεθῶν ἰσοῦται τῇ λόγῳ τῶν μέτρων αὐτῶν, ἔταν μετρηθῶσι διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος, ἔπεται ὅτι :

$$\frac{\widehat{AB}}{\widehat{ABE}} = \frac{\mu}{180}, \quad \frac{\widehat{AB}}{\widehat{ABE}} = \frac{\beta}{200} \text{ καὶ } \frac{\widehat{AB}}{\widehat{ABE}} = \frac{\alpha}{\pi}$$

ἐξ ὧν ἔπεται ὅτι :

$$\frac{\mu}{180} = \frac{\beta}{200} = \frac{\alpha}{\pi}$$

Αἱ ἰσότητες αὗται συνδέουσι τὰ μέτρα τοῦ αὐτοῦ τόξου καὶ τῇ βοήθειᾳ αὐτῶν εἶναι δυνατόν δεδομένου τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν μέτρων τόξου νὰ εὐρωμεν τὰ ἄλλα. Ὄπως, ἂν $\mu = 27^\circ$, εὐρίσκουμεν ὅτι

$$\delta = 27 \cdot \frac{200}{180} = 30^\circ \text{ και } \alpha = 27 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3\pi}{20}$$

Ἀσκήσεις. 16) Πόσων βαθμῶν εἶναι τόξον 30° ;

17) Πόσων μοιρῶν εἶναι τόξον 50° ;

18) Πόσων ἀκτινίων εἶναι τόξον 60° ;

19) Πόσων μοιρῶν εἶναι τόξον $\frac{5\pi}{3}$ ἀκτινίων;

20) Πόσων ἀκτινίων εἶναι τόξον $30^\circ 15'$;

§ 17. Γέννησις τόξου. — Ἐστῶσαν δύο διακεκριμένα ἀπ' ἀλλήλων σημεῖα A και B εἰς ἴσην κείμενα ἀπόστασιν ἀπὸ τρίτου σημείου K (Σχ. 11). Κινητὸν τι σημεῖον ἀπὸ τοῦ A ἀναχωροῦν και πάντοτε εἰς τὴν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ K εὐρισκόμενον ἀπόστασιν δύναται νὰ μεταβῇ εἰς τὸ B εἴτε κινούμενον κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ βέλους δ δεικνυομένην φορᾶν, εἴτε κατὰ τὴν ἀντίθετον ταύτης, ἣν δεικνύει τὸ βέλος γ . Κατὰ τὴν α' περίπτωσιν διαγράφει τὸ τόξον \widehat{AMB} , κατὰ δὲ τὴν β' τὸ $\widehat{A\Delta B}$. Τὸ σημεῖον A καλεῖται **ἀρχή**, τὸ B **τέλος** ἢ **πέρας** και ἀμφότερα **ἄκρα** ἑκατέρου τῶν τόξων τούτων καλοῦνται.

Κατὰ ταῦτα εἰς ἕκαστον τόξον διακρίνομεν **ἀρχήν**, **τέλος** και **φορᾶν**.

§ 18. Γενέουσις τῆς ἐννοίας τοῦ τόξου. — Τὸ κινητὸν σημεῖον, περὶ οὗ προηγουμένως ἐγένετο λόγος, δύναται ἐκ τοῦ A ἀναχωροῦν νὰ καταλήξῃ εἰς τὸ B, ἀφ' οὗ διαγράψῃ ἄπαξ δις, τρίς, κτλ. ὀλόκληρον τὴν περιφέρειαν και τὸ μεταξὺ A και B μέρος αὐτῆς, ὅπερ ἔχει τὴν φορᾶν τῆς κινήσεως τοῦ κινητοῦ σημείου. Ἐκαστος ἐκ τῶν δρόμων τούτων καλεῖται πάλιν τόξον.


Ἵσπε : **Τόξον καλεῖται τυχὸν δρόμος, τὸν ὁποῖον διαγράφει κινητὸν σημεῖον ἐπὶ περιφερείας κατὰ τὴν αὐτὴν φορᾶν και ἐπὶ πεπερασμένον χρόνον κινούμενον.**

Κατὰ τὸν γενικὸν τοῦτον ὀρισμὸν τὸ τόξον δὲν πρέπει νὰ θεωρῆται πλέον, ὡς ἐν τῇ Γεωμετρῖᾳ, ὡς μέρος περιφερείας, διότι ὑπάρχουσι και τόξα μείζονα περιφερείας· κατ' ἀκολουθίαν τούτου ἢ ἀρχή, τὸ τέλος και ἡ φορᾶ δὲν ἀρκοῦσι νὰ ὀρίσωσι τελείως τόξον τι. Ἀπαιτεῖται πλὴν τούτων νὰ ὀρισθῇ και ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀκεραίων περιφερειῶν, τὰς ὁποίας τοῦτο περιέχει. Οὕτω λέγοντες τόξον \widehat{AB} , ὅπερ ἔχει τὴν τοῦ βέλους δ φορᾶν, οὐδὲν ὀρισμένον τόξον δηλοῦμεν, διότι ὑπάρχουσιν ἄπειρα τοιαῦτα τόξα. Ἐὰν ὁμοίως εἴπομεν, τὸ τόξον \widehat{AB} , ὅπερ ἔχει τὴν τοῦ βέλους δ φορᾶν και περιέχει δύο π. χ. ἀκεραίας περιφερείας, δηλοῦμεν τελείως ὀρισμένον τόξον.

§ 19. **Θετική και ἀρνητική φορά ἐπὶ περιφερείας κύκλου.**—**Θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ τόξα.**— Ὡς προηγουμένως (§17) εἴπομεν, κινητόν τι σημεῖον ἀναχωροῦν ἐκ σημείου A περιφερείας τινός (Σχ. 11) δύναται νὰ κινήθῃ ἐπ' αὐτῆς εἴτε κατὰ τὴν φοράν τῆς κινήσεως τῶν δεικτῶν ὠρολογίου (βέλος γ), εἴτε κατὰ τὴν ἀντίθετον ταύτης φοράν (βέλος β). Κατὰ συνθήκην ἢ φορά, καθ' ἣν κινοῦνται οἱ δεικταὶ ὠρολογίου, καλεῖται **ἀρνητικὴ** φορά, ἢ δὲ ἀντίθετος ταύτης καλεῖται **θετικὴ** φορά.

Τὰ τόξα, τὰ ὅποια ἔχουσι θετικὴν φοράν καλοῦνται **θετικὰ** τόξα, τὰ δὲ ἔχοντα ἀρνητικὴν φοράν καλοῦνται **ἀρνητικὰ** τόξα.

Συνήθως θέλομεν προτάσσει τῶν γραμμάτων, δι' ὧν ὀνομάζεται ἀρνητικὸν τόξον, τὸ σημεῖον —, πρὸ δὲ τῶν γραμμάτων, δι' ὧν ὀνομάζεται θετικὸν τι τόξον ἢ οὐδὲν σημεῖον θέτομεν ἢ θέτομεν τὸ +. Οὕτω + \widehat{AB} ἢ καὶ ἀπλῶς \widehat{AB} δηλοῖ τόξον, ἕπερ ἔχει ἀρχὴν A, τέλος B καὶ θετικὴν φοράν, ἦτοι θετικὸν τόξον, ἐν ἣν — $\widehat{\Gamma\Delta}$ δηλοῖ τόξον, ἕπερ ἔχει ἀρχὴν Γ, τέλος Δ καὶ ἀρνητικὴν φοράν. Οὕτω



(Σχ. 12)

διὰ τοῦ σημείου + ἢ — καθορίζεται ἡ φορά ἐκάστου τόξου.

Ἐπειδὴ ὡς μονὰς τῶν τόξων λαμβάνεται πάντοτε θετικὸν τόξον, τὸ μέτρον παντός μὲν θετικοῦ τόξου εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς, παντός δὲ ἀρνητικοῦ τόξου εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς. Οὕτω τοῦ μὲν τεταρτημορίου $\widehat{A\Gamma}$ (Σχ. 12) τὸ μέτρον εἶναι $\frac{\pi}{2}$ τοῦ

δὲ $\widehat{A\Delta}$ τὸ μέτρον εἶναι $-\frac{\pi}{2}$, ἂν ληφθῇ

ὡς μονὰς τῶν τόξων τὸ ἀκτίνιον τόξον.


§ 20. **Ἴσα τόξα.**—**Ἀντίθετα τόξα.**— **Δύο ἢ πλείονα τόξα κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἢ ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν λέγονται ἴσα, ἔὰν τὰ μέτρα αὐτῶν, διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος μεμετρημένων, εἶναι ἴσα.**

Εἶναι δὲ εὐνόητον εἶτι, ἂν δύο ἴσα τόξα κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας ἔχωσι τὴν αὐτὴν ἀρχὴν, ἔχουσι καὶ τὸ αὐτὸ τέλος.

Δύο τόξα κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἢ ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν λέγονται ἀντίθετα, ἔὰν τὰ μέτρα αὐτῶν, διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος μεμετρημένων, εἶναι ἀντίθετα. Οὕτω τὰ τεταρτημόρια $\widehat{A\Gamma}$ καὶ $\widehat{A\Delta}$ (Σχ. 12) εἶναι τόξα ἀντίθετα.

Θεωρήσωμεν ἤδη δύο τόξα ἀντίθετα, τὴν αὐτὴν ἔχοντα ἀρχὴν καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς κείμενα περιφερείας· ἄς ἐξετάσωμεν τίς ἢ ἀμοιβαίαι τῶν περὶ αὐτῶν θέσεις.

Α'. — Ἐστω πρῶτον τόξον τι \widehat{AM} μικρότερον ἡμιπεριφερείας καὶ $\widehat{AM'}$ τὸ ἀντίθετον αὐτοῦ (Σχ. 13). Ἐπειδὴ τὰ μέτρα αὐτῶν εἶναι ἀπολύτως ἴσα, καὶ τὰ τόξα ταῦτα ἀπολύτως θεωρούμενα εἶναι ἴσα, ἤτοι τὸ σημεῖον Α εἶναι μέσον τοῦ τόξου $\widehat{M'AM}$ ἢ ἀκτὶς ἄρα ΚΑ τέμνει δίχα καὶ καθέτως τὴν χορδὴν MM' καὶ κατ' ἀκολουθίαν τὰ ἄκρα Μ καὶ Μ' εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάμετρον Α'ΚΑ.



(Σχ. 13)


Β'. — Ἐστω ἤδη τόξον τι \widehat{AN} μεγαλύτερον μὲν ἀπολύτως ἡμιπεριφερείας, ἀλλὰ μικρότερον περιφερείας, καὶ $\widehat{AN'}$ τὸ ἀντίθετόν του, ὅπερ ἔχει τὴν αὐτὴν ἀρχὴν Α (Σχ. 13). Ἐπειδὴ τὰ μέτρα τῶν τόξων τούτων εἶναι ἀπολύτως ἴσα, καὶ τὰ τόξα ταῦτα ἀπολύτως θεωρούμενα εἶναι ἴσα· ἐὰν δὲ ἀπὸ ἐκατέρου τῶν ἀπολύτως ἴσων τούτων τόξων ἀφαιρεθῇ μία ἡμιπεριφέρεια ἀπολύτως θεωρουμένη, τὰ ὑπολειπόμενα τόξα $\widehat{A'N'}$ καὶ $\widehat{A'N}$ εἶναι ἐπίσης ἀπολύτως ἴσα καὶ ἐκάτερον εἶναι ἀπολύτως μικρότερον ἡμιπεριφερείας· εἶναι ὅθεν τὸ Α' μέσου τοῦ τόξου $\widehat{N'AN}$ καὶ συνεπῶς ἡ χορδὴ NN' τέμνεται δίχα καὶ καθέτως ὑπὸ τῆς ΑΚΑ'. Τὰ ἄκρα ἄρα Ν καὶ Ν', αὐτῶν εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάμετρον ΑΚΑ'.

Γ'. — Ἐὰν τὰ ἀντίθετα τόξα \widehat{AM} καὶ $\widehat{AM'}$ (Σχ. 13) εἶναι τυχόντα, ἐπειδὴ τὰ μέτρα αὐτῶν εἶναι ἀπολύτως ἴσα, ἔπεται ὅτι ἀποτελοῦνται ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἀκεραίων περιφερειῶν (θετικῶν τὸ μὲν, ἀρνητικῶν τὸ δέ), τὰ δὲ μικρότερα ἀπολύτως τῆς περιφερείας μέρη αὐτῶν εἶναι τόξα ἀντίθετα. Ἔνεκα τούτου τὰ ἄκρα αὐτῶν Μ καὶ Μ' εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάμετρον Α'ΚΑ (§ 20 Α' καὶ Β').

Ἄρα : Ἐὰν δύο τόξα ἀντίθετα ἐπὶ τῆς αὐτῆς κείμενα περιφερείας ἔχωσι τὴν αὐτὴν ἀρχὴν, τὰ πέρατα αὐτῶν εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν διὰ τῆς κοινῆς ἀρχῆς αὐτῶν διερχομένην διάμετρον

§ 21. Διαδοχικὰ τόξα. — Ἄθροισμα καὶ διαφορὰ τόξων. — Τὰ τόξα ΑΒ καὶ ΒΓ (Σχ. 14), ὧν τὸ β' ἔχει ἀρχὴν τὸ τέλος Β τοῦ α', καλοῦνται διαδοχικὰ τόξα. Ὅμοίως τὰ \widehat{AB} , $\widehat{B\Gamma}$, $\widehat{\Gamma\Delta}$, $\widehat{\Delta E}$, εἶναι διαδοχικὰ τόξα.

Γενικῶς : Δύο ἢ πλείονα τόξα λέγονται διαδοχικά, ἐὰν ἀρχὴ




(Σχ. 14)

ξων ΑΕ ἐκεῖνο, ὅπερ ἔχει μέτρον τὸ ἄθροισμα

$$(\widehat{AB}) + (\widehat{B\Gamma}) + (-\widehat{\Gamma\Delta}) + (\widehat{\Delta E}).$$

Ἄθροισμα εὐωνόησιτε τόξων ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἢ ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν κειμένων καλεῖται τὸ ἄθροισμα τόξων ἐπὶ τῆς αὐτῆς κειμένων περιφερείας, διαδοχικῶν καὶ ἀντιστοίχως ἴσων ἐκεῖνοις.



(Σχ. 15)

τικὴν ἡμιπεριφέρειαν ΑΒΑ'. Τὰ δύο ταῦτα τόξα καλοῦνται παραπληρωματικὰ τόξα. Ὅμοίως τὰ τόξα ΒΟΟ' καὶ —120°, ὧν τὸ ἄθροισμα εἶναι 180°. Ἥτοι ἡμισυ θετικῆς περιφερείας, εἶναι παραπληρωματικὰ τόξα.

Γενικῶς: Δύο τόξα λέγονται παραπληρωματικά, ἐὰν ἔχωσιν ἄθροισμα ἴσον μιᾷ θετικῇ ἡμιπεριφερείᾳ.

Ἐξετάσωμεν ἤδη τίνα θέσειν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλα τὰ πέρατα δύο τόξων παραπληρωματικῶν, ἅτινα ἔχουσι κοινὴν ἀρχὴν καὶ κείνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας.

Ἐὰν τ εἶναι τὸ μέτρον τόξου τινός ΑΒ (Σχ. 15), τὸ παραπληρωματικὸν αὐτοῦ ἔχει μέτρον 180°—τ. Ἐπειδὴ δὲ 180°—τ=(—τ)+180°, ἐπεται ὅτι τὸ παραπληρωματικὸν τοῦτο τόξον εἶναι ἄθροισμα τόξου τινός ΑΒ', ὅπερ ἔχει (§ 20) μέτρον —τ καὶ τῆς θετικῆς ἡμιπεριφερείας ΒΓΑΚΕ, ἀφ' ἧς ἀφαιρέσῃ τὸ ἐκκεντρικὸν τόξον ΒΓΑΚΕ, ὅπερ εἶ-

ἐκάστου (πλὴν τοῦ α') εἶναι τὸ τέλος τοῦ προηγουμένου.

Ἄθροισμα διαδοχικῶν τόξων κειμένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας καλεῖται τὸ τόξον, ὅπερ ἔχει ἀρχὴν μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου, τέλος δὲ τὸ τέλος τοῦ τελευταίου καὶ μέτρον τὸ ἄθροισμα τῶν μέτρων αὐτῶν. Οὕτω τῶν διαδοχικῶν καὶ μικροτέρων περιφερείας τόξων ΑΒ, ΒΓ, —ΓΔ, ΔΕ ἄθροισμα καλεῖται ἐκ τῶν τό-

εἶναι δὲ εὐνόητον ὅτι καὶ τοῦ τοιοῦτου ἄθροίσματος τὸ μέτρον εἶναι ἄθροισμα τῶν μέτρων τῶν προσθετέων τόξων.

Διαφορὰ δύο τόξων καλεῖται τὸ ἄθροισμα τοῦ μειωτέου τόξου καὶ τοῦ ἀντιθέτου τοῦ ἀφαιρετέου τόξου.

§ 22. Παραπληρωματικὰ τόξα.—


Τὰ μικρότερα περιφερείας θετικὰ τόξα ΑΒ καὶ ΒΑ' (Σχ. 15) ἔχουσι ἄθροισμα τὴν θε-

ναι συμμετρικόν τοῦ Β' πρὸς τὸ κέντρον Κ. Ἐπειδὴ δὲ ἡ γωνία ΓΒΒ' εἶναι ὀρθή, ἢ χορδὴ ΒΓ εἶναι παράλληλος τῇ ΑΑ'. Ἄρα :

Τὰ πέρατα δύο τόξων παραπληρωματικῶν καὶ κοινὴν ἔχόντων ἀρχὴν κείνται ἐπὶ χορδῆς παραλλήλου τῇ διαμέτρῳ, ἣτις διέρχεται διὰ τῆς κοινῆς αὐτῶν ἀρχῆς.

§ 23. **Συμπληρωματικὰ τόξα.**— Τῶν θεικῶν καὶ μικρότερων περιφερείας τόξων ΑΜ καὶ ΜΒ (Σχ. 16) ἄθροισμα εἶναι τὸ θεικὸν τεταρτημόριον \widehat{AB} τῆς περιφερείας Κ

Τὰ δύο ταῦτα τόξα καλοῦνται **συμπληρωματικὰ τόξα**. Ὁμοίως τὰ τόξα 250° καὶ -160° , ὧν τὸ ἄθροισμα εἶναι 90° , ἦτοι θεικὸν τεταρτημόριον περιφερείας, εἶναι συμπληρωματικὰ τόξα.



(Σχ. 16)

Γενικῶς : **Δύο τόξα λέγονται συμπληρωματικά, ἐὰν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν ἰσοῦται πρὸς θεικὸν τεταρτημόριον περιφερείας.**

Ἐξετάσωμεν ἤδη τίνα θέσιν ἔχουσι τὰ πέρατα δύο τόξων συμπληρωματικῶν, ἅτινα ἔχουσι κοινὴν ἀρχὴν καὶ κείνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας.

Ἐὰν τὸ εἶναι τὸ μέτρον τυχόντος τόξου ΑΜ (Σχ. 16), τὸ συμπληρωματικὸν αὐτοῦ ἔχει μέτρον $90^\circ - \tau$. Ἐὰν δὲ τὰ τόξα ταῦτα ὑποθεθῶσιν ἄνισα, τὸ μὲν θὰ ἔχῃ μέτρον μικρότερον, τὸ δὲ μεγαλύτερον 45° . Ἐστω λοιπὸν $\omega = 45^\circ - \omega^\circ$ ὅτε θὰ εἶναι $90^\circ - \tau = 45^\circ + \omega^\circ$. Ἐπειδὴ δὲ τὸ τόξον ΑΔ, ὕπερ εἶναι ἡμισυ τοῦ θεικοῦ τεταρτημορίου \widehat{AB} , ἔχει μέτρον 45° , ἔπεται ὅτι τὸ μὲν τόξον ΑΜ εἶναι ἄθροισμα τοῦ $\widehat{A\Delta}$ καὶ ἑτέρου $\widehat{\Delta M}$ ἔχοντος μέτρον $(-\omega^\circ)$, τὸ δὲ συμπληρωματικὸν αὐτοῦ $\widehat{AM'}$ εἶναι ἄθροισμα τοῦ αὐτοῦ τόξου ΑΔ καὶ ἑτέρου τόξου $\widehat{\Delta M'}$, ὕπερ ἔχει μέτρον ω° . Γὰ τόξα δὲ $\widehat{\Delta M}$ καὶ $\widehat{\Delta M'}$ ἔχοντα ἀντίθετα μέτρα εἶναι ἀντίθετα ἔπειδὴ δὲ ἔχουσι κοινὴν ἀρχὴν Δ, τὰ πέρατα αὐτῶν Μ καὶ Μ' εἶναι (§ 20) συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάμετρον Δ'ΚΔ. Ἄρα :

Τὰ πέρατα τῶν δύο τόξων συμπληρωματικῶν, κοινὴν ἔχόντων ἀρχὴν καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς κειμένων περιφερείας εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάμετρον, ἣτις διέρχεται διὰ τοῦ μέσου τοῦ θεικοῦ τεταρτημορίου, ὕπερ ἔχει τὴν αὐτὴν μὲ τὰ τόξα ἀρχὴν.

ΣΗΜ. Ἐν τῇ ἀποδείξει ὑπετέθησαν τὰ συμπληρωματικὰ τόξα ἄνισα. Ἄν εἶναι ἴσα, ἔκαστον εἶναι 45° , καὶ ἀκολουθίᾳ ἔχουσι ἀμφότερα τὸ ἡμισυ τοῦ θεικοῦ τεταρτημορίου.

αυτό πέρας Δ, ὅπου εἶναι συμμετρικὸν ἑαυτοῦ πρὸς τὴν ΔΚΔ. Ἀληθεύει ἄρα καὶ ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ προηγουμένη ἰδιότης.

Ἀσκήσεις. 21) Δεδομένης κοινῆς τινος ἀρχῆς ν) εὑρεθῆ τὸ πέρασ ἐκάστου τῶν τόξων 45° , 135° , 225° , -45° , -225° καὶ 405° .

22) Δεδομένης κοινῆς τινος ἀρχῆς νά εὑρεθῆ τὸ πέρασ ἐκάστου τῶν τόξων 30° , 60° , -30° , -60° , 150° καὶ 210° .

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΞΩΝ ΤΙΝΩΝ

§ 24. Α'. Τόξα ἔχοντα κοινὰ ὁμόνομα ἄκρα.—

Ἐστώσαν Α καὶ Β δύο τυχόντα σημεῖα περιφερείας τινὸς Κ. (Σχ. 15). Ὡς ἐμάθομεν ἤδη (§ 18, 19), ὑπάρχουσιν ἄπειρα τόξα θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ ἔχοντα ἀρχὴν τὸ Α καὶ τέλος τὸ Β. Ἄς ἐξετάσωμεν, ἂν ὑπάρχη μεταξὺ τῶν μέτρων αὐτῶν σχέσις τις καὶ ποία εἶναι αὕτη.

ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ μέτρον τῆς μὲν θετικῆς περιφερείας εἶναι Γ, τὸ δὲ τοῦ ἐλαχίστου θετικοῦ τόξου ΑΒ (διὰ τῆς αὐτῆς μεμετρημένου μονάδος) εἶναι τ. Τὸ ἀμέσως μεγαλύτερον αὐτοῦ τόξον ΑΒ εἶναι ἄθροισμα μιᾶς θετικῆς περιφερείας καὶ τοῦ προειρημένου ἐλαχίστου θετικοῦ τόξου ΑΒ· ἔχει ἄρα τοῦτο μέτρον $\Gamma + \tau$. Τὸ ἀμέσως τούτου μεγαλύτερον τόξον ΑΒ εἶναι ἄθροισμα αὐτοῦ καὶ μιᾶς ἐπι θετικῆς περιφερείας· ἔχει ἄρα μέτρον $\Gamma + \Gamma + \tau = 2\Gamma + \tau$. Τὸ μετ' αὐτὸ ἔχει μέτρον $3\Gamma + \tau$ καὶ οὕτω καθ' ἐξῆς.

Ἄς ζητήσωμεν ἤδη τὰ μέτρα τῶν διαφορῶν ἀρνητικῶν τόξων ΑΒ. Τὸ ἀπολύτως ἐλάχιστον τούτων $\overline{AA'B}$ εἶναι ἄθροισμα τοῦ ἐλαχίστου θετικοῦ τόξου ΑΒ καὶ τῆς ἀρνητικῆς περιφερείας ΒΑΑ'Β· ἔχει ἄρα μέτρον $\tau + (-\Gamma) = -\Gamma + \tau$. Τὸ μετ' αὐτὸ ἀμέσως ἀρνητικὸν τόξον ΑΒ εἶναι ἄθροισμα τοῦ προηγουμένου καὶ μιᾶς ἐπι ἀρνητικῆς περιφερείας, διὰ τοῦτο ἔχει μέτρον $(-\Gamma + \tau) + (-\Gamma) = -2\Gamma + \tau$, τὸ μετ' αὐτὸ ἔχει μέτρον $-3\Gamma + \tau$ καὶ οὕτω καθ' ἐξῆς.

Κατὰ ταῦτα τὸ μέτρον παντὸς τόξου ΑΒ ἔχει τὴν μορφήν $K\Gamma + \tau$, ἐνθα Κ δύναται νά εἶναι μηδὲν ἢ τυχὸν ἀκέραιος θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς. Ὡστε, ἂν παρασταθῆ διὰ τοῦ χ τὸ μέτρον τυχόντος ἐκ τῶν τόξων ΑΒ, θὰ ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης :

$$\text{ἐξ ἧς προκύπτει ἡ} \quad \chi = K\Gamma + \tau \quad (1)$$

$$\chi - \tau = K\Gamma \quad (2)$$

Ἀμφότεραι αἱ ἰσότητες αὗται ἀληθεύουσιν οὐ μόνον, ὅταν τ εἶναι μέτρον τοῦ ἐλαχίστου θετικοῦ τόξου ΑΒ, ἀλλὰ καὶ ὅταν εἶναι μέτρον τυχόντος ἐκ τῶν τόξων ΑΒ. Τῷ ὄντι ἂν ω εἶναι τὸ μέτρον τοῦ ἐλαχίστου θετικοῦ τόξου ΑΒ, θὰ εἶναι $\tau = \lambda\Gamma + \omega$, διότι τ εἶναι τὸ μέτρον τυχόντος ἐκ τῶν ΑΒ, καὶ $\gamma = \lambda'\Gamma + \omega$, διὰ τὸν αὐτὸν λόγον.

³ Ἐκ τῶν ἰσοτήτων τούτων προκύπτει εὐκόλως ὅτι $\chi - \tau = (\lambda' - \lambda) \Gamma$.

⁴ Ἐὰν δὲ τεθῆ $\lambda' - \lambda = K$, ἵνα εἶναι $\chi - \tau = K \cdot \Gamma$, ὅθεν $\chi = K \cdot \Gamma + \tau$.

⁵ Ἄρα :

Ἐὰν δύο τόξα ἐπὶ τῆς αὐτῆς κείμενα περιφερείας ἔχωσι τὰ αὐτὰ ὁμώνυμα ἄκρα, ἢ διαφορὰ τῶν μέτρων αὐτῶν εἶναι μηδὲν ἢ πολλαπλάσιον (θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν) τοῦ μέτρου θετικῆς περιφερείας.

ΣΗΜ. Ἡ ἰσότης $\chi - \tau = K\Gamma$ λαμβάνει τὰς ἀκολουθοῦσας μορφάς $\chi - \tau = 360^\circ \cdot K$, $\chi - \tau = 400 \cdot K$, $\chi - \tau = 2K\pi$, καθ' ὅσον ὡς μονὰς τῶν τόξων λαμβάνεται ἡ μοῖρα, ὁ βαθμὸς, ἢ τὸ ἀκτίνιον.

§ 25 Β'—Τόξα ἔχοντα κοινὴν ἀρχὴν καὶ πέρατα συμμετρικὰ πρὸς τὴν διὰ τῆς κοινῆς ἀρχῆς αὐτῶν διερχομένην διάμετρον.—Ἐστω τ τὸ μέτρον τυχόντος τόξου AB (Σχ. 15) τὸ ἀντίθετον αὐτοῦ τόξον, ὅπερ ἔχει τὴν αὐτὴν ἀρχὴν A , περατοῦται (§ 20) εἰς τὸ B' συμμετρικὸν τοῦ B πρὸς τὴν διάμετρον $A'A$, ἔχει δὲ μέτρον $(-\tau)$. Πάν δὲ ἄλλο τόξον AB' ἔχει (§ 24, Α') μέτρον τῆς μορφῆς $2K\pi - \tau$. Ὡς ε, ἀν κληθῆ χ τὸ μέτρον τυχόντος ἐκ τῶν τόξων AB' , θὰ ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης $\chi = 2K\pi - \tau$, ἐξ ἧς ἔπεται ἡ ἰσότης

$$\chi + \tau = 2K\pi \quad (3)$$

Ἄρα : Ἐὰν δύο τόξα ἔχωσι κοινὴν ἀρχὴν καὶ πέρατα συμμετρικὰ πρὸς τὴν διὰ τῆς κοινῆς αὐτῶν ἀρχῆς διερχομένην διάμετρον, τὸ ἄθροισμα τῶν μέτρων αὐτῶν εἶναι μηδὲν ἢ πολλαπλάσιον (θετ. ἢ ἀρν.) τοῦ μέτρου θετικῆς περιφερείας.

§ 26. Γ'—Τόξα ἔχοντα κοινὴν ἀρχὴν καὶ τὰ πέρατα ἐπὶ χορδῆς παραλλήλου τῇ διαμέτρῳ, ἣτις διέρχεται διὰ τῆς κοινῆς αὐτῶν ἀρχῆς.—Ἐστω τ τὸ μέτρον τυχόντος τόξου AB (Σχ. 15). Τὸ παραπληρωματικὸν τούτου τόξον, ὅπερ ἔχει τὴν αὐτὴν ἀρχὴν A , περατοῦται (§ 22) εἰς τὸ Γ , ὅπερ εἶναι τὸ ἕτερον ἄκρον τῆς χορδῆς, ἣτις ἀγεται ἐκ τοῦ B καὶ εἶναι παράλληλος τῇ διαμέτρῳ $A'A$. Ἐπειδὴ δὲ τὸ μέτρον τούτου εἶναι $\pi - \tau$, τὸ μέτρον χ παντὸς ἄλλου ἐκ τῶν τόξων $A\Gamma$ εἶναι $2K\pi + \pi - \tau$, ἦτοι ἀληθεύει ἡ ἰσότης $\chi = (2K+1)\pi - \tau$, ἐξ ἧς ἔπεται ὅτι:

$$\chi + \tau = (2K+1)\pi \quad (4)$$

Ἄρα : Ἐὰν δύο τόξα ἔχωσι κοινὴν ἀρχὴν καὶ τὰ πέρατα αὐτῶν κεῖνται ἐπὶ χορδῆς παραλλήλου τῇ διαμέτρῳ, ἣτις διέρχεται διὰ τῆς κοινῆς αὐτῶν ἀρχῆς, τὸ ἄθροισμα τῶν μέτρων αὐτῶν εἶναι περιττὸν πολλαπλάσιον (θετ. ἢ ἀρνητ.) τοῦ μέτρου θετικῆς ἡμιπεριφερείας.

§ 27. Δ'. Τόξα ἔχοντα κοινήν ἀρχὴν καὶ πέρατα συμμετρικὰ πρὸς τὸ κέντρον τῆς περιφερείας — Ἐστω τ τὸ μέτρον τυχόντος τόξου ΒΓ (Σχ. 15). Τὸ ἄθροισμα τούτου καὶ τῆς θετικῆς ἡμιπεριφερείας ΓΑΒ' ἔχει πέρασ τὸ σημεῖον Β' συμμετρικὸν τοῦ Γ πρὸς τὸ κέντρον καὶ μέτρον $\pi + \tau$. Τὸ μέτρον ἄρα χ παντὸς ἄλλου ἐκ τῶν τόξων ΒΒ' θὰ εἶναι τῆς μορφῆς $2K\pi + \pi + \tau$. Ἄρα δὲ ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης $\chi = (2K + 1)\pi + \tau$, ἐξ ἧς ἔπεται ὅτι :

$$\chi - \tau = (2K + 1)\pi \quad (5)$$


Ἄρα : Ἐὰν δύο τόξα ἔχωσι κοινήν ἀρχὴν καὶ πέρατα συμμετρικὰ πρὸς τὸ κέντρον τῆς περιφερείας, ἡ διαφορὰ τῶν μέτρων αὐτῶν εἶναι περιττὸν πολλαπλάσιον (θετ. ἢ ἀρν.) τοῦ μέτρου θετικῆς ἡμιπεριφερείας.

Ἀσκήσεις. 23) Ἐὰν ΑΑ' εἶναι διάμετρος κύκλου τινὸς Κ, νὰ εὗρεθῇ ἡ γενικὴ μορφή τῶν μέτρων τῶν τόξων ΑΑ', ἄν ὡς μονὰς ληφθῇ τὸ ἀκτίδιον.

24) Ἐὰν ΑΑ' καὶ ΒΒ' εἶναι δύο κάθετοι διάμετροι κύκλου τινός, νὰ εὗρεθῇ ἡ γενικὴ μορφή τῶν μέτρων α') τῶν τόξων ΑΒ καὶ β') τῶν τόξων ΑΒ', ἄν ὡς μονὰς τῶν τόξων ληφθῇ τὸ ἀκτίδιον.

25) Ἐὰν ἡ εὐθεῖα ΔΔ' διχοτομῇ τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ΑΚΒ, Α'ΚΒ', ἄς σχηματίζουσιν αἱ κάθετοι διάμετροι ΑΑ' καὶ ΒΒ' κύκλου Κ, νὰ εὗρεθῇ ἡ γενικὴ μορφή τῶν μέτρων α') τῶν τόξων ΑΔ καὶ β') τῶν τόξων ΑΔ', ἄν ὡς μονὰς τῶν τόξων ληφθῇ τὸ ἀκτίδιον.

26) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι α'). Τὰ πέρατα τῶν τόξων $\frac{\overline{AM}}{4}$ εἶναι κορυφαὶ τετραγώνου, καὶ β'). Τὰ πέρατα τῶν τόξων $\frac{\overline{AM}}{3}$ εἶναι κορυφαὶ ἰσοπλεύρου τριγώνου.



(Σχ. 17)

§ 28. — Γέννεσις γωνίας. — Θετικὴ καὶ ἀρνητικὴ γωνία. — Αἱ εὐθεῖαι ΟΑ, ΟΒ (Σχ. 17α'), αἵτινες ἀρχονται ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου Ο, ἀποτελοῦσιν, ὡς γνωστὸν, τὴν γωνίαν ω. Ἐὰν ἡ πλευρὰ ΟΑ νοηθῇ στρεφόμενη περὶ τὸ σημεῖον Ο κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ βέλους ἠδὲ τοῦ ἡμικυκλίου ἐκπαιδευτικῆς ἐπέρας τῆς ἐτέρας

πλευράς OB , χωρίς να ἐξέλθῃ τοῦ ἐπιπέδου τῶν δύο τούτων εὐθειῶν, θέλει διαγράψει τὴν ρηθείσαν γωνίαν ω . Ὀμοίως ἢ πλευρὰ OA (Σχ. 17 β') στρεφομένη περὶ τὸ O κατὰ τὴν φοράν τοῦ οἰκείου βέλους, μέχρις οὗ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς OB , χωρίς να ἐξέλθῃ τοῦ ἐπιπέδου τῶν εὐθειῶν OA καὶ OB , θέλει διαγράψει τὴν γωνίαν φ . Ἡ ἀρχικὴ θέσις OA τῆς στρεφομένης εὐθείας καλεῖται ἀρχικὴ πλευρὰ, ἡ δὲ τελικὴ θέσις αὐτῆς καλεῖται τελικὴ πλευρὰ τῆς διαγραφείσης γωνίας.

Ἡ οὕτω γραφομένη γωνία καλεῖται θετικὴ (ω) ἢ ἀρνητικὴ (φ), καθ' ὅσον ἢ διαγράφουσα ταύτην εὐθεῖα στρέφεται καὶ τὴν θετικὴν ἢ ἀρνητικὴν φοράν (§ 19).

§ 29. Γενίκευσις τῆς ἐννοίας τῆς γωνίας. — Ἐὰν ἢ καθ' οἰανδήποτε φοράν στρεφομένη εὐθεῖα OA (Σχ. 17) δὲν σταματήσῃ κατὰ τὴν πρώτην μετὰ τῆς OB σύμπτωσιν, ἀλλ' ἐξακολουθήσῃ στρεφομένη κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, μέχρις οὗ ἐκ νέου ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς OB , γράφει σχῆμά τι, ὅπερ πάλιν γωνίαν καλοῦμεν. Ὀμοίως γωνίαν καλοῦμεν καὶ τὸ σχῆμα, ὅπερ γράφει ἡ στρεφομένη εὐθεῖα, ἐὰν διέλθῃ δίς, τρίς κ. τ. λ. διὰ τῆς OB καὶ σταματήσῃ κατὰ τὴν τρίτην, τετάρτην κ. τ. λ. μετ' αὐτῆς σύμπτωσιν.


Ὡστε: **Γωνία καλεῖται πᾶν σχῆμα, τὸ ὁποῖον διαγράφεται ὑπὸ εὐθείας στρεφομένης ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ περὶ τὸ σημεῖον, ἐξ οὗ αὕτη ἀρχεῖται, κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν καὶ ἐπὶ πεπερασμένον χρόνον.**

Κατὰ ταῦτα ὑπάρχουσι ἀπειροὶ γωνίαι θετικαὶ καὶ ἀρνητικαί, ὧν ἐκάστη ἔχει ἀρχικὴν πλευρὰν OA καὶ τελικὴν OB . Ἐκάστην

τούτων σημειοῦμεν συνήθως οὕτω: OA, OB . Ἴνα δὲ ὀρισθῇ τελείως γωνία τις δὲν ἀρκεῖ νὰ ὀρισθῇ ἡ θέσις τῆς ἀρχικῆς καὶ τελικῆς πλευράς καὶ ἡ φορά αὐτῆς: ἀπαιτεῖται πλὴν τούτων νὰ εἶναι γνωστός καὶ ὁ ἀριθμὸς, ὅστις δηλοῖ ποσάκις ἢ στρεφομένη εὐθεῖα διήλθε διὰ τῆς τελικῆς πλευράς.

§ 30. Ἀντιστοιχία γωνιῶν πρὸς τὰ τόξα. — Ἐὰν μὲ

κέντρον τὴν κορυφὴν O τῶν διαφόρων γωνιῶν OA, OB (Σχ. 18) καὶ ἀκτῖνα οἰανδήποτε γράψωμεν περιφέρειαν κύκλου, αὕτη τέμνει τὴν μὲν ἀρχικὴν πλευρὰν εἰς τι σημεῖον α τὴν δὲ τελικὴν εἰς τὸ β . Στρεφομένης τῆς OA περὶ τὸ O κατὰ τινὰ φοράν $\pi \chi$ τὴν θετικὴν, τὸ α κινεῖται ἐπὶ τῆς περιφέρειας κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν: ἐὰν δὲ ἡ OA σταματήσῃ κατὰ τὴν πρώτην μετὰ τῆς OB σύμπτωσιν, τὸ α θέλει στα-



(Σχ. 18)

ματήσῃ ἐπὶ τοῦ β κατὰ τὴν πρώτην μετ' αὐτοῦ συνάντησιν Οὕτω

δὲ ἢ μὲν ΟΑ γράφει τὴν ἐλάχιστην τῶν θετικῶν γωνιῶν $\widehat{OA,OB}$, τὸ δὲ σημεῖον α τὸ ἐλάχιστον τῶν θετικῶν τόξων αβ. Ἐάν ἢ ΟΑ ἐξακολουθήσῃ σπρεφομένη κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, μέχρις οὐ ἐκ δευτέρου συμπέσῃ μετὰ τῆς ΟΒ, καὶ τὸ α θὰ ἐξακολουθήσῃ κινούμενον, μέχρις οὐ ἐκ νέου συμπέσῃ μετὰ τοῦ β· ὥστε εἰς τὴν νέαν ὑπὸ τῆς ΟΑ διαγραφείσαν γωνίαν ἀντιστοιχεῖ ἕτερον τόξον αβ κατὰ μίαν θετικὴν περιφέρειαν μείζον τοῦ προηγουμένου. Ἐξακολουθοῦντες οὕτω σκεπτόμενοι κατανοοῦμεν ὅτι: **Εἰς ἐκάστην τῶν ἐπικέντρων**

γωνιῶν ΟΑ, ΟΒ ἀντιστοιχεῖ ἓν τόξον. Ὅτι δὲ καὶ τὸ ἀντίστροφον ἀληθεύει εὐκόλως κατανοοῦμεν.

§ 31. Ἴσαι γωνίαι. — **Ἀναλογία ἐπικ. γωνιῶν πρὸς τὰ ἀντίστοιχα τόξα.** — Μετὰ τὴν γενίκευσιν τῆς ἐννοίας τῆς γωνίας (§ 29) ὁ ἐκ τῆς γεωμετρίας γνωστός ὁρισμὸς τῆς ἰσότητος δύο γωνιῶν δὲν ἐπαρκεῖ. Τοῦτον γενικεύομεν ὡς ἑξῆς:

Δύο γωνίαι λέγονται ἴσαι, ἐὰν τὰ ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν κείμενα ἀντίστοιχα τόξα αὐτῶν (§ 30) εἶναι ἴσα

Ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τούτου ἔπεται εὐκόλως ὅτι:

Αἱ ἐπικέντρα γωνίαι εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ ἀντίστοιχα αὐτῶν τόξα.

§ 32. Μέτρον γωνίας. — Ἐστω $\widehat{\alpha\theta}$ ἡ μονὰς τῶν τόξων καὶ φ ἡ εἰς αὐτὸ βαίνουσα ἐπικέντρος γωνία (Σχ. 18). Ἐπειδὴ αἱ ἐπικέντροι γωνίαι εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ ἀντίστοιχα αὐτῶν τόξα, ἔπεται

ὅτι μεταξὺ τυχούσης γωνίας $\widehat{OA,OB}$, τοῦ εἰς ταύτην ἀντιστοιχοῦντος τόξου αβ, τῆς φ καὶ τοῦ $\widehat{\alpha\theta}$ ἀληθεύει ἡ ἰσότης

$$\frac{\widehat{OA,OB}}{\varphi} = \frac{\widehat{\alpha\beta}}{\widehat{\alpha\theta}} \quad (1)$$

Ἐάν δὲ ἡ γωνία φ ληφθῇ ὡς μονὰς τῶν γωνιῶν, ὁ λόγος $\frac{\widehat{OA,OB}}{\varphi}$

καλεῖται μέτρον τῆς γωνίας $\widehat{OA,OB}$, ἡ δὲ ἰσότης (1) ἐκφράζει ὅτι: Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ το Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς


Τὸ μέτρον γωνίας ἰσοῦται πρὸς τὸ μέτρον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου, ἐὰν ὡς μονὰς τῶν γωνιῶν ληφθῇ ἡ ἐπὶ τῆς μονάδος τῶν τόξων βαίνουσα ἐπίκεντρος γωνία.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἡ εὕρεσις τοῦ μέτρου γωνίας ἀνάγεται εἰς τὴν εὕρεσιν τοῦ μέτρου τοῦ ἀντιστοίχου τόξου, καὶ ὅσα περὶ τῶν μέτρων τῶν τόξων ἐμάθομεν εἰς τὰ προηγούμενα ἀληθεύουσι καὶ περὶ τῶν μέτρων τῶν ἀντιστοίχων ἐπίκ. γωνιῶν.

Ἀσκήσεις. 27). Ποῖον εἶναι τὸ μέτρον τῆς ὀρθῆς γωνίας, ἐὰν ὡς μονὰς τῶν γωνιῶν ληφθῇ ἡ ἐπὶ τοῦ ἀκτινίου βαίνουσα ἐπίκ. γωνία ;

28). Ποῖον εἶναι τὸ μέτρον τῆς ἐλαχίστης τῶν θετικῶν γωνιῶν $\widehat{OA}, \widehat{OA'}$, ἂν OA' εἶναι προέκτασις πρὸς τὸ ἕτερον μέρος τῆς OA καὶ μονὰς τῶν γωνιῶν εἶναι ἡ ἐπὶ τοῦ ἀκτινίου βαίνουσα ἐπίκ. γωνία ;

29). Ποία ἡ γενικὴ μορφή τοῦ μέτρου πάσης γωνίας $\widehat{OA}, \widehat{OB}$, ἂν ὡς μονὰς τῶν γωνιῶν ληφθῇ ἡ ἐπὶ τοῦ ἀκτινίου βαίνουσα ἐπίκ. γωνία ;



(Σχ. 19)

§ 33. Γωνία τῶν θετικῶν διευθύνσεων δύο ἀξόνων.
Ἐστωσαν δύο ἀξονες $\chi'\chi$, $\psi'\psi$ τεμνόμενοι κατὰ τὸ σημεῖον O (Σχ. 19) καὶ \overline{OA} , \overline{OB} τὰ διευθύνοντα αὐτῶν ἀνύσματα. Ἐὰν ὁ θετικὸς ἡμιᾶξων $O\chi$ τοῦ ἑτέρου τούτων στραφῇ κατὰ τὴν θετικὴν φοράν καὶ ἐν τῇ ἐπιπέδῳ τῶν ἀξόνων τούτων, μέχρις οὗ τὸ πρῶτον ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ θετικοῦ ἡμιᾶξονος τοῦ ἄλλου, γράφει γωνίαν τινὰ ω . Τὴν γωνίαν ταύτην καλοῦμεν γωνίαν τῶν θετικῶν διευθύνσεων τῶν ἀξόνων τούτων.

Γενικῶς : Γωνία τῶν θειτικῶν διευθύνσεων δύο τεμνομένων ἀξόνων καλεῖται ἡ γωνία, ἣν γράφει ὁ θειτικὸς ἡμιᾶξων τοῦ ἐνὸς στρεφόμενος κατὰ τὴν θειτικὴν φορὰν περὶ τὸ κοινὸν αὐτῶν σημεῖον, μέχρις οὗ (τὸ πρῶτον) ἐφαρμοσῆ ἐπὶ τοῦ θειτικοῦ ἡμιᾶξονος τοῦ ἄλλου.

ΣΗΜ. Ἡ οὕτως ὁρισθεῖσα γωνία τῶν θειτικῶν διευθύνσεων δύο ἀξόνων ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἐκλογῆς τῆς ἀρχικῆς πλευρᾶς. Οὕτως ἐν τῷ σχήματι (19α') γωνία τῶν θειτικῶν διευθύνσεων τῶν ἀξόνων $\chi\chi$ καὶ $\psi\psi$ εἶναι ἡ ω μὲν, ἂν ληφθῆ ὡς ἀρχικὴ πλευρὰ ἡ $O\chi$, ἡ φ δέ, ἂν ἀρχικὴ πλευρὰ εἶναι ἡ $O\psi$. Ἄξιον ἰδιαιτέρας παρατηρήσεως εἶναι ὅτι ὁ συντελεστὴς προβολῆς τῆς τελικῆς πλευρᾶς ἐπὶ τὴν ἀρχικὴν εἶναι ὁ αὐτός, οἷασιδήποτε οὔσης τῆς ἀρχικῆς πλευρᾶς, ἀρκεῖ τὰ διευθύνοντα ἀνύσματα νὰ εἶναι ἴσα. Τῷ ὄντι τῶν ὀρθ. τριγώνων $O\alpha\alpha$, $O\beta\beta$ ὄντων ἴσων, τὰ $O\alpha$ καὶ $O\beta$ εἶναι ἀπολύτως ἴσα, ἄρα οἱ λόγοι $\frac{O\alpha}{O\beta}$, $\frac{O\beta}{O\alpha}$ εἶναι καὶ αὐτοὶ ἀπολύτως ἴσοι. Ἐπειδὴ δὲ τὰ $O\alpha$, $O\beta$ εἶναι ἡ ἀμφοτέρα ὁμόρροπα (Σχ. 19α, δ') ἢ ἀμφοτέρα ἀντίρροπα (Σχ. 19β', γ') πρὸς τὰ διευθύνοντα ἀνύσματα τῶν ἀξόνων, ἐφ' ὧν κεῖνται, οἱ προειρημένοι λόγοι εἶναι πάντοτε καὶ ὁμοσημοὶ ἄρα $(O\alpha) = (O\beta)$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γον


ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΣΟΥ Η ΓΩΝΙΑΣ

§ 34. **Τριγωνομετρικὸς κύκλος.**—Συνήθως ἐν τῇ Τριγωνομετρίᾳ ἡ ἀκτίς τοῦ κύκλου, ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ ὀποῖου κεῖνται τὰ θεωρούμενα τόξα, λαμβάνεται ὡς μονὰς τοῦ μήκους. Καλεῖται δὲ ὁ τοιοῦτος κύκλος ἰδιαιτέρως τριγωνομετρικὸς κύκλος.

Ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι ὅτι τὸ μήκος τῆς περιφερείας τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου εἶναι 2π , τὸ τῆς ἡμιπεριφερείας π , τοῦ τετάρτου περιφερείας $\frac{\pi}{2}$ καὶ γενικῶς τὸ μήκος ἐκάστου τόξου κειμένου ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ τριγ. κύκλου ἴσεται πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ, ὅταν ὡς μονὰς τῶν τόξων λαμβάνηται τὸ ἀκτίδιον τόξον.

§ 35. **Ἀρχικὴ καὶ τελικὴ ἀκτίς τόξου.**—**Πρωτεύοντες ἄξονες τριγ. κύκλου.**—Ἐστω AM τυχὸν τόξον κείμενον ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ τριγ. κύκλου O (Σχ. 20) καὶ OA , OM αἱ εἰς τὰ ἄκρα αὐτοῦ καταλήγουσαι ἀκτίνες. Τούτων ἡ μὲν OA , ἥτις καταλήγει εἰς τὴν ἀρχὴν A τοῦ τόξου, καλεῖται ἀρχικὴ ἀκτίς, ἡ δὲ εἰς τὸ τέλος M αὐτοῦ καταλήγουσα ἀκτίς OM καλεῖται τελικὴ ἀκτίς τοῦ τόξου AM .

Ἡ ἀρχικὴ ἀκτίς λαμβάνεται πάντοτε ὡς διευθύνον ἄνυσμα τοῦ περιέχοντος αὐτὴν ἄξονος $\chi'\chi$. Ἐὰν ἡ ἀρχικὴ αὐτὴ ἀκτίς OA στραφῆ περὶ τὸ κέντρον O κατὰ τὴν θετικὴν φοράν, μέχρις οὗ δια-



(Σχ. 20)

εὐνόητον ὅτι πρὸς ἀρχὴν τόξων ἄλλο σημεῖον A_1 (Σχ. 20) ἀντιστοιχεῖ ἄλλο σύστημα πρωτεύοντων ἀξόνων $\chi'_1\chi_1, \psi'_1\psi_1$, οἵτινες ἔχουσι διευθύνοντα ἄνυσματα OA_1 καὶ OB_1 ὁμοίως ὀριζόμενα.

Οἱ π πρωτεύοντες ἄξονες ἐκάστου συστήματος διαιροῦσι τὴν περιφέρειαν τοῦ τριγ. κύκλου εἰς τέσσαρα ἴσα τόξα, ἅτινα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν τόξων καὶ κατὰ τὴν θετικὴν φοράν καλοῦμεν κατὰ σειράν **πρῶτον, δεύτερον, τρίτον** καὶ **τέταρτον** τεταρτημόριον. Ὅθεν διὰ τὸ σύστημα $\chi'\chi, \psi\psi$ τὰ εἰρημένα τεταρτημόρια εἶναι κατὰ σειράν $\overline{AB}, \overline{BA'}, \overline{A'B'}$ καὶ $\overline{B'A}$.

Ἐν τῷ πρώτῳ ἀξὼν $\chi'\chi$, ὅστις διέρχεται διὰ τῆς ἀρχῆς τῶν τόξων καλεῖται **ἄξων τῶν συνημιτόνων**. Ὁ δὲ ἐπ' αὐτὸν κάθετος ἄξων $\psi\psi$ καλεῖται **ἄξων τῶν ἡμιτόνων**.

Ἀσκήσεις. 30) Χαραχθέντων τῶν εἰς τινὰ ἀρχὴν A ἀντιστοιχούντων πρωτεύοντων ἀξόνων, νὰ χαραχθῶσιν οἱ πρωτεύοντες ἄξονες, οἵτινες ἀντιστοιχοῦσιν εἰς ἀρχὴν τόξων τὸ μέσον τοῦ α' τεταρτημορίου AB .

31) Νὰ στραφῆ δεδομένον σύστημα πρωτεύοντων ἀξόνων κατὰ 30° ἢ -30° .

32) Νὰ στραφῆ δοθὲν σύστημα πρωτεύοντων ἀξόνων κατὰ 90° ἢ -90° .

33) Νὰ στραφῆ δοθὲν σύστημα πρωτεύοντων ἀξόνων κατὰ $180^\circ, 270^\circ, \eta -270^\circ$.

34) Νὰ στραφῆ δοθὲν σύστημα πρωτεύοντων ἀξόνων κατὰ 315° ἢ -315° .

§ 36. **Συνημέτονον τόξου.** — Ἐστω AM (Σχ. 20) τυχὸν τόξον κεῖμενον ἐπὶ τῆς περιφέρειας τοῦ τριγ. κύκλου, O τῆς τελικῆς

αὐτοῦ ἀκτίνος OM προβολὴ ἐπὶ τὸν πρωτεύοντα ἄξονα $\chi'\chi$ εἶναι τὸ ἄνυσμα $O\Pi$, ὅπερ ἔχει μῆκος $\frac{\overline{O\Pi}}{OA} = (\overline{O\Pi})$. Τὸ μῆκος τοῦτο

$(\overline{O\Pi})$ καλεῖται *συνημίτονον* τοῦ τόξου AM . Ὁμοίως τοῦ τόξου AM' *συνημίτονον* εἶναι τὸ μῆκος τοῦ $\overline{O\Pi'}$, ἦτοι ὁ ἀριθμὸς $\frac{\overline{O\Pi'}}{OA} = (\overline{O\Pi'})$.

Γενικῶς: *Συνημίτονον* τόξου καλεῖται τὸ μῆκος τῆς προβολῆς τῆς τελικῆς αὐτοῦ ἀκτίνος ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν *συνημιτόνων*.

Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ *συνημιτόνου* ἔπεται ἀμέσως ὅτι:

α'). Πάντα τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὰ αὐτὰ ὁμώνυμα ἄκρα, ἔχουσι τὸ αὐτὸ *συνημίτονον*.

β'). Τὸ *συνημίτονον* τόξου εἶναι θετικόν, ἢ ἀρνητικόν καθ' ὅσον ἢ προβολὴ τῆς τελικῆς ἀκτίνος αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν *συνημιτόνων* εἶναι ἄνυσμα ὁμόρροπον ἢ ἀντίρροπον πρὸς τὸ διευθύον ἄνυσμα OA τοῦ ἄξονος τούτου.

Ὅθεν παντὸς τόξου περατουμένου εἰς τὸ α' ἢ δ' τεταρτημόριον τὸ *συνημίτονον* εἶναι θετικόν, ἐν ᾧ τῶν εἰς τὸ β' καὶ γ' τεταρτημόριον περατουμένων τόξων τὸ *συνημίτονον* εἶναι ἀρνητικόν.

ΣΗΜ. Τὸ *συνημίτονον* τόξου ἔχοντος μέτρον τ σημειούμεν συντόμως οὕτω: συντ.

Ἀσκήσεις. 35) Ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα $0^\circ, 98^\circ, 42^\circ, 180^\circ, 203^\circ, 278^\circ, 300^\circ$ ἔχουσι θετικὸν *συνημίτονον* καὶ ποῖα ἀρνητικόν;

36) Ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα $-48^\circ, -95^\circ, -270^\circ, 289^\circ, -336^\circ$ ἔχουσι θετικὸν *συνημίτονον* καὶ ποῖα ἀρνητικόν;

37) Ποῖα τόξα ἔχουσι *συνημίτονον* $+1$ καὶ ποῖα -1 ;

38) Ποῖα τόξα ἔχουσι *συνημίτονον* μηδέν;

39) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ *συνημίτονον* τόξου εἶναι ἀνεξάρτητον τῆς θέσεως, τὴν ὁποίαν τοῦτο κατέχει ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ τριγ. κύκλου.


§ 37. Μεταβολὴ τοῦ *συνημιτόνου* μετὰ τοῦ τόξου.

Ἐὰν τόξου τινὸς τὸ μέτρον εἶναι μηδέν, τελικὴ ἀκτὶς αὐτοῦ εἶναι ἡ OA , ἣτις συμπέπτει μετὰ τῆς προβολῆς τῆς ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν *συνημιτόνων*. *Συνημίτονον* ἄρα τοῦ τόξου τούτου εἶναι

$$\text{ὁ ἀριθμὸς } \frac{\overline{OA}}{OA} = +1.$$

Νοήσωμεν ἤδη ὅτι τὸ πέρασ τοῦ τόξου M κινεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας κατὰ τὴν θετικὴν φοράν, ἦτοι ὅτι τὸ τόξον βαίνει ἀπὸ τοῦ μηδενὸς ἀξανάμενον. Ἐφ' ὅσον τὸ M διαγράφει τὴν ἡμιπεριφέρειαν ABA' , ὁ πῶς Π διαγράφει συνεχῶς τὸ ἄνυσμα AA' καὶ

κατ' ἀκολουθίαν τὸ μῆκος τοῦ ἀνύσματος ΟΠ, ἦτοι τὸ συνημίτονον τοῦ τόξου, βρίνεται συνεχῶς ἐλαττούμενον ἀπὸ + 1 μέχρι - 1, καθιστάμενον ἐν τῇ μεταξὺ μηδέν, ὅταν $\widehat{AM} = 90^\circ$. Ὅταν δὲ τὸ Μ διαγράφη τὴν ἡμιπεριφέρειαν Α'Β'Α, ὁ πρὸς Π διαγράφει συνεχῶς τὸ ἀνύσμα Α'Α καὶ κατ' ἀκολουθίαν τὸ συνημίτονον τοῦ τόξου βαίνει συνεχῶς ἀξανόμενον ἀπὸ - 1 ἕως + 1, καθιστάμενον πάλιν μηδέν, ὅταν $\widehat{AM} = 270^\circ$ (Σχ. 21). Ἐὰν τὸ Μ ἐξακολουθήσῃ



(Σχ. 21)

κινούμενον κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, ὅτε τὸ τόξον ΑΜ λαμβάνει τιμὰς μείζονας θετικῆς περιφέρειας, εἶναι εὐνόητον ὅτι θέλει διέλθει διὰ τῶν αὐτῶν πάλιν θέσεων καὶ ἐπομένως (§ 36α') τὸ συνημίτονον λαμβάνει τὰς αὐτὰς κατὰ σειράν τιμὰς.

Τὴν τοιαύτην μετὰ τοῦ τόξου μεταβολὴν τοῦ συνημιτόνου συγφίξομεν ἐν τῇ ἀκολουθῇ πινάκῃ, ἐν ᾗ τὸ τόξον περιέχεται μεταξὺ 0° καὶ 360° .

τόξον	} εἰς μοίρας	0°	90°	180°	270°	360°
		0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
} εἰς ἀυτία	} εἰς ἀυτία	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
		0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
συνημίτονον		+1	0	-1	0	+1


ΣΗΜ. α'. Τὰ πρὸς τὰ ἄνω βέλη δεκνύουσιν ἀξήσιν, τὰ δὲ πρὸς τὰ κάτω ἐλάττωσιν.

Κατὰ ταῦτα ἡ μέγιστη τιμὴ, τὴν ὅποιαν δύναται νὰ λάβῃ τὸ συνημίτονον εἶναι +1, ἡ δὲ ἐλαχίστη - 1.

ΣΗΜ. β'. Ἐπειδὴ τὸ πέρασ τυχόντος ὀρθητικοῦ τόξου οὐδέποτε προβάλλεται ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν συνημιτόνων εἰς σημεῖον αὐτοῦ κείμενον ἐκτὸς τοῦ Α'Α, τὸ συνημίτονον οὐδέποτε δύναται νὰ γίνῃ μείζον τοῦ +1 καὶ ἔλασον τοῦ -1. Τὸ προηγούμενον λοιπὸν συμπέρασμα εἶναι γενικόν.

§ 38. Γραφικὴ παράστασις τῶν μεταβολῶν τοῦ συνημιτόνου τόξου — Τὴν μεταβολὴν τοῦ συνημιτόνου τόξου μετὰ τοῦ τόξου αἰσθητοποιούμεν ὡς ἑξῆς. Γράφομεν δύο ἄξονας χ', χ_2 ψ, ψ' καθέτως τεμνομένους εἰς τὸ Ο (Σχ. 22) καὶ ὀρίζομεν τὰ διευθύ-
Εὐθύγραμμος Τριγωνομετρία Ν. Δ. Νικολάου. Ἔκδ. Γ'.

νοντα αὐτῶν ἐνύψιακα \overline{OA} καὶ \overline{OB} συνήθως ἴσα. Ἐπὶ τοῦ ἄξονος



(Σχ. 22)

χ, λ , λαμβάνομεν ἄνυσμα $\overline{O\mu}$ ἔχον μῆκος ἴσον πρὸς τὸ μῆκος τόξου \overline{AM} , ἐπὶ δὲ τοῦ $\psi\psi$ λαμβάνομεν ἕτερον ἄνυσμα $\overline{O\mu'}$ ἔχον μῆκος ἴσον πρὸς τὸ συνημίτονον τοῦ τόξου \overline{AM} . Ἐὰν ἤδη ἐκ τῶν σημείων μ, ν φέρωμεν εὐθείας καθέτους ἐπὶ τοὺς ἀντιστοιχοῦς ἄξονας, αὗται τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον M . Ἐργαζόμενοι ὁμοίως καὶ μὲ ἄλλα τόξα ἀπὸ 0° ἕως 360° περιεχόμενα, ὀρίζομεν σειρὰν σημείων $B, \dots, M, \dots, \Gamma, \dots, M', \dots, \Delta, \dots, E, \dots, Z$, ἅτινα ἀποτελοῦσι καμπύλην τινὰ $\overline{BM\Gamma\Delta EZ}$.

Παρατηροῦντες ὅτι τὰ μῆκη τῶν ἀνυσμάτων $\overline{\mu M}, \overline{\mu' M'}, \overline{\mu'' M''}$, κ. τ. λ. εἶναι ἀντιστοιχῶς τὰ συνημίτονα τῶν τόξων, τὰ ὁποῖα ἔχουσι μῆκη $(\overline{O\mu}), (\overline{O\mu'}), (\overline{O\mu''})$ κτλ. ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὅτι ἡ μεταβολὴ τοῦ μήκους τοῦ $\overline{\mu M}$ μετὰ τοῦ μήκους $\overline{O\mu}$ δεικνύει τὴν μεταβολὴν τοῦ συνημιτόνου μετὰ τοῦ τόξου.

Ἡ καμπύλη $\overline{BM\Gamma\Delta EZ}$ καλεῖται **συνημιτονοειδῆς καμπύλη**.

Ἀσκήσεις. 40) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τοῦ συνημιτόνου, ὅταν τὸ τόξον βαίῃ συνεχῶς ἐλαττούμενον ἀπὸ 0° ἕως -2π καὶ νὰ ἐπεκταθῇ ἀντιστοιχῶς ἡ συνημιτονοειδῆς καμπύλη.


41) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $1 + \sin \chi$, ὅταν τὸ τόξον χ βαίῃ συνεχῶς αὐξανόμενον ἀπὸ 0° ἕως 2π ἢ ἐλαττούμενον ἀπὸ 0° ἕως -2π . Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

42) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $2\sin \chi - 3$, ὅταν τὸ τόξον χ βαίῃ συνεχῶς αὐξανόμενον ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

43) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $\sin^2 \chi$, ὅταν τὸ τόξον χ βαίῃ συνεχῶς αὐξανόμενον ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

44) Νά σπουδασθῆ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $1 - \sin^2 \chi$, ὅταν τὸ τόξον χ βαίνη συνεχῶς ἀξανάμενον ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νά παρασταθῆ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

§ 39. **Ἡμίτονον τόξου.** — Ἐστω AM (Σχ. 23) τυχόν τόξον



(Σχ. 23)

τριγ. κύκλου O καὶ $\chi'x$, $\psi'\psi$ οἱ ἄξονες τοῦ πρὸς ἀρχὴν A ἀντιστοιχοῦντος συστήματος πρωτεύοντων ἄξόνων, ὧν ὁ $\chi'x$ εἶναι ὁ τῶν συνημιτόνων ἄξων.

Ἡ προβολὴ \overline{OP} τῆς τελικῆς τοῦ τόξου τοῦ του ἀκτίνος OM ἐπὶ τὸν ἄξονα $\psi'\psi$ ἔχει μῆκος $\frac{\overline{OP}}{OB} = (\overline{OP})$. Τὸ μῆκος

τοῦτο (\overline{OP}) καλεῖται **ἡμίτονον** τοῦ τόξου AM . Ὅμοίως τοῦ τυχόντος τόξου AM' ἡμίτονον εἶναι τὸ μῆκος τοῦ $\overline{OP'}$, ἦτοι ὁ ἀριθμὸς $\frac{\overline{OP'}}{OB} = (\overline{OP'})$.

Γενικῶς: Ἡμίτονον τόξου καλεῖται τὸ **μῆκος τῆς προβολῆς τῆς τελικῆς ἀκτίνος αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν ἡμιτόνων**.

Ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἡμιτόνου τόξου ἐπεται ὅτι:

α'). Τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὰ αὐτὰ ὁμόγνωμα ἄκρα, ἔχουσι, τὸ αὐτὸ ἡμίτονον.

β'). Τὸ ἡμίτονον τόξου τινὸς εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν κατ' ὅσον ἡ προβολὴ τῆς τελικῆς αὐτοῦ ἀκτίνος ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν ἡμιτόνων εἶναι ἄνυσμα ὁμόροπον ἢ ἀντίροπον πρὸς τὸ διευθύνον ἄνυσμα OB τοῦ ἄξονος τῶν ἡμιτόνων.

Κατὰ ταῦτα τὰ εἰς τὸ α' καὶ β' τεταρτημόριον καταλήγοντα τόξα ἔχουσι ἡμίτονον θετικόν, τὰ δὲ εἰς γ' καὶ δ' ἔχουσι ἡμίτονον ἀρνητικόν.

ΣΗΜ. Τὸ ἡμίτονον τόξου ἔχοντος μέτρον τ σημειοῦμεν συντόμως οὕτω: ἡμ τ .

Ἀσκήσεις. 45) Ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα 35° , 128° , 200° , 285° , 72° , 95° ἔχουσι θετικὸν ἡμίτονον καὶ ποῖα ἀρνητικόν;

46) Ποια από τα τόξα -95° , -310° , -67° , -205° έχουν θετικό ημίτονο και ποια αρνητικό;

47) Ποια τόξα έχουν ημίτονο 0;

48) Ποια τόξα έχουν ημίτονο $+1$ και ποια -1 ;

49) Είς ποιον τεταρτημόριον λήγουσι τα τόξα, τα όποια έχουν ημίτονο και συνημίτονο θετικό;

50) Είς ποιον τεταρτημόριον λήγουσι τα τόξα, τα όποια έχουν ημίτονο και συνημίτονο αρνητικό;


51) Είς ποιον τεταρτημόριον λήγουσι τα τόξα, τα όποια έχουν θετικό ημίτονο και αρνητικό συνημίτονο;

52) Είς ποιον τεταρτημόριον λήγουσι τα τόξα, τα όποια έχουν αρνητικό ημίτονο και θετικό συνημίτονο;

53) Να αποδειχθῆ ὅτι τὸ ἡμίτονο τόξου εἶναι ἀνεξάρτητον τῆς θέσεως, τὴν ὁποίαν τοῦτο κατέχει ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ τριγών. κύκλου.

§ 40. Μεταβολὴ τοῦ ἡμιτόνου μετὰ τοῦ τόξου.—

Τοῦ τόξου, ὅπερ ἔχει μέτρον μηδέν, ἢ τελικὴ ἀκτίς OA ἔχει προβολὴν ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν ἡμιτόνων $\psi\psi'$ τὸ σημεῖον O , κατ' ἀκολουθίαν τὸ ἡμίτονον τοῦ τόξου, τοῦτου εἶναι μηδέν. Νοήσωμεν ἤδη ὅτι τὸ τέλος M τοῦ τόξου ἀναχωροῦνέν τοῦ A διαγράφει κατὰ τὴν θετικὴν φοράν τὴν περιφέρειαν, ἥτοι ὅτι τὸ τόξον AM βαίνει ἀπὸ τοῦ μηδενὸς συνεχῶς ἀξανάμενον.



(Σχ. 24)

Ἐφ' ὅσον τὸ M διαγράφει τὸ a' τεταρτημόριον, ὁ πούς P διαγράφει συνεχῶς τὸ ἀνυσμᾶ OB καὶ κατ' ἀκολουθίαν τὸ μῆκος τοῦ ἀνυσμᾶτος OP , ἥτοι τὸ ἡμίτονον τοῦ τόξου, βαίνει συνεχῶς ἀξανάμενον ἀπὸ τοῦ μηδενὸς μέχρι τοῦ $+1$, ἣν τιμὴν λαμβάνει, ὅταν $\widehat{AM} = 90^\circ$. Ὅταν τὸ M διαγράφῃ τὸ β' καὶ γ' τεταρτημόριον, ὁ πούς P διαγράφει τὸ ἀνυσμα BB' καὶ κατ' ἀκολουθίαν τὸ ἡμίτονον βαίνει συνεχῶς ἐλαττούμενον ἀπὸ τοῦ $+1$ μέχρι τοῦ -1 , καθιστάμενον

ἐν τῷ μεταξὺ 0, ὅταν $\widehat{AM} = 180^\circ$. Ὅταν τέλος τὸ M διαγράψῃ τὸ δ' τεταρτημόριον, ὁ πῶς διαγράφει τὸ ἀνυσμα B'O' καὶ ἐπομένως τὸ ἡμίτονον βαίνει αὐξανόμενον ἀπὸ -1 μέχρι μηδενός, ἣν τιμὴν λαμβάνει, ὅταν $\widehat{AM} = 360^\circ$.

Ἐὰν τὸ σημεῖον M ἐπανελθὼν ἤδη εἰς τὴν ἀρχικὴν του θέσειν A δὲν σταματήσῃ, ἀλλ' ἐξακολουθήσῃ κινούμενον κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν (ὅτε τὸ τόξον AM λαμβάνει τιμὰς μείζονας περιφερείας), εἶναι φανερόν ὅτι θέλει διέλθει διὰ τῶν αὐτῶν πάλιν θέσεων καὶ κατ' ἀκολουθίαν (§ 39 α') τὸ ἡμίτονον λαμβάνει πάλιν τὰς αὐτὰς κατὰ σειρὰν τιμὰς.

Τὴν τοιαύτην μετὰ τοῦ τόξου μεταβολὴν τοῦ ἡμιτόνου συναψίζομεν ἐν τῷ ἀκολουθῶν πίνακι, ἐν ᾧ τὸ τόξον περιέχεται μεταξὺ 0° καὶ 360°.

τόξον	{ εἰς μοίρας εἰς αὐτίγια }	0°	90°	180°	270°	360°
		0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
ἡμίτονον		0	+1	0	-1	0

Κατὰ ταῦτα ἡ μεγίστη τιμὴ, ἣν δύναται νὰ λάβῃ τὸ ἡμίτονον εἶναι +1, ἡ δὲ ἐλάχιστη -1.

ΣΗΜ. Τὸ συμπέρασμα τοῦτο ἰσχύει καὶ διὰ τὰ ἀρνητικὰ τόξα διὰ λόγον ἀνάλογον πρὸς τὸν ἐν (§ 37 σημ. β') ἐκτεθέντα.


§ 41. Γραφικὴ πειράσις τῶν μεταβολῶν τοῦ ἡμιτόνου.—Ἐὰν ἐργασθῶμεν μὲ τὰ ἡμίτονα διαφόρων τόξων, τὰ ὁποῖα περιέχονται ἀπὸ 0° ἕως 360°, καθ' ὃν τρόπον εἰργάσθημεν ἐν (§ 38) μὲ τὰ συνημίτονα, ὀρίζομεν τὴν καμπύλην ΟΓΔΕΖ (Σχ. 25). Διὰ ταύτης αἰσθητοποιοῦμεν τὴν προηγουμένως σπουδαθεῖσαν μεταβολὴν τοῦ ἡμιτόνου τόξου μετὰ τοῦ τόξου. Πράγματι: Τὰ μήκη τῶν ἀνυσμάτων μΜ, μ'Μ'... εἶναι ἐκ κατασκευῆς ἴσα πρὸς τὰ ἡμίτονα τῶν τόξων, τὰ ὁποῖα ἔχουσιν ἀντιστοίχως μήκη ἴσα πρὸς (\overline{OM}) , (\overline{OM}') , . Ἡ μεταβολὴ ἄρα τοῦ μήκους τοῦ \overline{MM} μετὰ τοῦ (\overline{OM}) δεικνύει τὴν μεταβολὴν τοῦ ἡμιτόνου τόξου μετὰ τοῦ τόξου.

Ἡ καμπύλη ΟΓΔΕΖ καλεῖται **ἡμιτονοειδὴς καμπύλη**

Ἀσκήσεις. 54) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τοῦ ἡμιτόνου τῶν
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

ξου, όταν τούτο βαίνει συνεχῶς ἐλαττούμενον ἀπὸ 0 ἕως -2π καὶ νὰ ἐπεκταθῇ ἀντιστοίχως ἡ ἡμιτονοειδῆς καμπύλη.

55) Νὰ σπουδασθῇ ἡ γ ταβολὴ τῆς συναρτήσεως $2\eta\mu\chi - 1$, όταν τὸ τόξον χ βαίνει συνεχῶς ἀξανάμενον ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.



(Σχ. 25)


56) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $1 + \eta\mu\chi$, όταν τὸ τόξον χ ἀξανάηται ἀπὸ 0 ἕως 2π . Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

57) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $\eta\mu^2\chi$, όταν τὸ τόξον χ βαίνει συνεχῶς ἀξανάμενον ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

58) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $3\eta\mu^2\chi - 1$, όταν τὸ τόξον χ βαίνει συνεχῶς ἀξανάμενον ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

§ 42. Σχέσις τοῦ ἡμιτόνου τόξου θετικοῦ καὶ μικροτέρου 90° πρὸς τὴν χορδὴν τοῦ διπλασίου τόξου. — Ἐστω AM (Σχ. 26) τόξον τι θετικὸν καὶ μικρότερον 90° , \overline{OP} τὸ ἡμίτονον καὶ \overline{OII} τὸ συνημίτονον αὐτοῦ. Ἐὰν τὴν προβάλλουσαν MΠ προεκτείνωμεν κατὰ τὴν ἀρνητικὴν φορὰν πέραν τοῦ ποδὸς Π, θὰ συναντήσῃ τὴν περιφέρειαν εἰς τι σημεῖον M'. οὕτω δὲ ὀρίζεται τὸ τόξον M'AM, ὅπερ εἶναι διπλάσιον τοῦ AM καὶ ἔχει χορδὴν MM', ἣτις εἶναι διπλάσιος τοῦ \overline{MM} . Ἐπειδὴ Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

Δὲ τὰ ἀνύσματα OP καὶ $ΠM$ εἶναι ἰσομήκεις ἴσα, ἔπεται ὅτι :



(Σχ. 26)

$$(\overline{OP}) = (\overline{ΠM}) = \frac{(\overline{M'M})}{2}. \text{ Ἄρα:}$$

Τὸ ἡμίτονον τόξου θετικού καὶ μικροτέρου 90° ἰσοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ μήκους τῆς χορδῆς τοῦ διπλασίου τόξου.

§ 43. Σχέσεις τοῦ συνημιτόνου τόξου θετικού καὶ μικροτέρου 90° πρὸς τὸ ἀπόστημα τοῦ κέντρου ἀπὸ

τῆς χορδῆς τοῦ διπλασίου τόξου. — Ἀναφερόμενοι εἰς τὸ προηγούμενον σχῆμα (26) παρατηροῦμεν ὅτι τοῦ θετικού καὶ μικροτέρου 90° τόξου AM τὸ συνημίτονον $(\overline{OΠ})$ παριστᾷ τὸ μήκος τοῦ ἀποστήματος τοῦ κέντρου τοῦ τριγ. κύκλου ἀπὸ τῆς χορδῆς τοῦ διπλασίου τόξου. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο συμβαίνει διὰ τὸ συνημίτονον καὶ παντὸς ἄλλου τόξου θετικού καὶ μικροτέρου 90° , ἔπεται γενικῶς ὅτι:

Τὸ συνημίτονον τόξου θετικού καὶ μικροτέρου 90° ἰσοῦται πρὸς τὸ μήκος τοῦ ἀποστήματος τοῦ κέντρου τοῦ τριγ. κύκλου ἀπὸ τῆς χορδῆς τοῦ διπλασίου τόξου.

Ἐφαρμογή. Κατὰ τὰ προειρημένα (§ 42 καὶ 43), ἂν εἶναι $0 < \mu^\circ < 90^\circ$, τὸ μὲν ἡμίτονον τοῦ μ° ἰσοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ μήκους τῆς χορδῆς τοῦ τόξου $2\mu^\circ$, τὸ δὲ συνημίτονον τοῦ αὐτοῦ τόξου μ° ἰσοῦται πρὸς τὸ μήκος τοῦ ἀποστήματος τοῦ κέντρου τοῦ τριγ. κύκλου ἀπὸ τῆς εἰρημένης χορδῆς τοῦ $2\mu^\circ$. Ἐὰν δὲ ὁ λόγος $\frac{360^\circ}{2\mu^\circ} = \frac{180^\circ}{\mu^\circ}$ εἶναι ἀκέραιός τις ἀριθμὸς λ , ἢ χορδὴ τοῦ τόξου $2\mu^\circ$


εἶναι πλευρὰ τοῦ εἰς τὸν τριγ. κύκλον ἐγγεγραμμένου κανονικοῦ πολυγώνου, ὅπερ ἔχει λ πλευράς. Κατ' ἀκολουθίαν τὸ μὲν ἡμίτονον τοῦ τόξου μ° ἰσοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ μήκους τῆς πλευρᾶς τοῦ προειρημένου κανονικοῦ πολυγώνου, τὸ δὲ συνημίτονον πρὸς τὸ μήκος τοῦ ἀποστήματος τοῦ αὐτοῦ πολυγώνου. Ὄβτως,

ἐπειδὴ εἶναι $\frac{360^\circ}{2 \cdot 45^\circ} = \frac{180^\circ}{45^\circ} = 4$, τὸ ἡμίτονον τοῦ τόξου 45° εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ μήκους τῆς πλευρᾶς τοῦ εἰς τὸν τριγ. κύκλον ἐγγεγραμμένου τετραγώνου ἥτοι: $\text{ἡμ. } 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, τὸ δὲ συνημίτονον τοῦ τόξου 45°

ἐφαπτομένη τοῦ τόξου 45° καὶ νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ ἐφαπτομένη τούτου ἰσοῦται πρὸς $+1$.

71) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ ἐφαπτομένη τῶς τόξου ἰσοῦται ἀπολύτως πρὸς τὸ μῆκος τοῦ ἀνύσματος, τὸ ὁποῖον ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ πέ. τοῦ τοῦ τόξου τούτου καὶ τοῦ κέντρου σημείου τοῦ ἀξονος τῶν συνημιτόνων καὶ τῆς εἰς τὸ πέρασ τοῦ τόξου ἐφαπτομένης τοῦ τριγων. κύκλου.

§ 43 Μεταβολὴ τῆς ἐφαπτομένης μετὰ τοῦ τόξου. — Τοῦ τόξου 0° ἡ ἀρχὴ A καὶ τὸ τέλος M συμπίπτουσι καὶ κατ' ἀκολουθίαν ὁ ἀριθμὸς (\overline{AT}) , ἧτοι ἡ ἐφαπτομένη τούτου εἶναι μηδέν. Νοήσωμεν ἤδη ὅτι τὸ πέρασ M διαγράφει κατὰ τὴν θετικὴν φοράν τὴν περιφέρειαν, ἧτοι ὅτι τὸ τόξον AM βαίνει συνεχῶς ἀπὸ



(Σχ. 28)

0° ἀξαναόμενον. Ἐφ' ὅσον τὸ M διαγράφει τὸ α' τεταρτημόριον, τὸ σημεῖον T (Σχ. 28) κινεῖται ἐπὶ τοῦ $Z'Z$ κατὰ τὴν θετικὴν φοράν συνεχῶς ἀπομακρυνόμενον τοῦ Z διὰ τοῦτο ὁ (\overline{AT}) δηλ. ἡ ἐφαπτομένη βαίνει συνεχῶς ἀπὸ 0 ἀξαναόμενη ταχύτατα καὶ, τοῦ M πλησιάζοντος πρὸς τὸ B , ἡ ἐφαπτομένη τείνει νὰ ὑπερβῇ πάντα ἀριθμὸν. Τοῦτο ἐκφράζομεν λέγοντες ὅτι: Τοῦ τόξου τείνοντος πρὸς τὰς 90° ἐκ τιμῶν ἐλασσόνων ἡ ἐφαπτομένη αὐτοῦ τείνει πρὸς τὸ θετικὸν ἄπειρον $(+\infty)$.


Ὅταν τὸ M ἀπομακρυνόμενον τοῦ B διαγράφῃ τὸ β' τεταρτημόριον, τὸ T ἐμφανίζεται ἐπὶ τοῦ AZ' , ἧτοι ἡ ἐφαπτομένη καθίσταται ἀρνητικὴ καὶ εἶναι, ἐφ' ὅσον τὸ M εὐρίσκειται ἐγγύτατα τοῦ B , ἀπολύτως πολὺ μεγάλη. Ὡστε, καθ' ἡν στιγμὴν τὸ M διέρχεται διὰ τοῦ B μεταβαῖνον ἐκ τοῦ α' εἰς τὸ β' τεταρτημόριον, ἡ ἐφαπτομένη τοῦ \overline{AM} μεταπηδᾷ ἀπὸ τοῦ $+\infty$ εἰς τὸ $-\infty$, διακοπτομένης οὕτω τῆς συνεχείας τῶν τιμῶν αὐτῆς.

Τοῦ M ἀπομακρυνόμενου τοῦ B , ἡ ἐφαπτομένη τοῦ \overline{AM} ἀξαναομένη ἀπὸ τοῦ $-\infty$ καὶ γίνεται μηδέν, ὅταν \overline{AM} γίνῃ 180° . Ὅταν τὸ Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

Μ διαγράφη τὸ γ' τεταρτημόριον, τὸ Τ κινεῖται πάλιν ἐπὶ τοῦ ΑΖ συνεχῶς καὶ ταχύτερα ἀπομακρυνόμενον τοῦ Α· ἡ ἐφαπτομένη ἄρα αὐξάνει ταχύτερα ἀπὸ τοῦ μηδενὸς καὶ τείνει πρὸς τὸ $+\infty$, ἐφ' ὅσον τὸ Μ πλησιάζει πρὸς τὸ Β', ἦτοι τὸ \overline{AM} πλησιάζει πρὸς τὰς 270° . Καθ' ἣν στιγμὴν τὸ Μ διέρχεται διὰ τοῦ Β', ἡ ἐφαπτομένη μεταπηδᾷ πάλιν ἀπὸ τοῦ $+\infty$ εἰς τὸ $-\infty$ καὶ βαίνει εἴτα συνεχῶς αὐξανόμενη, ἐφ' ὅσον τὸ Μ διαγράφει τὸ δ' τεταρτημόριον, καὶ καθίσταται μηδέν, ὅταν τὸ \overline{AM} γείνη 360° .

Ἐὰν ἡ κίνησις τοῦ Μ ἐξακλουθήσῃ κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, ἦτοι τὸ τόξον ΑΜ λαμβάνῃ τιμὰς μειζονας περιφερείας, εἶναι εὐνόητον ὅτι τοῦτο διέρχεται διὰ τῶν αὐτῶν κατὰ σειράν θέσεων καὶ ἐπομένως (§ 44 α') ἡ ἐφαπτομένη λαμβάνει τὰς αὐτὰς καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειράν τιμὰς.

Τὴν τοιαύτην μετὰ τοῦ τόξου μεταβολὴν τῆς ἐφαπτομένης συνοψίζομεν ἐν τῷ ἀκολούθῳ πίνακι, ἐν' ᾧ θεωρεῖται τὸ τόξον μεταβαλλόμενον ἀπὸ 0° ἕως 2π .




Ἐκ τοῦ πίνακος τούτου καθίσταται φανερόν ὅτι ἡ ἐφαπτομένη δύναται νὰ λάβῃ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν.

§ 46. Γραφικὴ προάστισις τῶν μεταβολῶν τῆς ἐφαπτομένης. — Τὴν προηγουμένως σπουδασθεῖσαν μεταβολὴν τῆς ἐφαπτομένης μετὰ τοῦ τόξου αἰσθητοποιοῦμεν διὰ τῆς καμπύλης ΟΕΖΒΗΘΔ, τῆς ὁποίας τὰ σημεῖα ὀρίζομεν κατὰ τρόπον ἀνάλογον πρὸς τὸν ἐν (§ 38) ἐκτεθέντα.

Πρὸς πληρεστέραν δὲ κατανόησιν τοῦ σχήματος αὐτῆς παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς :

Ἐφ' ὅσον τὸ τόξον τείνει πρὸς τὰς 90° ἐκ τιμῶν ἐλασσόνων, τὸ μῆκος του τείνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν $\frac{\pi}{2} = (\overline{OA})$. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐφαπτομένη τοῦ τόξου αὐξάνει τότε ταχύτερα καὶ δύναται νὰ ὑπερβῇ πάντα ἀριθμὸν, τὰ ἐκ τῶν διαφόρων σημείων τοῦ ΟΑ ἀγόμενα κάθετα ἀνύσματα μΜ... αὐξάνουσι ταχύτερα καὶ τείνουσιν εἰς τὸ ἄπειρον ἐφ' ὅσον τὸ μ προσεγγίξῃ πρὸς τὸ Α. Τὰ ἀντί-

στοιχα ἄρα σημεία, M, M' . τῆς καμπύλης διαρκῶς ἀπομακρύνονται τοῦ ἄξονος $\chi\chi$ καὶ ἀπαύστως πλησιάζουσι πρὸς τὴν κάθετον AA , οὐδέποτε ὅμως φθάνουσι ταύτην.



(Σχ. 29)

Ὅταν δὲ τὸ τόξον ὑπερβῇ κατ' ἐλάχιστον τὰς 90° , τὸ μ ἐμφανίζεται δεξιὰ τοῦ A καὶ εἰς ἐλάχιστην ἀπ' αὐτοῦ ἀπόστασιν. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐφαπτομένη καθίσταται τότε ἀρνητικὴ καὶ πολὺ μεγάλη ἀπολύτως, τὸ ἀντίστοιχον σημεῖον τῆς καμπύλης ἐμφανίζεται κάτω τοῦ ἄξονος $\chi\chi$ εἰς μεγάλην ἀπ' αὐτοῦ ἀπόστασιν καὶ ἐγγύτατα τῆς εὐθείας AA' , οὐδέποτε ὅμως ἐπ' αὐτῆς, ὅσονδήποτε πλησίον τοῦ A καὶ ἂν κεῖται τὸ μ .

Ἐκτοτε τοῦ τόξου τείνοντος πρὸς τὰς 180° , ἐπειδὴ ἡ ἐφαπτομένη ἀρνητικὴ οὖσα βαίνει αὐξανόμενη, ἡ καμπύλη πλησιάζουσα πρὸς τὸν ἄξονα $\chi\chi$, τέμνει αὐτὸν εἰς τὸ B [(\overline{OB}) εἶναι μῆκος τόξ. 180° ἦτοι π] καὶ βαίνει ἀπαύστως πλησιάζουσα πρὸς τὴν εὐθεῖαν ΓP , ἐφ' ὅσον τὸ τόξον τείνει πρὸς τὰ 270° (μῆκος $\frac{3\pi}{2}$) οὐδέποτε ὅμως συναντᾷ αὐτήν. Ἐμφανίζεται ἔπειτα πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῆς $\Gamma P'$ ἀνέρχεται πάλιν πρὸς τὸ ἄνω καὶ ὅταν τὸ τόξον γείνη 360° καταλήγει εἰς Δ .

ΣΗΜ. Αἱ εὐθεῖαι $\Lambda'\Lambda$, $P'P$ λέγονται ἀσύμπτωτοι τῆς καμπύλης $OEZB\eta\Theta\Delta$.

Ἀσκήσεις. 72) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς ἐφχ, ὅταν τὸ τόξον χ ἐλαττωταί ἀπὸ 0° μέχρι -2π καὶ νὰ παρασταθῇ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

73) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $1 + \epsilon\phi\chi$, ὅταν τὸ τόξον χ βαίνη συνεχῶς αὐξανόμενον ἀπὸ 0° ἕως 2π καὶ νὰ παρασταθῇ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

74) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $2\epsilon\phi\chi - 1$,
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

δταν τὸ τόξον χ μεταβάλληται ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

75) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $\epsilon\phi'\chi - 1$, δταν τὸ τόξον χ μεταβάλληται ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

§ 47. **Συνεφαπτομένη τόξου.**—Ἐστωσαν $\chi'\chi$ καὶ $\psi'\psi$ (Σχ. 30) οἱ πρὸς ἀρχὴν A τῶν τόξων ἀναφερόμενοι πρωτεύοντες ἄξονες καὶ $\phi'\phi$ ἢ εἰς τὸ πέρασ τοῦ α' τεταρτημορίου ἐφαπτομένη τοῦ τριγ. κύκλου O , ἣτις ἔχει διευθύνον ἄνυσμα τὸ \overline{OA} (§ 4). Ἐὰν ἡ τελικὴ ἀκτίς OM τυχόντος τόξου AM προεκτεινομένη τέμνῃ τὴν $\phi'\phi$ εἰς τι σημεῖον Σ , ὑπ' αὐτοῦ καὶ τοῦ σημείου ἐπαφῆς B ὀρίζεται τὸ ἄνυσμα $B\Sigma$, ὅπερ ἔχει μῆκος $\frac{B\Sigma}{OA} = (\overline{B\Sigma})$.

Τὸ μῆκος τοῦτο $(\overline{B\Sigma})$ καλεῖται **συνεφαπτομένη** τοῦ τόξου AM . Ὅμοίως τοῦ τυχόντος τόξου AM' συνεφαπτομένη εἶναι τὸ μῆκος τοῦ ἀνύσματος $B\Sigma'$, ἥτοι ὁ ἀριθμὸς $\frac{B\Sigma'}{OA} = (\overline{B\Sigma'})$.


Ἡ ἐφαπτομένη τοῦ τριγ. κύκλου εἰς τὸ πέρασ τοῦ α' τεταρτημορίου καλεῖται **ἄξων τῶν συνεφαπτομένων**.

Συνεφαπτομένη δὲ τόξου καλεῖται τὸ μῆκος τοῦ ἀνύσματος, ὅπερ ἔχει ἀρχὴν μὲν τὸ πέρασ τοῦ α' τεταρτημορίου, τέλος

δὲ τὸ κοινὸν σημεῖον τοῦ ἄξονος τῶν συνεφαπτομένων καὶ τῆς προεκτάσεως τῆς τελικῆς τοῦ τόξου ἀκτίνος.

Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς συνεφαπτομένης τόξου ἔπεται εὐκόλως ὅτι :

α') **Πάντα τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὰ αὐτὰ ὁμώνυμα ἄ-**



(Σχ. 30)

κτα, ἔχουσι τὴν αὐτὴν συνεφαπτομένην.

β') **Ἡ συνεφαπτομένη τόξου εἶναι θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ,**

καθ' ὅσον τὸ ἄνυσμα, οὗ αὐτὴ εἶναι μῆκος, εἶναι ὁμόροπον ἢ ἀντίροπον πρὸς τὸ διευθύνον ἄνυσμα ΟΑ.

Κατὰ ταῦτα, τὰ εἰς τὸ α' καὶ γ' τεταρτημόριον περατούμενα το, ἔχουσι συνεφαπτομένην θετικὴν, τὰ δὲ εἰς τὸ δ' καὶ ε' ἀρνητικὴν.

ΣΗΜ. Τὴν συνεφαπτομένην τόξου, ὅπου ἔχει μέτρον τ, σημειοῦμεν συντόμως οὕτω : σφτ.

'**Δοκίμσεις.** 76) Ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα $12^\circ, 300^\circ 67' 15''$,

$206^\circ 27' 35''$, $150^\circ, 205^\circ 10'$ ἔχουσι θετικὴν συνεφαπτομένην καὶ ποῖα ἀρνητικὴν :

77) Ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα $-32^\circ 15', -95^\circ, -250^\circ 45', -322^\circ 37' 10'', -260^\circ, -304^\circ, -130^\circ$ ἔχουσι συνεφαπτομένην θετικὴν καὶ ποῖα ἀρνητικὴν :

78) Εἰς ποῖον τεταρτημόριον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὅποια ἔχουσι θετικὴν ἐφαπτομένην καὶ συνεφαπτομένην ; Εἰς ποῖον δὲ τὰ ἔχοντα ἀρνητικὴν ἐφαπτομένην καὶ συνεφαπτομένην ;

79) Εἰς ποῖον τεταρτημόριον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὅποια ἔχουσι θετικὴν συνεφαπτομένην καὶ θετικὸν ἡμίτονον ; Εἰς ποῖον δὲ τὰ ἔχοντα ἀρνητικὴν συνεφαπτομένην καὶ ἀρνητικὸν ἡμίτονον ;

80) Εἰς ποῖον τεταρτημόριον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὅποια ἔχουσι θετικὴν συνεφαπτομένην καὶ θετικὸν συνημίτονον ; Εἰς ποῖον δὲ τὰ ἔχοντα ἀρνητικὴν συνεφαπτομένην καὶ ἀρνητικὸν συνημίτονον ;


81) Εἰς ποῖον τεταρτημόριον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὅποια ἔχουσι θετικὴν συνεφαπτομένην καὶ ἀρνητικὸν ἡμίτονον ; Εἰς ποῖον δὲ τὰ ἔχοντα ἀρνητικὴν συνεφαπτομένην καὶ θετικὸν ἡμίτονον ;

82) Εἰς ποῖον τεταρτημόριον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὅποια ἔχουσι θετικὴν συνεφαπτομένην καὶ ἀρνητικὸν συνημίτονον ; Εἰς ποῖον δὲ τὰ ἔχοντα ἀρνητικὴν συνεφαπτομένην καὶ θετικὸν συνημίτονον ;

83) Νὰ κατασκευασθῇ τὸ ἄνυσμα, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος εἶναι συνεφαπτομένη 45° καὶ νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι αὐτὴ ἰσοῦται πρὸς $+1$.

§ 48. Μεταβολὴ τῆς συνεφαπτομένης μετὰ τοῦ τόξου. — Ἐστω ΑΜ τόξον τι θετικὸν καὶ μικρότερον τεταρτημορίου καὶ ($\overline{B\Sigma}$) ἡ συνεφαπτομένη αὐτοῦ (Σχ. 30). Ἐὰν τὸ πέρας Μ αὐτοῦ κινῆται ἐπὶ τῆς περιφερείας κατὰ τὴν ἀρνητικὴν φοράν, τὸ σημεῖον Σ ἀποκρύνεται τοῦ Β κινούμενον ἐπὶ τοῦ ἄξονος φ'φ κατὰ τὴν θετικὴν φοράν, ἤτοι τοῦ ρηθέντος τόξου ΑΜ ἐλαττωμένου καὶ πρὸς τὸ μηδὲν τείνοντος ἡ συνεφαπτομένη αὐτοῦ ($\overline{B\Sigma}$) αὐξάνεται ταχύτατα· ὅταν δὲ τὸ ($\overline{ΑΜ}$) γείνηθῃ 0° , ἡ τελικὴ αὐτοῦ ἕκτις καθί-

σταται παράλληλος τῷ φ'φ καὶ τὸ Σ ἀνανίσταται εἰς τὸ θετικὸν ἄπειρον. Τοῦτο ἐκφράζομεν οὕτω: Τοῦ τόξου τείνοντος ἐκ θετικῶν τιμῶν εἰς τὸ μηδέν, ἢ συνεφαπτομένη αὐτοῦ θετικὴ οὐσα τείνει νὰ ὑπερβῇ πάντα ἀριθμὸν, ἥτοι τείνει εἰς τὸ + ∞.



(Σχ. 31)

Ἐὰν ἤδη τὸ πέρασ Μ ἀπὸ τοῦ Α ἀρχόμενον κινῆται ἐπὶ τῆς περιφερείας κατὰ τὴν θετικὴν φοράν, τὸ σημεῖον Σ κινεῖται ἐπὶ τοῦ

ἄξονος φ'φ κατὰ τὴν ἀρνητικὴν φοράν, συμπίπτει μετὰ τοῦ Β, δταν $\widehat{AM} = 90^\circ$ καὶ ἐξακολουθεῖ κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν κινούμενον καὶ ἀπείρως ἀπομακρυνόμενον τοῦ Β, ἐφ' ὅσον τὸ Μ πλησιάζει πρὸς τὸ Α', ἥτοι ἐφ' ὅσον τὸ τόξον τείνει πρὸς τὰς 180° . Κατὰ ταῦτα τοῦ τόξου αὐξάνοντος ἀπὸ 0° μέχρις 180° , ἢ συνεφαπτομένη αὐτοῦ ἐλαττοῦται ἀπὸ + ∞ μέχρι τοῦ - ∞, καθισταμένη ἐν τῷ

μεταξὺ Ο, δταν $(\widehat{AM}) = 90^\circ$.

Ὅταν τὸ Μ ὑπερβάν τὸ Α' διαγράφη τὸ γ' τεταρτημόριον, ἢ συνεφαπτομένη καθίσταται θετικὴ καὶ εἶναι ἀπείρως μεγάλη, ἐφ' ὅσον τὸ Μ εἶναι ἀκόμη ἐγγύτατα τοῦ Α'. Ὄποτε, καθ' ἣν στιγμὴν τὸ Μ διέρχεται διὰ τοῦ Α' μεταβαίνειν ἐκ τοῦ β' εἰς τὸ γ' τεταρτημόριον, ἢ συνεφαπτομένη τοῦ \widehat{AM} μεταπηδᾷ ἐκ τοῦ - ∞ εἰς τὸ + ∞. Ἀπομακρυνομένου δὲ τοῦ Μ ἀπὸ τοῦ Α', ἥτοι τοῦ \widehat{AM} αὐξάνοντος ἀπὸ 180° ἕως 360° , τὸ Σ κινεῖται κατὰ τὴν ἀρνητικὴν φοράν ἐπὶ τοῦ ἄξονος φ'φ καὶ κατ' ἀκολουθίαν ἢ συνεφαπτομένη (\widehat{BS}) ἐλαττοῦται συνεχῶς ἀπὸ τοῦ + ∞ μέχρι τοῦ - ∞, καθισταμένη ἐν τῷ μεταξὺ Ο, δταν $\widehat{AM} = 270^\circ$.


Ἐὰν τὸ Μ ἐπανελθὼν ἤδη εἰς τὴν ἀρχὴν Α ἐξακολουθήσῃ κινούμενον κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, ἥτοι, ἐὰν τὸ τόξον λαμβάνῃ τιμὰς μείζονας περιφερείας, τὸ Σ ἐμφανίζεται πάλιν ἐπὶ τοῦ Βφ καὶ διέρχεται πάλιν διὰ τῶν αὐτῶν θέσεων ὥστε ἢ συνεφαπτομένη λαμβάνει πάλιν τὰς αὐτὰς κατὰ σειράν τιμὰς.

Τὴν τοιαύτην μετὰ τοῦ τόξου μεταβολὴν τῆς συνεφαπτομένης συνοφίζομεν ἐν τῷ ἀκολουθῶνί πινάκῳ, ἐν ᾧ τὸ τόξον θεωρεῖται μεταβαλλόμενον ἀπὸ 0° ἕως 360° .

τόξον	{ εἰς μοίρας } { εἰς αὐτίγια }	0°	90°	180°	270°	360°
		0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
συνεφαπτομένη		$+\infty$	0	$-\infty$	0	$+\infty$

Ἐκ τούτου βλέπομεν ὅτι ἡ συνεφαπτομένη δύναται νὰ λάβῃ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν.

§ 49. Γραφικὴ παράστασις τῶν μεταβολῶν τῆς



(Σχ. 32)

συνεφαπτομένης. Ἐὰν ἐργασθῶμεν διὰ τὴν συνεφαπτομένην, ὅπως (ἐν § 46) ἐιργάσθημεν διὰ τὴν ἐφαπτομένην, ὀρίζομεν τὴν καμπύλην ΕΑΖΗΓΘ (Σχ. 32), δι' ἧς αἰσθητοποιεῖται ἡ προηγουμένως σπουδασθεῖσα μεταβολὴ τῆς συνεφαπτομένης, τόξου μετὰ τοῦ τόξου.

Ἡ καμπύλη αὕτη ἔχει ἀσυμπτώτους τὸν ἄξονα ψ'ψ, τὴν εὐθεῖαν Α'ΒΛ, δι' ἣν εἶναι $(\overline{OB}) = \pi$ καὶ τὴν εὐθεῖαν Ν'ΔΝ, δι' ἣν εἶναι $(\overline{OD}) = 2\pi$.

Ἀσκήσεις. 84) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς σφχ, ὅταν τὸ τόξον χ ἐλαττωταῖ ἀπὸ 0° ἕως -2π καὶ νὰ παρασταθῇ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

85) Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $1 + \sigma\phi\chi$, ὅταν τὸ τόξον χ βαίῃ συνεχῶς ἀξάνόμενον ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$. Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.


86) Νὰ σπουδασθῇ ἡ συνάρτησις $1 - \sigma\phi\chi$ ὅταν χ ἀξάνηται ἀπὸ -2π ἕως 2π καὶ νὰ παρασταθῇ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

87) Νὰ παρασταθῇ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως

3σφχ-1, όταν τὸ τόξον χ βαλῆναι ἀξανάμενον ἀπὸ -2π ἕως $+2\pi$.

§ 50. Τέμνουσα καὶ συντέμνουσα τόξου.— Ὑποθεσίτω ὅτι ἡ εἰς τὸ πέρας M τυχόντος τόξου AM (Σχ. 33) ἐφαπτομένη τοῦ τριγ. κύκλου τέμνει τὸν μὲν ἄξονα τῶν συνημιτόνων εἰς τὸ σημεῖον Γ, τὸν δὲ τῶν ἡμιτόνων εἰς τὸ Δ. Τὸ κέντροn O καὶ τὰ σημεῖα ταῦτα Γ καὶ Δ ὀρίζουσιν ἐπὶ τῶν προειρημένων ἀξόνων τὰ ἀ μέτρα ΟΓ καὶ ΟΔ. Τοῦ πρώτου τούτων τὸ μήκος, ἧτοι ὁ ἀριθμὸς $\frac{\overline{O\Gamma}}{OA}$ = $(\overline{O\Gamma})$ καλεῖται **τέμνουσα** τοῦ τόξου AM. Τοῦ δὲ

δευτέρου τὸ μήκος, ἧτοι ὁ ἀριθμὸς $\frac{\overline{O\Delta}}{OB}$ = $(\overline{O\Delta})$ καλεῖται **συντέ-**



(Σχ. 33)

μνουσα τοῦ τόξου AM. Ὀμοίως τυχόντος τόξου AM' τέμνουσα μὲν εἶναι ὁ ἀριθμὸς $\frac{\overline{O\Gamma'}}{OA}$ = $(\overline{O\Gamma'})$, συντέμνουσα δὲ ὁ ἀριθμὸς $\frac{\overline{O\Delta'}}{OB}$ = $(\overline{O\Delta'})$.

Γενικῶς: Τέμνουσα τόξου καλεῖται τὸ μήκος τοῦ ἀνύσματος, ὃπερ ἔχει ἀρχὴν μὲν τὸ κέντρον τοῦ τριγ. κύκλου, τέλος δὲ τὸ κοινὸν σημεῖον καὶ ἄξονος τοῦ ἐκπαισθημένου καὶ τῆς εἰς τὸ πέρας τοῦ τόξου ἐφαπτομένης τοῦ τριγ. κύκλου.

Συντέμνουσα τόξου καλεῖται τὸ μήκος τοῦ ἀνύσματος, ὅπερ ἔχει ἀρχὴν μὲν τὸ κέντρον τοῦ τριγ. κύκλου, τέλος δὲ τὸ κοί-
την σημεῖον τοῦ ἄξονος τῶν ἡμιτόνων καὶ τῆς εἰς τὸ πέρα-
τοῦ τόξου ἐφαπτομένης τοῦ τριγ. κύκλου.

Ἐκ τῶν ὁρισμῶν τούτων ἔπεται ὅτι :

α'). Πάντα τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὰ αὐτὰ ὁμώνυμα
ἄκρα, ἔχουσι τὴν αὐτὴν τέμνουσαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν αὐτὴν
συντέμνουσαν.

β'). Ἡ τέμνουσα τόξου εἶναι θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ, καθ' ὅσον
τὸ ἀνύσμα, οὗ αὕτη εἶναι μῆκος, εἶναι ὁμόρροπον ἢ ἀντίρρο-
πον πρὸς τὸ διευθύνον ἀνύσμα OA .

Κατὰ ταῦτα, τὰ εἰς τὸ α' καὶ δ' τεταρτημόριον περατούμενα
τόξα ἔχουσι τέμνουσαν θετικὴν, τὰ δὲ εἰς τὸ β' καὶ γ' ἀρνητικὴν.

γ'). Ἡ συντέμνουσα τόξου εἶναι θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ, καθ'
ὅσον τὸ ἀνύσμα, οὗ αὕτη εἶναι μῆκος, εἶναι ὁμόρροπον ἢ ἀν-
τίρροπον πρὸς τὸ διευθύνον ἀνύσμα OB .

Κατὰ ταῦτα, τὰ εἰς τὸ α' καὶ β' τεταρτημόριον περατούμενα
τόξα ἔχουσι συντέμνουσαν θετικὴν, τὰ δὲ εἰς τὸ γ' καὶ δ' ἀρνη-
τικὴν.

ΣΗΜ. Ἐὶν τέμνουσαν τόξου ἔχοντος μέτρον τ σημειοῦμεν συντόμως
οὕτω : τεμτ, τὴν δὲ συντέμνουσαν οὕτω : στεμτ.

* **Ἀσκήσεις.** 88) Νὰ σπουδασθῆ ἡ μεταβολὴ τῆς τεμνούσης
τόξου, ὅταν τοῦτο συνεχῶς βαίνει ἀξονόμενον ἀπὸ 0° ἕως 2π
καὶ νὰ παρασταθῆ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη. Τὸ αὐτὸ διὰ τὴν
συντέμνουσαν.


89) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι, ἂν ἡ τελικὴ ἀκτὶς OM τόξου AM προε-
κτεινομένη τέμνῃ τὸν ἄξονα τῶν ἐφαπτομένων εἰς τι σημεῖον Θ τὸ
ἀνύσμα $O\Theta$ ἰσοῦται ἀπολύτως πρὸς τὴν τέμνουσαν αὐτοῦ.

90) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι, ἂν ἡ τελικὴ ἀκτὶς OM τυχόντος τόξου
 AM προεκτεινομένη τέμνῃ τὸν ἄξονα τῶν συνεφαπτομένων εἰς τι
σημεῖον E , τὸ ἀνύσμα OE ἰσοῦται ἀπολύτως πρὸς τὴν συντέμνου-
σαν αὐτοῦ.

§ 51. Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τόξου. — Τὸ συνημί-
τονον, ἡμίτονον, ἐφαπτομένη, τέμνουσα καὶ συντέμνουσα τόξου
καλοῦνται πάντα ἑμοῦ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου τούτου.
Τὰ δὲ ἀνύσματα, ὧν οὗτοι εἶναι μῆκη, καλοῦνται πάντα ἑμοῦ τρι-
γωνομετρικαὶ γραμμαὶ τοῦ τόξου. Πρὸς διάκρισιν ἀπ' ἀλλήλων
ἐκάστη τριγ. γραμμὴ λαμβάνει τὸ ὄνομα τοῦ μήκους αὐτῆς.

§ 32. Τριγωνομετρικοί ἀριθμοὶ γωνίας. —

Ἐστω $\sphericalangle O\chi, O\psi$ τυχούσα γωνία (Σχ. 34). Ἡ μὲν κέντρον τὴν κορυφὴν αὐτῆς καὶ ἀκτίνα τὴν μονάδα τοῦ μήκους γραφομένη περιφέρεια τέμνει τὴν μὲν ἀρχικὴν πλευρὰν $O\chi$ εἰς σημεῖον A , τὴν δὲ τελικὴν εἰς τὸ Γ . Οὕτως εἰς τὴν τυχούσαν γωνίαν



(Σχ. 34)


$\sphericalangle O\chi, O\psi$ ἀντιστοιχεῖ (§ 30) τὸ ξὸν τι $A\Gamma$ κείμενον ἐπὶ τῆς περιφέρειας τοῦ τριγ. κύκλου. Τούτων τεθέντων καλοῦμεν ἡμίτονον συνημίτονον, ἐφαπτομένην, συνεφαπτομένην, τέμνουσαν καὶ συντέ-

μνουσαν τῆς γωνίας $\sphericalangle O\chi, O\psi$ τὸν δμώνυμον τριγωνομετρικὸν ἀριθμὸν τοῦ ἀντιστοίχου τόξου $A\Gamma$. Ὁμοίως ἡμίτονον, συνημίτονον κτλ.

γωνίας τινὸς $\sphericalangle O\chi, O\zeta$ καλεῖται τὸ ἡμίτονον, συνημίτονον κτλ. τοῦ εἰς ταύτην ἀντιστοιχοῦντος τόξου $A\Delta$.

Γενικῶς : Ἡμίτονον συνημίτονον κτλ. γωνίας καλεῖται ὁ δμώνυμος τριγ. ἀριθμὸς τοῦ ἀντιστοίχου τόξου, ὅπερ κεῖται ἐπὶ τῆς περιφέρειας τριγ. κύκλου.

§ 33. Συνημίτονον τῆς γωνίας τῶν θετικῶν διευθύνσεων δύο ἀξόνων. — Ἐστώσαν \overline{OA} καὶ $\overline{O\Gamma}$ (Σχ. 35) τὰ διευθύ-



(Σχ. 35)

νοντα ἀνύσματα δύο ἀξόνων $\chi'\chi$ καὶ $\psi'\psi$ τεμνομένων εἰς τι σημεῖον O , ὅπερ καθιστῶμεν κέντρον τριγ. κύκλου. Ἐμάθομεν ἤδη (§ 33) ὅτι

γωνία τῶν θετικῶν διευθύνσεων τῶν ἀξόνων τούτων εἶναι ἢ ω ἢ η ἢ φ , καθ' ὅσον ὡς ἀρχικὴ πλευρὰ λαμβάνεται ὁ ἡμίξων $O\chi$ ἢ ὁ $O\psi$.

Κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν εἶναι $\text{συν}\omega = (\overline{O\Pi})$, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν $\text{συν}\varphi = (\overline{O\rho})$. Ἐπειδὴ δὲ (§ 33 σημ.) εἶναι $(\overline{O\Pi}) = (\overline{O\rho})$ ἔπεται ὅτι :

$$\text{συν}\omega = \text{συν}\varphi, \text{ ἦτοι} :$$

Τὸ συνημίτονον τῆς γωνίας τῶν θετικῶν διευθύνσεων δύο ἀξόνων εἶναι τὸ αὐτό, οἷα σὸς ἴσως οὕσης τῆς ἀρχικῆς πλευρᾶς αὐτῆς⁽¹⁾.

§ 34. Ἔτερα ἔκφρασις τοῦ μήκους τῆς ὀρθῆς προβολῆς ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα. — Ἐστω ΔE τυχὸν ἀνύσμα κείμενον ἐπὶ ἄξονος $\psi\psi$, ὅστις ἔχει διευθύνον ἀνύσμα $O\Gamma$ καὶ σύντελεστήν προβολῆς $(\overline{O\Pi})$ ἐπὶ ἕτερον ἄξονα $\chi\chi$ (Σχ. 36). Ἐμάθωμεν ἤδη (§ 12 Γ') ὅτι, ἂν $\delta\epsilon$ εἶναι ἡ προβολὴ τοῦ $\overline{\Delta E}$ ἐπὶ τὸν ἄξονα $\chi\chi$ ἀληθεύει ἡ ἰσότης

$$(\overline{\delta\epsilon}) = (\overline{\Delta E}) \cdot (\overline{O\Pi}).$$

Ἐπειδὴ δὲ $(\overline{O\Pi}) = \text{συν}\omega = \text{συν}\varphi$, ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται

$$(\overline{\delta\epsilon}) = (\overline{\Delta E}) \cdot \text{συν}\omega = (\overline{\Delta E}) \cdot \text{συν}\varphi. \quad (1)$$

Ἄρα: Τὸ μήκος τῆς προβολῆς ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα ἰσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ μήκους αὐτοῦ ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς γωνίας τῶν θετικῶν διευθύνσεων τοῦ προβολικοῦ ἄξονος καὶ τοῦ περιέχοντος τὸ ἀνύσμα τοῦτο ἄξονος.

ΣΗΜ. Ἐὰν τὸ ἀνύσμα κεῖται ἐπὶ ἄξονος παραλλήλου πρὸς τὸν προβ. ἄξονα, τὸ μήκος τῆς προβολῆς αὐτοῦ ἰσοῦται πρὸς τὸ μήκος τοῦ ἀνύσματος τούτου. Καὶ ἡ ἰσότης (1) εἰς τὸ αὐτὸ ἄγει ἐξαγόμενον, καθ' ὅσον ἡ γωνία τῶν θετικῶν διευθύνσεων τῶν παραλλήλων ἀξόνων εἶναι μηδὲν καὶ τὸ συνημίτονον αὐτῆς +1. Ἀληθεύει ἄρα καὶ ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ προηγουμένη πρότασις.


Ἀσκήσεις. 91). Ἀνύσμα μήκους $0,15''$ κεῖται ἐπὶ τῆς διχοτομοῦσης τὴν γωνίαν τῶν θετικῶν διευθύνσεων δύο πρωτεύοντων ἀξόνων τριγ. κύκλου. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μήκος τῆς προβολῆς αὐτοῦ ἐπὶ ἑκάτερον τῶν ἀξόνων τούτων.

92) Ἡ γωνία τῶν θετικῶν διευθύνσεων δύο ἀξόνων εἶναι 30° . Νὰ εὐρεθῇ ὁ σύντελεστής προβολῆς ἑκατέρου τούτων ἐπὶ τὸν ἕτερον.

93) Ἀνύσμα μήκους $0,40''$ κεῖται ἐπὶ ἄξονος, ὅστις τέμνει τὸν

(1) Τὰ διευθύνοντα ἀνύσματα $O\Delta$, $O\Gamma$ εἶναι ἀκτῖνες τριγ. κύκλου, ἄρα ἴσα ἀποψήφισθησαν ἀπὸ τοῦ ἰσοπλάτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

προβ. άξονα υπό γωνίαν 60° . Να εύρεθῆ τὸ μήκος τῆς προβολῆς αὐτοῦ.



(Σχ. 36)

94) Άνύσματος κειμένου ἐπὶ άξονος τέμνοντος τὸν προβ. άξονα ὑπὸ γωνίαν 30° ἡ προβολή έχει μήκος $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. Πόσον εἶναι τὸ

μήκος τοῦ άνύσματος τούτου ;

95). Ἐάν ληφθῆ ὡς προβολικός άξων δ άξων τῶν συνημιτόνων, πόσον εἶναι τὸ μήκος τῆς προβολῆς άνύσματος κειμένου ἐπὶ τοῦ άξονος τῶν ἡμιτόνων ;

§ 55. Τόξοι. ὡν διδεται τριγωνομετρικός τις ἀριθμός. — Ἐξ ὧν μέχρι τοῦδε περὶ τῶν τριγ. ἀριθμῶν τόξου (ἢ γωνίας) ἐλέχθησαν, καθίσταται φανερόν ὅτι εἰς ἕκαστον τόξον (ἢ γωνίαν) ἀντιστοιχεῖ ὠρισμένος τριγ. ἀριθμός ἐξ ἑκάστου εἶδους. Ἐξετάσωμεν ἤδη, ἂν ἀντιστρόφως εἰς δεδομένον τριγ. ἀριθμὸν ἀντιστοιχῆ ἢ οὐ ὠρισμένον τόξον. Πρὸς τοῦτο θὰ λύσωμεν τὸ ἀκόλουθον πρόβλημα.

Πρόβλημα. — *Νὰ εύρεθῆ τόξον, ὅπερ ἔχει δεδομένην τριγ. ἀριθμόν.* — Ὀρίζομεν πρῶτον ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ τριγ. κύκλου σημεῖόν τι Α ὡς ἀρχὴν τῶν τόξων, καὶ κατασκευάζομεν τὸ ἀντίστοιχον σύστημα πρωτεύοντων άξόνων $x'x$ καὶ $\psi'\psi$ (Σχ. 37, 38, 39). Ἐἴτα διακρίνομεν τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις.


Α' Ἐὰν διδῆται τόξον ἔχον συνημιτόνον α.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Παρατηρούμεν ἐν πρώτοις ὅτι, ἵνα ἔχῃ τὸ πρόβλημα λύσιν, πρέπει ὁ a νὰ μὴ εἶναι ἀπολύτως μείζων τοῦ 1. Τοῦ περιορισμοῦ τούτου ἐπιπληρουμένου λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν συνημιτόνων ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀρχόμενοι ἄνυσμα $O\Pi$ τοιοῦτον ὥστε νὰ εἶναι $(O\Pi) = a$ καὶ ἄγομεν διὰ τοῦ Π χορδὴν κάθετον ἐπὶ τὸν $\chi\chi'$ τὴν $M'M$.

Εἶναι ἤδη εὐνόητον ὅτι πᾶν τόξον \widehat{AM} καὶ ὡς πᾶν $\widehat{AM'}$ ἔχει συνημίτονον $(O\Pi) = a$ καὶ πλὴν τούτων οὐδὲν ἄλλο τόξον ἔχει τὸ δοθὲν συνημίτονον, διότι οὐδὲν ἄλλο σημεῖον (πλὴν τῶν M καὶ M') τῆς περιφερείας προβάλλεται εἰς τὸ Π . (Σχ. 37)

ΣΗΜ. Ἐὰν $a = \pm 1$, τὰ σημεῖα M καὶ M' συμπίπτουσιν εἰς τὸ A ἢ τὸ A' καὶ τὸ δοθὲν συνημίτονον ἔχουσι πάντα τὰ \widehat{AA} ἢ πάντα τὰ $\widehat{A'A'}$ καὶ μόνον αὐτά.



(Σχ. 37)

Κατὰ ταῦτα, ἐὰν δύο τόξα τὴν αὐτὴν ἔχοντα ἀρχὴν ἔχωσι τὸ αὐτὸ συνημίτονον (π.χ. a), τὰ πέρατα αὐτῶν ἢ συμπίπτουσιν ἢ εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὸν ἄξονα τῶν συνημιτόνων. Ἄρα (§ 24, 25) μεταξὺ τῶν μέτρων αὐτῶν χ καὶ τ ἀληθεύει ἡ ἑτέρα τῶν ἰσοτήτων $\chi \pm \tau = 2K\pi$, αἵτινες ἐκφράζουσιν ὅτι:

Ἐὰν δύο τόξα ἔχωσι τὸ αὐτὸ συνημίτονον, ἡ διαφορὰ ἢ τὸ ἀθροισμα τῶν μέτρων αὐτῶν εἶναι μηδὲν ἢ πολλαπλάσιον (θετ. ἢ ἀρν.) τοῦ μέτρου θετικῆς περιφερείας.

Ἐκ τῶν προηγουμένων ἰσοτήτων προκύπτουσιν αἱ ἰσότητες :

$$\chi = 2K\pi \pm \tau,$$

δι' ὧν ἐρίζονται τὰ μέτρα, ὅσωνδήποτε θέλομεν, ἐκ τῶν τόξων, ὧν ἕκαστον ἔχει συνημίτονον ἴσον πρὸς τὸ συνημίτονον τοῦ γνωστοῦ τόξου τ . Ἡ ἰσότης π. χ. $\text{συν}\chi = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ἢ $\text{συν}\chi = \text{συν} \frac{\pi}{4}$ ἀληθεύει διὰ

πάντα μόνον τὰ τόξα, ἅτινα παρέχουσιν αἱ ἰσότητες $\chi = 2K\pi \pm \frac{\pi}{4}$

B'. Ἄν ζητηθῆται τόξον ἔχον τέμνουσαν a , (ὅστις a δὲν πρέπει

νά είναι ἀπολύτως μικρότερος τοῦ 1), λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἀξονος τῶν συνημιτόνων ἄνυσμα $ΟΓ$ τοιοῦτον ὅστε νά εἶναι $(\overline{ΟΓ}) = a$ καὶ ἄγομεν διὰ τοῦ $Γ$ τὰς τοῦ τριγ. κύκλου ἐφαπτομένης $ΓΜ$ καὶ $ΓΜ'$ (Σχ. 37). Εἶναι ἤδη φανερόν (§ 50) ὅτι τὴν δοθεῖσαν τέμνουσαν ἔχουσι πάντα τὰ τόξα $ΑΜ$ καὶ πάντα πάντα τὰ $\overline{ΑΜ'}$. Πλὴν δὲ τούτων οὐδὲν ἄλλο ἔχει τὴν τέμνουσαν ταύτην, διότι οὐδεμία ἄλλη τῆς περιφερείας ἐφαπτομένη διέρχεται διὰ τοῦ $Γ$

ΣΗΜ. Ἐάν εἶναι $a = +1$, τὰ σημεῖα ἐπαφῆς συμπέπτουσιν εἰς τὸ A ἢ τὸ A' καὶ τὴν τέμνουσαν ταύτην ἔχουσι πάντα τὰ \overline{AA} ἢ πάντα τὰ $\overline{A'A'}$ καὶ μόνον αὐτά.


Γ. Ἐστω ὅτι ζητεῖται τόξον ἔχον ἡμίτονον a . Τοῦ a μὴ ὄντος ἀπολύτως μεγαλύτερου τῆς μονάδος, λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἀξονος τῶν ἡμιτόνων ἐκ τοῦ κέντρου ἀρχόμενοι ἄνυσμα $\overline{ΟΡ}$ τοιοῦτον ὅστε νά εἶναι $(\overline{ΟΡ}) = a$ καὶ ἄγομεν διὰ τοῦ P χορδὴν $ΜΜ'$ παράλληλον τῇ $\chi\chi'$ (Σχ. 38). Εἶναι ἤδη φανερόν ὅτι πάντα τὰ τόξα $ΑΜ$ καὶ πάντα τὰ $\overline{ΑΜ'}$ ἔχουσι τὸ δεδομένον ἡμίτονον. Πλὴν δὲ τούτων οὐδὲν ἄλλο τόξον ἔχει τὸ αὐτὸ ἡμίτονον, διότι οὐδὲν ἄλλο σημεῖον (πλὴν τῶν M καὶ M') τῆς περιφερείας προβάλλεται εἰς τὸ P .

ΣΗΜ. Ἐάν $a = +1$ τὰ σημεῖα M καὶ M' συμπέπτουσιν εἰς τὸ B ἢ τὸ B' καὶ ἐπομένως τὸ ἡμίτονον τοῦτο ἔχουσι πάντα τὰ \overline{AB} ἢ πάντα τὰ $\overline{A'B'}$ καὶ μόνον αὐτά.

Κατὰ ταῦτα, ἂν δύο τόξα ἔχοντα ἀρχὴν ἔχουσι τὸ αὐτὸ ἡμίτονον, τὰ πέρατα αὐτῶν ἢ συμπέπτουσιν, ἢ κείνται ἐπὶ χορδῆς παράλληλου τῇ ἀξονι τῶν συνημιτόνων. Ἄρα (§ 24, 26) μεταξὺ τῶν μέτρων χ καὶ τ αὐτῶν ἀληθεύει ἢ ἑτέρα τῶν ἰσοτήτων.

$$\chi - \tau = 2K\pi \quad \text{καὶ} \quad \chi + \tau = (2K + 1)\pi$$

Ὅστε: Ἐάν δύο τόξα ἔχουσι τὸ αὐτὸ ἡμίτονον, ἢ ἡ διαφορὰ τῶν μέτρων αὐτῶν εἶναι μηδέν ἢ ἀρτιον πολλαπλάσιον (θετ. ἢ ἀρνητ.) ἢ τὸ ἀθροισμα εἶναι περιττὸν πολλαπλάσιον (θετ. ἢ ἀρνητ.) τοῦ μέτρου θετικῆς ἡμιπεριφερείας.



Ἐκ τῶν προηγουμένων (ισοτήτων) προκύπτουσιν αἱ ἰσοότητες.

$$\chi = 2K\pi + \tau \text{ καὶ } \chi = (2K + 1)\pi - \tau.$$

δι' ὧν εὐρίσκομεν τὰ μέτρα, ἔσων θέλομεν τόξων, ἐκ τῶν ἐχόντων ἡμίτονον ἴσον πρὸς τὸ τοῦ γνωστοῦ τόξου τ . Π.χ. ἡ ἰσότης $\eta\mu\chi = \frac{1}{2}$

ἢ $\eta\mu\chi = \eta\mu\frac{\pi}{6}$ ἀληθεύει δι' ὄλα μόνον τὰ τόξα, τὰ ὅποια παρέχουσιν αἱ ἰσοότητες

$$\chi = 2K\pi + \frac{\pi}{6} \text{ καὶ } \chi = (2K + 1)\pi - \frac{\pi}{6}.$$

Δ'. Ἄν ζητῆται τόξον ἔχον συντέμνουσαν a , (ἔσως a δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀπολύτως μικρότερος τοῦ 1), λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν ἡμιτόνων ἀνυσμα OA (Σχ. 38) ἔχον μῆκος a καὶ ἀγομεν τὰς διὰ τοῦ A ἐφαπτομένας AM καὶ AM' τοῦ τριγ. κύκλου. Οὕτως ὀρίζονται τὰ πέρατα M καὶ M' τῶν τόξων AM καὶ AM' , ἅτινα πάντα καὶ μόνον αὐτὰ ἔχουσι τὴν δεδομένην συντέμνουσαν.


ΣΗΜ. Ἄν εἶναι $a = +1$, τὰ σημεῖα τῆς ἐπαφῆς συμπέπτουσιν εἰς τ ἢ ἢ τὸ B' καὶ ζητούμενα τόξα εἶναι πάντα τὰ \overline{AB} ἢ τὰ $\overline{AB'}$ καὶ ταῦτα μόνον.

Ε'. Ἐστὶν διὰ ζητεῖται τόξον ἔχον ἐφαπτομένην a . Λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν ἐφαπτομένων $\zeta\zeta'$ (Σχ. 39) ἀπὸ τοῦ A

ἀρχόμενοι ἀνυσμα AT ἔχον μῆκος a καὶ ἀγομεν τὴν OT , ἣτις τέμνει τὴν περιφέρειαν εἰς τὰ σημεῖα M καὶ M' . Εἶναι ἤδη φανερόν ὅτι πᾶν τόξον AM ὡς καὶ πᾶν AM' ἔχει ἐφαπτομένην a . Πλὴν δὲ τούτων οὐδὲν ἄλλο τόξον ἔχει ἐφαπτομένην a , καθ' ὅσον οὐδεμία ἄλλη διάμετρος (πλὴν τῆς MM') διέρχεται διὰ τοῦ T .

Κατὰ ταῦτα, ἐάν δύο τόξα τὴν αὐτὴν ἔχοντα ἀρχὴν ἔχωσι τὴν αὐτὴν

ἐφαπτομένην, τὰ πέρατα αὐτῶν ἢ συμπέπτουσιν ἢ εἶναι συμμετρικὰ



Σχ. 39).

πρὸς τὸ κέντρον τοῦ τριγ. κύκλου. Ἄρα (§ 24, 27) μεταξύ τῶν μέτρων χ καὶ τ αὐτῶν ἀληθεύει ἡ ἑτέρα τῶν ἰσοτήτων

$$\chi - \tau = 2K\pi \text{ καὶ } \chi - \tau = (2K + 1)\pi,$$

ὡς δυνάμεθα νὰ συγχωνεύσωμεν εἰς τὴν

$$\chi - \tau = \lambda\pi.$$

ἐνθα λ δύναται νὰ εἶναι 0 ἢ τυχὸν ἀκέραιος θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς.

Ὡστε: Ἐὰν δύο τόξα ἔχωσι τὴν αὐτὴν ἐφαπτομένην, ἡ διαφορὰ τῶν μέτρων αὐτῶν εἶναι μηδὲν ἢ πολλαπλάσιον (θετ. ἢ ἀρν.) τοῦ μέτρου θετικῆς ἡμιπεριφερείας.

Ἐκ τῆς ἰσότητος $\chi - \tau = \lambda\pi$ προκύπτει ἡ ἰσότης

$$\chi = \lambda\pi + \tau.$$

δι' ἧς εὐρίσκομεν τὰ μέτρα ὅσων θέλομεν ἐκ τῶν τόξων, ὧν ἕκαστον ἔχει ἐφαπτομένην ἴσην πρὸς τὴν ἐφαπτομένην τοῦ γνωστοῦ τόξου τ .

Ὅθεν π, χ ἡ ἰσότης ἐφ $\chi = \text{ἐφ} \frac{\pi}{4}$ ἀληθεύει δι' ὅλα μόνον τὰ τόξα,

τὰ ὁποῖα παρέχει ἡ ἰσότης $\chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{4}$.

ΣΤ'. — Ἐὰν τέλος ζητῆται τόξον ἔχον συνεφαπτομένην α , ἀμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν συνεφαπτομένων τὸ ἄνυσμα ΒΣ ἵσον μήκος α καὶ ἐργαζόμεθα ὡς προηγουμένως.

τόνι. Ἀσκήσεις. 96) Ὀρισθείσης τῆς κοινῆς ἀρχῆς Α τῶν τόξων νὰ ἀριθμῶσι τὰ πέρατα τῶν τόξων, ὧν ἕκαστον ἔχει συνημίτονον $\frac{1}{2}$.

ἀν. 97). Τὸ αὐτὸ διὰ τὰ τόξα, ὧν ἕκαστον ἔχει ἡμίτονον $-\frac{2}{3}$.

98). Τὸ αὐτὸ διὰ τὰ τόξα, ὧν ἕκαστον ἔχει ἐφαπτομένην 3.

99). Τὸ αὐτὸ διὰ τὰ τόξα, ὧν ἕκαστον ἔχει συνεφαπτομένην -1 .

100). Νὰ ἀριθμῶσι τὰ πέρατα τῶν τόξων, ὧν ἕκαστον ἔχει τέμνουσαν $1,5$ ἢ -2 .

101). Νὰ ἀριθμῶσι τὰ πέρατα τῶν τόξων, ὧν ἕκαστον ἔχει στέμνουσαν $1,25$ ἢ $-1 \frac{1}{3}$.

102). Νὰ ἀριθμῶσι τὰ πέρατα τόξου 60° , γνωστοῦ ὀνότος σ $\sin 60^\circ = \frac{1}{2}$.

103). Νὰ ὀρισθῆ τὸ πέρασ τόξου 30° , γνωστοῦ ὄντος ὅτι
 ἢ $\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$.

104). Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ ἰσότητες, δι' ὧν ὀρίζομεν τόξα ὧν, ἕκα-
 στον ἔχει συνημίτον ἴσον πρὸς τὸ συν $\frac{\pi}{6}$.

105). Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ παράστασις ἐφ $\frac{K\pi}{\sqrt{2}}$ λαμβάνει δια-
 φέρους τιμὰς διὰ τὰς διαφόρους συμμετρους τιμὰς τοῦ K .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

§. 56. **Σχέσεις τῶν τριγῶν. ἀριθμῶν τοῦ αὐτοῦ τό-
 ξου.**— Α'). Ἐστω \widehat{AM} (Σχ. 39) τυχὸν τόξον ἔχον μέτρον τ καὶ (\overline{OP})
 (\overline{OR}) , (\overline{AT}) , (\overline{BS}) , (\overline{OG}) , (\overline{OL}) , οἱ τριγ. ἀριθμοὶ αὐτοῦ. Τοῦ τριγῶνου,
 OPM ὄντος ὀρθογωνίου ἀληθεύει, εἰς οἰονδήποτε τεταρτημόριον καὶ
 ἂν κείται τὸ πέρασ M τοῦ τόξου, ἡ ἰσότης $(\overline{OP})^2 + (\overline{PM})^2 = (\overline{OM})^2$.
 Ἐπειδὴ δὲ $(\overline{OP}) = \text{συν}\tau$, $(\overline{PM}) = (\overline{OR}) = \eta\mu\tau$ καὶ $(\overline{OM})^2 = 1$
 αὕτη γίνεται:

$$\text{συν}^2\tau + \eta\mu^2\tau = 1. \quad (1)$$

Ἄρα: Τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγῶνων τοῦ ἡμιτόνου καὶ τοῦ
 συνημιτόνου τοῦ αὐτοῦ τόξου ἰσοῦται ἐπὶ θετικῆ μονάδι.

Β'). Τοῦ τριγῶνου OMG (Σχ. 39) ὄντος ὀρθογωνίου καὶ τῶν ἀνυ-
 σμάτων OP , OG ὄντων πάντοτε ἁμορρόπων, ἀληθεύει, ὁπουδήποτε
 τῆς περιφερείας καὶ ἂν κείται τὸ M , ἡ ἰσότης $(\overline{OG}) \cdot (\overline{OP}) = (\overline{OM})^2$
 ἢ $\text{τεμ}\tau \cdot \text{συν}\tau = 1$, ἔξῃς

$$\text{τεμ}\tau = \frac{1}{\text{συν}\tau} \quad (2)$$

Ἄρα: Ἡ τέμνουσα τόξου εἶναι ἀντίστροφος τοῦ συνημι-
 τόνου τοῦ αὐτοῦ τόξου.

Γ').— Ὁμοίως ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγῶνου OMA (Σχ. 39) προ-
 κύπτει ἡ ἰσότης.

$$\text{στεμ}\tau = \frac{1}{\eta\mu\tau} \quad (3)$$

Ἄρα: Ἡ συντέμνουσα τόξου εἶναι ἀντίστροφος τοῦ ἡμι-
 τῶν τοῦ αὐτοῦ τόξου.

Δ').— Ἐκ τῶν ὁμοίων τριγῶνων OAT καὶ OPM προκύπτει ἡ

ἔφαπ
 λόγια $\frac{AT}{PM} = \frac{OA}{OP}$ ἢ $\frac{AT}{OP} = \frac{OA}{OP}$, ἥτις ἀληθεύει καὶ δταν

οι ὄροι αὐτῆς λάβωσι τὸ προσήκον ἕκαστος σημεῖον τῷ ὄντι, ὅταν \overline{AT} καὶ \overline{OP} εἶναι ὁμόρροπα ἢ ἀντίρροπα καὶ τὰ \overline{OA} καὶ \overline{OP} εἶναι ὁμοίως ὁμόρροπα ἢ ἀντίρροπα καὶ κατ' ἀκολουθίαν ἀμφότεροι οἱ λόγοι $\frac{\overline{AT}}{\overline{OP}}$ καὶ $\frac{\overline{OA}}{\overline{OP}}$ εἶναι πάντοτε ὁμόσημοι. Ἀληθεύει ὅθεν πάν-

τοτε ἡ ἀναλογία $\frac{(\overline{AT})}{(\overline{OP})} = \frac{(\overline{OA})}{(\overline{OP})}$ ἢ $\frac{\acute{\epsilon}\phi\tau}{\acute{\eta}\mu\tau} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\tau}$, ὅθεν

$$\acute{\epsilon}\phi\tau = \frac{\acute{\eta}\mu\tau}{\sigma\upsilon\nu\tau} \quad (4)$$

Ἄρα: Ἡ ἐφαπτομένη τόξου ἰσοῦται πρὸς τὸ πηλίκον τοῦ ἡμιτόνου διὰ τοῦ συνημιτόνου τοῦ αὐτοῦ τόξου.

Ε'). Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκ τῶν ὁμοίων τριγώνων OBS καὶ OPM προκύπτει ἡ ἰσότης

$$\sigma\phi\tau = \frac{\sigma\upsilon\nu\tau}{\acute{\eta}\mu\tau} \quad (5)$$

Ἄρα: Ἡ συνεφαπτομένη τόξου ἰσοῦται πρὸς τὸ πηλίκον τοῦ συνημιτόνου διὰ τοῦ ἡμιτόνου τοῦ αὐτοῦ τόξου.

Πλὴν τῶν πέντε προηγουμένων σχέσεων οὐδεμία ἄλλη μὴ, ἐξ αὐτῶν ἀπορρέουσα ὑφίσταται μεταξὺ τῶν τριγ. ἀριθμῶν τοῦ αὐτοῦ τόξου. Διότι, ἂν ὑπῆρχε καὶ ἄλλη τις, αὕτη μετὰ τῶν προειρημένων πέντε θὰ ἀπετέλει σύστημα ἐξ ἐξισώσεων μετὰ ἰσαριθμῶν ἀγνώστων· ἡ λύσις δὲ αὐτοῦ θὰ παρείχεν ὀρισμένας τιμὰς δι' ἕκαστον τριγ. ἀριθμὸν οἰουδήποτε ὄντος τοῦ τόξου, ὅπερ ἄτοπον.

Ἀσκήσεις. 106). Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη ἐκάστου τῶν τόξων 45° , 30° , 60° .

107) Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη τοῦ τόξου 18° .

108) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη τοῦ αὐτοῦ τόξου εἶναι ἀριθμοὶ ἀντίστροφοι καὶ πάντοτε ὁμόσημοι.

109) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι: $1 + \acute{\epsilon}\phi^2\tau = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\tau}$

110) Νὰ ἀποδειχθῇ ἔτι: $1 + \sigma\phi^2\tau = \frac{1}{\acute{\eta}\mu^2\tau}$

111) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι: $\acute{\epsilon}\phi\alpha + \acute{\epsilon}\phi\beta = \acute{\epsilon}\phi\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi\beta (\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta)$.

112) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι: $\sigma\phi^2\tau - \sigma\upsilon\nu^2\tau = \sigma\phi^2\tau \cdot \sigma\upsilon\nu^2\tau$.

113) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι: $\frac{\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta}{\acute{\epsilon}\phi\alpha + \acute{\epsilon}\phi\beta} = \frac{1}{\acute{\epsilon}\phi\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi\beta}$

114). Νὰ ἀποδειχθῇ ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὅτι: $\frac{1}{\sigma\phi\alpha \cdot \sigma\phi\beta} = \frac{1}{\acute{\epsilon}\phi\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi\beta}$.

115) Νά εὑρεθῆ ἡ τέμνουσα καὶ συντέμνουσα ἐκάστου τῶν τόξων $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3}$.

116) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ τόξα θετικά καὶ μικρότερα τεταρτημορίου περιφερείας ἀληθεύει ἡ ἰσότης:

$$\text{τόξ. ἡμ.} \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^2 + \nu^2} = \text{τόξ. συν} \frac{2\mu\nu}{\mu^2 + \nu^2}$$

117) Νά εὑρεθῶσι τὰ πέρατα τῶν τόξων χ , δι' ἃ ἀληθεύει ἡ ἰσότης $\frac{\acute{\epsilon}\varphi\chi}{\sigma\varphi\chi} = 4$, τῆς ἀρχῆς τῶν τόξων ἐκ τῶν προτέρων ὀρίσθαισης.

118) Τὸ αὐτὸ διὰ τὰ τόξα, δι' ἃ εἶναι $\frac{\acute{\epsilon}\varphi\chi}{\tau\epsilon\mu\chi} = \frac{1}{3}$.

119) Ποῖα τόξα ἔχουσι ἡμίτονον ἴσον πρὸς τὴν ἐφαπτομένην;

120) Ποῖα τόξα ἔχουσι συνημίτονον ἴσον πρὸς τὴν συνεφαπτομένην;

121) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι $\frac{\tau\epsilon\mu\tau}{\sigma\upsilon\upsilon\tau} + \frac{\sigma\tau\epsilon\tau}{\eta\mu\tau} = \frac{1}{\eta\mu^2\sigma\upsilon\upsilon\tau}$.

122) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι $\frac{\tau\epsilon\mu\tau}{\eta\mu\tau} + \frac{\sigma\tau\epsilon\tau}{\sigma\upsilon\upsilon\tau} = \frac{2}{\eta\mu\tau\sigma\upsilon\upsilon\tau}$.

123) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι $\eta\mu\tau \cdot \sigma\upsilon\upsilon\tau \cdot \acute{\epsilon}\varphi\tau \cdot \sigma\varphi\tau \cdot \tau\epsilon\mu\tau \cdot \sigma\tau\epsilon\mu\tau = 1$.

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 57 **Πρόβλημα Α'.** — *Εὑρεῖν συναρτήσας τοῦ συνητόνου τόξου τοὺς ἄλλους τριγ. ἀριθμοὺς αὐτοῦ.*

α'. *Εὑρεσις τοῦ ἡμιτόνου.* — Ἐκ τῆς ἰσότητος (1) (§ 56) λυομένης πρὸς ἡμτ προκύπτει ἡ ἰσότης

$$\eta\mu\tau = +\sqrt{1 - \sigma\upsilon\upsilon\tau^2} \quad (6).$$

ἣτις παρέχει τὸ ἡμτ συναρτήσας τοῦ συντ.

Βλέπομεν δὲ ἐκ τῆς ἰσότητος ταύτης ὅτι εἰς ἐκάστην τιμὴν τοῦ συντ ἀντιστοιχοῦσι δύο τιμαὶ τοῦ ἡμτ. Τὸν λόγον τοῦτον κατανοοῦμεν ἂν ἐνθυμηθῶμεν (§ 55 Α') ὅτι δοθέν συνημίτονόν π. χ. (\overline{OP}) (Σχ. 37), ἔχουσι δσα τόξα περατοῦνται εἰς τὸ Μ καὶ δσα περατοῦνται εἰς τὸ Μ' ἐπειδὴ δὲ τὰ σημεῖα Μ καὶ Μ' εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὸν ἄξονα τῶν συνημιτόνων, τὸ ἡμίτονόν τῶν εἰς τὸ Μ καταληγόντων εἶναι ἀντίθετον τοῦ ἡμιτόνου τῶν εἰς τὸ Μ' καταληγόντων τόξων.

Κατὰ ταῦτα ἐκ τοῦ συνημιτόνου τόξου δὲν ὀρίζεται τελείως τὸ ἡμίτονον αὐτοῦ, διότι μένει ἀμφίβολον τὸ σημεῖον, ὅπερ ἔχει τὸ ἡμίτονον. Ἡ ἀμφιβολία αὕτη αἴρεται, ἂν πλὴν τοῦ συνημιτόνου ὀρισθῇ καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς ὃ καταλήγει τὸ τόξον.

β'. Εὐρέσεις τῆς ἐφαπτομένης. — Ἐκ τῶν τύπων (4) καὶ (6) εὐρίσκομεν εὐκόλως τὴν ἰσότητα :

$$\epsilon\phi\tau = \frac{+\sqrt{1-\sigma\upsilon\nu^2}}{\sigma\upsilon\nu\tau} \quad (7)$$

γ'. Εὐρέσεις τῆς συνεφαπτομένης. Ἐκ τῶν τύπων (5) καὶ (6) προκύπτει εὐκόλως ἡ ἰσότης :

$$\sigma\phi\tau = \frac{\sigma\upsilon\nu\tau}{\pm\sqrt{1-\sigma\upsilon\nu^2}} \quad (8)$$

δ'. Εὐρέσεις τῆς συντεμνουσῆς. — Ἐκ τῶν τύπων (3) καὶ (6) προκύπτει ἡ ἰσότης :

$$\sigma\tau\epsilon\mu\iota = \frac{1}{\pm\sqrt{1-\sigma\upsilon\nu^2}} \quad (9)$$

ΣΗΜ. Τὸ διπλοῦν σημεῖον τοῦ β' μέλους ἐκάστης τῶν ἰσοτήτων (7), (8), (9) ἐξηγεῖται ὡς καὶ τὸ τῆς ἰσότητος (6) καὶ ἡ εἰς τὸ διπλοῦν τοῦτο σημεῖον ὀφειλομένη ἀμφιβολία αἴρεται, ἂν ὀρισθῇ καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς ὃ περατοῦται τὸ τόξον.

ε'. Εὐρέσεις τῆς τεμνουσῆς. — Ταύτην παρέχει ἀμέσως ὁ τύπος (2).

§ 38. Πρόβλημα Β'. — Εὐρεῖν συναρτήσῃ τοῦ ἡμιτόνου τόξου τοὺς ἄλλους τριγ. ἀριθμοὺς αὐτοῦ.

α'. Εὐρέσεις τοῦ συνημιτόνου. — Ἐκ τῆς ἰσότητος (1) λυομένης πρὸς $\sigma\upsilon\nu\tau$ προκύπτει ἡ ἰσότης :

$$\sigma\upsilon\nu\tau = \pm\sqrt{1-\eta\mu^2\tau} \quad (10)$$

β'. Εὐρέσεις τῆς ἐφαπτομένης. — Ἐκ τῶν τύπων (4) καὶ (10) προκύπτει ὅτι :

$$\epsilon\phi\tau = \frac{\eta\mu\tau}{\pm\sqrt{1-\eta\mu^2\tau}} \quad (11)$$

β'. Εὐρέσεις τῆς συνεφαπτομένης. — Ἐκ τῶν τύπων (5) καὶ (10) προκύπτει ὅτι :

$$\sigma\phi\tau = \frac{\pm\sqrt{1-\eta\mu^2\tau}}{\eta\mu\tau} \quad (12)$$

δ'. *Εὗρεσις τῆς τεμνούσης.* — Ἐκ τῶν τύπων (2) καὶ (10) προκύπτει ὅτι:

$$\tau\epsilon\mu\tau = \frac{1}{\pm\sqrt{1-\eta\mu^2\tau}} \quad (13)$$

ΣΗΜ. Τὸ διπλοῦν σημεῖον τοῦ β' μέλους ἐκάστης τῶν ἰσοτήτων (10) (11), (12) καὶ (13) ἐξηγεῖται κατὰ τρόπον ἀνάλογον πρὸς ἐκεῖνον, καθ' ὃν ἐξηγήθη τὸ διπλοῦν σημεῖον τοῦ τύπου (6). Ἡ δὲ ἐξ αὐτοῦ προερχομένη ἀμφιβολία αἴρεται ὁμοίως (§ 57 α').

ε'. *Εὗρεσις τῆς συντεμνούσης.* — Ταύτην παρέχει ἄμέσως ἡ ἰσότης (3).

§ 39. *Πρόβλημα Γ'.* — *Εὗρεῖν συναρτήσῃ τῆς ἐφαπτομένης τόξου τοὺς ἄλλους τριγ. ἀριθμοὺς αὐτοῦ.*

α'. *Εὗρεσις τοῦ ἡμιτόνου καὶ συνημιτόνου.* — Ἐκ τῆς ἰσότητος (4) τειθεμένης ὑπὸ τὴν μορφήν $\frac{\eta\mu\tau}{\sigma\upsilon\nu\tau} = \frac{\epsilon\varphi\tau}{1}$ προκύπτει δι'

— ἀλλαγῆς τῶν μέσων ἢ ἰσότης $\frac{\eta\mu\tau}{\epsilon\varphi\tau} = \frac{\sigma\upsilon\nu\tau}{1}$. Ὑψοῦντες δὲ ἀμφοτέρα τὰ μέλη ταύτης εἰς τὸ τετράγωνον, ἐφαρμόζοντες εἰτα γνωστὴν ἰδιότητα τῶν ἀναλογιῶν καὶ ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τὴν (1) εὐρίσκομεν τὰς ἰσότητας:

$$\frac{\eta\mu^2\tau}{\epsilon\varphi^2\tau} = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\tau}{1} = \frac{\eta\mu^2\tau + \sigma\upsilon\nu^2\tau}{1 + \epsilon\varphi^2\tau} = \frac{1}{1 + \epsilon\varphi^2\tau}$$

Ἐκ τούτων δὲ δι' ἐξαγωγῆς τῆς τετραγωνικῆς ρίζης προκύπτουσιν αἱ ἰσότητες:

$$\frac{\eta\mu\tau}{\epsilon\varphi\tau} = \frac{\sigma\upsilon\nu\tau}{1} = \frac{1}{\pm\sqrt{1+\epsilon\varphi^2\tau}}, \text{ ὅθεν}$$

$$\eta\mu\tau = \frac{\epsilon\varphi\tau}{\pm\sqrt{1+\epsilon\varphi^2\tau}} \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu\tau = \frac{1}{\pm\sqrt{1+\epsilon\varphi^2\tau}} \quad (14)$$

ΣΗΜ. Τὸ διπλοῦν σημεῖον τῶν β' μελῶν τῶν ἰσοτήτων τούτων ἐξηγεῖται ὡς ἑξῆς.

Δεδομένην ἐφαπτομένην π. χ. (\overline{AT}) (Σχ. 39) ἔχουσιν, ὡς γνωστὸν, τὰ τόξα \overline{AM} καὶ τὰ $\overline{AM'}$. Ἐπειδὴ δὲ τὰ πέρατα M καὶ M' αὐτῶν εἶναι συμμετρικά πρὸς τὸ κέντρον, τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον ἐκάστου τῶν \overline{AM} εἶναι ἀντιστοίχως ἀντίθετον πρὸς τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον ἐκάστου τῶν $\overline{AM'}$.

Ἐκ τῶν εἰρημένων κατανοοῦμεν ἐπίσης ὅτι ἡ ἐφαπτομένη τόξου δὲν ἀρκεῖ νὰ ὀρίσῃ τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον αὐτοῦ· ἀπαιτεῖται πλὴν ταύτης νὰ εἶναι γνωστὸν καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς ὃ καταλήγει τὸ τόξον, ὅτε αἴρεται ἡ ἀμφιβολία διὰ τὸ πρὸ τοῦ ριζικοῦ σημεῖον. Οὕτως, ἂν ἡ δοθεῖσα Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

ἐφαπτομένη είναι θετική και τὸ τόξον λήγη εἰς τὸ α' τεταρτημόριον, δέον πρὸ τοῦ ριζικοῦ ἀμφοτέρων τῶν τύπων (14) νὰ προτάξωμεν τὸ +, διότι πᾶν τοιοῦτον τόξον ἔχει ἡμίτονον καὶ συνημίτονον θετικά. Ἐν δὲ τὸ τόξον περατοῦται εἰς τὸ γ' τεταρτημόριον, τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον αὐτοῦ εἶναι ἀρνητικά καὶ δέον πρὸ ἀμφοτέρων τῶν ριζικῶν νὰ τεθῆ τὸ - . Ἐν ὅμως τὸ τόξον περατοῦται εἰς τὸ β' τεταρτημόριον, ἔχῃ ἡμίτονον θετικὸν καὶ συνημίτονον ἀρνητικόν· ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀριθμητὴς τοῦ α' τύπου εἶναι εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἀρνητικός, δέον ὁ παρανομαστής νὰ ληφθῆ μὲ τὸ σημεῖον -, τὸ αὐτὸ δὲ σημεῖον ὀφείλει νὰ ἔχῃ καὶ τὸ ριζικὸν τοῦ β' τύπου ἄν τέλος τὸ τόξον λήγη εἰς τὸ δ' τεταρτημόριον, ὁμοίως σκεπτόμενοι κατανοοῦμεν ὅτι πρέπει πρὸ ἀμφοτέρων τῶν ριζικῶν νὰ τεθῆ τὸ +.

Ἐκ τῶν λεχθέντων κατέστη φανερόν ὅτι εἰς ἐκάστην περίπτωσιν τὸ ριζικὸν ἐκατέρου τῶν τύπων (14) ἔχει τὸ σημεῖον τοῦ ριζικοῦ τοῦ ἐτέρου.

β'. Εὐρέσις τῆς ^{συνεφαπτομένης} ~~επιμονούσης~~. Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (4) καὶ (5) διὰ πολλαπλασιασμοῦ αὐτῶν κατὰ μέλη εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\epsilon\phi\tau \cdot \sigma\phi\tau = 1 \quad (15)$$

$$\acute{\alpha}\rho\alpha \quad \sigma\phi\tau = \frac{1}{\epsilon\phi\tau} \quad (16)$$

γ'. Εὐρέσις τῆς ^{τῆς ἰσοτήτων} ~~συνεφαπτομένης~~ καὶ συνεπιμονούσης. - Ἐκ τοῦ τύπου (2) καὶ τοῦ β'. τῶν τύπων (14) εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\tau\epsilon\mu\epsilon = \pm \sqrt{1 + \epsilon\phi^2\tau} \quad (17)$$

Ἐκ δὲ τοῦ τύπου (3) καὶ τοῦ α' τῶν τύπων (14) εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\sigma\tau\epsilon\mu\epsilon = \frac{\pm \sqrt{1 + \epsilon\phi^2\tau}}{\epsilon\phi\tau} \quad (18)$$

Ἀσκήσεις 124). Εὐρεῖν τὸ ἡμίτονον καὶ τὴν ἐφαπτομένην τοῦ ξου λήγοντος εἰς τὸ γ' τεταρτημόριον καὶ ἔχοντος συνημίτονον

$$-\frac{3}{5}$$

125). Εὐρεῖν τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον τόξου περατουμένου εἰς τὸ α' τεταρτημόριον καὶ ἔχοντος ἐφαπτομένην $\frac{3}{4}$.

126). Εὐρεῖν συναρτήσῃ τῆς συνεφαπτομένης τόξου τοὺς ἄλλους τριγ. ἀριθμοὺς αὐτοῦ.

127). Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\frac{\sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\beta}{\eta\mu^2\alpha \cdot \eta\mu^2\beta} = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha \cdot \epsilon\phi^2\beta}{\epsilon\phi^2\alpha \cdot \epsilon\phi^2\beta}$

128) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\epsilon\phi\alpha + \sigma\phi\alpha = \frac{1}{\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\alpha}$

129) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$

130) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\tau\epsilon\mu^2\phi \cdot \eta\mu^2\phi = 3\phi^2$

131) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ τῶν θετικῶν καὶ μικρότερων τεταρτημορίου ἀληθεύει ἡ ἰσότης $\tau\acute{\omicron}\xi \cdot \eta\mu \sqrt{\frac{\chi}{\chi + \alpha}} = \tau\acute{\omicron}\xi \epsilon\phi \sqrt{\frac{\chi}{\alpha}}$

132) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\frac{\tau\epsilon\mu\alpha}{\sigma\tau\epsilon\mu\alpha} = \pm \sqrt{\tau\epsilon\mu^2\alpha - 1}$

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

§ 60. Σχέσεις τῶν τριγ. ἀριθμῶν τῶν ἀντιθέτων. — Ἐστω AM (Σχ. 40) τυχὸν τόξον καὶ $\widehat{AM'}$ τὸ ἀντίθετόν του, τ δὲ καὶ — τ τὰ μέτρα αὐτῶν. Ἐπειδὴ (§ 20) ἡ χορδὴ MM' τέμνεται δίχα καὶ καθέτως ὑπὸ τοῦ ἄξονος τῶν συνημιτόνων, ἐπάγεται ὅτι ἀμφοτέραι αἱ τελικαὶ ἀκτῖνες OM καὶ OM' ἔχουσι τὴν αὐτὴν προβολὴν \overline{OP} ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν συνημιτόνων καὶ $(\overline{PM'}) = -(\overline{PM})$ ἢ $(\overline{OP'}) = -(\overline{OP})$.

Ἄρα : $\sigma\upsilon\nu(-\tau) = \sigma\upsilon\nu\tau$ καὶ $\eta\mu(-\tau) = -\eta\mu\tau$. (19)

Ἐκ τούτων δὲ προκύπτουσιν εὐκόλως αἱ ἰσότητες

$\epsilon\phi(-\tau) = -\epsilon\phi\tau$, $\sigma\phi(-\tau) = -\sigma\phi\tau$, (20)

καὶ

$\tau\epsilon\mu(-\tau) = \tau\epsilon\mu\tau$, $\sigma\tau\epsilon\mu(-\tau) = -\sigma\tau\epsilon\mu\tau$. (21)


Ἦτοι : Δύο τόξα ἀνίθετα ἔχουσι τὸ αὐτὸ συνημίτονον καὶ τὴν αὐτὴν τέμνουσαν, ἀντιθέτους δὲ τοὺς ἄλλους ὁμωνύμους τριγ. ἀριθμούς.

Ἀσκήσεις. 133) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ ἑκάστου τῶν τόξων -45° , -30° , -60° .

134) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι

$\eta\mu\tau \eta\mu(-\tau) + \sigma\upsilon\nu^2\tau = 1 - 2\eta\mu^2\tau$

135) Νὰ ἀποδειχθῆ ἀπὸ τοῦ ἰσοτιπύτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς



(Σχ. 40)

136) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι σφτ. ἐφ $(-\tau) + 1 = 0$.

137) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡμ $(-\tau)$. σφτ + συντ = 0 καὶ
συν $(-\tau)$. ἐφ $(-\tau) + \eta\mu\tau = 0$.

138) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι δύο ἀντίθετα τόξα ἔχουσι τὴν αὐτὴν τέ-
μουσαν καὶ ἀντιθέτους συντεμνούσας.

139) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τεμ $(-\tau)$ συντ = 1 καὶ
στεμ $(-\tau)$ ἡμτ = -1.

140) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι: τεμ $(-\tau)$ σφ $(-\tau) = -\frac{1}{\eta\mu\tau}$

καὶ στεμ $(-\tau)$. ἐφ $(-\tau) = \frac{1}{\text{συντ}}$

141) Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ ἰσότητες, αἵτινες παρέχουσι τὰ τόξα χ , ὧν
ἕκαστον ἔχει ἡμίτονον ἴσον πρὸς $-\eta\mu\frac{\pi}{6}$.

142) Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἰσότης, ἣτις παρέχει τὰ τόξα χ , ὧν ἕκαστον
ἔχει ἐφαπτομένην ἴσην πρὸς $-\epsilon\phi\frac{\pi}{8}$.

**§ 61. Σχέσεις τῶν τριγ. ἀριθμῶν τόξων παρα-
πληρωματικῶν.**— Ἐστω \widehat{AM} (Σχ. 40) τυχὸν τόξον καὶ AM'' τὸ
παραπληρωματικὸν αὐτοῦ. Ἐὰν κληθῇ τ τὸ μέτρον τοῦ α' , τὸ τοῦ
ἄλλου θὰ εἶναι $180^\circ - \tau$. Ἐπειδὴ δὲ ἡ χορδὴ MM'' εἶναι (§ 22)
κάθετος ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν ἡμιτόνων, αἱ τελικαὶ ἀκτίνες OM καὶ
 OM'' ἔχουσι τὴν αὐτὴν προβολὴν \overline{OP} ἐπὶ τὸν ἄξονα τοῦτον,
ἄρα $\eta\mu(180^\circ - \tau) = \eta\mu\tau$.

Ἐκ δὲ τῶν προφανῶν ἰσοτήτων $(\overline{PM''}) = (\overline{OP}')$, $(\overline{PM}) = (\overline{OP})$
καὶ $(\overline{PM''}) = -(\overline{PM})$ ἔπεται ὅτι: $(\overline{OP}') = -(\overline{OP})$, ἦτοι
συν $(180^\circ - \tau) = -\text{συντ}$

*Ὅστε: $\eta\mu(180^\circ - \tau) = \eta\mu\tau$, συν $(180^\circ - \tau) = -\text{συντ}$ (22)

Ἐκ τούτων δὲ προκύπτουσι εὐκόλως αἱ ἰσότητες

$\epsilon\phi(180^\circ - \tau) = -\epsilon\phi\tau$, σφ $(180^\circ - \tau) = -\text{σφτ}$ (23)

καὶ τεμ $(180^\circ - \tau) = -\text{τεμτ}$, στεμ $(180^\circ - \tau) = \text{σιεμτ}$. (24)

*Ἄρα: Δύο τόξα παραπληρωματικὰ ἔχουσι τὸ αὐτὸ ἡμίτο-
νον καὶ τὴν αὐτὴν συντέμνουσαν, ἀντιθέτους δὲ τοὺς ἄλλους
δμωνύμους τριγ. ἀριθμούς.

***Ἀσκήσεις.** 143) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τό-
ξων 135° , 150° καὶ 120° .

144). Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων -135° ,
 -150° , -120° .


- 145) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι $\eta\mu(180^\circ - \tau)\eta\mu\tau - \sigma\upsilon\nu(180^\circ - \tau)\sigma\upsilon\nu\tau = 1$
 146) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι $\acute{\epsilon}\varphi(180^\circ - \tau) \sigma\varphi\tau - \sigma\varphi(180^\circ - \tau) \acute{\epsilon}\varphi\tau = 0$,
 147) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι
 $\acute{\epsilon}\varphi(180^\circ - \tau) \sigma\upsilon\nu\tau - \sigma\varphi(180^\circ - \tau) \eta\mu\tau = \sigma\upsilon\nu\tau - \eta\mu\tau$.
 148) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι

$$- \sigma\varphi(180^\circ - \tau) \sigma\upsilon\nu\tau - \acute{\epsilon}\varphi(180^\circ - \tau) \sigma\upsilon\nu\tau = \frac{1}{\eta\mu\tau}$$

149) Νά εὐρεθῶσιν αἱ ἰσότητες, αἵτινες παρέχουσι τὰ τόξα, ὃν ἕκαστον ἔχει συνημίτονον ἴσον πρὸς $-\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{7}$.

§ 62. Σχέσεις τῶν τοιγ. ἀριθμῶν τόξων συμπληρωματικῶν. Ἐστω \widehat{AM} (Σχ. 41) τυχὸν τόξον καὶ $\widehat{AM'}$ τὸ συμπληρωματικὸν αὐτοῦ ἔαν

κληθῆ τ τὸ μέτρον τοῦ ἐνόσ, τὸ τοῦ ἄλλου θὰ εἶναι $90^\circ - \tau$. Ἐπειδὴ δὲ τὰ πέπρατα M καὶ M' αὐτῶν εἶναι (§ 23) συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάμετρον $\Delta'O\Delta$, ἥτις διχοτομεῖ τὴν γωνίαν



(Σχ. 41)

$\angle O\chi, O\psi$ τῶν θετικῶν διευθύνσεων τῶν πρωτευόντων ἀξόνων, οἵτινες ἀντιστοιχοῦσι πρὸς ἀρχὴν τόξων

τὸ A , ἔπονται τὰ ἐξῆς συμπεράσματα.

α'. Ἐάν τὸ ἐν τῶν περάτων τούτων κεῖται εἰς τὸ α' ἢ γ' τεταρτημόριον, καὶ τὸ ἕτερον θὰ κεῖται εἰς τὸ αὐτὸ τεταρτημόριον, ἄρα τὰ ἡμίτονα καὶ συνημίτονα αὐτῶν εἶναι ὁμόσημα· ἂν δὲ τὸ ἐν τῶν περάτων κεῖται εἰς τὸ β' ἢ δ' τεταρτημόριον, τὸ ἄλλο θὰ κεῖται εἰς τὸ ἕτερον τῶν αὐτῶν τεταρτημορίων, ἄρα τὸ ἡμίτονον ἑκατέρου τῶν προειρημένων τόξων εἶναι ὁμόσημον πρὸς τὸ συνημίτονον τοῦ ἑτέρου. Εἰς πᾶσαν λοιπὸν περίπτωσιν τὸ ἡμίτονον ἑκατέρου εἶναι ὁμόσημον πρὸς τὸ συνημίτονον τοῦ ἑτέρου.

β'. Ἐκ τῆς ἰσότητος τῶν θετικῶν καὶ μικροτέρων περιφερείας τόξων \widehat{AD} καὶ $\widehat{AD'}$ ἐνόσ \widehat{MD} καὶ $\widehat{M'D}$ ἀπ' ἑτέρου προκύπτει ἡ ἰσότης τῶν

\widehat{AM} και $\widehat{M'B}$, ἐξ ἧς ἔπεται ὅτι $\widehat{AOM} = \widehat{BOM'}$. Τὰ τρίγωνα, ἄρα, \widehat{POM} και $\widehat{P'OM'}$ εἶναι ἴσα και κατ' ἀκολουθίαν αἱ πλευραὶ \widehat{PM} και \widehat{OP} τοῦ ἑνὸς εἶναι ἐφαρμόσιμοι ἀντιστοίχως πρὸς τὰς $\widehat{P'M'}$ και $\widehat{OP'}$ τοῦ ἄλλου. Ἐκ τούτου δὲ κατανοοῦμεν εὐκόλως ὅτι τὰ ἀνύσματα $\widehat{OP'}$ και \widehat{OP} εἶναι ἐφαρμόσιμα· ἐπειδὴ δέ, ὡς προείπομεν, ταῦτα εἶναι και ὁμόσημα πάντοτε, ἔπεται ὅτι :

$\widehat{\text{syn}}(90^\circ - \tau) = \widehat{\eta\mu\tau}$. Ὁμοίως, ἐπειδὴ τὰ $\widehat{OP'}$ και \widehat{OP} εἶναι ἐφαρμόσιμα και πάντοτε ὁμόσημα, ἔπεται ὅτι $\widehat{\eta\mu}(90^\circ - \tau) = \widehat{\text{syn}}\tau$.

Κατ' ἀνάλογον τρόπον ἀποδεικνύεται ἡ ἀλήθεια τῶν δύο προηγουμένων ἰσοτήτων και ὅταν τὸ M καταλήγη εἰς οἰονδήποτε ἄλλο τεταρτημόριον. Ὡστε γενικῶς εἶναι πάντοτε :

$$\widehat{\eta\mu}(90^\circ - \tau) = \widehat{\text{syn}}\tau, \widehat{\text{syn}}(90^\circ - \tau) = \widehat{\eta\mu\tau}. \quad (25)$$

Ἐκ τῶν ἰσοτήτων δὲ τούτων προκύπτουσιν εὐκόλως αἱ ἰσότητες :

$$\widehat{\epsilon\phi}(90^\circ - \tau) = \widehat{\sigma\phi}\tau, \widehat{\sigma\phi}(90^\circ - \tau) = \widehat{\epsilon\phi\tau}. \quad (26)$$

$$\widehat{\text{και}} \widehat{\sigma\tau\epsilon\mu}(90^\circ - \tau) = \widehat{\tau\epsilon\mu\tau}, \widehat{\tau\epsilon\mu}(90^\circ - \tau) = \widehat{\sigma\tau\epsilon\mu\tau}. \quad (27)$$

Ἄρα : Ἐὰν δύο τόξα εἶναι συμπληρωματικά, τὸ ἡμίτονον, ἐφαπτομένη και τέμνουσα ἐκατέρου ἰσοῦται ἀντιστοίχως πρὸς τὸ συνημίτονον, συνεφαπτομένην και συντέμνουσαν τοῦ ἐτέρου.

Ἀσκήσεις. 150) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου 72° (ἄρα ἄσκ. 59).

151) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου 54° (ἄρα ἄσκ. 60).

152) Νὰ ὀρισθῶσιν τὰ πέρατα τῶν τόξων, ὧν ἕκαστον ἔχει ἡμίτονον ἴσον πρὸς τὸ συνημίτονόν του.

153) Ἄν τρία τόξα, A, B, Γ (ἢ γωνίαι) ἔχωσιν ἄθροισμα ἴσον πρὸς 180° , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\widehat{\epsilon\phi}\left(\frac{A+B}{2}\right) = \widehat{\sigma\phi}\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$.

154) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\widehat{\eta\mu}(90^\circ - \alpha)\widehat{\text{syn}}\alpha + \widehat{\text{syn}}(90^\circ - \alpha)\widehat{\eta\mu}\alpha = 1$.

155) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι : $\widehat{\epsilon\psi}(90^\circ - \alpha) \widehat{\epsilon\phi}\alpha = 1$.

156) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι : $\widehat{\sigma\phi}(90^\circ - \alpha)\widehat{\sigma\phi}\alpha = 1$.


157) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι : $\widehat{\epsilon\phi}(90^\circ - \alpha) \widehat{\epsilon\phi}\alpha - \widehat{\sigma\phi}(90^\circ - \alpha)\widehat{\sigma\phi}\alpha = 0$.

158) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\widehat{\epsilon\phi}(90^\circ - \omega) \widehat{\eta\mu}\omega + \widehat{\sigma\phi}(90^\circ - \omega) \widehat{\text{syn}}\omega = \widehat{\eta\mu}\omega + \widehat{\text{syn}}\omega$$

§ 63. Σχέσεις τῶν τριγωνομ. ἀριθμῶν τόξων διαφερόντων κατὰ ἡμιπεριφέρειαν. — Ἐστω

\overline{AM} (Σχ. 42) τυχόν τόξον και τ τὸ μέτρον αὐτοῦ. Τὸ πέρασ



Σχ. 42

τοῦ τόξου, ὄπερ ἔχει τὴν αὐτὴν ἀρχὴν A και μέτρον $\tau+180$ (ἢ $\tau+\pi$) εἶναι προφανῶς, συμμετρικὸν τοῦ A πρὸς τὸ κέντρον O, ἔστω δὲ M' τοῦτο. Ἐὰν αἱ τελικαὶ ἀκτῖνες OM και OM' τῶν τόξων τούτων προβληθῶσιν ἐπὶ τοὺς ἀντιστοίχους πρὸς τὴν ἀρχὴν A πρω-

τεύοντας ἀξονας, θὰ εἶναι :

$$\begin{aligned} \eta\mu(180^\circ + \tau) &= (\overline{OP'}), \eta\mu\tau = (\overline{OP}) \\ \sigma\upsilon\upsilon(180^\circ + \tau) &= (\overline{OM'}), \sigma\upsilon\upsilon\tau = (\overline{OM}) \end{aligned} \quad (1)$$

Ἄλλ' ἐκ τῶν ὀρθ. τριγῶνων OMP και $OM'P'$, ἔπεται ὅτι τὰ ἀνύσματα $\overline{PM} (= \overline{OP})$ και $\overline{P'M'} (= \overline{OP'})$ εἶναι ἐφαρμόσιμα, ἔμοιως δὲ και τὰ \overline{OP} και $\overline{OP'}$ ἐπειδὴ δὲ τὰ ἐφαρμόσιμα ταῦτα ἀνύσματα εἶναι ἀντίρροπα, ἔπεται ὅτι (§ 5) εἶναι ἀντιρρόπως ἴσα και ἐπομένως $(\overline{OP'}) = -(\overline{OP})$ και $(\overline{OM'}) = -(\overline{OM})$. Ἐκ τούτων δὲ και τῶν προηγουμένων ἰσοτήτων (1) προκύπτουσιν αἱ ἰσοότητες :

$$\eta\mu(180^\circ + \tau) = -\eta\mu\tau, \sigma\upsilon\upsilon(180^\circ + \tau) = -\sigma\upsilon\upsilon\tau \quad (28)$$

ἐξ ὧν ἔπονται εὐκόλως αἱ ἰσοότητες :

$$\epsilon\phi(180^\circ + \tau) = \epsilon\phi\tau, \sigma\phi(180^\circ + \tau) = \sigma\phi\tau. \quad (29)$$

$$\kappa\alpha\iota \sigma\tau\epsilon\mu(180^\circ + \tau) = -\sigma\tau\epsilon\mu, \tau\epsilon\mu(180^\circ + \tau) = -\tau\epsilon\mu. \quad (30)$$

Ἄρα : Ἐὰν δύο τόξα διαφέρωσι κατὰ ἡμιπεριφέρειαν, ἔχουσι τὴν αὐτὴν ἐφαπτομένην και τὴν αὐτὴν συνεφαπτομένην, ἀντιθέτους δὲ τοὺς ἄλλους ὁμωνύμους τριγ. ἀριθμοὺς.

Ἀσκήσεις. 159) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων 225° , 210° και 240° .

160) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων -225° , -210° και -240° .

161) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\eta\mu(180^\circ + \tau)\eta\mu\tau + \sigma\upsilon\upsilon(180^\circ + \tau)\sigma\upsilon\upsilon\tau = -1.$$

162) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\mu(180^\circ + \tau) \sigma\upsilon\nu(180^\circ - \tau) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ + \tau) \eta\mu(180^\circ - \tau) = 0.$$

163) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\mu(270^\circ - \tau) = -\sigma\upsilon\nu\tau \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu(270^\circ - \tau) = -\eta\mu\tau.$$

164) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\epsilon\varphi(270^\circ - \tau) = \sigma\varphi\tau \text{ καὶ } \sigma\varphi(270^\circ - \tau) = \epsilon\varphi\tau.$$

165) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\mu(270^\circ + \tau) = -\sigma\upsilon\nu\tau \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu(270^\circ + \tau) = \eta\mu\tau.$$

166) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\epsilon\varphi(270^\circ + \tau) = -\sigma\varphi\tau \text{ καὶ } \sigma\varphi(270^\circ + \tau) = -\epsilon\varphi\tau.$$

167) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\mu(270^\circ - \tau) \sigma\upsilon\nu(180^\circ + \tau) + \sigma\upsilon\nu(270^\circ - \tau) \eta\mu(180^\circ + \tau) = 1.$$

168) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\sigma\upsilon\nu(270^\circ - \omega) \sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) - \eta\mu(270^\circ - \omega) \eta\mu(180^\circ + \omega) = 0$$

169) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\epsilon\varphi(270^\circ + \alpha) \sigma\varphi(270^\circ - \alpha) + \sigma\varphi(270^\circ - \alpha) \epsilon\varphi(270^\circ - \alpha) = 0.$$

170) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\epsilon\varphi(270^\circ - \tau) \epsilon\varphi(180^\circ + \tau) + \epsilon\varphi(270^\circ - \tau) \epsilon\varphi(180^\circ - \tau) = 0.$$

171) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι

$$\eta\mu 270^\circ + \varphi) \eta\mu(180^\circ + \varphi) + \eta\mu(270^\circ - \varphi) \eta\mu(180^\circ - \varphi) = 0.$$

§ 61. Σχέσεις τῶν τριγ. ἀριθμῶν τόξων διαφερόντων κατὰ τετρατημόριον περιφερείας. — Ἐστῶσαν τ

καὶ $90^\circ + \tau$ ($\eta \frac{\pi}{2} + \tau$) τὰ μέτρα δύο τοιούτων τόξων. Ἐπειδὴ

$(90^\circ + \tau) + (-\tau) = 90^\circ$, ἔπεται (§ 62, 60) ὅτι :

$$\eta\mu' 90^\circ + \tau) = \sigma\upsilon\nu(-\tau) = \sigma\upsilon\nu\tau \quad (31)$$

$$\sigma\upsilon\nu(90^\circ + \tau) = \eta\mu(-\tau) = -\eta\mu\tau$$

Ἐκ τούτων δὲ προκύπτουσιν εὐκόλως αἱ ἰσότητες :

$$\epsilon\varphi(90^\circ + \tau) = -\sigma\varphi\tau, \sigma\varphi(90^\circ + \tau) = -\epsilon\varphi\tau. \quad (32)$$

$$\text{καὶ } \sigma\iota\epsilon\mu(90^\circ + \tau) = \tau\epsilon\mu\tau, \tau\epsilon\mu(90^\circ + \tau) = -\sigma\iota\epsilon\mu\tau \quad (33)$$

§ 62. Σχέσεις τῶν τριγ. ἀριθμῶν δύο τόξων ἔχόντων ἄλλοις μίαν περιφέρειαν. — Ἐστω \widehat{AM} (Σχ. 40) τυχόν τόξον, ὃπερ ἔχει μέτρον τ . Τὸ τόξον, ὃπερ ἔχει τὴν αὐτὴν ἀρχὴν A καὶ μετὰ τοῦ \widehat{AM} ἀποτελεῖ μίαν περιφέρειαν, θὰ ἔχη μέτρον $360^\circ - \tau$ ($\eta 2\pi - \tau$).

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι $360^\circ - \tau = (-\tau) + 360^\circ$, τὸ τόξον ὃπερ ἔχει μέτρον $360^\circ - \tau$ ἔχει τὰς ἰσότητες $\eta(-\tau) = \sigma\upsilon\nu\tau$ καὶ $\sigma\upsilon\nu(-\tau) = -\eta\mu\tau$, ὃπερ ἔχει

μέτρον ($-\tau$), ἦτοι εἰς τὸ M' συμμετρικὸν τοῦ M πρὸς τὸν ἄξονα τῶν συνημιτόνων. Διὰ τοῦτο μεταξὺ τῶν τριγ. ἀριθμῶν τῶν τόξων τούτων ὑφίστανται αἱ μεταξὺ τῶν τριγ. ἀριθμῶν δύο ἀντιθέτων τόξων (§ 60) ὑπάρχουσαι σχέσεις : Ἦτοι :

$$\begin{aligned} \eta\mu(360^\circ - \tau) &= -\eta\mu\tau, \text{ συν}(360^\circ - \tau) = \text{συν}\tau \\ \epsilon\varphi(360^\circ - \tau) &= -\epsilon\varphi\tau, \sigma\varphi(360^\circ - \tau) = -\sigma\varphi\tau \end{aligned} \quad (34)$$

$$\text{καὶ } \tau\epsilon\mu(360^\circ - \tau) = \tau\epsilon\mu\tau, \sigma\tau\epsilon\mu(360^\circ - \tau) = -\sigma\tau\epsilon\mu\tau. \quad (35)$$

* Ἄρα : Ἐὰν δύο τόξα ἔχωσιν ἄθροισμα μίαν περιφέρειαν, ἔχουσι τὸ αὐτὸ συνημίτονον καὶ τὴν αὐτὴν τέμνουσαν, ἀντιθέτους δὲ τοὺς ἄλλου; ὁμωνύμους τριγ. ἀριθμούς.

Ἄσκησεις. 172) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τῶν τόξων 315° , 330° καὶ 300° .

173) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων -315° , -330° καὶ -300° .

174) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\mu(360^\circ - \alpha)\text{συν}(270^\circ + \alpha) + \text{συν}(360^\circ - \alpha)\eta\mu(270^\circ + \alpha) = -1.$$

175) Νὰ καταστῆ ἀπλουστέρα ἡ παράστασις

$$\sigma\varphi(360^\circ - \tau)\text{συν}(90^\circ + \tau) - \epsilon\varphi(360^\circ - \tau)\eta\mu(90^\circ + \tau).$$

176) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ παράστασις

$$\epsilon\varphi(360^\circ - \alpha)\sigma\varphi(180^\circ + \alpha) - \sigma\varphi(360^\circ - \alpha)\epsilon\varphi(180^\circ - \alpha) \text{ εἶναι ἀνεξάρτητος τοῦ τόξου } \alpha.$$

177) Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ σχέσεις, δι' ὧν συνδέονται πρὸς ἀλλήλους οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ δύο τόξων, τὰ ὅποια διαφέρουσι κατὰ 360° .

178) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\tau\epsilon\mu(360^\circ - \tau)\text{συν}(360^\circ - \tau) + \sigma\tau\epsilon\mu(360^\circ - \tau)\eta\mu(360^\circ - \tau) = 2.$$

179) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\mu(360^\circ - \tau)\text{συν}(90^\circ + \tau) + \text{συν}(360^\circ - \tau)\eta\mu(90^\circ + \tau) = 1.$$

180) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι

$$\eta\mu(90^\circ + \tau)\text{συν}\tau + \text{συν}(90^\circ + \tau)\eta\mu(-\tau) = 1.$$

181) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι

$$\eta\mu(90^\circ + \tau)\eta\mu\tau + \text{συν}(90^\circ + \tau)\text{συν}\tau = 0.$$

182) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\mu(90^\circ + \tau)\text{συν}(90^\circ + \tau) + \text{συν}(90^\circ - \tau)\eta\mu(90^\circ - \tau) = 0.$$

183) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι

$$\epsilon\varphi(90^\circ + \tau)\epsilon\varphi(90^\circ - \tau) - \sigma\varphi(90^\circ + \tau)\sigma\varphi(90^\circ - \tau) = \epsilon\varphi^2\tau - \sigma\varphi^2\tau.$$

184) Να αποδειχθῇ ὅτι :

$$\sigma\varphi(90^\circ + \omega) \sigma\varphi\omega - \acute{\epsilon}\varphi(90^\circ + \omega) \acute{\epsilon}\varphi\omega = 0.$$

§ 66. Ἀναγωγή τόξου εἰς τὸ χ' τεταρτημόριον.—

Οὕτω καλεῖται ἡ ἐργασία, δι' ἧς ἀνάγεται ὁ ὑπολογισμὸς τῶν τριγ. ἀριθμῶν τυχόντος τόξου εἰς ὑπολογισμὸν τῶν τριγ. ἀριθμῶν τόξου θετικοῦ καὶ μικροτέρου τεταρτημορίου περιφέρειας. Ἡ ἀναγωγή αὕτη γίνεται ὡς ἀκολούθως.

α'). Ἐστω πρῶτον τόξον θετικόν, μικρότερον περιφέρειας καὶ εἰς τὸ β' τεταρτημόριον περατούμενον, π.χ. 127° .

Τούτου τὸ παραπληρωματικόν $180^\circ - 127^\circ = 53^\circ$ περατοῦται εἰς τὸ α' τεταρτημόριον. Εἶναι δὲ (§ 61)

$$\eta\mu 127^\circ = \eta\mu 53^\circ, \text{ συν} 127^\circ = -\text{συν} 53^\circ, \acute{\epsilon}\varphi 127^\circ = -\acute{\epsilon}\varphi 53^\circ \text{ κτλ.}$$

β'). Ἐστω δεύτερον ἄλλο τόξον θετικόν, μικρότερον περιφέρειας καὶ εἰς τὸ γ' περατούμενον τεταρτημόριον, π.χ. τὸ τόξον 200° .

Ἀφαιροῦντες ἀπ' αὐτοῦ 180° εὐρίσκομεν τὸ τόξον 20° , ὅπερ περατοῦται εἰς τὸ α' τεταρτημόριον. Εἶναι δὲ (§ 63)

$$\eta\mu 200^\circ = -\eta\mu 20^\circ, \text{ συν} 200^\circ = -\text{συν} 20^\circ, \acute{\epsilon}\varphi 200^\circ = \acute{\epsilon}\varphi 20^\circ \text{ κτλ.}$$

γ'). Ἐστω ἔτι τόξον θετικόν, μικρότερον περιφέρειας καὶ εἰς τὸ δ' τεταρτημόριον περατούμενον, π.χ. τὸ τόξον 310° . Ἀφαιροῦντες αὐτὸ ἀπὸ 360° εὐρίσκομεν τὸ τόξον 50° , ὅπερ περατοῦται εἰς τὸ α' τεταρτημόριον.

$$\text{Εἶναι δὲ (§ 65) } \eta\mu 310^\circ = -\eta\mu 50^\circ, \text{ συν} 310^\circ = \text{συν} 50^\circ, \\ \acute{\epsilon}\varphi 310^\circ = -\acute{\epsilon}\varphi 50^\circ \text{ κτλ.}$$

δ'). Ἐὰν τὸ τόξον εἶναι θετικόν καὶ μεγαλύτερον περιφέρειας, ἀφαιροῦντες ἀπ' αὐτοῦ πάσας τὰς περιεχομένας ἀκεραίας περιφέρειας εὐρίσκομεν τόξον θετικόν, μικρότερον περιφέρειας καὶ τὰ αὐτὰ μετ' ἐκείνου ἔχον ὁμώνυμα ἄκρα. Ἐχει ἄρα τοῦτο καὶ τοὺς αὐτοὺς ὁμώνυμους τριγ. ἀριθμούς. Καὶ ἂν μὲν τοῦτο εἶναι μικρότερον τεταρτημορίου, ἡ ἀναγωγή συνετελέσθη, ἄλλως ἀναγόμεθα εἰς μίαν τῶν προηγουμένων περιπτώσεων. Οὕτω τοῦ τόξου 1275° ἡ ἀναγωγή γίνεται οὕτω. Ἐπειδὴ $1275^\circ = (360^\circ \times 3) + 195^\circ$, ἀληθεύουσιν αἱ ἰσότητες :

$$\eta\mu 1275^\circ = \eta\mu 195^\circ = -\eta\mu 15^\circ, \text{ συν} 1275^\circ = \text{συν} 195^\circ = -\text{συν} 15^\circ \\ \acute{\epsilon}\varphi 1275^\circ = \acute{\epsilon}\varphi 195^\circ = \acute{\epsilon}\varphi 15^\circ \text{ κτλ.}$$

ε'). Ἐὰν τὸ τόξον εἶναι ἀρνητικόν καὶ ἔλασσον ἀπολύτως περιφέρειας, διὰ τῶν τύπων (19), (20) καὶ (21) ἀναγόμεθα εἰς μίαν τῶν τριῶν πρώτων περιπτώσεων. Οὕτως εἶναι ἐπὶ παραδείγματι :

$$\eta\mu(-132^\circ) = -\eta\mu 132^\circ = -\eta\mu 48^\circ, \text{ συν}(-132^\circ) = \text{συν} 132^\circ \\ = -\text{συν} 48^\circ$$

$$\acute{\epsilon}\varphi(-132^\circ) = -\acute{\epsilon}\varphi 132^\circ = \acute{\epsilon}\varphi 48^\circ \text{ κτλ.}$$

$\text{συν}(\alpha + \delta) = (\overline{O\bar{\Pi}})$, $\eta\mu(\alpha + \delta) = (\overline{O\bar{P}})$, $\text{συν}\delta = (\overline{O\bar{\Gamma}'})$ και $\eta\mu\delta = (\overline{O\bar{P}_1})$.

*Επειδή δὲ τὸ ἄνυσμα ON εἶναι συνισταμένη τῆς τεθλ. γραμμῆς OΠ'N, ἔπεται (§ 13 Γ') ὅτι :

$$(\text{προβ. } \overline{O\bar{N}}) = (\text{προβ. } \overline{O\bar{\Gamma}'}) + (\text{προβ. } \overline{\Pi'\bar{N}}) \quad (\alpha)$$

οἰουδήποτε ὄντος τοῦ προβ. ἄξονος, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ὁ αὐτὸς δι' ὅλα τὰ προβαλλόμενα ταῦτα ἀνύσματα.

"Αν ληφθῆ ἡδη ὡς προβ. ἄξων ὁ χ'χ και παρασταθῆ διὰ τοῦ ω ἡ γωνία χΟχ, τῶν θετικῶν διευθύνσεων τῶν ἀξόνων χ'χ και χ₁χ₁, διὰ τοῦ τ δὲ τὸ εἰς ταύτην ἀντιστοιχοῦν τόξον, εὐρίσκομεν (§ 54, 52) ὅτι :

$$(\text{προβ. } \overline{O\bar{N}}) = (\overline{O\bar{\Pi}}) = \text{συν}(\alpha + \delta)$$

$$(\text{προβ. } \overline{O\bar{\Gamma}'}) = (\overline{O\bar{\Gamma}'}) \text{ συν } \omega = \text{συν}\delta \text{ συν}\tau$$

$$(\text{προβ. } \overline{\Pi'\bar{N}}) = (\text{προβ. } \overline{O\bar{P}_1}) = (\overline{O\bar{P}_1}) \text{ συν}(\omega + 90^\circ) = -\eta\mu\delta \cdot \eta\mu\omega = -\eta\mu\beta \cdot \eta\mu\tau.$$

*Η ἰσότης (α) γίνεται λοιπὸν :

$$\text{συν}(\alpha + \delta) = \text{συν}\delta \text{ συν}\omega - \eta\mu\delta \eta\mu\tau. \quad (\beta)$$

"Αν δὲ ληφθῆ ὡς προβ. ἄξων ὁ ψ'ψ και ληφθῆ ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ γωνία ψΟψ, τῶν θετικῶν διευθύνσεων τῶν ἀξόνων ψ'ψ και ψ₁ψ₁, εἶναι ἴση τῇ ω, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$(\text{προβ. } \overline{O\bar{N}}) = (\overline{O\bar{P}}) = \eta\mu(\alpha + \delta)$$

$$(\text{προβ. } \overline{O\bar{\Gamma}'}) = (\overline{O\bar{\Gamma}'}) \text{ συν}(\omega - 90^\circ) = \text{συν}\delta \eta\mu\omega = \text{συν}\delta \eta\mu\tau$$

$$(\text{προβ. } \overline{\Pi'\bar{N}}) = (\text{προβ. } \overline{O\bar{P}_1}) = (\overline{O\bar{P}_1}) \text{ συν}\omega = \eta\mu\delta \text{ συν}\omega = \eta\mu\delta \text{ συν}\tau.$$

*Ενεκα δὲ τούτων ἡ ἰσότης (α) γίνεται :

$$\eta\mu(\alpha + \delta) = \eta\mu\tau \cdot \text{συν}\delta + \text{συν}\tau \cdot \eta\mu\delta. \quad (\gamma)$$

*Επειδὴ δὲ τὰ τόξα τ και α ἔχοντα τὰ αὐτὰ ὁμόνυμα ἄκρα ἔχουσι και τοὺς αὐτοὺς ὁμωνύμους τριγ. ἀριθμοὺς, εἶναι

$$\eta\mu\tau = \eta\mu\alpha, \quad \text{συν}\tau = \text{συν}\alpha.$$

Αἱ ἰσότητες ἄρα (β) και (γ) γίνονται :

$$\text{συν}(\alpha + \delta) = \text{συν}\alpha \text{ συν}\delta - \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\delta \quad (36)$$

$$\eta\mu(\alpha + \delta) = \eta\mu\alpha \cdot \text{συν}\delta + \text{συν}\alpha \cdot \eta\mu\delta$$

Οἱ τύποι οὗτοι παρέχουσι τὸ ἡμίτονον και συνῆμιτονον τοῦ ἀθροίσματος δύο τόξων συναρτήσεως τοῦ ἡμιτόνου και συνῆμιτόνου τῶν τόξων τούτων.

§ 68. Β'. — Εὕρεσις τοῦ $\text{συν}(\alpha - \delta)$ και $\eta\mu(\alpha - \delta)$. —

*Εφαρμόζοντες τοὺς τύπους (36) εἰς τὰ τόξα, ὧν τὰ μέτρα εἶναι α και (-δ) και ἔχοντες πρὸ ὀφθαλμῶν τοὺς τύπους (19) εὐρίσκομεν εὐκόλως ἀφ' ἧσθηκε ἀπὸ το Ἰνστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

$$\begin{aligned} \text{συν}(α - β) &= \text{συνα σινβ} + \text{ήμα.ήμβ} \\ \text{ήμ}(α - β) &= \text{ήμα. σινβ} - \text{συνα ήμβ} \end{aligned} \quad (37)$$

Οι τύποι οὔτοι παρέχουσι συναρτήσαι τῷ ἡμίτονου καὶ συνημιτόνου δύο τόξων, ὧν μέτρα α καὶ β, τὸ συνημίτονον τῆς διαφορᾶς αὐτῶν (α-β).

Ἀσκήσεις. 193) Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον ἑκατέρου τῶν τόξων 75° καὶ 15°.

194) Ἐὰν α+β=90°, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\text{συν}^2\alpha + \text{συν}^2\beta = 1$.

195) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι: $\text{συν}(α + β) \cdot \text{συν}(α - β) = \text{συν}^2\alpha - \text{ήμ}^2\beta$.

196) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι: $\text{ήμ}(α + β) \cdot \text{ήμ}(α - β) = \text{ήμ}^2\alpha - \text{ήμ}^2\beta$.

197) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι: $\frac{2\text{ήμ}(α + β)}{\text{συν}(α + β) + \text{συν}(α - β)} = \text{έφα} + \text{έφβ}$.

198) Ἄν α+β+γ=180°, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι: $\text{συν}^2\alpha + \text{συν}^2\beta + \text{συν}^2\gamma + 2\text{συνα σινβ σινγ} = 1$.

199) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ ἡμίτονον τοῦ ἀθροίσματος δύο τόξων θετικῶν καὶ μικροτέρων 90° εἶναι μικρότερον τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἡμιτόνων αὐτῶν.

200) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ παράστασις $\text{συν}^2\chi + \text{συν}^2(120^\circ + \chi) + \text{συν}^2(120^\circ - \chi)$

εἶναι ἀνεξάρτητος τοῦ τόξου χ.

201) Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον ἑκάστου τῶν τόξων (α+β+γ), (α+β-γ) συναρτήσαι τῶν αὐτῶν τριγ. ἀριθμῶν τῶν τόξων α, β, γ.

§ 69. Γ'. — **Εὑρεσις τῆς έφ(α+β) καὶ έφ(α-β).** — Διαιροῦντες τὰ μέλη τῆς β' τῶν ἰσοτήτων (36) διὰ τῶν ἀντιστοιχῶν

μελῶν τῆς α' εὑρίσκομεν ὅτι: $\text{έφ}(α + β) = \frac{\text{ήμασινβ} + \text{συναήμβ}}{\text{συνασινβ} - \text{ήμαήμβ}}$

Ἐὰν δὲ διαρέσωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ὅρους β' μέλους ταύτης διὰ συνασινβ, εὑρίσκομεν ὅτι:

$$\text{έφ}(α + β) = \frac{\text{έφα} + \text{έφβ}}{1 - \text{έφαέφβ}} \quad (38)$$

Ἐὰν δὲ ἐφαρμόσωμεν τὸν τύπον τοῦτον εἰς τὰ τόξα α καὶ (-β) καὶ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν (§ 60 ἰσ. 20) ὅτι: $\text{έφ}(-β) = -\text{έφβ}$, εὑρίσκομεν ὅτι

$$\text{έφ}(α - β) = \frac{\text{έφα} - \text{έφβ}}{1 + \text{έφαέφβ}} \quad (39)$$

Ἀσκήσεις. 202) Νὰ εὑρεθῆ ἡ ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη ἑκατέρου τῶν τόξων 75° καὶ 15°.

203). Ἐάν $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\alpha') \ \acute{\epsilon}\varphi\alpha + \acute{\epsilon}\varphi\beta + \acute{\epsilon}\varphi\gamma = \acute{\epsilon}\varphi\alpha. \acute{\epsilon}\varphi\beta. \acute{\epsilon}\varphi\gamma$$

$$\beta') \ \sigma\varphi\alpha. \sigma\varphi\beta + \sigma\varphi\alpha. \sigma\varphi\gamma + \sigma\varphi\beta. \sigma\varphi\gamma = 1.$$

204) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\acute{\epsilon}\varphi(45^\circ - \alpha) = \frac{\sigma\upsilon\alpha - \acute{\eta}\mu\alpha}{\sigma\upsilon\alpha + \acute{\eta}\mu\alpha}$.

205). Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ τὸξά περιεχόμενα μεταξὺ 0° καὶ 90° ἀληθεύει ἡ ἰσότης : $\acute{\epsilon}\varphi. \frac{1}{2} + \acute{\epsilon}\varphi. \frac{1}{3} = 45^\circ$.

206) Νὰ εὐρεθῆ ἡ σχέσις, ἣτις συνδέει τὰς ἑφαπτομένας τῶν γωνιῶν παντὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου.

207) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\acute{\epsilon}\varphi(\alpha - \beta) + \acute{\epsilon}\varphi(\beta - \gamma) + \acute{\epsilon}\varphi(\gamma - \alpha) = \acute{\epsilon}\varphi(\alpha - \beta) \acute{\epsilon}\varphi(\beta - \gamma) \acute{\epsilon}\varphi(\gamma - \alpha).$$

208) Ἐάν $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\alpha') \ \acute{\epsilon}\varphi\alpha. \acute{\epsilon}\varphi\beta + \acute{\epsilon}\varphi\alpha. \acute{\epsilon}\varphi\gamma + \acute{\epsilon}\varphi\beta. \acute{\epsilon}\varphi\gamma = 1,$$

$$\beta') \ \sigma\varphi\alpha. \sigma\varphi\beta. \sigma\varphi\gamma = \sigma\varphi\alpha + \sigma\varphi\beta + \sigma\varphi\gamma.$$

209) Νὰ ἐκφρασθῆ ἡ $\sigma\varphi(\alpha + \beta)$ καὶ ἡ $\sigma\varphi(\alpha - \beta)$ συναρτήσῃ. τῶν $\sigma\varphi\alpha, \sigma\varphi\beta$.

210) Εὐρεῖν τὴν ἑφαπτομένην ἑκατέρου τῶν τὸξων $(\alpha + \beta + \gamma)$ $(\alpha + \beta - \gamma)$ συναρτήσῃ τῶν ἑφαπτομένων τῶν τὸξων α, β, γ .

211) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\sigma\varphi(\alpha + \beta + \gamma) =$$

$$= \frac{\sigma\varphi\alpha. \sigma\varphi\beta. \sigma\varphi\gamma - \sigma\varphi\alpha - \sigma\varphi\beta - \sigma\varphi\gamma}{\sigma\varphi\alpha. \sigma\varphi\beta + \sigma\varphi\alpha. \sigma\varphi\gamma + \sigma\varphi\beta. \sigma\varphi\gamma - 1}.$$

ΤΡΙΓ. ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΩΝ ΤΟΞΟΥ

§ 70. Α'. — Εὐρέσις τοῦ $\sigma\upsilon\eta 2\alpha$. Ἐάν ἐν τῇ α' τῶν ἰσοτήτων (36) τεθῆ α ἀντὶ θ , προκύπτει ἡ ἰσότης

$$\sigma\upsilon\eta 2\alpha = \sigma\upsilon\eta^2\alpha - \acute{\eta}\mu^2\alpha, \quad (40)$$

δι' ἧς ὀρίζεται τὸ συνημίτονον τοῦ διπλασίου τοῦ τὸξου α συναρτήσῃ τοῦ συνημιτόνου καὶ ἡμιτόνου τοῦ α .

Ἐάν δὲ ἐν ταύτῃ ἀντὶ $\acute{\eta}\mu^2\alpha$ τεθῆ $1 - \sigma\upsilon\eta^2\alpha$, προκύπτει ἡ ἰσότης

$$\sigma\upsilon\eta 2\alpha = 2\sigma\upsilon\eta^2\alpha - 1, \quad (41)$$

δι' ἧς ὀρίζεται τὸ $\sigma\upsilon\eta 2\alpha$ συναρτήσῃ τοῦ $\sigma\upsilon\alpha$.

§ 71. Β'. — Εὐρέσις τοῦ $\acute{\eta}\mu 2\alpha$. — Ἐάν ἐν τῇ β' τῶν ἰσοτήτων (36) τεθῆ α ἀντὶ θ , προκύπτει ἡ ἰσότης

$$\acute{\eta}\mu 2\alpha = 2 \acute{\eta}\mu\alpha \sigma\upsilon\alpha, \quad (42)$$

δι' ἧς ὀρίζεται τὸ $\acute{\eta}\mu 2\alpha$ συναρτήσῃ τοῦ $\acute{\eta}\mu\alpha$ καὶ $\sigma\upsilon\alpha$.

Ἐάν δὲ ἐν αὐτῇ ἀντὶ $\sigma\upsilon\alpha$ τεθῆ $\pm \sqrt{1 - \acute{\eta}\mu^2\alpha}$, προκύπτει ὅτι :

$$\acute{\eta}\mu 2\alpha = \pm 2 \acute{\eta}\mu\alpha \sqrt{1 - \acute{\eta}\mu^2\alpha}, \quad (43)$$

ἔθεν ὀρίζεται τὸ ἡμ2α συναρτήσῃ τοῦ ἡμα, ἂν ἔτι ὀρισθῇ καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς ὃ περατοῦται τὸ τόξον 2α.

ΣΒΜ. Τὸ διπλοῦν σημεῖον τοῦ β' μέλους τοῦ τύπου (43) ἐξηγεῖται ὡς ἐξῆς. Ἡμίτονον ἴσον πρὸς τὸ τοῦ τόξου α ἔχουσιν ἄπειρα τόξα· ἕστω 8ν τούτων, διάφορον τοῦ α, τὸ τ. Ὡς γνωστὸν (§ 55 Γ') θὰ εἶναι

$$α = (2K+1)π - τ \quad \text{ἢ} \quad α = 2Kπ + τ, \quad \text{ἄρα}$$

$$2α = 2(2K+1)π - 2τ = 2λπ - 2τ \quad \text{ἢ} \quad 2α = 2 \cdot 2Kπ + 2τ = 2λ'π + 2τ.$$

Καὶ ἂν μὲν τὸ τόξον 2α παρέχεται ὑπὸ τοῦ α' τῶν τύπων τούτων, θὰ ἔχη τὸ αὐτὸ πέρασ μετὰ τοῦ τόξου (-2τ)· ἂν δὲ ὑπὸ τοῦ β', θὰ ἔχη τὸ αὐτὸ μὲ τὸ τόξον 2τ πέρασ, ὅπερ εἶναι συμμετρικὸν τοῦ προηγουμένου πέρατος πρὸς τὸν ἄξονα τῶν συνημιτόνων. Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι τὸ ἡμίτονον τοῦ τόξου 2α παρεχομένου ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν τύπων τούτων εἶναι ἀντίθετον τοῦ ἡμιτόνου τόξου 2α παρεχομένου ὑπὸ τοῦ ἑτέρου.

§ 72. Γ'. — **Ἐξοεσις τῆς ἐφ' 2α.** — Ἐὰν ἐν τῇ ἰσότητι (38) τεθῇ α ἀντὶ θ, προκύπτει ἡ ἰσότης :

$$\text{ἐφ} 2α = \frac{2\text{ἐφ} α}{1 - \text{ἐφ}^2 α} \quad (44)$$

Παρατήρησις. — Ἐὰν τεθῇ 2α = ω, ὅτε καὶ α = $\frac{\omega}{2}$, αἱ ἰσότητες

(40), (42), (44) γίνονται :

$$\begin{aligned} \text{συν} \omega &= \text{συν}^2 \left(\frac{\omega}{2} \right) - \eta\mu^2 \left(\frac{\omega}{2} \right) \\ \eta\mu \omega &= 2\eta\mu \left(\frac{\omega}{2} \right) \text{συν} \left(\frac{\omega}{2} \right) \\ \text{ἐφ} \omega &= \frac{2\text{ἐφ} \left(\frac{\omega}{2} \right)}{1 - \text{ἐφ}^2 \left(\frac{\omega}{2} \right)} \end{aligned} \quad (45)$$

αἱ δὲ ἰσότητες (41) καὶ (43) γίνονται :

$$\begin{aligned} \text{συν} \omega &= 2\text{συν}^2 \frac{\omega}{2} - 1 \\ \eta\mu \omega &= \pm 2\eta\mu \frac{\omega}{2} \sqrt{1 - \eta\mu^2 \frac{\omega}{2}} \end{aligned} \quad (46)$$

§ 73. Δ'. — **Ἐξοεσις τοῦ συνω καὶ ἡμω συναρτήσῃ τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$.** — Ἡ α' τῶν ἰσοτήτων (45) λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν

ὅτι $\text{συν}^2 \left(\frac{\omega}{2} \right) + \eta\mu^2 \left(\frac{\omega}{2} \right) = 1$ δύναται νὰ γραφῇ καὶ οὕτω :

$$\text{συνω} = \frac{\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}. \text{ Έάν δὲ διαιρέσωμεν ἀμφοτέρους τούτους}$$

ἄρους τοῦ β' μέλους διὰ $\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$, εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα :

$$\text{συνω} = \frac{1 - \epsilon\varphi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 + \epsilon\varphi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)} \quad (47)$$

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\eta\mu\omega = \frac{2\epsilon\varphi\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 + \epsilon\varphi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

Οἱ τύποι (47) καὶ ὁ γ' τῶν τύπων (45) παρέχουσι τὸ $\eta\mu\omega$, συνω , $\epsilon\varphi\omega$ συναρτήσῃ τῆς $\epsilon\varphi\frac{\omega}{2}$.

Ἀσκήσεις. 212) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι: $1 + \epsilon\varphi\alpha \cdot \epsilon\varphi 2\alpha = \frac{1}{\text{συν} 2\alpha}$

213) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\epsilon\varphi(45^\circ + \alpha) - \epsilon\varphi(45^\circ - \alpha) = 2\epsilon\varphi 2\alpha$.

214) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\epsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{1 - \eta\mu 2\alpha}{1 + \eta\mu 2\alpha}$.

215) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι

$$\alpha') \sigma\varphi 2\alpha = \frac{\sigma\varphi^2\alpha - 1}{2\sigma\varphi\alpha}, \beta') \sigma\varphi\alpha - \epsilon\varphi\alpha = 2\sigma\varphi 2\alpha.$$

216) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι α') $\eta\mu 2\alpha = \frac{2}{\epsilon\varphi\alpha + \sigma\varphi\alpha}$.

$$\beta') \epsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}\right) + \sigma\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{2}{\sigma\upsilon\alpha}$$

217) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι

$$\frac{\epsilon\varphi 2\alpha}{1 + \epsilon\varphi\alpha \cdot \epsilon\varphi 2\alpha} = \eta\mu 2\alpha$$

218) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\eta\mu 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)}{1 + \epsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)}$

219) Νά ἀπλοποιηθῆ ἡ παράστασις $3 - 4\text{συν}2\chi + \text{συν}4\chi$.

220) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι $\text{τεμ}2\alpha = \frac{\text{τεμ}^2\alpha}{2 - \text{τεμ}^2\alpha}$.

§ 74. Ε'. — **Εὗρεσις τοῦ συν³α, ἡμ³α καὶ ἐφ³α.**
Παρατηροῦντες ὅτι $3\alpha = 2\alpha + \alpha$ εὐρίσκομεν ὅτι $\text{συν}3\alpha = \text{συν}(2\alpha + \alpha)$.

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι $\text{συν}(2\alpha + \alpha) = \text{συν}2\alpha\text{συν}\alpha - \eta\mu 2\alpha \eta\mu \alpha$ καὶ
 $\text{συν}2\alpha = 2\text{συν}^2\alpha - 1$, $\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu \alpha\text{συν}\alpha$, ἔπεται ὅτι
 $\text{συν}(2\alpha + \alpha) = (2\text{συν}^2\alpha - 1)\text{συν}\alpha - 2\eta\mu^2\alpha\text{συν}\alpha = 2\text{συν}^3\alpha - \text{συν}\alpha -$
 $2(1 - \text{συν}^2\alpha)\text{συν}\alpha$
 $= 2\text{συν}^3\alpha - \text{συν}\alpha - 2\text{συν}\alpha + 2\text{συν}^3\alpha = 4\text{συν}^3\alpha - 3\text{συν}\alpha$.

Ἄρα: $\text{συν}3\alpha = 4\text{συν}^3\alpha - 3\text{συν}\alpha$

Ὀμοίως εὐρίσκομεν ὅτι: $\eta\mu 3\alpha = 3\eta\mu \alpha - 4\eta\mu^3\alpha$ (48)

$$\epsilon\phi 3\alpha = \frac{3\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi^3\alpha}{1 - 3\epsilon\phi^2\alpha}$$

Διὰ τῶν τύπων τούτων ὁρίζεται τὸ συνημίτονον, ἡμίτονον καὶ ἡ ἐφαπτομένη τοῦ τόξου 3α συναρτήσῃ τῶν ὁμωνύμων τριγ. ἀριθμῶν τοῦ τόξου α .

Ἀσκήσεις. 221) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι: $\sigma\phi 3\alpha = \frac{\sigma\phi^3\alpha - 3\sigma\phi\alpha}{3\sigma\phi^2\alpha - 1}$.

222) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι: $\frac{\epsilon\phi^2 2\alpha}{1 - \epsilon\phi^2 2\alpha} \cdot \frac{\epsilon\phi^2 \alpha}{\epsilon\phi^2 \alpha} = \epsilon\phi 3\alpha \cdot \epsilon\phi \alpha$.

223) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι $\epsilon\phi \alpha = 2$, εὐρεῖν τὸ $\eta\mu 4\alpha$ καὶ $\text{συν}4\alpha$.

224) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι: $\text{τεμ}3\alpha = \frac{\text{τεμ}^3\alpha}{4 - 3\text{τεμ}^2\alpha}$.

225) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι: $\sigma\tau\epsilon\mu 3\alpha = \frac{\sigma\tau\epsilon\mu^3\alpha}{3\sigma\tau\epsilon\mu^2\alpha - 4}$.

226) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι:

α') $\text{συν}(n\alpha) = \text{συν}\alpha \cdot \text{συν}(n-1)\alpha - \eta\mu \alpha \eta\mu (n-1)\alpha$

β') $\eta\mu (n\alpha) = \eta\mu \alpha \cdot \text{συν}(n-1)\alpha + \text{συν}\alpha \cdot \eta\mu (n-1)\alpha$

$$\gamma') \epsilon\phi (n\alpha) = \frac{\epsilon\phi \alpha + \epsilon\phi (n-1)\alpha}{1 - \epsilon\phi \alpha \epsilon\phi (n-1)\alpha}$$

δ') $\text{συν}(2n\alpha) = \text{συν}^2(n\alpha) - \eta\mu^2(n\alpha)$

ε') $\eta\mu (2n\alpha) = 2\eta\mu (n\alpha) \cdot \text{συν}(n\alpha)$,

Ἡ φησιοποιήθηκε ἀπό τὸ Ἰνστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

στ') $\epsilon\varphi(2\nu\alpha) = \frac{2\epsilon\varphi(\nu\alpha)}{1 - \epsilon\varphi^2(\nu\alpha)}$, αν ν είναι άκεραίος και θετικός αριθμός.

ΤΡΙΓ. ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΗΜΙΣΕΩΣ ΤΟΣΟΥ ΤΙΝΟΣ

§ 73. Α'. — Εύρεσις τοῦ $\text{συν} \frac{\omega}{2}$ καὶ $\eta\mu \frac{\omega}{2}$ συναρτήσεως τοῦ $\text{συν} \omega$. — Προσθέτοντες κατὰ μέλη τὰς γνωστὰς (1,45) ἰσότητας :

$$\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1, \text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \text{συν} \omega \text{ εὐρίσκομεν}$$

τὴν ἰσότητα $2\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 + \text{συν} \omega$, ἐξ ἧς

$$\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1 + \text{συν} \omega}{2}, \text{ ἄρα}$$

$$\text{συν}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \text{συν} \omega}{2}} \quad (49)$$

Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν μελῶν τῆς α' τῶν αὐτῶν ἰσοτήτων ἀφαιρέσωμεν τὰ ἀντίστοιχα μέλη τῆς β', εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα

$$2\eta\mu^2\frac{\omega}{2} = 1 - \text{συν} \omega, \text{ ἐξ ἧς } \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1 - \text{συν} \omega}{2}, \text{ ἄρα}$$

$$\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \text{συν} \omega}{2}} \quad (50)$$

Ἐνεκα τῆς παρουσίας τοῦ διπλοῦ σημείου οἱ τύποι (49) καὶ (50) δὲν ὀρίζουσι τελείως τὸ $\text{συν} \frac{\omega}{2}$ καὶ $\eta\mu \frac{\omega}{2}$ ἐκ μόνου τοῦ $\text{συν} \omega$. ἀπαιτεῖται πλὴν τούτων νὰ εἶναι γνωστὸν καὶ τὸ τόξον ω , ἢ τοῦλάχιστον τὸ τεταρτημόριον, εἰς ὃ καταλήγει τὸ $\frac{\omega}{2}$.

Ἐπειδὴ τὰ σημεῖα τῶν τιμῶν τοῦ $\text{συν} \frac{\omega}{2}$ εἶναι ἀνεξάρτητα τῶν σημείων τῶν τιμῶν τοῦ $\eta\mu \frac{\omega}{2}$, ἐπεταὶ ὅτι ἕκαστον σημεῖον τοῦ ἑνὸς τῶν τούτων ἀριθμῶν δύναται νὰ συνδυασθῇ πρὸς ἕκα-

στον σημείον του άλλου. Οβτως προκύπτουσιν αί ακόλουθοι 4 λύσεις.

α'.	$\text{συν} \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{1 + \text{συν}\omega}{2}}$		$\text{συν} \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{1 + \text{συν}\omega}{2}}$
	$\eta\mu \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{1 - \text{συν}\omega}{2}}$		$\eta\mu \frac{\omega}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \text{συν}\omega}{2}}$
	$\text{συν} \frac{\omega}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \text{συν}\omega}{2}}$		$\text{συν} \frac{\omega}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \text{συν}\omega}{2}}$
γ'.	$\eta\mu \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{1 - \text{συν}\omega}{2}}$		$\eta\mu \frac{\omega}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \text{συν}\omega}{2}}$

Ἐξηγείται δὲ ὁ ἀριθμὸς οὗτος τῶν λύσεων ὡς ἔξῃς. Ἐάν τ εἶναι τὸ μέτρον τυχόντος τόξου, ὅπερ ἔχει συνημίτονον ἴσον πρὸς τὸ δεδομένον $\text{συν}\omega$, θὰ εἶναι $\omega = 2K\pi \pm \tau$

(§ 55 Α'), ὅθεν


$$\frac{\omega}{2} = K\pi \pm \frac{\tau}{2}.$$

Ἐάν τὸ τόξον $\frac{\tau}{2}$ λήγῃ εἰς τι σημεῖον Μ (Σχ. 44) τῆς περιφερείας, τὸ $\frac{\omega}{2} = K\pi + \frac{\tau}{2}$ θὰ λήγῃ ἢ εἰς τὸ Μ ἢ εἰς τὸ Ν, ὅπερ εἶ-

ναι συμμετρικὸν τοῦ Μ πρὸς τὸ κέντρον. Ἐπειδὴ δὲ τὸ $(-\frac{\tau}{2})$ λήγει εἰς τὸ Μ', ὅπερ εἶναι συμμετρικὸν τοῦ Μ πρὸς τὸν ἄξονα χ'χ, τὸ τόξον $\frac{\omega}{2} = K\pi - \frac{\tau}{2}$ θὰ λήγῃ εἰς τὸ Μ' ἢ εἰς τὸ Ν', συμμετρικὸν τοῦ Μ' πρὸς τὸ κέντρον.

Τὰ εἰς τὸ δεδομένον λοιπὸν $\text{συν}\omega$ ἀντιστοιχοῦντα τόξα $\frac{\omega}{2}$ λήγουσιν ἄλλα μὲν εἰς τὸ Μ, ἄλλα εἰς τὸ Μ', ἄλλα εἰς τὸ Ν' καὶ ἄλλα εἰς τὸ Ν. Ἐκαστον δὲ τούτων ἔχει ἡμίτονον καὶ συνημίτονον, ἅτινα ἀντιστοιχοῦσιν, κατὰ σειρὰν εἰς τὰς προηγουμένας λύσεις.

§ 76. Β'. — Εὕρεσις τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$ συναρτήσεως τοῦ



συνω. — Προηγουμένως (§ 75) εύρομεν ότι: $2 \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 - \sigma\upsilon\nu\omega$

καὶ $2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 + \sigma\upsilon\nu\omega$,

Διακρίδοντες ταύτας κατὰ μέλη εὐρίσκομεν εὐκόλως ὅτι:

$$\epsilon\varphi\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\omega}{1 + \sigma\upsilon\nu\omega}} \quad (51)$$

Ἡ ἰσότης αὕτη ἔνεκα τῆς παρουσίας τοῦ διπλοῦ σημείου δὲν ὀρίζει τελείως τὴν ἐφ $\left(\frac{\omega}{2}\right)$ ἐκ τοῦ συνω· ἀπαιτεῖται πρὸς τοῦτο νὰ δοθῇ ἔτι καὶ τὸ τόξον ω ἢ τὸ τεταρτημόριον, εἰς ὃ λήγει τὸ $\frac{\omega}{2}$.

ΣΗΜ. Τὴν παρουσίαν τοῦ διπλοῦ σημείου ἐξηγοῦμεν εὐκόλως, ἂν ἔχομεν ὑπ' ὄψιν ὅσα προηγουμένως (§ 75) εἵπομεν περὶ τῶν σημείων, εἰς ἃ δύναται νὰ καταλήγῃ τὸ τόξον $\frac{\omega}{2}$.

Ἀσκήσεις. 227). Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ τοῦ τόξου 15°

228). Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ τοῦ τόξου $22^\circ 30'$.

229). Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ τοῦ τόξου $7^\circ 30'$.

230). Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγ. ἀριθμοὶ τόξου $\frac{\omega}{2}$, ὅπερ λήγει εἰς τὸ α' τεταρτημόριον, ἂν συνω = $\frac{2}{3}$.

231). Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\tau\epsilon\mu\frac{\omega}{2} = \pm \sqrt{\frac{2\tau\epsilon\mu\omega}{1 + \tau\epsilon\mu\omega}}$

§ 77. Γ'. — Εὐρέσεις τοῦ $\eta\mu\frac{\omega}{2}$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2}$ συναρ-

τήσει τοῦ $\eta\mu\omega$. — Ἐκ τῶν γνωστῶν ἰσοτήτων

$\eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1$ καὶ $2\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\omega}{2}\right) = \eta\mu\omega$ διὰ


προσθέσεως κατὰ μέλη εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα

$\left(\eta\mu\frac{\omega}{2} + \sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2}\right)^2 = 1 + \eta\mu\omega$, ὅθεν δι' ἐξαγωγῆς τῆς τετρ. ρίζας

ἀμφοτέρων τῶν μελῶν προκύπτει ὅτι:

$$\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{1 + \eta\mu\omega} \quad (\alpha)$$

$\frac{\omega}{2} = K\pi + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\tau}{2}\right)$. Ἐὐν δὲ ὑποτεθῆῃ ὅτι τὸ τόξον $\frac{\tau}{2}$ περατοῦται εἰς
 πὶ σημεῖον M τῆς περιφερείας (Σχ. 45) τὸ $\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\tau}{2}\right)$ θὰ περατοῦται εἰς τὸ



(Σχ. 45)

συμμετρικὸν τοῦ M πρὸς τὴν ΔΟΔ', ἣτις διχοτομεῖ τὴν γωνίαν ΑΟΒ. Τὸ τό-
 ξον ὅθεν $\frac{\omega}{2}$, εἰάν μὲν παρέχεται ὑπὸ τοῦ τύπου $\frac{\omega}{2} = K\pi + \frac{\tau}{2}$, θὰ περατοῦ-
 ται εἰς τὸ M ἢ εἰς τὸ N συμμετρικὸν τοῦ M πρὸς τὸ κέντρον· εἰάν δὲ πα-
 ρέχεται ὑπὸ τοῦ τύπου $\frac{\omega}{2} = K\pi + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\tau}{2}\right)$, θὰ περατοῦται εἰς τὸ
 M' ἢ τὸ N'. Ὡστε εἰς τὸ δεδομένον ἥμω ἀντιστοιχοῦσι τόξα $\frac{\omega}{2}$ περα-
 τούμενα εἰς 4 σημεῖα· εἰς ἕκαστον δὲ τούτων ἀντιστοιχεῖ ὠρισμένον σύ-
 στημα τιμῶν τοῦ ἥμ $\frac{\omega}{2}$ καὶ συν $\frac{\omega}{2}$.

Ἐκ τῶν προειρημένων καθίσταται ἔτι φανερόν ὅτι τὸ ἥμω δὲν
 ἀρκεῖ νὰ ὀρίσῃ τελείως τὸ ἥμ $\frac{\omega}{2}$ καὶ συν $\frac{\omega}{2}$. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖ-
 ται πλὴν τὸ ἥμω νὰ ὀρισθῆῃ καὶ αὐτὸ τὸ τόξον ω. Ἐστω π. χ. ἔτι
 $\omega = 1110^\circ$, ὅτε $\text{ἥμ}\omega = \frac{1}{2}$ (§ 66). Ἐπειδὴ τὸ τόξον $\frac{\omega}{2} = 555^\circ = 360^\circ +$
 195° περατοῦται εἰς τὸ γ' τεταρτημόριον καὶ μεταξὺ Α' καὶ Δ' (Σχ.
 45) ἔπεται ὅτι : α') $\text{ἥμ}\frac{\omega}{2}$ καὶ συν $\frac{\omega}{2}$ εἶναι ἀμφότερα ἀρνητικὰ καὶ

κατ' ἀκολουθίαν καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι ἀρνητικόν, β') τὸ συν $\frac{\omega}{2}$ εἶναι ἀπολύτως μείζον τοῦ ἡμ $\frac{\omega}{2}$ καὶ ἐπομένως ἡ διαφορά ἡμ 555° —συν 555° εἶναι θετική. Ἀρμόζει λοιπὸν τὸ γ' σύστημα ἦτοι :

$$\begin{aligned} \text{ἡμ } 550^\circ + \text{συν} 555^\circ &= -\sqrt{1 + \frac{1}{2}} = -\sqrt{\frac{3}{2}} \\ \text{ἡμ } 555^\circ - \text{συν} 555^\circ &= \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}}, \text{ ὅθεν} \\ \text{ἡμ } 555^\circ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{(1 - \sqrt{3})\sqrt{2}}{4} \text{ καὶ} \\ \text{συν } 555^\circ &= -\frac{(1 + \sqrt{3})\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

Ἀσκήσεις. 232) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἡμ $750^\circ = \text{ἡμ } 30^\circ = \frac{1}{2}$ νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμ 375° καὶ τὸ συν 375° .

233) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἡμ $1200^\circ = \text{ἡμ } 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμ 600° καὶ τὸ συν 600° .

234) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἡμ $225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον τοῦ τόξου $112^\circ 30'$.

* § 78 Δ'. **Εὐρέσεις τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$ συναρτήσεως τοῦ ἡμ ω.**
— Ἐὰν τὰς ἰσότητας (52) διαιρέσωμεν κατὰ μέλη, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{ἐφ } \frac{\omega}{2} = \frac{\varepsilon \sqrt{1 + \eta\mu\omega} + \varepsilon' \sqrt{1 - \eta\mu\omega}}{\varepsilon \sqrt{1 + \eta\mu\omega} - \varepsilon' \sqrt{1 - \eta\mu\omega}}$$

Ἐὰν δὲ ἀμφοτέρους τοῦ, ἔρους τοῦ β' μέλους πολίσωμεν ἐπὶ ε καὶ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι $\varepsilon^2 = +1$, εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα

$$\text{ἐφ } \frac{\omega}{2} = \frac{\sqrt{1 + \eta\mu\omega} + \varepsilon \varepsilon' \sqrt{1 - \eta\mu\omega}}{\sqrt{1 + \eta\mu\omega} - \varepsilon \varepsilon' \sqrt{1 - \eta\mu\omega}} \quad (53)$$

Ἐκ τῆς ἰσότητος ταύτης καθίσταται φανερόν ὅτι εἰς δεδομένην τινὰ τιμὴν τοῦ ἡμω ἀντιστοιχοῦσαν αἱ ἀκόλουθοι δύο ἀντίστροφαι τιμαὶ

$$\frac{\sqrt{1 + \eta\mu\omega} + \sqrt{1 - \eta\mu\omega}}{\sqrt{1 + \eta\mu\omega} - \sqrt{1 - \eta\mu\omega}}, \frac{\sqrt{1 + \eta\mu\omega} - \sqrt{1 - \eta\mu\omega}}{\sqrt{1 + \eta\mu\omega} + \sqrt{1 - \eta\mu\omega}} \text{ τῆς ἐφ } \frac{\omega}{2},$$

καθ' ὅσον ε καὶ ε' εἶναι ὁμόσημοι ἢ ἑτερόσημοι.

ἔχοντες ὑπ' ὄψιν ὅσα προηγουμένως (§ 77) εἶπομεν περὶ τῶν σημείων, εἰς ἃ δύναται νὰ περατοῦται τόξον τι $\frac{\omega}{2}$ ἀντιστοιχοῦν εἰς δεδομένον ἡμω, κατανοοῦμεν εὐκόλως τὴν αἰτίαν τῆς ὑπάρξεως δύο λύσεων. Ἴνα δὲ καθορισθῇ τελείως ἡ τιμὴ τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$, πρέπει πλὴν τοῦ ἡμω, νὰ ὀρισθῇ καὶ τὸ τόξον ω . Οὕτως εἰς ἡμω = $\frac{1}{2}$ καὶ $\omega = 1110^\circ$ ἀντιστοιχεῖ τιμὴ τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$ θετικὴ καὶ μικροτέρα τῆς μονάδος, καθ' ὅσον τὸ $\frac{\omega}{2} = 555^\circ$ περατοῦται εἰς τὸ γ' τεταρτημό- και μεταξὺ Α' καὶ Δ' (Σχ. 45). Πρέπει λοιπὸν νὰ λάβωμεν τὴν πληροῦσαν ἀμφοτέρους τοὺς ὅρους τούτους τιμὴν, ἥτοι

$$\text{ἐφ } 555^\circ = \frac{\sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{\frac{1}{2}}}{\sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}}} = 2 - \sqrt{3}.$$

Ἀσκήσεις. 235) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἡμ $330^\circ = -\frac{1}{2}$ νὰ εὑρεθῇ ἡ ἐφ 165° .

236) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἡμ $315^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ νὰ εὑρεθῇ ἡ ἐφα- πτομένη τοῦ τόξου $157^\circ 30'$.

§ 79 Ε'. — **Εὗρεσις τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$ συναρτήσεως τῆς ἐφ ω .**

Ἡ γνωστὴ ἰσότης ἐφ $\omega = \frac{2\text{ἐφ}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 - \text{ἐφ}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}$ λυομένη πρὸς ἐφ $\frac{\omega}{2}$ παρέχει

τὸν τύπον :

$$\text{ἐφ}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{-1 + \sqrt{1 + \text{ἐφ}^2 \omega}}{\text{ἐφ} \omega} \quad (54)$$

Ἐκ τούτου καθίσταται φανερόν ὅτι εἰς πᾶσαν τιμὴν τῆς ἐφ ω ἀντιστοιχοῦσι δύο πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι τιμαὶ τῆς ἐφ $\left(\frac{\omega}{2}\right)$, καὶ κατ' ἀκολουθίαν ἡ ἐφ ω δὲν ἀρκεῖ νὰ ὀρίσῃ τελείως τὴν ἐφ $\left(\frac{\omega}{2}\right)$. ἄ-

παιτείται πλὴν ταύτης νὰ εἶναι γνωστὸν καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς
ὃ καταλήγει τὸ τόξον $\frac{\omega}{2}$ ἢ, ὅπερ εἰς τὸ αὐτὸ καταντᾷ, νὰ εἶναι
γνωστὸν τὸ τόξον ω . Οὕτω π. χ. γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἐφ $45^\circ = 1$, εὐ-
ρίσκομεν ἐκ τοῦ τύπου (54) δύο τιμὰς τῆς ἐφ $\frac{45^\circ}{2}$ τὴν $-1 + \sqrt{2}$

καὶ τὴν $-1 - \sqrt{2}$. Ἐπειδὴ δὲ τὸ τόξον $\frac{45^\circ}{2} = 22^\circ 30'$ λήγει εἰς τὸ α^ο
τεταρτημόριον, ἔχει θετικὴν ἐφαπτομένην, ἦτοι ἐκ τῶν δύο προη-
γουμένων τιμῶν μόνον ἡ $-1 + \sqrt{2}$ εἶναι παραδεκτὴ.

ΣΗΜ. Τὴν ἐξήγησιν τῆς ὑπάρξεως δύο τιμῶν τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$ ἀφήνομεν
τοῖς μαθηταῖς ὡς ἄσκησιν.

Ἄσκησις. 237) Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἐφ 525° , γνωστοῦ ὄντος ὅτι
ἐφ $1050^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

238). Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἐφ. 750° , γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἐφ $1500^\circ = \sqrt{3}$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εον

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

§ 80. — **Εἶδη τριγωνομετρικῶν πινάκων.** — Συνή-
θως ἐν ταῖς τριγωνομετρικαῖς ἐφαρμογαῖς ἀγόμεθα εἰς τὴν εὕρεσιν
τριγωνομετρικοῦ τινος ἀριθμοῦ δεδομένου τόξου ἢ γωνίας καὶ τὰ-
νάπαλιν εἰς τὴν εὕρεσιν τόξου ἢ γωνίας ἐχούσης δεδομένον τινα
τριγ. ἀριθμὸν.

Ἀναγκαιοῦσιν ὅθεν ἡμῖν πίνακες περιέχοντες τοὺς τριγ. ἀριθμοὺς
τῶν μεταξὺ 0° καὶ 45° περιεχομένων τόξων προχωρούντων κατὰ ὁ-
ρισμένον τόξον, διότι οἱ τριγ. ἀριθμοὶ τῶν ἄλλων τόξων εὐρίσκονται
εὐκόλως (§ 62, 66) ἐκ τῶν τριγ. ἀριθμῶν ἐκείνων. Καὶ ὑπάρχουσι
πράγματι τοιοῦτοι πίνακες· οὕτω ἐν τῇ τοῦ J. Dupuis ἐκδόσει λο-
γαριθμικῶν πινάκων καὶ ἐν σελ. 149—151 περιέχεται ὁ XXIV πί-
ναξ, ἐν ᾧ ἀναγράφονται μὲ τρία δεκαδικὰ ψηφία τὸ ἡμίτονον, συ-
νημίτονον, ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη τῶν ἀπὸ 0° μέχρι 90°
καὶ ἀνά $30'$ προχωρούντων τόξων.

Ἐπειδὴ ὁμως οἱ ὑπολογισμοὶ γίνονται συνήθως διὰ τῶν λογαρίθ-
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

μων προτιμῶνται τοῦ ἀνωτέρω πίνακος ἄλλοι περιέχοντες ἀμέσως τοὺς λογαριθμοὺς τῶν προειρημένων τριγ. ἀριθμῶν. Καὶ ἄλλοι μὲν τῶν τοιούτων πινάκων περιέχουσι τοὺς λογαριθμοὺς τῶν προειρημένων 4 τριγ. ἀριθμῶν μὲ ὃ δεκαδικὰ ψηφία, ἄλλοι δὲ μὲ 7 τοιαύτων. Ἐν τοῖς ἀκολουθοῦσι θέλομεν περιγράψει συντόμως τοὺς πενταψηφίους, ὡς μᾶλλον εὐχρήστους, πίνακας, ὡς οὗτοι διατάχθησαν ὑπὸ τοῦ J. Dupuis καὶ θέλομεν ἐκθέσει τὸν τρόπον τῆς χρήσεως αὐτῶν (1).

§ 81. — Περιγραφή τῶν λογαριθμικῶν τριγ. πινάκων Dupuis. — Οἱ πίνακες οὗτοι περιέχουσι τοὺς λογαριθμοὺς τοῦ ἡμίτονου, ἐφαπτομένης, συνεφαπτομένης καὶ συνημιτόνου τῶν ἀπὸ 0^ο μέχρις 90^ο τόξων προχωρούντων κατὰ 1'. Ὁ ἀριθμὸς τῶν μοιρών εἶναι ἀναγεγραμμένος ἐκτὸς τοῦ πλαισίου καὶ διὰ μὲν τὰ μικρότερα 45^ο τόξα εἰς τὸ ἄνω μέρος ἐκάστης σελίδος, διὰ δὲ τὰ λοιπὰ εἰς τὸ κάτω. Οἱ δὲ ἀριθμοὶ τῶν πρώτων λεπτῶν διὰ μὲν τὰ μικρότερα 45^ο τόξα ἀναγράφονται εἰς τὴν α' ἐξ ἀριστερῶν στήλην, ἥτις ἔχει ὡς ἐπικεφαλίδα ὀξὺν τόνον ('), διὰ δὲ τὰ λοιπὰ εἰς τὴν α' ἐκ δεξιῶν στήλην βαίνουσι δὲ τὰ πρώτα λεπτά τῆς μὲν α' ἐξ ἀριστερῶν στήλης ἀξανάμενα ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω, ἀντιστρόφως δὲ τὰ τῆς ἄλλης. Ἐνεκα τῆς τοιαύτης διατάξεως οἱ ἀριθμοὶ τῶν πρώτων λεπτῶν δύο τόξων συμπληρωματικῶν κεῖνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὀριζοντίου γραμμῆς.

Παντὸς τόξου μικροτέρου τῶν 45^ο καὶ μὴ περιέχοντος δεύτερα λεπτά οἱ λογάριθμοι ἐκάστου τῶν προειρημένων τριγ. ἀριθμῶν ἀναγράφονται εἰς τὴν ὀριζοντίαν γραμμῆν, εἰς τὴν ὁποίαν περιέχεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πρώτων λεπτῶν αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν στήλην, ἥτις φέρει ἄνω τὴν συγκεκομμένην λέξιν *sin* (*sinus* = ἡμίτονος) διὰ τὸ ἡμίτονον, *tang* (*tangente* = ἐφαπτομένη) διὰ τὴν ἐφαπτομένην, *cotg* (*cotangente* = συνεφαπτομένη) διὰ τὴν συνεφαπτομένην καὶ *cos* (*cosinus* = συνημίτονος) διὰ τὸ συνημίτονον. Παντὸς δὲ τόξου περιεχομένου μεταξὺ 45^ο καὶ 90^ο καὶ μὴ περιέχοντος δεύτερα λεπτά οἱ λογάριθμοι

(1) Ὡς γνωστὸν, οἱ λογάριθμοι τῶν πλείστων ἀριθμῶν (πλὴν τῶν συμμέτρων δυνάμεων τοῦ 10) ἔχουσιν ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία· εἰς τοὺς πίνακας ὅθεν ἀναγράφονται μὲ προσέγγισιν ὡς ἀκλουθῶς. Τὰ τέσσαρα πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία ἀναγράφονται ὡς ἔχουσι, τὸ δὲ ὄσον ἀναγράφεται ἀμεταβλήτως ἢ ἀξάνεται κατὰ 1, καθ' ὅσον τὸ ἕκτον δὲν ὑπερβαίνει τὸν 5. Οὕτω δὲ τὸ λάθος δὲν εἶναι μείζον ἡμίσεος ἑκατοντάκις χιλιοστοῦ.

των προειρημένων 4 τριγ. αριθμῶν εὐρίσκονται ὁμοίως εἰς τὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν τῶν πρώτων λεπτῶν αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν στήλην, ἥτις φέρει κάτω τὸ ὄνομα τοῦ τριγ. ἀριθμοῦ:

Σημειωτέον δὲ ὅτι, ὅταν πλείονες λογάριθμοι ἔχωσι κοινὰ τὰ δύο πρώτα ψηφία αὐτῶν, ταῦτα γράφονται μόνον εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος ἐκάστης στήλης, νοσῶνται δὲ καὶ διὰ τοὺς ἐνδιαμέσους λογαριθμοὺς, ἐκάστου τῶν ὁποίων εἶναι εἰς τὴν οἰκείαν θέσιν τὰ 4 τελευταῖα ψηφία ἀναγεγραμμένα. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ μεταξὺ μεταβληθῇ τὸ ἕτερον τῶν δύο πρώτων ψηφίων, ἀναγράφεται πλήρης ὁ λογάριθμος, ὡς καὶ ὁ προηγούμενος αὐτοῦ.

Μετὰ τὰς στήλας τῶν λογαριθμῶν τῶν ἡμιτόνων καὶ συνημιτόνων εὐρίσκονται στήλαι, ὧν ἑκατέρη ἐπιγράφεται διὰ τοῦ D (ἀρχικὸν γράμμα τῆς λέξεως Difference=διαφορὰ), ἐν αἷς ἀναγράφονται εἰς μονάδας πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως (μ. ε'. δ. τ.) αἱ διαφοραὶ τῶν λογαριθμῶν τῶν εἰρημένων τριγ. ἀριθμῶν δύο διαδοχικῶς ἀναγεγραμμένων τόξων. Ὁμοία στήλη ὑπάρχει καὶ μεταξὺ τῶν στήλων Tang καὶ Cotg περιέχουσα τὰς κοινὰς διαφορὰς (1) τῶν λογαριθμῶν τῶν ἐφαπτομένων καὶ συνεφαπτομένων δύο διαδοχικῶς ἀναγεγραμμένων τόξων.

ΣΗΜ. Ἡ δεξιὰ τῶν συνημιτόνων στήλη διαφορῶν δὲν ὑπάρχει διὰ τὰ μικρότερα 18° καὶ μεγαλύτερα 71°, καθ' ὅσον αἱ διαφοραὶ αὗται οὔσαι μικρότερα τοῦ 5 εὐρίσκονται ταχύτατα δι' ἀπλῆς τῶν λογαριθμῶν παρατηρήσεως.

Εἰς τὰς σελίδας τῶν ἀπὸ 6^ο ἕως 83^ο τόξων ὑπάρχουσιν ἐκτὸς τοῦ πλαισίου πινακίδια, ὧν ἕκαστον φέρει ὡς ἐπικεφαλίδα 42 μίαν τῶν ἐν τῇ αὐτῇ σελίδι (μεγαλυτέρων τοῦ 12) διαφορῶν καὶ διαιρεῖται εἰς δύο στήλας. Τοῦτων ἡ α' περιέχει τοὺς μονοψηφίους ἀριθμοὺς, οἵτινες δηλοῦσι δευτέρα λεπτά, ἡ δὲ ἄλλη τὰς ἀντιστοιχοῦς τῶν λογαριθμῶν τῶν τριγ. ἀριθμῶν μεταβολὰς. Οὕτω τὸ ἥδε παρατιθέμενον πινακίδιον δηλοῖ ὅτι, τῆς διαφορᾶς τῶν λογαριθμῶν τριγ. ἀριθμοῦ δύο διαδοχικῶς ἀναγεγραμμένων τόξων οὔτης 42 μ. ε'. δ. τ. εἰς αὐξήσιν τοῦ τόξου κατὰ 1'', 9'' ἀντιστοιχεῖ αὐξήσις ἢ ἐλάττωσις τοῦ λογαριθμοῦ τοῦ αὐτοῦ τριγ. ἀριθμοῦ κατὰ 0,7 1,4....., 6, 3 μ. ε'. δ. τ.

(1) Ἐπειδὴ $\epsilon\phi\alpha = \frac{1}{\sigma\phi\alpha}$ καὶ $\epsilon\phi\beta = \frac{1}{\sigma\phi\beta}$ ἔπεται ὅτι :

λογέφα = -λογσφα καὶ λογέφβ = -λογσφβ. Ἄρα, λογέφα - λογέφβ = λογσφβ - λογσφα.

§ 82. Χρήσις τῶν λογαριθμικῶν τριγωνομετρικῶν πινάκων. — Τοὺς λογαριθμικοὺς τριγ. πίνακας χρησιμοποιοῦμεν διὰ τὴν λύσιν τῶν ἀκολουθῶν προβλημάτων.

Πρόβλημα Αον — *Εὐρεῖν τὸν λογάριθμον ὀρισμένου τριγων. ἀριθμοῦ δεδομένου τόξου.*

Δύσις. Ἐὰν τὸ δεδομένον τόξον δὲν ἔχη δεύτερα λεπτά, ὁ ζητούμενος λογάριθμος εἶναι ἀναγεγραμμένος εἰς τὴν σελίδα τῶν μοιρῶν τοῦ τόξου καὶ εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς ὀριζοντίου γραμμῆς τῶν πρώτων λεπτῶν καὶ τῆς ὀμωνύμου πρὸς τὸν τριγ. ἀριθμὸν στήλης. Οὕτως εὐρίσκομεν ὅτι $\log \eta \mu (15^{\circ} 42') = \bar{1}, 43233$, $\log \epsilon \phi (28^{\circ} 49') = \bar{1}, 74047$, $\log \sigma \upsilon \nu (61^{\circ} 20') = \bar{1}, 68098$, $\log \sigma \phi (57^{\circ} 45') = \bar{1}, 80000$ κτλ.

Ἐστω ἤδη ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν λογάριθμ(24° 10' 45''), ὅστις δὲν εἶναι ἀναγεγραμμένος εἰς τοὺς πίνακας. Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν ὅτι: $24^{\circ} 10' < 24^{\circ} 10' 45'' < 24^{\circ} 11'$.

Ἐπειδὴ δὲ τοῦ τόξου ἀξάνοντος ἀπὸ 0° μέχρις 90° καὶ τὸ ἡμίτονον αὐτοῦ ἀξάνει ἔπεται ὅτι

$$\eta \mu (24^{\circ} 10') < \eta \mu (24^{\circ} 10' 45'') < \eta \mu (24^{\circ} 11'), \text{ ὅθεν}$$

$$\log \eta \mu (24^{\circ} 10') < \log \eta \mu (24^{\circ} 10' 45'') < \log \eta \mu (24^{\circ} 11'),$$

ἤτοι ὁ ζητούμενος λογάριθμος περιέχεται μεταξὺ τῶν λογαριθμῶν τοῦ ἡμιτόνου τῶν τόξων (24° 10') καὶ (24° 11''), οὔτινες λογάριθμοι διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ 28 μ. ε'. δ. τ.

Ἄλλ' ἀπλοῦν βλέμμα ἐπὶ τῶν ἀνά χειρας λογαριθμικῶν πινάκων πείθει ἡμᾶς ὅτι εἰς ἀξῆσιν τοῦ τόξου κατὰ 1' ἀντιστοιχεῖ ἡ αὐτὴ ἀξῆσις τοῦ λογαριθμοῦ τοῦ ἡμιτόνου αὐτοῦ, ἀρκεῖ τὸ τόξον νὰ μὴ διαφέρει πολὺ τοῦ (24° 10'). δυνάμεθα ὅθεν νὰ θεωρήσωμεν τὴν ἀξῆσιν τῶν λογαριθμῶν ὡς ἔγγιστα ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξῆσιν τῶν τόξων καὶ κατ' ἀκολουθίαν δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν κατὰ πόσον πρέπει νὰ ἀξῆθῃ ὁ $\log \eta \mu (24^{\circ} 10') = \bar{1}, 61214$, διὰ νὰ προκύψῃ ὁ ζητούμενος λογάριθμος.

Ὁ ὑπολογισμὸς γίνεται οὕτω :

Ἀφ' οὗ εἰς ἀξῆσιν τοῦ τόξου κατὰ

60" ἀντιστοιχεῖ ἀξῆσις τοῦ \log . κατὰ 28 μ. ε'. δ. τ.

εἰς 45" » » » » » » χ » »

ἄρα $\chi = 28 \cdot \frac{45}{60} = 21$ μ. ε'. δ. τ. Ὡστε

$\log \eta \mu (24^{\circ} 10' 45'') = \bar{1}, 61214 + 0,00021 = \bar{1}, 61235$.

Τὴν προηγουμένως ὑπολογισθεῖσαν ἀξῆσιν 21 μ. ε'. δ. τ.

δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν ταχύτερον τῇ βοήθειᾳ τοῦ πινακιδίου, ὅπερ φέρει ἐπικεφαλίδα τὴν διαφορὰν 28, ὡς ἐξῆς.

Ἐπειδὴ, ὡς ἐκ τοῦ πινακιδίου φαίνεται, εἰς αὐξήσιν τοῦ τόξου κατὰ 4'' ἀντιστοιχεῖ αὐξήσις τοῦ λογαριθμοῦ κατὰ 1,87 μ. ε'. δ. τ., ἔπεται ὅτι εἰς αὐξήσιν τοῦ τόξου κατὰ 40'' θὰ ἀντιστοιχῇ αὐξήσις τοῦ λογ. κατὰ $1,87 \times 10 = 18,7$ μ. ε'. δ. τ. εἰς αὐξήσιν δὲ τοῦ τόξου κατὰ 5'' ἀντιστοιχεῖ ἑτέρα αὐξήσις τοῦ λογ. κατὰ 2,33. Ὡστε εἰς αὐξήσιν τοῦ τόξου κατὰ 45'' ἀντιστοιχεῖ ὀλική αὐξήσις τοῦ λογ. κατὰ $18,7 + 2,33 = 21,03$ ἢ 21 περίπου.

Πᾶσα δὲ πράξις διατάσσεται συνήθως ὡδε :

$$\begin{array}{r} \text{λογήμ}(24^{\circ} 10') \\ \text{εἰς αὐξ. τόξ. κατὰ } 40'' \text{ ἀντιστ. αὐξ. λογ. κατὰ } 18,7 \\ \text{» } \text{» } \text{» } \text{» } 5'' \text{ » } \text{» } \text{» } \text{» } 2,33 \\ \text{» } \text{» } \text{» } \text{» } 45'' \text{ » } \text{» } \text{» } \text{» } 21,03 \text{ ἢ } 21 \end{array} = \bar{1},61214$$

Ὡστε $\text{λογήμ}(24^{\circ} 10' 45'')$ $= \bar{1},61235$
 Ὁμοίως ἐργαζόμεθα καὶ διὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ λογαριθμοῦ τῆς ἐφαπτομένης δεδομένου τόξου.

Ἐστω ἔτι ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν $\text{λογσφ}(36^{\circ} 54' 38'')$.
 Ἐπειδὴ $36^{\circ} 54' < 36^{\circ} 54' 38'' < 36^{\circ} 55'$, ἔπεται (§ 48) ὅτι $\text{σφ}(36^{\circ} 54') > \text{σφ}(36^{\circ} 54' 38'') > \text{σφ}(36^{\circ} 55')$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν $\text{λογ σφ}(36^{\circ} 54') > \text{λογ σφ}(36^{\circ} 54' 38'') > \text{λογ σφ}(36^{\circ} 55')$, ἦτοι ὁ ζητούμενος λογάριθμος περιέχεται μεταξὺ δύο λογαριθμῶν διαφερόντων κατὰ 26 μ. ε'. δ. τ. Ἦδη τῇ βοήθειᾳ καὶ τοῦ πινακιδίου 26 ἐργαζόμεθα ὡς ἀκολούθως.

$$\begin{array}{r} \text{λογ σφ}(36^{\circ} 54') \\ \text{εἰς αὐξ. τόξ. κατὰ } 30'' \text{ ἀντιστ. μείωσις λογ. κατὰ } 13 \\ \text{» } \text{» } \text{» } \text{» } 8'' \text{ » } \text{» } \text{» } \text{» } 3,47 \\ \text{» } \text{» } \text{» } \text{» } 38'' \text{ » } \text{» } \text{» } \text{» } 16,47 \text{ ἢ } \end{array} = 0,12446$$

Ὡστε $\text{λογ σφ}[36^{\circ} 54' 38'')$ $= 0,12430$
 Ὁμοίως εὐρίσκεται καὶ ὁ λογ τοῦ συνημιτόνου τόξου, ὅπερ περιέχει καὶ δευτέρα λεπτά.

- Ἀσκήσεις.** 239) Εὕρεῖν τὸν $\text{λογ ἡμ}(48^{\circ} 12' 50'')$.
 240) Εὕρεῖν τὸν $\text{λογ συν}(62^{\circ} 6' 37'')$.
 241) Εὕρεῖν τὸν $\text{λογ ἔφ}(34^{\circ} 17' 46'')$.
 242) Εὕρεῖν τὸν $\text{λογ σφ}(24^{\circ} 14' 39'')$.
 243) Εὕρεῖν τὸν $\text{λογ ἡμ}(120^{\circ} 35')$.

244) Εύρεϊν τὸν λογ ἐφ(235° 40' 23'').

245) Εύρεϊν τὸν λογ συν(320° 12' 20'').

246) Εύρεϊν τὸν λογάριθμον τοῦ ἡμ $\frac{7\pi}{11}$, ἐφ $\frac{3\pi}{14}$, σφ $\frac{5\pi}{7}$,

συν $\frac{\pi}{17}$.

§ 83. Πρόβλημα Βον.— *Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐλάχιστον θετικὸν τόξον, οὗ ὠρισμένος τριγων. ἀριθμὸς ἔχει δεδομένον λογάριθμον.*

Α'. Περίπτωσης.— Ὁ δοθεὶς λογάριθμος εἶναι ἀναγεγραμμένος εἰς τοὺς πίνακας. — Ἐστω δὲ θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὸ ἐλάχιστον θετικὸν τόξον χ , δι' ὃ εἶναι λογ ἡμ χ = $\bar{1},46011$.

Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν ὅτι λογῆμ $45^\circ = \bar{1},84949$, ἐπειδὴ δὲ ὁ δοθεὶς λογάριθμος τοῦ ἡμ χ εἶναι μικρότερος τοῦ $\bar{1},84949$, ἔπεται ὅτι ἡμ $\chi < \eta\mu 45^\circ$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν $\chi < 45^\circ$. Θὰ ἀναζητήσωμεν λοιπὸν τὸν δοθέντα λογάριθμον εἰς τὰς στήλας, αἵτινες ἄνω φέρουσι τὴν λέξιν $\sin = \eta\mu\acute{\iota}\tau\omicron\nu\omicron\nu$. Καὶ κατὰ πρῶτον ἀνευρίσκομεν τὰ δύο πρῶτα ψηφία $\bar{1},4$ αὐτοῦ, εἶτα δὲ ἀναζητοῦμεν καὶ τὰ ἄλλα ἔχοντες ὑπ' ὄψιν ὅτι οἱ λογάριθμοι τῶν ἡμιτόνων ἀυξάνουσι, καθ' ἣν φοράν καὶ οἱ ἀριθμοὶ τῶν πρώτων λεπτῶν τῶν τόξων. Οὕτως ἀνευρίσκομεν τὸν δοθέντα λογάριθμον εἰς τὴν σελίδα τῶν 16° , τὴν στήλην τῶν ἡμιτόνων καὶ τὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν, ἣτις ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰ $46'$ ὥστε $\chi = 16^\circ 46'$.

Ἄν ζητῆται τὸ ἐλ. θετικὸν τόξον χ , δι' ὃ εἶναι λογῆμ $\chi = \bar{1},96267$, ἐπειδὴ $\bar{1},96267 > \bar{1},84949$ ἔπεται ὅτι $\chi > 45^\circ$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν θὰ ἀναζητήσωμεν τὸν δοθέντα λογάριθμον εἰς τὰς στήλας, αἵτινες κάτω φέρουσιν τὴν λέξιν \sin . Οὕτως εὑρίσκομεν ὅτι $\chi = 66^\circ 35'$.

Ἐστω ἤδη ὅτι λογ συν $\omega = \bar{1},96893$ καὶ ζητεῖται ἡ ἐλάχιστη θετικὴ τιμὴ τοῦ τόξου ω . Ἐπειδὴ $\bar{1},96893 > \bar{1},84949$, ἔπεται ὅτι συν $\omega > \text{συν } 45^\circ$ καὶ ἐπομένως $\omega < 45^\circ$, διότι τοῦ τόξου ἀυξάνοντος ἀπὸ 0° ἕως 90° τὸ συνημίτονον αὐτοῦ ἐλαττοῦται (§ 37). Θὰ ἀναζητήσωμεν λοιπὸν αὐτὸν εἰς τὰς στήλας, αἵτινες φέρουσιν ἄνω τὴν λέξιν $\cos = \text{συν}\eta\mu\acute{\iota}\tau\omicron\nu\omicron\nu$. Οὕτως εὑρίσκομεν ὅτι $\omega = 21^\circ 25'$.

Ἄν δοθῇ λογ. συνημιτόνου μικρότερος τοῦ $\bar{1},89494$, θὰ ἀναζητήσωμεν αὐτὸν εἰς τὰς στήλας, αἵτινες κάτω φέρουσιν τὴν λέξιν \cos . Οὕτως, ἂν λογσυν $\psi = \bar{1},76835$, εὑρίσκομεν ὅτι $\psi = 54^\circ 5'$.

Ἐστω ἔτι ὅτι λογἐφ $\tau = \bar{1},79776$ καὶ ζητεῖται ἡ ἐλάχιστη θετικὴ τ

τιμή τοῦ τόξου τ. Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν ὅτι ἐπειδὴ ἐφ $45^\circ = \sigma\phi 45^\circ = 1$, θὰ εἶναι καὶ $\log \sigma\phi 45^\circ = \log \sigma\phi 45^\circ = 0$. Ἐπειδὴ δὲ τοῦ τόξου ἀυξάνοντος ἀπὸ 0° μέχρις 90° ἢ ἐφαπτομένη, ἄρα καὶ ὁ λογάριθμος αὐτῆς ἀυξάνεται, ἢ δὲ συνεφαπτομένη, ὡς καὶ ὁ λογάριθμος αὐτῆς, ἐλαττοῦται, ἔπεται ὅτι διὰ τὰ μεταξὺ 0° καὶ 45° τόξα ὁ μὲν λογάριθμος τῆς ἐφαπτομένης εἶναι ἀρνητικός, ὁ δὲ τῆς συνεφαπτομένης εἶναι θετικός· διὰ δὲ τὰ μεταξὺ 45° καὶ 90° τόξα ὁ λογάριθμος τῆς ἐφαπτομένης εἶναι θετικός καὶ ὁ τῆς συνεφαπτομένης ἀρνητικός.

Κατὰ ταῦτα, τοῦ δοθέντος λογάφτ ὄντος ἀρνητικοῦ, τὸ τόξον τ εἶναι μικρότερον 45° καὶ ἐπομένως δέον νὰ ἀναζητήσωμεν αὐτὸν εἰς τὰς στήλας τῶν ἐφαπτομένων ἄνω. Οὕτως εὐρίσκομεν ὅτι $\tau = 32^\circ 7'$.

Ἐστω τέλος ὅτι $\log \sigma\phi \chi = \Gamma, 87317$ καὶ ζητεῖται ἡ ἐλ. θετικὴ τιμὴ τοῦ τόξου χ. Κατὰ τὰ προλεχθέντα τοῦ $\log \sigma\phi \chi$ ὄντος ἀρνητικοῦ, τὸ τόξον χ εἶναι μεγαλύτερον τῶν 45° · δέον λοιπὸν νὰ ἀναζητήσωμεν αὐτὸν εἰς τὰς στήλας, αἵτινες φέρουσι κάτω τὴν λέξιν cotg. Πρὸς ταχυτέραν δὲ εὑρεσιν αὐτοῦ πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι οἱ λογάριθμοι τῶν συνεφαπτομένων ἀυξάνουσι κατὰ φορὰν ἀντίθετον ἐκεῖνης, καθ' ἣν ἀυξάνουσι τὰ πρῶτα λεπτὰ τῶν τόξων. Οὕτως εὐρίσκομεν ὅτι τὸ ζητούμενον τόξον $\chi = 53^\circ 15'$.

Β'. Περίπτωσις. — Ὁ δοθεὶς λογάριθμος δὲν εἶναι ἀναγεγραμμένος εἰς τοὺς πίνακας. — Ἐστω ὅτι $\log \eta \mu \chi = \Gamma, 77127$ καὶ ζητεῖται ἡ ἐλ. θετικὴ τιμὴ τοῦ τόξου χ. Ἀναζητοῦντες τὸν δοθέντα λογάριθμον εἰς τοὺς πίνακας πειθόμεθα ὅτι:

$$\Gamma, 77112 < \Gamma, 77127 < \Gamma, 77130 \quad (\alpha)$$

τῶν ἄκρων λογαρίθμων ὄντων ἀναγεγραμμένων εἰς τοὺς πίνακας.

Ἐπειδὴ δὲ $\Gamma, 77112 = \log \eta \mu (36^\circ 11')$ καὶ

$$\Gamma, 77130 = \log \eta \mu (36^\circ 12'), \text{ ἔπεται ὅτι: } 36^\circ 11' < \chi < 36^\circ 12'.$$

Ἦδη παρατηροῦμεν ὅτι οἱ ἄκροι λογάριθμοι τῶν ἀνισότητων (α) διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ 18 μ. ε'. δ. τ, ὁ δὲ δοθεὶς εἶναι μείζων τοῦ $\Gamma, 77112$ κατὰ 15 τοιαύτας μονάδας. Ἐπειδὴ δὲ

τοῦ λογ. ἀυξάν. κατὰ 18, τὸ τόξον ἀυξάνει κατὰ $60''$ ἔπεται

$$\text{ὅτι } \gg \gg \gg \gg 15 \gg \gg \gg \gg 60'' \times \frac{15}{18} = 50''.$$

καὶ κατ' ἀκολουθίαν $\chi = 36^\circ 11' 50''$. Ἡ πρᾶξις διατάσσεται οὕτω:

Όταν ο λογ. είναι $\bar{1},77112$, τὸ τόξον εἶναι $36^{\circ} 11'$
 εἰς αὐξ. τοῦ λογ. κατὰ $15 \gg \gg$ αὐξ. κατὰ $50''$
 ἄρα, ὅταν ο λογ εἶναι $\bar{1},77127$, τὸ τόξον εἶναι $36^{\circ} 11' 50''$

ΣΗΜ. Ἐκ τοῦ πινακιδίου 18 βλέπομεν ἀμέσως ὅτι εἰς αὐξῆσιν τοῦ λογ κατὰ $1,5 \mu. \epsilon'. \delta. \tau.$ ἀντιστοιχεῖ αὐξῆσις τοῦ τόξου κατὰ $5'$, ἄρα εἰς αὐξῆσιν τοῦ λογ κατὰ $1,5 \times 10 = 15 \mu. \epsilon'. \delta. \tau.$ θὰ ἀντιστοιχῇ αὐξῆσις τοῦ τόξου κατὰ $5'' \times 10 = 50''$. Ὁ κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ὑπολογισμὸς τῆς ἀκριβοῦς, ὅσον ἔνεστι, μεταβολῆς τῶν τόξων δὲν εἶναι πάντοτε εὐχερῆς.

Ὁμοίως ἐργαζόμεθα καὶ ὅταν εἶναι δεδομένος ὁ λογάριθμος τῆς ἐφαπτομένης.

Ἐστω ἤδη ὅτι ὁ λογ συνψ $= \bar{1},85842$ καὶ ζητεῖται ἡ ἐλ. θετικὴ τιμὴ τοῦ ψ. Ἀναζητοῦντες τὸν λογάριθμον τοῦτον εἰς τοὺς πίνακας βλέπομεν ὅτι οὗτος περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν $\bar{1},85851$ καὶ $\bar{1},85839$, εἰς οὓς ἀντιστοιχοῦσι τὰ τόξα $43^{\circ} 47'$ καὶ $43^{\circ} 48'$. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι

$$\bar{1},85851 > \bar{1},85842 > \bar{1},85838, \text{ ἔπεται ὅτι } 43^{\circ} 47' < \psi < 43^{\circ} 48'.$$

Ἦδη παρατηροῦμεν ὅτι οἱ μὲν ἄκριοι λογάριθμοι διαφέρουσι κατὰ $12 \mu. \epsilon'. \delta. \tau.$, ὁ δὲ δοθεὶς εἶναι μικρότερος τοῦ α' κατὰ 9 τοιαύτας μονάδας.

Ἐπειδὴ δὲ εἰς ἐλάτ. λογ κατὰ $12 \mu. \epsilon'. \delta. \tau.$ ἀντ. αὐξ τοῦ τόξ. κατὰ $60''$, ἔπεται ὅτι $\gg \gg \gg \gg 9 \gg \gg \gg \gg 60'' \times \frac{9}{12} = 45''$

Ὡστε $\psi = 43^{\circ} 47' 45''$.

Τὴν πράξιν διατάσσομεν συνήθως οὕτω :

Όταν ο λογ. εἶναι $\bar{1},85851$ τὸ τόξον εἶναι $43^{\circ} 47'$
 εἰς μείωσιν τοῦ λογ. κατὰ 9 ἀντισ. αὐξ. τόξ. κατὰ $45''$
 ἄρα εἰς λογ $\bar{1},85842$ » τόξον $43^{\circ} 47' 45''$

Ὁμοίως ἐργαζόμεθα καὶ ὅταν δίδηται ὁ λογάριθμος τῆς συνεφαπτομένης τόξου.

ΣΗΜ. Ἐστῶσαν α καὶ β δύο τόξα θετικὰ καὶ τοιαῦτα ὥστε $\alpha < \beta < 9^{\circ}$:

Ἐκ τῶν εὐκόλως ἀποδεικνυομένων ἰσοτήτων.

λογ ἔφα = λογ ἡμα — λογ συνα καὶ λογ ἔφβ = λογ ἡμβ — λογ συνβ ἔπεται ὅτι
 λογ ἔφβ — λογ ἔφα = (λογ ἡμβ — λογ ἡμα) + (λογ συνα — λογ συνβ)

Ἐκ τῆς ἰσότητος ταύτης κατανοοῦμεν εὐκόλως ὅτι ἡ διαφορὰ Δ μεταξὺ τῶν λογ. τῶν ἐφαπτομένων δύο τόξων διαφερόντων κατὰ $1'$ ὑπερβαίνει ἐκατέραν τῶν διαφορῶν δ καὶ δ' τῶν λογ. τοῦ ἡμιτόνου ἢ συνημιτόνου τῶν αὐτῶν τόξων. Ἦδη δυνάμεθα εὐκόλως νὰ ἐννοησῶμεν ὅτι τόξον τι

προσδιορίζεται ακριβέστερον ἐκ τοῦ λογ. τῆς ἐφαπτομένης αὐτοῦ ἢ ἐκ τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμίτονου ἢ συνημίτονου αὐτοῦ. Τῶ ὄντι ἐπειδὴ λάθος Δ μ. ε'. δ, τ συμβάν εἰς τὸν λογ. τῆς ἐφαπτομένης προκαλεῖ εἰς τὸ τόξον λάθος $60''$, ἔπεται ὅτι λάθος ν μ. ε. δ. τ. θέλει προκαλέσει εἰς τὸ τόξον λάθος $\frac{60'' \times \nu}{\Delta}$, ἐν ϕ τοιοῦτον λάθος εἰς τὸν λογ. τοῦ ἡμίτονου ἢ συνημίτονου, προκαλεῖ εἰς τὸ τόξον λάθος $\frac{60'' \times \nu}{\delta}$ ἢ $\frac{60'' \times \nu}{\delta'}$, ὧν ἐκάτερον εἶναι μεγαλύτερον τοῦ $\frac{60'' \times \nu}{\Delta}$, διότι $\Delta > \delta$ καὶ $\Delta > \delta'$.

§ 84. Πρόβλημα Γον. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐλάχιστον θετικὸν τόξον, οὗ ἐδόθη τριγωνομετρικὸς ἀριθμὸς.

Ἐνίστα ἀντὶ τοῦ λογ. τριγ. ἀριθμοῦ δίδεται αὐτὸς ὁ τριγ. ἀριθμὸς καὶ ζητεῖται τὸ ἀντίστοιχον ἐλ θετικὸν τόξον. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ εὐρίσκωμεν τὸν λογάριθμον τοῦ ἀριθμοῦ τούτου (ἐκ τῶν λογ. πινάκων τῶν ἀριθμῶν) καὶ εἶτα ἐργαζόμεθα, ὡς προηγούμενως ἐξετέθη. Δυνατὸν ὅμως ὁ δοθεὶς τριγ. ἀριθμὸς νὰ εἶναι ἀρνητικὸς, ὅτε δὲν ἔχει λογάριθμον· τότε ἐργαζόμεθα ὡς εἰς τὰ ἀκόλουθα παραδείγματα φαίνεται.

Παράδ. α'.—Εὐρεῖν τὸ ἐλ. θετικὸν τόξον χ , ὅπερ ἔχει ἐφαπτομένην—3. Τὸ παραπληρωματικὸν τοῦ χ τόξον, ἦτοι τὸ $(180^\circ - \chi)$ ἔχει (§ 61) ἐφαπτομένην 3· ἄρα λογ ἐφ $(180^\circ - \chi) = \text{λογ} 3 = 0,47712$ καὶ ἐπομένως $180^\circ - \chi = 71^\circ 33' 54''$, ὅθεν $\chi = 108^\circ 26' 6''$. Ὁμοίως ἐργαζόμεθα καὶ ἔταν ὁ δεδομένος ἀρνητικὸς τριγ. ἀριθμὸς εἶναι συνημίτονον ἢ συνεφαπτομένην.

Παράδ. α'. Εὐρεῖν τὸ ἐλ. θετικὸν χ , ὅπερ ἔχει ἡμίτονον— $\frac{3}{4}$. Ἐπειδὴ τὸ ἡμ χ εἶναι ἀρνητικόν, τὸ χ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 180° · ἐὰν δὲ τεθῇ $\chi - 180^\circ = \psi$, θὰ εἶναι $0^\circ < \psi < 180^\circ$ καὶ (§ 63) ἡμ $\psi = -\eta\mu\chi = \frac{3}{4}$, ἄρα λογ ἡμ $\psi = \text{λογ} 3 - \text{λογ} 4 = \bar{1},87506$, ὅθεν $\psi = 48^\circ 35' 25''$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν $\chi = 180^\circ + \psi = 228^\circ 35' 25''$.

Δοκίσεις. 247) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐλ. θετικὸν τόξον, ὅπερ ἔχει ἡμίτονον $\frac{2}{3}$.

248) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐλ. θετικὸν τόξον, ὅπερ ἔχει ἐφαπτομένην 3.

249) Ὁμοίως τὸ ἔγιν συνεφαπτομένην $\frac{1}{3}$

250) Ὅμοιος τὸ ἔχον ἡμίτονον $-\frac{5}{6}$.

251) Ὅμοιος τὸ ἔχον συνημίτονον $-\frac{6}{10}$.

252) Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἰσότης, ἣτις παρέχει πάντα τὰ τόξα, ὧν ἕκαστον ἔχει ἐφαπτομένην $\frac{2}{3}$

253) Τὸ αὐτὸ διὰ τὰ τόξα, ὧν ἕκαστον ἔχει συνεφαπτομένην $\sqrt[3]{5}$.

254) Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ ἰσότητες, αἵτινες παρέχουσι πάντα τὰ τόξα, ὧν ἕκαστον ἔχει ἡμίτονον $\sqrt{2}$: 2.

255) Τὸ αὐτὸ διὰ τὰ τόξα, ὧν ἕκαστον ἔχει τέμνουσαν $1\frac{2}{3}$

§ 85. Εὗροεις τῶν λογιθμῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τόξων καὶ τινάπκλι, διὰ τόξα μικρότερα 2° καὶ μεγαλύτερα 88°.

Παράδ. 1ον. Νὰ εὐρεθῆ ὁ λογ. ἡμ (10' 40"). — Ἀνατρέχοντες εἰς τὴν σελίδα τῶν 0' καὶ τὴν οἰκείαν στήλην εὐρίσκομεν ὅτι λογ ἡμ 10' = 5,46373· παρατηροῦντες δὲ εἰς τὴν παρακειμένην στήλην διαφορῶν βλέπομεν ὅτι αὗται μεταβάλλονται ἀπὸ τόξου εἰς τόξον μείζον κατὰ 1', ἥτοι δὲν ὑφίσταται πλέον οὔτε κατὰ προσέγγισιν ἀναλογία μεταξὺ τῆς αὐξήσεως τῶν τόξων καὶ τῆς τῶν λογιθμῶν. Τοῦτο συμβαίνει διὰ τοὺς λογαριθμοὺς τοῦ ἡμιτόνων, ἐφαπτομένης καὶ συνεφαπτομένης τόξων μικροτέρων 2° ὡς καὶ διὰ τοὺς λογαριθμοὺς συνημιτόνου, ἐφαπτομένης καὶ συνεφαπτομένης τόξων μεγαλυτέρων 88°.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον δὲν δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας τὴν προηγουμένως ἐφαρμοσθεῖσαν ἀναλογικὴν μέθοδον πρὸς εὐρεσιν τῆς μετοβολῆς τοῦ λογαριθμοῦ, ἣτις ἀντιστοιχεῖ εἰς ὀρισμένην μεταβολὴν τοῦ τόξου καὶ τινάπκλι. Εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας ἡ λύσις τῶν προβλημάτων Α' καὶ Β' (§ 82, 83) γίνεται διὰ τῆς ἀκολουθίου εἰδικῆς μεθόδου.

Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν ὅτι ἐκ τῶν προφανῶν ἰσοτήτων

$$\eta\mu \tau = \tau \cdot \frac{\eta\mu \tau}{\tau} \text{ καὶ } \epsilon\phi \tau = \tau \cdot \frac{\epsilon\phi \tau}{\tau} \text{ προκύπτουσιν εὐκόλως αἱ ἰσο-}$$

τήτες:

$$\log \eta\mu \tau = \log \tau + \log \frac{\eta\mu \tau}{\tau} \quad (\alpha)$$

$$\log \epsilon\phi \tau = \log \tau + \log \frac{\epsilon\phi \tau}{\tau} \quad (\beta)$$

Ἐὰν δὲ τ παριστᾶ δεύτερα λεπτά, ὁ λογι εὐρίσκεται ἐκ τῶν πινάκων τῶν λογαριθμῶν τῶν ἀριθμῶν, ὁ δὲ λογάριθμος τῶν λόγων $\frac{\eta\mu\tau}{\tau}$ καὶ $\frac{\epsilon\phi\tau}{\tau}$ ἀναγράφεται εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς α' σελίδος καὶ εἰς τὸ κάτω ἐκάστης τῶν ἄλλων (καὶ ἐκτὸς πλαισίου) σελίδων τῶν λογ. πινάκων τῶν ἀριθμῶν, διακρινόμενοι ἀπ' ἀλλήλων διὰ τῶν γραμμάτων S καὶ T, ὧν τὸ μὲν S = λογ $\frac{\eta\mu\tau}{\tau}$, τὸ δὲ T = λογ $\frac{\epsilon\phi\tau}{\tau}$.

Ἐφαρμόζοντες ἤδη τὴν προηγουμένην ἰσότητα (α) εἰς τὸ τόξον 10' 40" = 640" εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{λογ } \eta\mu(10' 40'') = \text{λογ } 640 + \bar{6},68557 = 2,80618 + \bar{6},68557 = \bar{3},49175.$$

Παράδ. 2ον. — *Εὐρεῖν τὸν λογ ἐφ (1° 32' 45'').* — Ἐπειδὴ 1° 32' 45" = 5565", ἡ ἰσότης (β) ἐφαρμοζομένη εἰς τὸ τόξον τοῦτο γίνεται :

$$\begin{aligned} \text{λογ } \epsilon\phi(1^{\circ} 32' 45'') &= \text{λογ } 5565 + \bar{6},68568 = 3,74547 + \bar{6},68568 \\ &= \bar{2},43115. \end{aligned}$$

Παράδ. 3ον. — *Εὐρεῖν τὸν λογ σφ (15' 20'').* — Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν ὅτι λογ σφ(15' 20'') = -λογ ἐφ(15' 20''). Ἐπειδὴ δὲ λογ ἐφ(15' 20'') = λογ 920 + $\bar{6},68558 = 2,96379 + \bar{6},68558 = \bar{3},64937$, ἔπεται ὅτι: λογ σφ(15' 20'') = -($\bar{3},64937$) = 3 - 0,64937 = 2,35063.

Παράδ. 4ον. — *Εὐρεῖν τὸν λογ ἐφ (88° 45' 23'').* — Ἐπειδὴ 90° - (88° 45' 23'') = 1° 14' 37'', ἔπεται ὅτι ἐφ(88° 45', 23'') = σφ(1° 14' 49'') = $\frac{1}{\epsilon\phi(1^{\circ} 14' 37'')}$ κατ' ἀκολου-

θίαν

$$\begin{aligned} \text{λόγ } \epsilon\phi(88^{\circ} 45' 23'') &= -\text{λογ } \epsilon\phi(1^{\circ} 14' 37'') = -(\bar{2},33663) = \\ &= 2 - 0,33663 = 1,66337. \end{aligned}$$

Παράδ 5ον. — *Εὐρεῖν τὸν λογ σφ (88° 50' 25'').* Ἐπειδὴ τὸ συμπληρωματικὸν τοῦ δοθέντος τόξου εἶναι 1° 9' 35'', ἔπεται ὅτι

$$\text{λογ } \sigma\phi(88^{\circ} 50' 25'') = \text{λογ } \epsilon\phi(1^{\circ} 9' 35'') = \bar{2},30629.$$

Παράδ 6ον. — *Εὐρεῖν τὸν λογ συν (89° 17' 45'').* Ἐπειδὴ τὸ συμπληρωματικὸν τοῦ δοθέντος τόξου εἶναι 42' 15'', ἔπεται ὅτι :

$$\text{λογ } \sigma\upsilon\upsilon(89^{\circ} 17' 45'') = \text{λογ } \eta\mu(42' 15'') = \bar{2},08954.$$

Ἡ λύσις τοῦ Β' προβλήματος (§ 83) γίνεται ὡς εἰς τὰ ἀπολοῦθα παραδείγματα φαίνεται.

Παράδ. Δον.—Εύρειν τὸ ἐλ. θεικὸν τόξον τ , δι' ὃ εἶ-
ναι $\log \eta \tau = \bar{3},47964$.—'Αναζητούντες τὸν δεδομένον λογά-
ριθμον εἰς τὴν οἰκειαν τῶν λογ.πινάκων στήλην βλέπομεν ὅτι

$$\dots \bar{3},46373 < \bar{3},47964 < \bar{3},50512$$

$$\dots 10' < \tau < 11'$$

$$\eta \cdot 600' < \tau < 660'$$

Ἐνεκα τούτου $S = \bar{6},68557$. Ἡ ἰσότης ἄρα (α) γίνεται

$$\bar{3},47964 = \log \tau + \bar{6},68557, \text{ ὅθεν } \log \tau = 2,79407.$$

Ἐκ δὲ τῶν πινάκων τῶν ἀριθμῶν εὐρίσκόμεν ὅτι

$$\tau = 622, 4'' = 10' 22'', 4.$$

Ὅμοιως ἐργαζόμεθα καὶ ὅταν δίδηται ὁ λογάριθμος τῆς ἑφα-
πτομένης τόξου μικροτέρου τῶν 2'.

Παράδ. Βον.—Εύρειν τὸ ἐλ. θεικὸν τόξον τ , δι' ὃ εἶ-
ναι $\log \sigma \tau = \bar{1},72775$.—Τῇ βοηθειᾷ τῶν πινάκων εὐρίσκομεν

ὅτι, $1, 4' < \tau < 1^{\circ} 5' \eta 3840'' < \tau < 3900''$, ἄρα $T = \bar{6},68562$.

Ἐπειδὴ δὲ $\log \epsilon \varphi \tau = -\log \sigma \tau = -1,72775 = \bar{2},27225$, ἡ
ἰσότης (β) γίνεται $\bar{2},27225 = \log \tau + \bar{6},68562$, ὅθεν $\log \tau = \bar{3},58663$,
ὅθεν $\tau = 3860''$, $36 = 1^{\circ} 4' 20''$, 36.

Παράδ. Γον.—Εύρειν τὸ ἐλ. θεικὸν τόξον τ , δι' ὃ εἶναι
 $\log \sigma \tau = \bar{2},12775$.—Τῇ βοηθειᾷ τῶν πινάκων εὐρίσκομεν ὅτι

$$89^{\circ} 13' < \tau < 89^{\circ} 14', \text{ ἄρα } 47' > 90^{\circ} - \tau > 46' \text{ καὶ } T = \bar{6},68560.$$

Ἐπειδὴ δὲ $\epsilon \varphi(90^{\circ} - \tau) = \sigma \tau$, ἔπεται ὅτι $\log \epsilon \varphi(90^{\circ} - \tau) = \log \sigma \tau =$
 $\bar{2},12775$. Ἡ ἰσότης (β) ὅθεν γίνεται $\bar{2},12775 = \log(90^{\circ} - \tau) + \bar{6},68560$,

ὅθεν
 $\log(90^{\circ} - \tau) = 3,44215$ καὶ $90^{\circ} - \tau = 2767''$, $875 = 46' 7''$, 875 ἄρα
 $\tau = 90^{\circ} - (46' 7'', 876) = 89^{\circ} 13' 52''$, 125.

Παράδ. Δον.—Εύρειν τὸ ἐλ. θεικὸν τ , δι' ὃ εἶναι
 $\log \epsilon \varphi \tau = \bar{2},83949$.—Τῇ βοηθειᾷ τῶν πινάκων εὐρίσκομεν ὅτι

$$89^{\circ} 55' < \tau < 89^{\circ} 56', \text{ ἄρα } 5' > 90^{\circ} - \tau > 4' \eta$$

$$300'' > 90^{\circ} - \tau > 240'' \text{ καὶ ἐπομένως } T = \bar{6},68558.$$

Ἐπειδὴ δὲ $\epsilon \varphi(90^{\circ} - \tau) = \sigma \tau = \frac{1}{\epsilon \varphi \tau}$, ἔπεται ὅτι

$$\log \epsilon \varphi(90^{\circ} - \tau) = -\log \epsilon \varphi \tau = -2,83949 = \bar{3},16051.$$

Ἡ δὲ ἰσότης (β) γίνεται $\eta \delta \eta \bar{3},16051 = \log(90^{\circ} - \tau) + \bar{6},68558$, ὅθεν
 $\log(90^{\circ} - \tau) = 2,47493$ καὶ $90^{\circ} - \tau = 298''$, $5 = 4' 58''$, 5 ἄρα
 $\tau = 89^{\circ} 55' 1''$, 5.

Παράδ. Βον.—Εύρειν τὸ ἐλ. θεικὸν τόξον τ , δι' ὃ εἶ-
ναι $\log \sigma \tau = \bar{2},83949$.—Τῇ βοηθειᾷ τῶν πινάκων εὐρίσκομεν ὅτι

ναι λογ συν $\tau = \bar{2},23267$. — Ως προηγουμένως είπομεν, εύρισκο-
μεν ότι

$$89^{\circ} 1' < \tau < 89^{\circ} 2', \text{ άρα } 59' > 90^{\circ} - \tau > 58' \quad \eta$$

$$3480'' < 90^{\circ} - \tau < 3540'' \text{ και έπομένως } S = \bar{6},68556.$$

Έπειδή δέ λογ ήμ $(90^{\circ} - \tau) = \text{λογ συν } \tau = \bar{2},23267$, ή ισότης (α)
γίνεται $\bar{2},23267 = \text{λογ } (90^{\circ} - \tau) + \bar{6},68556$, θθεν εύρισκομεν κατά
σειράν λογ $(90^{\circ} - \tau) = 3,54711$, $90^{\circ} - \tau = 3524''$, $6 = 58' 44''$, 6
και $\tau = 89^{\circ} 1' 15''$, 4.

256) Νά εύρεθῆ ὁ λογ ήμ $8''$, 8.

257) Νά εύρεθῆ ὁ λογ συν $(88^{\circ} 40' 25'')$.

258) Νά εύρεθῆ ὁ λογ έφ $(1^{\circ} 5' 32'')$.

259) Νά εύρεθῆ ὁ λογ έφ $(89^{\circ} 3' 40'')$;

260) Νά εύρεθῆ ὁ λογ σφ $(15' 20'')$.

261) Νά εύρεθῆ ὁ λογ σφ $(88^{\circ} 53' 56'')$.

262) Νά εύρεθῆ τὸ έλ. θετικὸν τόξον τ , δι' ὃ εἶναι
λογ ήμ $\tau = \bar{3},72960$.

263) Νά εύρεθῆ τὸ έλ. θετικὸν τόξον χ , δι' ὃ εἶναι
λογ συν $\chi = \bar{2},16833$.

264) Νά εύρεθῆ τὸ έλ. θετικὸν τόξον χ , δι' ὃ εἶναι
λογ έφ $\chi = \bar{2},45777$.

265) Νά εύρεθῆ τὸ έλ. θετικὸν τόξον χ , δι' ὃ εἶναι
λογ έφ $\chi = 1,47613$.

266) Νά εύρεθῆ τὸ έλ. θετικὸν τόξον χ , δι' ὃ εἶναι
λογ σφ $\chi = \bar{1},75147$.

267) Νά εύρεθῆ τὸ έλ. θετικὸν τόξον χ , δι' ὃ εἶναι
λογ σφ $\chi = \bar{3},92858$.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Σ Τ'

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

§ 36. Μετασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων
ήμ $A \pm$ ήμ B εἰς γινόμενα. — Έκ τῶν γνωστῶν ισότητων.

$$\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha$$

$$\eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha$$

διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη εύρισκομεν τήν ισότητα

$$\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta) = 2 \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \quad (1)$$

Ἐάν δὲ ἀπὸ τῶν μελῶν τῆς α' τῶν προειρημένων ἰσοτήτων ἀφαιρέσωμεν τὰ ἀντίστοιχα μέλη τῆς β', εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα

$$\eta\mu(\alpha+\beta) - \eta\mu(\alpha-\beta) = 2\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha \quad (2)$$

Ἐάν δὲ τεθῆ $\alpha+\beta=A$ καὶ $\alpha-\beta=B$, εὐρίσκομεν εὐκόλως ὅτι $\alpha = \frac{A+B}{2}$ καὶ $\beta = \frac{A-B}{2}$, αἱ δὲ ἰσοότητες (1) καὶ (2) γίνονται :

$$\eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right) \quad (55)$$

$$\eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

§ 87. Μετασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων $\sigma\upsilon\nu A \pm \sigma\upsilon\nu B$ εἰς γινόμενα. — Ἐκ τῶν γνωστῶν ἰσοτήτων :

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) = 2\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \quad (3)$$

Ἐάν δὲ ἀπὸ τῶν μελῶν τῆς α' τῶν αὐτῶν ἰσοτήτων ἀφαιρέσωμεν τὰ ἀντίστοιχα μέλη τῆς β', εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα :

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) = -2\eta\mu\alpha\eta\mu\beta \quad (4)$$

Ἐάν δὲ πάλιν τεθῆ $\alpha+\beta=\lambda$ καὶ $\alpha-\beta=B$, αἱ ἰσοότητες (3) καὶ (4) γίνονται :

$$\sigma\upsilon\nu\lambda + \sigma\upsilon\nu B = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\lambda+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\lambda-B}{2}\right) \quad (56)$$

$$\sigma\upsilon\nu\lambda - \sigma\upsilon\nu B = 2\eta\mu\left(\frac{\lambda+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B-\lambda}{2}\right)$$

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 88. Α'. — Νὰ μετασχηματισθῆ ἡ παράστασις

$$\frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B}$$

Ἐάν τὰ μέλη τῆς β' τῶν ἰσοτήτων (55) διαιρέσωμεν διὰ τῶν ἀντίστοιχων μελῶν τῆς α', εὐρίσκομεν

$$\frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B} = \frac{\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)} =$$

$$= \frac{\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)} \quad \delta\theta\epsilon\nu$$

$$\frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B} = \epsilon\varphi\left(\frac{A-B}{2}\right) \cdot \sigma\varphi\left(\frac{A+B}{2}\right) = \frac{\epsilon\varphi\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\epsilon\varphi\left(\frac{A+B}{2}\right)} \quad (57)$$

Β'.— Νὰ μετασχηματισθῆ εἰς γινόμενον ἡ παράστασις $\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma - \eta\mu(A+B+\Gamma)$. Κατὰ τὸν 6' τῶν τύπων (55) εἶναι $\eta\mu A - \eta\mu(A+B+\Gamma) =$

$$2\eta\mu\left(-\frac{B+\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(A+\frac{B+\Gamma}{2}\right) = -2\eta\mu\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(A+\frac{B+\Gamma}{2}\right).$$

Κατὰ δὲ τὸν α' τῶν ἰδίων τύπων (55) εἶναι

$$\eta\mu B + \eta\mu \Gamma = 2\eta\mu\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right).$$

Ἐκ τῶν δύο τούτων τελευταίων ἰσοτήτων εὐρίσκωμεν διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη $\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma - \eta\mu(A+B+\Gamma) =$

$$= 2\eta\mu\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right)\left[\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(A+\frac{B+\Gamma}{2}\right)\right].$$

Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὸν 6' τῶν τύπων (56) εἶναι :

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(A+\frac{B+\Gamma}{2}\right) = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{A+\Gamma}{2}\right), \text{ ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται :}$$

$$\begin{aligned} \eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma - \eta\mu(A+B+\Gamma) &= \\ &= 4\eta\mu\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{A+\Gamma}{2}\right) \quad (58) \end{aligned}$$

Γ'.— Νὰ μετασχηματισθῆ εἰς γινόμενον ἡ παράστασις $\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma$, ἂν $A+B+\Gamma = 180^\circ$.— Ἐπειδὴ καθ' ὑπόθεσιν εἶναι $A+B+\Gamma = 180^\circ$, ἔπεται ὅτι

$$\frac{A}{2} + \frac{B+\Gamma}{2} = 90^\circ, \quad \frac{A+B}{2} + \frac{\Gamma}{2} = 90^\circ$$

$$\text{καὶ } \frac{B}{2} + \frac{A+\Gamma}{2} = 90^\circ, \text{ ἐπομένως } \eta\mu\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right) = \sigma\upsilon\nu\frac{A}{2},$$

$$\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sigma\upsilon\nu\frac{\Gamma}{2}, \quad \eta\mu\left(\frac{A+\Gamma}{2}\right) = \sigma\upsilon\nu\frac{B}{2}.$$

Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἰσότητι (58) τεθῆ $A+B+\Gamma = 180^\circ$ καὶ οἱ παράγοντες τοῦ β' μέλους αὐτῆς ἀντικατασταθῶσι διὰ τῶν προηγουμένων τιμῶν αὐτῶν, προκύπτει ἐξ αὐτῆς ἡ ἰσότης

$$\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma = 4 \sigma\upsilon\nu\frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu\frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu\frac{\Gamma}{2}. \quad (59)$$

Ἀσκήσεις. 268) Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα
 $\eta\mu(42^\circ 5') + \eta\mu(37^\circ 6' 57'')$.

269) Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα
 $\eta\mu(25^\circ 15' 30'') + \eta\mu(40^\circ 53' 12'')$.

270) Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ διαφορὰ $\eta\mu(54^\circ 6' 17'') - \eta\mu(23^\circ 4' 9'')$.

271) Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα
 $\sigma\upsilon\nu(21^\circ 15' 20'') + \sigma\upsilon\nu(35^\circ 10' 40'')$.

272) Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ διαφορὰ $\sigma\upsilon\nu(12^\circ 16' 30'') - \sigma\upsilon\nu(40^\circ 20' 24'')$.

√ 273) Ἐὰν $A+B+\Gamma=180^\circ$ νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι
 $\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma - 1 = 4 \eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}$.

274) Τῇ βοήθειᾳ τῶν ἰσοτήτων (56) νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι

$$1 + \sigma\upsilon\nu A = 2 \sigma\upsilon\nu^2 \left(\frac{A}{2} \right) \text{ καὶ } 1 - \sigma\upsilon\nu A = 2 \eta\mu^2 \left(\frac{A}{2} \right). \text{ (§ 75 A')}.$$

275) Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα $1 + \sigma\upsilon\nu(35^\circ 15')$ καὶ ἡ δια-
 φορὰ $1 - \sigma\upsilon\nu(75^\circ 20' 42'')$.

276) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι

$$\sigma\upsilon\nu \alpha + 2 \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu 3\alpha = 4 \sigma\upsilon\nu 2\alpha \sigma\upsilon\nu^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right).$$

277) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\eta\mu \alpha + 2 \eta\mu 2\alpha + \eta\mu 3\alpha = 4 \eta\mu 2\alpha \sigma\upsilon\nu^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right).$$

278) Νὰ ἀπλοποιηθῇ ἡ παράστασις $\frac{\eta\mu \alpha + \eta\mu 3\alpha + \eta\mu 5\alpha}{\sigma\upsilon\nu \alpha + \sigma\upsilon\nu 3\alpha + \sigma\upsilon\nu 5\alpha}$

279) Νὰ ἀπλοποιηθῇ ἡ παράστασις $\frac{1 - \sigma\upsilon\nu \tau}{1 + \sigma\upsilon\nu \tau}$.

§ 89. — Μετασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων

$\eta\mu A \pm \sigma\upsilon\nu B$ εἰς γινόμενα. — Ἐπειδὴ $\sigma\upsilon\nu B = \eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - B \right)$

ἔπεται ὅτι

$$\eta\mu A + \sigma\upsilon\nu B = \eta\mu A + \eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - B \right) =$$

$$2 \eta\mu \left(\frac{\pi}{4} + \frac{A-B}{2} \right) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{A+B}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$$

(60)

$$\eta\mu A - \sigma\upsilon\nu B = \eta\mu A - \eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - B \right) =$$

$$2 \eta\mu \left(\frac{A+B}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{A-B}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$$

Άσκησης. 280) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι

$$\frac{\eta\mu A + \sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu A - \sigma\upsilon\nu B} = \epsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{A-B}{2}\right) \sigma\varphi\left(\frac{A+B}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$

281) Νά μετασχηματισθῆ εἰς γινόμενον ἢ παράστασις $\eta\mu\tau + \sigma\upsilon\nu\tau$.

282) Νά ὑπολογισθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως $\tau\epsilon\mu\tau + \sigma\tau\epsilon\mu\tau$ διὰ $\tau = 50^\circ 17' 18''$.

283) Νά ὑπολογισθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως $\tau\epsilon\mu\tau + \epsilon\varphi\tau$ διὰ $\tau = 26^\circ 12' 38''$.

§ 90. — Μετασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων

$\epsilon\varphi A \pm \epsilon\varphi B$ εἰς $\eta\mu$ καὶ $\sigma\upsilon\nu$. — Ἐπειδὴ $\epsilon\varphi A = \frac{\eta\mu A}{\sigma\upsilon\nu A}$ καὶ $\epsilon\varphi B = \frac{\eta\mu B}{\sigma\upsilon\nu B}$

ἔπεται ὅτι :

$$\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B = \frac{\eta\mu A}{\sigma\upsilon\nu A} + \frac{\eta\mu B}{\sigma\upsilon\nu B} = \frac{\eta\mu A \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu A \eta\mu B}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B} = \frac{\eta\mu(A+B)}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B} \quad (61)$$

$$\epsilon\varphi A - \epsilon\varphi B = \frac{\eta\mu A}{\sigma\upsilon\nu A} - \frac{\eta\mu B}{\sigma\upsilon\nu B} = \frac{\eta\mu A \sigma\upsilon\nu B - \eta\mu B \sigma\upsilon\nu A}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B} = \frac{\eta\mu(A-B)}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B}$$

Ἐφαρμογὴ εἰς τὰς παραστάσεις $1 \pm \epsilon\varphi\tau$. — Παρατηροῦντες .

ὅτι $1 = \epsilon\varphi \frac{\pi}{4}$ ἀνάγομεν τὰς παραστάσεις ταύτας εἰς παραστάσεις τῶν προηγουμένων μορφῶν καὶ κατὰ τοὺς τύπους (61) εἶναι

$$1 + \epsilon\varphi \tau = \epsilon\varphi \frac{\pi}{4} + \epsilon\varphi \tau = \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{4} + \tau\right)}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} \sigma\upsilon\nu\tau} = \frac{\sqrt{2} \eta\mu\left(\frac{\pi}{4} + \tau\right)}{\sigma\upsilon\nu\tau}$$

$$1 - \epsilon\varphi \tau = \frac{\sqrt{2} \eta\mu\left(\frac{\pi}{4} - \tau\right)}{\sigma\upsilon\nu\tau} \quad (62)$$

Άσκησης. 284) Νά ὑπολογισθῆ τὸ ἄθροισμα

$$\epsilon\varphi(5^\circ 18'') + \epsilon\varphi(22^\circ 15' 20'').$$

285) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι $\sigma\varphi A + \sigma\varphi B = \frac{\eta\mu(A+B)}{\eta\mu A \eta\mu B}$.

286) Νά καταστῆ λογιστὴ διὰ τῶν λογαρίθμων ἡ παράστασις

$$\frac{\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B}{\sigma\varphi A + \sigma\varphi B}$$

287) Νὰ καταστή λογιστὴ διὰ τῶν λογαριθμῶν ἡ παράστασις $1 + \epsilon\varphi^2 A$.

§ 91. — Μετασχηματισμὸς γενομένου ἡμιτόνων καὶ συνημιτόνων εἰς ἡμιἄθροισμα ἢ ἡμιδιαφορὰν. — Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (1) καὶ (2) τῆς (§ 86) καὶ (3), (4) τῆς (§ 87) προκύπτουσιν ἐδκόλως αἱ ἰσότητες :

$$\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta = \frac{1}{2} [\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta)]$$

$$\eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{1}{2} [\eta\mu(\alpha + \beta) - \eta\mu(\alpha - \beta)] \quad (63)$$

$$\sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta = \frac{1}{2} [\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta)]$$

$$\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta = \frac{1}{2} [\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)]$$

Ἀσκήσεις. 288). Νὰ ἀποδειχθῆ δτι

$$\eta\mu 20^\circ \cdot \eta\mu 40^\circ \cdot \eta\mu 60^\circ \cdot \eta\mu 80^\circ = \frac{3}{16}$$

289). Νὰ ἀποδειχθῆ δτι $\sigma\upsilon\nu 20^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 40^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 60^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 80^\circ = \frac{1}{16}$.

290). Νὰ ἀποδειχθῆ δτι $\epsilon\varphi 20^\circ \cdot \epsilon\varphi 40^\circ \cdot \epsilon\varphi 60^\circ \cdot \epsilon\varphi 80^\circ = 3$.

291). Νὰ ἀποδειχθῆ δτι $\epsilon\varphi 9^\circ - \epsilon\varphi 27^\circ - \epsilon\varphi 63^\circ + \epsilon\varphi 81^\circ = 4$.

292). Νὰ ἀποδειχθῆ δτι

$$\eta\mu 7\chi - 2\eta\mu\chi(\sigma\upsilon\nu 2\chi + \sigma\upsilon\nu 4\chi + \sigma\upsilon\nu 6\chi) = \eta\mu\chi$$

293). Νὰ ἀποδειχθῆ δτι

$$\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu(\beta - \gamma) + \eta\mu\beta \cdot \eta\mu(\gamma - \alpha) + \eta\mu\gamma \cdot \eta\mu(\alpha - \beta) = 0$$

§ 92. Μετασχηματισμὸς διὰ τῆς χρήσεως βοηθητικῆς γωνίας παραστάσεων μὴ λογιστῶν εἰς ἄλλας λογιστὰς διὰ τῶν λογαριθμῶν.

Α' Μετασχηματισμὸς τῆς $(\alpha + \beta)$. — Ἀβτῆ μετασχηματίζεται καθ' οἷανδήποτε τῶν ἀκολουθῶν μεθόδων.

1η Μέθοδος. — Εἶναι φανερὸν δτι : $\alpha + \beta = \alpha \left(1 + \frac{\beta}{\alpha} \right)$. Ἐὰν

δὲ τσθῆ $\epsilon\varphi\omega = \frac{\beta}{\alpha}$ ἢ προηγουμένη ἰσότης γίνεται :

$$\alpha + \beta = \alpha \left(1 + \epsilon\varphi\omega \right) = \alpha \sqrt{2} \frac{\eta\mu \left(\frac{\pi}{4} + \omega \right)}{\sigma\upsilon\nu\omega} \quad (\S 90 \text{ ἰσότης } 62)$$

2α Μέθοδος.— Έάν τεθῆ $\epsilon\varphi^2\omega = \frac{\epsilon}{\alpha}$, ἢ παράστασις γίνεται

$$\alpha + \delta = \alpha(1 + \epsilon\varphi^2\omega) = \frac{\alpha}{\text{συν}^2\omega}$$

3η Μέθοδος.— Έάν $\delta < \alpha$ (1), τὸ κλάσμα $\frac{\epsilon}{\alpha}$ εἶναι μικρότερον ἀπολύτως τῆς 1 κατ' ἀκολουθίαν δυνάμεθα νὰ θέσωμεν $\text{συν}\omega = \frac{\epsilon}{\alpha}$, ὅτε ἡ παράστασις γίνεται :

$$\alpha + \delta = \alpha(1 + \text{συν}\omega) = 2\alpha \text{συν}^2 \frac{\omega}{2}. \quad (\S 75 \text{ A}')$$

B'. Μετασχηματισμὸς τῆς (α-β), ἔνθα $\alpha > \beta$.

1η Μέθοδος. Έν πρώτοις εἶναι $\alpha - \beta = \alpha\left(1 - \frac{\beta}{\alpha}\right)$. Έάν δὲ τεθῆ $\epsilon\varphi\omega = \frac{\beta}{\alpha}$, ἢ παράστασις γίνεται

$$\alpha - \beta = \alpha\left[1 - \epsilon\varphi\omega\right] = \alpha\sqrt{2} \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{4} - \omega\right)}{\text{συν}\omega} \quad (\S 90, \text{ισότης } 62)$$

2α Μέθοδος.— Τοῦ δ ὄντος μικροτέρου τοῦ α , τὸ κλάσμα $\frac{\beta}{\alpha}$, εἶναι ἀπολύτως μικρότερον τοῦ 1, ἐπομένως δυνάμεθα νὰ θέσωμεν $\eta\mu^2\omega = \frac{\beta}{\alpha}$ ὅτε $\alpha - \beta = \alpha(1 - \eta\mu^2\omega) = \alpha \text{συν}^2\omega$.

3η Μέθοδος.— Έάν τεθῆ $\text{συν}\omega = \frac{\beta}{\alpha}$, ἢ παράστασις γίνεται

$$\alpha - \beta = \alpha(1 - \text{συν}\omega) = 2\alpha \eta\mu^2 \frac{\omega}{2} \quad (\S 75 \text{ A}')$$

Ἀσκήσεις. 294). Γνωστοῦ ὄντος ὅτι $\log \alpha = 3,35892$ καὶ $\log \beta = 2,75964$, νὰ εὑρεθῆ τὸ ἄθροισμα $\alpha + \beta$ χωρὶς νὰ εὑρεθῶσιν προηγουμένως οἱ προσθετέοι αὐτοῦ.

295) Νὰ εὑρεθῆ ἡ διαφορὰ $\alpha - \beta$ ὑπὸ τοὺς προηγουμένους ὅρους καὶ περιορισμούς.

296) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι $\log \alpha = 1,27964$ καὶ $\log \beta = 0,93106$

(1) Τοῦτο ἢ δηλοῦται ἐκ τῶν προτέρων ἢ διακρίνεται ἐκ τοῦ σχετικοῦ μεγέθους τῶν λογαριθμῶν τῶν ἀριθμῶν α καὶ β , ἂν οἱ λογάριθμοι οὗτοι εἶναι δεδομένοι, οὐχὶ δὲ οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β .

νά υπολογισθῆ ἢ παράστασις $\frac{\alpha-\delta}{\alpha+\delta}$ χωρὶς νά υπολογισθῶσι προηγουμένως οἱ ἀριθμοὶ α καὶ δ οὐδὲ οἱ ὅροι τῆς παραστάσεως ταύτης. 297). Νά εὑρεθῆ τὸ ἐλ, θετικὸν τόξον χ , δι' ὃ εἶναι

$$\epsilon\phi\chi = \sqrt{2} + \eta\mu 20^\circ$$

Γ'. — Μετασχηματισμὸς τῆς $\sqrt{\alpha^2 + \delta^2}$. — Ἐπειδὴ

$$\alpha^2 + \delta^2 = \alpha^2 \left(1 + \frac{\delta^2}{\alpha^2} \right), \text{ ἔπεται: ὅτι } \sqrt{\alpha^2 + \delta^2} = \alpha \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{\alpha^2}}$$

Ἐὰν δὲ τεθῆ $\epsilon\phi^2 \omega = \frac{\delta^2}{\alpha^2}$, προκύπτει ὅτι

$$\sqrt{\alpha^2 + \delta^2} = \alpha \sqrt{1 + \epsilon\phi^2 \omega} = \frac{\alpha}{\sigma\upsilon\nu \omega}.$$

[§ 59]

Δ'. — Μετασχηματισμὸς τῆς $\sqrt{\alpha^2 - \delta^2}$. Ἐργαζόμενοιὸς προηγουμένως, εὐρίσκομεν ὅτι $\sqrt{\alpha^2 - \delta^2} = \alpha \sqrt{1 - \frac{\delta^2}{\alpha^2}}$. Θέτον.

τες $\sigma\upsilon\nu^2 \omega = \frac{\delta^2}{\alpha^2}$ εὐρίσκομεν ὅτι $\sqrt{\alpha^2 - \delta^2} = \alpha \sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2 \omega} = \alpha \eta\mu \omega$.

Ε'. — Μετασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων $\alpha \eta\mu \chi \pm \delta \sigma\upsilon\nu \chi$.

Ἐν πρώτοις εἶναι $\alpha \eta\mu \chi + \delta \sigma\upsilon\nu \chi = \alpha \left(\eta\mu \chi + \frac{\delta}{\alpha} \sigma\upsilon\nu \chi \right)$.

Ἐὰν δὲ θέσωμεν $\epsilon\phi \omega = \frac{\delta}{\alpha}$, εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\alpha \eta\mu \chi + \delta \sigma\upsilon\nu \chi = \alpha \left(\eta\mu \chi + \frac{\eta\mu \omega}{\sigma\upsilon\nu \omega} \sigma\upsilon\nu \chi \right) = \frac{\alpha \eta\mu (\chi + \omega)}{\sigma\upsilon\nu \omega}.$$

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\alpha \eta\mu \chi - \delta \sigma\upsilon\nu \chi = \frac{\alpha \eta\mu (\chi - \omega)}{\sigma\upsilon\nu \omega}$.

Ἀσκήσεις. 298) Νά καταστῆ λογιστῆ διὰ τῶν λογαρίθμων ἢ παράστασις $\sqrt{\frac{\alpha-\delta}{\alpha+\delta}}$, ἂν $\alpha > \delta > 0$.

$$299). \text{ Τὸ αὐτὸ διὰ τὴν παράστασιν } \sqrt{\frac{\alpha-\delta}{\alpha+\delta}} + \sqrt{\frac{\alpha+\delta}{\alpha-\delta}}$$

ἔνθα $\alpha > \delta > 0$.

300) Τὸ αὐτὸ διὰ τὴν παράστασιν $\sqrt{\alpha+\delta} + \sqrt{\alpha-\delta}$, ἔνθα

$\alpha > \delta > 0$.

301) Τὸ αὐτὸ διὰ τὴν παράστασιν $\sigma\upsilon\nu \chi + \sqrt{3} \eta\mu \chi$.

302). Το αὐτὸ διὰ τὴν παράστασιν $\eta\mu\tau - \frac{\sigma\upsilon\nu\tau}{\sqrt{3}}$.

303). Τῇ βοηθεῖα μιᾶς βοηθητικῆς γωνίας νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως $\sqrt{a^2 + b^2 - \gamma^2}$ διὰ $a=895$, $b=1200$ καὶ $\gamma=450$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζον

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

§ 93. — **Τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις.** — Ὑποθεείσθω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τόξα ἢ γωνίας χ , δι' ἃς ἀληθεύει ἡ ἰσότης $\eta\mu\chi=0,15$.

Λαμβάνοντες τοὺς λογαριθμοὺς ἀμφοτέρων τῶν μελῶν αὐτῆς εὑρίσκομεν $\log\eta\mu\chi=\bar{1},17609$, ἐκ δὲ τῶν λογ. τριγ. πινάκων εὑρίσκομεν εἰς $\log\eta\mu$ ($8^\circ 37' 36''$, 83) $=\bar{1},17609$. Ἄρα $\eta\mu\chi = \eta\mu(8^\circ 37' 36''$, $83)$, καὶ ἐπομένως (§ 55 Γ')

$$\begin{aligned} \chi &= 2K. 180^\circ + (8^\circ 37' 36'', 83) \text{ ἢ} \\ \chi &= (2K+1)180^\circ - (8^\circ 37' 36'', 83) \end{aligned} \quad (\alpha)$$

ἐνθα K δύναται νὰ εἶναι μηδὲν ἢ τυχῶν ἀκέραιος (θετ. ἢ ἀρν.) ἀριθμὸς.

Ὡστε ἡ ἰσότης $\eta\mu\chi=0,15$ δὲν ἀληθεύει διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ χ , ἀλλὰ διὰ τιμὰς τοῦ χ παρεχομένας ὑπὸ τῶν εὑρεθεισῶν ἰσοτήτων (α) καὶ ὑπὸ τοῦς ῥηθέντας περιορισμοὺς. Ἡ ἰσότης αὕτη καλεῖται **τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις**. Ὁμοίως αἱ ἰσοτήτες $2\eta\mu\chi=1$ ἢ $\epsilon\phi\chi - \delta\sigma\phi\chi + 1=0$, $\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 2$ εἶναι τριγ. ἐξιώσεις.

Γενικῶς: **Τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις καλεῖται πᾶσα ἰσότης, ἣτις περιέχει ἓνα ἢ πλείονας τριγ. ἀριθμοὺς τόξου ἢ τόξων καὶ δὲν ἀληθεύει διὰ πᾶσας τὰς τιμὰς τοῦ τόξου ἢ τῶν τόξων τούτων.**

Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (α) εὑρίσκομεν, ὅσα θέλομεν τόξα ἐκ τῶν ταυτοποιούντων τὴν τριγ. ἐξίσωσιν $\eta\mu\chi=0,15$. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ εὑρεσις τῶν ἰσοτήτων (α) ἀποτελεῖ τὴν λύσιν τῆς τριγ. ἐξίσωσεως $\eta\mu\chi=0,15$.

Γενικῶς: **Λύσις τριγ. ἐξίσωσεως καλεῖται ἡ εὑρεσις τύπου ἢ τύπων, ἐξ ὧν εὐχερῶς εὑρίσκομεν ὅσα θέλομεν τόξα ἐκ τῶν ταυτοποιούντων τὴν ἐξίσωσιν ταύτην.**

§ 94. **Λύσις τριγ. ἐξίσωσεως ἐχούσης ἓνα ἄγνωστον.** Ἐπισημασθέντες ἀπὸ τοῦ ἐπιπέδου Ἐκκλησιαστικῆς Πρακτικῆς τῆς ἐξίσωσις

ήμχ=ήμτ, ένθα τ είναι γνωστόν τόξον (ή γωνία). 'Επειδή τὰ τόξα χ και τ έχουσι τὸ αὐτὸ ήμίτονον, έπεται (§ 55 Γ') ότι

$$\chi = 2K\pi + \tau \text{ και } \chi = (2K+1)\pi - \tau.$$

ένθα Κ δύναται νά λάβη τήν τιμήν 0 ή πάσαν άκεραίαν (θετ. ή αρν.) τιμήν.

β.) 'Εστω πρὸς λύσιν ή εξίσωσις $\text{συν}\chi = \text{συν}\tau$. — 'Επειδή χ και τ έχουσι τὸ αὐτὸ συνημίτονον, έπεται (§ 55 Α') ότι

$$\chi = 2K\pi \pm \tau.$$

γ.) 'Εστω πρὸς λύσιν ή εξίσωσις $\epsilon\phi \chi = \epsilon\phi\tau$. 'Επειδή χ και τ έχουσι τήν αὐτήν έφαπτομένην, έπεται (§ 55 Ε') ότι $\chi = \lambda\pi + \tau$, ένθα λ δύναται νά είναι 0 ή τυχών άκεραίος (θετ. ή αρν.) αριθμός.

δ.) 'Εκάστη τῶν εξισώσεων τῆς μορφῆς ήμ $\chi = \alpha$, $\text{συν}\chi = \beta$, $\epsilon\phi \chi = \gamma$, ένθα α, β, γ είναι δεδομένοι αριθμοί, ανάγεται εἰς τινα τῶν προηγουμένων μορφῶν τῆ βοήθειά τῶν λογ. πινάκων, ὡς προηγούμεως (§ 93) ή εξίσωσις ήμ $\chi = 0,15$ άνήχθη εἰς τήν μορφήν ήμ $\chi = ήμ (8^\circ 37' 36'', 83)$.

ΣΗΜ. Αἱ εξισώσεις $\sigma\phi\chi = \sigma\phi\tau$, $\tau\epsilon\mu\chi = \tau\epsilon\mu\tau$, $\sigma\tau\epsilon\mu\chi = \sigma\tau\epsilon\mu\tau$ είναι αντίστοιχος ἰσοδύναμοι πρὸς τὰς $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi\tau$, $\text{συν}\chi = \text{συν}\tau$, $\eta\mu\chi = \eta\mu\tau$,

Β'. — 'Εξισώσεις (μὴ άπλής μορφῆς) ἕνα μόνον τριγ. αριθμὸν τοῦ άγνωστοῦ τόξου περιέχουσαι. 'Εν τῇ εξίσωσει $9 \text{συν}\chi + 2 = 17 \text{συν}\chi - 2$ περιέχεται μόνον τὸ συνημίτονον τοῦ άγνωστοῦ τόξου χ' διὰ τοῦτο αὕτη είναι άλγεβρικὴ εξίσωσις με βοήθητικὸν άγνωστον τὸ $\text{συν}\chi$. Λύοντες ὅθεν ταύτην πρὸς $\text{συν}\chi$ εὐρίσκομεν τήν άπλής μορφῆς εξίσωσιν $\text{συν}\chi = \frac{1}{2}$.

'Ομοίως ή εξίσωσις $\epsilon\phi \chi + \frac{3 \epsilon\phi \chi - 9}{5} = 4 - \frac{5 \epsilon\phi \chi - 12}{3}$ λυομένη πρὸς τήν $\epsilon\phi \chi$ λαμβάνει τήν άπλήν μορφήν $\epsilon\phi \chi = 3$, ήτις λύεται κατὰ τὰ προειρημένα.

'Η εξίσωσις $\frac{\eta\mu \chi - 1}{\eta\mu \chi + 1} + \frac{\eta\mu \chi + 1}{\eta\mu \chi - 1} = \frac{40}{21}$ είναι ἰσοδύναμος τῇ $10 \eta\mu^2 \chi + 21 \eta\mu \chi - 10 = 0$, ήν λύοντες πρὸς ήμ / εὐρίσκομεν τὰς $\eta\mu \chi = \frac{2}{5}$ και $\eta\mu \chi = -\frac{5}{2}$, ὧν ή τελευταία αδύνατος. 'Ωστε ή λύσις τῆς ὁδοθείσης εξισώσεως ανάγεται εἰς τήν λύσιν τῆς άπλής

μορφῆς εξισώσεως $\eta\mu \chi = \frac{2}{5}$.

Ἡ ἐξίσωσις $\frac{\epsilon\varphi^2\chi + 3\epsilon\varphi\chi}{3} - \frac{\epsilon\varphi^2\chi + 1}{2\epsilon\varphi\chi} = \frac{\epsilon\varphi\chi - \frac{6}{\epsilon\varphi\chi}}{12}$ εἶναι ἰσοδύ-
 ναμος τῇ $4\epsilon\varphi^3\chi + 5\epsilon\varphi^2\chi = 0$ ἢ $\epsilon\varphi^2\chi(4\epsilon\varphi\chi + 5) = 0$, ἧς ἡ λύσις ἀ-
 νάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν ἀπλῆς μορφῆς ἐξισώσεων $\epsilon\varphi\chi = 0$ καὶ
 $\epsilon\varphi\chi = -\frac{5}{4}$

Ὡστε : Πᾶσα τριγ. ἐξίσωσις, ἓνα μόνον τριγ. ἀριθμὸν τοῦ
 ἀγνώστου τόξου περιέχουσα λαμβάνει ἀπλῆν μορφήν, εἰὰν
 λυθῇ πρὸς τὸν τριγωνομετρικὸν τοῦτον ἀριθμὸν.

Γ'.—Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ὑπάγομεν πάσας τὰς λοι-
 πὰς τριγ. ἐξισώσεις μὲ ἓνα ἀγνώστον, ἧτοι τὰς περιεχούσας
 πλεονασ τοῦ ἐνὸς τριγ. ἀριθμοῦ τοῦ ἀγνώστου τόξου ἢ πολ-
 λαπλασίων καὶ ὑποπολλαπλασίων αὐτοῦ. Τοιαῦται εἶναι αἱ ἐξι-
 σώσεις, ἃς ἐν τοῖς ἀκολουθοῦσι ὡς παραδείγματα ἀναφέρομεν.

Προβ. 1ον.—Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις $3\eta\mu^2\chi - \sigma\upsilon\nu^2\chi = 1$.
 Ταύτην λύομεν κατὰ τοὺς ἀκολουθοῦντας δύο τρόπους.

1ος τρόπος.—Θέτοντες ἐν αὐτῇ $1 - \eta\mu^2\chi$ ἀντὶ $\sigma\upsilon\nu^2\chi$ εὐρίσκομεν
 τὴν ἐξίσωσιν $3\eta\mu^2\chi - 1 + \eta\mu^2\chi = 1$ ἢ $4\eta\mu^2\chi = 2$, ὅθεν
 $\eta\mu\chi = \pm \frac{1}{2}\sqrt{2}$, αἵτινες ἔχουσιν ἀμφότεραι ἀπλῆν μορφήν.

2ος τρόπος.—Ἐπειδὴ $\sigma\upsilon\nu^2\chi + \eta\mu^2\chi = 1$, ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις δύ-
 ναται νὰ γραφῇ οὕτως: $\frac{3\eta\mu^2\chi - \sigma\upsilon\nu^2\chi}{\sigma\upsilon\nu^2\chi + \eta\mu^2\chi} = 1$. Ἐὰν δὲ ἀμφότεροι οἱ ὅροι
 τοῦ α' μέλους αὐτῆς διαιρεθῶσι διὰ $\sigma\upsilon\nu^2\chi$, προκύπτει ἡ ἰσοδύναμος
 ἐξίσωσις $\frac{3\epsilon\varphi^2\chi - 1}{1 + \epsilon\varphi^2\chi} = 1$, ἐξ ἧς προκύπτουσιν αἱ ἀπλᾶι ἐξισώσεις
 $\epsilon\varphi\chi = \pm 1$.

Προβ. 2ον.—Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις
 $\epsilon\varphi^2\chi + 4\eta\mu^2\chi - \frac{36}{5} = 0$.—Πρὸς λύσιν αὐτῆς θέτομεν $\frac{\epsilon\varphi^2\chi}{1 + \epsilon\varphi^2\chi}$
 ἀντὶ τοῦ $\eta\mu^2\chi$ (§ 59, ἰσ. 14). ὅτι ἡ ἐξίσωσις γίνεται :

$$\epsilon\varphi^2\chi + \frac{4\epsilon\varphi^2\chi}{1 + \epsilon\varphi^2\chi} - \frac{36}{5} = 0,$$

ἧτις εἶναι ἰσοδύναμος τῇ $5\epsilon\varphi^4\chi - 11\epsilon\varphi^2\chi - 36 = 0$. Λύοντες ταύτην
 πρὸς $\epsilon\varphi^2\chi$ εὐρίσκομεν $\epsilon\varphi^2\chi = 4$ καὶ $\epsilon\varphi^2\chi = -\frac{9}{5}$, ὧν ἡ β' ἀδύνατος
 τῆς δὲ α' ἡ λύσις ἀνάγεται εἰς τὴν τῶν ἀπλῶν ἐξισώσεων $\epsilon\varphi\chi = \pm 2$.

Παράδ. 3ον.—Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις $8 \eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi=3$.
 Αὕτη λύεται ὡς ἀκολούθως:

1ος τρόπος.—Ἐπειδὴ $2\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi=\eta\mu 2\chi$, ἡ ἐξίσωσις γίνεται
 $4 \eta\mu 2\chi=3$, ὅθεν $\eta\mu 2\chi=\frac{3}{4}$, ἥτις ἔχει ἀπλήν μορφήν, ἀν θεωρηθῇ
 ὡς ἄγνωστον τὸ τόξον 2χ .

2ος τρόπος.—Ἐπειδὴ $\sigma\upsilon\nu^2\chi+\eta\mu^2\chi=1$, ἡ ἐξίσωσις γράφεται
 καὶ οὕτω $\frac{8\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi}{\sigma\upsilon\nu^2\chi+\eta\mu^2\chi}=3$, ὅθεν $\frac{8\acute{\epsilon}\varphi\chi}{1+\acute{\epsilon}\varphi^2\chi}$, ἥτις εἶναι ἰσοδύναμος τῇ
 $3\acute{\epsilon}\varphi^2\chi-8\acute{\epsilon}\varphi\chi+3=0$. αὕτη δὲ ἀνάγεται εἰς τὰς τῆς Β' κατηγορίας
 καὶ λύεται ὡς ἐμάθομεν ἤδη.

ΣΗΜ. Ἀπεφύγαμεν νὰ ὀρίσωμεν τὸ $\eta\mu\chi$ ἢ τὸ $\sigma\upsilon\nu\chi$ συναρτήσῃ τοῦ
 ἄλλου, διότι οὕτω θὰ προέκυπτεν ἐξίσωσις μὲ ῥιζικόν, ἡ δὲ λύσις αὐτῆς
 θὰ ἀπῆτει ὕψωσιν εἰς τὸ τετράγωνον, συνεπεία τῆς ὁποίας πιθανὸν νὰ
 εἰσῆγοντο καὶ ξένα ῥίζαι, ὧν ὁ χωρισμὸς θὰ ἦγεν εἰς μακράν καὶ ἐπίπο-
 νον διερεύνησιν.

Παράδ. 4ον.—Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις

$4\sigma\upsilon\nu\chi-8\sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2}+6=0$.—Ἐπειδὴ κατὰ τὸν τύπον (41) εἶναι
 $\sigma\upsilon\nu\chi=2\sigma\upsilon\nu^2\frac{\chi}{2}-1$, ἡ ἐξίσωσις αὕτη γίνεται

$8\sigma\upsilon\nu^2\frac{\chi}{2}-4-8\sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2}+6=0$ ἢ $4\sigma\upsilon\nu^2\frac{\chi}{2}-4\sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2}+1=0$, ἥτις
 ὑπάγεται εἰς τὰς τῆς Β' κατηγορίας ὡς ἔχουσα ἓνα μόνον τριγων.
 ἀριθμὸν, τὸν $\sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2}$.

Ἐκ τῶν παραδειγμάτων τούτων κατανοοῦμεν ὅτι: Ὅταν τριγ.
 ἐξίσωσις περιέχῃ πλειονὰς τοῦ ἐνὸς τριγ. ἀριθμοῦ τοῦ ἀγνώ-
 στου τόξου ἢ πολλαπλασιῶν καὶ ὑποπολλαπλασιῶν αὐτοῦ,
 πρέπει νὰ φρονιζώμεν νὰ εὐρίσκωμεν ἄλλην ἰσοδύναμον καὶ
 ἓνα ἔχουσαν τριγ. ἀριθμὸν τοῦ ἀγνώστου τόξου ἢ πολλαπλα-
 σίον καὶ ὑποπολλαπλασίου αὐτοῦ.

Τοῦτο ἐπιτυγχάνομεν ἐκφράζοντες τοὺς ἐν αὐτῇ ἀγνώ-
 στους τριγ. ἀριθμοὺς συναρτήσῃ ἐνὸς μόνου τριγ. ἀριθμοῦ.

Κανὼν τοῦ Bioche. Ἡ ἀπλότης καὶ ταχύτης τῆς λύσεως τριγ. ἐξισώ-
 σεως ἐξαρτᾶται τὰ μάλιστα ἐκ τῆς ἐπιτυχούς ἐκλογῆς τοῦ (βοηθητικοῦ)
 τριγ. ἀριθμοῦ, ὅστις θὰ ὑπολειφθῇ ἐν τῇ ἐξίσωσει.

Εἰς πολὺς περιπτώσεις (οὐχὶ πάσας) διὰ τὴν ἐκλογὴν ταύτην τοῦ βοη-
 θητικοῦ ἀγνώστου δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς ὁδηγὸς ὁ ἀκόλουθος πρα-
 κτικὸς κανὼν τοῦ Bioche.

Ἐάν τριγ. ἐξίσωσις δὲν ἀλλοιοῦται, ὅταν ἐν αὐτῇ ἀντικατασταθῇ τὸ ἀγνώστον τόξον χ ὑπὸ τινος τῶν τόξων $(\pi - \chi)$, $-\chi$, $(\pi + \chi)$, δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ὡς βοηθητικὸν ἀγνώστον ἀντιστοίχως τὸ ἡμίτονον, συνημιτονον, ἐφαπτομένην. Ἐάν δὲ πᾶσαι αἱ εἰρημέναι ἀντικαταστάσεις ἀλλοιωσὶ τὴν ἐξίσωσιν, λαμβάνομεν ὡς ἀγνώστον τὴν ἐφαπτομένην τοῦ ἡμίσεος τόξου.

Πρὸς ἐφαρμογὴν τοῦ κανόνα τούτου ἀναγράφομεν τρία ἕτερα παραδείγματα.

Παράδ. 3ον.—Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις $\eta\mu\chi - \sigma\upsilon\nu\chi = 1$. Κατὰ τὸν ρηθέντα κανόνα πρέπει νὰ λάβωμεν ὡς βοηθητικὸν ἀγνώστον τὴν ἐφ $\left(\frac{\chi}{2}\right)$. Λαμβάνοντες ὅθεν ὑπ' ὄψιν τοὺς τύπους (47) θέτομεν ταύτην ὑπὸ τὴν μορφήν

$$\frac{2 \text{ἐφ}\left(\frac{\chi}{2}\right) - 1 + \text{ἐφ}^2\left(\frac{\chi}{2}\right)}{1 + \text{ἐφ}^2\left(\frac{\chi}{2}\right)} = 1, \text{ ἐξ ἧς } \text{ἐφ}\left(\frac{\chi}{2}\right) = 1$$

Παράδ. 6ον.—Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις $1 + \eta\mu 3\chi = \sigma\upsilon\nu 2\chi$. Ἐπειδὴ $\eta\mu 3(\pi - \chi) = \eta\mu[2\pi + (\pi - 3\chi)] = \eta\mu(\pi - 3\chi) = \eta\mu 3\chi$ καὶ $\sigma\upsilon\nu 2(\pi - \chi) = \sigma\upsilon\nu(2\pi - 2\chi) = \sigma\upsilon\nu 2\chi$, ἡ ἐξίσωσις δὲν ἀλλοιοῦται, ἀν χ ἀντικατασταθῇ ὑπὸ τοῦ $(\pi - \chi)$. Λαμβάνομεν ὅθεν, ὡς βοηθητικὸν ἀγνώστον τὸ $\eta\mu\chi$. Πρὸς τοῦτο ἐνθυμούμεθα (48, 40) ὅτι $\eta\mu 3\chi = 3\eta\mu\chi - 4\eta\mu^3\chi$ καὶ $\sigma\upsilon\nu 2\chi = \sigma\upsilon\nu^2\chi - \eta\mu^2\chi = 1 - 2\eta\mu^2\chi$.

Ἡ ἐξίσωσις ὅθεν γίνεται $1 + 3\eta\mu\chi - 4\eta\mu^3\chi = 1 - 2\eta\mu^2\chi$, ἧτις εἶναι ἰσοδύναμος τῇ $\eta\mu\chi(4\eta\mu^2\chi - 2\eta\mu\chi - 3) = 0$. ταύτης δὲ ἡ λύσις ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν ἐξισώσεων $\eta\mu\chi = 0$ καὶ

$$4\eta\mu^2\chi - 2\eta\mu\chi - 3 = 0.$$

Παράδ. 7ον.—Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις $\sigma\upsilon\nu 2\chi + 3\eta\mu 2\chi = 2$. Ἐπειδὴ αὕτη δὲν ἀλλοιοῦται, ἐάν ἀντὶ χ τεθῇ $(\pi + \chi)$, μεταχαιρίζομεθα ὡς βοηθητικὸν τὴν ἐφ χ . Πρὸς τοῦτο ἐκφράζομεν τὸ $\sigma\upsilon\nu 2\chi$ καὶ $\eta\mu 2\chi$ συναρτήσας τῆς ἐφ χ κατὰ τοὺς τύπους (47), ὅτε ἡ ἐξίσωσις γίνεται $\frac{1 - \text{ἐφ}^2\chi + 6\text{ἐφ}\chi}{1 + \text{ἐφ}^2\chi} = 2$, ἧτις εἶναι ἰσοδύναμος τῇ

$$3\text{ἐφ}\chi - 6\text{ἐφ}^2\chi + 1 = 0, \text{ ἧτις ὑπάγεται εἰς τὰς τῆς Β' κατηγορίας.}$$

ΣΗΜ. Τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν λύσεων τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις παραδείγμασιν ἀναφερομένων ἐξισώσεων ἀπὸ σκοποῦ ἀφήνομεν διὰ τοὺς μαθητάς.

§ 93. Ἀξιοσημεῖοι ἐξισώσεις.— Πλὴν τῆς γενικῆς μεθόδου, περὶ ἧς ὠμιλήσαμεν ἀνωτέρω, τῆς ἐκφράσεως δηλ. τῶν ἐν τινι ἐξίσώσει περιεχομένων τριγ. ἀριθμῶν συναρτήσας ἑνός, ὅστις ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

λαμβάνεται ούτως ως βοηθητικός άγνωστος, υπάρχουνσι και ειδικαί μέθοδοι, αἵτινες εξαρτώνται ἐκ τῆς μορφῆς τῶν ἐξισώσεων και δὲν δύνανται νὰ ὑπαχθῶσιν εἰς γενικὸν κανόνα. Ἴνα λάβωμεν ἰδέαν τῶν τοιούτων μεθόδων ἀναγράφομεν ἐν τοῖς ἀκολουθοῦσι τὴν λύσιν ἐξισώσεων τινῶν, αἵτινες συχνὰ ἀπαντῶνται.

Παράδ. 1ον. - *Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις* $a\eta\mu\chi + \delta\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma$, ἔνθα α, δ, γ εἶναι γνωστοὶ ἀριθμοί. Καθιστώντες τὰ α' μέλος αὐτῆς λογιστὸν διὰ τῶν λογαριθμῶν (§ 92 Ε') θέτομεν τὴν ἐξίσωσιν ὑπὸ τὴν μορφήν

$$\alpha \frac{\eta\mu(\chi + \omega)}{\sigma\upsilon\nu \omega} = \gamma, \text{ ὅθεν } \eta\mu(\chi + \omega) = \frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu \omega, \text{ ἔνθα } \epsilon\phi\omega = \frac{\delta}{\alpha}.$$

Ὁρίζομένης πρώτον τῆς τιμῆς τῆς βοηθητικῆς γωνίας ω λύεται εἴτα ἡ ἐξίσωσις πρὸς $(\chi + \omega)$ και εἴτα ἐκ τῶν εὐρεθησομένων τύπων πρὸς $(\chi + \omega)$ εὐρίσκονται οἱ ζητούμενοι, ἤτοι οἱ παρέχοντες ὅσας θέλομεν τιμὰς τοῦ χ ἐκ τῶν ταυτοποιουσῶν τὴν ἐξίσωσιν.

Παράδ. 2ον. - *Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις* $a\epsilon\phi\chi + \delta\sigma\phi\chi = \gamma$, ἔνθα α, δ, γ εἶναι γνωστοὶ ἀριθμοί.

Αὕτη γράφεται και οὕτω $\alpha \frac{\eta\mu\chi}{\sigma\upsilon\nu\chi} + \delta \frac{\sigma\upsilon\nu\chi}{\eta\mu\chi} = \gamma$, ὅθεν

$\alpha \eta\mu^2\chi + \delta\sigma\upsilon\nu^2\chi = \gamma \eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi$. Ἐὰν δὲ πολυσθῶσιν ἀμφότερα τὰ μέλη αὐτῆς ἐπὶ 2 και ληφθῶσιν ὑπ' ὄψιν αἱ ἰσότητες $2\eta\mu^2\chi = 1 - \sigma\upsilon\nu 2\chi$, $2\sigma\upsilon\nu^2\chi = 1 + \sigma\upsilon\nu 2\chi$, $2\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi = \eta\mu 2\chi$, ἡ ἐξίσωσις γίνεται :

$\alpha(1 - \sigma\upsilon\nu 2\chi) + \delta(1 + \sigma\upsilon\nu 2\chi) = \gamma \eta\mu 2\chi$ ἢ $\gamma \eta\mu 2\chi + (\alpha - \delta)\sigma\upsilon\nu 2\chi = \alpha + \delta$, ἥτις ἔχει τὴν μορφήν τῆς προηγουμένης και λύεται ὡς ἐκείνη.

Παράδ. 3ον. - *Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις*

$$a\eta\mu^2\chi + \delta \eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi + \gamma\sigma\upsilon\nu^2\chi = \delta.$$

Πολύζοντες ἀμφότερα τὰ μέλη ταύτης ἐπὶ 2 και λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τὰς ἐν τῷ προηγουμένῳ παραδείγματι ἀναγραφείσας ἰσότητας δίδομεν εἰς τὴν ἐξίσωσιν τὴν μορφήν $\delta \eta\mu 2\chi + (\gamma - \alpha)\sigma\upsilon\nu 2\chi = 2\delta - \alpha - \gamma$, ἥτις λύεται πρὸς 2χ , ὡς ἡ τοῦ α' παραδείγματος.

Παράδ. 4ον. - *Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις*

$$\alpha(\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi) + \delta \eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi = \gamma.$$

Ἐπειδὴ $\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi = \eta\mu\chi + \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \chi\right) = 2\eta\mu\frac{\pi}{4} \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) =$

$\sqrt{2} \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right)$ και $\eta\mu\chi \cdot \sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\eta\mu 2\chi}{2}$, ἡ ἐξίσωσις γίνεται

$$\alpha \sqrt{2} \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) + \frac{\delta}{2} \eta\mu 2\chi = \gamma.$$

Εάν ήδη θέσωμεν $\frac{\pi}{4} - \chi = \omega$, εύρισκομεν ὅτι $2\chi = \frac{\pi}{2} - 2\omega$, ἄρα $\eta\mu 2\chi = \sigma\upsilon\nu 2\omega$ καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἐξίσωσις γίνεται

$\alpha \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu\omega + \frac{\delta}{2} \sigma\upsilon\nu 2\omega = \gamma$. Ἐπειδὴ δὲ $\sigma\upsilon\nu 2\omega = 2\sigma\upsilon\nu^2\omega - 1$, ἡ προηγούμενη ἐξίσωσις γίνεται $\alpha \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu\omega + \frac{\delta}{2} (2\sigma\upsilon\nu^2\omega - 1) = \gamma$, ἥτις εἶναι ἰσοδύναμος τῇ $2\delta\sigma\upsilon\nu^2\omega + 2\sqrt{2} \alpha \sigma\upsilon\nu\omega - \delta - 2\gamma = 0$, ἐξ ἧς προκύπτει ὅτι $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{-\alpha \sqrt{2} \pm \sqrt{2\alpha^2 + 2\delta(\delta + 2\gamma)}}{2\delta}$. Λύοντες

τὰς δύο ταύτας ἀπλᾶς ἐξισώσεις εύρισκομεν τοὺς τύπους, οἵτινες παρέχουσι τὰς τιμὰς τοῦ ω ἐκ τούτων δὲ καὶ τῆς $\frac{\pi}{4} - \chi = \omega$ εύρισκομεν τοὺς τὰς τιμὰς τοῦ χ παρέχοντας τύπους.

ΣΗΜ. Εἶναι εὐνόητον ὅτι, ἵνα ἡ ἐξίσωσις αὕτη ἔχη λύσιν, πρέπει $2\alpha^2 + 2\delta(\delta + 2\gamma) \geq 0$ καὶ

$$-1 \leq \frac{-\alpha \sqrt{2} \pm \sqrt{2\alpha^2 + 2\delta(\delta + 2\gamma)}}{2\delta} \leq 1$$

Ἀσκήσεις. 304) Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις $\eta\mu \frac{\chi}{2} = \sigma\upsilon\nu\chi$.

305) Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις $\eta\mu^2\chi - \sigma\upsilon\nu^2\chi = 0$.

306) » » » » $2\sigma\upsilon\nu^2\chi - 3\sigma\upsilon\nu\chi + 1 = 0$.

307) » » » » $\frac{3\eta\mu\chi - \sigma\upsilon\nu\chi}{\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi} = 1$.

308) » » » » $\eta\mu\left(\frac{3}{5}\pi + \chi\right) + \sigma\upsilon\nu 3\chi = 0$.

309) » » » » $\epsilon\varphi\left(\chi + \frac{\pi}{3}\right) + \sigma\varphi\left(\frac{\pi}{2} - 3\chi\right) = 0$.

310) » » » $\epsilon\varphi\chi \cdot \epsilon\varphi 3\chi = 1$.

311) » » » $2 \sigma\upsilon\nu\chi = \tau\epsilon\mu\chi$

312) » » » $\frac{\epsilon\varphi\left(\frac{\pi}{3} - \chi\right)}{\sigma\upsilon\nu^2\chi} = \frac{\epsilon\varphi\chi}{\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi}{3} - \chi\right)}$

313) » » » $1 + \sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu 2\chi + \sigma\upsilon\nu 3\chi = 0$.

314) » » » $\eta\mu\chi - \sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

315) » » » $\sqrt{3} \cdot \eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi - 1 = 0$.

Πρὸς λύσιν τοιοῦτου συστήματος περιέχοντος ἑξισώσεις ἰσαριθμούς πρὸς τὰ ἀγνώστα τόξα δυνάμεθα νὰ ἀκολουθήσωμεν τὴν ἐξῆς γενικὴν μέθοδον. Ἐκφράζομεν τοὺς ἐν τῷ συστήματι περιεχομένους τριγ. ἀριθμούς ἐκάστου ἀγνώστου τόξου συναρτήσει ἑνὸς μόνου τριγ. ἀριθμοῦ τοῦ αὐτοῦ τόξου καὶ οὕτω λαμβάνομεν ἀλγεβρικὸν σύστημα μὲ ἀγνώστους τοὺς ὑπολειφθέντας τριγ. ἀριθμούς τῶν ἀγνώστων τόξων. Ἐκάστη δὲ λύσις τοῦ συστήματος τούτου ἄγει εἰς τὴν λύσιν ἰσαριθμῶν πρὸς τὰ ἀγνώστα τόξα ἀπλῶν ἑξισώσεων.

Ἐστω ὡς παράδειγμα τὸ σύστημα :

$$\text{συν } \chi + \text{συν } \psi = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

$$\text{τεμ } \chi + \text{τεμ } \psi = \frac{2(3 + \sqrt{3})}{3}$$

Ἐπειδὴ $\text{τεμ } \chi = \frac{1}{\text{συν } \chi}$ καὶ $\text{τεμ } \psi = \frac{1}{\text{συν } \psi}$, τὸ σύστημα ἀνάγεται εἰς τὸ ἀκόλουθον :

$$\text{συν } \chi + \text{συν } \psi = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}, \quad \frac{1}{\text{συν } \chi} + \frac{1}{\text{συν } \psi} = \frac{2(3 + \sqrt{3})}{3}, \quad \delta\text{περ}$$

λύομεν πρὸς $\text{συν } \chi$ καὶ $\text{συν } \psi$ ὡς ἐξῆς. Ἐξαιρέσομεν τοὺς παρονομαστικὰς τῆς β' καὶ εὐρίσκομεν $3(\text{συν } \chi + \text{συν } \psi) = 2(3 + \sqrt{3})\text{συν } \chi \text{συν } \psi$, ὅθεν ἕνεκα τῆς α' προκύπτει ἡ $\text{συν } \chi \cdot \text{συν } \psi = \frac{\sqrt{3}}{4}$. Οἱ ἀγνώ-

στοι ὅθεν $\text{συν } \chi$ καὶ $\text{συν } \psi$ εἶναι ρίζαι τῆς ἑξισώσεως

$$X^2 - \frac{1 + \sqrt{3}}{2} X + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0.$$

ἦτοι εἶναι $\text{συν } \chi = \frac{1}{2}$ καὶ $\text{συν } \psi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ἢ καὶ τὰνάπαλιν

$\text{συν } \chi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ καὶ $\text{συν } \psi = \frac{1}{2}$. Οὕτως ἤχθημεν εἰς τὴν λύσιν ἀπλῶν τριγ. ἑξισώσεων.

Ἡ γενικὴ αὕτη μέθοδος, εἰ καὶ κατ' ἀρχὴν δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ εἰς πᾶν σύστημα τῆς κατηγορίας ταύτης, ἄγει ἐνίοτε εἰς πράξεις λίαν πολυπλόκους δι' ὅ ἐπιδιώκεται συνήθως δι' ἕκαστον σύστημα τεχνικὴ τις μέθοδος ἐκ τῆς μορφῆς αὐτοῦ ἐξαρτωμένη.

Παράδ. 1ον. - *Νά λυθῆ τὸ σύστημα*

$$\text{συν } \chi + \text{συν } \psi = \alpha \quad (1)$$

$$\eta\mu \chi + \eta\mu \psi = \beta$$

Μετασχηματίζοντας τὰ α' μέλη τῶν ἐξισώσεων αὐτῶν εἰς γινόμενα λαμβάνομεν τὸ σύστημα

$$2 \text{συν} \left(\frac{\chi + \psi}{2} \right) \text{συν} \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \alpha \quad (2)$$

$$2 \eta\mu \left(\frac{\chi + \psi}{2} \right) \text{συν} \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \beta$$

Ἐκ τούτου δὲ προκύπτει εὐκόλως ἡ ἐξίσωσις $\epsilon\phi \left(\frac{\chi + \psi}{2} \right) = \frac{\beta}{\alpha}$.

Ἐὰν δὲ τ εἶναι τόξον ἐκ τῶν πινάκων εἰλημμένον καὶ ἔχον ἐφαπτομένην ἴσην πρὸς $\frac{\beta}{\alpha}$, ἢ ἀληθεύῃ ἡ ἐξίσωσις $\frac{\chi + \psi}{2} = K\pi + \tau$, ἄρα

$$\text{συν} \left(\frac{\chi + \psi}{2} \right) = \text{συν} (K\pi + \tau) = \pm \text{συν} \tau. \text{ Ἡ } \alpha' \text{ ὁθεν τῶν ἐξισώσεων}$$

(2) γίνεται

$$\pm 2 \text{συν} \tau \cdot \text{συν} \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \alpha, \text{ ἄρα } \text{συν} \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \pm \frac{\alpha}{2 \text{συν} \tau}$$

Ἐὰν δὲ ὑποθέσωμεν ὅτι ἐκτῶν πινάκων εὐρίσκομεν τόξον $\pi - \varphi$ τοιοῦτον ὥστε νὰ εἶναι $\text{συν} \varphi = \frac{\alpha}{2 \text{συν} \tau}$ τότε καὶ $\text{συν}(\pi - \varphi) = -\text{συν} \varphi =$

$$-\frac{\alpha}{2 \text{συν} \tau}. \text{ Ἀρα θὰ εἶναι } \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = 2K\pi \pm \varphi \text{ καὶ } \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = 2K\pi \pm$$

$(\pi - \varphi) = (2K + 1)\pi \pm \varphi$, οἵτινες τύποι προφανῶς συμπυκνῶνται εἰς τὸν $\left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \lambda\pi \pm \varphi$. Ὡστε εἰς τὴν ἐξίσωσιν $\frac{\chi + \psi}{2} = K\pi + \tau$ ἀντι-

στοιχοῦσι δύο ἐξισώσεις παρέχοντες τὸ $\frac{\chi - \psi}{2}$. Ἀγόμεθα ὁθεν εἰς τὴν λύσιν τῶν ἀκολουθῶν δύο ἀλγεβρικῶν συστημάτων

$$\frac{\chi + \psi}{2} = K\pi + \tau$$

$$\frac{\chi - \psi}{2} = K\pi + \tau$$

καὶ

$$\frac{\chi - \psi}{2} = \lambda\pi + \varphi$$

$$\frac{\chi - \psi}{2} = \lambda\pi - \varphi$$

ΣΗΜ. Ἴνα τὸ σύστημα ἔχη λύσιν, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι

$$-1 \leq \frac{\alpha}{2 \text{συν} \tau} \leq 1, \text{ ὁθεν κατὰ σειρὰν}$$

$$\frac{\alpha^2}{4 \text{συν}^2 \tau} \leq 1, \alpha^2 \leq 4, \frac{1}{1 + \epsilon\phi^2 \tau} \alpha^2 \leq \frac{4}{\delta^2}, \alpha^2 \leq \frac{4\alpha^2}{\alpha^2 + \delta^2} \text{ καὶ } \alpha^2 + \delta^2 \leq 4$$

Παράδ. 2ον. Νὰ λυθῆ τὸ σύστημα $\begin{matrix} \eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\psi = 0 \\ \sigma\upsilon\nu\chi \cdot \eta\mu\psi = \alpha \end{matrix}$

Ἐκ τῆς α' λαμβάνομεν $\sigma\upsilon\nu\psi = -\eta\mu\chi = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} + \chi\right)$, ἄρα

$$\psi = 2K\pi \pm \left(\frac{\pi}{2} + \chi\right)$$

Ἡ δὲ β' γίνεται $\sigma\upsilon\nu\chi \cdot \eta\mu\left[2K\pi \pm \left(\frac{\pi}{2} + \chi\right)\right] = \alpha$ ἢ

$$\pm \sigma\upsilon\nu\chi \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + \chi\right) = \alpha.$$

Ἐπειδὴ δὲ $\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + \chi\right) = \sigma\upsilon\nu(-\chi) = \sigma\upsilon\nu\chi$, ἡ τελευταία αὐτῆ

ἐξίσωσις γίνεται $\pm \sigma\upsilon\nu^2\chi = \alpha$ ἢ $\sigma\upsilon\nu^2\chi = \pm\alpha$, ὧν ἡ μία μόνον εἶναι παραδεκτὴ. Ἐστω δὲ αὕτῃ ἡ $\sigma\upsilon\nu^2\chi = \alpha$, ἐξ ἧς προκύπτουσιν αἱ ἀπλάτῃ ἐξισώσεις $\sigma\upsilon\nu\chi = \pm\sqrt{\alpha}$. Ἄν δὲ εὐρωμεν ἐκ τῶν πινάκων τόξον τ τοιοῦτον ὥστε νὰ εἶναι $\sigma\upsilon\nu\tau = \sqrt{\alpha}$, τότε θὰ εἶναι καὶ $\sigma\upsilon\nu(\pi - \tau) = -\sqrt{\alpha}$ καὶ κατ'ἀκολουθίαν ἢ μὲν $\sigma\upsilon\nu\chi = \sqrt{\alpha}$ ταῦτοποιεῖται, ὅταν $\chi = 2K'\pi \pm \tau$ ἢ δὲ $\sigma\upsilon\nu\chi = -\sqrt{\alpha}$ ταῦτοποιεῖται, ὅταν $\chi = 2K'\pi \pm (\pi - \tau) = (2K' \pm 1)\pi \pm \tau$. Οἱ τύποι ὁμοῦς οὗτοι συγχωνεύονται εἰς τοὺς $\chi = \lambda\pi \pm \tau$, ἐνθα λ εἶναι τυχῶν ἀκέραιος (θετ. ἢ ἀρ.) ἀριθμὸς ἢ καὶ μηδέν. Εἰς ἑκάτερον δὲ τούτων ἀντιστοιχοῦσι δύο τύποι παρέχοντες τὸν ψ , ὡς φαίνεται ἐκ τῶν ἀρχικῶς εὐρεθεισῶν ἰσοτήτων

$\psi = 2K\pi \pm \left(\frac{\pi}{2} + \chi\right)$ Οὕτως εὐρίσκομεν τὰς ἀκολουθίους λύσεις.

$$\chi = \lambda\pi + \tau$$

$$\chi = \lambda\pi + \tau$$

$$\alpha') \psi = 2K\pi + \left(\frac{\pi}{2} + \lambda\pi + \tau\right)$$

$$\beta') \psi = 2K\pi - \left(\frac{\pi}{2} + \lambda\pi + \tau\right)$$

$$\chi = \lambda\pi - \tau$$

$$\chi = \lambda\pi - \tau$$

$$\gamma') \psi = 2K\pi + \left(\frac{\pi}{2} + \lambda\pi - \tau\right)$$

$$\delta') \psi = 2K\pi - \left(\frac{\pi}{2} + \lambda\pi - \tau\right)$$

§ 98. Λύσεις τριγ. συστημάτων Β' κατηγορίας.

Εἰς τὰ συστήματα τῆς κατηγορίας ταύτης οὐδεμία γενικὴ μέθοδος δύναται νὰ ὑποδειχθῆ· ἕκαστον τούτων λύεται κατ' ἰδίαν μέθοδον ἐξαρτωμένην ἐκ τῆς μορφῆς αὐτοῦ. Εἰς τὰ συνηθέστερον ὁμοῦς ἀπατώμενα συστήματα δύο ἐξισώσεων μὲ ἰσαριθμούς ἀγνώστους παρέχεται τὸ ἀθροισμα ἢ ἡ διαφορά τῶν ἀγνώστων τόξων, δετ προσπα-

Θυμῶμεν νὰ εὐρωμεν τύπον ἢ τύπους δίδοντας τὸ ἕτερον τῶν ποσῶν τούτων.

Ὡς παραδείγματα τούτων συστημάτων ἔστωσαν τὰ ἀκόλουθα.

Παράδ. 1ον. — Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα
$$\begin{aligned} x + \psi &= \alpha \\ \eta \mu \chi + \eta \mu \psi &= \delta \end{aligned}$$

Ἐπειδὴ, ὡς γνωστόν, $\eta \mu \chi + \eta \mu \psi = 2 \eta \mu \left(\frac{\chi + \psi}{2} \right) \sigma \upsilon \nu \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right)$,

ἢ β' ἐξίσωσις γίνεται $2 \eta \mu \left(\frac{\chi + \psi}{2} \right) \cdot \sigma \upsilon \nu \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \delta$ ἢ, ἔνεκα τῆς

α' $2 \eta \mu \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sigma \upsilon \nu \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \delta$, ὅθεν $\sigma \upsilon \nu \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \frac{\delta}{2 \eta \mu \left(\frac{\alpha}{2} \right)}$.

Ἐὰν δὲ ἐκ τῶν πινάκων εὐρωμεν ὅτι $\sigma \upsilon \nu \tau = \frac{\delta}{2 \eta \mu \left(\frac{\alpha}{2} \right)}$, ἔπεται ὅτι

$\sigma \upsilon \nu \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \sigma \upsilon \nu \tau$ καὶ ἐπομένως $\frac{\chi - \psi}{2} = 2K\pi \pm \tau$, ὅθεν

$\chi - \psi = 4K\pi \pm 2\tau$. Οὕτως ἀγόμεθα εἰς τὴν λύσιν τῶν ἀκολουθῶν δύο συστημάτων:

α')
$$\begin{aligned} \chi + \psi &= \alpha \\ \chi - \psi &= 4K\pi + 2\tau \end{aligned}$$
 β')
$$\begin{aligned} \chi + \psi &= \alpha \\ \chi - \psi &= 4K\pi - 2\tau. \end{aligned}$$

Παράδ. 2ον. — Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα
$$\begin{aligned} x - \psi &= \alpha \\ \eta \mu \chi \cdot \eta \mu \psi &= \delta \end{aligned}$$

Ἐπειδὴ $2 \eta \mu \chi \cdot \eta \mu \psi = \sigma \upsilon \nu(\chi - \psi) - \sigma \upsilon \nu(\chi + \psi)$ (ισ. 63), ἢ β' ἐξίσωσις γίνεται $\sigma \upsilon \nu(\chi - \psi) - \sigma \upsilon \nu(\chi + \psi) = 2\delta$. ἢ ἔνεκα τῆς α'

$\sigma \upsilon \nu \alpha - \sigma \upsilon \nu(\chi + \psi) = 2\delta$, ὅθεν $\sigma \upsilon \nu(\chi + \psi) = \sigma \upsilon \nu \alpha - 2\delta$.

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν τύπους, οἵτινες παρέχουσι τὸ ἀθροῖσμα $\chi + \psi$ καὶ εἶτα ἐργαζόμεθα, ὡς εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα.

Παράδ. 3ον. Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα
$$\begin{aligned} \chi + \psi &= \alpha \\ \frac{\eta \mu \chi}{\eta \mu \psi} &= \frac{\delta}{\gamma} \end{aligned}$$

Ἐκ τῆς β' ἐξισώσεως κατὰ τὴν γνωστὴν ιδιότητα τῶν ἀναλογιῶν προκύπτει ὅτι

$$\frac{\eta \mu \chi - \eta \mu \psi}{\eta \mu \chi + \eta \mu \psi} = \frac{\delta - \gamma}{\delta + \gamma}$$
 ἢ (ισ. 57) $\epsilon \varphi \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = \frac{\delta - \gamma}{\delta + \gamma} \epsilon \varphi \left(\frac{\alpha}{2} \right)$.

Ἐὰν δὲ τὸξον τι τ ἐκ τῶν πινάκων λαμβανόμενον εἶναι τοιοῦτον ὥστε

$$\epsilon\phi\tau = \frac{\delta-\gamma}{\delta+\gamma} \epsilon\phi\left(\frac{\alpha}{2}\right) \text{ ἔπεται ὅτι } \epsilon\phi\left(\frac{\chi-\psi}{2}\right) = \epsilon\phi\tau \text{ καὶ ἑπομένως}$$

$$\frac{\chi-\psi}{2} = K\pi + \tau, \text{ ὅθεν } \chi-\psi = 2K\pi + 2\tau. \text{ Λύοντες τὸ ὑπὸ ταύτης καὶ}$$

τῆς $\chi + \psi = \alpha$ ἀποτελούμενον σύστημα εὐρίσκομεν

$$\chi = K\pi + \tau + \frac{\alpha}{2}, \psi = \frac{\alpha}{2} - K\pi - \tau.$$

Παράδ. 4ον. - Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα

$$\chi + \psi = \alpha, \text{ συν}\chi \cdot \text{συν}\psi = \delta$$

Ἐπειδὴ (ἰσ. 63) εἶναι $2\text{συν}\chi\text{συν}\psi = \text{συν}(\chi - \psi) + \text{συν}(\chi + \psi)$, ἡ β' ἐξίσωσις γίνεται $\text{συν}(\chi - \psi) + \text{συν}\alpha = 2\delta$, ὅθεν $\text{συν}(\chi - \psi) = 2\delta - \text{συν}\alpha$.

Λύοντες ταύτην εὐρίσκομεν 2 τύπους παρέχοντας τὴν διαφορὰν $\chi - \psi$. Ἐκ τούτων δὲ καὶ τῆς $\chi + \psi = \alpha$ εὐρίσκομεν τοὺς ζητούμενους τύπους.

Παράδ. 5ον. Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα.

$$\chi + \psi = \alpha, \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = \delta$$

Ἐπειδὴ (ἰσ. 63) εἶναι $\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = \frac{\eta\mu(\chi + \psi)}{\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi}$, ἡ β' ἐξίσωσις γίνεται

$$\frac{\eta\mu\alpha}{\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi} = \delta, \text{ ὅθεν } \text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi = \frac{\eta\mu\alpha}{\delta}. \text{ Ὅπως ἤχθημεν εἰς}$$

τὴν λύσιν τοῦ συστήματος $\chi + \psi = \alpha$, $\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi = \frac{\eta\mu\alpha}{\delta}$, ὁπερ ἔχει τὴν μορφήν τοῦ προηγουμένου.

Παράδ. 6ον. Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα

$$\chi + \psi = \alpha, \epsilon\phi\chi \cdot \epsilon\phi\psi = \delta$$

Θέτοντες τὴν β' ἐξίσωσιν ὑπὸ τὴν μορφήν $\frac{\eta\mu\chi \cdot \eta\mu\psi}{\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi} = \frac{\delta}{1}$ λαμβάνομεν

$$\frac{\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi - \eta\mu\chi \cdot \eta\mu\psi}{\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi} = \frac{1-\delta}{1} \text{ ἢ } \frac{\text{συν}(\chi + \psi)}{\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi} = 1 - \delta, \text{ ὅθεν}$$

$$\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi = \frac{\text{συν}\alpha}{1-\delta}$$

Ὅπως ἤχθημεν εἰς τὴν λύσιν τοῦ συστήματος $\chi + \psi = \alpha$,

$\text{συν}\chi \cdot \text{συν}\psi = \frac{\text{συν}\alpha}{1-\delta}$, ὁπερ ἔχει τὴν μορφήν τοῦ 4ου παραδείγματος.

Παράδ. 7ον. - Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα

$$\epsilon\phi\chi = \frac{\delta}{\epsilon}, \chi - \psi = \alpha$$

Εν τῆς α' προκύπτει ἡ ἰσοδύναμος ἐξίσωσις $\frac{\epsilon\phi\chi - \epsilon\psi\phi}{\epsilon\phi\chi + \epsilon\psi\phi} = \frac{\delta - \gamma}{\epsilon + \gamma}$

ἢ ἔνεκα τῶν τύπων (61), $\frac{\eta\mu(\chi - \psi)}{\eta\mu(\chi + \psi)} = \frac{\delta - \gamma}{\delta + \gamma}$, ὅθεν λαμβάνοντες

ὅπ' ὄψιν καὶ τὴν β' ἐξίσωσιν εὐρίσκομεν $\eta\mu(\chi + \psi) = \frac{\delta + \gamma}{\delta - \gamma} \eta\mu\alpha$

καὶ προχωροῦμεν εἴτα κατὰ τὰ γνωστά.

Ἀσκήσεις. Νὰ λυθῶσι τὰ ἀκόλουθα συστήματα.

332) $\epsilon\phi\chi + \epsilon\psi\phi = 0$

$\epsilon\phi \frac{\chi}{2} + \epsilon\psi \frac{\psi}{2} = 1,$

334) $\chi + \psi = \alpha$
 $\eta\mu\chi - \eta\mu\psi = \beta$

336) $\chi + \psi = \alpha$
 $\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \eta\mu\chi \cdot \eta\mu\psi.$

338) $\chi - \psi = 45^\circ$
 $\epsilon\phi\chi = 3 \epsilon\phi\psi$

340) $\frac{\chi + y + z = \pi}{\frac{\epsilon\phi\chi}{\mu} = \frac{\epsilon\psi\phi}{\nu} = \frac{\epsilon\phi z}{\lambda}}$

342) $\epsilon\phi\chi + \epsilon\psi\phi = \alpha$
 $\sigma\phi(\chi + \psi) = \beta$

344) $\chi - \psi = \alpha$
 $\sigma\mu\chi \cdot \sigma\mu\psi = \delta$

333) $\eta\mu\chi + \sqrt{\beta} \cdot \sigma\mu y = 1$

$\eta\mu\chi + \sigma\mu y = \frac{-1 + \sqrt{\beta}}{2}$

335) $\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \alpha$
 $\eta\mu\chi \cdot \eta\mu\psi = \beta$

337) $\chi - \psi = 30^\circ$
 $\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 1$

339) $\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi y = 1$
 $\sigma\mu\chi \cdot \sigma\mu\psi = \frac{\sqrt{2}}{2}$

341) $\epsilon\phi\chi + \epsilon\psi\phi = \alpha$
 $\sigma\phi\chi + \sigma\phi\psi = \beta$
 $\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 1$

343) $\sigma\mu\chi \cdot \sigma\mu\psi = -\frac{3}{4}$

345) $\chi + \psi = \alpha$
 $\frac{\sigma\mu\chi}{\sigma\mu\psi} = \beta.$

§ 39. — Ἀπαλοιφή ἀγνώστων τόξων μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων τριγ. συστήματος. — Ἐστώσαν αἱ ἀλγεβρικοὶ ἐξισώσεις

$$a\chi + \delta\psi = \gamma, \quad a'\chi + \delta'\psi = \gamma', \quad a''\chi + \delta''\psi = \gamma''$$

αἵτινες ἔχουσιν ἀγνώστους ὀλιγωτέρους τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν. Ἐπιζητήσωμεν νὰ εὕρωμεν ποία συνθήκη πρέπει νὰ ἐκπληροῦται, ὥστε αὗται ἔχωσι τὴν αὐτὴν λύσιν, ἥτοι ταυτοποιεῦνται ὑπὸ τῶν αὐτῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων.

Πρὸς τοῦτο λύομεν τὸ ὑπὸ τῶν δύο πρώτων ἀποτελούμενον σύστημα (ὑποτίθεται $\frac{\alpha}{\alpha'} \neq \frac{\beta}{\beta'}$) καὶ εὐρίσκομεν ὅτι αὐταὶ ταῦτοποιοῦνται ὑπὸ τῶν ἀκολουθῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων :

$$\chi = \frac{\beta'\gamma - \beta\gamma'}{\alpha\beta' - \alpha'\beta}, \quad \psi = \frac{\alpha\gamma' - \alpha'\gamma}{\alpha\beta' - \alpha'\beta}.$$

Ἴνα δὲ αἱ τιμαὶ αὐταὶ ταῦτοποιῶσι καὶ τὴν γ' θέον προφανῶς καὶ ἀληθεύῃ ἢ ἰσότητι $\frac{\alpha''(\beta'\gamma - \beta\gamma')}{\alpha\beta' - \alpha'\beta} + \frac{\beta''(\alpha\gamma' - \alpha'\gamma)}{\alpha\beta' - \alpha'\beta} = \gamma'', \quad \eta'$

$$\alpha''(\beta'\gamma - \beta\gamma') + \beta''(\alpha\gamma' - \alpha'\gamma) - \gamma''(\alpha\beta' - \alpha'\beta) = 0.$$

Ἐπειδὴ δὲ ἐν τῇ σχέσει ταύτῃ οὐδεὶς τῶν ἀγνώστων ὑπάρχει, ἢ εὐρεσις αὐτῆς καλεῖται ἀπαλοιφή τῶν ἀγνώστων χ καὶ ψ μεταξὺ τῶν προειρημένων ἐξισώσεων.

Γενικῶς : Ἀπαλοιφή ἑνὸς ἢ πλείονων ἀγνώστων μεταξὺ ἐξισώσεων πλείονων τῶν ἀγνώστων τούτων καλεῖται ἢ εὐρεσις τῆς συνθήκης, ἣτις πρέπει νὰ ἐκκληροῦται, ὅπως αἱ ἐξισώσεις αὗται ἀληθεύωσι διὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς τῶν ἐν αὐταῖς περιεχομένων ἀγνώστων.

Ὁ ὁρισμὸς οὗτος ἀληθεύει οἰανδήποτε μορφήν καὶ ἂν ἔχωσιν αἱ ἐξισώσεις καὶ ἐπομένως καὶ ὅταν τινὲς αὐτῶν ἢ πᾶσαι εἶναι τριγ. ἐξισώσεις.

Ἡ εἰς τὸ ἀνωτέρω ὁμοῦ ἀλγεβρικὸν παράδειγμα ἐφαρμοσθεῖσα μέθοδος πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ἀπαλοιφῆς, εἰ καὶ κατὰ θεωρίαν εἶναι γενικὴ, δὲν ἐφαρμόζεται εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν τινὲς ἢ πᾶσαι αἱ δεδομένα ἐξισώσεις εἶναι τριγωνομετρικαί. Κατὰ ταύτην ἐπιζητεῖται καὶ ἐφαρμόζεται ἰδίᾳ ἐκάστοτε μέθοδος ἐξαρτωμένη ἐκ τῆς μορφῆς τῶν ἐξισώσεων, ὡς ἐκ τῶν ἀκολουθῶν παραδειγμάτων φαίνεται.

Παράδ. 1. — Νὰ ἀπαλειφθῇ τὸ τόξον χ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων $\eta\mu\chi + \theta\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma, \alpha'\eta\mu\chi + \beta'\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma'$, (ἐνθα $\frac{\alpha}{\alpha'} \neq \frac{\beta}{\beta'}$). Λύοντες τὸ ὑπ' αὐτῶν ἀποτελούμενον σύστημα πρὸς $\eta\mu\chi$

καὶ $\sigma\upsilon\nu\chi$ εὐρίσκομεν ὅτι $\eta\mu\chi = \frac{\gamma\beta' - \gamma'\beta}{\alpha\beta' - \alpha'\beta}, \quad \sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\alpha\gamma' - \alpha'\gamma}{\alpha\beta' - \alpha'\beta}$

Ἐὰν δὲ ὑψώσωμεν τὰ μέλη ἑκατέρας εἰς τὸ τετράγωνον καὶ εἰτα προσθέσωμεν κατὰ μέλη εὐρίσκομεν ὅτι

$$\eta\mu^2\chi + \sigma\upsilon\nu^2\chi = \frac{(\gamma\beta' - \gamma'\beta)^2 + (\alpha\gamma' - \alpha'\gamma)^2}{(\alpha\beta' - \alpha'\beta)^2} \quad \delta\theta\epsilon\nu$$



$$1 = \frac{(\gamma\delta' - \gamma'\delta)^2 + (\alpha\gamma' - \alpha'\gamma)^2}{(\alpha\delta' - \alpha'\delta)^2} \quad \eta$$

$(\gamma\delta' - \gamma'\delta)^2 + (\alpha\gamma' - \alpha'\gamma)^2 = (\alpha\delta' - \alpha'\delta)^2$, ήτις είναι η ζητούμενη συνθήκη.

Παράδ. 2ον.—Νά απαλειφθώσι τὰ τόξα χ καὶ ψ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων

$$\alpha \eta \mu^2 \chi + \beta \sigma \nu^2 \chi = \mu, \delta \eta \mu^2 \psi + \alpha \sigma \nu^2 \psi = \nu, \alpha \epsilon \varphi \chi - \beta \epsilon \varphi \psi = 0.$$

Καθιστώμεν τὰς δύο πρώτας ἐξισώσεις ὁμογενεῖς πρὸς τὰ ἐν ἑκατέρᾳ περιεχόμενα ἡμίτονα καὶ συνημίτονα πορίζοντες τὰ δευτέρα μέλη τῆς μὲν α' ἐπὶ $\sigma \nu^2 \chi + \eta \mu^2 \chi$, τῆς δὲ β' ἐπὶ $\sigma \nu^2 \psi + \eta \mu^2 \psi$. Διαιροῦντες εἶτα ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς μὲν α' διὰ $\sigma \nu^2 \chi$, τῆς δὲ β' διὰ $\sigma \nu^2 \psi$ εὐρίσκομεν τὰς ἐξισώσεις

$$\alpha \epsilon \varphi^2 \chi + \beta = \mu(1 + \epsilon \varphi^2 \chi), \quad \beta \epsilon \varphi^2 \psi + \alpha = \nu(1 + \epsilon \varphi^2 \psi) \quad \eta$$

$(\alpha - \mu) \epsilon \varphi^2 \chi = \mu - \beta$, $(\beta - \nu) \epsilon \varphi^2 \psi = \nu - \alpha$, ἐξ ὧν εὐκόλως εὐρίσκουμεν ὅτι

$$\frac{\epsilon \varphi^2 \chi}{\epsilon \varphi^2 \psi} = \frac{\mu - \beta}{\alpha - \mu} \cdot \frac{\beta - \nu}{\nu - \alpha}. \quad (1)$$

Ἄλλ' ἐκ τῆς γ' τῶν δεδομένων ἐξισώσεων λαμβάνομεν εὐκόλως

ὅτι $\frac{\epsilon \varphi \chi}{\epsilon \varphi \psi} = \frac{\beta}{\alpha}$, ἄρα $\frac{\epsilon \varphi^2 \chi}{\epsilon \varphi^2 \psi} = \frac{\beta^2}{\alpha^2}$. Ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῆς (1) προ-

κύπτει ἡ ζητούμενη σχέσηις $\frac{\mu - \beta}{\alpha - \mu} \cdot \frac{\beta - \nu}{\nu - \alpha} = \frac{\beta^2}{\alpha^2}$.

Ἀσκήσεις.—346) Νά απαλειφθῆ τὸ τόξον χ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων

$$\eta \mu \chi + \epsilon \varphi \chi = \alpha, \quad \sigma \nu \chi = \beta.$$

347) Νά απαλειφθῆ τὸ τόξον χ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων

$$\eta \mu \chi + \sigma \nu \chi = \alpha, \quad \eta \mu^3 \chi + \sigma \nu^3 \chi = \beta.$$

348) Νά απαλειφθῆ τὸ τόξον χ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων

$$\eta \mu \chi - \sigma \tau \epsilon \mu \chi = \alpha, \quad \sigma \nu \chi \tau \epsilon \mu \chi = \beta.$$

349) Νά απαλειφθῆ τὸ τόξον χ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων

$$\alpha \eta \mu \chi - \beta \sigma \nu \chi = \frac{1}{2} \gamma \eta \mu 2\chi, \quad \alpha \sigma \nu \chi + \delta \eta \mu \chi = \gamma \sigma \nu 2\chi.$$

350) Νά απαλειφθώσι τὰ τόξα χ καὶ ψ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων

$$\eta \mu \chi + \eta \mu \psi = \alpha, \quad \sigma \nu \chi + \sigma \nu \psi = \beta, \quad \sigma \nu(\chi - \psi) = \gamma.$$

351) Νά ἀπολειφθώσι τὰ τόξα χ καὶ ψ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων

$$\chi \eta \mu \psi \tau \epsilon \mu \chi + \epsilon \varphi \psi - \epsilon \varphi \delta = \sigma \varphi \chi + \sigma \varphi \psi = \sigma \varphi \gamma.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄.


ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

§ 100. **Κύρια καὶ δευτερεύοντα στοιχεῖα τριγώνου.**—Αἱ πλευραί, αἱ γωνίαι καὶ τὸ ἔμβασθον τριγώνου καλοῦνται **κύρια** στοιχεῖα αὐτοῦ. Πᾶν δὲ ἄλλο μέγεθος ὁπωσδήποτε μετὰ τριγώνου συνδεόμενον καλεῖται **δευτερεύον** στοιχεῖον αὐτοῦ. Τοιαῦτα π.χ. εἶναι ἡ περίμετρος, αἱ διάμεσοι, τὰ ὕψη, ἡ ἀκτίς τοῦ ἐγγεγραμμένου καὶ ἐκάστου τῶν παρεγγεγραμμένων κύκλων κ. ἄ.

Ἐὰν δύο στοιχεῖα τριγώνου συνδέωνται πρὸς ἄλληλα, οὕτως ὥστε ὀρισθέντος τοῦ ἑνὸς νὰ δρίζηται ἐξ αὐτοῦ καὶ τὸ ἄλλο, ἐκάτερον καλεῖται **συνάρτησις** τοῦ ἄλλου. Π. χ. ἡ ὑποτείνουσα ὀρθ. τριγώνου καὶ ἡ εἰς τὸ μέσον αὐτῆς καταλήγουσα διάμεσος εἶναι συναρτήσεις ἀλλήλων.

Ἐὰν οὐδεμία τοιαύτη σχέσις ὑφίσταται μεταξὺ δύο στοιχείων τριγώνου, ἦτοι, ἂν ταῦτα δύνανται νὰ λαμβάνωσι τιμὰς ἀνεξαρτήτους ἀλλήλων, καλοῦνται **ἀνεξάρτητα** στοιχεῖα. Τοιαῦτα π.χ. εἶναι ἡ ὑποτείνουσα καὶ οἰαδήποτε τῶν ὀξείων γωνιῶν ὀρθ. τριγώνου, ἡ βᾶσις καὶ ἑκατέρα τῶν προσκειμένων αὐτῇ γωνιῶν ἰσοσκελοῦ τριγώνου κτλ.


Συνήθως τὰς γωνίας τριγώνου παριστῶμεν καὶ ὀνομάζομεν διὰ τῶν γραμμάτων Α, Β, Γ, ἅτινα τίθενται πλησίον τῶν κορυφῶν αὐτοῦ τὰ δὲ μήκη τῶν ἀντικειμένων πλευρῶν διὰ τῶν ἀντιστοίχων μικρῶν α, β, γ, (Σχ. 46). Ἐὰν τὸ τρίγωνον εἶναι ὀρθογώνιον, θέτομεν συνήθως τὸ γράμμα Α εἰς τὴν κορυφὴν τῆς ὀρθῆς γωνίας καὶ κατ' ἀκολουθίαν τὸ μήκος τῆς ὑποτείνουσας παρίσταται διὰ τοῦ α.



(Σχ. 46)

§ 101. **Τριγωνομετρικαὶ σχέσεις μεταξὺ τῶν κύριων στοιχείων ὀρθ. τριγώνου.**— Α΄. Ἐστω ΑΒΓ ὀρθογώ-

νίον τι τριγώνων (Σχ. 47). και $\chi'\chi$, $\psi'\psi$, $Z'Z$ οί άξονες, έφ' ών κείνται αί πλευραί αὐτοῦ, έκάστου τών όποίων ή θετική φορά δηλοῦται υπό τοῦ αντίστοιχου βέλους. Τούτων τεθέντων παρατηροῦμεν ότι τοῦ άνύσματος ΓB προβολή επί μέν τόν άξονα $\chi'\chi$ είναι τό άνυσμα ΓA , επί δέ τόν $\psi'\psi$ τό \overline{AB} . Έάν δέ έφαρμόσωμεν επί τών προβολών τούτων τήν ιδιότητα (§ 54) εύρισκομεν ότι :



(Σχ. 47)

$$\delta = a \cdot \text{συν} \Gamma, \gamma = a \cdot \text{συν} B. \quad (64)$$

Έπειδή δέ $B + \Gamma = 90^\circ$, έπιεται ότι $\text{συν} \Gamma = \acute{\eta}\mu B$ και $\text{συν} B = \acute{\eta}\mu \Gamma$, αί δέ προηγούμεναι ισότητες γίνονται :

$$\delta = a \cdot \acute{\eta}\mu B, \gamma = a \cdot \acute{\eta}\mu \Gamma \quad (65)$$

Άρα : Έκατέρω τών καθέτων πλευρών όρθ. τριγώνου ισούται προς τό γινόμενον τής ύποτείνουσής επί τό ήμίτονον τής αντίκειμένης όξείας γωνίας αὐτοῦ.

B' . — Έκ τών ισότητων $\delta = a \acute{\eta}\mu B$ και $\gamma = a \text{συν} B$ διαιρουμένων κατά μέλη προκύπτει ή ισότης $\frac{\delta}{\gamma} = \acute{\epsilon}\varphi B$, όθεν $\delta = \gamma \acute{\epsilon}\varphi B$,

Όμοίως εκ τών $\gamma = a \acute{\eta}\mu \Gamma$ και $\delta = a \text{συν} \Gamma$ προκύπτει ή $\gamma = \delta \acute{\epsilon}\varphi \Gamma$. Έπειδή δέ $\acute{\epsilon}\varphi B = \sigma\varphi \Gamma$ και $\acute{\epsilon}\varphi \Gamma = \sigma\varphi B$ αί ισότητες,

$$\begin{aligned} \delta &= \gamma \acute{\epsilon}\varphi B, & \gamma &= \delta \acute{\epsilon}\varphi \Gamma \\ \delta &= \gamma \sigma\varphi \Gamma, & \gamma &= \delta \sigma\varphi B \end{aligned} \quad (66)$$

Άρα : Έκατέρω τών καθέτων πλευρών όρθ. τριγώνου ισούται προς τό γινόμενον τής έτέρας επί τήν έφαπτομένην τής αντίκειμένης ή επί τήν συνεφαπτομένην τής προσκειμένης όξείας γωνίας αὐτοῦ.

Ασκήσεις. 352) Νά αποδειχθῆ ότι διά πᾶν όρθ. τρίγωνον ἀληθεύει

$$\text{ή ισότης } \acute{\epsilon}\varphi \frac{B}{\delta} = \frac{\delta}{\gamma}$$

$$353) \text{ Όμοίως ότι } \epsilon\phi 2B = \frac{2\delta\gamma}{\gamma^2 - \delta^2}.$$

$$354) \text{ Όμοίως ότι συν } (B - \Gamma) = \frac{2\delta\gamma}{\alpha^2}.$$

§ 102. — **Επίλυσις ὀρθογωνίου τριγώνου.** — Ὁ διὰ λήσμου προσδιορισμὸς τῶν ἀγνώστων στοιχείων τριγώνου, ὅταν ἰκανὰ πρὸς τοῦτο στοιχεῖα αὐτοῦ δοθῶσι, καλεῖται **ἐπίλυσις τοῦ τριγ. τούτου** (§ 2).

ΣΗΜ. Κυρίως διὰ τῆς ἐπίλυσεως τριγώνου, ἐπιδιώκεται ὁ προσδιορισμὸς τῶν ἀγνώστων κυρίων στοιχείων αὐτοῦ, ἐκτὸς ἂν ρητῶς ζητητᾶται ἢ ἢ τινὰ ἐκ τῶν δευτερευόντων.

Προκειμένου περὶ ὀρθ. τριγώνου εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς γεωμετρίας ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ κατασκευὴ καὶ κατ' ἀκολουθίαν εἶναι τελείως ὠρισμένον τοιοῦτον τρίγωνον, ἂν δοθῶσι μία πλευρὰ καὶ μία ὀξεῖα γωνία ἢ δύο πλευραὶ αὐτοῦ. Ὅμοίως εἶναι εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας δυνατὸς ὁ ὑπολογισμὸς τῶν ἀγνώστων κυρίων στοιχείων ἢτοι ἡ ἐπίλυσις τοῦ ὀρθ. τριγώνου.

Ἐκατέραν τῶν περιπτώσεων τούτων ὑποδιαιροῦμεν εἰς δύο μερικωτέρως, καθ' ὅσον ἐν μὲν τῇ α' περιπτώσει γνωστὴ πλευρὰ εἶναι ἢ ὑποτείνουσα ἢ μία τῶν καθέτων, ἐν δὲ τῇ β' γνωσταὶ πλευραὶ εἶναι αἱ κάθετοι· πλευραὶ ἢ μία κάθετος καὶ ἡ ὑποτείνουσα.

Διακρίνομεν δὲθεν κατὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν ὀρθ. τριγώνων τέσσαρες περιπτώσεις, ἃς συνοψίζομεν οὕτω :

γνωστὰ στοιχεῖα 1) α, Β 2) β, Β 3) β, γ 4) α, β
 ἀγνώστα στοιχεῖα 1) δ, γ, Γ, Ε 2) α, γ, Γ, Ε 3) α, Β, Γ, Ε 4) γ, Β, Γ, Ε.

Ἡ δὲ ἐπίλυσις ἐν ἐκάστη περιπτώσει γίνεται ὡς ἀκολουθῶς.

§ 103. Α. Περίπτωσης. — **Νὰ ἐπιλυθῇ ὀρθ. τρίγωνον οὗ δίδεται ἡ ὑποτείνουσα α καὶ ἡ ὀξεῖα γωνία Β.**

Αἰετόσητες $\Gamma = 90^\circ - B$, $\delta = \alpha \eta\mu B$ $\gamma = \alpha \sigma\upsilon\nu B$
 ἀρκουσι πρὸς ὄρισμόν τῶν στοιχείων Γ , δ , γ , δι' ἐκτελέσεως τῶν εἰς τὰ β' μέλη σημειουμένων πράξεων.

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἐμβαδὸν Ε παρατηροῦμεν ὅτι μετὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν πλευρῶν δ καὶ γ εὐρίσκεται τοῦτο ἐκ τοῦ τύπου

$$E = \frac{1}{2} \delta\gamma.$$

Ἄν ὁμως θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἀπ' εὐθείας ἐκ τῶν ἀρχικῶς δοθέντων στοιχείων ἀπὸ τὸν τύπον $E = \frac{1}{2} \alpha^2 \eta\mu \beta$ καὶ ἔκταυτο ἀποκρίνομεν τὴν προ-

ηγουμένην ισότητα θέτοντες ἐν αὐτῇ ἀντὶ θ καὶ γ τὰς τιμὰς αὐτῶν συναρτήσῃ τῶν α καὶ B Οὕτως εὐρίσκομεν ὅτι

$$E = \frac{1}{2} \alpha^2 \cdot \eta\mu B \text{ συν} B = \frac{1}{4} \alpha^2 \cdot 2 \eta\mu B \text{ συν} B, \quad \text{ἔθεν}$$

$$E = \frac{1}{4} \alpha^2 \eta\mu (2B) \quad (67)$$

Παράδειγμα.— Ἐστω $\alpha=753\mu$, $B=30^\circ 15' 20''$.

Υπολογισμὸς τῆς Γ .

$$\Gamma = 90^\circ - B$$

90° = 89° 59' 60''
B = 30° 15' 20''

Γ = 59° 44' 40''

Υπολογισμὸς τῆς θ

$$\theta = \alpha \eta\mu B, \quad \text{ἄρα}$$

$$\log \theta = \log \alpha + \log \eta\mu B$$

$$\log \alpha = 2,87679$$

$$\log \eta\mu B = \bar{1},70231$$

$$\log \theta = 2,57910$$

$$\theta = 379,4^\mu$$

Υπολογισμὸς τῆς γ .

$$\gamma = \alpha \text{ συν} B \quad \text{ἄρα}$$

$$\log \gamma = \log \alpha + \log \text{συν} B$$

$$\log \alpha = 2,87679$$

$$\log \text{συν} B = \bar{1},93641$$

$$\log \gamma = 2,81320$$

$$\gamma = 650,43^\mu$$

Υπολογισμὸς τοῦ E . $= \frac{1}{4} \alpha^2 \eta\mu (2B), \quad \text{ἄρα}$

$$\log E = 2 \log \alpha + \log \eta\mu (2B) - \log 4$$

$$2B = 60^\circ 30' 40''$$

$$2 \log \alpha = 5,75358$$

$$\log \eta\mu (2B) = \bar{1},93975$$

$$\text{ἄθροισμα} = 5,69333$$

$$\log 4 = 0,60206$$

$$\log E = 5,09127$$

$$E = 123386,11 \text{ τμ.}$$

ΣΗΜ. Ἐπειδὴ οἱ ἐν τοῖς πίναξιν ἀναγεγραμμένοι λογάριθμοι διαφέρουσι τῶν ἀληθῶν, καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν ὑπολογιζόμενοι λογάριθμοι ὡς καὶ οἱ ἀντίστοιχοι ἀριθμοὶ εὐρίσκονται μὲ προσέγγισιν, ἦν δυνάμεθα ἐκάστοτε νὰ ἐκτιμῶμεν. Οὕτω κατὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς πλευρᾶς θ τοῦ προηγουμένου παραδείγματος εὕρομεν ὅτι $\log \theta = 2,57910$ · ἐπειδὴ ὁμοίως οὗτος εὐρέθη ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ δύο λογαρίθμων, ὧν ἑκάτερος δύναται (§ 77 ὑπόσ) νὰ ἔχη λάθος μικρότερον τοῦ 0,000005, ἔπεται ὅτι καὶ οὗτος δύναται νὸ διαφέρειν τοῦ ἀληθοῦς κατὰ ποσότητα μικροτέραν τοῦ $0,000005 \times 2 = 0,00001$, ἥτοι ὁ ἀληθὴς λογάριθμος τοῦ θ θὰ περιέχεται μεταξὺ 2,57909 καὶ 2,57911· ἔνεκα τούτου ἡ ἀληθὴς τιμὴ τοῦ θ περιέχεται μεταξὺ τῶν εἰς τοὺς λογαρίθμους τούτους ἀντιστοιχοῦντων ἀριθμῶν 379,309 καὶ 379,408.

368). Τὸ ὕψος ὀρθογωνίου εἶναι 5,60^μ, ἢ διαγωνίως σχηματίζει μετὰ τῆς βάσεως γωνίαν 25° 30' 4". Νὰ εὑρεθῇ τὸ μήκος τῆς βάσεως, τῆς διαγωνίου καὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τούτου.

369). Ρόμβου μία γωνία εἶναι 28° 24' 42", ἢ δὲ διὰ τῆς κορυφῆς αὐτῆς ἀγομένη διαγωνίως ἔχει μήκος 8,20^μ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς καὶ τῆς ἄλλης διαγωνίου αὐτοῦ.

370). Τριγωνικῆς πλευρᾶς στέγης ἢ βάσις εἶναι ὀριζόντιος καὶ ἔχει μήκος 4,30^μ, ἢ δὲ κλίσις αὐτῆς πρὸς τὸ διὰ τῆς βάσεως διερχόμενον ὀριζόντιον ἐπίπεδον εἶναι 25° καὶ ἡ κορυφή ἀπέχει τοῦ ἐπιπέδου τούτου, 1,80^μ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς πλευρᾶς ταύτης τῆς στέγης.

371). Ἀνωφερῆς καὶ εὐθεῖα ὁδὸς σχηματίζει γωνίαν 18° μετὰ τοῦ διὰ τοῦ κατωτέρου ἄκρου αὐτῆς διερχομένου ὀριζοντίου ἐπιπέδου, τὸ δὲ ἀνώτατον ἄκρον αὐτῆς ἀπέχει 4^μ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μήκος τῆς ὁδοῦ ταύτης.

§ 105. — Γ' Περίπτωσης. — Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ δίδονται αἱ δύο κἀθετοὶ πλευραὶ. — Ἐκ τῆς ἰσότητος $b = \gamma \epsilon\phi B$ προκύπτει ἢ $\epsilon\phi B = \frac{b}{\gamma}$, δι' ἧς ὑπολογίζεται ἡ Β. εἴτα

ἐκ τῆς $\Gamma = 90^\circ - B$ εὐρίσκεται ἡ Γ· ἐκ δὲ τῆς $a = \frac{b}{\eta\mu B}$ ὀρίζεται ἡ α.

Τέλος τὸ ἐμβαδὸν εὐρίσκεται ἐκ τῆς ἰσότητος $E = \frac{1}{2} b\gamma$.

Παράδειγμα. Ἐστω $b = 3456\mu$ καὶ $\gamma = 1280\mu$.

Ἰπολογισμὸς τῆς Β καὶ Γ.

Ἰπολογισμὸς τῆς α.

$$\epsilon\phi B = \frac{b}{\gamma}, \text{ ἄρα}$$

$$a = \frac{b}{\eta\mu B}, \text{ ἄρα}$$

$$\log \epsilon\phi B = \log b - \log \gamma$$

$$\log a = \log b - \log \eta\mu B$$

$$\log b = 3,53857$$

$$\log b = 3,53857$$

$$\log \gamma = 3,10721$$

$$\log \eta\mu B = \bar{1},97208$$

$$\log \epsilon\phi B = 0,43136$$

$$\log a = 3,56649$$

$$B = 69^\circ 40' 36'' \text{ κατὰ προσ. } 2''.$$

$$a = 3685,41 \text{ κατὰ}$$

$$90^\circ = 89^\circ 59' 60''$$

$$\text{προσ. } 0,09\mu$$

$$B = 69^\circ 40' 36''$$

$$\Gamma = 20^\circ 19' 24''$$

Υπολογισμὸς τοῦ Ε

$$E = \frac{1}{2} \beta \gamma, \text{ ἄρα } \log E = \log \beta + \log \gamma - \log 2$$

$$\log \beta = 3,53857$$

$$\log \gamma = 3,10721$$

$$\text{ἄθροισμα} = 6,64578$$

$$\log 2 = 0,30103$$

$$\log E = 6,34475$$

$$E = 2211800 \text{ τμ. κατὰ προσ. } 100 \text{ τμ}$$

Ἀσκήσεις. 372). Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ $\beta = 256,25 \mu$ καὶ $\gamma = 348 \mu$.

373). Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ $\beta = 48 \mu$ καὶ $\gamma = 36 \mu$.

374). Νὰ ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ $\beta = 2\gamma$ καὶ $\alpha = 3 \mu$.

375). Νὰ εὐρεθῆ ἡ πλευρὰ καὶ αἱ γωνίαι τοῦ ῥόμβου, ὅστις ἔχει διαγωνίους $3,48 \mu$ καὶ $2,20 \mu$.

376). Τὸ κέντρον κύκλου ἀπέχει 8μ ἀπὸ χορδῆς 12μ . Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἀκτίς τοῦ κύκλου καὶ τὰ μέτρα τῶν εἰς τὴν χορδὴν ταύτην ἀντιστοιχοῦντων τόξων.

377). Κινητὸν ἀνήλθεν ἐπὶ ἀνωφεροῦς εὐθυγράμμου ὁδοῦ εἰς ὕψος 15^m , ἐν ᾧ ἡ ὀριζόντιος προβολὴ αὐτοῦ μετεποπίσθη κατὰ 1500 μέτρα. Νὰ εὐρεθῆ ἡ κλίσις τῆς ὁδοῦ ταύτης.

378). Ὁρθογωνίου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εἶναι $940,50$ τ. μ. ἡ δὲ κάθετος πλευρὰ β εἶναι $260,40^m$. Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον τοῦτο.

379) Κλίμαξ ἔχει δέκα βαθμίδας, ὧν ἐκάστη ἔχει πλάτος $0,30^m$ καὶ ἀπέχει τῆς ὑπερκειμένης $0,18^m$. Νὰ εὐρεθῆ ἡ κλίσις αὐτῆς πρὸς τὸ διὰ τῆς βάσεως διερχόμενον ὀριζόντιον ἐπίπεδον.

§ 106. — Δ' Περίπτωσης. — Νὰ ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ δίδεται ἡ ὑποτείνουσα α καὶ ἡ εἰτέρα τῶν καθέτων πλευρῶν β .

Τὴν πλευρὰν γ υπολογίζομεν διὰ τῆς γνωστῆς ἰσότητος

$$\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2 = (\alpha + \beta)(\alpha - \beta).$$

Διὰ τὸν υπολογισμὸν τῶν γωνιῶν Β καὶ Γ ἐργαζόμεθα ὡς ἐξῆς.

Ἐκ τῆς σχέσεως $\beta = \alpha \sin \Gamma$ εὐρίσκομεν $\sin \Gamma = \frac{\beta}{\alpha}$. θέτοντες

δὲ τὴν ὑπὸ ταύτης παρεχομένην τιμὴν τοῦ $\sin \Gamma$ ἐν τῇ γνωστῇ (§ 76) ἰσότητι.

$$\epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{1 - \sin \Gamma}{1 + \sin \Gamma}} \text{ εϋρίσκομεν τήν ισότητα } \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{\alpha - \delta}{\alpha + \delta}},$$

δι' ἧς ὑπολογίζεται ἡ Γ καὶ εὐκόλως εἶτα ἡ B .

Τέλος τὸ ἐμβαδὸν ὑπολογίζομεν ἐκ τῆς ισότητος

$$E = \frac{1}{2} \delta \sqrt{(\alpha + \delta)(\alpha - \delta)}, \text{ ἣν εϋρίσκομεν ἐκ τῆς } E = \frac{1}{2} \delta \gamma, \text{ ἂν ἐν αὐτῇ ἀντὶ } \gamma \text{ τεθῆῃ ἡ τιμὴ αὐτοῦ } \sqrt{(\alpha + \delta)(\alpha - \delta)}. \text{ Ἀπλούστερον ὁμοίως ὑπολογίζεται τοῦτο ἐκ τῆς } E = \frac{1}{2} \delta \gamma, \text{ ἂν προταχθῆῃ } \delta \text{ ὑπολογισμὸς τῆς πλευρᾶς } \gamma.$$

Παράδειγμα. — Ἐστω $\alpha = 15964^m$ καὶ $\delta = 11465^m$.

Βοηθητικὸς πίναξ

$$\alpha = 15964$$

$$\delta = 11465$$

$$\alpha + \delta = 27429$$

$$\alpha - \delta = 4499$$

Ἐπολογισμὸς τῆς Γ .

$$\epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{\alpha - \delta}{\alpha + \delta}}, \text{ ἄρα}$$

$$\log \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = \frac{\log(\alpha - \delta) - \log(\alpha + \delta)}{2}$$

$$\log(\alpha - \delta) = 3,65312$$

$$\log(\alpha + \delta) = 4,43821$$

$$\text{διαφορὰ} = \bar{1},21491$$

$$\log \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = \bar{1},60745$$

$$\frac{\Gamma}{2} = 22^\circ 2' 51'', 66$$

$$\Gamma = 44^\circ 5' 43'', 32$$

Ἐπολογισμὸς τῆς B .

$$90^\circ = 89^\circ 59' 60''$$

$$\Gamma = 44^\circ 5' 43'', 32$$

$$B = 45^\circ 54' 16'', 68$$

Ἐπολογισμὸς τῆς γ

$$\gamma^2 = (\alpha + \delta)(\alpha - \delta), \text{ ἄρα}$$

$$2 \log \gamma = \log(\alpha + \delta) + \log(\alpha - \delta)$$

$$\log(\alpha + \delta) = 4,43821$$

$$\log(\alpha - \delta) = 3,65312$$

$$2 \log \gamma = 8,09133$$

$$\log \gamma = 4,04566$$

$$\gamma = 11108,72 \mu$$

Ἐπολογισμὸς τοῦ E

$$E = \frac{1}{2} \delta \gamma, \text{ ἄρα}$$

$$\log E = \log \delta + \log \gamma - \log 2$$

$$\log \delta = 4,05937$$

$$\log \gamma = 4,04566$$

$$\text{ἄθροισμα} = 8,10503$$

$$\log 2 = 0,30103$$

$$\log E = 7,80400$$

$$E = 63680000 \text{ τ. μ.}$$

ΣΗΜ. α'. Ἡ γωνία Γ εἶναι προτιμώτερον νὰ ὑπολογίζηται διὰ τῆς ἰσότητος
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

τητος εφ $\frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{\alpha - \epsilon}{\alpha + \epsilon}}$ ἢ διὰ τῆς συν $\Gamma = \frac{\epsilon}{\alpha}$, πρῶτον μὲν διότι ἐκ τῆ

ἐφαπτομένης προσδιορίζεται ἀκριβέστερον (§ 83 Β' Σημ.) δεύτερον δὲ διότι γίνεται χρῆσις μόνον τῶν $\log(\alpha - \epsilon)$ καὶ $\log(\alpha + \epsilon)$, οἵτινες χρῆσι-
μοποιοῦνται καὶ διὰ τὴν εὐρεσιν τῆς πλευρᾶς γ.

ΣΗΜ. 6'. Τὸ πηλίκον $\bar{1},21491 : 2$ εὐρίσκομεν προσθέτοντες εἰς τὸ χα-
ρακτηριστικὸν τοῦ διαιρετέου -1 καὶ εἰς τὸ δεκαδικὸν μέρος $+1$ · εἶτα δὲ
διαιροῦμεν χωριστὰ τὸ ἀρνητικὸν καὶ χωριστὰ τὸ θετικὸν μέρος καὶ προ-
στέτομεν τὰ πηλίκια. Οὕτω :

$$\bar{1},21491 : 2 = (-2 + 1,21491) : 2 = -1 + 0,60745 = \bar{1},60745.$$

'**Ασκήσεις.** 380) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, εὖ $\alpha = 25''$ καὶ
 $\beta = 15,25''$.

381) Ἴσοσκελοῦς τριγώνου ἡ βᾶσις εἶναι $5,60''$, ἑκατέρα δὲ τῶν
ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ $5''$. Νὰ ὑπολογισθῆ τὸ ὕψος καὶ αἱ γωνίαι
αὐτοῦ.

382) Ρόμβου ἡ πλευρὰ εἶναι $8''$ καὶ ἡ μικροτέρα διαγώνιος
 $5,30''$. Νὰ εὐρεθῆ τὸ μῆκος τῆς ἄλλης διαγωνίου καὶ αἱ γωνίαι
αὐτοῦ.

383) Ὑπὸ ποίαν γωνίαν φαίνεται κύκλος ἀκτίνος ρ ἀπὸ σημείου
ἀπέχοντος τοῦ κέντρου ἀπόστασιν 2ρ ;

384) Ἡ ἀκτίς κύκλου ἔχει μῆκος $2,40''$. Πόσον ἀπέχῃ τὸ κέν-
τρον ἀπὸ χορδῆς αὐτοῦ μήκους 2 μέτρων ; Πόσον δὲ εἶναι τὸ μέ-
τρον ἑκατέρου τῶν εἰς τὴν χορδὴν ταύτην ἀντιστοιχούντων τόξων ;

385) Κεκλιμένον εἰκόπεδον ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου ΑΒΓΔ δια-
στάσεων $(ΑΒ) = 25''$ καὶ $(ΑΔ) = 15''$. Ἡ βᾶσις τούτου ΑΒ εἶναι
ὀριζόντιος, ἡ δὲ ἀπέναντι πλευρὰ ΓΔ κεῖται $9''$ ὑψηλότερον τοῦ ὀρι-
ζοντίου ἐπιπέδου, ὅπερ διέρχεται διὰ τῆς βάσεως. Νὰ εὐρεθῆ ἡ
κλίσις τοῦ πρὸς τὸ ὀριζόντιον τοῦτο ἐπίπεδον.

386) Ἀμαξοστοιχία διανύει εἰς $5''$ ἀνωφερικὸν εὐθύγραμμον
τμήμα ΒΓ σιδηροδρομικῆς γραμμῆς μετὰ ταχύτητα 30 χιλιομέτρων
καθ' ὥραν. Οὕτω δὲ ἀνέρχεται εἰς ὕψος $500''$ ὑπὲρ τὸ ὀριζόντιον
ἐπίπεδον, ὅπερ διέρχεται διὰ τῆς ἀρχῆς Β τοῦ ῥηθέντος τμήματος
τῆς γραμμῆς. Νὰ εὐρεθῆ ἡ κλίσις τῆς γραμμῆς πρὸς τὸ ῥηθὲν ὀρι-
ζόντιον ἐπίπεδον καὶ τὸ μῆκος τῆς προβολῆς αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ
ἐπίπεδον.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

387) Ὄρθογωνίου ἑκατέρα διαγώνιος ἔχει μῆκος $88''$ καὶ σχη-

ματίζει μετά τῆς μεγαλυτέρας πλευρᾶς γωνίαν $30^{\circ} 40'$. Νὰ εὑρεθῶσιν αἱ διαστάσεις αὐτοῦ.

388) Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ πλευρὰ καὶ αἱ γωνίαι ῥόμβου, ὅστις ἔχει διαγωνίους 40^{μ} καὶ $12,80^{\mu}$.

389) Ἴσοσκελοῦς τριγώνου ἡ βᾶσις ἔχει μήκος $80,30^{\mu}$, ἡ δὲ γωνία τῆς κορυφῆς εἶναι $20^{\circ} 10' 35''$. Νὰ ὑπολογισθῶσιν αἱ ἄλλαι γωνίαι καὶ πλευραὶ αὐτοῦ.

390) Νὰ εὑρεθῶσιν αἱ γωνίαι τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου, οὗτινος ἡ βᾶσις εἶναι τὸ ἡμισυ ἑκατέρας τῶν ἴσων πλευρῶν αὐτοῦ.

391) Εὑρεῖν τὸ ὕψος τοῦ Ἥλιου, καθ' ἣν στιγμὴν ῥάβδος κατακόρυφος μήκους $2,15^{\mu}$ ῥίπτει ἐπὶ ὀριζοντίου ἐδάφους σκιὰν $6,45^{\mu}$.

392) Ἀνύσματος ἡ ἐπὶ ἄξονα προβολὴ εἶναι $3,4^{\mu}$ ἡ δὲ γωνία αὐτοῦ μετὰ τοῦ προβ. ἄξονος εἶναι $25^{\circ} 18' 30''$. Πόσον εἶναι τὸ μήκος τοῦ ἀνύσματος τούτου ;

393) Νὰ εὑρεθῇ τὸ μήκος τῆς χορδῆς τόξου 40° περιφερείας, ἣτις ἔχει ἀκτῖνα 12^{μ} .

394) Αἱ διαστάσεις ὀρθογωνίου ἔχουσι λόγον $\frac{2}{3}$. Νὰ εὑρεθῶσιν αἱ γωνίαι ἑκατέρας μετὰ τινος τῶν διαγωνίων αὐτοῦ.

395) Εἰς κύκλον ἀκτίνος 30^{μ} ἄγεται χορδὴ AB ἔχουσα μήκος $25,30^{\mu}$ καὶ αἱ ἐφαπτόμεναι αὐτοῦ ΑΓ καὶ ΒΓ. Νὰ ὑπολογισθῶσιν αἱ γωνίαι καὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ABΓ.

396) Νὰ ὑπολογισθῶσιν αἱ ἀκτίνες δύο κύκλων, ὧν τὰ κέντρα ἀπέχουσιν ἀλλήλων 714^{μ} , αἱ ἐξωτερικαὶ κοιναὶ αὐτῶν ἐφαπτόμεναι σχηματίζουν γωνίαν $36^{\circ} 8'$ καὶ αἱ ἐσωτερικαὶ $104^{\circ} 12'$.

397) Δύο κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων ἐκτὸς καὶ ἔχουσιν ἀκτῖνα 9^{μ} ὁ μὲν καὶ 4^{μ} ὁ ἕτερος. Νὰ εὑρεθῇ ἡ γωνία τῶν κοινῶν ἐξωτερικῶν ἐφαπτομένων αὐτῶν.

398) Διὰ τοῦ ἄκρου B διαμέτρου AB ἡμιπεριφερείας ἄγομεν ἐφαπτομένην ταύτης καὶ ἐκ τοῦ A εὐθεῖαν τέμνουσαν τὴν μὲν ἡμιπεριφέρειαν εἰς τι σημεῖον Γ τὴν δὲ ἐφαπτομένην εἰς τὸ Δ. Πόση πρέπει νὰ εἶναι ἡ γωνία ταύτης καὶ τῆς διαμέτρου, ἵνα ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης $(A\Delta) = 4 (A\Gamma)$;

399) Τῆς μέσης ὀριζοντίου ἰσημερινῆς παραλλάξεως τοῦ Ἥλιου οὕσης $8''$, 8 νὰ εὑρεθῇ εἰς γῆνας ἰσημερινὰς ἀκτῖνας ἡ ἀπόστασις τῆς Γῆς ἀπὸ τοῦ Ἥλιου.

400) Χορδὴ κύκλου ἰσοῦται πρὸς τὰ $\frac{2}{3}$ τῆς διαμέτρου αὐτοῦ.

Πόσων μοιρών είναι εκάτερον τῶν εἰς τὴν χορδὴν ταύτην ἀντιστοι-
χούντων τόξων ;

401) Νὰ ὑπολογισθῶσιν αἱ ὀξεῖαι γωνίαι ὀρθ. τριγώνου, οὗτινος
αἱ κάθετοι πλευραὶ ἔχουσιν ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν προβολὰς $3^μ$ ἢ
μὲν καὶ $4^μ$ ἢ ἄλλη.

402) Ἡ προβολὴ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν μιᾶς τῶν καθέτων
πλευρῶν ὀρθ. τριγώνου καὶ ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς τῆς ὀρθῆς
γωνίας ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσης ἔχουσι λόγον 7 : 5. Νὰ ὑπολογισθῶ-
σιν αἱ γωνίαι τοῦ ὀρθ. τριγώνου.

403) Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ γωνία τῶν διαγωνίων κύβου.

404) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ δίδεται τὸ ἔμβασδὸν καὶ
ἡ ὑποτείνουσα. Ἐφαρμογὴ. $E=45968$ τ.μ., $a=22840^μ$.

405) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ δίδεται τὸ ἔμβασδὸν καὶ
μία ὀξεῖα γωνία. Ἐφαρμογὴ $E=8940$ τ. μ., $B=48^{\circ} 50'$.

406) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ δίδεται τὸ ἔμβασδὸν καὶ
μία τῶν καθέτων πλευρῶν. Ἐφαρμογὴ διὰ $E=940,50$ τ. μ. καὶ
 $b=260,40^μ$.

§ 107. Ἐπίλυσις ὀρθ. τριγώνου, ὅταν τὰ δεδομέ-
να στοιχεῖα δὲν εἶναι ἀμφοῖτερα ἐκ τῶν κυρίων στοι-
χείων αὐτοῦ. — Ὀρθογώνιον τι τρίγωνον κατασκευάζεται καὶ ὅταν
δοθῶσι δύο τυχόντα στοιχεῖα αὐτοῦ, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἀνεξάρτητα
ἀλλήλων καὶ τὸ ἐν τοῦλάχιστον νὰ εἶναι μῆκος ἢ ἐπιφάνεια. Εἶναι
ἴθιεν ἐκ δύο τοιούτων στοιχείων δυνατὴ ἡ ἐπίλυσις ὀρθ. τριγώνου,
ἥτοι ἡ εὕρεσις τῶν ἀγνώστων κυρίων στοιχείων αὐτοῦ.


Πρὸς τοῦτο ἀκολουθοῦμεν γενικῶς τὴν ἀκόλουθον πορείαν.

Ἐκφράζομεν τὸ δεδομένον ἢ τὰ δεδομένα δευτερεύοντα
στοιχεῖα συναρτήσῃ κυρίων στοιχείων τοῦ τριγώνου. Οὕτως
εὕρισκομεν μίαν ἢ δύο σχέσεις, δι' ὧν τῇ βοήθειᾳ καὶ ἄλλων
ἐκ τῶν συνδεουσῶν τὰ κύρια στοιχεῖα τοῦ τριγώνου προσπα-
θοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν πάντα ἢ τινὰ τῶν ἀγνώστων κυρίων
στοιχείων συναρτήσῃ τῶν δεδομένων. Ὑπολογίζομεν εἴτα
τὰ οὕτως ἐκφρασθέντα στοιχεῖα καὶ ἐξ αὐτῶν καὶ τὰ τυχὸν
ὑπολειπόμενα.

ᾧ παραδείγματα ἔστωσαν τὰ ἀκόλουθα.

§ 108. Παρίδ. 1ον. — Νὰ ἐπιλυθῇ ὀρθ. τρίγωνον ἐκ
τοῦ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ὕψους v καὶ τῆς ὀξείας γωνίας B .
Τοῦ τριγώνου $ΑΒΔ$ (Σχ.46) ὄντος ὀρθογωνίου ἔπεται ὅτι $v=y$ ἢ $μΒ$

ἔθεν $\gamma = \frac{v}{\eta\mu B}$. Ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῶν $\delta = \gamma \epsilon\phi B$, $\alpha = \frac{\gamma}{\sigma\upsilon\nu B}$



(Σχ. 46)

προκύπτουσιν εὐκόλως αἱ ἰσότητες $\delta = \frac{v}{\sigma\upsilon\nu B}$:

$\alpha = \frac{v}{\eta\mu B \cdot \sigma\upsilon\nu B}$. Ἐὰν τέλος ἐν τῇ ἰσότητι

$E = \frac{1}{2} \delta\gamma$ τεθῶσιν αἱ εὐρεθεῖσαι τιμαὶ τῶν τῶν δ καὶ γ προκύπτει ἡ ἰσότης

$$E = \frac{v^2}{2\eta\mu B \sigma\upsilon\nu B} = \frac{v^2}{\eta\mu(2B)}$$

Διὰ τῶν οὕτως εὐρεθεισῶν ἰσοτήτων

$$\gamma = \frac{v}{\eta\mu B}, \delta = \frac{v}{\sigma\upsilon\nu B}, \alpha = \frac{v^2}{\eta\mu B \sigma\upsilon\nu B}, E = \frac{v^2}{\eta\mu(2B)}$$

καὶ τῆς γωνίας $\Gamma = 90^\circ - B$ ἐκφράζονται πάντα τὰ ἀγνωστα στοιχεῖα συναρτήσῃ τῶν δεδομένων v καὶ B . Ὁ δὲ τελικὸς ὑπολογισμὸς αὐτῶν γίνεται κατὰ τὰ γνωστά.

§ 109. Παράδ. 2ον. — *Νὰ ἐπιλυθῇ ὀρθ. τρίγωνον ἐκ τῆς ὑποτείνουσας a καὶ τοῦ ἐπ' αὐτὴν ὕψους v .* Ἐκ τῶν ἰσοτήτων $\delta = a \eta\mu B$, $\gamma = a \sigma\upsilon\nu B$ καὶ $av = \delta\gamma$, ἔπεται εὐκόλως ὅτι $av = a^2 \eta\mu B \sigma\upsilon\nu B$, ἔθεν $2av = a^2 \eta\mu(2B)$, ἄρα $\eta\mu 2B = \frac{2v}{a}$. Ὀριζομένης οὕτω τῆς B εὐρίσκονται κατὰ τὰ γνωστά (§ 103) τὰ στοιχεῖα Γ , δ , γ αὐτοῦ. Τὸ ἐμβαδὸν εὐρίσκεται ἐκ τῆς ἰσότητος

$$E = \frac{1}{2} a \cdot v.$$

ΣΗΜ. Τὰς καθέτους πλευρὰς δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν ἀπ' εὐθείας ἐκ τῶν δεδομένων στοιχείων οὕτω. Ἐπειδὴ $\delta^2 + \gamma^2 = a^2$ καὶ $2\delta\gamma = 2av$, ἔπεται εὐκόλως ὅτι $(\delta + \gamma) = a(\alpha + 2v)$ καὶ $(\delta - \gamma) = a(\alpha - 2v)$, ἐξ ὧν ἔπεται ὅτι:

$$\delta + \gamma = \sqrt{a(\alpha + 2v)}, \quad \delta - \gamma = \sqrt{a(\alpha - 2v)}.$$

Ὀριζομένων οὕτω τῶν $(\delta + \gamma)$ καὶ $(\delta - \gamma)$ ὀρίζονται εὐκόλως εἶτα καὶ αἱ πλευραὶ δ καὶ γ .

§ 110. Παράδ. 3ον. — *Νὰ ἐπιλυθῇ ὀρθ. τρίγωνον ἐκ τῆς ὑποτείνουσας a καὶ τῆς ἀκτίνος ρ τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου.* — Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν ὅτι (Σχ 47)

$$a = (\Gamma E) + (E B) = (\Gamma \Delta) + (B Z).$$

Ἐπειδὴ δὲ $\Gamma \Delta = \delta - (A \Delta) = \delta - \rho$ καὶ $B Z = \gamma - (A Z) = \gamma - \rho$, ἔπεται ὅτι: $(\Gamma \Delta) + (B Z) = \delta - \rho + \gamma - \rho = \delta + \gamma - 2\rho$. Ἄλλ'

ἀφ' ἐτέρου ἐκ τῶν ἰσοτήτων $\delta = x \text{ ἢ } \mu B$, $\gamma = x \text{ συν} B$, προκύπτει ὅτι $\delta + \gamma = x (\text{ἢ } \mu B + \text{συν} B)$, ἢ δὲ προηγουμένη ἰσότης γίνεται


$$a = x(\text{ἢ } \mu B + \text{συν} B) - 2\rho = a\sqrt{2} \text{ ἢ } \mu \left(\frac{\pi}{4} + B \right) - 2\rho.$$

Ἐκ ταύτης ἔπεται ὅτι

$$\text{ἢ } \mu \left(\frac{\pi}{4} + B \right) = \frac{(a + 2\rho)\sqrt{2}}{2a}.$$

Υπολογιζομένης ἐκ ταύτης τῆς γωνίας B , τὰ ἄλλα στοιχεία υπολογίζονται κατὰ τὰ γνωστά (§ 103).

§ 111. Πιράδ. 4ον. — *Νὰ ἐπιλυθῇ ὁρθ. τρίγωνον ἐκ τῆς γωνίας B καὶ τοῦ ἀθροίσματος τῆς ὑποτεινούσης καὶ τοῦ ἐπ' αὐτὴν ὕψους.*



Ἐκ τοῦ ὁρθ. τριγώνου $AB\Delta$ (Σχ. 46) προκύπτει ὅτι: $u = \gamma \text{ ἢ } \mu B$; ἐπειδὴ δὲ εἶναι $\gamma = a \text{ συν} B$, ἔπεται ὅτι $u = a \text{ ἢ } \mu B \cdot \text{συν} B$.

Ἄρα:

$$\mu = a + u = a + a \text{ ἢ } \mu B \text{ συν} B = a(1 + \text{ἢ } \mu B \text{ συν} B) \text{ καὶ ἐπομένως}$$

$$a = \frac{\mu}{1 + \text{ἢ } \mu B \text{ συν} B}. \quad (1)$$

Ἀλλὰ προφανῶς εἶναι $1 + \text{ἢ } \mu B \text{ συν} B = 1 + \frac{1}{2} \text{ ἢ } \mu(2B)$ καὶ ἂν τεθῶ $\acute{\epsilon}\varphi^{\omega} = \frac{1}{2} \text{ ἢ } \mu(2B)$ (ω βοηθητικὴ γωνία), ἔπεται ὅτι

$$1 + \text{ἢ } \mu B \text{ συν} B = 1 + \acute{\epsilon}\varphi^{\omega} = \frac{1}{\text{συν}^2 \omega}. \text{ Ἡ ἰσότης ἄρα (1) γίνεται}$$

$a = \mu \cdot \text{συν}^2 \omega$. Υπολογιζομένης ἐκ ταύτης τῆς a , τὰ ἄλλα στοιχεία υπολογίζονται κατὰ τὰ γνωστά (§ 103).

§ 112. Πιράδ. 5ον. — *Νὰ ἐπιλυθῇ ὁρθ. τρίγωνον ἐκ τῆς ὑποτείνουσας a καὶ τοῦ μήκους δ τῆς διχοτομοῦσης τὴν ὀξείαν γωνίαν B .*

Ἐκ τοῦ ὁρθ. τριγώνου $AB\Delta$ (Σχ. 48) προκύπτει ὅτι

$$\gamma = \delta \cdot \text{συν} \left(\frac{B}{2} \right); \text{ ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῆς } \gamma = a \text{ συν} B \text{ ἔπεται ὅτι}$$

$$\delta \text{ συν} \left(\frac{B}{2} \right) = a \text{ συν} B. \quad (1)$$

Ἀλλ' ἐπειδὴ (ἰσ. 49) εἶναι $\text{συν} B = 2 \text{συν}^2 \left(\frac{B}{2} \right) - 1$, ἡ ἰσότης

(1) γίνεται $\delta \text{ συν} \left(\frac{B}{2} \right) = \alpha \left(2 \text{ συν}^2 \frac{B}{2} - 1 \right)$ ή

$2\alpha \text{ συν}^2 \left(\frac{B}{2} \right) - \delta \text{ συν} \left(\frac{B}{2} \right) - \alpha = 0.$

Λύντες ταύτην πρὸς $\text{συν} \left(\frac{B}{2} \right)$ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{συν} \left(\frac{B}{2} \right) = \frac{\delta \pm \sqrt{\delta^2 + 8\alpha^2}}{4\alpha}$$


Ἐπειδὴ δὲ προφανῶς εἶναι $\sqrt{\delta^2 + 8\alpha^2} > \delta$,

ἡ ρίζα $\frac{\delta - \sqrt{\delta^2 + 8\alpha^2}}{4\alpha}$ εἶναι ἀρνητικὴ καὶ

δέον νὰ ἀπορριφθῆ, διότι τῆς γωνίας $\frac{B}{2}$

οὔσης ἀξείας τὸ $\text{συν} \left(\frac{B}{2} \right)$ εἶναι θετικόν. Ἡ

ἑτέρα ρίζα $\frac{\delta + \sqrt{\delta^2 + 8\alpha^2}}{4\alpha}$ εἶναι παραδεκτὴ,



(Σχ. 48).

ἐφ' ὅσον εἶναι $\delta + \sqrt{\delta^2 + 8\alpha^2} < 4\alpha$. Τοῦ περιορισμοῦ τούτου ἐκ-
πληρουμένου δέον πρὸς ὑπολογισμὸν τῆς B νὰ καταστῆ ἡ παρά-
στασις $\frac{\delta + \sqrt{\delta^2 + 8\alpha^2}}{4\alpha}$ λογιστὴ διὰ τῶν λογαρίθμων. Τοῦτο γίνεται

ὡς ἑξῆς. Ἐξάγοντες τὸν δ ἐκτὸς παρενθέσεως θέτομεν ταύτην ὑπὸ
τὴν μορφήν $\frac{\delta}{4\alpha} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{8\alpha^2}{\delta^2}} \right)$. ἐὰν ἦδη τεθῆ $\text{ἐφ}^2 \omega = \frac{8\alpha^2}{\delta^2}$, ἡ
προηγούμενη παράστασις γίνεται διαδοχικῶς :

$$\frac{\delta}{4\alpha} \left(1 + \sqrt{1 + \text{ἐφ}^2 \omega} \right) = \frac{\delta}{4\alpha} \left(1 + \frac{1}{\text{συν} \omega} \right) = \frac{\delta(1 + \text{συν} \omega)}{4\alpha \text{συν} \omega}$$

$$= \frac{2\delta \text{συν}^2 \left(\frac{\omega}{2} \right)}{4\alpha \text{συν} \omega} = \frac{\delta \text{συν}^2 \left(\frac{\omega}{2} \right)}{2\alpha \text{συν} \omega}. \text{ Ὡστε } \text{συν} \left(\frac{B}{2} \right) = \frac{\delta \text{συν}^2 \left(\frac{\omega}{2} \right)}{2\alpha \text{συν} \omega}.$$

Ἐπολογιζομένης οὕτω τῆς B τὰ ἄλλα στοιχεῖα ὑπολογίζονται κατὰ
τὰ γνωστά (§ 103)

Ἀσκήσεις. 407) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ $B = 54^\circ 14'$
καὶ τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ὕψος εἶναι $7,70^m$.

408) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ $\alpha = 12^m$, ἡ δὲ ἀκτίς τοῦ
ἐγγεγραμμένου κύκλου εἶναι 3^m .

409). Νὰ ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὗ δίδεται τὸ ἐμβασδὸν E καὶ
τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ὕψος Γ. Ἐφαρμογὴ $E = 450 \text{ π. μ.}$, $\Gamma = 15^m$.

410) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδονται αἱ προβολαὶ μ καὶ ν τῶν καθέτων πλευρῶν ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν. Ἐφαρμογὴ διὰ $\mu=9^u$, $\nu=6^u$.

411) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδεται ἡ ὑποτείνουσα α καὶ τὸ ἄθροισμα μ τῶν ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ. Ἐφαρμογὴ διὰ $\alpha=100^u$, $\mu=140^u$.

412) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδεται ἡ ἀκτίς ρ τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου καὶ ἡ διάμεσος $(AM)=\Delta$. Ἐφαρμογὴ διὰ $\rho=3^u$, $\Delta=8^u$.

413) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδονται τὰ δύο μέρη μ καὶ ν , εἰς ἃ διαιρεῖ τὴν ὑποτείνουσαν ἢ διχοτομοῦσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν. Ἐφαρμογὴ διὰ $\mu=4$, 319^u καὶ $\nu=5$, 238^u .

414) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδεται ἡ περίμετρος 2τ καὶ ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς τῆς ὀρθῆς γωνίας ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσης.

415) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδεται ἡ ὀξεία γωνία B καὶ ἡ διαφορὰ δ μεταξὺ τῆς ὑποτείνουσης καὶ τοῦ ἐπὶ ταύτην ὕψους.

416) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ὕψος εἶναι u , διαιρεῖ δὲ τὴν ὑποτείνουσαν εἰς δύο μέρη διαφέροντα κατὰ u . Ἐφαρμογὴ διὰ $u=3^u$.

417) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδεται ἡ γωνία B καὶ τὸ ἄθροισμα λ τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ. Ἐφαρμογὴ διὰ $B=33^\circ 18' 52''$, $\lambda=3180$, 863^u .

418) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδεται ἡ ὑποτείνουσα α καὶ ἡ διαφορὰ λ τῶν ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.

419) Νά ὑπολογισθῆ ἡ ἀκτίς ρ τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου εἰς ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδεται ἡ ὑποτείνουσα α καὶ ἡ γωνία B .

420) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδονται τὰ δύο μέρη μ καὶ ν , εἰς ἃ διαιρεῖ τὴν πλευρὰν b ἢ διχοτομοῦσα τὴν ὀξείαν γωνίαν B .

421) Νά ἐπιλυθῆ ὀρθ. τρίγωνον, οὐ δίδεται ἡ διάμεσος Δ καὶ τὸ ὕψος u , ἅτινα ἄγονται ἐκ τῆς κορυφῆς τῆς ὀρθῆς γωνίας. Ἐφαρμογὴ διὰ $\Delta=2$, $u=\sqrt{3}$.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

§ 113. Τριγωνομετρικαὶ σχέσεις τῶν κυρίων στοι-

ηφιστοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

χείων οἴουδῆποτε τριγώνου. - Α'. Ἐστω ΑΒΓ (Σχ. 49) τυ-
χόν τρίγωνον, Κ τὸ κέντρον τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου, Ρ ἡ ἀκτίς



(Σχ. 49)

αὐτοῦ. Ἡ ἐκ τοῦ κέντρου Κ ἐπὶ τινὰ πλευρὰν π.χ. τὴν ΒΓ κάθετος
τέμνει αὐτὴν εἰς τὸ μέσον Δ· ἐκ δὲ τοῦ ὀρθ. τριγώνου ΒΚΔ ἔπει-
ται ὅτι

$$(B\Delta) = \frac{\alpha}{2} = R \eta\mu(BK\Delta). \quad (1)$$

Καί, ἂν μὲν ἡ γωνία Α εἶναι ὀξεῖα (Σχ 49 α'), θὰ εἶναι προ-
φανῶς ἴση πρὸς $\frac{BK\Delta}{2} = BK\Delta$ καὶ ἡ ἰσότης (1) γίνεσται

$$\frac{\alpha}{2} = R \eta\mu A. \quad (2)$$

Ἐὰν δὲ ἡ Α εἶναι ἀμβλεῖα (Σχ. 49 β') καὶ ληφθῆ ἐπὶ τοῦ ἀν-
τιστοίχου τόξου τυχόν σημεῖον Α', ἀχθῶσι δὲ καὶ αἱ χορδαὶ Α'Β,
Α'Γ, σχηματίζεται τὸ ἐγγεγραμμένον τετράπλευρον ΑΒΑ'Γ, οὗ ἔνε-
κα εἶναι $A + A' = 2\delta\theta\theta$. καὶ ἐπομένως $\eta\mu A = \eta\mu A' = \eta\mu(BK\Delta)$.

Ὅστε πάλιν ἐκ τῆς (1) προκύπτει ἡ (2), ἐξ ἧς προκύπτει ὅτι

$$2R = \frac{\alpha}{\eta\mu A}. \quad \text{Ὁμοίως ἀποδεικνύεται ὅτι καὶ } 2R = \frac{\beta}{\eta\mu B}, 2R = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$$

Ὅθεν
$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \quad (69)$$

Ἄρα : **Αἱ πλευραὶ παντὸς τριγώνου εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ
ἡμίτονα τῶν ἀπέναντι γωνιῶν αὐτοῦ.**

ΣΗΜ. Ἐκ τῶν ἰσοτήτων $\beta = \alpha \eta\mu B$, $\gamma = \alpha \eta\mu \Gamma$, $\eta\mu A = 1$, προκύπτει εὐ-
κόλως ὅτι $\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$ ἢ $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$, ἥτοι αἱ ἰσότητες (69) ἀλη-
θεύουσι καὶ διὰ τὰ ἄλλα τριγώνων.

συν ΔΑΒ = -συν Α, ἢ δὲ ἰσότης (1) γίνεται (ΑΔ) = -γ. συν Α (4).

Ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῆς ἐν τῇ Γεωμετρίᾳ κατὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην ἀποδεικνυομένης σχέσεως (ΒΓ)² = (ΑΒ)² + (ΑΓ)² + 2(ΑΓ)(ΔΓ) προκύπτει πάλιν ἰσότης (3), ἣτις εἶναι οὕτω γενική.

Ὅμοίως ἀποδεικνύεται ὅτι

$$\delta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma \text{ συν } B, \quad \gamma^2 = \alpha^2 + \delta^2 - 2\alpha\delta \text{ συν } \Gamma.$$

Ὡστε μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν παντὸς τριγώνου ὑφίστανται καὶ αἱ σχέσεις:

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= \delta^2 + \gamma^2 - 2 \delta\gamma \text{ συν } A. \\ \delta^2 &= \alpha^2 + \gamma^2 - 2 \alpha\gamma \text{ συν } B. \\ \gamma^2 &= \alpha^2 + \delta^2 - 2 \alpha\delta \text{ συν } \Gamma. \end{aligned} \quad (71)$$

Ἄρα: Τὸ τετράγωνον ἐκάστης πλευρᾶς τριγώνου ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἄλλων πλευρῶν ἡλατωμένον κατὰ τὸ διπλάσιον τοῦ γινομένου αὐτῶν πολυσθέντος καὶ ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς ὑπ' αὐτῶν περιεχομένης γωνίας.

Δ'.—Ἐστω ΑΒΓ (Σχ. 50) τυχὸν τρίγωνον καὶ Ε τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ. Ἐκ τῶν γνωστῶν ἰσοτήτων

$$E = \frac{1}{2} \delta \cdot (B\Delta) \text{ καὶ } (B\Delta) = \gamma \text{ ἢ } (\Delta A B) \text{ προκύπτει ἡ ἰσότης}$$

$$E = \frac{1}{2} \delta\gamma \text{ ἢ } \mu(\Delta \wedge B)$$

Ἐπειδὴ δὲ ἡ γωνία ΔΑΒ εἶναι ἴση (Σχ. 50 α', β') ἢ παραπληρωματικὴ (Σχ. 50 γ') τῆς Α, ἔπεται ὅτι ἢ $\mu\Delta A B = \text{ἢ} \mu A$ καὶ ἢ προηγουμένη ἰσότης γίνεται $E = \frac{1}{2} \delta\gamma \text{ ἢ } \mu A$ (72)

Ἄρα: Τὸ ἔμβαδὸν παντὸς τριγώνου ἰσοῦται πρὸς τὸ ἡμίσιον τοῦ γινομένου δύο πλευρῶν αὐτοῦ πολυσθέντος καὶ ἐπὶ τὸ ἡμίτονον τῆς ὑπ' αὐτῶν περιεχομένης γωνίας.

Ἀσκήσεις. 422) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ πᾶν τρίγωνον ἀληθεύουσιν αἱ ἰσότητες

$$\alpha = \delta \text{ συν } \Gamma + \gamma \text{ συν } B, \quad \delta = \alpha \text{ συν } \Gamma + \gamma \text{ συν } A, \quad \gamma = \alpha \text{ συν } B + \delta \text{ συν } A$$

423) Ὅμοίως ὅτι
$$\frac{\delta + \gamma}{\alpha} = \frac{\text{συν}\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right)}{\text{ἢ}\mu\left(\frac{A}{2}\right)}$$

424) Ὅμοίως ὅτι
$$\frac{\text{ἢ}\mu(A - B)}{\text{ἢ}\mu(A + B)} = \frac{\alpha^2 - \delta^2}{\gamma^2}$$

425) Ὁμοίως ζῆτι $\frac{a^2 + \gamma^2 - \beta^2}{\beta^2 + \gamma^2 - a^2} = \frac{\epsilon\varphi A}{\epsilon\varphi B}$.

426) Ὁμοίως ὅτι $E = 2P^2$ ἢ μA ἢ μB ἢ $\mu \Gamma$.

427) Νὰ καταστή λογιστὴ διὰ τῶν λογαριθμῶν ἢ παράστασις $\eta\mu 2A + \eta\mu 2B + \eta\mu 2\Gamma$ ἂν A, B, Γ εἶναι γωνίαι τοῦ αὐτοῦ τριγώνου.

428) Τριγώνου $AB\Gamma$ ἢ διάμεσος AM σχηματίζει μετὰ τῆς AB γωνίαν ω , μετὰ δὲ τῆς AG γωνίαν φ . Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\gamma \eta\mu \omega - \beta \eta\mu \varphi = 0$.

429) Ἐὰν μεταξὺ τῶν στοιχείων τριγώνου ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης $a = 2\beta \eta\mu \left(\frac{A}{2}\right)$, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τοῦτο δύναται νὰ εἶναι ἰσοσκελὲς τρίγωνον.

430) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ ἐκ τῆς κορυφῆς B τριγώνου $AB\Gamma$ ἀγόμενον ὕψος αὐτοῦ ἰσοῦται πρὸς $2P$ ἢ μA ἢ $\mu \Gamma$.

431) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν τρίγωνον ἀληθεύει ἡ ἰσότης $\beta \sigma\upsilon\nu B + \gamma \sigma\upsilon\nu \Gamma = a \sigma\upsilon\nu (B - \Gamma)$.

432) Ὁμοίως ὅτι $a \eta\mu(B - \Gamma) + \beta \eta\mu(\Gamma - A) + \gamma \eta\mu(A - B) = 0$.

433) Ὁμοίως ὅτι $a \sigma\upsilon\nu A + \beta \sigma\upsilon\nu B + \gamma \sigma\upsilon\nu \Gamma = 4P$ ἢ μA ἢ μB ἢ $\mu \Gamma$.

434) Ὁμοίως ὅτι $\frac{a \eta\mu A + \beta \eta\mu B + \gamma \eta\mu \Gamma}{a \sigma\upsilon\nu A + \beta \sigma\upsilon\nu B + \gamma \sigma\upsilon\nu \Gamma} = B \frac{a^2 + \beta^2 + \gamma^2}{a\beta\gamma}$.

435) Ἐὰν εἶναι $\eta\mu A = 2 \eta\mu B$. $\sigma\upsilon\nu \Gamma$, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι ἰσοσκελὲς.

436) Ἐὰν μεταξὺ τῶν γωνιῶν τριγώνου $AB\Gamma$ ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης $\eta\mu A = \frac{\eta\mu B + \eta\mu \Gamma}{\sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma}$ νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ τρίγωνον τοῦτο εἶναι ὀρθογώνιον.

437) Ἐὰν αἱ πλευραὶ a, β, γ τριγώνου εἶναι, καθ' ἑνὴν ἐγράφησαν τάξιν, ἔρρι ἀξούσης ἀριθμητικῆς προόδου, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι $\beta \epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) \epsilon\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = 1$.

§ 114. Ἐπίλυσις οἰωνδῆποτε τριγώνων, ὧν τὰ δεδομένα στοιχεῖα εἶναι ἐκ τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν.

Ἐκ τῆς γεωμετρίας γνωρίζομεν ὅτι τρίγωνόν τι δύναται νὰ κατασκευασθῆ, ἂν δοθῶσι 3 στοιχεῖα ἐκ τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν αὐτοῦ, ἀρκεῖ ἔν τουλᾶχιστον τούτων νὰ εἶναι πλευρά. Εἶναι 8 δὲν κατὰ τὰς αὐτὰς περιπτώσεις δυνατὴ καὶ ἡ ἐπίλυσις τοῦ τριγώνου.

Ἐντεῦθεν προκύπτουσιν αἱ ἀκόλουθοι τέσσαρες περιπτώσεις ἐπιλύσεως οἰωνδήποτε τριγώνων, αἵτινες καλοῦνται καὶ **κλασσικαὶ** περιπτώσεις.

§ 113, Α'. **Περίπτωσης.** — **Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον, οὗ δίδεται ἡ πλευρὰ a καὶ αἱ γωνίαι B καὶ Γ αὐτοῦ.**

Προφανῶς, ἵνα τὸ πρόβλημα ἔχῃ λύσιν, πρέπει $B + \Gamma < 180^\circ$.

Ἐκ τῆς σχέσεως $A + B + \Gamma = 180^\circ$, ἔπεται ὅτι $A = 180^\circ - (B + \Gamma)$ ἐξ ἧς ἐρίζεται ἡ A .

Ἐκ δὲ τῶν ἰσοτήτων $\frac{a}{\eta\mu A} = \frac{b}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$ προκύπτουσιν αἱ ἰσό-

$$b = \frac{a \eta\mu B}{\eta\mu A}, \quad \gamma = \frac{a \eta\mu \Gamma}{\eta\mu A}.$$

Ἐπειδὴ δὲ $\eta\mu A = \eta\mu(B + \Gamma)$, αὗται

γίνονται $b = \frac{a \eta\mu B}{\eta\mu(B + \Gamma)}, \quad \gamma = \frac{a \eta\mu \Gamma}{\eta\mu(B + \Gamma)}$, δι' ὧν ἐρίζονται αἱ πλευραὶ b καὶ γ συναρτήσῃ τῶν δεδομένων στοιχείων. Τέλος πρὸς εὑρεσιν τοῦ ἐμβαδοῦ θέτομεν ἐν τῇ ἰσότητι $E = \frac{1}{2} b \gamma \eta\mu A$ τὰς προηγούμενως εὑρεθείσας τιμὰς τῶν $b, \gamma, \eta\mu A$ καὶ εὐρίσκομεν ὅτι

$$E = \frac{a^2 \eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma}{2 \eta\mu(B + \Gamma)} \quad (73)$$

Παράδειγμα. — Ἐστω $a = 3475, 6^m, B = 27^\circ 12' 8'',$ καὶ $\Gamma = 50^\circ 40' 15''$.

Ἐπολογισμὸς τῆς A .

$B = 27^\circ 12' 18''$	$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$
$\Gamma = 50^\circ 40' 15''$	$B + \Gamma = 77^\circ 52' 33''$
<hr/> $B + \Gamma = 77^\circ 52' 33''$	<hr/> $A = 102^\circ 7' 27''$

Ἐπολογισμὸς τῆς $b = \frac{a \eta\mu B}{\eta\mu(B + \Gamma)}$ καὶ $\gamma = \frac{a \eta\mu \Gamma}{\eta\mu(B + \Gamma)}$.

$$\log b = \log a + \log \eta\mu B - \log \eta\mu(B + \Gamma)$$

$$\log \gamma = \log a + \log \eta\mu \Gamma - \log \eta\mu(B + \Gamma)$$

$$\log a = 3,54103$$

$$\log a = 3,54103$$

$$\log \eta\mu B = \bar{1},66008$$

$$\log \eta\mu \Gamma = \bar{1},88847$$

$$\hline \text{ἄθροισμα} = 3,20111$$

$$\hline \text{ἄθροισμα} = 3,42950$$

$$\log \eta\mu(B + \Gamma) = \bar{1},99021$$

$$\log \eta\mu(B + \Gamma) = \bar{1},99021$$

$$\log b = 3,21090$$

$$\log \gamma = 3,43929$$

$$b = 1625,18^m$$

$$\gamma = 2749,75^m$$

$$\text{Υπολογισμὸς τοῦ } E = \frac{\alpha \cdot \eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma}{2\eta\mu (B + \Gamma)}$$

$$\log(2E) = 2\log\alpha + \log\eta\mu B + \log\eta\mu \Gamma - \log\eta\mu (B + \Gamma)$$

$$2\log\alpha = 7,08206$$

$$\text{ἄθροισμα} = 6,63061$$

$$\log \eta\mu B = \bar{1},66008$$

$$\log \eta\mu (B + \Gamma) = \bar{1},99021$$

$$\log \eta\mu \Gamma = \bar{1},88847$$

$$\log(2E) = 6,64040$$

$$\text{ἄθροισμα} = 6,63061$$

$$2E = 4369200 \text{ τμ.}$$

$$E = 2184600 \text{ τμ.}$$

Ἀσκήσεις. 438) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 1250^u$, $B = 28^\circ 16'$ καὶ $\Gamma = 56^\circ 20'$.

439) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 333^u$, $A = 33^\circ 33'$ καὶ $B = 55^\circ 55'$.

440) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 140^u$, $B = 24^\circ 24' 24''$ καὶ $\Gamma = 32^\circ 23'$.

441) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ μία πλευρὰ εἶναι 348^u , ἡ ἀπέναντι αὐτῆς γωνία εἶναι $33,3\gamma$ καὶ μία τῶν προσκειμένων γωνιῶν εἶναι $33^\circ 3'$.

442) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 240^u$, $B = 1^\circ 5' 11''$ καὶ $A = 66^\circ 36'$.

443) Εἰς κύκλον ἀκτίνος 3^u ἄγεται χορδὴ ΒΓ ἴση πρὸς τὴν ἀκτίνα καὶ ἐκ τῶν ἄκρων αὐτῆς ἐφαπτόμεναι ΒΑ καὶ ΓΑ. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον ΑΒΓ.

444) Παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ ἡ διαγώνιος ΑΓ ἔχει μῆκος $12,25^u$ καὶ διαιρεῖ τὴν γωνίαν Α εἰς δύο γωνίας, ὧν ἡ μία εἶναι $23^\circ 12'$ ἡ δὲ ἄλλη εἶναι $50^\circ 25'$. Νὰ εὑρεθῶσι τὰ μῆκη τῶν πλευρῶν καὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου τούτου.

445) Ἴσοσκελοῦς τραπεζίου ΑΒΓΔ ἡ μεγαλύτερα βᾶσις ΑΒ ἔχει μῆκος $20,50^u$, ἑκατέρα δὲ τῶν προσκειμένων αὐτῆ γωνιῶν εἶναι 50° . Νὰ εὑρεθῇ τὸ μῆκος ἑκατέρας τῶν ἴσων πλευρῶν αὐτοῦ, γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἡ διαγώνιος ΑΓ διχοτομεῖ τὴν γωνίαν Α τοῦ τραπεζίου τούτου.

§ 116. Β' Περίπτωσης. — Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον, οὗ δίδονται δύο πλευραὶ καὶ ἡ ὑπ' αὐτῶν περιεχομένη γωνία

Ἐστωσαν α, β, Γ τὰ δεδομένα στοιχεῖα καὶ $\alpha > \beta$. Ἐκ τῆς ἰσότητος (70) προκύπτει ὅτι ἐφ $\left(\frac{A - B}{2}\right) = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}$ ἐφ $\left(\frac{A + B}{2}\right)$

Ἐπειδὴ ὁμῶς $A+B+\Gamma=180^\circ$, ἔπεται ὅτι $\frac{A+B}{2} + \frac{\Gamma}{2} = 90^\circ$ καὶ

ἐφ $\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2}$ ἢ δὲ προηγουμένη ἰσότης γίνεται :

$$\varepsilon\varphi \left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta} \sigma\varphi \left(\frac{\Gamma}{2}\right).$$

Διὰ ταύτης ὑπολογίζομεν τὴν διαφορὰν $A-B$ καὶ ἔστω Δ ἡ τιμὴ αὐτῆς. Λύοντες εἶτα τὸ σύστημα $A+B=180^\circ-\Gamma$, $A-B=\Delta$ εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν ἑκατέρας τῶν γωνιῶν A καὶ B . Μεθ' ὃ ἐκ τῆς ἰσότητος $\frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = \frac{\alpha}{\eta\mu A}$ λαμβάνομεν τὴν $\gamma = \frac{\alpha \eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}$, δι' ἧς ὑπολογίζεται ἡ πλευρὰ γ . Τὸ ἔμβαδὸν τέλος ὑπολογίζομεν ἐκ τῆς ἰσότητος

$$E = \frac{1}{2} \alpha \beta \eta\mu \Gamma.$$

ΣΗΜ. α'. Τὴν πλευρὰν γ δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν καὶ ὡς ἐξῆς.

Ἐκ τῶν ἰσοτήτων $\frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B}$ προκύπτει εὐκόλως ἡ ἰσότης

$$\frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = \frac{\alpha+\beta}{\eta\mu A + \eta\mu B}, \text{ ὅθεν } \gamma = \frac{(\alpha+\beta)\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A + \eta\mu B}.$$

Ἐπειδὴ ὁμῶς $\eta\mu\Gamma = 2\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$ καὶ $\eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right) = 2 \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$, ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται :

$$\gamma = \frac{(\alpha+\beta) \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)}.$$

Προτιμᾶται ὁμῶς ταύτης ἡ προηγουμένη $\gamma = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}$, διότι δύο ἐκτῶν χρησιμοποιηθησομένων λογαριθμῶν χρησιμοποιοῦνται καὶ διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ ἔμβαδου.

ΣΗΜ. β'. Ἄν $\alpha=\beta$, θὰ εἶναι καὶ $A=B$ καὶ ἑκατέρα ὑπολογίζεται ἐκ τῆς ἰσότητος $\Gamma+2A=180^\circ$.

Παράδειγμα. Ἐστω $\alpha=3475,6^{\mu}$, $\beta=1625,2^{\mu}$, καὶ $\Gamma=50^\circ 40' 15''$.

Ἐπολογισμὸς τῶν γωνιῶν B καὶ Γ .

$$\varepsilon\varphi \left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta} \sigma\varphi \left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$\log \varepsilon\varphi \left(\frac{A-B}{2}\right) = \log(\alpha-\beta) + \log \sigma\varphi \left(\frac{\Gamma}{2}\right) - \log(\alpha+\beta)$$

Βοηθητικός πίναξ.

$$\begin{aligned} a &= 3475,6 \\ \delta &= 1625,2 \\ \hline a + \delta &= 5100,8 \\ a - \delta &= 1850,4 \\ \Gamma &= 50^\circ 40' 15'' \\ \frac{\Gamma}{2} &= 25^\circ 20' 7'',5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 180^\circ &= 179^\circ 59' 60'' \\ \Gamma &= 50^\circ 40' 15'' \end{aligned}$$

$$A + B = 129^\circ 19' 45''$$

$$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$$

$$A = 102^\circ 7' 45'',5$$

$$180^\circ \quad A = 77^\circ 52' 14'',5$$

$$\eta\mu A = \eta\mu(77^\circ 52' 14'',5)$$

$$\text{Υπολογισμός της } \gamma = \frac{a \eta\mu \Gamma}{\eta\mu A}$$

$$\log \gamma = \log a + \log \eta\mu \Gamma - \log \eta\mu A$$

$$\log a = 3,54103$$

$$\log \eta\mu \Gamma = 1,88847$$

$$\text{ἄθροισμα} = 3,42950$$

$$\log \eta\mu A = 1,99020$$

$$\log \gamma = 3,43930$$

$$\gamma = 2749,8^{\mu}$$

$$\log (a - \delta) = 3,26727$$

$$\log \sigma\phi \left(\frac{\Gamma}{2} \right) = 0,32480$$

$$\text{ἄθροισμα} = 3,59207$$

$$\log (a + \delta) = 3,70764$$

$$\log \epsilon\phi \left(\frac{A - B}{2} \right) = 1,88443$$

$$\left(\frac{A - B}{2} \right) = 27^\circ 27' 53''$$

$$A - B = 74^\circ 55' 46''$$

$$A + B = 129^\circ 19' 45''$$

$$2A = 204^\circ 15' 31''$$

$$2B = 54^\circ 23' 59''$$

$$A = 102^\circ 7' 45'',5$$

$$B = 27^\circ 11' 59'',5$$

$$\text{Υπολογισμός του } E = \frac{1}{2} a \delta \eta\mu \Gamma$$

$$\log(2E) = \log a + \log \delta + \log \eta\mu \Gamma$$

$$\log a = 3,54103$$

$$\log \delta = 3,21090$$

$$\log \eta\mu \Gamma = 1,88847$$

$$\log(2E) = 6,64040$$

$$2E = 4369200 \text{ τ. μ.}$$

$$E = 2184600 \text{ τ. μ.}$$

Ἀσκήσεις. 446) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $a = 300^{\mu}$, $b = 127^{\mu}$ καὶ $\Gamma = 68^\circ 40'$.

447) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $a = 444,44\mu$, $b = 888,88\mu$ καὶ $\Gamma = 40^\circ 44' 44''$.

448) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $b = \frac{3\mu}{4}$, $\gamma = \frac{5\mu}{12}$ καὶ $A = 40^\circ$.

449) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $a = 100\mu$, $b = 75\mu$ καὶ $\Gamma = \frac{5\pi}{9}$.

450) Παράλληλογράμμου αἱ διαγώνιοι τέμνονται ὑπὸ γωνίαν $43^\circ 20'$ καὶ ἔχουσι μήκη 35μ ἢ μία καὶ $16,50\mu$ ἢ ἄλλη. Νὰ εὗρε-

θῶσιν αἱ πλευραί, γωνίαι καὶ τὸ ἔμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου τούτου.

451) Εἰς τὰ ἄκρα χορδῆς ΒΓ ἴσης τῇ ἀκτίνι τοῦ κύκλου, εἰς ὃν ἀνήκει, ἄγονται ἐκ σημείου Α τῆς περιφερείας αἱ χορδαὶ ΑΒ καὶ ΑΓ ἔχουσαι μῆκη $2\sqrt{3}^μ$ ἢ μία καὶ ἡ $4^μ$ ἢ ἄλλη. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τοῦ κύκλου τούτου.

§ 117. Γ' Περίπτωσης. — *Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον, οὗ δίδονται δύο πλευραὶ καὶ μία γωνία κειμένη ἀπέναντι τῆς μιᾶς τῶν δεδομένων πλευρῶν.* — Ἐστῶσαν α, β καὶ Α τὰ δεδο-

μένα στοιχεῖα. Ἐκ τῆς ἰσότητος $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B}$ προκύπτει ἡ ἰσότης

$$\eta\mu B = \frac{\beta \eta\mu A}{\alpha} \quad (1)$$

Ὑπολογιζομένης ἐκ ταύτης τῆς Β εὐρίσκεται εἴτα ἡ Γ ἐκ τῆς ἰσότητος $\Gamma = 180^\circ - (A + B)$ (2)

καὶ ἡ πλευρὰ γ ἐκ τῆς $\gamma = \frac{\alpha \eta\mu \Gamma}{\eta\mu A}$ (3)

Τέλος τὸ ἔμβαδὸν εὐρίσκεται ἐκ τῆς ἰσότητος $E = \frac{1}{2} \alpha \beta \eta\mu \Gamma$.

Διερεύνησις. — Τῆς γωνίας Α περιλαμβανομένης μεταξὺ 0° καὶ 180° , τὸ $\eta\mu A$ εἶναι θετικόν· ἐπειδὴ δὲ οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β εἶναι θετικοί, τὸ β' μέρος τῆς ἰσότητος (1) εἶναι θετικόν. Ἴνα δὲ ὑπάρχη γωνία Β ἔχουσα ἡμίτονον τὸν θετικὸν τοῦτον ἀριθμὸν $\frac{\beta \eta\mu A}{\alpha}$,

πρέπει νὰ εἶναι $\frac{\beta \eta\mu A}{\alpha} \leq +1$, ὅθεν $\beta \eta\mu A \leq \alpha$.

Ἐὰν ἄρα εἶναι $\alpha < \beta \eta\mu A$, οὐδεμία γωνία ταυτοποιεῖ τὴν (1), ἤτοι τὸ πρόβλημα δὲν ἔχει λύσιν.

Ἐὰν εἶναι $\alpha = \beta \eta\mu A$, ἡ ἰσότης (1) γίνεται $\eta\mu B = 1$, ἣν ἐκ τῶν θετικῶν καὶ μικροτέρων 180° γωνιῶν μόνον ἡ $B = 90^\circ$ ταυτοποιεῖ. Αἱ δὲ ἰσότητες (2) καὶ (3) δίδουσι τότε $\Gamma = 90^\circ - A$ καὶ $\gamma = \beta \eta\mu \Gamma = \beta \sin A$. Ἡ λύσις αὕτη εἶναι παραδεκτὴ, ἂν εἶναι $\Gamma > 0$ καὶ $\gamma > 0$, ἤτοι ἂν $A < 90^\circ$.

Ὡστε: Ἐὰν $\alpha = \beta \eta\mu A$ $\begin{cases} A < 90^\circ, & \text{ὕπάρχει μία λύσις.} \\ A \geq 90^\circ, & \text{οὐδεμία ὑπάρχει λύσις.} \end{cases}$

Ἐὰν τέλος εἶναι $\alpha > \beta \eta\mu A$, τὸ β' μέρος τῆς (1) εἶναι μικρότερον τοῦ +1 καὶ ἀπὸ τῆς ἀνάπτυξης τῶν τινάκων εὐρίσκουμεν ὁξείαν

τινα γωνίαν Δ τοιαύτην ὥστε $\eta\mu\Delta = \eta\mu B = \frac{\delta\eta\mu A}{\alpha}$. Ἐπειδὴ ὁμοίως $\eta\mu(180^\circ - \Delta) = \eta\mu\Delta$, τὴν αὐτὴν ἰσότητα (1) ἐπαληθεύει καὶ ἡ γωνία $180^\circ - \Delta$. Δι' ἑκατέραν τῶν τιμῶν τούτων τῆς B αἱ ἰσότητες (2) καὶ (3) παρέχουσιν ἰδίαν τιμὴν ἑκατέρου τῶν ἀγνώστων Γ καὶ Υ ἃς καλέσωμεν δὲ Γ_1 καὶ Υ_1 τὰς ἀντιστοιχοῦσας εἰς τὴν $B = \Delta$ καὶ Γ_2, Υ_2 τὰς εἰς τὴν $B = 180^\circ - \Delta$ ἀντιστοιχοῦσας τιμὰς αὐτῶν.

Ὅττω διὰ $B = \Delta$ θὰ εἶναι $\Gamma_1 = 180^\circ - (A + \Delta)$ καὶ $\Upsilon_1 = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma_1}{\eta\mu A}$

διὰ $B = 180^\circ - \Delta$ » » $\Gamma_2 = \Delta - A$ καὶ $\Upsilon_2 = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma_2}{\eta\mu A}$.

Ἴνα ἡ πρώτη λύσις εἶναι παραδεκτὴ, πρέπει νὰ εἶναι $A + \Delta < 180^\circ$, δι' ὃ καὶ $\eta\mu\Gamma_1 > 0$, ἄρα καὶ $\Upsilon_1 > 0$. Ἴνα δὲ καὶ ἡ β' λύσις εἶναι παραδεκτὴ, πρέπει νὰ εἶναι $A < \Delta$. Τούτων τεθέντων διακρίνομεν δύο περιπτώσεις, καθ' ὅσον εἶναι $A < 90^\circ$, ἢ $A > 90^\circ$.

1η Περίπτωσης, $A < 90^\circ$. — Ἐπειδὴ καὶ $\Delta < 90^\circ$, εἶναι $A + \Delta < 180^\circ$ καὶ ἐπομένως ἡ α' λύσις εἶναι παραδεκτὴ. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν δευτέραν, θὰ εἶναι παραδεκτὴ ἂν εἶναι $A < \Delta$. Ἐπειδὴ δὲ ἀμφότεραι αὗται εἶναι ὀξείαι, τὰ ἡμίτονα αὐτῶν θὰ εἶναι ὁμοίως ἄνισα (§ 40), ἦτοι

$\eta\mu A < \eta\mu\Delta = \frac{\delta\eta\mu A}{\alpha}$, ὅθεν $\alpha < \delta$. Ὡστε :

ἂν $\alpha > \delta\eta\mu A$ καὶ $A < 90^\circ$ $\left\{ \begin{array}{l} \alpha \geq \delta, \text{ ὑπάρχει 1 λύσις} \\ \alpha < \delta, \text{ ὑπάρχουσι 2 λύσεις.} \end{array} \right.$

2α Περίπτωσης, $A > 90^\circ$. — Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ β' λύσις ἀπορρίπτεται, διότι παρέχει ἀρνητικὴν τιμὴν τῆς Γ . Ἴνα δὲ ἡ α' εἶναι παραδεκτὴ, πρέπει $A + \Delta < 180^\circ$ ἢ $A < 180^\circ - \Delta$. Ἐπειδὴ δὲ αἱ γωνίαι A καὶ $180^\circ - \Delta$ εἶναι ἀμφότεραι ἀμβλείαι, θετικαὶ καὶ μικρότεροι 180° , ἡ μικροτέρα θὰ ἔχη μεγαλύτερον ἡμίτονον (§ 40)

ἦτοι $\eta\mu A > \eta\mu(180^\circ - \Delta)$ ἢ $\eta\mu A > \eta\mu\Delta = \frac{\delta\eta\mu A}{\alpha}$, ὅθεν $\alpha > \delta$. Ἐν ἐναν-

τίᾳ περιπτώσει καὶ ἡ λύσις αὕτη ἀπορρίπτεται. Ὡστε :

ἂν $\alpha > \delta\eta\mu A$ καὶ $A > 90^\circ$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{ἂν } \alpha \leq \delta, \text{ οὐδεμίαν ὑπάρχει λύσιν} \\ \alpha > \delta, \text{ μία } \end{array} \right.$

Τὰ πορίσματα τῆς ἀνωτέρω διερευνήσεως συνοψίζομεν ὡς ἀκολούθως. Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

$\alpha < \delta \eta \mu A$	οὐδεμία λύσις	
$\alpha = \delta \eta \mu A$	$\left\{ \begin{array}{l} A < 90^\circ \\ A \geq 90^\circ \end{array} \right.$ μία λύσις	
	 οὐδεμία λύσις	
$\alpha > \delta \eta \mu A$	$\left\{ \begin{array}{l} A < 90^\circ \\ A > 90^\circ \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \alpha \geq \delta \\ \alpha < \delta \end{array} \right.$ μία λύσις
		 δύο λύσεις
		$\left\{ \begin{array}{l} \alpha \leq \delta \\ \alpha > \delta \end{array} \right.$ οὐδεμία λύσις
		 μία λύσις

ΣΗΜ. Εἰς τὰ πορίσματα ταῦτα καταλήγομεν καὶ δι' ἄλλης γεωμετρικῆς μεθόδου περὶ ἧς ὄρα ἡμέτερα Στοιχεῖα Εὐθ. Τριγωνομετρίας.

Παράδειγμα 1ον. — Ἐστω $\alpha = 300''$, $\delta = 456,75''$, καὶ $A = 34^\circ 16'$.

Κατὰ πρῶτον ὑπολογίζομεν τὴν παράστασιν $\delta \eta \mu A$, ἵνα γνωρίσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν λύσεων.

$\log(\delta \eta \mu A) = \log \delta + \log(\eta \mu A) = 2,41022$, ἄρα $\delta \eta \mu A = 257,17''$, ἦτοι $\delta \eta \mu A < \alpha$.

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ $A < 90$ καὶ $\alpha < \delta$, τὸ πρόβλημα ἔχει δύο λύσεις.

Ἦδη θὰ ὑπολογίσωμεν τὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων στοιχείων ἑκάτερου τῶν τριγῶνων, ἅτινα ἀποτελοῦσι τὰς λύσεις ταύτας.

Ἐπολογισμὸς τῶν τιμῶν τῆς Β. $\eta \mu B = \frac{\delta \eta \mu A}{\alpha}$, ἄρα

$\log \eta \mu B = \log \delta + \log \eta \mu A - \log \alpha$

$\log \delta = 2,65968$

$\log \eta \mu A = 1,75054$

ἄθροισμα = 2,41022

$B = 59^\circ 0' 25'',7$

ἄθροισμα = 2,41022

$\log \alpha = 2,47712$

$\log \eta \mu B = 1,93310$

$B' = 180^\circ - B = 120^\circ 59' 34'',3$.

Ἐπολογισμὸς τῶν τιμῶν τῆς Γ.

$A = 34^\circ 16'$

$B = 59^\circ 0' 25'',7$

$B' = 120^\circ 59' 34'',3$

$A + B = 93^\circ 16' 25'',7$

$A + B' = 155^\circ 15' 34'',3$

$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$

$A + B = 93^\circ 16' 25'',7$

$\Gamma_1 = 85^\circ 43' 34'',3$

$A + B' = 155^\circ 15' 34'',3$

$\Gamma_2 = 24^\circ 44' 25'',7$

Ἐπολογισμὸς τῶν τιμῶν τῆς πλευρᾶς γ.

$\gamma_1 = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma_1}{\eta \mu A}$

ἄρα

$\gamma_2 = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma_2}{\eta \mu A}$

ἄρα

$\log \gamma_1 = \log \alpha + \log \eta \mu \Gamma_1 - \log \eta \mu A$, $\log \gamma_2 = \log \alpha + \log \eta \mu \Gamma_2 - \log \eta \mu A$

$$\begin{aligned} \log a &= 2,47712 \\ \log \eta \mu \Gamma_1 &= \bar{1},99929 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \acute{\alpha}\theta\rho\omicron\iota\sigma\mu\alpha &= 2,47641 \\ \log \eta \mu A &= \bar{1},75054 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log \gamma &= 2,72587 \\ \gamma &= 531,95^{\mu} \end{aligned}$$

Υπολογισμός τῶν τιμῶν τοῦ ἐμβαδοῦ.

$$2E_1 = \alpha \delta \eta \mu \Gamma_1. \acute{\alpha}\rho\alpha$$

$$\log(2E_1) = \log \alpha + \log \delta + \log \eta \mu \Gamma_1$$

$$\log \alpha = 2,47712$$

$$\log \delta = 2,65968$$

$$\log \eta \mu \Gamma_1 = \bar{1},99929$$

$$\log(2E_1) = 5,13609$$

$$2E_1 = 136800 \text{ τ.μ.}$$

$$E_1 = 68400 \text{ τ.μ.}$$

$$\begin{aligned} \log a &= 2,47712 \\ \log \eta \mu \Gamma_2 &= \bar{1},62171 \end{aligned}$$

$$\acute{\alpha}\theta\rho\omicron\iota\sigma\mu\alpha = 2,09883$$

$$\log \eta \mu A = \bar{1},75054$$

$$\log \gamma_2 = 2,34829$$

$$\gamma_2 = 222,995^{\mu}$$

$$2E_2 = \alpha \delta \eta \mu \Gamma_2. \acute{\alpha}\rho\alpha$$

$$\log(2E_2) = \log \alpha + \log \delta + \log \eta \mu \Gamma_2$$

$$\log \alpha = 2,47712$$

$$\log \delta = 2,65668$$

$$\log \eta \mu \Gamma_2 = \bar{1},62171$$

$$\log(2E_2) = 4,75851$$

$$2E_2 = 57347,14 \text{ τ.μ.}$$

$$E_2 = 28673,57 \text{ τ.μ.}$$

Παράδειγμα 2ον. — Έστω $\alpha = 900^{\mu}$, $\delta = 1245^{\mu}$ καὶ

$A = 53^{\circ} 12' 20''$. Υπολογίζοντες ὡς προηγουμένως τὴν παράστασιν $\delta \eta \mu A$ εὐρίσκομεν ὅτι αὕτη ἰσοῦται πρὸς $996,98^{\mu}$, ἤτοι $\delta \eta \mu A > \alpha$. Ἄρα τὸ πρόβλημα οὐδεμίαν ἔχει λύσιν.

ΣΗΜ. Ἐὰν δὲν ὑπολογίσωμεν ἐκ τῶν προτέρων τὴν παράστασιν $\delta \eta \mu A$, ἀλλ' ἐπιχειρήσωμεν ἀμέσως τὸν ὑπολογισμόν τῆς B , θέλομεν εὐρεῖν $\log \eta \mu B = 0,04445$, ὅθεν $\eta \mu B > 1$, ὅπερ ἄτοπον.

Ἀσκήσεις. 452) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 560^{\mu}$, $\delta = 840^{\mu}$ καὶ $A = 40^{\circ} 20' 10''$.

453) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 500^{\mu}$, $\delta = 415,5^{\mu}$ καὶ $A = 115^{\circ}$.

454) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 40^{\mu}$, $\delta = 45^{\mu}$ καὶ $A = 50^{\circ} 15'$.

455) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 28^{\mu}$, $\delta = 38^{\mu}$ καὶ $B = 32^{\circ}$.

456) Εἰς κύκλον ἀκτίνος 4μ ἄγεται χορδὴ ΒΓ ἴση πρὸς τὴν ἀκτίνα καὶ ἑτέρα χορδὴ ΒΑ ἴση πρὸς $4\sqrt{3}^{\mu}$. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μῆκος τῆς χορδῆς ΑΓ.

§ 118. Α' Περίπτωσις. — Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον, οὗ δίδονται αἱ τρεῖς πλευραί. — Ἐκ τῆς γνωστῆς (71) σχέσεως

$$\alpha^2 = \delta^2 + \gamma^2 - 2\delta\gamma \sin A \text{ προκύπτει ἡ ἰσότης}$$

$$\sin A = \frac{\delta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\delta\gamma}$$

(1)

Ἐπειδὴ τὸ β' μέλος αὐτῆς δὲν εἶναι λογιστὸν διὰ τῶν λογαρίθμων, ἀναζητοῦμεν ἕτερον τύπον κατάλληλον διὰ τὸν λογισμὸν διὰ τῶν λογαρίθμων. Πρὸς τοῦτο ἐφαρμόζομεν τὸν τύπον

$\epsilon\varphi\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1-\text{συν}\omega}{1+\text{συν}\omega}}$ εἰς τὴν γωνίαν A θέτοντες πρὸ τοῦ ριζικοῦ τὸ +, διότι τῆς γωνίας $\frac{A}{2}$ οὐσης ὀξείας, ἢ $\epsilon\varphi\frac{A}{2}$ εἶναι θετική. Οὕτως εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα

$$\epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{1-\text{συν}A}{1+\text{συν}A}} \quad (2)$$

Λαμβάνοντες δὲ ὑπ' ὄψιν τὴν ὑπὸ τῆς (1) παρεχομένην τιμὴν τοῦ $\text{συν}A$ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\frac{1-\text{συν}A}{1+\text{συν}A} = \frac{1-\frac{\beta^2+\gamma^2-\alpha^2}{2\beta\gamma}}{1+\frac{\beta^2+\gamma^2-\alpha^2}{2\beta\gamma}} = \frac{2\beta\gamma-\beta^2-\gamma^2+\alpha^2}{2\beta\gamma+\beta^2+\gamma^2-\alpha^2} = \frac{(\alpha+\beta-\gamma)(\alpha-\beta+\gamma)}{(\alpha+\beta+\gamma)(\beta+\gamma-\alpha)}$$

Ἐὰν δὲ χάριν συντομίας τεθῆ $\alpha+\beta+\gamma=2\tau$ (3) καὶ ἀφαιρεθῆ ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν μελῶν αὐτῆς ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν 2α , 2β , 2γ , προκύπτουσιν αἱ ἰσότητες

$$\beta+\gamma-\alpha=2(\tau-\alpha), \quad \alpha-\beta+\gamma=2(\tau-\beta), \quad \alpha+\beta-\gamma=2(\tau-\gamma) \quad (4)$$

Ἐνεκα τούτων $\frac{1-\text{συν}A}{1+\text{συν}A} = \frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)}$ ἢ δὲ ἰσότης (2) γίνεται

$$\epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)}}$$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\epsilon\varphi\left(\frac{B}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\beta)}}$ (74)

$$\epsilon\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}{\tau(\tau-\gamma)}}$$

Διὰ τῶν ἰσοτήτων τούτων ὑπολογίζονται αἱ γωνίαι $\frac{A}{2}$, $\frac{B}{2}$ καὶ $\frac{\Gamma}{2}$, εἶτα δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ αἱ A, B, Γ. Δυνάμεθα ὁμῶς νὰ δώσωμεν εἰς τὰς ἰσότητας (74) ἑτέραν μορφήν, δι' ἧς τὰ μέγιστα ἐπιταχύνεται ὁ ὑπολογισμὸς τῶν γωνιῶν. Πρὸς τοῦτο πολυζομεν καὶ διαιροῦμεν τὸ β' μέλος τῆς α' τῶν ἰσοτήτων διὰ $(\tau-\alpha)$ καὶ εὐρίσκομεν

$$\epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = \frac{1}{\tau - \alpha} \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}}. \text{ \textit{ε}άν δ\textit{ε} χάριν συντομίας}$$

$$\text{τεθ\textit{η}} \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}} = \lambda, \text{ \textit{η} προηγούμενη ισότης γίνεται}$$

$$\epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = \frac{\lambda}{\tau - \alpha}$$

$$\text{Όμοίως ε\textit{υ}ρίσκομεν \textit{δ}τι } \epsilon\varphi\left(\frac{B}{2}\right) = \frac{\lambda}{\tau - \beta} \quad (75)$$

$$\epsilon\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \frac{\lambda}{\tau - \gamma}$$

Δι\textit{α} τούτων υπολογίζονται α\textit{ί} γωνία\textit{ι} $\frac{A}{2}, \frac{B}{2}, \frac{\Gamma}{2}$, \textit{ά}\varphi' ο\textit{ύ} προηγούμενως υπολογισθ\textit{η} \textit{δ} λογάριθμος του \textit{λ}.

Πρ\textit{ό}ς \textit{ε}ύρεσιν του \textit{ε}μβ\textit{α}δου \textit{ε}κφράζομεν α\textit{υ}τό συναρτήσει των δεδομένων στοιχείων \textit{ώ}ς \textit{ε}ξ\textit{η}ς. *Εν τ\textit{η} ισότητι $E = \frac{1}{2} \delta\gamma \eta\mu A$ θέτο-

μεν \textit{ἀ}ντ\textit{ί} \textit{η}\mu A τ\textit{ό} 2\textit{η}\mu $\frac{A}{2}$ συν $\frac{A}{2}$ και \textit{ε}ύρίσκομεν

$$E = \delta\gamma \eta\mu \frac{A}{2} \text{ συν } \frac{A}{2} \quad (5).$$

*\textit{Η}δη θ\textit{ά} \textit{ε}κφράσωμεν τ\textit{ό} \textit{η}\mu $\left(\frac{A}{2}\right)$ και συν $\left(\frac{A}{2}\right)$ συναρτήσει των πλευρ\textit{ώ}ν \alpha, \beta, \gamma. Πρ\textit{ό}ς τούτο ει\textit{s} τ\textit{α}s ισότη\textit{τ}αs

$$\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \text{συν} A}{2}} \text{ και } \text{συν}\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \text{συν} A}{2}}$$

θέτομεν τ\textit{η}ν \textit{υ}πό τ\textit{η}s (1) παρεχομένην τιμήν του συν A και \textit{ε}κτελο\textit{ύ}ν\textit{τ}εs ει\textit{s} τ\textit{ά} \textit{υ}πόρριζ\textit{α} μετασχηματισμο\textit{ύ}s \textit{ἀ}ναλόγους πρ\textit{ό}ς του\textit{s} ει\textit{s} τ\textit{ό} \textit{υ}πόρριζον τ\textit{η}s (2) \textit{ε}κτελεσθέν\textit{τ}αs και \textit{ε}χον\textit{τ}εs \textit{υ}π' \textit{δ}ψιν τ\textit{α}s ισότη\textit{τ}αs (3) και (4) \textit{ε}ύρίσκομεν \textit{δ}τι :

$$\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\delta\gamma}}, \text{ συν}\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{\delta\gamma}} \quad (76).$$

*\textit{Η} προηγούμενη \textit{δ}θεν ισότη\textit{s} (5) γίνεται

$$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} \quad (77).$$

Σ\textit{Η}Μ. α'. *Εκ των ισότη\textit{τ}ων $\sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}} = \lambda$ και

$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$ προκύπτουσιν α\textit{ί} ισότη\textit{τ}εs
 $2 \log \lambda = [\log(\tau - \alpha) + \log(\tau - \beta) + \log(\tau - \gamma)] - \log \tau$ και
 \textit{η}φηλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

$2 \log E = [\log(\tau - \alpha) + \log(\tau - \beta) + \log(\tau - \gamma)] + \log \tau$. Έκ τούτων φαίνεται ότι ο $2 \log E$ εύρισκεται, αν εις τὸ κατά τὸν ὑπολογισμόν τοῦ $2 \log \lambda$ εύρισκόμενον ἄθροισμα

$$\log(\tau - \alpha) + \log(\tau - \beta) + \log(\tau + \gamma) \text{ προστεθῆ ὁ } \log \tau.$$

ΣΗΜ. β'. Ἴνα αἱ ὑπὸ τῶν (74) παρεχόμεναι τιμαὶ τῶν ἐφαπτομένων ὄσῃ πραγματικά, πρέπει πάντα τὰ ὑπόρριζα νὰ εἶναι θετικά. Ἐάν δὲ ὑποτεθῆ ὅτι ἡ πλευρὰ α δὲν εἶναι μικροτέρα οὐδεμιᾶς τῶν ἄλλων, οἱ παράγοντες $(\tau - \beta) = \frac{1}{2}(\alpha - \beta + \gamma)$, $(\tau - \gamma) = \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \gamma)$ εἶναι ἀμφότεροι

θετικοί, ὡς καὶ ὁ τ . Ὑπολείπεται ὅθεν ὁ $(\tau - \alpha) = \frac{1}{2}(\beta + \gamma - \alpha)$, ὅστις ἐπίσης πρέπει νὰ εἶναι θετικός· ἵνα δὲ τοῦτο συμβαίῃν πρέπει νὰ εἶναι $\beta + \gamma > \alpha$, ἐπειδὴ δὲ εἶναι προφανῶς καὶ $\alpha + \beta > \gamma$, $\alpha + \gamma > \beta$, καταλήγομεν εἰς τὸν γνωστὸν ἐκ τῆς γεωμετρίας περιορισμὸν.

Παράδειγμα. Ἐστω $\alpha = 4562^m$, 30μ , $\beta = 3964 \mu$, $\gamma = 2872,50 \mu$.

Βοηθητικὸς πίναξ

$$\alpha = 4562,30$$

$$\beta = 3964$$

$$\gamma = 2872,50$$

$$2 \tau = 11398,80$$

$$\tau = 5699,40$$

$$\tau - \alpha = 1137,10$$

$$\tau - \beta = 1735,40$$

$$\tau - \gamma = 2826,90$$

Ὑπολογισμὸς τοῦ $\log \lambda$ καὶ E .

$$\log(\tau - \alpha) = 3,05580$$

$$\log(\tau - \beta) = 3,23940$$

$$\log(\tau - \gamma) = 3,45131$$

$$\text{ἄθροισμα} = 9,74651$$

$$\log \tau = 3,75583$$

$$2 \log \lambda = 5,99068$$

$$\log \lambda = 2,99534$$

$$2 \log E = 13,50234$$

$$\log E = 6,75117$$

$$E = 5638571,428 \tau. \mu.$$

Ὑπολογισμὸς τῆς A .

$$\epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = \frac{\lambda}{(\tau - \alpha)}, \text{ ἄρα}$$

$$\log \epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = \log \lambda - \log(\tau - \alpha)$$

$$\log \lambda = 2,99534$$

$$\log(\tau - \alpha) = 3,05580$$

$$\log \epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = 1,93954$$

$$\frac{A}{2} = 41^\circ 1' 28''$$

$$A = 82^\circ 2' 56''$$

Ὑπολογισμὸς τῆς B .

$$\epsilon\varphi\left(\frac{B}{2}\right) = \frac{\lambda}{(\tau - \beta)}, \text{ ἄρα}$$

$$\log \epsilon\varphi\left(\frac{B}{2}\right) = \log \lambda - \log(\tau - \beta)$$

$$\log \lambda = 2,99534$$

$$\log(\tau - \beta) = 3,23940$$

$$\log \epsilon\varphi\left(\frac{B}{2}\right) = 1,75594$$

$$\frac{B}{2} = 29^\circ 41' 12'', 4$$

$$B = 59^\circ 22' 24'', 8$$

Υπολογισμός τῆς Γ . ἐφ $\frac{\Gamma}{2} = \frac{\lambda}{\tau - \gamma}$, ἄρα

$$\log \text{ἐφ} \left(\frac{\Gamma}{2} \right) = \log \lambda - \log (\tau - \gamma),$$

$$\log \lambda = 2,99534$$

$$\log (\tau - \gamma) = 3,45131$$

$$\log \text{ἐφ} \left(\frac{\Gamma}{2} \right) = \overline{1,54403}$$

$$\frac{\Gamma}{2} = 19^\circ 17' 19''$$

$$\Gamma = 38^\circ 34' 38''$$

Ἀσκήσεις. 457) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, ὅπερ ἔχει πλευρὰς 8μ, 9μ, 10μ.

458) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, ὅπερ ἔχει πλευρὰς 147μ, 247μ καὶ 347μ.

459) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, ὅπερ ἔχει πλευρὰς 7964μ, 10368,6μ καὶ 5872μ.

460) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $b = 47958\mu$, $A = 88^\circ 17'$ καὶ $B = 47^\circ$.

461) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $a = 7843,2\mu$, $b = 4962\mu$ καὶ $\Gamma = 12^\circ 42'$.

462) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $a = 1500\mu$, $b = 1462\mu,8$ καὶ $A = 108^\circ 40'$.

463) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $a = 15642\mu$, $b = 12923\mu$, $\gamma = 8964\mu$.

464) Πόσα τρίγωνα ἔχουσιν $a = 40\mu$, $b = 100\mu$ καὶ $A = 30^\circ$;

465) Αἱ πλευραὶ a , b , γ τριγώνου εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3, 4. Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ γωνίαι αὐτοῦ.

466) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι, ἐὰν μεταξὺ τῶν στοιχείων τριγώνου ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης $E = \tau(\tau - a)$, τὸ τρίγωνον εἶναι ὀρθογώνιον καὶ ἀντιστρόφως.

467) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι εἰς πᾶν τρίγωνον εἶναι

$$(108) \quad 2E = \sqrt{a^2 b^2 \gamma^2 \eta \mu A \eta \mu B \eta \mu \Gamma}.$$

468) Ὁμοίως ὅτι $\eta \mu A + \eta \mu B + \eta \mu \Gamma = \frac{\tau}{P}$,

469) Ὁμοίως ἔστι $(\epsilon - \gamma) \text{ συν} \left(\frac{A}{2} \right) = a \eta \mu \left(\frac{B - \Gamma}{2} \right)$.

470) Ὅμοιως ἔστι

$$\epsilon\gamma\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{A}{2}\right) + \alpha\gamma\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{B}{2}\right) + \alpha\epsilon\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \tau^2.$$

471) Νὰ ἀπαλειφθῇ ἡ γωνία Α μεταξὺ τῶν ἰσοτήτων

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A \quad \text{καὶ} \quad E = \frac{1}{2} \beta\gamma\eta\mu A.$$

472) Νὰ ὑπολογισθῶσιν αἱ γωνίαι Β καὶ Γ τριγώνου,

$$\text{oὐ } A = 60^\circ \quad \text{καὶ} \quad \alpha = \sqrt{3} (\beta - \gamma).$$

473) Τριγώνου ΑΒΓ τὸ ὕψος ΒΔ εἶναι τὸ ἥμισυ τῆς β,

$\alpha = 184,65\mu$ καὶ $\Gamma = 42^\circ 15'$. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

474) Τριγώνου ΑΒΓ ἡ $A = 120^\circ$. Ἀποδείξαι ὅτι $\frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2 - \beta^2}$.

475) Ἐπὶ ἀπεράντου εὐθείας διερχομένης διὰ τοῦ κέντρου Ὁ κύκλου ἀκτίνας ρ ἔστωσαν δύο σημεῖα Α καὶ Α' τοιαῦτα ὥστε εἶναι $(\overline{OA}) = \alpha$ καὶ $(\overline{OA'}) = \beta$. Τίς σχέσεις πρέπει νὰ ὑφίσταται μεταξὺ τῶν α καὶ β, ἵνα ὁ λόγος $\frac{(\overline{MA})}{(\overline{MA'})}$ εἶναι ὁ αὐτὸς διὰ πᾶν σημεῖον Μ τῆς περιφερείας;

ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

§ 119. Α'. Σχέσεις κυρίων στοιχείων τριγώνου πρὸς τὴν ἀκτίνα τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου.

1ον. Ἐκ τῶν γνωστῶν (69) ἰσοτήτων

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2P \quad \text{προκύπτουσιν αἱ ἰσότητες}$$

$$\alpha = 2P \eta\mu A, \quad \beta = 2P \eta\mu B, \quad \gamma = 2P \eta\mu \Gamma. \quad (78)$$

2ον. Ἐκ τῆς ἰσότητος $E = \frac{1}{2} \beta\gamma \eta\mu A$, λαμβάνομεν διαδοχικῶς

$$2E = \beta\gamma \eta\mu A, \quad 2E \cdot \frac{\alpha}{\eta\mu A} \cdot \beta = \gamma. \quad \text{Ἐπειδὴ δὲ} \quad \frac{\alpha}{\eta\mu A} = 2P, \quad \text{αὕτη γίνεται}$$

$$4EP = \alpha\beta\gamma. \quad (79)$$

3ον. Ἐκ τῆς (79) καὶ (77) προκύπτει ὅτι

$$P = \frac{\alpha\beta\gamma}{4E} = \frac{\alpha\beta\gamma}{4\sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}} \quad (80)$$

4ον. Ἐκ τῶν (79) καὶ (78) προκύπτει ὅτι

$$4EP = 8P^3 \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma, \quad \text{ὅθεν}$$

$$E = 2P^2 \eta \mu A \eta \mu B \eta \mu \Gamma. \quad (81)$$

§ 120. Β'. Σχέσεις κυρίων στοιχείων τριγώνου καὶ τῶν ἀκτίνων τοῦ ἐγγεγραμμένου καὶ τῶν παρεγγεγραμμένων κύκλων.

1ον. Αἱ ἐκ τοῦ κέντρου K (Σχ. 51) τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου εἰς τὰς κορυφὰς τοῦ τριγώνου ABΓ ἀγόμεναι εὐθεῖαι διαιροῦσιν αὐτὸ εἰς τρία τρίγωνα, ὧν τὰ ἔμβασθὰ εἶναι κατὰ σειρὰν $\frac{1}{2} \alpha\rho$, $\frac{1}{2} \beta\rho$, $\frac{1}{2} \gamma\rho$, ἔνθα ρ εἶναι ἡ ἀκτίς τοῦ κύκλου K. Ὅθεν

$$E = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} \rho \quad \eta \quad E = \tau \rho \quad (82)$$

2ον) Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (82) καὶ (77) προκύπτει ἡ ἰσότης

$$\rho = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}} \quad (83)$$

(Σχ. 51)

3ον. Παραβάλλοντες τὴν ἰσότητα (83) πρὸς τὴν ἐν (§ 118 Δ') τεθεισάν $\sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}} = \lambda$, βλέπομεν ὅτι $\lambda = \rho$ καὶ κατ'

ἀκολουθίαν αἱ ἰσότητες (75) γίνονται :

$$\epsilon\phi\left(\frac{A}{2}\right) = \frac{\rho}{\tau - \alpha}, \quad \epsilon\phi\left(\frac{B}{2}\right) = \frac{\rho}{\tau - \beta}, \quad \epsilon\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \frac{\rho}{\tau - \gamma}, \quad \delta\theta\epsilon\upsilon$$

$$\rho = (\tau - \alpha) \epsilon\phi\frac{A}{2} = (\tau - \beta) \epsilon\phi\frac{B}{2} = (\tau - \gamma) \epsilon\phi\frac{\Gamma}{2} \quad (84)$$

4ον. Ἐστω ρ_a ἡ ἀκτίς καὶ K' τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, ὅστις εἰ- παρεγγεγραμμένος εἰς τὸ τρίγωνον ABΓ καὶ ἐγγεγραμμένος εἰς τὴν γωνίαν A αὐτοῦ. Ἀγομένων τῶν εὐθειῶν K'A, K'B, K'Γ σχηματίζονται τὰ τρίγωνα K'AB, K'AG, K'BG, ὧν τὰ ἔμβασθὰ εἶναι κατὰ

$$\text{σειρὰν } \frac{1}{2} \gamma\rho_a, \frac{1}{2} \beta\rho_a, \frac{1}{2} \alpha\rho_a,$$

Ἐπειδὴ δὲ $(AB\Gamma) = (K'AB) + (K'AG) - (K'BG)$, ἔπεται ὅτι

$$E = \frac{\gamma + \delta - \alpha}{6} \cdot \rho_a \quad \eta \quad E = (\tau - \alpha) \cdot \rho_a,$$

ἔθεν

$$\rho_a = \frac{E}{\tau - \alpha} = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \delta)(\tau - \gamma)}{\tau - \alpha}}$$

Ὅμοιως ἀποδεικνύομεν ὅτι

$$\rho_\beta = \frac{E}{\tau - \beta} = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \gamma)}{\tau - \delta}} \quad (85)$$

$$\rho_\gamma = \frac{E}{\tau - \alpha} = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \delta)}{\tau \gamma}}$$

ἐνθα ρ_β, ρ_γ εἶναι αἱ ἀκτῖνες τῶν κύκλων, οἵτινες εἶναι παρεγγεγραμμένοι εἰς τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ ἐγγεγραμμένοι ὁ μὲν εἰς τὴν γωνίαν B ὁ δὲ εἰς τὴν Γ αὐτοῦ.

ἕον. Ἐκ τῶν ἰσοτήτων $E = \tau \cdot \rho$, $E = (\tau - \alpha)\rho_a$, $E = (\tau - \delta)\rho_\beta$, $E = (\tau - \gamma)\rho_\gamma$ διὰ πολισμοῦ κατὰ μέλη προκύπτει ἡ ἰσότης

$$E = \tau(\tau - \alpha)(\tau - \delta)(\tau - \gamma) \rho \rho_a \rho_\beta \rho_\gamma = E^2 \rho \rho_a \rho_\beta \rho_\gamma, \quad \delta\theta\epsilon\nu$$

$$E = \sqrt{\rho \rho_a \rho_\beta \rho_\gamma} \quad (86)$$

἖ον) Ἡ α' τῶν ἰσοτήτων (85) διὰ πολισμοῦ ἀμφοτέρων τῶν ὀρων τοῦ ὑπορρίζου ἐπὶ τ γίνεται

$$\rho_a = \sqrt{\frac{\tau^2(\tau - \delta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}} = \tau \cdot \sqrt{\frac{(\tau - \delta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}}$$

Ἐπειδὴ δὲ (74) ὁ τελευταῖος παράγων ἰσοῦται τῇ ἐφ $\left(\frac{A}{2}\right)$,

ἡ ἰσότης αὕτη γίνεται

$$\rho_a = \tau \cdot \epsilon\phi \left(\frac{A}{2}\right)$$

Ὅμοιως ἀποδεικνύεται ὅτι

$$\rho_\beta = \tau \cdot \epsilon\phi \left(\frac{B}{2}\right) \quad (87)$$


$$\rho_\gamma = \tau \cdot \epsilon\phi \left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

§ 121. Γ'. Σχέσεις τῶν ὕψων τριγώνου πρὸς ἄλλα στοιχεῖα αὐτοῦ.

1ον. Ἐστωσαν $\Upsilon_a, \Upsilon_\beta, \Upsilon_\gamma$ τὰ ἐκ τῶν κορυφῶν A, B, Γ ἀγόμενα ὕψη τριγώνου $AB\Gamma$ (Σχ. 52). Ἐκ τῶν ἰσοτήτων

$E = \frac{1}{2} \alpha \cdot \Upsilon_a$ καὶ $E = \frac{1}{2} \delta \gamma \eta\mu A$ προκύπτει ἡ ἰσότης $\alpha \cdot \Upsilon_a = \delta \gamma \eta\mu A$. Ἐπει-

δὴ δὲ (§ 115) $\delta = \frac{\alpha \eta\mu B}{\alpha \eta\mu A}$ καὶ $\gamma = \frac{\alpha \eta\mu \Gamma}{\eta\mu A}$



(Σχ. 52)

ή προηγούμενη ισότητα γίνεται $\alpha \Upsilon_{\alpha} = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$ $\delta \theta \epsilon \nu$

$$Y_{\alpha} = \frac{\alpha \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$$

Όμοίως αποδεικνύεται ότι $Y_{\beta} = \frac{\beta \eta \mu A \eta \mu \Gamma}{\eta \mu B}$ (88)

$$Y_{\gamma} = \frac{\gamma \eta \mu A \eta \mu B}{\eta \mu \Gamma}$$

2ον. Έκ τών ὀρθ. τριγώνων $\Lambda \Delta \Gamma$, $\Lambda \Delta B$, $B \Gamma E$, $A B E$, $B \Gamma Z$, $\Lambda \Gamma Z$ προκύπτουσιν αἱ ἰσότητες.

$$Y_{\alpha} = \beta \eta \mu \Gamma = \gamma \eta \mu B, Y_{\beta} = \alpha \eta \mu \Gamma = \epsilon \eta \mu A, Y_{\gamma} = \alpha \eta \mu B = \delta \eta \mu A \quad (89)$$

3ον. Ἐπειδὴ $E = \frac{1}{2} \alpha \cdot Y_{\alpha}$ καὶ $E = \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}$ ἔπεται εὐκόλως ὅτι

$$Y_{\alpha} = \frac{2}{\alpha} \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}$$

Όμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $Y_{\beta} = \frac{2}{\beta} \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}$ (90)


$$Y_{\gamma} = \frac{2}{\gamma} \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}$$

4ον. Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (89) καὶ (78) προκύπτουσιν αἱ ἰσότητες

$$Y_{\alpha} = 2P \eta \mu B \eta \mu \Gamma, Y_{\beta} = 2P \eta \mu A \eta \mu \Gamma, Y_{\gamma} = 2P \eta \mu A \eta \mu B. \quad (91)$$

§ 122. Α'. Σχέσεις τῶν διαμέσων τριγώνου πρὸς ἄλλα στοιχεία αὐτοῦ.

1ον. Ἐστώσαν μ_{α} , μ_{β} , μ_{γ} αἱ ἐκ τῶν κορυφῶν A , B , Γ ἀγόμεναι διάμεσοι τριγώνου $AB\Gamma$ (Σχ. 53). Ἐπὶ τῆς προεκβολῆς μιᾶς τούτων π. χ. τῆς $(A\Delta) = \mu_{\alpha}$, ἄς ληφθῆ $(\Delta E) = (A\Delta)$ καὶ ἄς ἀχθῶσιν αἱ εὐθεταὶ BE καὶ ΓE . Ἐκ τοῦ οὕτω σχηματιζομένου παραλλη-



(Σχ. 53)

λογράμμου $ABEG$ προκύπτει ὅτι $\hat{A}BE + \hat{A} = 2$ ὀρθ. καὶ $(BE) = (A\Gamma) = \beta$. Ἐὰν ἤδη ἐφαρμόσωμεν εἰς τὸ τρίγωνον ABE τὴν ἰδιότητα (§ 113 Γ') εὐρίσκομεν ὅτι

$$(AE)^2 = \delta^2 + \gamma^2 - 2\delta\gamma \text{ συν}(ABE) = \delta^2 + \gamma^2 + 2\delta\gamma \text{ συν } A, \text{ ὅθεν}$$

$$\mu^2_\alpha = \frac{\delta^2 + \gamma^2}{4} + \frac{\delta\gamma}{2} \text{ συν } A$$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι

$$\mu^2_\beta = \frac{\delta^2 + \gamma^2}{4} + \frac{\alpha\gamma}{2} \text{ συν } B \quad (92)$$

$$\mu^2_\gamma = \frac{\alpha^2 + \delta^2}{4} + \frac{\alpha\delta}{2} \text{ συν } \Gamma$$

2ον. Ἐφαρμόζοντες τὴν ιδιότητα (§113Γ') εἰς ἑκάτερον τῶν τριγώνων ΑΔΒ καὶ ΑΔΓ εὐρίσκομεν ὅτι

$$\mu^2_\alpha = \gamma^2 + \frac{\alpha^2}{4} - \alpha\gamma \text{ συν } B = \delta^2 + \frac{\alpha^2}{4} - \alpha\delta \text{ συν } \Gamma.$$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι

$$\mu^2_\beta = \gamma^2 + \frac{\delta^2}{4} - \delta\gamma \text{ συν } A = \alpha^2 + \frac{\delta^2}{4} - \alpha\delta \text{ συν } \Gamma \quad (93)$$

$$\mu^2_\gamma = \delta^2 + \frac{\gamma^2}{4} - \delta\gamma \text{ συν } A = \alpha^2 + \frac{\gamma^2}{4} - \alpha\gamma \text{ συν } B.$$

3ον. Ἐκ τῶν ἐν τῇ Γεωμετρικῇ ἀποδεικνυομένων ἰσοτήτων

$$\delta^2 + \gamma^2 = 2\mu^2_\alpha + 2\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2, \alpha^2 + \gamma^2 = 2\mu^2_\beta + 2\left(\frac{\delta}{2}\right)^2 \text{ καὶ}$$

$$\alpha^2 + \delta^2 = 2\mu^2_\gamma + 2\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 \text{ προκύπτουσιν αἱ ἀκόλουθοι ἰσότητες}$$

$$\mu^2_\alpha = \frac{\delta^2 + \gamma^2}{2} - \frac{\alpha^2}{4}, \mu^2_\beta = \frac{\alpha^2 + \gamma^2}{2} - \frac{\delta^2}{4}, \mu^2_\gamma = \frac{\alpha^2 + \delta^2}{2} - \frac{\gamma^2}{4} \quad (94)$$

§ 123. Ε'. Σχέσεις τῶν διχοτομοῦσων τὰς γωνίας τρι-

γώνου πρὸς ἄλλα στοιχεῖα αὐτοῦ.

1ον. Ἐστωσαν $\delta_\alpha, \delta_\beta, \delta_\gamma$ τὰ μήκη τῶν διχοτομοῦσων τὰς γωνίας τριγώνου ΑΒΓ (Σχ 54).

Ἐπειδὴ $(AB\Gamma) = (AB\Delta) + (A\Delta\Gamma)$, ἔπεται ὅτι


$$\frac{1}{2} \delta\gamma \eta\mu A = \frac{1}{2} (\delta + \gamma) \delta_\alpha \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right), \text{ ὅθεν}$$

$$\delta_\alpha = \frac{2\delta\gamma}{\delta + \gamma} \text{ συν}\left(\frac{A}{2}\right)$$

$$\delta_\beta = \frac{2\alpha\gamma}{\alpha + \gamma} \text{ συν}\left(\frac{B}{2}\right) \quad (95)$$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι

$$\delta_\gamma = \frac{2\alpha\delta}{\alpha + \delta} \text{ συν}\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$



2ον. Λαμβανομένου υπ' ὄψιν ὅτι συν $\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{\tau(\tau-\alpha)}{\delta\gamma}}$ ἢ α'.

τῶν προειρημένων ἰσοτήτων γίνεται $\delta_\alpha = \frac{2}{\delta+\gamma} \sqrt{\tau(\tau-\alpha)\delta\gamma}$
 ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\delta_\beta = \frac{2}{\alpha+\gamma} \sqrt{\tau(\tau-\delta)\alpha\gamma}$ (96)

$$\delta_\gamma = \frac{2}{\alpha+\delta} \sqrt{\tau(\tau-\alpha)\alpha\delta}$$

3ον. Ἐπειδὴ $\delta = 2P \eta \mu B$, $\gamma = 2P \eta \mu \Gamma$, ἢ α' τῶν ἰσοτήτων (95)

γίνεται $\delta_\alpha = \frac{8P^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma \cdot \text{συν}\left(\frac{A}{2}\right)}{2P(\eta \mu B + \eta \mu \Gamma)} = \frac{8P^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma \cdot \text{συν}\left(\frac{A}{2}\right)}{4P \text{συν}\left(\frac{A}{2}\right) \text{συν}\left(\frac{B-A}{2}\right)}$, ὅθεν

$$\delta_\alpha = \frac{2 P \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\text{συν}\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right)}$$

$$\delta_\beta = \frac{2 P \eta \mu A \eta \mu \Gamma}{\text{συν}\left(\frac{A-\Gamma}{2}\right)} \quad (97)$$

ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι

$$\delta_\gamma = \frac{2 P \eta \mu A \eta \mu B}{\text{συν}\left(\frac{A-B}{2}\right)}$$

4ον. Ἐκ τῶν τριγώνων $AB\Delta$ καὶ $A\Delta\Gamma$ προκύπτουσιν εὐκόλως αἱ ἰσότητες $\frac{(B\Delta)}{\eta \mu\left(\frac{A}{2}\right)} = \frac{\delta_\alpha}{\eta \mu B}$, $\frac{(\Delta\Gamma)}{\eta \mu\left(\frac{A}{2}\right)} = \frac{\delta_\alpha}{\eta \mu \Gamma}$ ἐξ ὧν

$$(B\Delta) + (\Delta\Gamma) = \frac{\delta_\alpha \eta \mu\left(\frac{A}{2}\right) (\eta \mu B + \eta \mu \Gamma)}{\eta \mu B \eta \mu \Gamma}$$
 ἄρα


$$\delta_\alpha = \frac{\alpha \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\eta \mu\left(\frac{A}{2}\right) (\eta \mu B + \eta \mu \Gamma)}$$

ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\delta_\beta = \frac{\beta \eta \mu A \eta \mu \Gamma}{\eta \mu\left(\frac{B}{2}\right) (\eta \mu A + \eta \mu \Gamma)}$ (98)

$$\delta_\gamma = \frac{\gamma \eta \mu A \eta \mu B}{\eta \mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) (\eta \mu A + \eta \mu B)}$$

§ 124. ΣΤ'. Σχέσεις τῶν διχοτομοῦσῶν τὰς ἐξωτερικὰς γωνίας τριγώνου πρὸς ἄλλα στοιχεῖα αὐτοῦ

1ον. Ἐστώσαν $\Delta_\alpha, \Delta_\beta, \Delta_\gamma$ τὰ μήκη τῶν διχοτομοῦσῶν τὰς ἐξω-



τερικὰς γωνίας A, B, Γ τριγώνου $AB\Gamma$ (Σχ. 55). Ἀχθείσης μιᾶς τούτων π. χ. τῆς $(A\Delta')$ $= \Delta_\alpha$ σχηματίζονται τὰ τρίγωνα $\Delta' A\Gamma$ καὶ $\Delta' AB$, ὧν διαφορά εἶναι τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$. Ἐκφράζοντες δὲ τὴν τοιαύτην μεταξὺ

τῶν τριγώνων τούτων σχέσιν καὶ ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τὸ μὲν τὴν ιδιότητα (§ 113 Δ'), τὸ δὲ ὅτι ἡ $A\Delta'$ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν $A\Delta$, ἥτις διχοτομεῖ τὴν ἐσωτερικὴν γωνίαν A , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\frac{1}{2} \beta \gamma \eta\mu A = \frac{1}{2} \epsilon \Delta_\alpha \eta\mu \left(90^\circ + \frac{A}{2} \right) - \frac{1}{2} \gamma \Delta_\alpha \eta\mu \left(90^\circ - \frac{A}{2} \right).$$

Ἐπειδὴ δὲ $\eta\mu A = 2\eta\mu \left(\frac{A}{2} \right) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{A}{2} \right)$, $\eta\mu \left(90^\circ + \frac{A}{2} \right) = \sigma\upsilon\nu \left(\frac{A}{2} \right)$

καὶ $\eta\mu \left(90^\circ - \frac{A}{2} \right) = \sigma\upsilon\nu \left(\frac{A}{2} \right)$, ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται

$$\beta \gamma \eta\mu \left(\frac{A}{2} \right) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{A}{2} \right) = \frac{1}{2} \Delta_\alpha (\beta - \gamma) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{A}{2} \right), \quad \delta\theta\epsilon\nu$$

$$\Delta_\alpha = \frac{2\beta\gamma}{\beta - \gamma} \eta\mu \left(\frac{A}{2} \right)$$

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\Delta_\beta = \frac{2\alpha\gamma}{\alpha - \gamma} \eta\mu \left(\frac{B}{2} \right)$ (99)

$$\Delta_\gamma = \frac{2\alpha\beta}{\alpha - \beta} \eta\mu \left(\frac{\Gamma}{2} \right)$$

ΣΗΜ. Οἱ παρονομαστὰ τῶν ἰσοτήτων τούτων εἶναι θετικοί, ὡς εὐκόλως βεβαιούμεθα. Πρέπει λοιπὸν νὰ προσέχωμεν ὅπως μὴ ποτε μικροτέρα πλευρὰ τεθῆ μειωτέος καὶ μεγαλυτέρα ἀφαιρετέος.

2ον. Ἐὰν εἰς τὰς ἰσοτήτας (99) ἀντικατασταθῶσι τὰ $\eta\mu \left(\frac{A}{2} \right)$,

$\eta\mu \left(\frac{B}{2} \right)$, $\eta\mu \left(\frac{\Gamma}{2} \right)$ διὰ τῶν ὑπὸ τῶν ἰσοτήτων (76) παρεχομένων

τιμῶν αὐτῶν, προκύπτουσιν αἱ ἰσότητες

$$\Delta_{\alpha} = \frac{2}{\delta - \gamma} \sqrt{(\tau - \delta)(\tau - \gamma)} \delta \gamma, \quad \Delta_{\beta} = \frac{2}{\alpha - \gamma} \sqrt{(\tau - \alpha)(\tau - \gamma)} \alpha \gamma$$

(100)

$$\Delta_{\gamma} = \frac{2}{\alpha - \delta} \sqrt{(\tau - \alpha)(\tau - \delta)} \alpha \delta.$$

3ον. Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (78) καὶ (99) προκύπτουσιν αἱ ἰσοότητες

$$\Delta_{\alpha} = \frac{2P\eta\mu B\eta\mu\Gamma}{\eta\mu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right)}, \quad \Delta_{\delta} = \frac{2P\eta\mu A\eta\mu\Gamma}{\eta\mu\left(\frac{A-\Gamma}{2}\right)}, \quad \Delta_{\gamma} = \frac{2P\eta\mu A\eta\mu B}{\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)} \quad (101)$$

Ἀσκήσεις. 476) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $A=38^{\circ} 25'$, $B=54^{\circ} 35' 28''$ καὶ $P=0,45^{\mu}$.

477) Εἰς τυχὸν σημεῖον περιφερείας ἀκτῖνος $0,25^{\mu}$ ἄγομεν ἐφαπτομένην καὶ ἐκ τοῦ σημείου τῆς ἐπαφῆς δύο χορδὰς, ὧν ἡ μὲν σχηματίζει μετὰ τοῦ ἐνὸς μέρους τῆς ἐφαπτομένης γωνίαν $47^{\circ} 15'$, ἡ δὲ ἄλλη μετὰ τοῦ ἐτέρου μέρους τῆς ἐφαπτομένης γωνίαν $56^{\circ} 40'$. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἀπόστασις τῶν μὴ κοινῶν ἄκρων τῶν χορδῶν τούτων.

478) Πόση εἶναι ἡ P τριγώνου, οὗ $\alpha=5^{\mu}$, καὶ $\delta=8^{\mu}$ καὶ $\gamma=10^{\mu}$;

479) Πόση εἶναι ἡ P τριγώνου, οὗ $\alpha=2,15^{\mu}$ καὶ $A=34^{\circ} 15'$;

480) Πόση εἶναι ἡ ρ τριγώνου, οὗ $\alpha=3,50^{\mu}$, $\delta=2,25^{\mu}$ καὶ

$\gamma=4^{\mu}$;

481) Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ ἀκτῖνες $\rho_{\alpha}, \rho_{\beta}, \rho_{\gamma}$ τῶν παρεγγεγραμμένων κύκλων εἰς τρίγωνον, οὗ $\alpha=1^{\mu}$, $\delta=3^{\mu}$ καὶ $\gamma=2,5^{\mu}$.

482) Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τριγώνου, δι' ὃ εἶναι $\rho=2^{\mu}$, $\rho_{\alpha}=6^{\mu}$, $\rho_{\beta}=7^{\mu}$ καὶ $\rho_{\gamma}=7,5^{\mu}$;

483) Τριγώνου εἶναι $\alpha=8^{\mu}$, $\delta=10^{\mu}$ καὶ $\gamma=12^{\mu}$. Εὐρεῖν τὰ ποσὰ $\rho, \rho_{\alpha}, \rho_{\beta}, \rho_{\gamma}$.

484). Εὐρεῖν τὰς γωνίας τριγώνου, οὗ $2\tau=30^{\mu}$, $\rho_{\alpha}=6^{\mu}$, $\rho_{\beta}=10^{\mu}$ καὶ $\rho_{\gamma}=7,5^{\mu}$.

485) Εὐρεῖν τὰ ὕψη τοῦ τριγώνου, οὗ $\alpha=6^{\mu}$, $\delta=8^{\mu}$ καὶ $\gamma=10^{\mu}$.

486). Εὐρεῖν τὰ ὕψη τοῦ τριγώνου, οὗ $A=35^{\circ}$, $B=40^{\circ} 40'$ καὶ $P=6^{\mu}$.

487). Εὐρεῖν τὰς διχοτόμους τῶν γωνιῶν τριγώνου, οὗ $\alpha=4^{\mu}$, $\delta=5^{\mu}$ καὶ $\gamma=6^{\mu}$.

488). Τὸ αὐτὸ διὰ τὸ τρίγωνον, οὗ $A=62^{\circ}$, $B=55^{\circ}$ καὶ $P=15^{\mu}$.

489). Εὐρεῖν τὰς διχοτόμους τῶν ἐξωτερικῶν γωνιῶν τριγώνου, οὗ $\alpha=12\mu$, $\delta=30\mu$ καὶ $\gamma=20\mu$.

490). Τὸ αὐτὸ διὰ τὸ τρίγωνον, οὗ $A=25^\circ$, $B=147^\circ 12'$ καὶ $P=2^μ$.

491). Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι εἰς πᾶν τρίγωνον εἶναι

$$\rho_a = (\tau - \delta) \sigma\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = (\tau - \gamma) \sigma\phi\left(\frac{B}{2}\right).$$

492). Ὅμοίως ὅτι $\rho_a = 4P \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$

493). Ὅμοίως ὅτι $\rho = 4P \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{B}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$.

494). Ὅμοίως ὅτι $\sigma\phi\left(\frac{A}{2}\right) + \sigma\phi\left(\frac{B}{2}\right) + \sigma\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \frac{\tau}{e}$

495). Ὅμοίως ὅτι $\frac{P}{\rho} = \frac{\alpha + \delta + \gamma}{\alpha \sigma\upsilon\nu A + \delta \sigma\upsilon\nu B + \gamma \sigma\upsilon\nu \Gamma}$.

496). Ὅμοίως ὅτι $\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma = 1 + \frac{\rho}{P}$.

497). Ὅμοίως ὅτι $\tau - \alpha = 4P \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{B}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$.

498). Ὅμοίως ὅτι $Y_\alpha = \frac{2\tau \eta\mu\left(\frac{B}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right)}$.

499). Ὅμοίως ὅτι $\rho = \tau \epsilon\phi\left(\frac{A}{2}\right) \epsilon\phi\left(\frac{B}{2}\right) \epsilon\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$.

500). Ὅμοίως ὅτι $\rho = \frac{Y_\alpha \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)}{2 \sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)}$.

501). Ὅμοίως ὅτι $\eta\mu A \cdot \eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma = \frac{\tau\rho}{2P^2}$.

502). Ὅμοίως ὅτι $E = \alpha \cdot P \eta\mu B \eta\mu \Gamma$.

503). Ὅμοίως ὅτι $E = P \cdot Y_\alpha \cdot \eta\mu A$.

504). Ὅμοίως ὅτι $\tau = \rho_a \sigma\phi\left(\frac{A}{2}\right)$.

505). Ὅμοίως ὅτι $E = \rho\rho_a \sigma\phi\left(\frac{A}{2}\right)$.

506) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι ἐν ὀξυγωνίῳ τριγώνῳ ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς A ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου τῶν ὀψῶν αὐτοῦ εἶναι $2P \sigma\upsilon\nu A$.

507) Τριγώνου ΑΒΓ είναι $B=63^{\circ} 15'$ και $\Gamma=40^{\circ} 12'$. Νά υπολογισθῇ ἡ ὀξεία γωνία, ἣν σχηματίζει ἡ διάμεσος ΑΜ μετὰ τῆς πλευρᾶς ΒΓ.

508) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι εἰς πᾶν τρίγωνον εἶναι

$$ab\gamma \Upsilon_a \cdot \Upsilon_b \cdot \Upsilon_\gamma \cdot \rho_a \cdot \rho_b \cdot \rho_\gamma \cdot \sigma\phi\left(\frac{A}{2}\right) \sigma\phi\left(\frac{B}{2}\right) \sigma\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = 8\tau^3 E^3$$

509) Ὅμοίως ὅτι $\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_a} + \frac{1}{\rho_b} + \frac{1}{\rho_\gamma}$.

510) Ὅμοίως ὅτι $\rho_a + \rho_b + \rho_\gamma - \rho = 4 P$.

§ 125. Ἐπίλυσις οἰωνδῆποτε τριγώνων, ὧν τὰ δεδομένα στοιχεῖα εἶναι τυχόντα. — Ἐκ τῆς γεωμετρίας εἶναι γνωστὸν ὅτι τρίγωνόν τι κατασκευάζεται, ἂν δοθῶσι τρία ἀνεξάρτητα στοιχεῖα αὐτοῦ, ἀρκεῖ ἔν τούτῳ νὰ εἶναι μῆκος ἢ τὸ ἐμβαδόν. Οὕτω π.χ. ἐκ τῆς περιμέτρου καὶ δύο γωνιῶν, ἐκ δύο πλευρῶν καὶ τῆς διχοτομούσης τὴν γωνίαν αὐτῶν, ἐκ τοῦ ἐμβαδοῦ, τῆς βάσεως καὶ τῆς ἀντικειμένης γωνίας, κτλ. δύναται νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον. Εἶναι ἄρα δυνατὴ ἡ ἐπίλυσις τριγώνου, ὅταν δοθῶσι τρία τοιαῦτα στοιχεῖα αὐτοῦ.

Πρὸς τοῦτο ἀκολουθοῦμεν γενικῶς τὴν ἐξῆς πορείαν.

Προσπαθοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν πάντα ἢ τινὰ τῶν ἀγνώστων κυρίων στοιχείων συναρτήσῃ τῶν δεδομένων ὑπολογίζομεν εἶτα τὰ οὕτως ἐκφρασθέντα στοιχεῖα αὐτοῦ καὶ ἐκ τούτων καὶ τὰ τυχόν ὑπολειφθέντα τοιαῦτα.

Ὡς παραδείγματα ἔστωσαν τὰ ἀκόλουθα.

§ 126. Παράδ. 1ον.—Νά ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῆς περιμέτρου 2τ καὶ τῶν γωνιῶν A καὶ B αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς ἰσότητος $\Gamma=180^{\circ} - (A+B)$ προσδιορίζεται ἡ Γ . Εἶτα λαμβάνομεν διαδοχικῶς.

$$\frac{a}{\eta\mu A} = \frac{b}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = \frac{a+b+\gamma}{\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma} = \frac{2\tau}{4\sigma\upsilon\nu\frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu\frac{B}{2} \frac{\Gamma}{2}} \quad (59)$$

ἔθεν

$$a = \frac{\tau \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)}$$

Ὅμοιως εὐρίσκομεν ὅτι

$$\beta = \frac{\tau \eta\mu\left(\frac{B}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)} \quad \text{καὶ} \quad \gamma = \frac{\tau \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right)}$$

Τὸ ἔμβαδὸν ὑπολογίζεται διὰ τῆς ἰσότητος

$$E = \tau^2 \epsilon\varphi \frac{A}{2} \epsilon\varphi \frac{B}{2} \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \quad (102)$$

ἣτις προκύπτει δι' ἀπαλειφῆς τῶν ρ , $(\tau - \alpha)$, $(\tau - \beta)$, $(\tau - \gamma)$ μεταξὺ τῶν γνωστῶν ἰσοτήτων

$$E = \tau\rho, \quad \epsilon\varphi \frac{A}{2} = \frac{\rho}{\tau - \alpha}, \quad \epsilon\varphi \frac{B}{2} = \frac{\rho}{\tau - \beta}, \quad \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = \frac{\rho}{\tau - \gamma}$$

$$\text{καὶ} \quad \rho^2 \tau = (\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)$$

§ 127. Παράδ. 2ον. — *Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τοῦ τοῦ ἔμβαδοῦ καὶ τῶν γωνιῶν.*

$$\text{Ἐμάθομεν (81) ὅτι } E = 2P^2 \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma, \text{ ἄρα } P = \sqrt{\frac{E}{2\eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma}}$$

Ἐνεκα ταύτης αἱ ἰσότητες (78) γίνονται :

$$\alpha = \sqrt{\frac{2E \eta\mu A}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma}}, \quad \beta = \sqrt{\frac{2E \eta\mu B}{\eta\mu A \eta\mu \Gamma}}, \quad \text{καὶ} \quad \gamma = \sqrt{\frac{2E \eta\mu \Gamma}{\eta\mu A \eta\mu B}}$$

§ 128. Παράδ. 3ον. — *Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῆς πλευρᾶς a , τοῦ ἀθροίσματος κ τῶν ἄλλων πλευρῶν καὶ τῆς*

γωνίας A . — Ἐκ τῶν ἰσοτήτων $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$ ἔπεται εὐκόλως

$$\text{ὅτι } \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta + \gamma}{\eta\mu B + \eta\mu \Gamma} = \frac{\kappa}{2\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B - \Gamma}{2}}, \quad \text{ὅθεν}$$

$$\alpha = \frac{\kappa \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right)}, \quad \text{ἄρα } \sigma\upsilon\nu\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right) = \frac{\kappa}{\alpha} \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right).$$

Υπολογιζομένης

ἐκ ταύτης τῆς $B - \Gamma$, εὐρίσκεται εἴτα ἐκ ταύτης καὶ τῆς $B + \Gamma = 180^\circ - A$ ἢ B καὶ ἡ Γ . μεθ' ὃ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ὑπολογίζονται κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 115).

Δυνάμεθα ἄρα νὰ ὑπολογίσωμεν τὰς πλευρὰς β καὶ γ καὶ ὡς

ἔξῃς. Ἐκ τῶν $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$ προκύπτει ὅτι

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta - \gamma}{2\eta\mu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)}, \text{ ὅθεν } \beta - \gamma = \frac{\alpha\eta\mu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right)}{\text{συν}\left(\frac{A}{2}\right)}.$$

Ὑπολογιζομένης τῆς $\beta - \gamma$ καὶ γνωστοῦ ὄντος τοῦ $\beta + \gamma$ εὐρίσκονται εἰτα εὐκόλως αἱ πλευραὶ β καὶ γ .

§ 129. Παράδ. 4ον. — *Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῆς γωνίας A, τῆς διχοτόμου ταύτης δ_a καὶ τῆς διχοτόμου Δ_a τῆς ἔξωτερικῆς γωνίας A.* Ἐκ τῶν γνωστῶν (97, 101) ἰσοτήτων

$$\delta_a = \frac{2P \eta\mu B \eta\mu \Gamma}{\text{συν} \frac{B-\Gamma}{2}}, \quad \Delta_a = \frac{2P \eta\mu B \eta\mu \Gamma}{\eta\mu \frac{B-\Gamma}{2}}$$

δαιρουμένων κατὰ μέλη προκύπτει ἡ ἰσότης $\frac{\delta_a}{\Delta_a} = \varepsilon\varphi \frac{B-\Gamma}{2}$, δι'

ἣς ὀρίζεται ἡ $B-\Gamma$, μεθ' ἧς ἐκ ταύτης καὶ τοῦ ἀθροίσματος $B+\Gamma = 180^\circ - A$ εὐρίσκονται αἱ B καὶ Γ . Εἰτα ἐκ τῆς α' τῶν ἰσοτήτων (98) εὐρίσκομεν ὅτι

$$\alpha = \delta_a \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) \frac{\eta\mu B + \eta\mu \Gamma}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma} = \frac{2 \delta_a \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) \text{συν}\left(\frac{A}{2}\right) \text{συν}\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right)}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma},$$

Τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ὑπολογίζονται κατὰ τὰ γνωστά (§ 115).


§ 130. Εἷδη μεθόδων ἐπιλύσεως τριγώνων. — Εἰς ὅσα ἐκ τῶν προηγουμένων παραδειγμάτων ἦτο ἄγνωστος μία ἢ δύο γωνίαι, τὴν ἐπίλυσιν ἠρξάμεθα ἐκ τοῦ προσδιορισμοῦ τῶν γωνιῶν τούτων. Ἡ τοιαύτη μέθοδος καλεῖται *τριγωνομετρικὴ* καὶ ἔχει τὸ πλεονέκτημα ὅτι ἄγει συνήθως εἰς παραστάσεις λογιστὰς διὰ τῶν λογαρίθμων. Πλὴν ταύτης γίνεται χρῆσις καὶ δύο ἄλλων μεθόδων. Διὰ τῆς μίας τούτων, ἣτις καλεῖται *Ἀλγεβρικὴ*, ὁ ὑπολογισμὸς ἀρχόμενος ἀπὸ τῶν πλευρῶν γίνεται συνήθως (οὐχὶ πάντοτε, ὅρα παράδ. 2ον) δι' ἀλγεβρικῶν λογισμῶν αὕτη ἔχει τὸ μειονέκτημα ὅτι συνηθέστατα ἄγει εἰς παραστάσεις μὴ λογιστὰς διὰ τῶν λογαρίθμων καὶ εἶναι ἀνάγκη μετασχηματισμοῦ αὐτῶν, ὡς ἂν ὁ ὑπολογισμὸς αὐτῶν δὲν δύναται νὰ γίνῃ ἄλλως. Οὕτως εἰς τὸ τελευταῖον παράδειγμα ἠδυνάμεθα νὰ εὕρωμεν πρῶτον τὰς πλευρὰς β καὶ γ λύοντες τὸ σύστημα

$$\delta_a = \frac{2\beta\gamma}{\beta + \gamma} \text{συν}\left(\frac{A}{2}\right), \quad \Delta_a = \frac{2\beta\gamma}{\beta - \gamma} \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) \quad (95, 99) \text{ πρὸς τοὺς}$$


βοηθητικούς αγνώστους $\frac{\beta\gamma}{\beta+\gamma}$ και $\frac{\beta\gamma}{\beta-\gamma}$, ὧν ἔστωσαν λ και μ ἀε-

τιμαί, και λύοντες εἶτα τὸ σύστημα $\frac{\beta\gamma}{\beta+\gamma} = \lambda, \frac{\beta\gamma}{\beta-\gamma} = \mu$. Ἡ δὲ ἀπο-
περάτωσις τῆς ἐπιλύσεως γίνεται εἶτα κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 116 Β')

Εἰς τινὰς τέλος περιστάσεις δυνάμεθα κατασκευάζοντες πρῶ-
τον τὸ ζητούμενον τρίγωνον νὰ διευκολυνθῶμεν εἰς τὴν εὑρεσιν κα-
ταλλήλων σχέσεων, δι' ὧν προσδιορίζονται τινὰ τῶν ἀγνώστων στοι-
χείων. Ἡ πορεία αὕτη ἀποτελεῖ τὴν τρίτην μέθοδον, ἣτις καλεῖται



(Σχ. 56)



(Σχ. 57)

γεωμετρική. Κατ' αὐτὴν ἡ λύσις τοῦ προηγουμένου προβλήματος
γίνεται ὡς ἐξῆς. Κατασκευάζομεν γωνίαν ΓΑΒ ἴσην τῇ δεδομένῃ
Α· ἐπὶ τῶν διχοτομουσῶν ταύτης και τῆς παραπληρωματικῆς αὐτῆς
λαμβάνομεν (ΑΔ)=δ_α, (ΑΕ)=Δ_α· ἀγομένης εἶτα τῆς ΔΕ σχημα-
τίζεται τὸ ζητούμενον τρίγωνον ΑΒΓ (Σχ. 56).

Ἦδη ἐκ τοῦ ὀρθ. τριγώνου ΑΔΕ προκύπτει ἔτι

$$(ΑΔ)=(ΑΕ) \varepsilon\varphi E, \text{ ὅθεν } \varepsilon\varphi E = \frac{\delta_{\alpha}}{\Delta_{\alpha}}. \text{ Ἄλλ' ἔνεκα τοῦ τριγώνου}$$

$$ΑΓΕ \text{ εἶναι } E + \Gamma + 90^{\circ} + \frac{A}{2} = 180^{\circ}, \text{ ὅθεν}$$

$$E + \Gamma + \frac{A}{2} = 90^{\circ} = \frac{A}{2} + \frac{B}{2} + \frac{\Gamma}{2} \text{ ἄρα } E = \frac{B - \Gamma}{2}$$

και ἐπομένως ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται $\varepsilon\varphi\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right) = \frac{\delta_{\alpha}}{\Delta_{\alpha}}$, ἣν

και διὰ τῆς τριγ. μεθόδου εὔρομεν. Εἶτα ἐργαζόμεθα ὡς κατὰ
τὴν τριγ. μέθοδον.

Εἰς τὸ παράδειγμα τοῦτο ἡ γεωμετρικὴ μέθοδος ἄγει εἰς τὴν
αὐτὴν ἐξίσωσιν μετὰ τὴν τριγωνομετρικὴν μέθοδον. Τοῦτο ὁμῶς δὲν
συμβαίνει πάντοτε. Ἡ τριγωνομετρικὴ π. γ. λύσις τοῦ βου πα-

ραδ. (§ 128) ἄγει εἰς τὴν ἐξίσωσιν συν $\frac{B-\Gamma}{2} = \frac{\kappa}{\alpha} \eta\mu \frac{A}{2}$.

Ἐὰν δὲ κατασκευάσωμεν τὸ τρίγωνον ΑΒΓ (Σχ. 57) (κατασκευαζομένου πρώτου τοῦ ΓΔΒ, οὗ (ΓΒ) = α, (ΔΓ) = κ,

καὶ Δ = $\frac{A}{2}$ κ. τ. λ.) καὶ ἐφαρμόσωμεν τὴν ιδιότητα

(§ 113) εἰς τὸ τρίγωνον ΒΔΓ εὐρίσκομεν $\frac{\alpha}{\eta\mu\Delta} = \frac{\kappa}{\eta\mu(\Gamma\text{Β}\Delta)}$ ἢ

$$\frac{\alpha}{\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)} = \frac{\kappa}{\eta\mu\left(B + \frac{A}{2}\right)}, \text{ ὅθεν } \eta\mu\left(B + \frac{A}{2}\right) = \frac{\kappa}{\alpha} \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right),$$

ἣτις διαφέρει τῆς προηγουμένης ἐνδεθείσης.

$$\text{ΣΗΜ. Παρατηροῦντες ὅτι } B + \frac{A}{2} = B + \frac{180^\circ - B - \Gamma}{2} = \frac{B - \Gamma}{2} + 90^\circ$$

συμπεραίνομεν ὅτι $\eta\mu\left(B + \frac{A}{2}\right) = \eta\mu\left(\frac{B - \Gamma}{2} + 90^\circ\right) = \text{συν}\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right)$. Ἔρα

ἡ ἐξίσωσις $\eta\mu\left(B + \frac{A}{2}\right) = \frac{\kappa}{\alpha} \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)$ ἀνάγεται εἰς τὴν

$$\text{συν}\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right) = \frac{\kappa}{\alpha} \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right).$$

Πρὸς πληρεστέραν κατανόησιν τῆς μεταξὺ τῶν διαφορῶν τούτων μεθόδων ὑφισταμένης διαφορᾶς ὡς πρὸς τὴν εὐκολίαν καὶ ταχύτητα τῆς ἐπιλύσεως θέλομεν ἐφαρμόσει εἰς τὸ ἀκόλουθον παράδειγμα καὶ τὰς τρεῖς μεθόδους.

§ 131. Πηροχίδ. 50ν. — *Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐν τῆς γωνίας Α, τῆς πλευρᾶς δ καὶ τῆς διαφορᾶς ν τῶν ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.*

1ον. Μέθοδος τριγωνομετρική. — Γνωρίζομεν ὅτι

$$\epsilon\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \delta)}{\tau(\tau - \gamma)}} \text{ καὶ } \epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau - \delta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}}.$$

Διαιροῦντες ταύτας κατὰ μέλη εὐρίσκομεν ὅτι

$$\frac{\epsilon\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right)}{\epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right)} = \frac{\tau - \alpha}{\tau - \gamma} = \frac{\delta + (\gamma - \alpha)}{\delta + (\alpha - \gamma)} = \frac{\delta + (\gamma - \alpha)}{\delta - (\gamma - \alpha)} = \frac{\delta + \nu}{\delta - \nu},$$

ἔθεν ἐφ $\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \frac{\delta + \nu}{\delta - \nu} \text{ἐφ}\left(\frac{A}{2}\right)$. Ὀριζομένης οὕτω τῆς Γ ἀποπερα-
τοῦται ἡ λύσις κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 115).

2ον. **Μέθοδος ἀλγεβρική.**— Λύομεν τὸ σύστημα $\gamma - \alpha = \nu$,
 $\alpha^2 = \delta^2 + \gamma^2 - 2\delta\gamma \text{ συν } A$ πρὸς τοὺς ἀγνώστους α καὶ γ . Πρὸς τοῦτο
θέτομεν ἐν τῇ β' τὴν ἐκ τῆς α' εὐρισκομένην τιμὴν τῆς πλευρᾶς α
καὶ εὐρίσκομεν $(\gamma - \nu)^2 = \delta^2 + \gamma^2 - 2\delta\gamma \text{ συν } A$, ἔθεν


$$2\gamma(\delta \text{ συν } A - \nu) = \delta^2 - \nu^2 \text{ καὶ } \gamma = \frac{\delta^2 - \nu^2}{2(\delta \text{ συν } A - \nu)}, \text{ δι' ἧς ὀρίζεται}$$

ἡ γ , ἀρκεῖ νὰ καταστή τὸ δ' μέλος λογιστὸν διὰ τῶν λογαρίθμων. Πρὸς
ἐπίτευξιν τούτου γράφομεν ταύτην οὕτω $\gamma = \frac{(\delta + \nu)(\delta - \nu)}{2\delta \text{ συν } A \left(1 - \frac{\nu}{\delta \text{ συν } A}\right)}$.

ἐὰν ἤδη θέσωμεν ἐφ $\omega = \frac{\nu}{\delta \text{ συν } A}$ εὐρίσκομεν ὅτι

$$1 - \frac{\nu}{\delta \text{ συν } A} = 1 - \text{ἐφ } \omega = \frac{\sqrt{2} \text{ ἡμ}(45^\circ - \omega)}{\text{συν } \omega} \text{ καὶ κατ' ἀκολουθίαν}$$

$\gamma = \frac{(\delta + \nu)(\delta - \nu)\sqrt{2} \text{ συν } \omega}{4\delta \text{ συν } A \text{ ἡμ}(45^\circ - \omega)}$. Ὀριζομένης οὕτω τῆς γ ἡ ἐπίλυσις πε-
ρατοῦται κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 116 Β').



(Σχ. 58)

3ον. **Μέθοδος γεωμε-
τρική.**— Κατασκευάζομεν τρί-
γωνον $A\Gamma\Delta$ (Σχ. 58) ἔχον
 $(A\Gamma) = \delta$, $(A\Delta) = \nu$ καὶ γωνίαν
αὐτῶν ἴσην τῇ δεδομένῃ A .
Ὑψοῦντες εἰτα τὴν κάθετον
εἰς τὸ μέσον τῆς $\Gamma\Delta$ καὶ προ-
εκτείνοντες τὴν $A\Delta$ ὀρίζομεν
τὴν κορυφὴν B τοῦ ζητουμέ-

νου τριγώνου $AB\Gamma$. Ἦδη ἐκ τοῦ τριγώνου $A\Gamma\Delta$ λαμβάνομεν

$$\frac{\delta}{\text{ἡμ}\varphi} = \frac{\nu}{\text{ἡμ}\rho}, \text{ ἔθεν } \frac{\delta}{\nu} = \frac{\text{ἡμ}\varphi}{\text{ἡμ}\rho}, \text{ ἄρα } \frac{\delta + \nu}{\delta - \nu} = \frac{\text{ἡμ}\varphi + \text{ἡμ}\rho}{\text{ἡμ}\varphi - \text{ἡμ}\rho} = \frac{\text{ἐφ}\left(\frac{\varphi + \rho}{2}\right)}{\text{ἐφ}\left(\frac{\varphi - \rho}{2}\right)}$$

Ἄλλ' ἐπειδὴ $\varphi + \rho + A = 180^\circ$, ἔπεται: ὅτι $\frac{\varphi + \rho}{2} + \frac{A}{2} = 90^\circ$ καὶ

$\varepsilon\varphi\left(\frac{\varphi+\rho}{2}\right)=\sigma\varphi\left(\frac{A}{2}\right)$, ή δὲ προηγούμενη ἰσότης γίνεται

$\varepsilon\varphi\left(\frac{\varphi-\rho}{2}\right)=\frac{\delta-\nu}{\delta+\nu}\sigma\varphi\left(\frac{A}{2}\right)$. Ὀριζομένης ἐκ ταύτης τῆς $\varphi-\rho$ καὶ ὄν-
τος γνωστοῦ τοῦ ἀθροίσματος $\varphi+\rho$ ὑπολογίζονται αἱ γωνίαι φ καὶ
 ρ , μεθ' ὧ ἡ B ἐκ τῆς εὐκόλως ἀποδεικνυομένης ἰσότητος
 $B=2\varphi-180^\circ$. Εἶτα ἡ ἐπίλυσις ἀποπερατοῦται κατὰ τὰ γνωστά
(§ 115 Α').

Ἀσκήσεις. 511) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha=1468^μ$,
 $\delta+\gamma=2900^μ$ καὶ $A=70^\circ$.

512) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $A=123^\circ 44'$, $B=30^\circ 16'$ καὶ
 $2\tau=56^μ$.

513) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $A=42^\circ 15'$, $B=85^\circ 55'$ καὶ
 $E=1245$ τ. μ.

514) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $A=67^\circ 10' 40''$, $\delta_\alpha=17,5^μ$
καὶ $\Delta_\alpha=40μ$.

515) Τριγώνου $AB\Gamma$ εἶναι $(AB)=28,30^μ$, $(B\Gamma)=42,60μ$ καὶ ἡ
διάμεσος $(A\Delta)=25μ$. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον τοῦτο.

516) Τριγώνου $AB\Gamma$ εἶναι $(AB)=45μ$, ἡ διχοτόμος $(A\Delta)=36,5μ$
καὶ $(B\Delta)=28μ$. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον τοῦτο.

517) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ δίδονται τὰ ὕψη. — **Ἐφαρ-**
μογῇ $\Upsilon_\alpha=4μ$, $\Upsilon_\beta=5μ$, $\Upsilon_\gamma=8μ$.

518) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν α , δ_α καὶ Υ_α .

519) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον, οὗ $\alpha=142μ$, $B=28^\circ 46'$ καὶ
 $\gamma-\delta=54,6μ$.

520) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν α , δ καὶ δ_γ .

521) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν A , B , Γ καὶ P .

522) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν α , $\delta+\gamma=\mu$ καὶ Υ_α .

523) Νὰ ἐπιλυθῇ ἰσοσκελὲς τρίγωνον (A κορυφή), οὗ $\Upsilon_\alpha=27μ$
καὶ $\rho=12μ$.

524) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον οὗ δίδεται ἡ διάμεσος μ_α , ἣτις σχη-
ματίζει μετὰ μὲν τῆς AB γωνίαν 45° , μετὰ δὲ τῆς $A\Gamma$ γωνίαν 60°

525) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον, οὗ $\gamma=4μ$, $A=2\Gamma$ καὶ $\text{συν}\Gamma=\frac{3}{4}$.

526) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον οὗ $\Upsilon_\alpha=15μ$, $B=15^\circ$ καὶ $\Gamma=65^\circ$.

527) Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ρ καὶ ἡ P τοῦ προηγούμενου τριγώνου.
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

528) Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον, οὗ δίδεται ἡ περίμετρος, τὸ γινόμενον ἐφ' ($\frac{B}{2}$) ἐφ' ($\frac{\Gamma}{2}$) καὶ ἡ γωνία Α.

529) Νά ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον οὗ δίδεται ἡ α , ἡ Α καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ἄλλων πλευρῶν.

530) Νά ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha=20\mu$, $\beta+\gamma=38\mu$ καὶ ἡ διχοτόμος τῆς Α σχηματίζει μετὰ τῆς ἀντικειμένης πλευρᾶς γωνίαν $\omega=20^\circ$.

531) Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον ἐκ τῶν γωνιῶν καὶ τῆς ρ .

532) Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον, οὗ $A=50^\circ 18'$, τὸ δὲ ὕψος ΑΔ αὐτοῦ διαιρεῖ τὴν ΒΓ εἰς δύο μέρη, ὧν τὰ μήκη εἶναι 15μ τὸ μὲν καὶ 20μ τὸ δέ.

533) Τριγώνου ΑΒΓ εἶναι $\alpha=38,40\mu$, $\beta=24,60\mu$ καὶ $\gamma=50\mu$. Νά εὑρεθῆ τὸ μήκος τῆς διαμέσου ΑΜ καὶ ἡ γωνία αὐτῆς μετὰ τῆς ΒΓ.

534) Τριγώνου ΑΒΓ εἶναι $A=60^\circ$ καὶ $\beta:\gamma=2$. Νά ὑπολογισθῶσιν αἱ ἄλλαι γωνίαι αὐτοῦ.

535) Εὑρεῖν τὴν δ_α τριγώνου, οὗ $\gamma=120\mu$, $A=48^\circ 12'$ καὶ $B=24^\circ$.

536) Ἐν τριγώνῳ ΑΒΓ, οὗ $B=52^\circ 15'$, καὶ $\Gamma=35^\circ 5'$, ἄγεται τὸ ὕψος ΑΔ καὶ ἡ διὰ τοῦ μέσου αὐτοῦ καὶ τοῦ τῆς ΒΓ διερχομένη εὐθεῖα. Εὑρεῖν τὴν γωνίαν ταύτης μετὰ τῆς ΒΓ.

537) Νά ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οὗ $\beta=142\mu$, $\gamma=42$ καὶ $\mu_\alpha=\sqrt{142 \cdot 42}$.

538) Τριγώνου ΑΒΓ ἡ $A=60^\circ$, ἡ δὲ διχοτόμος αὐτῆς εἶναι μέση ἀνάλογος μεταξὺ τῶν μερῶν, εἰς ἃ αὕτη διαιρεῖ τὴν ΒΓ. Νά ὑπολογισθῶσιν αἱ ἄλλαι γωνίαι αὐτοῦ.

539) Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον, οὗ $\alpha=30\mu$, $E=225$ τ. μ. καὶ αἱ γωνίαι ἀποτελοῦσιν ἀριθμητικὴν πρόοδον.

540) Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον, οὗ $\Gamma=2B$, $\alpha=25\mu$ καὶ $\beta+\gamma=40\mu$.

541) Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον, οὗ $\alpha=50\mu$, $A=30^\circ$ καὶ $\mu_\alpha=40\mu$.


542) Νά ἐπιλυθῆ ἰσοσκελὲς τρίγωνον, οὗ ἡ περίμετρος εἶναι 22μ καὶ τὸ ὕψος $\sqrt{11}$.

543) Νά ἐπιλυθῆ ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἐκ τῆς γωνίας τῆς κορυφῆς καὶ τοῦ ἐμβαδοῦ $\frac{1}{2}K^2$.

544) Νά ἐπιλυθῆ ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ἐμβαδοῦ $\frac{1}{2}K^2$.

§ 132. **Ἐπίλυσις κυρτῶν τετραπλεύρων.** — Ἐπειδὴ

πάν κυρτὸν τετράπλευρον διαιρεῖται δι' ἑκατέρως τῶν διαγωνίων αὐτοῦ εἰς τρίγωνα, εἶναι δυνατόν διὰ τῆς ἐπιλύσεως τῶν τριγῶνων τούτων νὰ ἐπιλυθῇ καὶ τὸ κυρτὸν τετράπλευρον. Οὕτω π. χ. ἐκ τῶν πλευρῶν AB, BG, ΓΔ (Σχ. 59) καὶ τῶν γωνιῶν αὐτῶν δύναται νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τετράπλευρον ABΓΔ. Τῷ ὄντι· ἐπιλυομένου (§ 116) τοῦ τριγῶνου ABΓ καὶ τὸ AΓΔ εἶτα ἐπιλύεται, ἤτοι ὀρίζονται πάντα τὰ κύρια στοιχεῖα αὐτοῦ. Μεθ' ὃ εὐρίσκεται τὸ ἐμβαδὸν $(ABΓΔ) = (ABΓ) +$



(Σχ. 59)

$(AΓΔ)$ καὶ ἡ γωνία $A = B A Γ + Γ A Δ$, οὕτω δὲ πάντα τὰ κύρια (1) στοιχεῖα τοῦ τετραπλεύρου ὀρίζονται. Γενικῶς, ἵνα εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπίλυσις τετραπλεύρου ἐκ κυρίων στοιχείων αὐτοῦ, πρέπει νὰ δίδωνται πέντε τοιαῦτα, ὧν δύο τοῦλάχιστον εἶναι πλευραὶ. Ἐνίοτε στοιχεῖον ἢ στοιχεῖά τινα ἀντικαθίστανται ὑπὸ δρων τινῶν εἰδικῶν, οὕς ἐκπληροῖ τὸ τετράπλευρον, π.χ. νὰ εἶναι περιγράψιμον περὶ κύκλον, νὰ ἔχη διαγωνίους καθέτους κτλ. Ὡς παράδειγμα ἔστω τὸ ἀκόλουθον πρόβλημα.

§ 133. **Πρόβλημα.** — *Νὰ ἐπιλυθῇ κυρτὸν τετράπλευρον ἐγγράψιμον εἰς κύκλον ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.* — Ὑποθεθεῖ-

σθω ὅτι τὸ κ. τετράπλευρον ABΓΔ (Σχ. 59) εἶναι ἐγγράψιμον, ἤτοι $A + Γ = 180^\circ$ καὶ $B + Δ = 180^\circ$. Ἐστωσαν δὲ $(AB) = α$, $(BG) = β$, $(ΓΔ) = γ$, $(ΔA) = δ$, $(AΓ) = χ$ καὶ $(BΔ) = ψ$. Ἐκ τῶν τριγῶνων ABΓ καὶ AΔΓ προκύπτουσιν αἱ σχέσεις :

$χ^2 = α^2 + β^2 - 2αβ \text{ συν} B$, $χ^2 = γ^2 + δ^2 - 2γδ \text{ συν} Δ$. Ἐπειδὴ ὁμοῦς $\text{συν} Δ = -\text{συν} B$, ἢ δ' τούτων γίνεται $χ^2 = γ^2 + δ^2 + 2γδ \text{ συν} B$. ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῆς α' προκύπτει ὅτι

$$α^2 + β^2 - 2αβ \text{ συν} B = γ^2 + δ^2 + 2γδ \text{ συν} B, \text{ ὅθεν } \text{συν} B = \frac{α^2 + β^2 - γ^2 - δ^2}{2(αβ + γδ)}. (1)$$

Θέτοντες τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ $\text{συν} B$ εἰς τὰς γνωστὰς ἰσότη-
τας $2\eta\mu^2\left(\frac{B}{2}\right) = 1 - \text{συν} B$ καὶ $2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{B}{2}\right) = 1 + \text{συν} B$ εὐρίσκομεν

(1) Κατ' ἀναλογία πρὸς τὸ τρίγωνον καλοῦμεν κύρια στοιχεῖα τετραπλεύρου τὰς πλευρὰς, γωνίας καὶ ἐμβαδόν. Ἐπιλύθηκε ἀπὸ το Ἰνστιτούτου Ἑσπαιδοτικῆς Πολιτικῆς

μετά τὴν ἐκτέλεσιν τῶν καταλλήλων μετασχηματισμῶν ὅτι

$$2 \eta \mu^2 \frac{B}{2} = \frac{(\gamma + \delta + \alpha - \beta)(\gamma + \delta - \alpha + \beta)}{2(\alpha\beta + \gamma\delta)},$$

$$2 \sigma \nu^2 \left(\frac{B}{2} \right) = \frac{(\alpha + \beta + \gamma - \delta)(\alpha + \beta - \gamma + \delta)}{2(\alpha\beta + \gamma\delta)}. \text{ Ἐὰν δὲ χάριν συντομίας τειθῆ } \alpha + \beta + \gamma + \delta = 2 \kappa, \text{ εὐρίσκομεν εὐκόλως ὅτι:}$$

$$\beta + \gamma + \delta - \alpha = 2(\kappa - \alpha), \quad \alpha + \gamma + \delta - \beta = 2(\kappa - \beta),$$

$$\alpha + \beta + \delta - \gamma = 2(\kappa - \gamma), \quad \alpha + \beta + \gamma - \delta = 2(\kappa - \delta).$$

Αἱ δὲ προηγούμεναι ἰσοτήτες γίνονται

$$\eta \mu \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(\kappa - \alpha)(\kappa - \beta)}{\alpha\beta + \gamma\delta}}, \quad \sigma \nu \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(\kappa - \gamma)(\kappa - \delta)}{\alpha\beta + \gamma\delta}} \quad (103)$$

Ἐκ τούτων δὲ ἔπεται ὅτι $\xi \varphi \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(\kappa - \alpha)(\kappa - \beta)}{(\kappa - \gamma)(\kappa - \delta)}} \quad (104)$

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\xi \varphi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\kappa - \alpha)(\kappa - \delta)}{(\kappa - \gamma)(\kappa - \beta)}}$

Ὑπολογιζομένων ἐκ τούτων τῶν γωνιῶν A καὶ B ὑπολογίζονται εἴτα καὶ αἱ παραπληρωματικαὶ αὐτῶν Γ καὶ Δ.

Διὰ τὴν εὑρεσιν τοῦ ἐμβαδοῦ ἀναχωροῦμεν ἐκ τῆς προφανοῦς ἰσοτήτος $E = (AB\Gamma) + (A\Delta\Gamma)$ καὶ ἐφαρμόζοντες τὴν ιδιότητα (§ 113 Δ')

εὐρίσκομεν ὅτι $E = \frac{1}{2} \alpha\beta \eta \mu B + \frac{1}{2} \gamma\delta \eta \mu \Delta$. Ἐπειδὴ δε

$$\eta \mu \Delta = \eta \mu B = 2 \eta \mu \frac{B}{2} \sigma \nu \frac{B}{2} \quad \text{αὕτη γίνεται}$$

$$E = (\alpha\beta + \gamma\delta) \eta \mu \frac{B}{2} \sigma \nu \frac{B}{2}, \quad \text{καὶ ἔνεκα τῶν (103)}$$

$$E = \sqrt{(\kappa - \alpha)(\kappa - \beta)(\kappa - \gamma)(\kappa - \delta)} \quad (105)$$

Ὅττω περατοῦται ἡ ἐπίλυσις τοῦ τετραπλεύρου τούτου, ἦτοι ὁ ὑπολογισμὸς τῶν ἀγνώστων κυρίων στοιχείων αὐτοῦ. Δυνάμεθα δὲ μὴ νὰ ὑπολογίσωμεν συναρτήσῃ τῶν πλευρῶν τοῦ ἐγγραψίμου κ. τετραπλεύρου τὰς διαγωνίους καὶ τὴν ἀκτίνα τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου ὡς ἀκολούθως.

§ 134. Ὑπολογισμὸς τῶν διαγωνίων ἐγγραψίμου κ. τετραπλεύρου.— Ἀπαλείφοντες τὸ $\sigma \nu B$ μεταξὺ τῶν προηγούμενων εὐρεθειῶν ἰσοτήτων $\chi^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \sigma \nu B$, $\chi^2 = \gamma^2 + \delta^2 + 2\gamma\delta \sigma \nu B$ εὐρίσκομεν ὅτι

$$\chi^2(\alpha\delta + \gamma\delta) = (\alpha^2 + \beta^2) \gamma\delta + (\gamma^2 + \delta^2) \alpha\delta, \text{ εθιν}$$

$$\chi = \sqrt{\frac{(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\delta + \beta\gamma)}{\alpha\delta + \gamma\delta}} \quad (106)$$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν εἶτι

$$\psi = \sqrt{\frac{(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\delta + \beta\gamma)}{\alpha\delta + \beta\gamma}}$$

ΣΗΜ. Ἐκ τῶν ἰσοτήτων τούτων προκύπτουσιν εὐκόλως αἱ ἰσότητες

$$\chi\psi = \alpha\gamma + \beta\delta, \frac{\chi}{\psi} = \frac{\alpha\delta + \beta\gamma}{\alpha\delta + \beta\gamma} \quad (107)$$

αἵτινες ἐκφράζουσι τὰ δύο θεωρήματα τοῦ Πτολεμαίου.

135. Ὑπολογισμὸς τῆς ἀκτῆνος P τοῦ περὶ κ. τετράπλευρον περιγεγραμμένου κύκλου. — Τοῦ τριγώνου ΑΒΓ (Σχ.59) ὄντος ἐγγεγραμμένου εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον, ἀληθεύει (§ 113 Α'). ἡ ἰσότης

$$\frac{(ΑΓ)}{\eta\mu B} = 2P, \text{ εθιν } P = \frac{\chi}{2\eta\mu B} = \frac{\chi}{4\eta\mu \frac{B}{2} \text{ συν} \frac{B}{2}}$$

φθῶσιν ὑπ' ὄψιν αἱ ἰσότητες (103,106) προκύπτει ἐξ αὐτῆς ἡ ἰσότης:

$$P = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{(\alpha\delta + \gamma\delta)(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\delta + \beta\gamma)}{(\kappa - \alpha)(\kappa - \beta)(\kappa - \gamma)\kappa - \delta}} \quad (108)$$

Ἐὰν δὲ ληφθῇ ὑπ' ὄψιν καὶ ἡ ἰσότης (105), ἡ προηγουμένη ἰ-

σότης (108) γίνεται
$$P = \frac{\sqrt{(\alpha\delta + \gamma\delta)(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\delta + \beta\gamma)}}{4E} \quad (109)$$

Ἀσκήσεις. 545). Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ κ. τετράπλευρον ΑΒΓΔ, οὗ (ΑΒ)=8μ, (ΒΓ)=10μ, (ΓΔ)=6μ, Β=30° καὶ Γ=80°.

546). Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ κ. τετράπλευρον, οὗ αἱ πλευραὶ εἶναι κατὰ σειράν 2μ, 3μ, 5μ, 4μ, καὶ ἡ γωνία τῶν δύο πρώτων εἶναι 100°.

547). Εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν κ. τετραπλεύρου ἔχοντος διαγωνίους 6,50μ καὶ 5,42μ τεμνομένας ὑπὸ γωνίαν 65° 15'.

548). Νὰ ὑπολογισθῶσιν αἱ γωνίαι τραπεζίου, οὗ αἱ βάσεις εἶναι 5μ ἢ μὲν καὶ 20μ ἢ ἄλλη, αἱ δὲ ἄλλαι πλευραὶ αὐτοῦ εἶναι 12μ καὶ 9μ.

549). Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ διαγώνιος ΑΓ καὶ νὰ ἐπιλυθῇ κ. τετράπλευρον ΑΒΓΔ, οὗ εἶναι

$$A=90^\circ, \Gamma=60^\circ, (ΑΔ) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ καὶ } AB=1, \text{ γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἡ}$$

ΑΓ διχοτομεῖ τὴν Γ.

550). Νά υπολογισθῶσιν αἱ γωνίαι Γ καὶ Δ κ. τετραπλεύρου, $ΑΒΓΔ$, οὗ $(ΑΒ)=α$, $(ΑΔ)=\frac{α}{4}(1+\sqrt{5})$, $(ΒΓ)=\frac{α}{2}$, $Α=36^\circ$ καὶ $Β=108^\circ$.

551). Νά ὀρισθῶσιν αἱ γωνίαι κ. τετραπλεύρου $ΑΒΓΔ$, οὗ $Α=90^\circ$ καὶ αἱ πλευραὶ $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΓΔ$, $ΔΑ$ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 4, 7, 8, 3.

552). Νά ἐπιλυθῇ ἐγγεγραμμένον εἰς κύκλον κ. τετράπλευρον, οὗ δίδεται ἡ $Α$, αἱ πλευραὶ $α$ καὶ $δ$ καὶ $Β=90^\circ$.

553). Νά ἐπιλυθῇ ἐγγεγραμμένον εἰς κύκλον κ. τετράπλευρον, οὗ δίδονται αἱ πλευραὶ $α$, $β$, $γ$, καὶ ἡ γωνία $Β$ τῶν δύο πρώτων πλευρῶν.


554). Νά ἐπιλυθῇ ἐγγεγραμμένον εἰς κύκλον τραπέζιον ἐκ μιᾶς τῶν βάσεων, μιᾶς γωνίας καὶ τῆς ἀκτίνος τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου.

555). Νά υπολογισθῶσιν αἱ διαγώνιοι τραπέζιου ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 136. Πρόβλημα 1ον. — Νά εὐρεθῇ ἡ ἀπόστασις προσιτοῦ ἀπὸ ἀπροσίτου καὶ ὄρατοῦ σημείου. — Ἐστω $Α$ τὸ



(Σχ. 60)

προσιτὸν καὶ $Γ$ τὸ ἀπρόσιτον σημεῖον, ὧν ἡ ἀπόστασις $(ΑΓ)$ ζητεῖται (Σχ. 60). Πρὸς εὐρεσιν ταύτης ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου τοῦ $Α$ ἐκλέγομεν σημεῖόν τι $Β$ τοιοῦτον ὥστε νὰ φαίνωνται ἐξ αὐτοῦ τὰ σημεῖα $Α, Γ$ καὶ νὰ εἶναι εὐκολοὶ ἢ μετὰ πάσης τῆς δυνατῆς ἀκριβείας μέτρησις τῆς ἀποστάσεως $(ΑΒ)$. Μετὰ τὴν

μέτρησιν ταύτης διὰ καταλλήλου γωνιομετρικοῦ ὄργανου μετροῦμεν τὰς γωνίας $ω$ καὶ $ρ$ τῆς $ΑΒ$ καὶ τῶν προβολῶν $Αγ, Βγ$ τῶν $ΑΓ, ΒΓ$

ἐπὶ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον τῆς AB. Μετὰ τοῦτο ἐκ τοῦ τριγώνου ABΓ


$$\text{εὐρίσκομεν } \frac{A\Gamma}{\eta\mu\rho} = \frac{AB}{\eta\mu A\Gamma B}, \text{ ὅθεν } (A\Gamma) = \frac{(AB)\eta\mu\rho}{\eta\mu(\omega+\rho)}. \quad (1)$$

Μετροῦμεν ἔπειτα τὴν γωνίαν φ τῆς AΓ μετὰ τῆς προβολῆς τῆς Aγ
καὶ ἐκ τοῦ ὀρθ. τριγώνου AΓγ εὐρίσκομεν $(A\Gamma) = (A\Gamma)\text{συν}\varphi$,

ὅθεν $(A\Gamma) = \frac{(A\Gamma)}{\text{συν}\varphi}$. Ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῆς (1) εὐρίσκομεν ὅτι

$$(A\Gamma) = \frac{AB\eta\mu\rho}{\eta\mu(\omega+\rho)\text{συν}\varphi}.$$

§ 137. Πρόβλημα 2ον. Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἀπόστασις δύο σημείων ἀπροσίτων καὶ ὄρατων.—Ἐστῶσαν A καὶ B (Σχ. 61) τὰ δύο σημεία, ὧν ζητεῖται ἡ ἀπόστασις (AB). Πρὸς εὐρεσιν ταύτης ἐργαζόμεθα οὕτως. Ἐπὶ ὀριζοντίου καὶ ὀμαλοῦ ἐδάφους ἐκλέγομεν δύο σημεία Γ καὶ Δ, ἀπὸ τῶν ὁποίων νὰ εἶναι ἑρατὰ τὰ σημεία A καὶ B καὶ ἑκάτερον νὰ εἶναι ὄρατον ἐκ τοῦ ἐτέρου. Ἐστῶσαν δὲ α καὶ β αἱ προβολαὶ τῶν A καὶ B ἐπὶ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον τῆς ΓΔ. Ἐὰν μετρήσωμεν τὴν ΓΔ καὶ τὰς γωνίας ω καὶ ρ, ὑπολογίζομεν τὰ μήκη τῶν πλευρῶν Γα καὶ Δα. Ἐὰν



(Σχ. 61)

δὲ μετρήσωμεν καὶ τὰς γωνίας η καὶ ΓΔβ, εὐρίσκομεν καὶ τὸ μήκον τῆς Δβ. Ἡδὴ γνωρίζοντες τὰ μήκη τῶν πλευρῶν Δα, Δβ καὶ

τὴν γωνίαν αὐτῶν τ ($\tau = \delta \Delta \Gamma - \rho$) εὐρίσκομεν (§ 116) τὸ μῆκος τῆς ὀριζοντίου προβολῆς αὐ τῆς AB. Μετροῦμεν ἔπειτα τὴν γωνίαν φ τῆς εὐθείας ΓΑ μετὰ τῆς ὀριζοντίου προβολῆς τῆς Γα καὶ εὐρίσκομεν ἐκ ταύτης καὶ τῆς Γα τὸ μῆκος τῆς Αα. Κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον εὐρίσκομεν καὶ τὸ μῆκος τῆς βB. Ἡδὴ ἐπειδὴ $(AE) = (\alpha\beta)$ καὶ $(BE) = (B\beta) - (A\alpha)$, ἐπιλύεται τὸ ὄρθ. τρίγωνον AEB καὶ εὐρίσκειται ἡ ζητούμενη ἀπόστασις AB.


§ 138. Προβλημα 3ον. *Νὰ εὐρεθῇ τὸ ὕψος πύργου, οὗ ἡ βάση εἶναι προσιτή.*— Ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ ποδὸς A (Σχ. 62) τοῦ πύργου μετροῦμεν ὀριζοντίον τινα εὐθεῖαν AO' καὶ ἔστω $(AO') = \delta$.

Τοποθετοῦντες τὸ γωνιομετρικὸν ὄργανον εἰς τὸ ἄκρον O' τῆς μετρηθείσης εὐθείας μετροῦμεν τὴν γωνίαν $\Gamma OB = \omega$ (OO' εἶναι τὸ ὕψος τοῦ ὀργάνου καὶ OΓ ὀριζόντιος εὐθεῖα). Μεθ' ὃ ἐκ τοῦ ὄρθ.

τριγώνου OΓB εὐρίσκομεν $(\Gamma B) = \delta$. ἐφ' ὧ καὶ προσθέτοντες εἰς τὸ δι' αὐτῆς ὑπολογιζόμενον μῆκος (ΓB) τὸ τοῦ ὀργάνου ὕψος (OO') εὐρίσκομεν τὸ ὕψος (AB).

§ 139. Προβλημα 4ον. *Νὰ εὐρεθῇ τὸ ὕψος ὄρους.*


Ἐστω A ἡ κορυφή τοῦ ὄρους (Σχ. 63) Γ σημειῶν τι τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου, ἀφ' οὗ λογίζεται τὸ ὕψος τοῦ ὄρους καὶ τοιοῦτον ὥστε νὰ φαίνηται ἐξ αὐτοῦ ἡ κορυφή A. Ἐστω δὲ AB τὸ ἄρατον ὕ-



(Σχ. 62)

ψος, ὅπερ πρόκειται νὰ εὐρωμεν. Πρὸς τοῦτο ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ Γ μετροῦμεν ἐπὶ ὀριζοντίου καὶ ὀμαλοῦ, ὅσον ἔνεστι, ἐδάφους εὐθεῖαν τινα ΓΔ, ἡ ὁποία νὰ κεῖται ἐν τῷ αὐτῷ μετὰ τοῦ A κατα-

κορύφῃ ἐπιπέδῳ καὶ ἀπὸ τοῦ ἄκρου Δ τῆς ὁποίας νὰ φαίνωνται, ἀμ-
 φότερα τὰ σημεῖα Α
 καὶ Γ. ἔστω δὲ α τὸ
 μῆκος αὐτῆς. Μετὰ
 τοῦτο τοποθετοῦμεν
 εἰς τὰ σημεῖα Γ καὶ
 Δ τὸ γωνιομετρικὸν
 ὄργανον, οὗ τὸ ὕψος
 ἔστω $(\Gamma\Gamma') = (\Delta\Delta')$
 καὶ μετροῦμεν τὰς
 γωνίας $\text{ΑΓ}'\Delta' = \omega$
 καὶ $\text{ΑΔ}'\Gamma' = \varphi$. ἐκ δὲ
 τοῦ τριγώνου $\text{ΑΓ}'\Delta'$
 λαμβάνομεν εἴτα



$(\text{ΑΓ}') = \frac{\alpha \eta \mu \varphi}{\eta \mu(\omega + \varphi)}$, δι' ἧς ὑπολογίζομεν τὴν $\text{ΑΓ}'$. Μετροῦμεν τέλος τὴν
 γωνίαν $\text{ΑΓ}'\text{Z} = \theta$, ἣν σχηματίζει ἡ $\text{ΑΓ}'$ μετὰ τῆς κατακορύφου
 $\text{Γ}'\text{Z}$, ὅτε καὶ $\text{ΒΑΓ}' = \theta$, καὶ ἐκ τοῦ τριγώνου $\text{ΑΒ}'\Gamma'$ ($\text{Β}'\Gamma'$ εἶναι
 νοητὴ ὀριζόντιος εὐθεῖα) λαμβάνομεν


$$(\text{ΑΒ}') = (\text{ΑΓ}') \cdot \text{συν}\theta = \frac{\alpha \eta \mu \varphi \text{ συν}\theta}{\eta \mu(\omega + \varphi)}$$

δι' ἧς εὐρίσκομεν τὸ ὕψος $(\text{ΑΒ}')$. ἐὰν δὲ εἰς αὐτὸ προσθέσωμεν
 καὶ τὸ ὕψος τοῦ ὄργανου $(\Gamma\Gamma') = (\text{ΒΒ}')$, εὐρίσκομεν τὸ ζητούμενον
 ὕψος τοῦ ὄρους.

§ 140. Προβλήμα 5ον. — Ἐπὶ ἐπιπέδου ἐδάφους νὰ
 χαραχθῇ ἡ προέκτασις εὐθείας ὀπισθεν κωλύματος, ὅπερ ἐμ-
 ποδίζει νὰ βλέπωμεν τὴν ὀπισθὴν του διεύθυνσιν αὐτῆς.

Ἐστω ΑΒ (Σχ. 64) ἡ δεδομένη εὐθεῖα, Σ τὸ κώλυμα καὶ ΕΔ
 ἡ ζητούμενη προέκτασις τῆς ΑΒ πέραν τοῦ Σ . Ἐπὶ τῆς δεδομένης
 εὐθείας ὀρίζομεν δύο σημεῖα Α καὶ Β, ὧν τὴν ἀπόστασιν μετροῦ-
 μεν μετὰ πάσης τῆς δυνατῆς ἀκριβείας. Εἴτα εἰς τι σημεῖον Γ, ἀφ'
 οὗ φαίνονται τὰ Α καὶ Β καὶ ὁ ὀπισθεν τοῦ Σ χῶρος, τοποθετοῦ-
 μεν σὴμὰ τι καὶ μετροῦμεν τὰς γωνίας ΒΑΓ καὶ ΑΒΓ . Ἐκ τούτων
 καὶ τῆς ΑΒ εὐρίσκομεν τὸ μῆκος τῆς ΑΓ · εἴτα δ' ἀκοντίων χαράσ-
 σομεν εὐθεῖαν ΓΖ κατευθυνομένην εἰς τὸν ὀπισθεν τοῦ Σ χῶρον καὶ
 μετροῦμεν τὴν γωνίαν αὐτῆς μετὰ τῆς ΑΓ . Ἐὰν ἤδη ὑποθέσω-

μεν ζτι Δ είναι τὸ σημεῖον, εἰς ὃ ἡ ΓZ τέμνει τὴν ἄγνωστον ἐπι-
 προέκτασιν τῆς AB καὶ ἐπιλύσωμεν τὸ τρίγωνον $A\Gamma\Delta$, εὐρίσκομεν
 τὸ μῆκος τῆς $\Gamma\Delta$ καὶ τὴν γωνίαν Δ . Ἀρκεῖ εἶτα τοποθετοῦντες
 τὸ γωνιομετρικὸν ὄργανον εἰς τὸ ἄκρον Δ τῆς ὑπολογισθείσης πλευ-



(Σχ. 64)

ράς $\Gamma\Delta$ νὰ χαράξωμεν δι' ἄκοντίων τῇ βοήθειᾳ αὐτοῦ εὐθεῖαν κει-
 μένην πρὸς ὃ καὶ τὸ Σ μέρος τῆς $\Gamma\Delta$ καὶ σχηματίζουσιν μετ' αὐ-
 τῆς γωνίαν ἴσην τῇ ὑπολογισθείσῃ Δ . Ἡ οὕτω χαρασσομένη εὐ-
 θεῖα εἶναι ἡ ζητούμενη προέκτασις τῆς AB .

§ 141. Πρόβλημα (τοῦ χάρτου) 6ον — Τριῶν ὀρι-
 σμένων καὶ μὴ ἐπ' εὐθείας κειμένων σημείων A, B, Γ ὀριζον-
 τίου ἐδάφους ἀρμοδίως τοποθετηθέντων ἐπὶ χάρτου εἰς τὰς
 θέσεις α, β, γ (Σχ. 65). νὰ τοποθετηθῇ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χάρτου
 σημεῖον M τοῦ αὐτοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου, ἐξ οὗ αἱ εὐθεῖαι
 AB καὶ $A\Gamma$ φαίνονται ὑπὸ γνωστῆς γωνίας ω καὶ φ .


Ἐπειδὴ πᾶν εὐθύγραμμον σχῆμα ἀπεικονίζεται ἐν τῷ χάρτῳ δι'
 ὁμοίου σχήματος, αἱ γωνίαι τῶν ἀπεικονιζομένων σχημάτων διατηροῦν-
 ται ἐπομένως, ἂν μ εἶναι ἡ ἐπὶ τοῦ χάρτου ζητούμενη θέσις τοῦ M , αἱ
 γωνίαι $\alpha\mu\beta$, καὶ $\alpha\mu\gamma$ θὰ εἶναι ἀντιστοίχως ἴσαι πρὸς τὰς ω καὶ φ .
 Τὸ σημεῖον μ εἶναι λοιπὸν κοινὸν σημεῖον τῶν τόξων τῶν κυκλι-
 κῶν τμημάτων, ἅτινα ἔχουσι χορδὰς $\alpha\beta$ καὶ $\alpha\gamma$ καὶ δέχονται ἀντι-
 στοίχως γωνίας ω καὶ φ .

Ἡ κατασκευὴ ὁμοῦς τῶν τόξων τούτων ἐξαρτημένη ἐκ κατασκευῆς
 γωνιῶν δὲν δύναται νὰ γείνη μετὰ τῆς προσηκούσης ἀκριβείας καὶ
 συνεπῶς δὲν ὀρίσεται ὁμοίως ἀκριβῶς ἡ θέσις τοῦ μ . Ἀκριβέστερον

ὀρίζεται αὕτη, ἂν υπολογισθῶσι δύο τῶν ἀποστάσεων μα, μβ, μγ, π.χ. αἱ μα, μγ καὶ γραφῶσι περιφέρειαι μὲ κέντρα α καὶ γ καὶ ἀκτίνας ἀντιστοίχως τὰς μα καὶ μγ. Ὁ υπολογισμὸς τῶν εἰρημένων ἀποστάσεων γίνεται ὡς ἐξῆς. Ἐστω πρῶτον χάριν συντομίας γων. αβμ=χ καὶ γων. αγμ=ψ. Ἔνεκα τῶν τριγώνων αμβ καὶ αμγ εἶναι $\omega + \varphi + \rho + \chi + \psi = 360^\circ$, $\frac{\eta\mu\chi}{\alpha\mu} = \frac{\eta\mu\omega}{\gamma}$, $\frac{\eta\mu\psi}{\alpha\mu} = \frac{\eta\mu\varphi}{\beta}$. Ἐπειδὴ δὲ ἐκ

τῶν δύο τελευταίων ἰσοτήτων προκύπτει $\frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu\psi} = \frac{\beta\eta\mu\omega}{\gamma\eta\mu\varphi}$, τὸ ζήτημα ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τοῦ συστήματος $\chi + \psi + \omega + \varphi + \rho = 360^\circ$, $\frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu\psi} = \frac{\beta\eta\mu\omega}{\gamma\eta\mu\varphi}$, ἣν ἐκτελοῦμεν ὡς ἀκολούθως. Ἐκ τῆς β' αὐτοῦ ἐξίσωσης λαμβάνομεν

$$\frac{\eta\mu\chi - \eta\mu\psi}{\eta\mu\chi + \eta\mu\psi} = \frac{\beta\eta\mu\omega - \gamma\eta\mu\varphi}{\beta\eta\mu\omega + \gamma\eta\mu\varphi}, \quad \text{ἔθεν} \quad \frac{\varepsilon\varphi \frac{\chi - \psi}{2}}{\varepsilon\varphi \frac{\chi + \psi}{2}} = \frac{1 - \frac{\gamma\eta\mu\varphi}{\beta\eta\mu\omega}}{1 + \frac{\gamma\eta\mu\varphi}{\beta\eta\mu\omega}}.$$



(Σχ. 65)



Ἐὰν δὲ τεθῇ $\frac{\gamma\eta\mu\varphi}{\beta\eta\mu\omega} = \varepsilon\varphi\tau$, ἡ προηγούμενη ἰσότης γίνεται

$$\frac{\varepsilon\varphi \frac{\chi - \psi}{2}}{\varepsilon\varphi \frac{\chi + \psi}{2}} = \frac{1 - \varepsilon\varphi\tau}{1 + \varepsilon\varphi\tau}, \quad \text{ἔθεν}$$

$\varepsilon\varphi \left(\frac{\chi - \psi}{2} \right) = - \varepsilon\varphi(45^\circ - \tau) \cdot \varepsilon\varphi \left(\frac{\omega + \varphi + \rho}{2} \right)$. Ὑπολογιζομένης ἐκ
 Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ταύτης τῆς διαφορᾶς $\chi - \psi$ καὶ ἐκ τῆς α' τῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος τοῦ ἀθροίσματος $\chi + \psi$ ὑπολογίζονται εἴτα εὐκόλως ἀμφοτέραι αἱ γωνίαι χ καὶ ψ . Ἡδὴ ἐκ τοῦ ἐτέρου τῶν τριγώνων ἀμδ καὶ ἀμγ, ἑκατέρου τῶν ὁποίων εἶναι γνωστὴ μία πλευρὰ καὶ δύο γωνίαι, ὑπολογίζονται δύο τῶν ἀποστάσεων $\mu\alpha$, $\mu\beta$, $\mu\gamma$, καὶ ὀρίζεται εἴτα, ὡς προείπομεν, ἡ θέσις τοῦ μ .

ΣΗΜ. Πρὸς ἐξέλεξιν τῆς ἀκριβείας τῆς λύσεως ὑπολογίζεται καὶ ἡ τρίτη τῶν προειρημένων ἀποστάσεων καὶ γράφονται τρεῖς περιφέρειαι μὲ κέντρα α , β , γ καὶ ἀκτίνας ἀντιστοίχως τὰς $\mu\alpha$, $\mu\beta$, $\mu\gamma$. Πᾶσαι αὗται δέον νὰ διέρχωνται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου μ , ἂν ἄλανθάστως ἐγένετο ἡ λύσις.

Ἀσκήσεις. 556). Παρατηρητῆς βλέπει πύργον ὑπὸ γωνίαν 60° . Ἐάν δὲ ἀπομακρυνθῇ τῆς θέσεώς του κατὰ 100^m ἐπὶ τῆς εὐθείας, ἣν ὀρίζει ἡ ἀρχικὴ του θέσις καὶ ὁ πύργος τῆς ἐκ τοῦ ὑψηλοτέρου σημείου τοῦ πύργου διερχομένης κατακορύφου, βλέπει αὐτὸν ὑπὸ γωνίαν 30° . Πόσον εἶναι τὸ ὕψος τοῦ πύργου;

557). Δύο παρατηρηταὶ ἀπέχοντες ἀλλήλων 1000^m καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κείμενοι ὀριζοντίου ἐπιπέδου βλέπουσιν ἀπρόσιτον σημεῖον ὑπὸ τὴν αὐτὴν γωνίαν ὕψους 35° , ἐν ᾧ ἑκάτερος τούτων βλέπει τὴν ἀπόστασιν τοῦ ἀπρασίτου σημείου ἀπὸ τοῦ ἄλλου παρατηρητοῦ ὑπὸ γωνίαν 60° . Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος τοῦ ἀπρόσιτου σημείου.

558). Ἐκ τριῶν σημείων A , B , Γ ἐπὶ εὐθείας κειμένων τὸ πρῶτον μόνον εἶναι προσιτόν. Ἀπὸ τετάρτου σημείου Δ ἀπέχοντος τοῦ A 600^m φαίνεται ἡ μὲν AB ὑπὸ γωνίαν 42° , ἡ δὲ $A\Gamma$ ὑπὸ γωνίαν 75° , ἐν ᾧ ἀπὸ τοῦ A φαίνεται ἡ BA ὑπὸ γωνίαν 40° . Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀπόστασις ($B\Gamma$).

559). Εἰς τὴν κορυφὴν πύργου ὕψους 16^m εἶναι ἐστερωμένον κατακορύφως στελέχος τι. Ἡ πρὸς τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ἐκ σημείου τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου, ἐφ' οὗ ἡ βᾶσις τοῦ πύργου διευθυνομένη εὐθεῖα σχηματίζει μετὰ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου γωνίαν 60° , ἡ δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς τὴν κορυφὴν τοῦ πύργου διευθυνομένη εὐθεῖα σχηματίζει μετὰ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου γωνίαν 30° . Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος τοῦ στελέχους.

560). Ἐκ δύο σημείων κειμένων ἐπὶ εὐθείας ἐφαπτομένης κυλινδρικοῦ πύργου καὶ εἰς ἀπόστασιν 100^m ἀπ' ἀλλήλων φαίνεται ὑπὸ τὴν αὐτὴν γωνίαν $6^\circ 4'$ ἡ τομὴ τοῦ πύργου ὑπὸ τοῦ διὰ τῶν σημείων τούτων διερχομένου ὀριζοντίου ἐπιπέδου. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀκτίς τοῦ πύργου.

561) Δύο σημεῖα A καὶ B κείμενα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀριζοντίου
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

· επιπέδου απέχουσιν ἀλλήλων 800^m . Τὸ ὑπὲρ τὸ ὀριζόντιον αὐτῶν ἐπίπεδον ὕψος ἀπρὸς τοῦ σημείου Γ ὀρωμένου μὲν ἀπὸ τοῦ Α εἶναι 30° , ἀπὸ δὲ τοῦ Β 35° , ἐν ᾧ $AB\Gamma=60^\circ$ καὶ $\Gamma AB=62^\circ 15'$. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέγεθος τῆς προβολῆς τῆς γωνίας AGB ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον.

562). Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀκτίς τῆς Γῆς (ὑποτιθεμένης σφαιρικῆς) δεδομένου τοῦ βάθους τοῦ ὀριζήσαντος ω πρὸς παρατηρητὴν κείμενον εἰς δεδομένον ὕψους u ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης — Ἐφαρμογή $u=75^m$, $\omega=15' 30''$.

563). Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος πύργου, οὗ ἡ βάσις εἶναι ἀπρόσιτος.

564) Παρατηρητῆς ὕψους $1,65^m$ εὐρισκόμενος εἰς τὴν ὄχθην λίμνης βλέπει κατὰ τινα στιγμὴν ἀεροπλάνον εἰς ὕψος 48° ὑπὲρ τὸ διὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ του διερχόμενον ὀριζόντιον ἐπίπεδον, τὸ δὲ εἶδωλον τοῦ ἀεροπλάνου τούτου ἐντὸς τῆς λίμνης βλέπει εἰς βάθος 65° ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος τοῦ ἀεροπλάνου κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

565). Πόσας διαφόρους τιμὰς λαμβάνει ἡ παράστασις $\varepsilon\varphi \frac{K\pi}{3}$, τοῦ Κ λαμβάνοντος πάσας τὰς πραγματικὰς καὶ ἀκεραίας τιμὰς;

566). Τὸ αὐτὸ διὰ τὴν παράστασιν $\text{συν} \frac{2K\pi}{5}$.

567). Ἐὰν $\varepsilon\varphi^2\tau=1+2\varepsilon\varphi^2\delta$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\text{συν}^2\delta=1+\text{συν}2\tau$.

568). Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\text{συν}^2(\alpha+\delta)+\text{συν}^2(\alpha-\delta)=1+\text{συν}2\alpha \cdot \text{συν}2\delta$.

569). Νὰ καταστῇ λογιστὴ διὰ τῶν λογαρίθμων ἡ παράστασις $(\eta\mu A + \eta\mu B)^2 + (\text{συν} A + \text{συν} B)^2$.

570) Εὑρεῖν τὸ θετικὸν καὶ μικρότερον 90° τόξον χ , δι' ὃ εἶναι $\eta\mu\chi + \text{συν}\chi = 1,15$.

571) Εὑρεῖν τὴν $\varepsilon\varphi\omega$, γνωστοῦ ὄντος ὅτι $\varepsilon\varphi \frac{\omega}{2} = -1 + \sqrt{2}$.

572) Εὑρεῖν πάσας τὰς μεταξὺ 0° καὶ 1000° γωνίας, ὧν ἑκάστη ἔχει συνημίτονον $0,548$.

573) Νὰ διαιρεθῇ τὸ τόξον 45° εἰς δύο μέρη, ὧν τὸ ἓν νὰ ἔχη ἡμίτονον διπλάσιον τοῦ ἡμιτόνου τοῦ ἄλλου.

574) Νά διαιρεθῆ τὸ τόξον 30° εἰς δύο μέρη, ὧν τὸ ἓν νά ἔχη ἡμίτονον τριπλάσιον τοῦ ἡμιτόνου τοῦ ἄλλου.

575) Διὰ ποίαν θετικὴν καὶ μικροτέραν 90° τιμὴν τοῦ χ ἡ παράστασις $\epsilon\varphi\chi + 3\sigma\varphi\chi$ γίνεται ἐλαχίστη ;

576) Νά εὑρεθῆ ἡ γωνία ἀκμῆς τινος κανονικοῦ τετραέδρου μετὰ ἔδρας μὴ περιεχούσης αὐτὴν ἐκ τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ.

577) Νά ὑπολογισθῆ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ζώνης, ἣτις περιέχεται μετὰ τοῦ γῆίνου ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ γῆίνου παραλλήλου πλάτους 45° .

578) Νά εὑρεθῆ ἡ γωνία δύο διαγωνίων ὀρθ. παραλληλεπιπέδου, ὅπερ ἔχει ὕψος 2^{μ} καὶ βάσιν τετράγωνον πλευρᾶς 1^{μ} .

579) Ὄρθ. τριγώνου $AB\Gamma$ εἶναι $(AB)=2\mu\nu$, $A\Gamma=\mu^2-\nu^2$. Νά ὀρισθῶσιν αἱ $\epsilon\varphi\frac{B}{2}$ καὶ $\epsilon\varphi\frac{\Gamma}{2}$ συναρτήσῃ τῶν ἀριθμῶν μ καὶ ν .

580) Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον, οὗ αἱ πλευραὶ εἶναι ὄροι ἀριθμητικῆς προόδου ἐχούσης λόγον 1, ἡ δὲ μεγαλυτέρα γωνία εἶναι διπλασία τῆς μικροτέρας.

581) Ἐὰν α , β , γ , A , B , Γ εἶναι πλευραὶ καὶ γωνίαι τριγώνου, χ , ψ , z ὀξείαι γωνίαι, δι' ἃς εἶναι

$$\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\alpha}{\beta + \gamma}, \quad \sigma\upsilon\nu\psi = \frac{\beta}{\alpha + \gamma}, \quad \sigma\upsilon\nu z = \frac{\gamma}{\alpha + \beta}, \quad \text{νά ἀποδειχθῆ ὅτι}$$

$$\alpha'). \quad \epsilon\varphi^2\left(\frac{\chi}{2}\right) + \epsilon\varphi^2\left(\frac{\psi}{2}\right) + \epsilon\varphi^2\left(\frac{z}{2}\right) = 1,$$

$$\beta'). \quad \epsilon\varphi\left(\frac{\chi}{2}\right)\epsilon\varphi\left(\frac{\psi}{2}\right)\epsilon\varphi\left(\frac{z}{2}\right) = \epsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right)\epsilon\varphi\left(\frac{B}{2}\right)\epsilon\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right):$$

582) Νά ὑπολογισθῆ ἡ γωνία B τριγώνου $AB\Gamma$, δι' ἣ εἶναι $\Gamma=120^\circ$ καὶ $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$.

583) Δύο διάφορα τρίγωνα ἔχουσιν ἴσα τὰ στοιχεῖα α , β , A ἔν πρός ἓν. Νά ὑπολογισθῆ συναρτήσῃ τῶν στοιχείων τούτων ἡ διαφορά τῶν ἄλλων πλευρῶν αὐτῶν.

584) Νά ὑπολογισθῶσιν αἱ γωνίαι A καὶ B τριγώνου, οὗ $\Gamma=60^\circ$ καὶ $\beta = \frac{\alpha}{2}$.

585) Ἐὰν τὰ μήκη τῶν πλευρῶν τριγώνου εἶναι κατὰ σειρὰν $(\chi^2 + \chi + 1)$, $(2\chi + 1)$, $(\chi^2 - 1)$ καὶ $\chi > 1$, νά ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ ἀπέναντι τῆς α' πλευρᾶς κειμένη γωνία εἶναι 120° .

586) Νά υπολογισθῶσιν αἱ γωνίαι τριγώνου, οὗ αἱ πλευραὶ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς $2, \sqrt{6}, (1 + \sqrt{3})$.

587). Νά ἀποδειχθῇ ὅτι εἰς πᾶν τρίγωνον εἶναι

$$r = 4 R \text{ συν} \left(\frac{A}{2} \right) \text{ συν} \left(\frac{B}{2} \right) \text{ συν} \left(\frac{\Gamma}{2} \right).$$

588). Νά ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 180^{\mu}$, $\beta = 101,0093^{\mu}$ καὶ $A = 2B$.

589). Νά ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ $\alpha = 167^{\mu}$, $\beta = 147^{\mu}$, καὶ $A - B = 15^{\circ} 45' 29'', 32$.

590). Ἐκ τῶν κορυφῶν A, B, Γ τριγώνου ἀγομεν καθέτους ἀντιστοίχως ἐπὶ τὰς $AB, B\Gamma, A\Gamma$. Δειξάι ὅτι ὁ λόγος τοῦ ὑπ' αὐτῶν σχηματιζομένου τριγώνου πρὸς τὸ ἀρχικὸν εἶναι $(\sigma\phi A + \sigma\phi B + \sigma\phi \Gamma)^2$.

591). Διὰ δεδομένου σημείου A κειμένου ἐκτὸς δεδομένου κύκλου νά ἀχθῇ τέμνουσα $AB\Gamma$ τοιαύτη ὥστε νά εἶναι $\widehat{BO\Gamma} = 4(\widehat{OAT})$

592). Τεσσάρων σημείων A, B, Γ, Δ ἐπ' εὐθείας καθ' ἣν ἐγράφησαν τάξιν κειμένων καὶ οὕτως ὥστε $(AB) = 4^{\mu}$, $(B\Gamma) = 2^{\mu}$ καὶ $(\Gamma\Delta) = 6^{\mu}$, νά εὗρεθῶσι σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου, ἐφ' οὗ ταῦτα κεῖνται, ἐξ ἐκάστου τῶν ἐποίων τὰ προειρημένα εὐθ. τμήματα φαίνονται ὑπὸ τὴν αὐτὴν γωνίαν καὶ νά υπολογισθῇ ἡ γωνία αὐτή.

593). Νά ὀρισθῇ τὸ ἥμιτονον τοῦ τόξου α οὕτως ὥστε αἱ ρίζαι, τῆς ἐξίσωσ εως $\chi^4 + \frac{1}{3} \eta\mu\alpha \cdot \chi^2 + \frac{1}{200} \text{ συν} \frac{\pi}{3} = 0$ νά ἀποτελῶσιν ἀριθμητικὴν πρόδον.

594). Εὐρεῖν τὸν λόγον τοῦ ὄγκου σφαίρας πρὸς τὸν ὄγκον σφαιρικοῦ αὐτῆς τμήματος, οὗ ἡ μία βᾶσις διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου, τὸ δὲ ὕψος ἰσοῦται πρὸς τὴν χορδὴν τόξου 20° τῆς περιφερείας μεγ. κύκλου τῆς σφαίρας ταύτης.

595). Νά τραπῇ εἰς γινόμενον ἢ παράστασις $\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma + \eta\mu \Delta$, γνωστοῦ ὅντος ὅτι $A + B + \Gamma + \Delta = 2\pi$.

596). Ἐὰν $\alpha = 18928$, $\epsilon = 20842$, $\omega = 115^{\circ} 45' 27''$, νά εὗρεθῇ ἡ τιμὴ τοῦ χ , δι' ἣν $\chi^3 = \alpha^3 \eta\mu\omega + \epsilon^3$ συνω.

597). Ἐὰν $\epsilon\phi\alpha = \frac{1}{2}$, $\epsilon\phi\beta = \frac{1}{3}$, $\epsilon\phi\gamma = 1 + \sqrt{2}$, $\epsilon\phi\delta = -1 + \sqrt{2}$ νά ὀρισθῇ ἡ ὀξεῖα γωνία χ , δι' ἣν

$$\eta\mu\chi = \frac{\eta\mu(2\alpha + 2\beta - \gamma)}{\eta\mu(2\alpha + 2\beta - \delta)}$$

598) Νά υπολογισθῶσιν αἱ γωνίαι ὀρθ. τριγώνου γνωστοῦ ὄντος εἶτι τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ὕψος διαιρεῖ αὐτὸ εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον.

$$599) \text{Νά λυθῆ ἡ ἐξίσωσις } \sin(\chi + 30^\circ) - \sin(\chi + 45^\circ) = \eta\mu 15^\circ.$$

$$600) \text{Νά λυθῆ ἡ ἐξίσωσις } \eta\mu\chi + \sin\chi = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

601) Νά εὑρεθῆ τὸ θετικὸν καὶ μικρότερον 90° τόξον χ , δι' ὃ εἶναι $\sin 2\chi = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} (\sin\chi - \eta\mu\chi)$.

$$602) \text{Νά λυθῆ ἡ ἐξίσωσις } \epsilon\varphi 2\chi = 3\epsilon\varphi\chi.$$

$$603) \text{Ὅμοίως ἡ } \sin\chi + \sin(\chi + 30^\circ) = \frac{3}{2}.$$

604) Νά ἀπαλειφθῶσιν οἱ χ καὶ ψ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων $\eta\mu\chi = \eta\mu\alpha$, $\eta\mu\gamma$, $\eta\mu\psi = \eta\mu\delta$, $\eta\mu\gamma$, $\epsilon\varphi\left(\frac{\chi}{2}\right) \epsilon\varphi\left(\frac{\psi}{2}\right) = \epsilon\varphi\left(\frac{\gamma}{2}\right)$.

605) Δειξάι ὅτι, ἂν μεταξὺ τῶν γωνιῶν τριγώνου ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης $\eta\mu^2 A = \eta\mu^2 B + \eta\mu^2 \Gamma$, τὸ τρίγωνον εἶναι ὀρθογώνιον.

606) Τριγώνου $AB\Gamma$ εἶναι $(AB) = 293,90^m$, $(A\Gamma) = 201,30^m$ καὶ $A = 23^\circ 27' 32''$. Νά εὑρεθῆ τὸ μῆκος τοῦ ἐντὸς τοῦ τριγώνου τμήματος τῆς ἐπὶ τὴν AB καθέτου, ἧτις διαιρεῖ τὸ τρίγωνον εἰς δύο μέρη ἰσοδύναμα.

607) Ἰσόπλευρον τρίγωνον $AB\Gamma$ στρέφεται περὶ ἄξονα διερχόμενον διὰ τῆς κορυφῆς A , κείμενον ἐν τῇ ἐπιπέδῳ τοῦ τριγώνου καὶ οὕτως ὥστε οὗτος καὶ τὸ τρίγωνον κείνται ἐκατέρωθεν τῆς πλευρᾶς $A\Gamma$, μεθ' ἧς ὁ ἄξων σχηματίζει δεδομένην γωνίαν ω . Νά υπολογισθῆ ὁ ὄγκος τοῦ ὑπ' αὐτοῦ γραφομένου στερεοῦ συναρτήσῃ τῆς πλευρᾶς καὶ τῆς γωνίας ω . — Ἐφαρμογή $\alpha = 730^m$, $\omega = 18^\circ$.

608) Ἐκ δύο σημείων A καὶ B ἀπεχόντων ἀπόστασιν α ὑψοῦνται αἱ κάθετοι ἐπὶ τὴν AB καὶ ἐπ' αὐτῶν πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς AB ἐρίζονται τὰ σημεῖα Γ καὶ Λ οὕτως ὥστε $(A\Gamma) = \gamma$, $(B\Lambda) = \delta$. Νά εὑρεθῆ ἐπὶ τῆς AB σημεῖοι E , τοιοῦτον ὥστε νὰ ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης γων. $\Gamma EA = 2$ γων. (ΔEB) .

609) Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον ἐκ τῶν Y_α , μ_α καὶ $\delta + \gamma = 2\lambda$.

610). Ἐκ τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν τριγώνου νὰ υπολογισθῶσιν αἱ πλευραὶ καὶ γωνίαι τοῦ τριγώνου, ὅπερ ἔχει κορυφᾶς τοὺς πόδας τῶν ὕψων τοῦ πρώτου

611). Νά ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ τρίγωνον, δι' ὃ εἶναι

$$1 + \sigma\phi (45^\circ - B) = \frac{2}{1 - \sigma\phi \Gamma}, \text{ εἶναι ὀρθογώνιον.}$$

612). Τριγώνου ΑΒΓ δίδεται ἡ γωνία Β, ἡ γωνία τοῦ ὕψους ΒΔ μετὰ τῆς διαμέσου ΒΜ καὶ τὸ μῆκος τοῦ εὐθ. τμήματος ΔΜ. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

613). Τριγώνου ΑΒΓ εἶναι $(AB) = 107^m$, $A = 44^\circ 20' 12''$ καὶ $E = 6527$ τ. μ. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

614). Κυκλικὸς τομεὺς ΑΟΓ στρεφόμενος περὶ τὴν διάμετρον ΑΟΒ γράφει σφαιρικὸν τομέα ἴσον πρὸς τὸ τέταρτον τῆς σφαίρας, εἰς ἣν ἀνήκει. Νά εὐρεθῆ ἡ γωνία τοῦ κυκλικοῦ τομέως.

615). Δεδομένης τῆς πλευρᾶς $AB = \gamma$ καὶ τῶν προσκειμένων αὐτῇ γωνιῶν τριγώνου ΑΒΓ νά ἀχθῆ εὐθεῖα ΔΕ παράλληλος πρὸς τὴν πλευρὰν ΑΒ καὶ οὕτως ὥστε τὸ τραπέζιον ΑΒΔΕ εἶναι τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ τριγώνου ΓΔΕ.

616) Νά ὀρισθῆ συναρτήσῃ τῶν πλευρῶν ὀρθ. τριγώνου ἡ γωνία τῶν διαμέσων, αἵτινες ἄγονται ἐκ τῶν ἄκρων τῆς ὑποτείνουσῃς.

617) Διὰ τοῦ μέσου Γ τόξου ΑΓΒ περιφερείας Ο ἄγομεν χορδὴν ΓΕ παράλληλον τῇ ἀκτίνι ΟΑ. Πόση πρέπει νά εἶναι ἡ γωνία ΟΑΒ, ὅπως ἡ ΓΕ διχοτομηθῆται ὑπὸ τῆς ΑΒ ;

618) Νά ἐπιλυθῆ τετράπλευρον περιγεγραμμένον περὶ κύκλον ἀκτίνος ρ, ἔχον ἑμβαδὸν Ε καὶ δύο ἀντικείμενας γωνίας ὀρθὰς.

619) Στέγη ἔχει σχῆμα διέδρου γωνίας, ἧς αἱ ἔδραι ΑΒΓΔ, ΑΒΕΖ εἶναι ὀρθογώνια, ἡ δὲ ἀκμὴ ΑΒ καὶ αἱ ἀντικείμεναι πρὸς ταύτην πλευραὶ ΓΔ καὶ ΕΖ τῶν ἐδρῶν εἶναι ὀριζόντιοι. Ἐὰν ἡ κάθετος τομῆ ΖΑΔ αὐτῆς ἔχῃ πλευρὰς $(ΑΔ) = 5,20^m$, $(ΑΖ) = 3,40^m$ ἡ δὲ ἀπόστασις ΖΔ ἔχει μῆκος $7,10^m$, νά εὐρεθῆ τὸ μέγεθος τῆς διέδρου ταύτης γωνίας.

620) Αἱ πλευραὶ καθέτου τομῆς πλαγίου τριγωνικοῦ πρίσματος ἔχουσι μῆκῃ $0,20^m$, $0,16^m$ καὶ $0,12^m$. Νά ὑπολογισθῶσιν αἱ διέδροι γωνίας, τὰς ὁποίας σχηματίζουν μετ' ἀλλήλων αἱ παράπλευροι ἔδραι τοῦ πρίσματος τούτου.

621). Κλίμαξ εἶναι κεκλιμένη πρὸς τὸ διὰ τῆς βάσεως αὐτῆς διερχόμενον ὀριζόντιον ἐπίπεδον κατὰ 25° , ἔχει δὲ δέκα βαθμίδας, αἱ ὁποῖαι ἀπέχουσιν ἀλλήλων κατὰ $0,18^m$. Πόσον εἶναι τὸ πλάτος ἐκάστης βαθμίδος.

622). Νά ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπὶ ἐπίπεδον ὀρθῆς προβολῆς τριγώνου εἶναι γινόμενον τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ τριγώνου τοῦ ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς γωνίας τοῦ τριγώνου τούτου καὶ τοῦ προβ. ἐπιπέδου. Νά γενικευθῇ ἡ ιδιότης αὕτη διὰ πᾶν εὐθύγραμμον σχῆμα.

623). Τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει μετὰ τῆς προβολῆς του αΒΓ ἐπὶ ἐπίπεδον κοινὴν βᾶσιν ΒΓ καὶ εἶναι διπλάσιον τῆς προβολῆς του. Νά ὑπολογισθῇ ἡ διέδροσ γωνία, ἣτις σχηματίζεται ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ τριγώνου καὶ τοῦ προβολικοῦ ἐπιπέδου.

624). Αἱ πλευραὶ τριγώνου ἔχουσι μήκη $a = (\sqrt{3} : 2)$, $b = (\sqrt{2} : 2)$ $\gamma = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) : 4$ Νά εὐρεθῶσιν αἱ γωνίαι, τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου τούτου καὶ ἡ ἀκτίς τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου.

$$625). \text{Νά λυθῇ ἡ ἐξίσωσις } \epsilon\phi\chi = \frac{\eta\mu 75^\circ - \sigma\upsilon\nu 75^\circ}{\eta\mu 75^\circ + \sigma\upsilon\nu 75^\circ}$$

626) Ἐὰν ἡ διάμεσος ΒΔ ὀρθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ σχηματίζῃ μὲ τὴν ὑποτείνουσαν ΒΓ γωνίαν ω νά ἀποδειχθῇ ὅτι $\epsilon\phi B = 2\epsilon\phi(B - \omega)$.

627) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἀληθεύει ἡ ἰσότης $\frac{\eta\mu^2 \Gamma}{\eta\mu^2 B} - \frac{\sigma\upsilon\nu^2 \Gamma}{\sigma\upsilon\nu^2 B} = \alpha^2 \frac{\gamma^2 - \beta^2}{\beta^2 \cdot \gamma^2}$.

$$628) \text{Νά λυθῇ τὸ σύστημα } 9\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 4, 2\sigma\phi\chi + 4\sigma\phi\psi = 1.$$

629) Τριγώνου ΑΒΓ εἶναι $B = 90^\circ + \Gamma$. Νά ἀποδειχθῇ ὅτι $\beta^2 + \gamma^2 = 4P^2$. Ἐνθα P εἶναι ἡ ἀκτίς τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου.

$$630) \text{Νά λυθῇ ἡ ἐξίσωσις } \beta - \frac{\eta\mu^4 \omega + 1}{\eta\mu^2 \omega} = \eta\mu^2 \omega.$$

$$631) \text{Νά ἀποδειχθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς ἰσότητος } (\eta\mu\alpha + \epsilon\phi\alpha) (\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\phi\alpha) = (1 + \eta\mu\alpha) (1 + \sigma\upsilon\nu\alpha).$$

$$632) \text{Νά λυθῇ ἡ ἐξίσωσις } \sigma\upsilon\nu(\chi + 30^\circ) - \sigma\upsilon\nu(\chi + 45^\circ) = \eta\mu 15^\circ.$$

Τ Ε Λ Ο Σ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίς
3

Ἄποσπάσματα ἐκ τῶν ἐκθέσεων τῶν κ. κ. Εἰσηγητῶν

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προεισαγωγικά προβλήματα. — Σκοπὸς τῆς Τριγωνομετρίας 5—6

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αον

Ὁρισμὸς καὶ στοιχεῖα ἀνύσματος. — Ἄξων, διευθύνον ἄνυσμα ἄξονος. — Θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ ἀνύσματα. — Ἀνύσματα ὁμόρροπα καὶ ἀντίρροπα. — Διαδοχικὰ ἀνύσματα. — Γινόμενον ἀνύσματος ἐπὶ ἀριθμόν. — Ἄλογος ἀνύσματος πρὸς ἄλλο ἄνυσμα, μῆκος ἀνύσματος. Σχέσεις τῶν μηκῶν διαδοχικῶν ἀνυσμάτων πρὸς τὸ μῆκος τῆς συνισταμένης αὐτῶν. — Ὄρθῃ προβολὴ σημείου καὶ ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα. — Προβολικαὶ ιδιότητες ἀνυσμάτων. — Προβολὴ τεθλ. γραμμῆς ἐπὶ ἄξονα. — Προβολικαὶ ιδιότητες τῶν τεθλ. γραμμῶν 6—17

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βον

Μέτρησις καὶ μέτρον τόξου. — Σχέσεις τῶν μέτρων τοῦ αὐτοῦ τόξου. — Γέννεσις τόξου. — Γενίκευσις τῆς ἐννοίας τοῦ τόξου. — Θετικαὶ καὶ ἀρνητικὰ τόξα. — Ἴσα καὶ ἀντίθετα τόξα, ἄθροισμα καὶ διαφορὰ τόξων. — Παραπληρωματικὰ καὶ συμπληρωματικὰ τόξα. — Σχέσεις τῶν μέτρων τόξων τινῶν. Γέννεσις γωνίας, θετικαὶ καὶ ἀρνητικαὶ γωνίαι. — Γενίκευσις τῆς ἐννοίας τῆς γωνίας. — Ἀντιστοιχία γωνιῶν πρὸς τὰ τόξα. — Ἴσαι γωνίαι, ἀναλογία ἐπικ. γωνιῶν πρὸς τὰ ἀντίστοιχα τόξα. — Μέτρον γωνίας. — Γωνία τῶν θετικῶν διευθύνσεων δύο ἄξόνων. Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

17—30

Τριγωνομετρικός κύκλος.— Ἀρχική και τελική ἀκτίς τόξου, πρωτεύοντες ἄξονες τριγ κύκλου.— Συνημίτονον τόξου, μεταβολή τοῦ συνημίτονου τόξου μετά τοῦ τόξου, γραφική παράστασις τῶν μεταβολῶν τοῦ συνημίτονου τόξου.— Ἡμίτονον τόξου, μεταβολή τοῦ ἡμίτονου τόξου μετά τοῦ τόξου, γραφική παράστασις τῶν μεταβολῶν τοῦ ἡμίτονου τόξου.— Σχέσεις τοῦ ἡμίτονου και συνημίτονου τόξου θετικοῦ και μικροτέρου 90° πρὸς τὴν χορδὴν τοῦ διπλασίου τόξου και πρὸς τὸ ἀπόστημα τοῦ κέντρου ἀπὸ τῆς χορδῆς ταύτης.— Ἐφαπτομένη τόξου, μεταβολή αὐτῆς μετά τοῦ τόξου και γραφική παράστασις τῶν μεταβολῶν τούτων.— Συνεφαπτομένη τόξου, μεταβολή αὐτῆς μετά τοῦ τόξου και γραφική παράστασις τῶν μεταβολῶν τούτων.— Τέμνουσα και συντέμνουσα τόξου.— Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ γωνίας.— Συνημίτονον τῆς γωνίας τῶν θετικῶν διευθύνσεων δύο ἄξόνων.— Ἐτέρα ἔκφρασις τοῦ μήκους τῆς ὀρθῆς προβολῆς ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα.— Τόξα, ὧν δίδεται τριγωνομετρικός τις ἀριθμός

30—58

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δον

Σχέσεις τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τοῦ αὐτοῦ τόξου.— Ἐφαρμογαὶ τῶν σχέσεων τούτων εἰς τὴν εὔρεσιν τῶν ἄλλων τριγ. ἀριθμῶν τόξου συναρτήσῃ ἐνὸς τούτων.— Σχέσεις τῶν τριγ. ἀριθμῶν τόξων ἀντιθέτων, παραπληρωματικῶν, συμπληρωματικῶν, διαφερόντων κατὰ 180° ἢ 90° , ἐχόντων ἄθροισμα 360° .— Ἀναγωγή τόξου εἰς τὸ α' τεταρτημόριον.— Ἡμίτονον, συνημίτονον, ἐφαπτομένη τῶν τόξων $(\alpha + \beta)$, $(\alpha - \beta)$ και 2α .— Εὔρεσις τοῦ συνω και ἡμω συναρτήσῃ τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$.— Συνημίτονον, ἡμίτονον και ἐφαπτομένη τόξου 3α .— Εὔρεσις τοῦ ἡμ $\frac{\omega}{2}$, συν $\frac{\omega}{2}$, ἐφ $\frac{\omega}{2}$ συναρτήσῃ τοῦ συνω ἢ ἡμ ω.— Εὔρεσις τῆς ἐφ $\frac{\omega}{2}$ συναρτήσῃ τῆς ἐφω

58—86

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εον

Εἶδη τριγωνομετρικῶν πινάκων. — Περιγραφή τῶν λογαριθμικῶν τριγ. πινάκων Dupuis. — Χρήσις τῶν λογαριθμικῶν τριγ. πινάκων. — Χρήσις αὐτῶν διὰ τόξα μικρότερα 2^ο καὶ μεγαλύτερα 88^ο.

86 - 98

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤον

Μετασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων $\eta\mu A \pm \eta\mu B$, $\sigma\upsilon\nu A \pm \sigma\upsilon\nu B$ εἰς γινόμενα. Ἐφαρμογὴ εἰς τὸν μετασχηματισμὸν τῶν παραστάσεων $\frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B}$,

$\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma - \eta\mu(A+B+\Gamma)$ καὶ $\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma$, ἂν $A+B+\Gamma=180^\circ$. — Μετασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων $\eta\mu A \pm \sigma\upsilon\nu B$ εἰς γινόμενα. Μετασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων $\epsilon\phi A \pm \epsilon\phi B$, ἔφαρμογὴ εἰς τὰς παραστάσεις $1 \pm \epsilon\phi t$. Μετασχηματισμὸς γινομένου ἡμιτόνου καὶ συνημιτόνου εἰς ἡμίθροισμα ἢ ἡμιδιαφορὰν. — Μετασχηματισμὸς διὰ τῆς χρήσεως βοηθητικῆς γωνίας παραστάσεων τῆς μορφῆς $\alpha \pm \epsilon, \sqrt{a^2 + \epsilon^2}$, $a\eta\mu\chi \pm \epsilon\sigma\upsilon\nu\chi$ εἰς ἄλλας λογιστὰς διὰ τῶν λογαριθμῶν

98 - 106

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζον

Τριγωνομετρικαὶ ἔξισώσεις καὶ τριγ. συστήματα. Ἀπαλοιφή ἀγνώστων τόξων μεταξὺ ἔξισώσεων τριγ. συστήματος

106 - 122

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ηον

Κύρια καὶ δευτερεύοντα στοιχεῖα τριγώνου. Τριγωνομετρικαὶ σχέσεις μεταξὺ τῶν κυρίων στοιχείων ὀρθ. τριγώνου. — Ἐπίλυσις ὀρθ. τριγώνου ἐκ κυρίων δεδομένων στοιχείων. — Ἐπίλυσις ὀρθ. τριγώνων, ὅταν τὰ δεδομένα στοιχεῖα δὲν εἶναι ἀμφοτέρω ἐκ τῶν κυρίων στοιχείων

122 - 137

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θον

Τριγωνομετρικαὶ σχέσεις τῶν κυρίων στοιχείων οἰουδήποτε τριγώνου. — Ἐπίλυσις οἰωνδήποτε τριγώνων, ὧν τὰ δεδομένα στοιχεῖα εἶναι ἐκ τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν. Σχέσεις κυρίων στοιχείων τριγώνου πρὸς τὴν P , Q , $Q_α$, $Q_β$, $Q_γ$. — Σχέσεις τῶν ὑψῶν, διαμέσων, διχοτομουσῶν τριγώνου πρὸς ἄλλα στοιχεῖα αὐτοῦ. — Ἐπίλυσις οἰωνδήποτε τριγώνων, ὧν τὰ δεδομένα στοιχεῖα εἶναι τυχόντα. — Εἶδη μεθόδων ἐπιλύσεως τριγώνων. — Ἐπίλυσις κυρτῶν τετραπλεύρων. — Ἐπίλυσις ἐγγραψίμου εἰς κύκλον κυρτοῦ τετραπλεύρου, ὧν δίδονται αἱ πλευραὶ. — Ὑπολογισμὸς τῶν διαγωνίων καὶ τῆς P ἐγγραψίμου κυρτοῦ τετραπλεύρου ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ. 137—174

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιον

Εὔρεσις τῆς ἀποστάσεως προσιτοῦ ἀπὸ ἀπροσίτου σημείου καὶ δύο ἀπροσίτων σημείων. — Εὔρεσις τοῦ ὕψους πύργου καὶ ὄρους. — Χάραξις τῆς προεκτάσεως εὐθείας ὀπισθεν κωλύματος. — Πρόβλημα τοῦ χάρτου. Διάφοροι ἀσκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν. 177—186
Πίναξ τῶν περιεχομένων. 187—190
Ἔργα τοῦ αὐτοῦ συγγραφέως. 191—192



0020632503
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων. *Ἡ συντομωτέρα καὶ μεθοδικωτέρα ὄλων.*
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΘ. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων συντεταγμένη κατὰ τὰς τελευταίας ἀπαιτήσεις τῆς Μαθηματικῆς ἐπιστήμης καὶ διδακτικῆς. Ἐνεκρίθησαν κατὰ τὸν τελευταῖον διαγωνισμόν διὰ τὴν πενταετίαν 1932 — 37 χαρακτηρισθέντα *τελείοτατα ἀπὸ πάσης ἀπόψεως.*
3. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων. Ἐνεκρίθη κατὰ τὸν νόμον 3438 διὰ τὴν πενταετίαν 1931—36 ὡς διακρινομένη διὰ τὸ *εὐμέθοδον, σύντομον, τοὺς πολυπληθεῖς καὶ λίαν ἐπιτυχεῖς νεωτερισμοὺς καὶ διὰ τὰς πολυαρίθμους καὶ καταλλήλους ἀσκήσεις.*
4. ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν πρακτικῶν Λυκείων καὶ τῶν ὑποψηφίων διὰ τὰς ἀνωτάτας τοῦ Κράτους σχολάς. Τὸ βιβλίον τοῦτο διακρίνεται διὰ τὸ *εὐμέθοδον, τὸν πλοῦτον τῶν θεμάτων καὶ ἀσκήσεων καὶ διὰ τοὺς ἐπιτυχεσιτάτους νεωτερισμοὺς αὐτοῦ.* Πρώτην φορὰν ἐκδίδεται παρ' ἡμῖν τόσον πλούσιον καὶ πλήρες βιβλίον στοιχειώδους Ἀλγέβρας.
5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν Πρακτικῶν Λυκείων καὶ παντὸς ἀσχολουμένου εἰδικῶς μὲ τὰ Μαθηματικά. Εἶναι μοναδικὸν εἰς τὸ εἶδος του παρ' ἡμῖν τὸ βιβλίον τοῦτο.
6. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν

τῶν Πρακτικῶν Λυκείων καὶ τῶν σπευδαστῶν τῶν Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν. Τὸ βιβλίον τοῦτο διακρινόμενον διὰ τὴν **μεθοδικότητα, ἀπλότητα καὶ τὸ πλήθος τῶν ἐπιτυχῶν καὶ καταλλήλως διατεταγμένων ἀσκήσεων**, ἐνεκρίθη διὰ τὴν πενταετίαν 1932—37.

7. ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ πρὸς χοῦσιν τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων ἐγκριθεῖσα διὰ τὴν πενταετίαν 1931—36 ὡς διακρινομένη διὰ τὴν μεθοδικότητα, τὴν τάξιν καὶ τὴν ἀπλότητα καὶ σαφήνειαν τῆς γλώσσης.

8. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ πρὸς χοῦσιν τῶν μαθητῶν τῶν Πρακτικῶν Λυκείων καὶ τῶν ὑποψηφίων διὰ τὰς ἀνωτάτας τοῦ Κράτους Σχολὰς. Μοναδικὸν εἰς τὸ εἶδος τοῦ παρ' ἡμῖν τὸ βιβλίον τοῦτο διακρίνεται διὰ τὴν **ἀπλότητα, σαφήνειαν καὶ τὰς ἐπιτυχεστάτας ἀσκήσεις**.

9. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ πρὸς χοῦσιν τῶν μαθητῶν τῶν Ἡμιγυμνασίων καὶ τῶν κατωτέρων τάξεων τῶν Γυμνασίων. Τὸ βιβλίον τοῦτο εἶναι αὐστηρότατα συντεταγμένον κατὰ τὸ τελευταῖον πρόγραμμα καὶ ἐνεκρίθη διὰ τὴν πενταετίαν 1932—37 ὡς **μεθοδικώτατον, ἀπλοῦστατον, συντιμώτατον καὶ γλωσσικῶς σαφέστατον**. Ὁ τρόπος δέ, καθ' ὃν τοῦτο εἶναι συντεταγμένον διευκολύνει τὰ μέγιστα τὴν διδασκαλίαν κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ σχολείου ἐργασίας.

10. ΛΥΣΕΙΣ τῶν ἐν τῇ Στοιχειώδει Γεωμετρίᾳ περιεχομένων ἀσκήσεων.

12. ΛΥΣΕΙΣ τῶν εἰς ἀμφοτέρας τὰς Τριγωνομετρίας καὶ τὴν Κοσμογραφίαν περιεχομένων ἀσκήσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΝ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 131—ΑΘΗΝΑΙ

Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

$$\ln 2a = \frac{1 \cdot \ln 2}{1 + \ln 2}$$

$$\ln 2a = \frac{\ln 2}{1 + \ln 2}$$

$$\begin{aligned} 10^2 &= 1000 \\ \log x &= 2 \\ \log x + \log x &= 2 \\ 2 \log x &= 2 \\ \log x &= 1 \\ x &= 10 \end{aligned}$$



