

1413

• ΝΕΙΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΓΙΟΥ

Τακτικοῦ Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ
καὶ τῇ Σχολῇ τῶν Ν. Δοκίμων

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Ἐνεκριθὲν κατὰ τὴν ὑπ' ἀριθ. $\frac{13144}{7-5-19}$ κοινοποίουσιν τοῦ
Ὑπουργείου τῆς Παιδείας.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

26, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

1924

Πᾶν ἀντίτυπον ψὲ φέρον τὴν ὑπογραφὴν τοῦ συγγραφέως
θεωρεῖται κλεψίτυπον.

Ελληνική Κυρία



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

L413



§ 1. Θετικοὶ καὶ ἀρνητικοὶ ἀριθμοί.

α') Διὰ τῶν ἀκεραιών καὶ κλασματικῶν ἀριθμῶν δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν πᾶσαν πρόσθεσιν, πολλαπλασιασμόν, καὶ διαίρεσιν, ὅχι ὅμως καὶ πᾶσαν ἀφαίρεσιν. Οὕτω π.χ. δὲν δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν ἀφαίρεσιν 3—7, εἰς τὴν δποίαν ὁ ἀφαιρετέος εἶνε μεγαλύτερος τοῦ μειωτέου. Διότι, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἀκέραιος οὔτε κλασματικός τις ἀριθμός, ὁ δποῖος προστιθέμενος εἰς τὸν 7 δίδει ἄθροισμα τὸν 3.

Θὰ μάθωμεν νέον εἶδος ἀριθμῶν, καὶ θὰ δεῖξωμεν, ὅτι καὶ μετὰ τῶν γνωστῶν ἀκεραιών καὶ κλασματικῶν δύνανται νὰ προστεθοῦν, νὰ ἀφαιρεθοῦν, νὰ πολλαπλασιασθοῦν καὶ νὰ διαιρεθοῦν ἀκόμη δέ, ὅτι μὲ τὴν βοήθειαν αὐτῶν δύναται νὰ ἐκτελεσθῇ καὶ πᾶσα ἀφαίρεσις.

β') Νὰ προσθέσωμεν δύο ἀριθμούς, π.χ. τὸν 9 καὶ 4, σημαίνει, καθὼς γνωρίζομεν, νὰ ἐνώσωμεν τὰς μονάδας τοῦ 9 καὶ τοῦ 4 καὶ νὰ εἴρωμεν τὸν ἀριθμόν, ὁ δποῖος ἐκφράζει τὸ οὔτω προκυπτον πλῆθος τῶν μονάδων. Ενίστε ὅμως ενδίσκομεν δύο ἀριθμούς τοῦ αὐτοῦ μὲν εἶδον, ἀλλὰ μὲ διάφορα γνωρίσματα, οἱ δποῖοι κατὰ τὴν τοιαύτην ἔνωσιν τῶν μονάδων των δίδουν ἔξαγόμενον ἵσον μὲ μηδέν. Εάν π.χ. εἰς τὸν ἀριθμὸν 6 δρ. δώσωμεν τὸ γνώρισμα, ὅτι εἶνε κέρδος ἐνὸς ἀνθρώπου, ἔχωμεν δὲ καὶ ἄλλον ἀριθμὸν 6 δρ., ὁ δποῖος παριστάνει ζημιάν τοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐνώσωμεν τὰς μονάδας τῶν δύο αὐτῶν ἀριθμῶν, καθεμία μονάς τοῦ κέρδους ἔξουδετερώνει μίαν τῆς ζημιάς· καὶ ἀντιστόφως. Οὕτω τὸ ἔξαγόμενον τῆς τοιαύτης ἐνώσεως εἶνε ἵσον μὲ μηδέν. "Οιμοίον τι ἔχουμεν καὶ εἰς ἄλλας περιπτώσεις. Π.χ. ἐὰν διανύσῃ τις ἐπ'

εὐθείας δόδοι, ἀπὸ ἐν ὀρισμένον σημεῖον αὐτῆς, ἕνα ἀριθμὸν βημάτων πρὸς μίαν φοράν, ἔστω πρὸς βορρᾶν, καὶ ἐπειτα τὸ αὐτὸ πλῆθος βημάτων πρὸς νότον, ἀπὸ τὸ σημεῖον εἰς τὸ δυοῖον ἐφθασε προηγουμένως, ζητεῖται δὲ πόσον θὰ ἀπέχῃ εἰς τὸ τέλος ἐκ τοῦ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως. Ἐὰν ἐν σῶμα θερμανθῇ μέχρις ὀρισμένου βαθμοῦ, καὶ ἐπειτα ψυχθῇ ἐκ τοῦ βαθμοῦ αὐτοῦ, καθ' ὅσους βαθμοὺς ἐνθερμάνθη, ζητεῖται δὲ κατὰ πόσον μετεβλήθη ἡ θερμοκρασία τοῦ σώματος κατὰ τὸ χρονικὸν αὐτὸ διάστημα. Ἐὰν κερδίζῃ τις ἐνα ἀριθμὸν δραχμῶν, καὶ ἐπειτα γάνη τὸ αὐτὸ ποσόν. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοί, οἵτινες ἔχουν τὴν ἀνωτέρῳ ιδιότητα, δηλαδὴ τὸ ἀθροισμά των νὰ είνε τοσούν μὲ μηδέν, λέγομεν ὅτι ἔχουν τοσούν πλήθος μονάδων, ἀλλ' είνε ἀντίθετοι. «Ωστε,

«ἀντίθετοι λέγονται δύο ἀριθμοί, ἂν ἔχουν τοσούν πλήθος μονάδων, τὸ δὲ ἀθροισμά των τοσούται μὲ μηδέν».

γ) Διὰ νὰ ἐκφράσωμεν διὰ συμβόλου τὴν ἀντίθεσιν δύο ἀριθμῶν, γράφομεν πρὸ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν δύο τὸ σημεῖον + (σύν), πρὸ δὲ τοῦ ἄλλου τὸ —(πλήν) καὶ τὸ μὲν + λέγεται θετικὸν σημεῖον τὸ δὲ — ἀρνητικὸν σημεῖον.

«Ωστε δύο ἀντίθετοι ἀριθμοί, καθεὶς τῶν δυοῖων ἔχει 6 μονάδας, γράφονται + 6 καὶ — 6, ἀπαγγέλλονται δὲ ἀντιστοίχως οὕτω· σὸν ἔξ, πλὴν ἔξ.

δ) Εἰς ἔκαστον ἔκ τῶν γνωστῶν (ἀκεραίων ἢ κλασματικῶν) ἀριθμῶν ἀντιστοιχοῦν δύο ἀντίθετοι ἀριθμοί.

Π. χ. εἰς τὸν 23 ἀντιστοιχοῦν οἱ ἀντίθετοι + 23 καὶ — 23

$$\begin{array}{ccccccc} \gg & \frac{3}{5} & \gg & \gg & + & \frac{3}{5} & \gg \\ \gg & 6,15 & \gg & \gg & + & 6,15 & \gg \\ & & & & & & - 6,15. \end{array}$$

ε') Ἔν γένει, δύο ἀριθμοὶ λέγονται ἐτερόσημοι, ἐὰν δὲ εἰς ἔχῃ πρὸ αὐτοῦ τὸ σημεῖον +, δὲ δὲ ἄλλος τὸ —. Π. χ. οἱ + 8 καὶ — 3, ἐπίσης οἱ — 15 καὶ + $\frac{5}{9}$, οἱ + 2,15 καὶ — 6 $\frac{3}{4}$, είνε ἐτερόσημοι ἀριθμοί.

Συνήθως παραλείπεται τὸ σημεῖον + εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀριθμοῦ. Επομένως, δταν δὲ εἰς ἀριθμὸς δὲν ἔχῃ πρὸ αὐτοῦ σημεῖον, ὑποτίθεται δτι ἔχει τὸ σημεῖον +.

Ϛ') Οἱ ἀριθμοί, οἱ δυοῖοι ἔχουν πρὸ αὐτῶν ἐν τῶν δύο σημείων +

Ἔ — λέγονται ἀλγεβρικοὶ ἀριθμοί· καὶ θετικοὶ μέν, ἢν ἔχουν τὸ +, ἀρνητικοὶ δέ, ἢν τὸ -. Π. γ. οἱ

$$14 + 12 \frac{3}{7}, \quad 2,15$$

εἶνε θετικοὶ ἀριθμοί, ἐνῶ οἱ

$$-3, \quad -7, \quad -2,13 \quad \text{εἶνε ἀρνητικοί.}$$

Ἄριθμοὶ ἔχοντες τὸ αὐτὸ σημεῖον (εἴτε τὸ σύν, εἴτε τὸ πλήν) λέγονται δύσοποι ἀριθμοί.


ζ') Καλοῦμεν ἀπόλυτον ἀριθμόν, ἥ ἀπόλυτον τιμῆν, ἐνὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ, τὸν ἀριθμόν, δστις προκύπτει ἐκ τοῦ ἀλγεβρικοῦ, ἢν παραλείψωμεν τὸ σημεῖον του, καὶ θεωροῦμεν μόνον τὸ πλῆθος τῶν μονάδων του. Κατὰ ταῦτα, οἱ ἀπόλυτοι ἀριθμοὶ τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν

$$4 - 8 - 6 + 2 - 3, 5 - 3 \frac{1}{2}$$

$$\text{εἶνε οἱ} \quad 4 \quad 8 \quad 6 \quad 2 \quad 3, 5 \quad 3 \frac{1}{2}$$

§ 2. *) Ημεράστασις τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν διὰ σημείων.—

α') Δυνάμεθα νὰ παριστήσωμεν πάντας τοὺς ἀμῆμοὺς διὰ σημείων μᾶς εὐθείας γραμμῆς, τὴν δόποιαν θὰ καλοῦμεν εὐθεῖαν τῶν ἀριθμῶν. Πρὸς τοῦτο, λαμβάνομεν μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν χ' χ σγ. (1). Ἐπ' αὐτῆς λαμβάνομεν ἐν σημεῖον, ἔστω Ο, τὸ δόποιν δοῖτομεν ἐκ τῶν προτέρων νὰ παριστάνῃ τὸ μηδέν. Ἐπειτα λαμβάνομεν πρὸς μίαν φορὰν, π. γ. τὴν ἐκ τοῦ Ο πρὸς τὸ χ, μῆκος ἵσον μὲ τὴν μονάδα τοῦ μῆκους, ἔστω μὲ 1 μ., τὸ ΟΘ. Τὸ σημεῖον Θ παριστάνει τὴν θετικὴν μονάδα + 1. Καθ' ὅμοιον τρόπον εὐρίσκομεν τὰ σημεῖα, Α, Β, Γ, ...



(Σγ. 1)

σγ. (1), τὰ δόποια παριστάνουν τους ἀριθμοὺς + 2 + 3 + 4... ἐὰν

*) Τὰ φέροντα ἀστερίσκους δύνανται νὰ παραλείπωνται κατὰ τὴν διδασκαλίαν (ἢν δὲν ἔπαρχῃ ὁ γράνος) ἀλλὰ τοῦτο μόνον εἰς κλασικὰ Γυμνάσια.

λάβωμεν ἐκ τοῦ Ο πρὸς τὴν αὐτὴν φορὰν Οχ μῆκος ἵσον μὲ 2· 3· 4...

Ἐὰν ἐκ τοῦ Ο καὶ πρὸς τὴν ἀντίθετον φορὰν τῆς προηγουμένης, τὴν ἐκ τοῦ Ο πρὸς τὸ χ', λάβωμεν διοίως τὸ μῆκος ΟΘ' ἵσον μὲ μίαν μονάδα μήκους, τὸ Θ' θὰ παριστάνῃ τὸ — 1. Κατ' ἀνάλογον τρόπον εὑρίσκομεν τὰ σημεῖα Α', Β', Γ', Δ'... τὰ διοίως παριστάνουν τοὺς ἀριθμούς — 2· — 3· — 4... σγ. (1).

Ϛ') Ὁμοίως εὑρίσκομεν τὸ σημεῖον, τὸ διοίων παριστάνει ἓνα κλασματικὸν ἀριθμόν, π. χ. τὸν $\frac{1}{2}$. Πρὸς τοῦτο, λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς εὐθείας μῆκος ἵσον μὲ τὸν δοθέντα ἀριθμόν, π. χ. ἵσον μὲ $\frac{1}{2}$ τῆς μονάδος μήκους, καὶ πρὸς τὴν φορὰν Οχ μὲν ἀπὸ τοῦ Ο, ἐὰν δοθεῖς ἀριθμὸς εἴνει θετικός, πρὸς τὴν Οχ' δέ, ἢν εἴνει ἀρνητικός.

γ') Τὸ μέρος Οχ τῆς εὐθείας χ' κ λέγεται θετικὸν τυπῆμα τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν, καὶ ἐπ' αὐτοῦ κεῖνται πάντα τὰ σημεῖα, τὰ διοίων παριστάνουν τοὺς θετικοὺς ἀριθμούς. Τὸ Οχ' λέγεται ἀρνητικὸν τυπῆμα, καὶ ἐπ' αὐτοῦ κεῖνται πάντα τὰ σημεῖα, τὰ διοίων παριστάνουν τοὺς ἀρνητικοὺς ἀριθμούς. Ἡ φορὰ Οχ λέγεται θετική, ἡ δὲ Οχ' ἀρνητική, καὶ καθεμία σημειώνεται μὲ ἐν βέλος, καθὼς εἰς τὸ σγ. (1).

δ') Ἐὰν ὁδοιπόρος διατρέξῃ 2 μέτρα ἐπὶ τοῦ Οχ ἀπὸ τοῦ Ο, θὰ παριστάνωμεν τὸν δρόμον αὐτὸν διὰ τοῦ τμήματος ΟΑ, τὸ διοίων ἵσονται μὲ δύο μονάδας μήκους τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν. Ἀνάλογα παρατηροῦμεν, καὶ ἢν ἄλλος ὁδοιπόρος διατρέξῃ 2 μ. ἀπὸ τοῦ Ο ἐπὶ τοῦ Οχ'. Ο δρόμος αὐτὸς θὰ παριστάνεται ὑπὸ τοῦ τμήματος ΟΑ'. Οὗτῳ δυνάμεθα νὰ παριστάνωμεν τοὺς ἀλγεβρικοὺς ἀριθμούς καὶ διὰ τημάτων, τὰ διοίων λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν. Τὸ μῆκος αὐτῶν μετροῦμεν ἀπὸ τοῦ Ο καὶ εἴνει ἵσον μὲ τόσας μονάδας μήκους, δοσας ἔχει ὁ δοθεῖς ἀριθμός.

ε') Κατὰ ταῦτα, ἢν θέλωμεν νὰ παραστήσωμεν ἐν χρονικὸν διάστημα, π. χ. μετὰ 2 ἔτη (+ 2 ἔτη), λαμβάνομεν ἀπὸ τοῦ σημείου Ο ἐν μῆκος ΟΑ ἵσον μὲ δύο μονάδας μήκους, καὶ τὸ σημεῖον Α παριστάνει τὸν ἀριθμὸν (+ 2), τὸ δὲ μῆκος ΟΑ τὸ διάστημα + 2 ἔτῶν. Ὁμοίως τὸ χρονικὸν διάστημα πρὸ 3 ἔτῶν (- 3 ἔτ.) παριστάνεται

νπὸ τοῦ τιμήματος ΟΒ'. Ἐὰν δύο ὁδοιπόροι ἀναχωροῦν ἀπὸ τὸ αὐτὸν σημεῖον, καὶ διευθύνωνται ἀντιθέτως, ὃ μὲν εἰς μὲ ταχύτητα 5 χμ. πρὸς τὴν θετικὴν φοράν, ὃ δὲ ἄλλος πρὸς τὴν ἀρνητικὴν μὲ ταχύτητα 4 χμ., ἡ μὲν ταχύτης τοῦ πρώτου θὰ παριστάνεται ὑπὸ τοῦ τιμήματος ΟΔ, ἵσου μὲ 5 μονάδας μῆκους, καὶ κειμένου ἐπὶ τοῦ θετικοῦ τιμήματος τῆς εὐθείας τῷν ἀριθμῷν, ἡ δὲ ταχύτης τοῦ δευτέρου ὑπὸ τιμήματος ΟΓ', ἀντιθέτου τοῦ πρώτου, καὶ ἔχοντος μῆκος ἵσου μὲ 4 μονάδας μῆκους. Ἀνάλογα παρατηροῦμεν διὰ τὴν παράστασιν τῆς θερμοκρασίας ἀνω ἢ κάτω τοῦ μηδενὸς εἰς τὸ θερμόμετρον.

§ 3. Σχέσις τῶν ἀριθμῶν πρὸς τὴν θετικὴν μονάδα.—

α') Γνωρίζομεν ὅτι πᾶς ἀπόλυτος ἢ θετικὸς ἀριθμὸς γίνεται ἐκ τῆς μονάδος, ἢ ἐξ ἑνὸς τῶν ἵσων μερῶν της, διὰ τῆς ἐπαναλήψεως. Καθ' ὅμοιον τρόπον, πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς γίνεται ἐκ τῆς ἀρνητικῆς μονάδος, ἢ ἐξ ἑνὸς τῶν ἵσων μερῶν της, διὰ τῆς ἐπαναλήψεως. Οὕτω ὁ — 3 γίνεται ἐκ τῆς — 1, ἐὰν τὴν ἐπαναλάβωμεν τρεῖς φοράς· ὁ — $\frac{3}{5}$ γίνεται ἐκ τοῦ πέμπτου τῆς — 1, ἐὰν ἐπαναλάβωμεν αὐτὸν τρεῖς φοράς.

β') Ἐπειδὴ ἡ ἀρνητικὴ μονάδα — 1 εὑρίσκεται ἀπὸ τὴν θετικὴν μονάδα + 1, ἐὰν ἀλλάξωμεν τὸ σημεῖόν της, δεχόμεθα ὅτι,

«πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς γίνεται ἀπὸ τὴν θετικὴν μονάδα, ἐὰν ἀλλάξωμεν τὸ σημεῖόν της, καὶ ταύτην, ἢ μέρος της, ἐπαναλάβωμεν πολλάκις».

Οὕτω δεχόμεθα ὅτι ὁ — 7 γίνεται ἐκ τῆς + 1, ἐὰν πρῶτον λάβωμεν τὴν ἀντίθετόν της — 1, καὶ ἀντὶ τὴν ἐπαναλάβωμεν ἐπτὰ φοράς· ὁ — $\frac{3}{8}$ γίνεται ἀπὸ τὴν + 1, ἐὰν πρῶτον λάβωμεν τὴν ἀντίθετόν της — 1, καὶ τὸ ὅγδοον ταύτης ἐπαναλάβωμεν τρίς.

Πράξεις ἐπὶ τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν

§ 4. Ὁρισμοί.—

α') Υποθέτομεν, ὅτι καὶ διὰ τοὺς ἀλγεβρικοὺς ἀριθμοὺς διατηρεῖται ἡ ἴσχυς τῶν θεμελιωδῶν ἴδιοτήτων τῶν πράξεων (τοῦ νόμου τῆς ἀντιμεταθέσεως, καὶ τοῦ ἐπιμεριστικοῦ νόμου) κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

6') Όταν σημειώνωμεν τὰς πράξεις τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν, γράφομεν αὐτούς, συνήθως, ἐν παρενθέσει μετὰ τοῦ σημείου των, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοῦ σημείου τῶν πράξεων προσθέσεως, καὶ ἀφαιρέσεως. Π. χ. γράφομεν $(-3) + (+5)$, ὅταν πρόκειται νὰ προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμούς -3 καὶ $+5$.

Ομοίως γράφομεν $(-3) - (-8)$, ὅταν πρόκειται νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν -3 τὸν -8 .

§ 5. Προσθετικά.

a') Πρόσθετις ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν καλεῖται ἡ πρᾶξις, διὰ τῆς δοπίας, δοθέντων ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν, εὑρίσκομεν ἄλλον, ἀποτελούμενον ἐκ πασῶν τῶν μονάδων τῶν δοθέντων.

Οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ λέγονται προσθετέοι, τὸ ἔξαγόμενον τῆς προσθέσεως ἀθροισμα, τὸ δὲ σημεῖον τῆς πράξεως εἶναι τὸ $+$ (σύν).

Διακρίνομεν δύο περιπτώσεις ἐν τῇ προσθέσει ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν, καθόσον οἱ προσθετέοι εἶναι ὅμοσημοι, ἢ ἑτερόσημοι.

6') Πῶς προσθέτομεν ὁμοσήμους ἀριθμούς.

Τὸ ἀθροισμα $(+7) + (+5)$ εἶναι ἵσον μὲ $+12$. Διότι 7 θετικαὶ μονάδες καὶ 5 θετικαὶ κάμνουν 12 θετικάς.

Ομοίως τὸ ἀθροισμα $(-7) + (-5)$ εἶναι ἵσον μὲ -12 . Διότι 7 ἀρνητικαὶ μονάδες καὶ 5 ἀρνητικαὶ κάμνουν 12 ἀρνητικάς. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχομεν,

$$(-3) + (-2) + (-8) = -13.$$

$$\text{Ἐπίσης} \quad (+2) + (+6) + (+10) = 18$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι

«διὰ νὰ προσθέσωμεν ἀλγεβρικοὺς ἀριθμούς, ἔχοντας τὸ αὐτὸν σημεῖον, προσθέτομεν τὰς ἀπολύτους τιμάς των, καὶ εἰς τὸ ἀθροισμα θέτομεν τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν προσθετέων».

γ') Πῶς προσθέτομεν δύο ἑτεροσήμους ἀριθμούς.

Τὸ ἀθροισμα $(+7) + (-5)$ εἶναι ἵσον μὲ $+2$. Διότι, καθεμία τῶν 5 ἀρνητικῶν μονάδων ἔξουδετερώνεται μὲ μίαν ἀντίστοιχόν της θετικὴν ἐκ τῶν 7, καὶ μένουν μόνον δύο θετικαί. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον εὑρίσκομεν ὅτι

$$(-7) + (+5) = -2 \cdot (-10) + (+10) = 0,$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(+\frac{1}{4}\right) = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\left(+\frac{4}{4}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) = +\frac{1}{4}.$$

Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι,

«διὰ νὰ προσθέσωμεν δύο ἑτεροσήμους ἀριθμούς, ἀφαιροῦμεν τὴν μικροτέραν ἐκ τῶν ἀπολύτων τιμῶν των ἀπὸ τὴν μεγαλυτέραν, καὶ εἰς τὴν διαφορὰν θέτομεν τὸ σημεῖον τοῦ ἔχοντος τὴν μεγαλυτέραν ἀπόλυτον τιμῆν.»

δ') Διὰ νὰ προσθέσωμεν περισσοτέρους τῶν δύο ἑτεροσήμων ἀριθμῶν, προσθέτομεν χωριστὰ τοὺς ἔχοντας τὸ σημεῖον +, καὶ χωριστὰ τοὺς ἔχοντας τὸ —. Οὕτω προκύπτουν δύο ἑτεροσήμοι ἀριθμοί, τοὺς δοποίους προσθέτομεν, ὡς ἀνωτέρω, καὶ τὸ ἄθροισμα τούτων παριστάνει καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Οὕτω διὰ τὸ ἄθροισμα

$$(-3) + (-5) + (+2) + (+3) + (-7) + (+6)$$

$$\text{ἔχομεν } (-3) + (-5) + (-7) = -15,$$

$$\text{καὶ } (+2) + (+3) + (+6) = +11$$

$$\text{τέλος } (+11) + (-15) = -4.$$

ε'') Δυνάμειθα νὰ ἀπεικωνίσωμεν τὴν πρόσθεσιν τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν (§ 2). Διὰ νὰ παραστήσωμεν τὸ ἄθροισμα $(-8) + (+3)$ π. χ., ἀναχωροῦμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον τὸ δοποῖον παριστάνει τὸ -8 , καὶ προχωροῦμεν πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ κατὰ $+3$ μονάδας μήκους. Τὸ οὕτω εὑρισκόμενον σημεῖον παριστάνει τὸ ἄθροισμα $(-8) + (+3) = -5$.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ σημεῖον, τὸ δοποῖον παριστάνει τὸ ἄθροισμα $(+4) + (-8)$, ἀναχωροῦμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον, τὸ δοποῖον παριστάνει τὸ $+4$, καὶ προχωροῦμεν πρὸς τὰ δριστερὰ αὐτοῦ κατὰ διπλάς μονάδας μήκους.

***Ασκήσεις καὶ προβλήματα**

Ομάς πρώτη. 1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἀθροίσματα

α') $(+5) + (-3)$. β') $(-9) + (-3)$. γ') $(-15) + 3$.

δ') $122 + (-83)$. ε') $(-1864) + (+9134)$.

$$2) \text{ 'Ομοιώς } \alpha') (-18,1) + 13,6. \beta') -9,13 + (-92,1)$$

$$\gamma') 0,13 + (-13,4).$$

$$3) \text{ 'Ομοιώς } \alpha') \left(+\frac{1}{2} \right) + \left(-\frac{3}{4} \right) \cdot$$

$$\beta') \left(-3 \frac{2}{3} \right) + \left(-4 \frac{1}{4} \right). \gamma') \left(-1 \frac{1}{8} \right) + (-8,45).$$

Όμαδας δευτέρα. 1) Νὰ εύρεθουν τὰ ἀθροίσματα, $\alpha')$ $12 + (-18) + 24$, $\beta')$ $(-29) + (-13) + (-35)$. $\gamma')$ $(+13,7) + (-1,118) + 9,25$.

$$\delta') 8 \frac{2}{3} + \left(-17 \frac{1}{2} \right) + 4 \frac{1}{2}. \varepsilon') \left(-13 \frac{1}{5} \right) + 26 \frac{1}{3} + \left(-1 \frac{2}{15} \right).$$

$$\zeta') (-8,3) + 7,93 + (-35,6) = \frac{4}{5}.$$

$$2) \text{ 'Ομοιώς } \alpha') \tauὸ -125 + \left(-1 \frac{1}{2} \right) + \left(-3 \frac{1}{6} \right) + 14 \frac{1}{2} + \\ \left(-3 \frac{1}{8} \right). \beta') \tauὸ [(-13,5) + (-8,4)] + 6,1 + (-7,5).$$

Όμαδας τρίτη 1) Κερδίζει τις 234 δρ. ἔπειτα χάνει 216,40 δρ., κερδίζει πάλιν 215,70 δρ. καὶ χάνει ἐκ νέου 112 δρ. Ἐκρόδισεν ἡ ἔχασε τελικῶς καὶ πόσον;

2) Ἐμπορός τις αὐξάνει τὸ ἐνεργητικόν του κατὰ 128 δρ., τὸ δὲ παθητικόν του κατὰ 312,40 δρ. Τίνα μεταβολὴν παθάνει τὸ κεφάλαιόν του, (ἐλ. 184,40),

3) Σῶμα θερμανθέν, ἔλασθε θερμοκρασίαν $17,6^{\circ}$. ἔπειτα ἐφύχθη κατὰ $19,1^{\circ}$ καὶ τέλος ἔθερμάνθη κατὰ $3,1^{\circ}$. Ηὕηθη ἡ ἡλαττώθη ἡ ἀρχική του θερμοκρασία, καὶ πόσον;

§ 6. Ἀφαιρέσεις.—

$\alpha')$ Ἀφαίρεσις δύο ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν καλεῖται ἡ πρᾶξις διὰ τῆς διποίας, δοθέντων δύο ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν, εὑρίσκεται τρίτος, δεύτης προστιθέμενος εἰς τὸν δεύτερον δίδει ἀθροίσμα τὸν πρῶτον.

Οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ λέγονται γειτέος καὶ ἀφαιρετέος, διῆητού μενος ἀριθμὸς διαφορά, τὸ δὲ σημεῖον τῆς ἀφαιρέσεως εἶνε τὸ $(-)$ πλάνη.

$\beta')$ Διὰ νὰ εἴρωμεν τὴν διαφορὰν $(+7) - (-5)$, δυνάμεθα, ἀντὶ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὰς 7 θετικὰς μονάδας 5 δρονητικάς, νὰ προσθέσωμεν εἰς τὰς 7 θετικὰς 5 θετικάς.

"Ητοι θὰ δεῖξωμεν ὅτι $(+7) - (-5) = (+7) + (+5)$.

Πράγματι ἔχομεν ὅτι $(+7) + (+5) + (-5) = \text{μὲ} + 7$.

Διότι, εἰς τὸ ἄθροισμα αὐτὸ $(+7) + (+5) + (-5)$ αἱ ὅ θετικαι μονάδες καὶ αἱ ὅ ἀρνητικαι ἔξουδετεροῦνται. Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων δμοίων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι,

«διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπό τινος ἀριθμοῦ ἄλλον, προσθέτομεν εἰς τὸν μειωτέον τὸν ἀντίθετον τοῦ ἀφαιρετέον».

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν, ὅτι

$$(-3) - (-5) = (-3) + (+5) = + 2.$$

$$12 - (+6) = 12 + (-6) = + 6.$$

$$\left(-\frac{4}{9}\right) - \left(-\frac{2}{9}\right) = \left(-\frac{4}{9}\right) + \left(+\frac{2}{9}\right) = -\frac{2}{9}$$

γ') Δυνάμεθα νὰ ἀπεικονίσωμεν τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν ὡς ἔξης. Ἐστω, ὅτι ἔχομεν τὴν διαφορὰν $(-4) - (+5) = (-4) + (-5) = - 9$.

Ἐνδίσκουμεν τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον παριστάνει τὸν (-4) , καὶ προχωροῦμεν ἀριστερὰ αὐτοῦ κατὰ 5 μονάδας. Διὰ νὰ παραστήσωμεν τὴν διαφορὰν $(-7) - (-4) = (-7) + (+4)$, προχωροῦμεν ἐκ τοῦ σημείου (-7) κατὰ 4 μονάδας πρὸς τὰ δεξιά αὐτοῦ.

§ 2. Ἐκτέλεσις οίκαδήποτε ἀφαιρέσεως.—

Εἶνε εὔκολον νὰ ἴδωμεν, ὅτι δυνάμεθα νὰ ἐκτέλεσωμεν οίανδήποτε ἀφαίρεσιν μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν. Ἡτοι, ὅτι ἡ ἀφαίρεσις εἶνε δυνατή, καὶ ὅταν ὁ ἀφαιρετέος εἶνε μεγαλύτερος τοῦ μειωτέου. Τῷ ὅντι, ἔχομεν κατὰ τὸν ἀνωτέρῳ κανόνα π. χ. ὅτι

$$3 - 5 = 3 - (+ 5) = 3 + (- 5) = - 2$$

$$10 - 25 = 10 + (- 25) = - 15 \cdot 1 - 24 = 1 - (+ 24) =$$

$$1 + (- 24) = - 23 \cdot 0 - 7 = - 7 \cdot 0 - 12 = - 12.$$

Ασκήσεις καὶ προβλήματα

Ομάς πρώτη 1) Νὰ εύρεθοῦν αἱ διαφοραὶ
 α') $(+8) - (-4)$. β') $(-18) - (+19)$. γ') $(-14) - (-7)$.
 δ') $(+19) - (-27)$.

2) Όμοιώς α') $(+0,9) - (-0,13)$. β') $2,25 - (-1,65)$.
 3) Όμοιώς α') $2 \frac{5}{6} - \left(-3 \frac{1}{3}\right)$. β') $9 \frac{1}{7} - \left(-7 \frac{1}{3}\right)$
 γ') $-16 \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{13}\right)$.

Ομάς δευτέρα 1) Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων
 α') $120 + 19 - (-18)$. β') $(-17) - (-4) + (+8)$. γ') $21,4 - 7,14 - (-13)$.
 δ') $\left(-5 \frac{1}{2}\right) + \left(-6 \frac{1}{4}\right) - \left(-\frac{1}{5}\right) - 4 \frac{3}{4}$.
 2) Επίσης α') $(+16) - ((+28) + (-8)) - 3$. β') $-20 -$
 $[-29 - (-10)] - [(+95) + (-14)] - [+38] - (-9)]$.

Ομάς τρίτη. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν ἔξης πράξεων
 α') $2 - 7$. β') $3 - 10$. γ') $15 - 22$. δ') $15 - 130$. ε') $125 - 965$.
 ζ') $8,41 - 9,04$. η') $2 - 3 \frac{4}{5}$. θ') $14 - 8 - 6 - 19,5$.

Ομάς τετάρτη. 1) Αὐξάνει τις τὸ ἐνεργητικόν του καὶ ἐλαττώνει τὸ
 παθητικόν του κατὰ 384,20 δρχ. Τίνα μεταβολὴν παθάνει ἡ περιουσία του;
 (αὐξ. 768,40).

2) Ελαττώνει τις τὸ ἐνεργητικόν του κατὰ 84,3 δρχ. καὶ αὐξάνει τὸ πα-
 θητικόν του κατὰ 64,70 δργ. Τίνα μεταβολὴν παθάνει ἡ περιουσία του;
 (ἐλατ. 149.).

3) Άνα/ωρεῖ τις ἐκ τίνος ὀντισμένου σημείου A. Βαδίζει ἐπ' εὐθείας ὅδοῦ
 238 βήματα πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ φθάνει εἰς τὸ σημεῖον B. Πόσα βήματα πρέπει
 νὰ βαδίσῃ ἐκ τοῦ B πρὸς τάριστερά, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον Γ, ἀπέχον
 τοῦ A 3846 βήματα;

4) Χάνει τις 16,3 δρχ. πόσα πρέπει νὰ κερδίσῃ διὰ νὰ ἔγῃ 58,65 δρχ. πε-
 ρισσοτέρας τῶν ὅσων εἶχεν ἀρχικῶς; (74,95).

§ 8. Πολλαπλασιασμός.—

α') Πολλαπλασιασμὸς δύο ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν λέγεται ἡ πρᾶξις, διὰ τῆς δοπίας, δοθέντων δύο ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν, σχηματίζεται ἐκ τοῦ πρώτου τρίτος, διὰς δὲ δεύτερος σχηματίζεται ἐκ τῆς μονάδος.

Οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ λέγονται παράγοντες (πολλαπλασιαστέος καὶ πολλαπλασιαστής), δὲ προκύπτων ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ γινόμενον.

β') Κατὰ τὸν δομὸν ἔχομεν, ὅτι

$$(+) \cdot (+3) = (+8) + (+8) + (+8) = (+24) = 24$$

Ομοίως

$$(-8) \cdot (+3) = (-8) + (-8) + (-8) = -24.$$

γ') Πολλαπλασιασμὸς ἑνὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ κλάσμα π.χ. τοῦ -9 ἐπὶ $\frac{3}{4}$ σημαίνει, νὰ εὔρωμεν τὸ τέταρτον τοῦ ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ -9 , καὶ τοῦτο νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 3. Ἡτοι ἔχομεν

$$(-9) \cdot \frac{3}{4} = \frac{(-9)}{4} \cdot 3 = \frac{(-27)}{4} = -6\frac{3}{4}$$

§ 9. Πώς πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ ἀριθμοὺς ἀριθμόν.—

α') Ἐστω, ὅτι ζητεῖται τὸ γινόμενον

$$(+) \cdot (-3).$$

Τὸ -3 γίνεται ἐκ τῆς 1, ἐὰν λάβωμεν τὴν ἀντίθετὸν τῆς -1 , καὶ ταύτην ἐπαναλάβωμεν τρὶς (§ 3, β'). Ἀρα, κατὰ τὸν ἀνωτέρῳ δομὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενον

$$(+) \cdot (-3),$$

θὰ λάβωμεν τὸν ἀντίθετον τοῦ $+8$, δηλαδὴ τὸν (-8) , καὶ τοῦτον θὰ ἐπαναλάβωμεν τρίς, ἵτοι θὰ εἴνε

$$(+) \cdot (-3) = (-8). 3 = (-8) + (-8) + (-8) = -24.$$

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχομεν, ὅτι

$$(-8) \cdot (-3) = (+8). 3 = 24.$$

Ἐκ τούτων ἐπεται ὅτι

«διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄλλον ἀρνητικὸν, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀντίθετον τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ τὸν πολλαπλασιαστήν, θετικῶς λαμβανόμενον».

6') Ἐκ τοῦ ἀνωτέρῳ κανόνος φαίνεται, ὅτι ἵσχει ὁ νόμος τῆς ἀντιμεταθέσεως τῶν παραγόντων δι' ἀλγεβρικοὺς ἀριθμοὺς (§ 4, α').
“Ητο, ὅτι,

«τὸ γινόμενον δύο ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν ἀλλαχθῇ ἡ τάξις τῶν παραγόντων».

Οὕτω εἶνε (+8). (-3) = - 24, - 24 = (-3). (+8).

Ἐκ τῶν ἀνωτέρων συνάγομεν τὸν ἔξιης γενικὸν κανόνα.

γ') «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο ἀλγεβρικοὺς ἀριθμούς, πολλαπλασιάζομεν τὰς ἀπολύτους τιμάς των, καὶ τὸ γινόμενον λαμβάνομεν μὲ τὸ σημεῖον + μέν, ἢν οἱ δύο παράγοντες εἶνε διμόσημοι, μὲ τὸ — δέ, ἢν εἶνε ἑτερόσημοι».

§ 10. Περὶ τοῦ σημείου τοῦ γινομένου ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν.—

α') Κατὰ τάνωτέρῳ, προκειμένου περὶ τοῦ σημείου δύο παραγόντων καὶ τοῦ γινομένου των, θὰ ἔχωμεν ὅτι

«Τὸ γινόμενον δύο διμοσήμων ἀριθμῶν εἶνε θετικόν».

«Τὸ γινόμενον δύο ἑτερόσημων ἀριθμῶν εἶνε ἀρνητικόν».

β') Ἐκ τούτου ἔπειται ὅτι, ἢν εἰς γινόμενον δσωνδήποτε παραγόντων τὸ πλῆθος τῶν ἀρνητικῶν ἔξι αὐτῶν εἶνε περιττὸς ἀριθμός, τὸ γινόμενον θὰ εἶνε ἀρνητικόν. Ἄν δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀρνητικῶν παραγόντων εἶνε ἀριθμός, τὸ γινόμενον θὰ εἶνε θετικόν. Π. γ.

$$(-8). (+5). (-2). (-1). (-5) = + 120$$

$$(-3). (-2). (-1). (+5) = - 30.$$

§ 11. Πολλαπλασιασμὸς ἀριθμοῦ ἐπὶ ἔν, ἢ ἐπὶ μηδέν.—

α') Πολλαπλασιασμὸς ἐνὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ τὴν μονάδα (+1) σημαίνει αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ (-1) δὲ τὸν ἀντίθετόν του. Οὕτω θὰ εἶνε

$$(-4). 1 = - 4 \quad (+5). 1 = + 5$$

$$(-5). (-1) = + 5 \quad (+7). (-1) = - 7.$$

β') Πολλαπλασιασμὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ μηδὲν σημαίνει, νὰ θέσωμεν τὸ γινόμενον αὐτὸν ἵσον μὲ μηδέν. Οὕτω ἔχομεν ὅτι

(+3). 0=0. Διότι (+3). 0=0. (+3) = + 0 + 0 + 0 = 0.

(- 7). 0=0. (- 7) = 0. 7=0,

επειδή ὁ ἀντίθετος τοῦ μηδὲν εἶνε πάλιν μηδέν.

Ασκήσεις

Όμας πρώτη. 1) Νὰ εύρεσθοῦν τὰ γινόμενα

α') (- 5). (+8). β') (+18). (-4). γ') (-7). (+15). δ') (-9). (-7).

ε') (+35). (-19).

2) Όμοιως τὰ

$$\alpha') \left(+1 \frac{1}{4} \right) \cdot \left(-1 \frac{3}{4} \right) \cdot \beta') \left(-6 \frac{4}{7} \right) \cdot (-3,7).$$

γ') (-8,4). (-6,5). δ') (-9,8). 8,5. (-4,3). (-2,3).

Όμας δευτέρα 1) Όμοιως α') (-3,9). (-7,6). β') (-9,45). 3,5.

$$\gamma') (-9). (-7)(-3). \delta') \left(+4 \frac{1}{2} \right) \cdot \left(-3 \frac{1}{6} \right) \cdot (-6,8).$$

$$2) \text{Όμοιως τὰ } \alpha') (-16). 14. \left(-\frac{2}{3} \right) \cdot \left(-\frac{3}{8} \right).$$

β') (-3,1).(+6). (+8). (-7). γ') (+7). (-4) (+8). (+3).

δ') (0,6). [(9,74) - 0,9. (+7,5)]. 0,3.

§ 12. Διαιρέσεις. —

α') Διαιρεσίς ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν λέγεται ἡ πρᾶξις διὰ τῆς ὁποίας, δοθέντων δύο τοιούτων ἀριθμῶν, εὑρίσκεται τρίτος, ὃστις, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν δευτέρου, δίδει γινόμενον τὸν πρῶτον.

Ο πρῶτος ἐκ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν λέγεται διαιρετός, ὁ ἄλλος διαιρέτης, καὶ ὁ ζητούμενος πιλίκον, τὸ δὲ σημεῖον τῆς διαιρέσεως εἶναι τὸ διὰ (:).

β') "Εστω, ὅτι ζητεῖται τὸ πιλίκον (+8) : (+2). Έν πρώτοις παρατηροῦμεν, ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς θὰ ἔχῃ τὸ σημεῖον +. Διότι τὸ γινόμενον δύο θετικῶν ἀριθμῶν θὰ εἶνε θετικός. Εξ ἄλλου γνωρίζομεν ὅτι, ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ πιλίκου, πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ 2, πρέπει νὰ δίδῃ γινόμενον 8. Αρα θὰ εἶνε ἵση μὲ 8 : 2 = 4, ἢτοι θὰ εἶνε

$$(+8) : (+2) = + 4.$$

Όμοιώς σκεπτόμενοι, εὑρίσκομεν ὅτι

$$(+8) : (-2) = - 4.$$

Ἐπίσης (-8) : (+2) = - 4.

$$(-8) : (-2) = + 4.$$

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι

διὰ τὰ διαιρέσωμεν δύο ἀλγεβρικοὺς ἀριθμούς, διαιροῦμεν τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ διαιρετού διὰ τῆς ἀπολύτου τιμῆς τοῦ

διαιρέτουν καὶ τὸ οὕτω προκῆπτον πηλίκον θὰ εἶνε φετικὸν μέν, ἀν οἱ δούθεντες ἀριθμοὶ εἶνε δμόσημοι, ἀρνητικὸν δὲ ἀν ἐτερό-
σημοι.

**§ 13. Περὶ τοῦ σημείου τοῦ πηλέκου ἀλγεβρικῶν
ἀριθμῶν.**

α') Ὡστε, προκειμένου περὶ τῆς σχέσεως τῶν σημείων τοῦ διαιρε-
τέου, τοῦ διαιρέτου, καὶ τοῦ πηλίκου θὰ ἔχωμεν ὅτι,
«τὸ πηλίκον δύο δμοσήμων ἀριθμῶν εἶνε φετικόν».

«Τὸ πηλίκον δύο ἐτεροσήμων ἀριθμῶν εἶνε ἀρνητικόν».

β') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καὶ τῶν ἐν (§ 10, α') ἔπειται
«τὸ γινόμενον ἢ τὸ πηλίκον δύο δμοσήμων ἀριθμῶν εἶνε φετικόν,
δύο δ' ἐτεροσήμων ἀρνητικόν».

Ασκήσεις

'Ομάς πρώτη. 1) Νὰ εύρεθοῦν τὰ πηλίκα. α') (+28) : (+4).
β') (+28) : (-7). γ') (-45) : (+9). δ') (-49) : 9. ε') (-1543) : (-36).
2) Όμοίως α') (+0,95) : (-0,5). β') (-340) : 1,8. γ') -143,5 : -32,1.

$$\delta') \left(5 \frac{1}{4}\right) : (-0,6). \quad \varepsilon') 14 \frac{1}{6} : \left(-\frac{2}{7}\right).$$

'Ομάς δευτέρα. 1) Εὑρετε τὰ α') (-6) : (-9). 15.

$$\beta') 3 \frac{2}{3} : \left(-1 \frac{4}{5}\right) : 8. \gamma') (-9,6) : (-26) : 0,7. 6 \frac{1}{2}.$$

2) Όμοίως τὰ α') (-36) : [(-9)-8]. β') -18 : 9-(-4) : 2.

3) Νὰ εύρεθῃ ὁ ἀγνωστος x , ώστε νὰ εἶνε α') (-40). $x=16$.

$$\beta') (-6). x=27. \quad \gamma') 12. x=48. \quad \delta') 31,4. x=-18,84.$$

**§ 14. Περὶ δυνάμεων μὲ ἐκθέτας θετικοὺς καὶ ἀκεραί-
ους ἀριθμούς.**

α') Καθὼς (ἐν τῇ 'Ἄριθμητικῇ') τὸ γινόμενον ἵσων παραγόντων
ἐνὸς ἀριθμοῦ, π. χ. τὸ 3. 3. 3. 3 καλοῦμεν τετάρτην δύναμιν
τοῦ 3, καὶ παριστάνομεν αὐτὸ διὰ τοῦ 3^4 , οὗτο καὶ τὸ γινόμε-
νον ἵσων παραγόντων ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ π. χ. τὸ (-5). (-5)
καλεῖται δευτέρα δύναμις τοῦ (-5) καὶ παριστάνεται διὰ τοῦ
 $(-5)^2$. Όμοίως τὸ (-3). (-3) λέγεται δευτέρα δύναμις τοῦ -3,
καὶ παριστάνεται μὲ $(-3)^2$.

Τὸ $(-7).(-7).(-7)$ = μὲ $(-7)^3$ καὶ λέγεται τρίτη δύναμις
τοῦ -7.

Ἐν γένει, «καλοῦμεν δύναμιν ἐνὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ τὸ γινό-
μενον παραγόντων ἵσων μὲ τὸν ἀριθμόν».

6') Ο ἀριθμὸς τῶν ἵσων παραγόντων τοῦ γινομένου καλεῖται ἐκθέτης τῆς δυνάμεως. Ο ἀριθμὸς τοῦ ὅποιου ἔχομεν τὴν δύναμιν λέγεται βάσις τῆς δυνάμεως.

Ἡ δευτέρα δύναμις ἐνὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ λέγεται καὶ τετράδρων τοῦ ἀριθμοῦ, ἡ δὲ τρίτη δύναμις αὐτοῦ καὶ κύβος τοῦ ἀριθμοῦ. Κατὰ ταῦτα ἔχομεν ὅτι $(-7)^2 = (-7) \cdot (-7) = 49$.

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8}$$

τὸ $a^{\mu} = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{\mu \text{ φοράς}}$

ὅπου τὸ a φανερώνει ἀλγεβρικὸν ἀριθμόν, τὸ δὲ μ ἀκέραιον καὶ θετικόν. Τὸ a^{μ} καλεῖται μυοστή (μή) δύναμις τοῦ a .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Εὑρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι δυνάμεων.

$$\alpha') (-6)^3, \beta') (-9)^2, \gamma') (+8)^5, \delta') (-3)^3, \varepsilon') (-7)^5, \zeta') (-1)^3.$$

2) Δείξατε διὰ παραδειγμάτων, ὅτι πᾶσα δύναμις ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην ἄρτιον καὶ θετικόν εἶνε ἀριθμὸς θετικός, περιττὸν δὲ ἔχουσα, εἶνε ἀρνητικός.

§ 13. Περὶ τῶν συμβόλων a^1 καὶ a^0 .—

a') Κατὰ τὸν ὁρισμὸν τῆς δυνάμεως ἀριθμοῦ ἔχομεν ὅτι

$$a^5 = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a, \quad a^4 = a \cdot a \cdot a \cdot a,$$

$$a^3 = a \cdot a \cdot a, \quad a^2 = a \cdot a.$$

Ἐκ τούτων διακρίνομεν ὅτι, ὅταν ὁ ἐκθέτης μιᾶς δυνάμεως τοῦ a ἔλαττονται κατὰ μονάδα, τὸ γινόμενον, τὸ ὅποιον ὁρίζει τὴν δύναμιν ταύτην, διαιρεῖται δι' ἐνὸς τῶν ἵσων παραγόντων του. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι $a^{2-1} = a \cdot a : a$.

'Αλλὰ τὸ a^{2-1} ἴσονται μὲν a^1 , τὸ δὲ $a \cdot a : a = \mu \epsilon a$.

"Ἄρα $a^1 = a$.

"Ητοι

«ἡ πρώτη δύναμις ἐνὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ ἴσονται μὲν αὐτὸν τὸν ἀριθμόν».

6') Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὰ ἀνωτέρω θὰ λέγωμεν ὅτι

$$\alpha^{1-1} = \alpha : \alpha = 1. \text{ Άλλὰ τὸ } \alpha^{1-1} = \text{μὲ } \alpha^0. \text{ "Αρα } \alpha^0 = 1,$$

ὅταν τὸ α εἶνε διάφορον τοῦ μηδενός. "Ητοι ὅτι

«τὸ α^0 δπον τὸ α εἶνε ἀριθμός τις ἀλγεβρικός, διάφορος τοῦ μηδενός, ἵσοῦται μὲ τὴν μονάδα».

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν ὅτι

$$(-3)^0 = 1, \quad 45^0 = 1, \quad (-10)^0 = 1, \quad \left(-\frac{3}{5}\right)^0 = 1$$

$$(-2)^1 = -2, \quad \left(-\frac{3}{5}\right)^1 = -\frac{3}{5}, \quad 4,3^1 = 4,3$$

§ 16. Θεμελιώδεις ἴδειοτητες τῶν δυνάμεων.—

α') Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς 'Αριθμητικῆς) ὅτι,

«τὸ γινόμενον δύο δυνάμεων ἐνδεῖ ἀριθμοῦ εἶνε δύναμις αὐτοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην τὸ ἀνθροισμα τῶν ἐκθετῶν τῶν παραγόντων».

Ἡ ἴδιότης αὗτη ἴσχυει καὶ ἂν ἡ βάσις εἶνε ἀλγεβρικὸς ἀριθμός, ὁ δὲ ἐκθέτης θετικὸς καὶ ἀκέραιος. Πράγματι, ἐὰν ἔχωμεν τὸ γινόμενον

$$\alpha^3. \quad \alpha^2, \quad \text{θὰ εἶνε} \quad \alpha^3 = \alpha. \quad \alpha. \quad \alpha, \\ \alpha^2 = \alpha. \quad \alpha,$$

καὶ ἐπομένως $\alpha^3. \alpha^2$ εἶνε ἵσον μὲ $\alpha. \alpha. \alpha. \alpha. \alpha = \alpha^5$.

Ομοίως εὐρίσκομεν ὅτι εἶνε $x^4. \quad x^2 = x^6$,
καὶ, ἐν γένει; τὸ γινόμενον $\alpha^{\mu}. \alpha^{\nu}$,
δπον μ καὶ ν εἶνε ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοί, τὸ δὲ α ἀλγεβρικός τις ἀριθμὸς, ἵσοῦται μὲ $\alpha^{\mu + \nu}$.

Διότι ἔχομεν, ὅτι

$$\overbrace{\alpha^{\mu} = \alpha. \quad \alpha. \quad \dots \quad . \quad \alpha,}^{\mu \text{ φοράς}} \quad \overbrace{\alpha^{\nu} = \alpha. \quad \alpha. \quad \dots \quad . \quad \alpha}^{\nu \text{ φοράς}}$$

$$\begin{aligned} \text{ἐπομένως } \alpha^{\mu}. \alpha^{\nu} &= \underbrace{\alpha. \alpha. \dots. \alpha}_{\mu \text{ φοράς}} \quad \underbrace{\alpha. \alpha. \dots. \alpha}_{\nu \text{ φοράς}} \\ &= \underbrace{\alpha. \alpha. \dots. \alpha}_{(\mu + \nu) \text{ φοράς}} = \alpha^{\mu + \nu} \end{aligned}$$

6') Όμοιώς ἀποδεικνύεται ὅτι, τὸ γινόμενον

$$\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} \cdot \alpha^{\rho} \cdot \dots \cdot \alpha^{\lambda} = \alpha^{\mu+\nu+\rho+\dots+\lambda},$$

ὅπου τὸ α εἶνε ἀλγεβρικός τις ἀριθμός, τὰ δὲ $\mu, \nu, \rho, \dots, \lambda$ ἀκέραιοι καὶ θετικοί.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι

«τὸ γινόμενον δσωνδήποτε δυνάμεων ἐνὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ εἶνε δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην τὸ ἀθροισμα τῶν ἐκθετῶν τῶν παραγόντων».

γ') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρῷμεν τὸ γινόμενον $(2^3)^2$.

Τοῦτο σημαίνει νὰ σχηματίσωμεν τὸ γινόμενον δύο παραγόντων οὓσων μὲ τὸ 2^3 , ἥτοι τὸ $2^3 \cdot 2^3$

Ἄλλὰ τοῦτο ισοῦται κατὰ τὰ ἀνωτέρω μὲ

$$2^3 + 3 = 2^{3+3}.$$

Όμοιώς εὑρίσκομεν ὅτι

$$(\alpha^3)^4 = \alpha^{3 \cdot 4},$$

καὶ, ἐν γένει, ὅτι

$$(\alpha^{\mu})^{\nu} = \alpha^{\mu \cdot \nu},$$

ὅπου α εἶνε ἀλγεβρικός τις ἀριθμός, καὶ μ, ν , ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοί. Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι

«ἄν δύναμις τις ἀριθμοῦ ἀλγεβρικοῦ ὑψωθῆ εἰς δύναμιν, προκύπτει δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην τὸ γινόμενον τῶν δύο ἐκθετῶν».

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Εὑρετε τὰ ἔξαγόμ ενα τῶν

$$\alpha') \quad \left((-2)^2 \right)^3 \quad \beta) \quad \left((-3)^2 \right)^2 \quad \gamma) \quad \left((-1)^2 \right)^8 \quad \delta) \quad \left((-1)^2 \right)^9$$

δ') Εὐκόλως ἀποδεικνύεται ὅτι,

«διὰ νὰ ὑψώσωμεν γινόμενον ἀλγεβρικῶν παραγόντων εἰς δύναμιν, ἀρκεῖ, νὰ ὑψώσωμεν καθένα τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου εἰς τὴν δύναμιν ταύτην».

= 20 =

Πράγματι, ἔχομεν ὅτι

$$(2.3)^2 = (2.3) \cdot (2.3) = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3^2.$$

$$\left((-5) \cdot (-3) \right)^3 = (-5) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (-3) \\ = (-5)^3 \cdot (-3)^3.$$

Καὶ γενικῶς, ὅτι

$$(a\beta\gamma)^v = \underbrace{(a\beta\gamma)}_{v \text{ φοράς}} \cdot \underbrace{(a\beta\gamma) \dots (a\beta\gamma)}_{v \text{ φοράς}} \dots \underbrace{(a\beta\gamma)}_{v \text{ φοράς}} \\ = a \cdot \underbrace{a \cdot a \dots a}_{v \text{ φοράς}} \cdot \underbrace{\beta \beta \dots \beta}_{v \text{ φοράς}} \cdot \underbrace{\gamma \gamma \gamma \dots \gamma}_{v \text{ φοράς}} \\ = a^v \cdot \beta^v \cdot \gamma^v.$$

ε') Ἐπίσης ἀποδεικνύεται εὐκόλως ὅτι,

«κλάσμα, τοῦ διποίου οἱ ὅροι εἶνε ἀλγεβρικοὶ ἀριθμοὶ, ὁψοῦται εἰς δύναμιν, ἐὰν ἔκαστος τῶν ὅρων του ὁψωθῇ εἰς τὴν δύναμιν ταύτην».

Ἐχομεν οὕτω ὅτι

$$\left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\mu} = \frac{\alpha^{\mu}}{\beta^{\mu}}$$

Διότι τὸ

$$\left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\mu} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \underbrace{\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \dots \frac{\alpha}{\beta}}_{\mu \text{ φοράς}} = \underbrace{\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \dots \frac{\alpha}{\beta}}_{\mu \text{ φοράς}} = \frac{\alpha^{\mu}}{\beta^{\mu}}$$

ὅπου τὸ μ φανερώνει ἀριθμὸν ἀκέραιον καὶ θετικόν, τὸ δὲ α καὶ β ἀριθμοὺς ἀλγεβρικούς.

ζ') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εῦρωμεν τὸ πηλίκον τῶν δυνάμεων 2^5 καὶ 2^2 . Γνωρίζομεν (ἐν τῆς Ἀριθμητικῆς) ὅτι τὸ πηλίκον τοῦτο $2^5 : 2^2 = 2^{5-2} = 2^3$. Ἡτοι ὅτι

«τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων ἐνὸς ἀριθμοῦ εἶνε δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην τὴν διαφορὰν τῶν ἐκθετῶν τοῦ διαιρετού καὶ διαιρέτου».

Η ίδιοτης αυτή ισχύει καὶ ὅταν ἡ βάσις τῶν δυνάμεων εἶναι ἀλγεβρικός τις ἀριθμός, οἱ ἐκμέται ἀκέραιοι καὶ θετικοί, ἐκ τούτων δὲ ὁ τοῦ διαιρετέου μεγαλύτερος ἢ ἵσος μὲ τὸν τοῦ διαιρέτου. Οὕτω τὸ πηλίκον

$$(-5)^4 : (-5)^2 = \frac{(-5) \cdot (-5) \cdot (-5)}{(-5) \cdot (-5)} = (-5) \cdot (-5)$$

$$= (-5)^2 = (-5)^{4-2}.$$

Ομοίως

$$(-3)^6 : (-3)^3 = \frac{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3)}{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3)} =$$

$$= (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = (-3)^3 = (-3)^{6-3}$$

Ἐν γένει, τὸ πηλίκον

$$\alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \frac{\alpha^{\mu}}{\alpha^{\nu}} = \frac{\overbrace{\alpha \alpha \dots \alpha}^{\mu \text{ φοράς}}}{\overbrace{\alpha \alpha \dots \alpha}^{\nu \text{ φοράς}}} = \overbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}^{\mu - \nu \text{ φοράς}} = \alpha^{\mu - \nu}$$

ὅπου α παριστάνει ἀλγεβρικόν τινα ἀριθμὸν καὶ μ, ν θετικοὺς καὶ ἀκεραίους, ὁ δὲ μ εἶναι μεγαλύτερος ἢ ἵσος μὲ τὸν ν .

A σκήσεις

1) Νὰ εύρεθοῦν τὰ γινόμενα

- $\alpha')$ $x^5 \cdot x^3, \beta')$ $y^3 \cdot y^4, \gamma')$ $x^6 \cdot x, \delta')$ $(-x^4)^2, \varepsilon')$ $(-\beta^6)^3, \zeta')$ $x^2 \cdot x^4$
 $\zeta')$ $x^{2\nu} \cdot x (-x)^{2\nu}, \eta')$ $x^{2\nu-1} \cdot x, (-x), \theta')$ $x^{2\nu} (-x^3)^5$
- 2) Ομοίως τὰ $\alpha')$ $(4\alpha\beta)^2, \beta')$ $(-3xy)^3, \gamma')$ $(5x^2)^2, \delta')$ $(-xyw)^4$
 $\varepsilon')$ $\left(-\frac{2}{3} x^2 y\right)^2, \zeta')$ $\left(-\frac{1}{5} xy^2\right)^3, \eta')$ $\left(-\frac{3}{4} x^2\right)^0, \eta')$ $(-5x^3y)^2$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

Περὶ ἀλγεβρικῶν παραστάσεων

§ 12. Χρῆσις γραμμάτων. Γενικοὶ ἀριθμοί. Ἀλγεβρικοὶ τύποι.

α') Καθὼς γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς), ὑπάρχουν πολλὰ προβλήματα δμοια μεταξύ των, διαφέροντα μόνον κατὰ τὰς τιμὰς τῶν δεδομένων των, τὰ δποία λύονται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ή τὸν αὐτὸν κανόνα. Οὕτω π. χ. τὰ ἔξης προβλήματα.

1) *Ai 4 ὁκάδες ἐνὸς πράγματος τιμῶνται 8 δρ.*: πόσον τιμῶνται αἱ 6 ὁκ. τοῦ αὐτοῦ πράγματος;

2) *Oi 5 πήχ. ἐνὸς ὄφασματος τιμῶνται 36 δρ.*: πόσον τιμῶνται οἱ 30 πήχ. τοῦ αὐτοῦ ὄφασματος;

Εἰς ἕκαστον τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων, καὶ εἰς τὰ δμοια πρὸς αὐτά, δίδεται ἡ τιμὴ ἐνὸς πλήθους μονάδων (4 ὁκ., 5 πήχ.) καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ ἀλλού πλήθους μονάδων (6 ὁκ., 30 πήχ.). Ως γνωστόν, πρὸς λύσεν τούτων ἀρκεῖ, νὰ διαιρέσωμεν τὴν τιμὴν τῶν δοθεισῶν μονάδων διὰ τοῦ πλήθους τῶν μονάδων τούτων, καὶ τὸ ἔξαγόμενον νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν μονάδων, τῶν δποίων ζητοῦμεν τὴν τιμὴν. Οὕτω διὰ τὸ πρῶτον πρόβλημα ἔχομεν ὃς ἔξαγόμενον τὸ

$$\frac{8}{4} \cdot 6 \text{ δρ.}, \quad \text{διὰ δὲ τὸ δεύτερον} \quad \frac{36}{5} \cdot 30 \text{ δρ.}$$

6') Χάριν γενικότητος, καὶ διὰ τὴν συντομίαν, ἀντὶ νὰ μεταχειριζόμεθα τὰς ἐκφράσεις «ἀριθμός τις ὁκάδων, πήχεων κλπ.» ἔχει μίαν δοθεῖσαν τιμήν, μεταχειριζόμεθα γράμματα τοῦ ἀλφαριθμήτου, διὰ νὰ παραστήσωμεν ποσότητας, τῶν δποίων ἡ τιμὴ δὲν εἶνε μὲν ἀμέσως ὠρισμένη, ἀλλ' ἡ δποία ὀρίζεται, δταν τὰ γράμματα ἀντικατασταθοῦν δι' ὠρισμένων ἀριθμῶν. Οὕτω, ἀν ἀντὶ τῶν ἐν λόγῳ γραμμάτων θέσωμεν διαφόρους ἀριθμούς, λαμβάνομεν διάφορα προβλήματα, διαφέροντα μόνον κατὰ τὰς δεδομένας τιμάς, ἀλλὰ λυόμενα διὰ τοῦ αὐτοῦ κανόνος. Π.χ. ἀντὶ τῶν ἀνωτέρω δύο προβλημάτων λύομεν τὸ ἔξης γενικώτερον.

«Ἐὰν αἱ μονάδες (ἀκέραιαι ἢ κλασματικαὶ) ἐνὸς πράγματος τιμῶνται β δρ., πόσον τιμῶνται γ μονάδες τοῦ αὐτοῦ πράγματος;»

Πρὸς λύσιν αὐτοῦ λέγομεν

Αφοῦ αὶ α μονάδες ἀξίουν β δρ., διὰ νὰ εῦρωμεν πόσον τιμᾶται ἡ 1 μονὰς τοῦ αὐτοῦ πράγματος, ἀρκεῖ, νὰ διαιρέσωμεν τὰς β δρ. διὰ τοῦ α . Ἡτοι ἡ μία μονὰς θὰ τιμᾶται $\frac{\beta}{\alpha}$ δρ. Καὶ αἱ γ μονάδες θὰ τιμῶνται $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \gamma$ δρ. Ἀν λοιπὸν παραστήσωμεν διὰ τοῦ γράμματος x τὴν ζητουμένην τιμὴν τῶν γ μονάδων, θὰ ἔχωμεν

$$x = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \gamma \text{ δρ.}$$

γ') Οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι, οἱ ὅποιοι παριστάνονται μὲν γράμματα τοῦ ἀλφαρίτου, καὶ δύνανται νὰ εἰνε ἀλγεβρικοί, ἢ καὶ ἀπόλυτοι, λέγονται γενικοὶ ἀριθμοί.

δ') Ἡ γραφὴ τοῦ ἀνωτέρω ἔξαγομένου καλεῖται **τύπος**, καθὼς γνωρίζομεν (ἐν τῇς Ἀριθμητικῇ). Τοιούτους τύπους, καὶ τοιαύτας γραφάς, τὰς ὅποιας εὑρίσκομεν κατὰ τὴν λύσιν διαφόρων προβλημάτων, μεταχειρίζομενοι ἀντὶ τῶν ἀριθμῶν γράμματα τοῦ ἀλφαρίτου, καλοῦμεν ἀλγεβρικοὺς τύπους. Οὕτω εὑρίκαμεν (ἐν τῇ Ἀριθμητικῇ) διὰ τὴν εὑρεσῖν τοῦ τόκου T , ὅταν γνωρίζομεν τὸ ἐπιτόκιον, τὸ κεφάλαιον καὶ τὸν χρόνον, παριστάνοντες αὐτὰ ἀντιστοίχως διὰ τῶν γραμμάτων E , K , X , τὸν ἀλγεβρικὸν τύπον

$$T = \frac{K \cdot E \cdot X}{100}$$

Ἐπίσης διὰ τὴν εὑρεσῖν τοῦ χρόνου ἔχομεν

$$X = \frac{T \cdot 100}{K \cdot E} \text{ κ. ο. κ.}$$

§ 18. Όρισμὸς καὶ σκοπὸς τῆς Ἀλγέβρας.—

α') Ἡ Ἀλγεβρα εἶνε γενικωτέρα τῇς Ἀριθμητικῇ. Σκοπὸς δ' αὐτῆς εἶνε νὰ λύῃ τὰ διάφορα προβλήματα ἐκείνης, καὶ πολλὰ ἄλλα σχετικὰ πρὸς ἐκεῖνα, ἢ καὶ μή, διὰ γενικωτέρου τρόπου, καὶ διὰ συλλογισμῶν γενικωτέρων, μὲ τὴν βοήθειαν τῆς χρήσεως τῶν γραμμάτων καὶ τῶν ἀλγεβρικῶν τύπων.

β') Θὰ παριστάνωμεν συνήθως τὸν ἀγγωστὸν ἀριθμόν, τὸν ὅποιον ζητοῦμεν εἰς τὰ διάφορα προβλήματα, διὰ τῶν τελευταίων γραμμάτων τοῦ ἀλφαρίτου x , y , w , $\varphi \dots \dots$, τοὺς δὲ ἀριθμούς, οἱ ὅποιοι ὑποτίθενται γνωστοὶ διὰ τῶν γραμμάτων α , β , $\gamma \dots$

Α σ κ ή σ εις

1) Να εύρετε τὸν ἀλγεβρικὸν τύπον, ὁ ὄποιος δίδει: τὸ κεφάλαιον (ἐπιτόκιον) K (E), ὅταν γνωρίζουμεν τὸ ἐπιτόκιον (κεφάλαιον) E (K) τὸν γράσιον X καὶ τὸν τόκον T. **)

2) Εὕρετε τὸν ἀλγεβρικὸν τύπον, ὁ ὄποιος δίδει: τὴν τιμὴν α μονάδων ἐνὸς πράγματος, ὅταν ἡ μία μονάδα αὐτοῦ τιμᾶται $\frac{\beta}{\gamma}$ δρ.

3) Εὕρετε τὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν τοῦ ἀνωτέρω τύπου, ὅταν εἴνε

$$\alpha = \frac{4}{9} (\text{ἢ } 3.6) \quad \beta = 6,4 \left(\text{ἢ } 4 \frac{4}{3} \right). \quad \gamma = 6 \frac{1}{5} (\text{ἢ } 7,82).$$

4) Ποιοι τύποι, δίδουν τὰ μερίδια x, y, ω, ἐὰν ὁ ἀριθμὸς K μερισθῇ ἀναλόγως τῶν λ, μ, ν;

5) Εὕρετε τὴν τιμὴν, τῶν ἀνωτέρω τύπων, ὅταν εἴνε K=38000, λ=4, μ= $\frac{1}{3}$, ν= $\frac{6}{7}$.

6) Ποιὸς τύπος δίδει: τὸ γινόμενον τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἀριθμῶν α καὶ β ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν μ;

7) Εὕρετε τὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν τοῦ τύπου τούτου, ὅταν εἴνε

$$\alpha = 6,8 \left(\text{ἢ } 4 \frac{4}{3} \right), \quad \beta = 12 \left(\text{ἢ } 2 \frac{3}{4} \right), \quad \mu = \frac{1}{5} (\text{ἢ } 13,3)$$

§ 19. Συμβολικὴ παράστασις πράξεων.—

α') Έὰν δοθοῦν οἱ γενικοὶ ἀριθμοὶ α, β, γ, καὶ προστεθοῦν οἱ α καὶ β ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν γ,

$$(α+β) + γ.$$

β') Έὰν ἀπὸ τὸ ἀθροισμα τῶν α καὶ β ἀφαιρεθῇ δ γ θὰ ἔχωμεν

$$(α+β) - γ,$$

ὅπου τὸ (α+β) παριστάνει τὸ ἀθροισμα τῶν α καὶ β.

γ') Έν γένει, ἔὰν εἰς τὸ ἀθροισμα, ἢ τὴν διαφοράν, δύο ἀριθμῶν θέλωμεν νὰ προσθέσωμεν ἢ ἀφαιρέσωμεν τρίτον, θέτομεν τοὺς δύο πρώτους μὲ τὸ σημεῖον, τὸ δόποιον τοὺς συνδέει ἐν παρενθέσει, ἢ ἐν ἀγκύλαις, καὶ τὸ ἔξαγόμενον τοῦτο συνδέομεν μὲ τὸν τρίτον διὰ τοῦ σημείου τῆς προσθέσεως, ἢ ἀφαιρέσεως. Οὕτω δ α-(β-γ) φανερώνει, ὅτι ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν α θὰ ἀφαιρεθῇ ἡ διαφορὰ (β-γ).

δ') Αθροισμα ἵσων προσθετέων γράφομεν συντόμως, γράφοντες ἐνα μόνον τῶν προσθετέων, καὶ πρὸ αὐτοῦ ὡς παράγοντα τὸν ἀριθμόν, δ ὄποιος φανερώνει τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων τοῦ ἀθροίσματος, μὲ τὸ σημεῖον σὺν μέν, ἀν οἱ προσθετεῖοι εἰνε θετικοί, μὲ τὸ πλὴν δέ, ἀν εἴνε ἀρνητικοί. Οὕτω ἀντὶ τοῦ α+α+α γράφομεν 3α· ἀντὶ τοῦ (-β)+(-β)+(-β) τὸ - 3β.

**) Ἀντὶ νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἡ διατύπωσις τοῦ αὐτοῦ προσθήματος μὲ διάφορα δεδομένα, γράφομεν πρὸς συντομίαν τὰ νέα δεδομένα ἐν παρενθέσει.

ε') Κατ' ἀνάλογον τρόπον τὸ γινόμενον δύο ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν π. χ. τοῦ a καὶ β παριστάνεται ὑπὸ τοῦ $a \cdot \beta$ ἢ τοῦ $a\beta$ τὸ δὲ πηλίκον τοῦ a διὰ τοῦ β ὑπὸ τοῦ $a : \beta$ ἢ ὑπὸ τοῦ κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$.

§ 20. Ἀλγεβρικὰ σύμβολα.—

Τὰ διάφορα σύμβολα, τὰ δποῖα μεταχειριζόμενα ἐν τῇ Ἀλγέβρᾳ διὰ νὰ σημειώσωμεν τὸ σημεῖον ἐνὸς ἀριθμοῦ, σὸν (+) ἢ πλὴν (-), τὸ γινόμενον (.), τὸ πηλίκον (:), τὸ ἄθροισμα (+), τὴν διαφορὰν (-), τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ($\sqrt{ }$) ἀριθμῶν κτλ., καλοῦμεν ἀλγεβρικὰ σύμβολα.

§ 21. Ορισμὸς ἀλγεβρικῆς παραστάσεως.—

Ἀλγεβρικὴ παράστασις καλεῖται τὸ σύνολον ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν, ἢ καὶ γραμμάτων, συνδεομένων δ' ἀλγεβρικῶν συμβόλων.

Οὗτῳ ἀλγεβρικαὶ παραστάσεις εἶνε αἱ

$$a + \beta, \quad a + \beta - (\gamma + \delta), \quad a, \quad \alpha a, \quad \beta \gamma, \quad \alpha a + \beta - 8\gamma.$$

Ἐκ τούτων ἡ παράστασις $a + \beta$ φανερώνει τὸν ἀριθμόν, ὅστις προκύπτει, ἐὰν εἰς τὸν a προστεθῇ β . Ἡ $a + \beta - (\gamma + \delta)$ φανερώνει τὸν ἀριθμόν, ὅστις προκύπτει, ἐὰν εἰς τὸν a προστεθῇ β , καὶ ἀπὸ τὸ ἄθροισμα $a + \beta$ ἀφαιρεθῇ τὸ $\gamma + \delta$. Ἡ παράστασις a παριστᾶ τὸν ἀριθμὸν a . κτλ.

§ 22. Εἰδη ἀλγεβρικῶν παραστάσεων.—

α') Ἀλγεβρικὴ παράστασις λέγεται ρητή, ἐὰν τὰ μόνα σημεῖα τῶν πράξεων, τὰ δποῖα εἶνε σημειωμένα ἐπὶ τῶν γραμμάτων της, εἶνε τῆς προσθέσεως, τῆς ἀφαιρέσεως, τοῦ πολλαπλασιασμοῦ (ἢ ὑψώσεως εἰς δύναμιν ἀκεραίαν) ἢ διαιρέσεως, ὃχι δὲ ἐξαγωγῆς ρίζης. Οὗτῳ αἱ παραστάσεις

$$\frac{\alpha}{\beta}, \quad 3a\sqrt{3}, \quad \frac{\alpha^2}{\gamma} \beta, \quad \frac{x}{3\sqrt{12}} + y$$

εἶναι ρηταί, διότι ἐπὶ οὐδενὸς τῶν γραμμάτων, τὰ δποῖα περιέχουν, εἶνε σημειωμένη ρίζα τις.

β') Παράστασις ἀλγεβρικὴ λέγεται ἀρρωτος, ἐὰν τοῦλάχιστον ἐπὶ ἐνὸς τῶν γραμμάτων της εἶνε σημειωμένη ρίζα τις. Π.χ. αἱ παραστάσεις

$$a + \sqrt{\beta}, \quad a - \sqrt{\alpha^2 \beta}, \quad 6\sqrt{x} + y$$

εἶνε ἀρρωτοί.

(Θὰ ἀσχοληθῶμεν κατωτέρῳ κυρίως μὲ ρητὰς παραστάσεις).

γ') Παράστασις τις λέγεται ἀκεραία, ἐὰν δὲν περιέχῃ καμιάν

διαιρεσιν δι' ἐνδος, ἦ και περισσοτέρων, τῶν γραμμάτων της. Π. χ. αἱ παραστάσεις

$$a+\beta, \quad 8a^3 - \frac{3}{4} a^2\beta + \gamma, \quad \frac{4}{5} a^2$$

εἶνε ἀκέραιαι, ἐνῶ τούναντίον, αἱ

$$\frac{\alpha}{\beta}, \quad \frac{12\alpha^2-\beta}{\alpha+\beta}, \quad \frac{3}{5} \alpha^2 + \frac{\beta^3}{\alpha^2}, \quad \frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta}$$

εἶνε κλασματικαί· ἐπειδὴ ἡ μὲν πρώτη περιέχει διαιρεσιν διὰ τοῦ β, ἡ δευτέρα διὰ τοῦ α + β, ἡ τρίτη διὰ τοῦ α², κλπ.

Α σκήσεις

1) Τίνες ἐκ τῶν κάτωθι παραστάσεων εἶνε ρηταὶ; "Αρρητοι; 'Ακέραιαι; κλασματικαι; Διατά;

$$\alpha') \quad 9\alpha^2\beta - \alpha\beta^2. \quad \beta') \quad \sqrt{28\alpha^2\beta}. \quad \gamma') \quad 8\sqrt{x^2y} - 9x. \quad \delta') \quad \frac{\alpha}{\beta} + \frac{19\beta^2}{\gamma}$$

$$2) \text{Αἱ παραστάσεις } \alpha') \sqrt{\alpha^2}. \quad \beta') \sqrt{(\alpha+\beta)^2}. \quad \gamma') \quad \frac{7\gamma}{\sqrt[3]{\delta^3}}$$

εἶνε ρηταὶ ἡ ἄρρητοι; Διατά;

3) Εὑρετε παραστάσεις, αἱ ὅποιαι μόνον φαινομενικῶς εἶνε ἄρρητοι.

4) Αἱ κατωτέρω παραστάσεις εἶνε ἀκέραιαι, ἡ κλασματικαι; Διατά;

$$\alpha') \quad \frac{9\alpha^2\beta}{5\alpha}. \quad \beta') \quad \frac{16\alpha(\alpha-\beta)^2}{7(\alpha-\beta)}. \quad \gamma') \quad \frac{6\gamma^2xy^2}{5\gamma xy^2}$$

§ 23. Περὶ μονώνυμων.—

α') «Μονώνυμον λέγεται παράστασις ἐν τῇ δοπίᾳ οὐτε πρόσθεσις οὐτε ἀφαίρεσις εὐδίσκεται σημειωμένη».

Π. χ. αἱ παραστάσεις

$$a, \quad -6x y^2, \quad -\frac{3}{7} \alpha\beta\gamma\delta, \quad -\frac{8\alpha\beta}{9\gamma\delta},$$

εἶνε μονώνυμα

β') 'Ακέραιον λέγεται ἐν μονώνυμον, ἐὰν μόνον πολλαπλασιασμὸν ἐπὶ τῶν γραμμάτων του περιέχῃ. Εὰν δὲ περιέχῃ καὶ διαιρεσιν, λέγεται κλασματικόν. Οὕτω ἐκ τῶν ἀνωτέρω μονωνύμων τὰ μὲν τρία πρῶτα εἶνε ἀκέραια, τὸ δὲ τελευταῖον κλασματικόν.

γ') Εὰν εἰς τὸ μονώνυμον ὑπάρχῃ ἀριθμητικός τις παράγων, γράφεται οὗτος πρῶτος, καὶ λέγεται συντελεστὴς τοῦ μονωνύμου. Οὕτω εἰς τὰ ἀνωτέρω μονώνυμα οἱ συντελεσταὶ εἶνε κατὰ σειρὰν οἱ

$$1, \quad -6, \quad -\frac{3}{7}, \quad -\frac{8}{9}$$

Τὸ ἄλλο μέρος τοῦ μονωνύμου λέγεται κύριον ποσὸν αὐτοῦ, εἶνε δὲ αὐτὰ εἰς τὰ ἀνωτέρω μονώνυμα κατὰ σειρὰν τὰ

$$a, \quad xy^2, \quad \alpha\beta\gamma\delta, \quad \frac{x\beta}{\gamma\delta}.$$

δ') Εἰς τὰ μονώνυμα, τὰ μὴ ἔχοντα συντελεστήν, ἐννοοῦμεν τοιούτον τὴν θετικὴν μονάδα. Π. χ. τοῦ α συντελεστῆς εἶναι ἡ μονάς. Διότι τὸ α δύναται νὰ γραφῇ 1. α, ἐνῶ τοῦ — α εἶνε ὁ —1.

ε') Ἐπειδὴ ὁ συντελεστὴς τοῦ μονωνύμου εἶναι θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀριθμός, ἔπειται ὅτι, τὰ μονώνυμα τὰ ἔχοντα θετικὸν συντελεστήν, ἢ μονάδα, θὰ ἔχουν πρὸ αὐτῶν τὸ σημεῖον +, τὰ δὲ ἔχοντα ἀρνητικὸν συντελεστὴν τὸ —.

Οὕτω τὰ μονώνυμα

$$a, \quad -9xy, \quad 8\alpha.\beta.\gamma.\delta, \quad \frac{-2x\beta}{9\gamma\delta}$$

γράφονται καὶ οὕτω

$$(+)a, \quad (-9).xy, \quad (+8)\alpha.\beta.\gamma.\delta, \quad \left(\frac{-2}{9}\right) \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta}.$$

“Ωστε, τὸ πρὸ τοῦ μονωνύμου γραφόμενον σημεῖον + ἢ — εἶναι τοῦ συντελεστοῦ αὐτοῦ, καὶ δεικνύει τὸ εἶδος αὐτοῦ, τὸ δὲ κύριον ποσὸν τοῦ μονωνύμου θεωρεῖται ὅτι εἶναι θετικόν.

§ 24. Περὶ 6. Θμοῦ ἀκεραίου μονωνύμου.—

α') Βαθμὸς ἀκεραίου μονωνύμου ὡς πρὸς ἓν γράμμα τον καλεῖται ὁ ἐκθέτης, τὸν δποίον ἔχει τὸ γράμμα τοῦτο ἐν τῷ μονωνύμῳ.

Π. χ. τοῦ μονωνύμου

$$7\alpha^3\beta,$$

ὅ βαθμὸς ὡς πρὸς τὸ γράμμα α εἶναι 3, ὡς πρὸς δὲ τὸ β ὁ 1· τοῦ $\frac{3}{4}\alpha^3\beta^2\gamma$.

ὅ βαθμὸς ὡς πρὸς τὸ α εἶναι 3, ὡς πρὸς τὸ β ὁ 2, καὶ ὡς πρὸς τὸ γ ὁ 1.

β') Εὰν ἐν μονώνυμον δὲν περιέχῃ γράμμα τι, θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ βαθμὸς τον ὡς πρὸς τὸ γράμμα αὐτὸν εἶναι μηδέν. Π. χ. τὸ μονώνυμον

$$3\alpha^3$$

εἶναι μηδὲν βαθμοῦ ὡς πρὸς τὸ β. Διότι, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ἀντὶ τοῦ

$$3\alpha^2 \quad \text{τὸ} \quad 3\alpha^2\beta^0. \quad \text{'Επειδὴ εἶναι } \beta^0=1$$

Καὶ τῷ ὄντι, εἶναι $3\alpha^2\beta^0=3\alpha^2$. $1=3\alpha^2$.

γ') Βαθμὸς ἀκεραίου μονωνύμου ὡς πρὸς περισσότερα γράμματά τον λέγεται τὸ ἀθροισμα τῶν ἐκθετῶν, τὸς δποίονς ἔχονν τὰ γράμματα ταῦτα ἐν τῷ μονωνύμῳ.

Π. χ. τὰ μονώνυμον

$$\frac{3}{4}\alpha^2\beta^3\gamma$$

είνε πέμπτου βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰ γράμματα α καὶ β, τετάρτου βαθμοῦ ὡς πρὸς β καὶ γ, τρίτου ὡς πρὸς α καὶ γ, καὶ ἕκτου ὡς πρὸς α, β, γ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίνος βαθμοῦ είνε καθὲν τῶν κάτωθι μονωνύμων ὡς α καὶ β; ὡς πρὸς α; ὡς πρὸς β; ὡς πρὸς γ; ὡς πρὸς α, β, γ;

$$\alpha') \quad 13\alpha^2\beta\gamma^8. \quad \beta) \quad \frac{11}{32}\alpha^3\delta^2\gamma. \quad \gamma') \quad \frac{24}{19}\alpha\beta^5\gamma^2. \quad \delta') -3\alpha^3\beta^2\gamma^5.$$

§ 25. Περὶ ἀθροίσματος μονωνύμων.—

Καλοῦμεν ἀθροίσμα δοθέντων μονωνύμων τὸ ἔξαρδμενον, τὸ ὁποῖον εὑρίσκομεν, ἢν γράψωμεν τὸ ἐν παρὰ τὸ ἄλλο ἐπ' εὐθείας γραμμῆς, καθὲν μὲ τὸ πρὸ αὐτοῦ σημεῖον.

$$\text{Οὕτω τὸ ἀθροίσμα τῶν μονωνύμων } 9\alpha^2, \quad -15\beta^2, \quad \frac{6}{\gamma^3}$$

$$\text{εἶνε τὸ } 9\alpha^2 - 15\beta^2 + \frac{6}{\gamma^3}$$

§ 26. Περὶ ὅμοιών μονωνύμων καὶ ἀναγωγῆς αὐτῶν.—

α') Δύο, ἢ περισσότερα, μονώνυμα λέγονται ὅμοια, ἢν εἰχουν τὸ αὐτὸ κύριον ποσόν. Οὕτω τὰ μονώνυμα

$$6\alpha, \quad \frac{2}{7}\alpha, \quad -23\alpha$$

είνε ὅμοια. Διότι εἰχουν τὸ αὐτὸ κύριον ποσόν α, διαφέρουν δὲ μόνον κατὰ τὸν συντελεστήν. Ἐπίσης τὰ

$$-\frac{39}{47}\beta, \quad 6\beta, \quad -17\beta,$$

είνε ὅμοια, εἰχοντα κύριον ποσόν, τὸ β, καθὼς είνε ὅμοια καὶ τὰ

$$12\alpha^2\beta, \quad -15\alpha^2\beta, \quad 23\alpha^2\beta, \quad -\alpha^2\beta,$$

εἰχοντα τὸ αὐτὸ κύριον ποσόν $\alpha^2\beta$.

β') «Τὸ ἀθροίσμα ὅμοιών μονωνύμων είνε μονώνυμον ὅμοιον πρὸς αὐτά, εἴχον συντελεστὴν τὸ ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα τῶν συντελεστῶν τῶν δοθέντων».

Ἐστω ὅτι ζητοῦμεν τὸ ἀθροίσμα τῶν ὅμοιών μονωνύμων 3α καὶ 4α. Ἐχομεν

$$3\alpha + 4\alpha = (\alpha + \alpha + \alpha) + (\alpha + \alpha + \alpha + \alpha) = 7\alpha.$$

$$\text{Ἐπίσης } -2\alpha + (-3\alpha) = (-\alpha) + (-\alpha) +$$

$$+ (-\alpha) + (-\alpha) + (-\alpha) = -5\alpha.$$

$$\text{Ομοίως } 8\alpha + (-5\alpha) = 3\alpha.$$

$$\text{Tὸ } -3\alpha + 4\alpha + \frac{2}{3}\alpha - 13\alpha$$

$$\begin{aligned}
 &= 4a + \frac{2}{3}a + (-3a) + (-13a) \\
 &= \frac{14}{3}a + (-16a) \\
 &= \frac{14}{3}a + \left(-\frac{48}{3}a\right) = -\frac{34}{3}a,
 \end{aligned}$$

Τὸ $2a^2\beta + (-6a^2\beta) + 13a^2\beta - a^2\beta = 15a^2\beta - 7a^2\beta = 8a^2\beta$.

γ') «Καλοῦμεν ἀναγωγὴν δμοίων μονωνύμων τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν δι' ἐνδεικούτου».

§ 27. Αριθμητικὴ τιμὴ ἀλγεβρικῆς παραστάσεως.

Καλοῦμεν ἀριθμητικὴν τιμὴν ἀλγεβρικῆς τινος παραστάσεως τὸ ἔξαγόμενον, τὸ προκύπτον, ἐὰν τὰ ἐν τῇ παραστάσει ὑπάρχοντα γράμματα ἀντικαταστήσωμεν δι' ἀριθμῶν ὀρισμένων καὶ ἐκτελέσωμεν τὰς πράξεις, αἵτινες σημειοῦνται ἐν αὐτῇ.

Οὕτω, ἐὰν εἶνε $a = 3$ ἢ παράστασις $4a$ ἔχει τὴν τιμὴν 4. 3 = 12. Η παράστασις $a^4 = a \cdot a \cdot a \cdot a$, ὅταν εἶνε $a = 3$ ἔχει τὴν τιμὴν $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$.

Ἐὰν εἶνε $a = 5$, $\beta = 6$, $\gamma = 7$, ἢ παράστασις $\frac{9}{14}a\beta\gamma$ ἔχει τὴν τιμὴν $\frac{9}{14} \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 135$.

Ἐὰν εἶνε $a = -2$, $\beta = 1$, $\gamma = 5$, ἢ παράστασις $3a^2 - 5\beta + 2\gamma$ ἔχει τὴν τιμὴν $3(-2)^2 - 5 \cdot 1 + 2 \cdot 5 = 12 - 5 + 10 = 17$.

Ἐὰν εἶνε $x = 2$, $y = 3$, $\omega = 4$, ἢ παράστασις $\frac{8x^2y}{3\omega^3}$ ἔχει τὴν $\frac{8 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{1}{2}$.

§ 28. Παραστάσεις ἰσοδύναμοι.—

α') Δύο, ἢ περισσότεραι, παραστάσεις λέγονται ἰσοδύναμοι, ἐὰν ἔχουν τὴν αὐτὴν τιμήν, δι' οἵασδήποτε τιμὰς τῶν γραμμάτων των. Οὕτω αἱ παραστάσεις

$$a^2 + a\beta \quad \text{καὶ} \quad a(a + \beta)$$

εἶνε ἰσοδύναμοι. Διότι, ἂν θέσωμεν $\pi. \chi.$ $a = 2$, $\beta = 3$, ενδίσκομεν καὶ διὰ τὰς δύο τὴν αὐτὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν 10.

β') Εάν δύο παραστάσεις εἶνε ἰσοδύναμοι, συνδέονται συνήθως διὰ τοῦ σημείου τῆς ἴσοτητος. Οὕτω ἔχομεν

$$3a = a + a + a,$$

$$a^3 = a \cdot a \cdot a,$$

$$4a + 5a + (-12a) = -3a.$$

Θέτοντες δὲ εἰς καθέν τῶν μελῶν τῆς ἴσοτητος ἀντὶ καθενὸς τῶν γραμμάτων ὁρισμένην τιμήν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν δι' ἐν καὶ τὸ αὐτό, εὑρίσκομεν ἵσας ἀριθμητικὰς τιμάς.

§ 29. Πώς κάμνομεν τὴν δοκιμὴν μετὰς πράξεως.—

Ἐὰν θέλωμεν νὰ κάμψουμεν τὴν δοκιμὴν μιᾶς πράξεως, π. χ. τῆς ἀναγωγῆς διοίων δρῶν, ἀντικαθιστῶμεν τὰ γράμματα δι' ἀριθμῶν τινῶν ὁρισμένων, καὶ πρέπει αἱ παραστάσεις, αἴτινες συνδέονται διὰ τοῦ σημείου τῆς ἴσοτητος, νὰ ἔχουν τὴν αὐτὴν ἀριθμητικὴν τιμήν.

*Α σκήσεις

1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἑξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων

$$\alpha') \quad \alpha\mu + 4\mu \cdot \beta') - 8\mu + (-6\mu) \cdot \gamma') - 4\mu + 7\mu \cdot \delta') 5\mu + (-9\mu) \cdot \epsilon') 8x + \alpha + 9x \cdot \sigma') \rho + 7\rho + (6\rho + 3\rho) \cdot \zeta') 7x + (-8x) + (6x) \cdot \eta') 9x + (-6x + \alpha). \quad \theta') -\alpha + 9x + [(-3\alpha) + 9x].$$

$$2) \text{ 'Ομοίως τὰ } \alpha') - \mu + \mu \cdot \beta') 10\mu - (-\mu) \cdot \gamma') - 9\mu - \mu.$$

$$\delta') - 7\mu - (-\mu) \cdot \epsilon') 8x - 10x - 6x \cdot \sigma') - \rho + 15\rho - (6\rho - 9\rho).$$

3) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἑξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων καὶ νὰ γίνῃ ἡ δοκιμὴ διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων,

$$\alpha') - 6x + 7y + (-3x).$$

$$\delta\tau\alpha \quad x = -3, y = 4$$

$$\beta') - 7x + [(-8x) + 4].$$

$$\delta\tau\alpha \quad x = 0.$$

$$\gamma') - 9x + (-7y) + (-3y) + (-6x).$$

$$\delta\tau\alpha \quad x = 3, y = -4.$$

$$4) \text{ Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τῶν}$$

$$\alpha') \alpha^3 - 6\alpha^2\beta + \beta^3,$$

$$\delta\tau\alpha \quad \alpha=2, \beta=6.$$

$$\beta') \frac{(\alpha+\beta)(\alpha-3\beta)}{6\alpha-2\beta},$$

$$\delta\tau\alpha \quad \alpha=2, \beta=5.$$

$$\gamma') \alpha(\beta-\gamma) + \beta(\gamma-\alpha),$$

$$\delta\tau\alpha \quad \alpha=-2, \beta=-2, \gamma=-1,7.$$

$$5) \text{ Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τῶν παραστάσεων}$$

$$\alpha') (\alpha+\beta)[\alpha^2 - (\beta^2 - 6\alpha\gamma)],$$

$$\delta\tau\alpha \quad \alpha=-5, \beta=2, \gamma=-3$$

$$\beta') \sqrt{\alpha^3 - 2\beta - 4\gamma} - 2\sqrt{4\alpha^2 + \beta} (\alpha + \gamma),$$

$$\delta\tau\alpha \quad \alpha=9, \beta=-4, \gamma=3.$$

§ 30. Περὶ πολυωνύμων.—

α') *Καλοῦμεν πολυώνυμον τὸ ἄθροισμα ἀκεραίων μονωνύμων.*

Οὕτω τὰ 3 $\alpha^2 + 5\alpha\beta\gamma - 13\gamma^2$, $8\alpha^2 - 2\alpha\beta + 4\gamma^2 - 6\gamma\delta$ εἶνε πολυώνυμα, ἐκ τῶν δύοιών τὸ πρῶτον εἶνε ἄθροισμα τῶν ἀκεραίων μονωνύμων $3\alpha^2$, $5\alpha\beta\gamma$, $-13\gamma^2$, τὸ δὲ δεύτερον τῶν $8\alpha^2$, $-2\alpha\beta$, $4\gamma^2$, $-6\gamma\delta$.

β') Καθέν μονώνυμον πολυωνύμου λέγεται καὶ ὅρος αὐτοῦ, θεωρεῖται δὲ θετικὸς ἢ ἀρνητικός, ἢν δὲ συντελεστής του ἔχει τὸ σημεῖον, + ἢ -. Πολυώνυμόν τι λέγεται διώνυμον, ἐὰν ἔχῃ δύο ὅρους, ὃς τὰ

$$\alpha + \beta, \quad \alpha^2 + \beta^2, \quad x^2 + a,$$

τριώνυμον δέ, ἐὰν ἔχῃ τρεῖς ὅρους, ὡς τὰ

$$x^2 + px + \kappa, \quad a + \beta - \gamma, \quad a^2 + 2a\beta + \beta^2.$$

§ 31. Βαθμὸς πολυωνύμου.—

α') Βαθμὸς πολυωνύμου ὡς πρὸς ἐν γράμμα τον λέγεται ὁ μέγιστος τῶν ἐκθετῶν, τοὺς ὅποιους ἔχει τὸ γράμμα τοῦτο εἰς τὸν ὅρους τοῦ πολυωνύμου.

Ἐὰν ὁ ἐκθέτης οὗτος εἴνε 1, 2, 3... τὸ πολυώνυμον λέγεται πρώτου, δευτέρου, τρίτου..., βαθμοῦ ὡς πρὸς τὸ γράμμα τοῦτο. Οὕτω τὸ

$$3 a^2 - 5 ab\gamma - 13 \gamma^3$$

εἴνε δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς τὸ a, καὶ τρίτου ὡς πρὸς τὸ γ, πρώτου δὲ ὡς πρὸς τὸ β.

β') Βαθμὸς πολυωνύμου τινός ὡς πρὸς δύο, τρία... γράμματά τον καλεῖται ὁ μέγιστος τῶν βαθμῶν τῶν μονωνύμων τον ὡς πρὸς τὰ γράμματα ταῦτα. Οὕτω τὸ πολυώνυμον $3x^2 - 3xy + 2x - 7$ εἴνε δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰ x καὶ y.

Τὸ $5a^2 - 3 ab^2 \gamma + 13 \gamma$ εἴνε τετάρτου βαθμοῦ ὡς πρὸς a, β. γ.

*Περὶ συναρτήσεων**

§ 32. Ήννοια τῆς συναρτήσεως.—

α') 1) Ταξιδεύων τις λαμβάνει μαζὸν τὸν 350 δρ., καὶ ἔξοδεύει καθ' ἡμέραν 8 δραχμάς.

Ἐὰν ταξιδεύῃ ἐπὶ 2 ἡμ. θὰ ἔξοδεύῃ 8.2 δραχ. ἐὰν τρεῖς, τέσσαρας... ἡμέρας θὰ ἔξοδεύῃ 8.3· 8.4 δραχ... Καὶ ἐὰν ἐπὶ x ἡμέρας, θὰ ἔξοδεύῃ 8.x δρ., θὰ τῷ μείνουν δὲ καὶ 350 - 8.x δρ.

Καθὼς βλέπομεν, θὰ εὑρωμεν πόσαι δραχμαὶ θὰ τῷ μείνουν, ἐὰν γνωρίζωμεν πόσας ἡμέρας διήρκεσε τὸ ταξείδιον. Θὰ παραστήσωμεν διὰ τοῦ γ τὸν ἀριθμὸν τῶν δραχμῶν, αἱ ὅποιαι θὰ τῷ μείνουν μετὰ x ἡμέρας, θὰ ἔχωμεν ὅτι

$$y = 350\delta_r - 8.x\delta_r.$$

καὶ ἐὰν εἴνε

$$\text{τὸ } x = 5, \text{ τὸ } y = 350 - 8.5 = 350 - 40 = 310 \text{ δρ.}$$

2) Εἰς ποδηλάτης διάννοε 21 χμ., διὰ νὰ φθάσῃ εἰς ἔνα ὠρισμένον τόπον, ἀπὸ τοῦτον δὲ διάννει 17 χιλ. καθ' ἥραν.

Μετὰ x ὡρας διάννυσεν 17. x χμ. ἀπὸ τὸν τόπον, ἀπ' ἀρχῆς δ' ἐν ὅλῳ $21 + 17. x$ χμ. Θὰ παραστήσωμεν διὰ τοῦ γ τὸν διανυθέντα δρόμον, θὰ ἔχωμεν ὅτι

y=21 + 17.x.

(1)

Ἐὰν γνωρίζωμεν πόσας ὥρας ἔξηκολούθησε τὸν δρόμον του ἀπὸ τὸν ὡρισμένον τόπον, δηλαδὴ ἂν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τοῦ x, δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ y ἐκ τῆς ἴσοτητος (1). Π.χ. ἂν εἶνε τὸ x=2, θὰ ἔχωμεν

y=21 + 17. 2=21+34=55.

ἄν εἶνε x=3, τότε y=21 + 17. 3=21 + 51=72.

Αἱ ποσότητες x καὶ y, αἱ δοῖαι λαμβάνουν διαφόρους τιμὰς εἰς καθὲν τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων λέγονται μεταβληταί. Ἐνῷ αἱ ποσότητες, αἱ δοῖαι ἔχουν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τιμὴν εἰς ἓν προβλημα λέγονται σταθεραί. Π. χ. τὸ ποσὸν τῶν χρημάτων, τὸ δοῖον ἔλαβεν ὁ ταξιδιώτης μαζύ του, ἡ ἀπόστασις τὴν δοῖαν διήγνυσεν ὁ ποδηλάτης κατ' ἀρχάς, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν ὡρισμένον τόπον, εἶνε σταθεραὶ ποσότητες.

6') Εἰς καθὲν τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων ἡ μεταβλητὴ ποσότης γι συνδέεται μὲ τὴν x οὕτως, ὡστε δοῖαν δώσωμεν εἰς τὴν x τιμὴν τινα ὡρισμένην, εὑρίσκομεν καὶ τὴν τιμὴν τοῦ y. Ἡ μεταβλητὴ x, εἰς τὴν δοῖαν δίδομεν αὐθαιρέτως τὴν τιμὴν, τὴν δοῖαν θέλομεν, καλεῖται ἀνεξάρτητος μεταβλητή, ἡ δὲ y, τῆς δοῖας ἡ τιμὴ ἔξαρται ἐκ τῆς τιμῆς τῆς x, καλεῖται συνάρτησις τῆς x.

7') Ἐν γένει, ἔὰν δόνο μεταβληταὶ x καὶ y συνδέονται μεταξύ των κατὰ τοιούτον τρόπον, ὡστε εἰς καθεμίαν δοθεῖσαν τιμὴν τοῦ x νὰ εὑρίσκωμεν ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς y, τότε ἡ y θὰ λέγεται συνάρτησις τῆς x, ἡ δὲ x ἀνεξάρτητος μεταβλητή.

8') Κατὰ ταῦτα ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κύκλου εἶνε συνάρτησις τῆς ἀκτῖνός του. Διότι, ἄν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὴν ἀκτῖνα τοῦ κύκλου, καὶ διὰ τοῦ y τὸ ἐμβαδόν του, θὰ ἔχωμεν ὅτι εἶνε

y = πx²,

καὶ τὸ μὲν π εἶνε ἀριθμὸς ὡρισμένος (ἴσος μὲ 3, 141 περίπου) τὸ δὲ y εὑρίσκεται, δοῖαν δοθῇ εἰς τὸ x ὡρισμένη τις τιμὴ. Ὄμοίως τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου, τοῦ ἔχοντος βάσιν ὡρισμένην a, εἶνε συνάρτησις τοῦ ὑψούς του. Διότι ἔχομεν ὅτι

y = $\frac{1}{2}$ a x,

ἄν τὸ x παριστάνει τὸ ὑψός τοῦ τριγώνου, καὶ y τὸ ἐμβαδόν του.

A σκήσεις

1) Εύρετε παραδείγματα ἑξαρτήσεως δύο ποσῶν, τὰ όποια παρουσιάζονται εἰς τὸν κοινὸν βίον καὶ ἐκ τῶν ὅποιών τὸ ἔν νὰ είνε συνάρτησις τοῦ ἄλλου (χρόνος, ἐργασία καὶ ἀμοιβή, ἀξία ἐμπορεύματος καὶ βάρος κλπ.).

2) Εύρετε παραδείγματα συναρτήσεων ἐκ τῆς Φυσικῆς (τὸ διανυόμενον διάστημα καὶ ἡ ταχύτης ἐν τῷ κενῷ, τὸ διάστημα καὶ ὁ χρόνος κλπ.) ἐκ τῆς Γεωμετρίας.

§ 33. Πέντε τιμῶν συναρτήσεως. —

α') "Εστω μία συνάρτησις y , ἥδη ὅποια είνε λση μὲ 13 + 5x." Ήτοι ἐστω ὅτι ἔχομεν

$$y = 13 + 5x \quad (1).$$

Ἐὰν εἰς τὴν ἀνεξάρτητον μεταβλητὴν x δώσωμεν κατὰ σειρὰν τὰς τιμὰς 0, 1, 2, 3, ... δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς y , ἀν θέσωμεν εἰς τὴν (1) ἀντὶ τοῦ x τὰς τιμὰς του. Οὕτω ἔχομεν ὅτι

$$\text{ὅταν εἶνε } x=0, \quad \text{τὸ } y = 13+5.0=13$$

$$\text{ὅταν εἶνε } x=1, \quad \text{τὸ } y = 13+5.1=18$$

$$\text{ὅταν εἶνε } x=2, \quad \text{τὸ } y = 13+5.2=23.$$

Ομοίως διὰ τὴν συνάρτησιν

$$y = 144 - 6x$$

ἔχομεν ὅτι

$$\text{ὅταν εἶνε } x=0, \quad y = 144 - 6.0=144$$

$$\text{ὅταν εἶνε } x=1, \quad y = 144 - 6.1=138$$

$$\text{ὅταν εἶνε } x=2, \quad y = 144 - 6.2=132.$$

β') 'Εν γένει, ἐὰν δοθῇ μία συνάρτησις, π. χ. ἥ y , μιᾶς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς, ἐστω x , καὶ διὰ δοθείσας τιμὰς τῆς x γράφωμεν τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς y , καθὼς εἰς τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα, λέγομεν ὅτι σχηματίζομεν πίνακα τῶν τιμῶν τούτων τῆς συναρτήσεως ταύτης.

A σκήσεις

1) Σχηματίσατε τὸν πίνακα τῶν τιμῶν τῶν κάτωθι συναρτήσεων διὰ τὰς τιμὰς τοῦ

$$x=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot -1 \cdot$$

$$x = -2 \cdot -3 \cdot -\frac{1}{4}$$

$$\alpha') y = 3x + 6. \beta') y = 8x - 25, \quad \gamma') y = x, \delta') y = -x$$

$$\epsilon') y = \frac{3}{4}x - 62. \quad \varepsilon') y = \frac{x^2}{2} - 3x - 7$$


$$\zeta') y = \frac{4}{19}x^2 + \frac{3}{8}x + 9. \quad \eta') y = 600 - 35x^2 + \frac{13}{15}x.$$

2) Σχηματίσατε τόν πίνακα τῶν τιμῶν καθεμιᾶς τῶν κάτωθι συναρτήσεων ὅταν εἶναι $x=0, \frac{1}{2}, 1, 4 \frac{1}{2}, 2, 2 \frac{1}{2}, \dots$

$$\alpha') y = \frac{6x-7}{9x+5}, \quad \beta') y = \frac{3}{4}x - \frac{7}{5x+6} + 9, \quad \gamma') y = \frac{1}{x^3+6}$$

§ 34. Απεικόνισις τῶν τιμῶν συναρτήσεως.

α') Καθώς τοὺς ἀλγεβρικοὺς ἀριθμοὺς παριστάνομεν (§2) διὰ σημείων τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν, οὕτω δυνάμεθα νὰ παριστάνωμεν



(Σχ. 2)

διὰ σημείων τὰ ζεύγη τῶν τιμῶν τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς καὶ τῆς συναρτήσεως.

$$\text{6')} \text{ Εστω ὅτι ἔχομεν τὴν συνάρτησιν } y = 2 \cdot x + 1 \quad (1)$$

Ἐὰν δώσωμεν εἰς τὴν x τὴν τιμὴν 1, εὑρίσκομεν

$$y = 2 \cdot 1 + 1 = 3.$$

Λαμβάνομεν τὴν εὐθεῖαν τῶν ἀριθμῶν $x' x$ καὶ ἐπ' αὐτῆς εὐρίσκομεν τὸ σημεῖον Θ (ὅπου $O\Theta = 1$), τὸ δοποῖον παριστάνει τὴν τιμὴν $x = 1$. Τὴν τιμὴν τοῦ y θὰ παριστάνωμεν κατ' ἀνάλογον τρόπον δι' ἐνὸς σημείου μιᾶς ἄλλης εὐθείας y' y, τὴν δοποῖαν λαμβάνομεν συνήθως κάθετον ἐπὶ τὴν x' x εἰς τὸ σημεῖον O. Ταύτης τὸ τιμῆμα Oy εἶναι τὸ τιμῆμα τῶν θετικῶν τιμῶν τοῦ y, τὸ δὲ Oy' τὸ τῶν ἀρνητικῶν (σχ. 2)

Οὕτω ἡ τιμὴ τῆς $y=3$ θὰ παριστάνεται ύπὸ τοῦ σημείου P τῆς Oy . Εάν ἐκ τοῦ Θ φέρωμεν παράλληλον πρὸς τὴν Oy , καὶ ἐκ τοῦ P πρὸς τὴν Ox , αἱ εὐθεῖαι αὐτὰ τέμνονται εἰς ἓν σημεῖον ἔστω τὸ M . Θὰ λέγωμεν, ὅτι τὸ σημεῖον M παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν τοῦ $x=1$, καὶ $y=3$, τῆς συναρτήσεως $y=2 x+1$.

Καθ' ὅμοιον τρόπον εὑρίσκομεν τὸ σημεῖον, τὸ παριστάνον τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν $x=2$, καὶ $y=2. 2+1=5$, ἵτις εὑρίσκεται ἐκ τῆς (1), ἀν δέσωμεν ὅπου x τὸ 2. Τοῦτο παριστάνεται ύπὸ τοῦ σημείου M' , τὸ δόποιον εἶναι ἡ τομὴ τῆς εὐθείας $\Pi_2 M'$, ἵτις ἄγεται παράλληλος πρὸς τὴν Oy ἐκ τοῦ σημείου Π_2 τῆς $x' x$, παριστάνοντος τὸν ἀριθμὸν $x=2$, καὶ τῆς $\Sigma M'$, ἵτις ἄγεται παράλληλος πρὸς τὴν Ox ἐκ τοῦ σημείου Σ , τοῦ παριστάνοντος τὴν τιμὴν $y=5$.

Διὰ τὴν τιμὴν $y=-2$ ἔχομεν ἐκ τῆς (1)

$$y=2. (-2)+1=-4+1=-3.$$

Εὑρίσκομεν δὲ τὸ σημεῖον Π_{-2} ἐπὶ τῆς εὐθείας $x' x$, τὸ P_{-3} ἐπὶ τῆς $y' y$, καὶ τὸ σημεῖον M'' , τομὴ τῆς ἐκ τοῦ Π_{-2} παραλλήλου πρὸς τὴν $y' y$, καὶ τῆς ἐκ τοῦ P_{-3} παραλλήλου πρὸς τὴν $x' x$, παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν $x=-2$, $y=-3$, τοῦ x καὶ τῆς συναρτήσεως (1).

γ') Ἐν γένει, καθὲν ζεῦγος τῶν ἀντιστοιχουσῶν τιμῶν τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς καὶ τῆς συναρτήσεως θὰ παριστάνεται ύπὸ ἑνὸς σημείου, τὸ δόποιον εἶναι τομὴ δύο εὐθεῶν παραλλήλων πρὸς τὰς εὐθείας $x' x$ καὶ $y' y$. Ἐκ τούτων ἡ μὲν παράλληλος πρὸς τὴν $y' y$ ἄγεται ἐκ τοῦ σημείου, τοῦ παριστῶντος τὴν τιμὴν τοῦ x , ἡ δὲ πρὸς τὴν $x' x$ ἐκ τοῦ σημείου, τοῦ παριστῶντος τὴν τιμὴν τοῦ y .

δ') Δυναμέδα ταχύτερον νὰ εῦρωμεν τὸ ἐν λόγῳ σημεῖων ὡς ἔξῆς. Ἐκ τοῦ σημείου τοῦ παριστῶντος τὴν τιμὴν τοῦ x (η τοῦ y) φέρομεν τιμῆμα εὐθείας παράλληλον πρὸς τὴν εὐθεῖαν $y' y$ (η τὴν $x' x$), καὶ ἵσον μὲ τόσας μονάδας μῆκους, δῆση εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ y (η τοῦ x), πρὸς τὰ ἄνω μὲν (η δεξιά), ἀν ἡ τιμὴ τοῦ y (η τοῦ x) εἶναι θετική, πρὸς τὰ κάτω δὲ (η ἀριστερά), ἀν εἶναι ἀρνητική.


Π. γ. ἐὰν ἔχωμεν τὴν συνάρτησιν $y=2x-3$

διὰ $x=1$ θὰ εἴνε $y=2-3=-1$.

Εὑρίσκομεν τὸ σημεῖον, τὸ δόποιον παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν 1 καὶ -1 τῆς x καὶ y , ἐὰν ἀπὸ τὸ σημεῖον, τὸ παριστάνον τὴν τιμὴν -1 τοῦ y ἐπὶ τοῦ Oy φέρωμεν τιμῆμα εὐθείας παραλλήλου τῆς Ox , καὶ ἵσον μὲ 1. Τὸ σημεῖον τοῦτο σημειώνομεν διὰ τοῦ (1, -1) εἰς τὸ σχῆμα (3)-

Όμοιώς διὰ $x=2$ εἶνε $y=2 \cdot 2 - 3 = +1$. Τὸ σημεῖον $(2,1)$ παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν 2 καὶ $+1$, κ.ο.κ.

ε') Τὴν εὐθεῖαν x' καλοῦμεν συνήθως $\delta\xi\sigma\alpha$ τῶν x ἢ τῶν τετμημένων, τὴν δὲ εὐθεῖαν y' γ' $\delta\xi\sigma\alpha$ τῶν y ἢ τῶν τεταρμένων. τοὺς δύο δὲ $\delta\xi\sigma\alpha$ μὲ ἐν ὄνομα $\delta\xi\sigma\alpha$ τῶν συντεταρμένων καὶ



(Σχ. 3)

γ. Συνήθως λαμβάνομεν τὸν $\delta\xi\sigma\alpha$ τῶν x δοιζόντιον, τὸν δὲ τῶν y κάθετον ἐπὶ τὸν πρῶτον. Τὴν τιμὴν τοῦ x καὶ y καλοῦμεν ἀντιστοίχως τετμημένην καὶ τεταρμένην τοῦ σημείου, τοῦ παριστάνοντος τὸ ζεῦγος τῶν δύο τούτων τιμῶν, καὶ τὰς δύο δὲ μὲ ἐν ὄνομα συντεταρμένας τοῦ σημείου.

Ασκήσεις

Παραστῆσατε διὰ σημείων τὰ ζεύγη τῶν τιμῶν τῆς x καὶ y τῶν κάτωθι συναρτήσεων διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τοῦ x

$$\alpha') y=x+2, \quad \beta') y=\frac{1}{2}x+1, \quad \gamma') y=\frac{3}{4}x-2,$$

$$\delta') y=\frac{3}{4}x-\frac{2}{5}x^2, \quad x=0 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$$

$$\epsilon') y=\frac{1}{2}x^2-x^3, \quad \zeta') y=-\frac{3}{4}x^2+5, \quad \eta') y=\frac{x-1}{2}+1,$$

$$\eta') y=\frac{x^2}{2}-x+1, \text{ διὰ } x=0 \cdot -1 \cdot -2, \frac{3}{2}, +2.$$

$$\theta') y=x^4-x+3, \text{ διὰ } x=0 \cdot 1 \cdot -1 \cdot -\frac{1}{3}, 0, 1.$$

ε') Τὸν ἀνωτέρῳ τῷ πάντας παραστάσεως ζεύγους τιμῶν μεταχειρίζονται συχνὰ διὰ νὰ συγκρίνουν μεταξύ των πλῆθος παρατηρήσεων. Ἐστω π. χ. ὅτι γνωρίζομεν τὴν θερμοκρασίαν, τὴν δποίαν δεικνύει τὸ θερμόμετρον τὴν 8ην πρωΐνην ὡραν καθ' ἡμέραν ἐπὶ ἔνα μῆνα. Λαμβάνομεν ἐν ὁρισμένον μῆκος ὡς μονάδα μῆκους, ἡ δποία θὰ παριστάῃ τὴν μίαν ἡμέραν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν x, ἐστω τὸ 0,01 μ. Ἐπίσης ἐν ἄλλῳ ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν y, ἐστω τὸ 0,02 μ., τὸ δποῖον θὰ παριστάῃ τὸν ἑνα βαθμὸν (ἢ περισσοτέρους) τοῦ θερμομέτρου. Ἀφοῦ εὑρωμεν τὰ σημεῖα, τὰ δποῖα παριστάνουν τὰ ζεύγη τῶν τιμῶν (τῶν ἡμερῶν τοῦ μηνός, καὶ τῶν ἀντιστοίχων βαθμῶν τοῦ θερμομέτρου) συνδέομεν τὰ διαδοχικὰ σημεῖα, ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ ἔξῆς διὰ τημάτων εὐθειῶν. Ἡ γραμμή, τὴν δποίαν οὕτω εὑρίσκομεν, δίδει μίαν εἰκόνα τῶν κυμάνσεων τῆς θερμοκρασίας κατὰ τὸν θεωρούμενον μῆνα. Ἡ γραμμή αὗτη καλεῖται, συνήθως, γραμμὴ τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἐν λόγῳ μηνός.

Καθ' ὅμιον τῷ πάντα παριστάσεως τὴν μεταβολὴν τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος ἐνὸς ἀσθενοῦς, παρατηροῦντες αὗτὴν δἰς τῆς ἡμέρας (τὴν πρωΐαν καὶ ἐσπέραν συνήθως) καὶ λαμβάνοντες τὸν μέσον δρον των, διὰ νὰ εὑρωμεν τὴν μέσην θερμοκρασίαν τῆς ἡμέρας. Τὴν γραμμήν, τὴν δποίαν οὕτω θὰ εὑρωμεν, καλοῦμεν συνήθως γραμμὴν πυρετοῦ τοῦ ἀσθενοῦς.

Ἄσκησεις

1) Ἡ μέση μηνιαία θερμοκρασία μιᾶς πόλεως εἶνε διὰ πάντας τοὺς μῆνας ἐνὸς ἔτους κατὰ σειρὰν $-4^{\circ}, -2,3^{\circ}, 3,3^{\circ}, 6,5^{\circ}, 13^{\circ}, 16,6^{\circ}, 17,8^{\circ}, 19,5^{\circ}, 13,9^{\circ}, 9^{\circ}, 3,1^{\circ}, -2,6^{\circ}$. Λάβετε ὡς μονάδα μετρήσεως τοῦ μηνός ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν x τὸ 0,01 μ. Ως μονάδα δὲ μετρήσεως ἐνὸς βαθμοῦ ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν y ἐπίσης τὸ 0,01 μ. Εὔρετε τὴν γραμμὴν τῆς θερμοκρασίας τῆς πόλεως.

2) Ἡ αὐξήσεις τοῦ πληθυσμοῦ μιᾶς πόλεως κατὰ τὸ 1890 ἦτο 54 γιλιάδες καὶ κατὰ τὰ ἐπόμενα ἔτη κατὰ σειρὰν μέχρι τοῦ 1903 56· 46· 38· 32· 35· 37· 48· 52· 87· 79· 69· 90· 97 γιλιάδες. Λάβετε ὡς μονάδα μῆκους πρὸς παράστασιν τοῦ ἔτους ἐπὶ τοῦ ἄξονος x καὶ τῆς γιλιάδος ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν y τὸ 0,005 μ. Ἀπεικονίσατε τὴν πορείαν τῆς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως ταύτης.

Πράξεις ἐπὶ τῶν πολυωνύμων

§ 35. Ηρόσθεσεις πολυωνύμων.—

α') Γνωρίζομεν (ἐν τῆς Ἀριθμητικῆς) ὅτι

«τὸ ἀθροισμα δσωνδήποτε ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται καθ' ὀλανδήποτε τάξιν καὶ ἀν προσθέσωμεν αὐτούς».

Οὕτω π. χ. ἔχομεν ὅτι $a+\beta+\gamma=\beta+a+\gamma=\gamma+\beta+a,\dots$

6') Έν γένει, «έὰν ἀλγεβρικοὶ τινες ἀριθμοὶ συνδέωνται μεταξύ των διὰ προσθέσεως, δυνάμεντα νὰ γράψωμεν αὐτοὺς καθ' οἰανδήποτε τάξιν, χωρὶς τὸ ἔξαγόμενον νὰ μεταβληθῇ, ἀρκεῖ, καθεὶς ἕξ αὐτῶν νὰ διατηρῇ τὸ πρὸ αὐτοῦ σημεῖον».

Διότι, δυνάμεντα νὰ μετατρέψωμεν πᾶσαν ἀφαίρεσιν ἀριθμῶν εἰς πρόσθια συμβολή. Οὕτω ἔχομεν,

$$\alpha + \beta - \gamma = \alpha + \beta + (-\gamma) = \alpha + (-\gamma) + \beta = \alpha - \gamma + \beta.$$

$$\text{Ομοίως } \alpha - \gamma - \beta = \alpha + (-\gamma) + (-\beta) = +(-\beta) + \alpha + (-\gamma) = -\beta + \alpha - \gamma.$$

$$\text{Ἐπίσης } \text{Έχομεν } \text{ὅτι } \alpha + (\beta - \gamma) = \alpha + [\beta + (-\gamma)] = \alpha + \beta + (-\gamma) = \alpha + \beta - \gamma \\ \text{καὶ τοῦτο} \qquad \qquad \qquad = \alpha - \gamma + \beta.$$

$$\text{Ομοίως } \alpha + (-\beta - \gamma) = \alpha + [(-\beta) + (-\gamma)] = \alpha + (-\beta) + (-\gamma) = \alpha - \beta - \gamma.$$

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι

γ') «Διὰ νὰ προσθέσωμεν μονώνυμα, ἀρκεῖ, νὰ γράψωμεν καθ' οἰανδήποτε τάξιν τὸ ἐν παρὰ τὸ ἄλλο καὶ καθὲν μὲ τὸ σημεῖόν του».

Οὕτω τὸ ἄθροισμα τῶν μονωνύμων

$$\begin{array}{lllll} 15\alpha^2x, & -3\alpha^2x, & 15\alpha^3y, & -\alpha^2x, & -\alpha^3y \\ \text{εἶνε} & 15\alpha^2x & -3\alpha^2x & +15\alpha^3y & -\alpha^2x & -\alpha^3y \end{array}$$

καὶ μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὅμοιών ὁρῶν $15\alpha^2x, -3\alpha^2x, -\alpha^2x$ ἀφ' ἑνός, καὶ τῶν $15\alpha^3y, -\alpha^3y$ ἀφ' ἑτέρου, εὑρίσκομεν $11\alpha^2x + 14\alpha^3y$.

δ') Ἐπειδὴ πᾶν πολυώνυμον εἶνε ἄθροισμα τῶν μονωνύμων του, ἔπειται ὅτι

«διὰ τὰ προσθέσωμεν πολυώνυμα, ἀρκεῖ, νὰ σχηματίσωμεν ἐν πολυώνυμον ἐκ πάντων τῶν ὁρῶν τῶν δοθέντων, διατηροῦντες τὸ σημεῖον ἑκάστου ὁρού».

Οὕτω τὸ ἄθροισμα τῶν πολυωνύμων

$$3\alpha^2x + \beta^3 + 6 + \alpha^4, \qquad \qquad -\beta^3 - 8 + 2\alpha^4 + 2\alpha^2x \\ \text{ἴσοιςται μὲ τὸ πολυώνυμον}$$

$$3\alpha^2x + \beta^3 + 6 + \alpha^4 - \beta^3 - 8 + 2\alpha^4 + 2\alpha^2x,$$

καὶ μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὅμοιών ὁρῶν εὑρίσκομεν

$$5\alpha^2x + 3\alpha^4 - 2.$$

Καθ' ὅμοιον τρόπον διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἄθροισμα ὁσπενδήποτε πολυωνύμων, σχηματίζομεν ἐν πολυώνυμον ἐκ πάντων τῶν ὁρῶν τῶν δοθέντων, διατηροῦντες τὰ σημεῖα τῶν ὁρῶν των.

§ 36. Ἀφαιρεσις πολυωνύμων.—

α') «Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν μονάνυμόν τι ἀπὸ δοθεῖσαν παραστασιν, ἀρχεῖ, νὰ προσθέσωμεν εἰς ταῦτην τὸ ἀντίθετον τοῦ δοθέντος».

Διότι, ως γνωστόν, διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀριθμόν τινα ἀλγεβρικὸν ἀπὸ ἄλλον, ἀρχεῖ, νὰ προσθέσωμεν τὸν ἀντίθετόν του εἰς τὸν μειωτέον. Οὕτω, ἡ διαφορὰ τοῦ $-a^3$ ἀπὸ τοῦ a^2y εἶναι $a^2y + a^3$. Ἡ διαφορὰ τοῦ $a^2\beta$ ἀπὸ τοῦ $3a^2\beta + 5a\beta^2 - \beta^2$ εἶναι

$$3a^2\beta + 5a\beta^2 - \beta^2 - a^2\beta = 2a^2\beta + 5a\beta^2 - \beta^2.$$

6') 'Εὰν ζητῆται ἀπὸ τὸ ἀθροισμα τῶν

$$a^3x, -a^2y, a^3$$

τὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ μονάνυμα

$$a^2x, -3a^2y^3, -a^4, 2ay^2,$$

εὑρίσκομεν πρῶτον τὸ ἀθροισμα τῶν τριῶν πρώτων καὶ εἰς τὸ ἔξαγόμενον προσθέτομεν καθέν τῶν ἄλλων μὲ ἀντίθετον σημεῖον. Ἡτοι ἔχομεν $a^3x - a^2y + a^3 - a^2x + 3a^2y^3 + a^4 - 2ay^2$.

Κατὰ ταῦτα

«διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ δοθεῖσης παραστάσεως δοθὲν πολυωνύμον, γράφομεν ἐπειτα αὐτῆς τοὺς δρους τοῦ ἀφαιρετέου, καθένα μὲ τὸ ἀντίθετον σημεῖόν του».

Οὕτω τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ πολυωνύμου

$$3a^2x - 9a^3x^2 - 6a^2x^2$$

$$\text{ἀπὸ τοῦ πολυωνύμου} \qquad \qquad \qquad 9a^2x + 18a^3x^2 - a^2x^2$$

$$\text{εἶναι } 9a^2x + 18a^3x^2 - a^2x^2 - 3a^2x + 9a^3x^2 + 6a^2x^2,$$

καὶ μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τῶν διμοίων δρων εὑρίσκομεν

$$6a^2x + 27a^3x^2 + 5a^2x^2.$$

§ 37. Περὶ χρήσεως παρενθέσεων καὶ ἀγκυλῶν.—

α') 'Εκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεται ὅτι

«ἐὰν πρὸ παρενθέσεως ἡ ἀγκύλης, ἐντὸς τῆς δποίας ὑπάρχουν δροι, ὑπάρχῃ τὸ σημεῖον + δυνάμεθα νὰ τὴν παραλείψωμεν, χωρὶς νὰ μεταβάλωμεν τὰ σημεῖα τῶν ἐντὸς αὐτῆς δρων' ἐὰν δὲ

υπάρχη τὸ σημεῖον —, ἀφοῦ προηγουμένως ἀλλάξωμεν τὸ σημεῖον καθενὸς τῶν ἐντὸς αὐτῆς δρων».

$$\text{Οὕτω } \tilde{\chi}\text{ομεν } a - (\beta - \gamma + \delta) = a - \beta + \gamma - \delta.$$

Διότι, τὸ σημεῖον τὸ πρὸ τῆς παρενθέσεως φανερώνει, νὰ ἀφαιρεθῇ τὸ $\beta - \gamma + \delta$ ἀπὸ τὸ a . Καὶ κατὰ τάνωτέρω, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ a τοὺς δρους τῆς παρενθέσεως, καθένα μὲ τὸ ἀντίθετον σημεῖόν του. Όμοιώς $\tilde{\chi}\text{ομεν}$

$$\begin{aligned} a - [-(\beta + \gamma) + (a - \beta) - \gamma + a] &= a + (\beta + \gamma) - (a - \beta) + \gamma - a \\ &= a + \beta + \gamma - a + \beta + \gamma - a = -a + 2\beta + 2\gamma. \end{aligned}$$

6') Τούναντίον, δυνάμεθα νὰ θέσωμεν δρους ἐντὸς παρενθέσεως ἢ ἀγκύλης, θέτοντες τὸ σημεῖον + μὲν πρὸ αὐτῆς, ἢν ἔκαστος δρος διατηρῇ τὸ σημεῖόν του ἐντὸς αὐτῆς, τὸ — δέ, ἢν οἱ δροι γράφωνται μὲ ηλλαγμένον τὸ σημεῖόν των ἐντὸς αὐτῆς. Οὕτω π. χ. $\tilde{\chi}\text{ομεν}$

$$a - \beta - \gamma = a + (-\beta - \gamma) \stackrel{?}{=} \mu \varepsilon a - (\beta + \gamma).$$

***Α σκήσεις καὶ προβλήματα**

Όμαδας πρώτη. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἑξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων· καὶ νὰ γίνουν αἱ δοκιμαὶ διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων.

- 1) $3x - (6x - 4y)$, δοκιμὴ διὰ $x = y = 3$.
- 2) $7\alpha - 8\beta - (19\alpha + 3\beta)$, $\gg \gg \alpha = \beta = 10$.
- 3) $3x + 6y - 9\omega + (14x - 7y + 6\omega)$, $\gg \gg x = 9, y = 3, \omega = 4$.
- 4) $\theta - (\mu - \nu)$, ἐὰν εἴνε $\theta = x + 9y - 6\omega$, $\mu = 4x - 7y + 2\omega$, $\nu = x + y + \omega$

Όμαδας δευτέρα. Δειξατε τὴν ἀληθειῶν τῶν

- 1) $3x + 9y + (6x - 7y) = 8x + 6y - (4y - x)$,
- 2) $3\alpha + 2\beta - (4\alpha - \beta) = 2\beta + 4\alpha + (\beta - 5\alpha)$.
- 3) $2x - 3y - 5\omega - (3x + 2y - \omega) = 2x + 5y + 6\omega - (3x + 10y + 10\omega)$.

Όμαδας τρίτη. Έκτελέσατε τὰ πράξεις κατωτέρω, ὅστε νὰ ἑξαλειφθοῦν αἱ παρενθέσεις καὶ αἱ ἀγκύλαι.

- 1) $(8\alpha - 3\beta) - [(9\alpha - \gamma) - (6\beta - 9\gamma)]$ δοκιμὴ διὰ $\alpha = \beta = \gamma = 2$
- 2) $(8\alpha - 9\gamma) - [(6\beta - 5\gamma) + 7\alpha] - 2\beta$ $\gg \gg \gg$
- 3) $19 - x - (8x - [8 - 9x - (7 - 9x)])$ $\gg \gg \gg x = -3$.

Όμαδας τετάρτη. Γράψατε καταλλήλως τὰς κατωτέρω παραστάσεις, ὅστε οἱ δροι των ἀπὸ τοῦ δευτέρου καὶ ἑστῆς νὰ εἴνε ἐν παρενθέσει $\tilde{\chi}\text{ομηση}$ σημείον + ἢ τὸ —.

- 1) $13x - 6x^2 + 19x^3 - 8\beta - 14\alpha + 5\gamma$
- 2) $x^3 + 7x^2 - 3x - 5$
- 3) $-5x^4 - (3x^3 - 8x^2) - 6x + 9.$

Όμαδας πέμπτην 1) Έλα τό άθροισμα δύο άριθμῶν, π. χ. α καὶ β, αὐξήθῃ κατὰ τὴν διαφοράν των, προκύπτει τὸ διπλάσιον τοῦ πρώτου ἀριθμοῦ. Διατί;

2) Έλα τό άθροισμα δύο άριθμῶν ἐλαττωθῆ κατὰ τὴν διαφοράν των προκύπτει τὸ διπλάσιον τοῦ δευτέρου ὑπόθεμοῦ. Διατί;

3) Ἡ διαφορὰ δύο άριθμῶν, π. χ. τῶν α καὶ β, δὲν μεταβάλλεται, ἂν τὸν μετώτερον καὶ ἀφαιρέσσον αὐξήσωμεν, ἢ ἐλαττώσωμεν, κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν. Διατί;

Όμαδας ἕκτην. 1) Ἐν παιδίον εἶνε α ἐτῶν, ὁ δὲ πατέρος του ἔχει τριπλασίαν ἡλικίαν τούτου. Πόσην ἡλικίαν θὰ ἔχουν (ἢ εἰχον) καὶ οἱ δύο μετὰ (ἢ πρό) μὲτη (ἐτῶν); $4\alpha + 2\mu$ ($4\alpha - 2\mu$).

2) Εἰς τὴν πρώτην τάξιν σγολείου τινὸς φοιτῶσιν α μαθηταί, εἰς τὴν δευτέραν β ὀλιγώτεροι, εἰς δὲ τὴν τρίτην 2β ὀλιγώτεροι τῶν ἐν τῇ πρώτῃ. Πόσους μαθητὰς ἔχουν ἐν ὅλῳ αἱ τρεῖς τάξεις; Πόσους ἔχουν περισσοτέρους αἱ δύο πρώται τάξεις τῆς τρίτης;

$$3 (\alpha - \beta) (\alpha + \beta).$$

3) Ἐκ δύο ἀνθρώπων Α καὶ Β ὁ πρῶτος ἔχει x δραχ., καὶ οἱ δύο ὄμοιοι γ δραχ. Ο Α διδει εἰς τὸν Β 3 γρ.: πόσας θὰ ἔγη ἔκαστος; $x - 3$, $x - y + 3$.

4) Ό Β ἔχει τριπλασίας δραχ. ἢ ο Α. Ό Γ διπλασίας τῶν τοῦ Β· ὁ δὲ Α ἔχει γ δραχ. Πόσας ἔχουν καὶ οἱ τρεῖς; (10 μ.).

§ 38. Πολλαπλασιασμὸς ἀκεραιῶν μονωνύμων.—

α') Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς) ὅτι

«τὸ γινόμενον δσωνδήποτε ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται καθ' οἰανδήποτε τάξιν καὶ ἀν γράψωμεν τοὺς παράγοντας».

Η ἴδιότης αὕτη ἴσχύει, καὶ ἀν οἱ παράγοντες εἶνε ἀλγεβρικοὶ ἀριθμοὶ (§ 4, α'). Οὕτω, ἀν διὰ τῶν α, β, γ παραστήσωμεν τοὺς δοθέντας παράγοντας, θὰ ἔχωμεν,

$$\alpha\beta\gamma = \beta\alpha\gamma = \gamma\alpha\beta = \gamma\beta\alpha = \alpha\gamma\beta, \dots$$

οἵοιδήποτε καὶ ἀν εἶνε οἱ ἀριθμοὶ α, β, γ.

β') Καλοῦμεν γινόμενον μονωνύμων τὸ μονώνυμον, τὸ δόποιον ἔχει παράγοντας τὰ δοθέντα μονώνυμα.

γ') Εστω, ὅτι θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενον τῶν ἀκεραιῶν μονωνύμων

$$5\alpha^2 \beta^2 \gamma, \quad 3\beta\gamma^2.$$

Κατὰ τὸν ἀνωτέρῳ δρισμὸν τὸ γινόμενον αὐτῶν εἶνε τὸ

$$(5\alpha^2 \beta^3 \gamma). (3\beta\gamma^2)$$

ἢ τὸ

$$5\alpha^2\beta^3\gamma. 3\beta\gamma^2.$$

Καὶ κατὰ τὴν ἀνωτέρῳ ίδιοτητα, ἢν ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν παγόντων, θὰ ἔχωμεν

$$5\alpha^2\beta^3\gamma. 3\beta\gamma^2 = 5. 3. \alpha^2. \beta^3. \beta. \gamma. \gamma^2 = 15\alpha^2\beta^4\gamma^3.$$

Όμοίως τὸ γινόμενον τῶν

$$-\frac{4}{3} \alpha^2\beta^4\gamma, -\frac{2}{5} \alpha^3\beta^2\gamma, -\frac{1}{6} \beta\gamma^2\delta$$

εἶνε

$$-\frac{4}{3} \alpha^2\beta^4\gamma. \frac{2}{5} \alpha^3\beta^2\gamma. \frac{1}{6} \beta\gamma^2\delta = \frac{-4}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{6} \alpha^2\alpha^3\beta^4\beta^2\beta\gamma\gamma^2\delta = -\frac{4}{45} \alpha^5\beta^7\gamma^4\delta.$$

Ἐκ τούτου συνάγομεν, ὅτι

«διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενον ἀκεραιῶν μονωνύμων, πολλαπλασιάζομεν τοὺς συντελεστάς των, καὶ δεξιὰ τοῦ γινομένου τούτων γράφομεν καθὲν γράμμα, τὸ δποῖον ὑπάρχει εἰς τὰ δοθέντα μονώνυμα, μὲ ἐκθέτην τὸ ἀθροισμα τῶν ἐκθετῶν, τοὺς δποίους τοῦτο ἔχει εἰς τὰ δοθέντα».

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Νὰ εύρεθοῦν τὰ γινόμενα

$$\alpha') x^7 (-x^3), y^6 y^4, \beta') (-x^4 x), \alpha^3, \alpha^5, \alpha^2, \gamma') (x^2)^2, (3\beta)^4$$

$$\delta') x^{v-2}, x^{v-2}, x, \varepsilon') x^{3v-1}, x, x^{2v-2} x^2,$$

$$\varsigma') 6zx, 5z^3x^2, (-9x^3)^3, \iota') (-xyw), x^2y^2w^2, \iota z') (-7xyw), (4x^2x^2)$$

$$\beta') \left(\frac{2}{4} x^2y \right) 2xy^2 \left(-\frac{4}{5} x y \right)^2.$$

§39. Πολλαπλασιασμὸς πολυωνύμου ἐπὶ ἀκέραιων μονώνυμον —

α') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενον

$$(\alpha + \beta - \gamma). \mu,$$

ὅπου τὸ μ πάροιστάνει ἀκέραιον καὶ θετικὸν ἀριθμόν.

Κατὰ τὸν δρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ θὰ ἔχωμεν

$$(\alpha + \beta - \gamma). \mu = \underbrace{(\alpha + \beta - \gamma)}_{1\eta} + \underbrace{(\alpha + \beta - \gamma)}_{2\alpha} + \dots + \underbrace{(\alpha + \beta - \gamma)}_{\mu\eta}$$

$$= \binom{1\eta \quad 2\alpha}{(\alpha + \alpha + \dots + \alpha)} + \binom{1\eta \quad 2\alpha}{(\beta + \beta + \dots + \beta)} - \binom{1\eta \quad 2\alpha}{(\gamma + \gamma + \dots + \gamma)}$$

καὶ τοῦτο ἵσοῦται μὲν $a.$ $\mu + \beta.$ $\mu - \gamma.$ $\mu.$

“Ητοι «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀθροίσμα ἐπὶ ἀριθμόν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν καθένα προσθετέον τοῦ ἀθροίσματος ἐπὶ τὸν ἀριθμόν, καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἔξαγόμενα».

6') Ό διατέρω κανὼν ἀληθεύει, καὶ ἂν εἴνε ἀρνητικὸς δ. μ. Ὡ διόδειξις γίνεται διμοίως, ἐὰν στηριχθῶμεν εἰς τὸν γενικὸν διισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ (§ 8, α').

Οὕτω π. γ. τὸ γινόμενον τοῦ $(a + \beta - \gamma).$ $\mu = (-a - \beta + \gamma).$ $\mu = -a\mu - \beta\mu + \gamma\mu.$ εἴνε ἵσον μὲν

$$-(a + \beta - \gamma).\mu = (-a - \beta + \gamma).\mu = -a\mu - \beta\mu + \gamma\mu.$$

γ') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εῦρωμεν τὸ γινόμενον

$$(a^2 - 3ab + \beta^2) \text{ ἐπὶ τὸ } 2a.$$

Θὰ ἔχωμεν

$$(a^2 - 3ab + \beta^2).2a = [a^2 + (-3ab) + \beta^2].2a$$

Καὶ κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἴδιότητα εὑρίσκομεν ὅτι ἵσοῦται μὲν

$$a^2.2a + (-3ab).2a + \beta^2.2a = 2a^3 - 6a^2\beta + 2a\beta^2.$$

Ομοίως ἔχομεν

$$(5a^2b - 3ab^2 + 7\beta^3).(-3ab) = -15a^3\beta^2 + 9a^2\beta^3 - 21a\beta^4.$$

“Ωστε «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν πολυώνυμον ἐπὶ ἀκέραιον μονώνυμον, παλλαπλασιάζομεν καθένα τῶν ὅρων τοῦ πολυωνύμου ἐπὶ τὸ μωνόνυμον καὶ προσθέτομεν τὰ ἔξαγόμενα».

δ') Εὰν ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀκέραιον μονώνυμον ἐπὶ πολυώνυμον, δυνάμεθα νὰ ἐναλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν παραγόντων (θεωροῦντες τὸν πολυώνυμον ὡς ἔνα ἀριθμόν). Οὕτω θὰ ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν πολυώνυμον ἐπὶ ἀκέραιον μονώνυμον. Η. γ. τὸ γινόμενον $a.(\beta - a + \gamma) = (\beta - a + \gamma).a,$ καὶ τοῦτο ἵσοῦται μὲν $a\beta - a^2 + a\gamma.$

Α συνήσεις καὶ προβλήματα

Οὐδὲς πρώτη. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα

$$\alpha') (x^3 + 9x^2 - 6x + 1).x^2. \quad \beta') 7x^2. (x^2 - 9\beta^2)$$

$$\gamma') 3zx. (x^2 - 4zx + z^2) \text{ δοκιμαῖ διὰ } x = -1, z = 2, \beta = -3.$$

$$\delta') 5x - 3. (x + 4). \quad \varepsilon') (3\beta - 5z). \beta. \quad \zeta') (4z + 7\beta) - (9\beta - 5z). \beta \text{ δοκιμαῖ διὰ } x = 0, z = -1, \beta = 2.$$

$$\xi') (3z^2 + 7\beta^2) \alpha\beta - (9z^2 - 8\beta^2) \alpha\beta, \text{ δοκιμὴ διὰ } z = -1, \beta = -2.$$

Ομάς δευτέρα. Λύσατε τὰ ἑῆσι προσθήματα.

1) "Εκ τινος τόπου ἀναχωροῦν συγχρόνως δύο ταχυδρόμοι πρός ἀντιθέτους διευθύνσεις. 'Ο πρῶτος δυσκόνει καθ' ἡμέραν $\alpha + \mu$ χιλιόμετρα, ὁ δὲ δεύτερος 2μ χμ. ὀλιγότερα τοῦ πρώτου. Πόσον θὰ ἀπέχουν μετὰ τὴν ἡμέρας;

(2ατ).

2) Τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων διψηφίου τινὸς ἀριθμοῦ εἶναι α . Τὸ ψηφίον τῶν μονάδων του εἶναι μ . Πόσον θὰ αὐξηθῇ ὁ ἀριθμός, ἐὰν ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν ψηφίων του;

(18μ—9α)

3) "Εκ τινος τόπου ἀναχωρεῖ ταχυδρόμος διανύνων 30χμ. ἡμερησίως· μ. ἡμέρας βραδύτερον ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τόπου ἄλλος, διανύνων γ γμ. ἡμερησίως καὶ διευθύνεται πρός τὸ α' . Πόσον θὰ ἀπέχουν μετὰ τὴν ἡμέρας ἀπό τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ πρώτου (η τοῦ δευτέρου); $(30\tau + \gamma(\mu - \tau))$, $(30(\tau + \mu) - \gamma\tau)$

§ 40. Πολλαπλασιασμὸς πολυωγύμων.—

α') "Εστω πρῶτον ὅτι θέλομεν νὰ εῦρωμεν τὸ γινόμενον

$$(\alpha + \beta). (\gamma + \delta).$$

'Εὰν τὸ $(\gamma + \delta)$ παραστήσωμεν διὰ τοῦ A, ἥτοι ἀν θέσωμεν

$$(\gamma + \delta) = A,$$

θὰ ἔχωμεν ὅτι

$$(\alpha + \beta). (\gamma + \delta) = (\alpha + \beta). A = \alpha A + \beta A = \alpha A + \beta A.$$

'Εὰν ἀντὶ τοῦ A θέσωμεν τὸν 7σον τοῦ $(\gamma + \delta)$, ἔχομεν

$$(\alpha + \beta). (\gamma + \delta) = (\gamma + \delta). \alpha + (\gamma + \delta) \beta = \alpha \gamma + \alpha \delta + \beta \gamma + \beta \delta.$$

'Ομοίως εὗροισκομεν ὅτι $(\alpha - \beta)(\gamma - \delta) = [\alpha + (-\beta)][\gamma + (-\delta)]$

$$\begin{aligned} &= \alpha \gamma + (-\beta \gamma) + (-\alpha \delta) + \beta \delta \\ &= \alpha \gamma + \beta \delta - \beta \gamma - \alpha \delta. \end{aligned}$$

'Εκ τούτων συνάγομεν ὅτι

«διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο πολυώνυμα, ἀρκεῖ, νὰ πολλαπλασιάσωμεν καθένα δρον τοῦ πολλαπλασιαστέον ἐπὶ πάντας τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἔξαγόμενα».

6') "Εστω πολυώνυμόν τι $8x + x^2 + 16$.

'Εὰν γράψωμεν αὐτό, ὡστε οἱ ἔκθέται τοῦ γράμματος x νὰ βαίνουν αὐξανόμενοι ἀπὸ δρον εἰς δρον, δηλαδὴ ὡς κατωτέρῳ

$$16 + 8x + x^2$$

λέγομεν, ὅτι τὸ πολυώνυμον εἶναι διατεταρμένον κατὰ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις τοῦ x.

Ομοίως ἔὰν γράψωμεν αὐτό, ὥστε οἱ ἐκθέται τοῦ x νὰ βαίνουν ἐλαττούμενοι, δηλαδὴ ὡς κατωτέρῳ

$$x^2 + 8x + 16,$$

λέγομεν, ὅτι τὸ πολυώνυμον εἶναι διατεταγμένον κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ x .

γ') Ἐν γένει, λέγομεν ὅτι πολυώνυμόν τι εἶναι διατεταγμένον κατὰ τὰς κατιούσας, ή ἀνιούσας, δυνάμεις ἐνὸς γράμματός του, ἐὰν οἱ ἐκθέται τοῦ γράμματος τούτου ἐλαττοῦνται, ή αὐξάνονται, ἀπὸ ὅρων εἰς ὅρων.

δ') Ἐάν ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο πολυώνυμα, συνήθως, διατάσσομεν αὐτὰ κατὰ τὰς κατιούσας, ἢ ἀνιούσας, δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γράμματος. Ακολούθως ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν (πρὸς εὐκολίαν ἐν τῇ ἀναγωγῇ τῶν ὁμοίων ὅρων), ώς φαίνεται εἰς τὰ κάτωθι παραδείγματα.

1ον). Ἐστω τὸ γινόμενον

$$(2x^2 - x + 3) \cdot (x - 4)$$

Ἐχομεν

$$2x^2 - x + 3$$

$$x - 4$$

$$(1) \quad \dots \quad 2x^3 - x^2 + 3x$$

$$(2) \quad \dots \quad -8x^2 + 4x - 12$$

$$(3) \quad \dots \quad 2x^3 - 9x^2 + 7x - 12.$$

Τὰ (1) καὶ (2) εὑρίσκομεν ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ x , καὶ ἐπὶ -4 , λέγονται δὲ μερικὰ γινόμενα. Τὸ (3) προκύπτει ἐκ τῆς προσθέσεως τῶν (1) καὶ (2) καὶ λέγεται τελικὸν γινόμενον.

2ον) Ἐστω τὸ γινόμενον

$$(4x^5 - 3x^4 + x^2 - 1) \cdot (x^3 - x + 2)$$

Ομοίως ἔχομεν

$$4x^5 - 3x^4 + x^2 - 1$$

$$x^3 - x + 2$$

$$\begin{array}{r} 4x^8 - 3x^7 \quad +x^5 \quad -x^3 \quad \text{(***)} \\ -4x^6 + 3x^5 \quad \quad -x^3 \quad +x \\ 8x^5 - 6x^4 \quad \quad \quad +2x^2 \quad \quad \quad -2 \end{array}$$

$$4x^8 - 3x^7 - 4x^6 + 12x^5 - 6x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x - 2.$$

3ον) Έπισης διὰ τὸ γινόμενον

$$(x^3 - 3ax^2 + a^3). (2ax - a^2)$$

ζήσουμεν

$$\begin{array}{r} x^3 - 3ax^2 + a^3 \\ 2ax - a^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2ax^4 - 6a^2 x^3 - 2a^4 x \\ - a^2 x^3 + 3a^3 x^2 - a^5 \\ \hline 2ax^4 - 7a^2 x^3 + 3a^3 x^2 - 2a^4 x - a^5. \end{array}$$

ε') Έκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι,

«ὅταν οἱ δύο παράγοντες εἰνε διατεταγμένοι κατὰ τὰς κατιούσας, ἢ ἀνιούσας, δυνάμεις ἐνδει γράμματος των, τὰ γινόμενα τῶν ἀντιστοίχων ἀκρων δρων των (πρώτων καὶ τελευταίων) δίδουν τοὺς ἀντιστοίχους ἀκρους δρους τοῦ γινομένου (πρώτον καὶ τελευταῖον), διατεταγμένου δμοίως ὡς πρός τὸ αὐτὸ γράμμα».

Α σηήσεις

Έκτελέσατε τὰς κάτωθι πράξεις καὶ τὴν δοκιμὴν διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων.

α') $(3x + 5y), (9x - 8y),$

$x = 2$

$y = 3$

β') $(4xy + 8\gamma\delta), (7xy - 6\gamma\delta),$

$\gamma = -3$

$\delta = -1$

γ) $(7\rho^2 - 6\lambda^2), (9\rho^2 - 3\lambda^2),$

$\rho = -2$

δ') $(6\rho^2 - 7\rho + 5), (3\rho + 6)$

$\lambda = -3$

ε') $(\mu^2 - 4\mu + 5\nu^2), (7\mu^2 + 3\mu\nu + 6\nu^2).$

$\mu = -3, \nu = 2.$

(***) Ο διδασκαλεῖται, ὅτι πρός εύκολίαν, ἐνν ὁ πολλαπλασιαστέος δὲν εἴτε πλήρες πολυωνυμούς τὸ $4x^5 - 3x^4 + x^2 - 1$, εἰς τὰ μερικὰ γινόμενα ἀφήνομεν ἀντιστοίχως κενὰς θέσεις ισχρούμονς πρός τοὺς ἐλλείποντας ὄρους.

- $\zeta')$ $(x+1) \cdot (x+2) \cdot (x+3)$ $x=-5.$
 $\zeta')$ $(3x+4) \cdot (5x-6) \cdot (7x+9)$ $x=-4.$
 $\eta')$ $(xy-3) \cdot (x^2y^2-4) \cdot (x^2y^2+9)$ $x=y=-6.$
 $\theta')$ $(x^2+x+1) \cdot (x-2)-(x^2-x+6) \cdot (x+3)$, $x=2.$
 $\iota')$ $(x^3+4x^2+6x-7) \cdot (x-3)-(x^3-6x^2-5x+9) \cdot (x-2)$.

§ 41. Αξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοί.—

α') Παραστάσεις τῆς μορφῆς

$$(a+\beta)^2, \quad (a+\beta) \cdot (a-\beta), \quad (a+\beta)^3, \quad (a-\beta)^3$$

παρουσιάζονται πολύ συχνά, καὶ διὰ τοῦτο εἶναι καλόν νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης τὰ ἔξαγόμενα, ἅτινα εὑρίσκομεν, ἐὰν εἰς ἑκάστην ἐξ αὐτῶν ἐφαρμόσωμεν τὸν κανόνα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Οὕτω ἔχομεν

$$(a+\beta)^2 = (a+\beta) \cdot (a+\beta) = a^2 + a\beta + a\beta + \beta^2 = a^2 + 2a\beta + \beta^2$$

Ἔτοι

δ') «Τὸ τετραγωνὸν τοῦ ἀθροίσματος δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται τῷ τετραγώνῳ τοῦ πρώτου ἀριθμοῦ, σὺν τῷ διπλασίῳ γινομένῳ τῶν ἀριθμῶν, σὺν τῷ τετραγώνῳ τοῦ δευτέρου ἀριθμοῦ».

Ομοίως εὑρίσκομεν

$$(a-\beta)^2 = (a-\beta) \cdot (a-\beta) = a^2 - a\beta - a\beta + \beta^2 = a^2 - 2a\beta + \beta^2.$$

Ἔτοι

γ') «Τὸ ἄθροισμα τῆς διαφορᾶς δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται τῷ τετραγώνῳ τοῦ πρώτου ἀριθμοῦ, πλὴν τῷ διπλασίῳ γινομένῳ τῶν ἀριθμῶν, σὺν τῷ τετραγώνῳ τοῦ δευτέρου».

Ἐπίσης εὑρίσκομεν $(a+\beta) \cdot (a-\beta) = a^2 + a\beta - a\beta - \beta^2 = a^2 - \beta^2$. Δηλαὶ ἡ

δ') «Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν ἐπὶ τὴν διαφοράν των δίδει γινόμενον τὴν διαφορὰν τοῦ τετραγωνού τοῦ πρώτου πλὴν τοῦ τετραγωνού τοῦ δευτέρου».

Ἐπίσης ἔχομεν $(a+\beta)^3 = (a+\beta)^2 \cdot (a+\beta) =$

$$= (a^2 + 2a\beta + \beta^2) \cdot (a+\beta) = a^3 + 3a^2\beta + 3a\beta^2 + \beta^3.$$

Ἔτοι

ε') «Οἱ οὐρβοὶ τοῦ ἀθροίσματος δύο ἀριθμῶν εἶναι ἵσοις τῷ οὐρβῷ τοῦ πρώτου, σὺν τῷ τριπλασίῳ τετραγώνῳ τοῦ πρώτου ἐπὶ

τὸν δεύτερον, σὺν τῷ τριπλασίῳ τοῦ πρώτου ἐπὶ τὸ τετράγωνον τοῦ δευτέρου, σὺν τῷ κύβῳ τοῦ δευτέρου».

'Εὰν εἰς τὴν τελευταίαν ισότητα γράψωμεν —β ἀντὶ τοῦ β προκύπτει

$$(\alpha - \beta)^3 = \alpha^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3.$$

*Ασκήσεις

1) Έκτελέσατε τὰς κάτωθι πράξεις καὶ τὴν δοκιμὴν των διὰ τὰς σημειουμένας τιμᾶς τῶν γραμμάτων.

$$\alpha') (4x+7y)(4x-7y). \quad \beta') (x^2+y^2)(x^2-y^2), \quad x=2, \quad y=-1$$

$$\gamma') (9x+6y)^2. \quad \delta') (9xy-xy^2)^2. \quad \epsilon') (4x+\beta)^3. \quad x=y=-1, \quad \alpha=4, \quad \beta=3.$$

2) Νὰ διατυπώσετε τὸν κανόνα διὰ τὸν τελευταῖον ἐκ τῶν ἀνωτέρω τύπων κατ' ἀναλογίαν τῶν ἀλλων.

3) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἑξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεις.

$$\alpha') (x+y+\omega)^2. \quad \beta') (\alpha x^2 + \beta y^2 - \gamma \omega^2)^2. \quad \text{Δοκιμὴ διὰ } \alpha, \beta, \gamma, x, y, \omega = 3$$

$$\gamma') (x+\beta+\gamma+\delta)^2. \quad \delta') (x+\beta-\gamma-\delta)^2. \quad \epsilon') (\gamma+\delta-\alpha-\beta)^2.$$

4) Εὕρετε ἐκ τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων κανόνα συμφώνως πρὸς τὸν ὅποιον εὐρίσκομεν τὸ τετράγωνον τοῦ ἀθροίσματος περισσοτέρων τῶν, δύο προσθετέων.

5) Έπαληθεύσατε ὅτι εἶναι

$$\alpha') (x^2+\beta^2)(x^2+y^2) - (\alpha x+\beta y)^2 = (xy-\beta x)^2.$$

$$\beta') (x^2 + \beta^2 + \gamma^2)(x^2 + y^2 + \omega^2) - (\alpha x + \beta y + \gamma \omega)^2 = (xy - \beta x)^2 + (\alpha \omega - \gamma x)^2 + (\beta \omega - \gamma y)^2 \quad [\text{Ἄντα: λέγονται τούτοτες τοῦ Lagrange}].$$

6) Συμπληρώσατε τὸ $\alpha^2 + \beta^2$, ώστε νὰ εἶναι ἵσον μὲ τὸ $(\alpha + \beta)^2$.

7) Όμοιώς τὸ $\alpha^2 + \beta^2$ καὶ τὸ $\alpha^4 + \beta^4$ ώστε νὰ γίνῃ τὸ μὲν ἵσον μὲ $(\alpha - \beta)^2$, τὸ δὲ μὲ τὸ $(\alpha^2 + \beta^2)^2$, η μὲ τὸ $(\alpha^2 - \beta^2)^2$.

§ 42. Διαέρεσις ἀκεραίων μονωνύμων.—

α') Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς 'Αριθμητικῆς) ὅτι

«Διὰ νὰ διαιρέσωμεν γινόμενον διά τινος τῶν παραγόντων του, ἀρκεῖ νὰ ἑξαλείψωμεν τὸν παράγοντα τοῦτον».

Οὗτον ἔχομεν ὅτι

$$(\alpha\beta\gamma\delta) : \beta = \alpha\gamma\delta.$$

Διότι εἴναι

$$(\alpha\gamma\delta). \quad \beta = \alpha\beta\gamma\delta.$$

Η ἰδιότης αὗτη ἀληθεύει καὶ ἀποδεικνύεται ὅμοιώς, καὶ ἀν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἴναι ἀλγεβρικοί.

β') Έπισης γνωρίζομεν ὅτι

«Διὰ νὰ διαιρέσωμεν γινόμενον διά τινος ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ

διεραίσωμεν ἔνα τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου διὰ τοῦ ἀριθμοῦ,
τὸ δὲ οὕτω προκύπτον πηλίκον νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τοὺς
ἄλλους παράγοντας».

Διότι, ἔστω ἡ διαίρεσις $(\alpha \beta) : \gamma$.

Λέγω, ὅτι $(\alpha \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) \cdot \beta$.

Πράγματι τὸ $(\alpha \beta) : \gamma$

σημαίνει, νὰ εὔρωμεν τὸν ἀριθμόν, δ ὁποῖος πολλαπλασιάζόμενος ἐπὶ
γ, δίδει γινόμενον τὸν αβ. Ἀλλὰ τὴν ἴδιότητα ταύτην ἔχει δ ἀριθμὸς
 $(\alpha : \gamma) \cdot \beta$. Ἐπειδὴ $(\alpha : \gamma) \cdot \beta \cdot \gamma = (\alpha : \gamma) \cdot \gamma \cdot \beta = \alpha \beta$.

Ἐπομένως εἶνε $(\alpha \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) \cdot \beta$.

Ἡ ἴδιότης αὗτη ἀποδεικνύεται δυοῖς, καὶ ἀν δοθέντες ἀριθμοὶ εἶνε ἀλγεβρικοί.

γ') Ἐκ τοῦ κανόνος συμφώνως πρὸς τὸν ὁποῖον εὔρισκομεν τὸ
πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτας ἀκεραίους
(§ 16, 5') συνάγομεν ὅτι

«ἴνα δύναμίς τις ἀριθμοῦ εἶνε διαιρετὴ διὰ δυνάμεως τοῦ
αὐτοῦ ἀριθμοῦ, πρέπει δ ἐκθέτης τοῦ διαιρετέου νὰ εἶνε ἵσος, η
μεγαλύτερος τοῦ ἐκθέτου τοῦ διαιρέτου».

δ') Ἐστω, ὅτι ζητοῦμεν τὸ πηλίκον τοῦ μονωνύμου

$$24 \alpha^7 : 8 \alpha^5.$$

Ἡτοι, ζητοῦμεν νὰ εὔρωμεν ἐν μονώνυμον, τὸ ὁποῖον πολλαπλα-
σιάζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην, νὰ δίδῃ γινόμενον τὸν διαιρετέον.

Ἐὰν παραστήσωμεν τὸ πηλίκον διὰ κλάσματος, ἔχομεν ὅτι

$$24 \alpha^7 : 8 \alpha^5 = \frac{24 \alpha^7}{8 \alpha^5} = \frac{24}{8} \cdot \frac{\alpha \alpha \alpha \alpha \alpha \alpha \alpha}{\alpha \alpha \alpha \alpha \alpha \alpha} = 3 \alpha^2.$$

Ομοίως εὔρισκομεν, ὅτι

$$20 \alpha^5 \beta^6 : (-4 \alpha \beta^5) = \frac{20 \alpha^5 \beta^6}{-4 \alpha \beta^5} = -5 \alpha^4 \beta.$$

$$-30 \alpha^2 \beta^3 \gamma^4 : (-20 \alpha \beta \gamma^3) = \frac{-30 \alpha^2 \beta^3 \gamma^4}{-20 \alpha \beta \gamma^3} = \frac{3}{2} \alpha \beta^2 \gamma.$$

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι

«ἴνα γινόμενόν τι εἶνε διαιρετὸν δι' ἄλλου, πρέπει νὰ περιέχῃ
τοὺς παράγοντας τοῦ ἄλλου, καὶ καθένα μὲ ἐκθέτην ἵσον η μεγα-
λύτερον».

ε') Προσέτι ὅτι

«διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο ἀκεραίων μονωνύμων, διαιροῦμεν τὸν συντελεστὴν τοῦ διαιρετέου διὰ τοῦ συντελεστοῦ τοῦ διαιρέτου καὶ δεξιὰ τοῦ πηλίκου τούτου γράφομεν τὰ γράμματα τοῦ διαιρετέου καθέν μὲ ἐκθέτην ἵσον τῇ διαφορᾷ τῶν ἐκθετῶν του ἐν τῷ διαιρετέῳ καὶ διαιρέτῃ».

(Ἔποτίθεται, ὅτι τὸ μονώνυμον τοῦ διαιρετέου διαιρεῖται διὰ τοῦ μονωνύμου τοῦ διαιρέτου).

§ 43. Διερεσίς πολυωνύμου διὰ ἀκεραίου μονωνύμου.—

α') Γνωρίζομεν ὅτι

«διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἄθροισμα δι' ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ, νὰ διαιρέσωμεν καθένα τῶν προσθετέων διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἔξαγόμενα».

Ἡ ἴδιότης αὗτη ἴσχυει καὶ ὅταν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἶνε ἀλγεβρικοί.

Πράγματι ἔστω ὅτι ἔχομεν τὴν διαιρεσιν $(a + \beta - \gamma) : \mu$. Λέγω, ὅτι εἶνε

$$(a + \beta - \gamma) : \mu = (a : \mu) + (\beta : \mu) - (\gamma : \mu).$$

Διότι τὸ $(a + \beta - \gamma) : \mu$ σημαίνει, νὰ εῦρωμεν ἀριθμόν, ὃστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ μ , δίδει τὸ $a + \beta - \gamma$. Ἀλλὰ τὸ

$$(a : \mu) + (\beta : \mu) - (\gamma : \mu)$$

πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ μ δίδει ἔξαγόμενον τὸ $a + \beta - \gamma$.

$$\text{Άρα } (a + \beta - \gamma) : \mu = a : \mu + \beta : \mu - \gamma : \mu.$$

б') Ἐκ τῆς ἀνωτέρῳ ἴδιότητος, ἐπειδὴ πᾶν πολυώνυμον εἶνε ἄθροισμα τῶν ὅρων του, ἔπειται ὅτι,

«διὰ νὰ διαιρέσωμεν πολυώνυμόν τι δι' ἀκεραίου μονωνύμου, ἀρκεῖ, νὰ διαιρέσωμεν καθένα ὅρον του διὰ τοῦ μονωνύμου, καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἔξαγόμενα».

Κάτα τῶν τοῦ ἔχομεν

$$(7\alpha^2\beta^3 + 6\alpha^3\beta^2 - 15\alpha^3\beta^3) : \alpha\beta = 7\alpha\beta^2 + 6\alpha^2\beta - 15\alpha^2\beta^2.$$

$$(42\alpha x - 48\alpha y + 18\alpha w) : (-6\alpha) = -7x + 8y - 3w.$$

$$(-80\alpha^5 - 24\alpha^{10}) : (8\alpha^3) = -10\alpha^2 - 3\alpha^7.$$

**Α σκήσεις*

1) Νάρ εύρεθοῦν τὰ πηλίκα τῶν

$$\alpha') (14x^3y^2 - 28x^4y^3) : 2x^2y^2 \quad \text{δοκιμὴ} \quad \delta i\ddot{\alpha} \quad x=2, y=-2,$$

$$\beta') 60x^5y^5 : (4x^3y \cdot 4x^2y^3). \quad \gg \quad x=-3, y=-2,$$

$$\gamma') (x+y)(x+\beta) : (x+y). \quad \gg \quad x=-4, \alpha=\beta=1.$$

$$\delta') (16z^2x^4 : \alpha x) : 9\alpha z^2. \quad \gg \quad \alpha=2, x=-3.$$

2) Ὁμοίως τῶν

$$\alpha') (8z^4\beta^2 - 16z^3\beta^3 + 24z^2\beta^4 - 12z^2\beta^2) : (-4z^2\beta^2)$$

$$\beta' (z^5 + 3z^3 + 3z^2 + z) : \frac{2}{3}\alpha \quad \text{δοκιμὴ} \quad \delta i\ddot{\alpha} \quad \alpha=2$$

$$\gamma') (x^{m+2}y^n + 2x^{m+1}y^{n+1} + x^m y^{n+2}) : x^m y^n.$$

$$\text{δοκιμὴ} \quad \delta i\ddot{\alpha} \quad x=-4, y=1, m=n=-1.$$

§ 44. Διεύρεσις πολυωνύμων διὰ πολυωνύμων.—

α') "Εστω, ὅτι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸ πολυώνυμον

$$a^3 + 3a^2 + 3a + 1 \text{ διὰ τοῦ } a + 1.$$

Παρατηροῦμεν, ὅτι ἐπειδὴ τὰ πολυώνυμα εἶνε διατεταγμένα κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ a , ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ πηλίκου (μὲ τὸν μεγαλύτερον ἐκθέτην τοῦ a) τὸν ὅποιον ζητοῦμεν, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν πρῶτον ὅρον a τοῦ διαιρέτου, πρέπει νὰ δίδῃ τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ διαιρέτου a^3 (**§ 40, ε'**). Ἐπομένως ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ πηλίκου θὰ εἴνε

$$a^3 : a = a^2.$$

"Αλλὰ τὸ a^2 δὲν δύναται νὰ εἴνε διλόκληρον τὸ πηλίκον. Διότι (εἰὰν μάμοιμεν τὴν δοκιμὴν εὑρίσκομεν)

$$a^2 \cdot (a + 1) = a^3 + a^2.$$

Τοῦτο ἀφαιρούμενον ἀπὸ τὸν διαιρετέον δίδει

$$(a^3 + 3a^2 + 3a + 1) - (a^3 + a^2) = 2a^2 + 3a + 1.$$

Πρέπει λοιπὸν εἰς τὸν εὐρεθέντα πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου νὰ προστεθῇ παράστασίς τις ἀκόμη, ἵτις πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ $(a + 1)$ νὰ δίδῃ

$$2a^2 + 3a + 1.$$

"Ητοι πρέπει νὰ διαιρέσωμεν ἀκόμη τὸ

$$2a^2 + 3a + 1 \text{ διὰ τοῦ } (a + 1).$$

"Εχομεν πάλιν νὰ διαιρέσωμεν δύο πολυώνυμα. "Αλλ' ἡ

διαιρεσις αυτη είνε ἀπλουστέρα τῆς δοθείσης, ἐπειδὴ ὁ διαιρετέος ταύτης είνε ἀπλούστερος. Ἐπαναλαμβάνομεν τὴν αὐτὴν πορείαν καὶ διὰ τὴν νέαν ταύτην διαιρεσιν καὶ εὑρίσκομεν, ὅτι ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ πηλίκου αὐτῆς είνε

$$2\alpha^2 : \alpha = 2\alpha.$$

Ἐὰν τὸ γινόμενον τοῦ 2α ἐπὶ τὸν διαιρέτην $(\alpha + 1)$ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν διαιρετέον

$$2\alpha^2 + 3\alpha + 1,$$

εὑρίσκομεν ὑπόλοιπον $\alpha + 1$. Παρατηροῦμεν ὅτι δὲν εὑρέθη ὀλόκληρον τὸ πηλίκον, ἀλλ' ὅτι πρέπει νὰ διαιρέσωμεν ἀκόμη τὸ $(\alpha + 1)$ διὰ τοῦ $\alpha + 1$.

Ἐπαναλαμβάνομεν πάλιν τὴν αὐτὴν πορείαν καὶ εὑρίσκομεν, ὅτι τὸ πηλίκον τῆς νέας ταύτης διαιρέσεως είνε 1, τὸ δὲ ὑπόλοιπον 0.
“Ωστε τὸ πηλίκον τῆς δοθείσης διαιρέσεως είνε

$$\alpha^2 + 2\alpha + 1,$$

τὸ δὲ ὑπόλοιπον 0.

6') Συνήθως ἔκτελοῦμεν τὴν διαιρεσιν ὡς κατωτέρω.

Γράφομεν τὸν διαιρετέον δεξιὰ αὐτοῦ τὸν διαιρέτην κάτωθεν τούτου τὸ πηλίκον, καὶ ὑπὸ τὸν διαιρετέον τὰ γινόμενα ἔκαστου δροῦ τοῦ πηλίκου ἐπὶ τὸν διαιρέτην μὲν ἀντίθετον σημεῖον, ἵνα γίνεται εὐκόλως ἡ ἀφαιρεσις. Εἰς τὴν αὐτὴν στήλην γράφομεν καὶ τὰ ἔκαστοτε ὑπόλοιπα τῶν ἀφαιρέσεων.

$(1) \frac{\alpha^3 + 3\alpha^2 + 3\alpha + 1}{-\alpha^3 - \alpha^2}$ <hr/> $(2) \frac{\dots \dots 2\alpha^2 + 3\alpha + 1}{-2\alpha^2 - 2\alpha}$ <hr/> $(3) \frac{\dots \dots \dots \alpha + 1}{-\alpha - 1}$ <hr/> $(4) \frac{\dots \dots \dots 0}{}$	$\frac{\alpha + 1}{\alpha^2 + 2\alpha + 1}$
--	---

Αἱ παραστάσεις (1), (2), (3) είνε ὑπόλοιπα τῶν μερικῶν διαιρέσεων, τὸ δὲ τελευταῖον καὶ τῆς ὅλης διαιρέσεως.

γ') Ἐν γένει, ἀποδεικνύεται ὅτι

«εις τὴν διαιρεσιν πολυωνύμου, διατεταγμένου κατὰ τὰς κατιούσας (ἀνιούσας) δυνάμεις ἐνδεικόμενης, διὸ ἀλλοι, δύοις διαιρεταγμένου, διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου (διαιρεταγμένου δυοῖς), ἀρκεῖ, νὰ διαιρέσωμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ διαιρετέου, διὰ τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ διαιρέτου».

*) Διότι, ἔστω $\Delta + \Delta' + \Delta'' + \dots$ τὸ ἄθροισμα τῶν ὅρων τοῦ διαιρετέου, καὶ $\delta + \delta' + \delta'' + \dots$ τοῦ διαιρέτου, διαιρεταγμένων κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γράμματος των. Παριστάνομεν διὰ τοῦ $\Pi + \Pi' + \Pi'' + \dots$ τὸ ἄθροισμα τῶν ὅρων τοῦ πηλίκου, διαιρεταγμένου δυοῖς, ὡς πρὸς τὸ αὐτὸ γράμμα. Κατὰ τὸν δρισμὸν τῆς διαιρέσεως ἔχομεν ὅτι

$$\Delta + \Delta' + \Delta'' + \dots = (\delta + \delta' + \delta'' + \dots) (\Pi + \Pi' + \Pi'' + \dots)$$

Αλλὰ τὸ γινόμενον δ. Π , ἐκ τοῦ δευτέρου μέλους τῆς ἴσοτητος τούτης παριστάνει τὸν ὅρον, ὁ ὅποιος ἔχει τὸν μεγαλύτερον ἔκθετην τοῦ γράμματος ὡς πρὸς τὸ δρισμὸν ὑπετέθησαν διαιρεταγμένα τὰ πολυώνυμα (40, ε'). Ἐπομένως θὰ ἴσοιται μὲ τὸν πρῶτον ὅρον Δ τοῦ πρώτου μέλους. Ἡτοι ἔχομεν ὅτι

$$\delta. \Pi = \Delta,$$

Ἐξ' οὐ συνάγομεν, ὅτι τὸ Π εἶνε πηλίκον τοῦ Δ διά τοῦ δ.

δ') Ἐπίσης, ἀποδεικνύεται, γενικῶς, ὅτι

«μετὰ τὴν εὗρεσιν τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ πηλίκου τῆς διαιρέσεως, ἀρκεῖ, νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν εὑρεθέντα ὅρον ἐπὶ τὸν διαιρέτην, τὸ γινόμενον νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν διαιρετέον, καὶ τὴν οὕτω προκύπτουσαν διαφορὰν νὰ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ διαιρέτου, ἵνα εὑρωμεν τοὺς λοιποὺς ὅρους τοῦ πηλίκου».

*) Διότι, ἂν παραστήσωμεν διὰ τοῦ Π τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου, διὰ δὲ τοῦ P τὸ ἄθροισμα τῶν λοιπῶν ὅρων του, διὰ Δ τὸν διαιρετέον καὶ διὰ Δ' τὸν διαιρέτην, θὰ ἔχωμεν

$$\Delta = \Delta' (\Pi + P) = \Delta'. \Pi + \Delta'. P$$

ἢ

$$\Delta - \Delta'. \Pi = \Delta'. P,$$

Ἐξ' οὐ ἔπειται ὅτι

$$P = (\Delta - \Delta'. \Pi) : \Delta'.$$

ε') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸ πολυώνυμον

$$x^4 - 2x^3 - 7x^2 - 19x - 8 \quad \text{διὰ τοῦ} \quad x^2 - 4x - 2.$$

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἔχομεν :

$$\begin{array}{r}
 x^4 - 2x^3 - 7x^2 - 19x - 8 \\
 - x^4 + 4x^3 + 2x^2 \\
 \hline
 2x^3 - 5x^2 - 19x - 8 \\
 - 2x^3 + 8x^2 + 4x \\
 \hline
 3x^2 - 15x - 8 \\
 - 3x^2 + 12x + 6 \\
 \hline
 - 3x - 2
 \end{array} \left| \begin{array}{l} \frac{x^2 - 4x - 2}{x^2 + 2x + 3} \\ \hline \end{array} \right.$$

Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει παράστασίς τις, ἥτις πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ $x^2 - 4x - 2$ νὰ δίδῃ τὸ $-3x - 2$, πρέπει νὰ διακόψωμεν τὴν διαιρέσιν. Ἡτοι,

«ἔὰν τὰ δοθέντα πολυώνυμα εἶνε διαιτεταγμένα κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γράμματος, ἔξακολουθοῦμεν τὴν διαιρέσιν μέχρις δτον δ βαθμὸς τοῦ τελευταίου ὑπολοίπου εἶνε μικρότερος τοῦ βαθμοῦ τοῦ διαιρέτου (ἢ μηδέν)».

Σ') Εάν τὸ ὑπόλοιπον διαιρέσεως τινος δὲν εἶνε μηδέν, λέγομεν ὅτι ἡ διαιρέσις εἶνε ἀτελὴς καὶ τότε ἔχομεν ὅτι

«δ διαιρετέος ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον σὺν τῷ ὑπολοίπῳ»,

Ἐνῶ εἰς τὴν τελείαν διαιρέσιν ἔχομεν ὅτι

δ διαιρετέος ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον».

Ἐκ τῆς σχέσεως ταύτης ἔχομεν τὴν δοκιμὴν τῆς διαιρέσεως δύο πολυωνύμων, δημοίαν πρὸς τὴν τῆς διαιρέσεως δύο ἀκεραίων ἴσιμων.

Α σκήσεις καὶ προβλήματα

Ομάς πρώτη. Νὰ γίνουν αἱ ἑξῆς διαιρέσεις μετὰ τῶν δοκιμῶν των.

1) $(5\alpha\gamma + 3\beta\gamma - 5\alpha\delta - 3\beta\delta) : (5\alpha + 3\beta)$

2) $(10x^3 + 21x^2 + 5x - 6) : (3 + 2x)$

3) $(125\mu^3 + x^3) : (x^2 - 5\mu x + 25\mu^2)$

4) $(x^3 + z^3) : (x - z)$,

5) $(27x^3 - 8y^3) : (3x - 2y)$.

6) $\left(x^4 - \frac{5}{4}x^3 + \frac{11}{8}x^2 - \frac{1}{4}x \right) : \left(x^2 - \frac{1}{2}x \right)$

7) $(z^8x^4 - 81\beta^{12}) : (z^6x^3 - 3z^4\beta^3x^2 + 9z^2\beta^6x - 27\beta^9)$

8) $(32z^5 + \beta^5) : (2z + \beta)$. 9) $(x^3 + z^3) : (x + z)$.

Ουδας δεντρέρα. 1) "Εμπορος ἀγοράζει α ὄκαδας ἐμπορεύματός τινος πρὸς μ
δραχμὰς ἐκάστην ὄκαν, β ὄκ. πρὸς ν δρχ. ἐκάστην, καὶ γ ὄκ. πρὸς ρ δρχ. ἐκάστην.

Πόσον τῷ κοστίζει ἐκάστη ὄκα κατὰ μέσον ὅρον;

$$\frac{(\alpha\mu + \beta\nu + \gamma\rho)}{(\alpha + \beta + \gamma)}$$

Πόσον ἀγοράζει κατὰ μέσον ὅρον μὲ 1 δραχμήν,

$$\frac{\alpha + \beta + \gamma}{(\alpha\mu + \beta\nu + \gamma\rho)}$$

2) "Εμπορός τις ἀναμειγνύει α ὄκ. οἶνου μὲ β ὄκ. ἄλλης ποιότητος καὶ μὲ γ ὄκ.
δραχατος. Ἡ ὄκα τοῦ πρώτου εἴδους τιμᾶται μ δρχ. τοῦ δὲ δευτέρου ν δρχ. Πόσον κο-
στίζει ἡ ὄκα τοῦ μείγματος;

$$\frac{(\alpha\mu + \beta\nu)}{(\alpha + \beta + \gamma)}$$

Πόσας ὄκαδας μείγματος ἀγοράζει κατὰ μέσον ὅρον μὲ 1 δραχμήν :

$$\frac{(\alpha + \beta + \gamma)}{(\alpha\mu + \beta\nu)}$$

3) Αμαξοστοιχία τις τρέχει α ὥρας μὲ ταχύτητα τ γιλιομέτρων καθ' ὥραν. "Επειτα
τρέχει β ὥρας μὲ ταχύτητα τ' γιλ. Πόση εἶναι ἡ μέση ταχύτης αὐτῆς καθ' ὥραν; Πόσας
ὥρας γρειάζεται κατὰ μέσον ὅρον, ἵνα διατρέξῃ 1 γιλιομέτρον;

$$\frac{(\alpha\tau + \beta\tau')}{(\alpha + \beta)}, \quad \frac{(\alpha + \beta)}{(\alpha\tau + \beta\tau')}$$

§ 43. Ηερὶ τοῦ ὑπόλοιπον διαιρέσεως πολυωνύμου, περιέχοντος τὸν x, διὰ (x—a).—

α') «Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως πολυωνύ-
μου τινός, περιέχοντος τὸ x, διὰ (x—a), ἀρκεῖ, ν' ἀντικαταστή-
σωμεν εἰς τὸν διαιρετέον ἀντὶ τοῦ x τὸν a».

"Εστω π. γ. ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως

$$(x^3 - 3x^2 + 3x + 2) : (x - 1).$$

'Εὰν διὰ τοῦ q παραστήσωμεν τὸ πηλίκον καὶ διὰ τοῦ u τὸ ὑπό-
λοιπον, θὰ ἔχωμεν (§ 44, ε').

$$(x^3 - 3x^2 + 3x + 2) = q. (x - 1) + v, \quad (1)$$

Τὸ ὑπόλοιπον u δὲν περιέχει τὸ x εἰς τὰς τοιαύτας διαιρέσεις.
Διότι, διαιρετής εἶναι πρώτου βαθμοῦ ὡς πρὸς x (§ 44, ε').

·Η σχέσις (1) λισχύει διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x, ἢντα καὶ διὰ x=1.
Θέτοντες ἐν αὐτῇ x=1, εὑρίσκομεν

$$1^3 - 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 2 = v,$$

ἵτοι

$$v = 3.$$

Τὸ ἔξαγόμενον τοῦτο δυνάμεθα νὰ ἐπαληθεύσωμεν, ἐὰν ἐκτελέ-
σωμεν τὴν διαιρεσιν.

ε*) 'Εν γένει, ἔστω ὅτι Π (x) παριστάνει τὸν διαιρετέον, ὁ

ὅποιος ὑποτίθεται ὅτι εἶνε πολυώνυμον, περιέχον τὸν x^* ὅτι τὸ ϱ (x) παριστάνει τὸ πηλίκον, καὶ τὸ v τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως διὰ τοῦ ($x - a$). Λέγω ὅτι v εἶνε ἵσον μὲν Π (a). Δηλαδὴ μὲ τὸ ἔξαγόμενον, τὸ προκῦπτον, ἐὰν εἰς τὸ πολυώνυμον τοῦ διαιρετέου γράψωμεν ἀντὶ τοῦ x τὸ a

Πράγματι ἔχομεν ὅτι ($\S\ 44$, 5')

$$\Pi(x) = \varrho(x) \cdot (x - a) + v.$$

Ἐὰν θέσωμεν ὅπου x τὸ a , λαμβάνομεν

$$\Pi(a) = \varrho(a) \cdot (a - a) + v$$

ἢ

$$\Pi(a) = \varrho(a) \cdot 0 + v = v$$

γ') "Εστω ἡ διαιρέσις $(x^6 - a^6) : (x + a)$.

Τὸ ὑπόλοιπον εὑρίσκεται, ἐὰν ἐν τῷ διαιρετέῳ θέσωμεν ἀντὶ τοῦ x τὸ $(-a)$. Διότι τὸ $x + a = x - (-a)$. "Ωστε, ἀντὶ τῆς δοθείσης διαιρέσεως ἔχομεν τὴν $(x^6 - a^6) : (x - (-a))$.

Ἐὰν κάμωμεν τὴν ἀντικατάστασιν $x = (-a)$ ἐν τῷ διαιρετέῳ, εὑρίσκομεν ὅτι τὸ ὑπόλοιπον εἶνε $(-a)^6 - a^6 = a^6 - a^6 = 0$.

'Ἐκ τούτου ἐπεται ὅτι,

"διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως πολυωνύμου, περιέχοντος τὸ x , διὰ $x + a$, ἀρκεῖ, νὰ θέσωμεν ὅπου x τὸ $-a$ εἰς τὸ πολυώνυμον".

Κατὰ τάνωτέρῳ τὸ $x^5 - a^5$ εἶνε διαιρετὸν διὰ τοῦ $x - a$. Διότι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως εἶνε $v = a^5 - a^5 = 0$.

Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $(x^4 + a^4) : (x - a)$
εἶνε $a^4 + a^4 = 2a^4$.

Τὸ $x^3 + a^3$ διαιρεῖται διὰ $x + a$.

Διότι

$$(-a)^3 + (a)^3 = -a^3 + a^3 = 0.$$

§ 46. Εὔρεσις πηλέκων τεινῶν ἀπὸ μνήμης.—

"Εστω ἡ διαιρέσις $(x^6 - a^6) : (x + a)$.

Εἶνε εὐκολὸν νὰ εὕρωμεν, πῶς σχηματίζεται τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης. 'Ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρέσιν, βλέπομεν ὅτι οἱ τρεῖς πρῶτοι ὄροι τοῦ πηλίκου εἶνε

$$x^5 - ax^4 + a^2x^3$$

Διαιρούμεν, ότι οἱ ἐκθέται τοῦ x ἐλαττοῦνται ἀπὸ ὅρου εἰς ὅρου κατὰ μονάδα, ἐνῶ οἱ τοῦ a αὐξάνουν, πρὸς δέ, ὅτι τὰ σημεῖα τῶν ὅρων εἶνε ἐναλλάξ θετικά καὶ ἀρνητικά. Ἐπομένως τὸ πηλίκον εἶνε

$$x^5 - a x^4 + a^2 x^3 - a^3 x^2 + a^4 x - a^5,$$

καθὼς βεβαιούμεθα, ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρεσιν.

$$\text{Όμοίως εὑρίσκομεν } \text{ὅτι } (x^4 - a^4) : (x - a) = x^3 + x^2 a + x a^2 + a^3.$$

*Α συγκεισ

1) Νὰ εύρεθοῦν τὰ ὑπόλοιπα τῶν κάτωθι διαιρέσεων χωρὶς νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ πρᾶξις.

$$\alpha') (2x^2 + x - 19) : (x - 2). \beta') (x^2 + ax - 3a^2) : (x - a). \gamma') (x^2 + 6x + 7) : (x + 2).$$

2) Εὕρετε ἀπὸ μνήμης τὰ πηλίκα καὶ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων,

$$\alpha') (x^6 + y^6) : (x + y). \beta') (x^6 - y^6) : (x - y). \gamma') (x^3 + a^3) : (x + a).$$

$$\delta') (x^5 + a^5) : (x + a). \epsilon') (x^7 + 1) : (x + 1). \zeta') (x^3 + a^3) : (x - a).$$

$$\zeta') (x^5 + y^5) : (x - y). \eta') (x^8 + 9x + 6) : (x + 5). \theta') (x^8 + 6x^2 - 7x + 1) : (x + 3).$$

3) Εὕρετε τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως

$$(2x^4 + 17x^3 - 68x - 32) : \left(x - \frac{1}{2}\right)$$

χωρὶς νὰ ἐκτελέσετε τὴν πρᾶξιν.

4) Εὕρετε τίνων διαιρέσεων εἶνε τέλεια πηλίκα τὰ κάτωθι

$$\alpha') x^2 + x + 1. \beta') x^2 - x + 1. \gamma') x^3 + x^2 + x + 1. \delta') x^3 - x^2 + x - 1.$$

$$\epsilon') a^3 + a^2 \beta + a \beta^2 + \beta^3. \zeta') x^4 - a x^3 + a^2 x^2 - a^3 x + a^4.$$

Περὶ τοῦ μεγίστου κοινοῦ διαιρέτου καὶ τοῦ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου ἀλγεβρικῶν παραστάσεων.

§ 47. Ανάλυσις ἀλγεβρικῆς παραστάσεως εἰς γενόμενον παραγόντων.—

α') Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς 'Αριθμητικῆς), ὅτι

«πᾶς σύνθετος ἀριθμὸς ἀναλύεται εἰς γνόμενον πρώτων παραγόντων».

β') "Εστω μονωνυμόν τι ἀκέραιον, π , χ. τὸ $24 a^2 \beta^3 \gamma$.

"Ἐὰν τὸν ἀριθμὸν 24 ἀναλύσωμεν εἰς τοὺς πρώτους του παράγοντας, θὰ εῦρωμεν ὅτι $24 = 2^3 \cdot 3$. "Αρα $24 a^2 \beta^3 \gamma = 2^3 \cdot 3 a^2 \beta^3 \gamma$. Παρατηροῦμεν, ὅτι οἱ παράγοντες τοῦ ἀνωτέρῳ μονωνύμου εἶνε οἱ 2, 3, a, β, γ .

"Η ἀνάλυσις λοιπὸν ἀκέραιον τινὸς μονωνύμου, ἔχοντος συντελεστὴν ἀκέραιον ἀριθμόν, γίνεται εὐκόλως. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ,

νὰ ἀναλύσωμεν τὸν συντελεστήν του εἰς πρώτους παράγοντας. Τουναντίον, ἡ τροπὴ πολυωνύμου τινὸς εἰς γινόμενον παραγόντων, κατὰ τρόπον μᾶλλον ἀπλοῦν, εἶναι δυνατὴ εἰς ὁρισμένας τινὰς περιπτώσεις. Ἐκ τούτων ἀναφέρωμέν τινας κατωτέρω.

γ') Εὰν οἱ ὅροι τοῦ πολυωνύμου εἶναι γινόμενα, τὰ δποῖα ἔχουν κοινόν τινα παράγοντα, τρέπεται τοῦτο εἰς γινόμενον παραγόντων.

$$\text{Οὕτω τὸ } \alpha\mu + \beta\mu - \gamma\mu = \mu. (\alpha + \beta - \gamma).$$

$$\text{Όμοιώς τὸ } \mu\alpha + \mu = \mu. (\alpha + 1).$$

$$\text{Ἐπίσης τὸ } 2x^2 + 6x y = 2x(x + 3y).$$

Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ λέγομεν, ὅτι θέτομεν τὸν κοινὸν παράγοντα ἐκτὸς παρενθήσεως.

Ασκήσεις. Τρέψατε εἰς γινόμενα τὰ

$$8z^2\beta - 6\alpha^3 + 4\alpha\beta, \quad 4x^2y - 8xy^2 - 4xy \\ 8z^3\beta^2\gamma^2 - 4\alpha^2\beta^3\gamma^3 + 2\alpha^2\beta^2\gamma^3, \quad 15\alpha^3x - 10\alpha^3y + 5\alpha^3\omega, \quad \alpha^3\gamma y^3 + 2z^2\gamma^2y^2 - z^2\gamma y^4, \\ 3\beta^3\gamma^3 + 2\beta^2\gamma^2 - 6\beta\gamma^3, \quad x^2y^2\omega^2 - x^3y^2\omega^3 + x^2y^3\omega, \quad \alpha\beta^2\gamma^3 - 2\alpha^2\beta\gamma + 3\alpha^3\beta^3\gamma^2, \\ 6\alpha^2 - 12\alpha^3, \quad 3x^2 - 6x, \quad 8x^2y^2 + 16xy\omega - 24x^2y^2\omega^2, \quad \alpha\beta^2 - \beta\gamma^2 + \beta x.$$

δ') Εὰν εἶναι δυνατὸν νὰ διαταχθοῦν οἱ ὅροι τοῦ πολυωνύμου καθ' διμάδας, ὥστε εἰς ἑπάστημα τούτων νὰ ὑπάρχῃ ὁ αὐτὸς παράγων, τότε τρέπεται τοῦτο εἰς γινόμενον παραγόντων.

$$\text{Π. γ. τὸ πολυώνυμον } \alpha\gamma + \alpha\delta + \beta\gamma + \beta\delta \\ \text{εἴγε } \text{ἴσος } \text{ μὲ}$$

$$(\alpha\gamma + \alpha\delta) + (\beta\gamma + \beta\delta) = \alpha(\gamma + \delta) + \beta(\gamma + \delta) = (\alpha + \beta)(\gamma + \delta).$$

Όμοιώς ἔχομεν

$$3x^3 - 5x^2 - 6x + 10 = (3x^3 - 5x^2) - (6x - 10) = \\ = x^2(3x - 5) - 2(3x - 5) = (x^2 - 2)(3x - 5).$$

Ασκήσεις. Νὰ μετατραπεῖται σθοῦν εἰς γινόμενα αἱ κάτωθι παραστάσεις.

$$x^2 - x^3 + 1 - x, \quad x^3 - 5x^2 + 2x - 10, \quad x^3 + 7x^2 + 3x + 21, \quad x x^2 + \alpha^2 x + x + x,$$

$$(x - y)^2 + 2y(x - y), \quad 1 + 15x^4 - 5x - 3x^3, \quad x^3 + x - x^2\omega - \omega.$$

$$\alpha x^4 + \beta x^3 - \alpha x - \beta, \quad 2x^3 - 3x^2 - 4x + 5, \quad \alpha^2\beta - \alpha\beta x - \alpha\gamma + \gamma x.$$

ε') Εὰν τοιώνυμόν τι ίσοιται μὲ τέλειον τετράγωνον, τρέπεται εἰς γινόμενον παραγόντων, ἢτοι, ἐὰν ἑκαστος τῶν δύο ὅρων του εἶναι

τελείων τετραγώνων, δὲ τοίτος ὅρος εἶνε τὸ διπλάσιον τῆς τετραγωνικῆς φύσης τῶν δύο ἀλλων. Οὕτω τὸ

$$y^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2 = (x+y)(x+y).$$

Ομοίως ἔχουμεν

$$16\alpha^2 - 24\alpha\beta + 9\beta^2 = (4\alpha - 3\beta)^2 = (4\alpha - 3\beta)(4\alpha - 3\beta)$$

$$\text{Ἐπίσης τὸ } x^4 - 2x^2y + y^2 = (x^2 - y)^2 = (x^2 - y)(x^2 - y).$$

Ασκήσεις. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα παραγόντων αἱ παραστάσεις.

$$9x^2 + 24xy + 16y^2, \quad 49x^2 - 28xy + 4y^2, \quad 1 - 20\beta + 100\beta^2,$$

$$49 - 140\lambda^2 + 100\lambda^4, \quad 81\alpha^2 + 126\alpha\beta + 49\beta^2, \quad \mu^2y^2 - 16\mu\nu x^2 + 64\alpha^4,$$

$$4\alpha^2 - 20\alpha x + 25x^2, \quad 121\alpha^2 + 198\alpha y + 81y^2, \quad \alpha^2\beta^4\gamma^6 - 2\alpha\beta^2\gamma^3x^8 + x^{16},$$

$$49\alpha^2 + 42\alpha\gamma^2 + 9\gamma^4, \quad 121 + 110x + 25x^2, \quad 144 + 168\omega + 49\omega^2,$$

$$36x^2 - 60xy + 25y^2, \quad y^2 - 50y\omega + 625\omega^2.$$

Σ') Εὰν διώνυμόν τι εἴνε διαφορὰ δύο τετραγώνων, τρέπεται εἰς γινόμενον τοῦ ἀθροίσματος ἐπὶ τὴν διαφορὰν τῆς τετραγωνικῆς φύσης τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

$$\text{Οὕτω } \text{ἔχουμεν } \text{ὅτι } 16x^2 - 9y^6 = (4x + 3y^3)(4x - 3y^3).$$

$$\text{Ομοίως τὸ } 25 - 16\alpha^2 = (5 + 4\alpha)(5 - 4\alpha).$$

Ασκήσεις. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα αἱ κάτωθι παραστάσεις.

$$\alpha^2\beta^2 - 1, \quad 4\alpha^2 - 49\beta^2, \quad 121\alpha^2 - 36\beta^2, \quad 49\alpha^{14} - y^{12}, \quad 81\alpha^4\beta^4 - \gamma^4,$$

$$4\alpha^2\gamma - 9\gamma^3, \quad 20\alpha^3\beta^3 - 5\alpha\beta, \quad 3x^5 - 12\alpha^3\gamma^2, \quad 1 - 400x^4, \quad 4x^{16} - y^{20},$$

$$9x^8 - \alpha^6, \quad 16x^{17} - 6xy^6, \quad 25x^{10} - 16\alpha^8x^8, \quad 121\alpha^2 - 36\beta^2.$$

ζ') Ενίστε δυνάμεθα νὰ διατάξωμεν τοὺς ὄρους δοθέντος πολυωνύμου καθ' ὅμαδας οὕτως, ὥστε αἱ ὅμαδες αὐτὰ νὰ δύνανται νὰ γραφοῦν ὡς διαφορὰ τετραγώνων δύο παραστάσεων.

Οὕτω ἐπανερχόμεθα εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν.

$$\text{Π. } \gamma. \text{ ἔχουμεν } \text{ὅτι, } \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 - 9\gamma^2 = (\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2) - 9\gamma^2$$

$$= (\alpha - \beta)^2 - 9\gamma^2 = (\alpha - \beta + 3\gamma)(\alpha - \beta - 3\gamma).$$

$$\text{Ομοίως } 12\alpha\beta + 9x^2 - 4\alpha^2 - 9\beta^2 = 9x^2 - (4\alpha^2 - 12\alpha\beta + 9\beta^2)$$

$$= 9x^2 - (2\alpha - 3\beta)^2 = (3x - 2\alpha + 3\beta)(3x + 2\alpha - 3\beta).$$

$$\text{Ασκήσεις. } \alpha^2 - (3\beta - 2\gamma)^2, \quad \beta^2 - (2\alpha + 3\gamma)^2, \quad 9\alpha^2 - (x - 3\gamma)^2,$$

$$16\alpha^2 - (2y - 3\omega)^2, \quad (\alpha + 2\beta - 3\gamma)^2 - (\alpha + 5\gamma)^2, \quad (2\alpha + \beta - \gamma)^2 - (\alpha - 2\beta + \gamma)^2$$

$$(x - 5)^2 - (x + y - 5)^2, \quad (2z - 1)^2 - (z + 1)^2, \quad (z + \beta - \gamma)^2 - (\alpha - \beta - \gamma)^2,$$

$$x^2 - (y - \omega)^2, \quad (z - 3x)^2 - (3\alpha - 2x)^2, \quad 1 - (x + 5\beta)^2.$$

η') Έὰν ἡ δοθεῖσα παράστασις εἶνε τῆς μορφῆς

$$\alpha^4 + \alpha^2 \beta^2 + \beta^4$$

$$\begin{aligned} \text{παρατηροῦμεν ὅτι } \alpha^4 + \alpha^2 \beta^2 + \beta^4 &= \alpha^4 + \alpha^2 \beta^2 + \beta^4 + \alpha^2 \beta^2 - \alpha^2 \beta^2 \\ &= \alpha^4 + 2 \alpha^2 \beta^2 + \beta^4 - \alpha^2 \beta^2 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - \alpha^2 \beta^2 \\ &= (\alpha^2 + \beta^2 + \alpha \beta)(\alpha^2 + \beta^2 - \alpha \beta). \end{aligned}$$

$$\text{Π. χ. τὸ } x^4 + x^2 + 1 = x^4 + 2 x^2 + 1 - x^2$$

$$= (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1).$$

Θ') Έὰν ἡ δοθεῖσα παράστασις εἶνε τῆς μορφῆς

$$x^2 + \beta x + \gamma$$

$$\begin{aligned} \text{καὶ τὸ μὲν } \beta \text{ εἶνε τὸ ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν, ἔστω τῶν } \\ \varrho, \varrho', \text{ τὸ δὲ } \gamma \text{ τὸ γινόμενον τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν, θὰ } \text{ἔχωμεν ὅτι} \\ \beta = \varrho + \varrho', \gamma = \varrho \cdot \varrho'. \text{ "Αρα τὸ } x^2 + \beta x + \gamma = x^2 + (\varrho + \varrho')x + \varrho \varrho' \\ = x^2 + \varrho x + \varrho' x + \varrho \varrho' = (x^2 + \varrho x) + (\varrho x + \varrho \varrho') \\ = x(x + \varrho) + \varrho'(x + \varrho) = (x + \varrho)(x + \varrho'). \end{aligned}$$

$$\text{Π. χ. ἀν } \text{ἔχωμεν τὸ τριώνυμον } x^2 + 8x + 15, \\ \text{παρατηροῦμεν ὅτι } 8 = 5 + 3, \text{ καὶ } 15 = 3 \cdot 5.$$

$$\Delta i \alpha \tau o \nu t o \quad x^2 + 8x + 15 = (x + 3)(x + 5).$$

$$\text{Ομοίως τὸ } x^2 + 11x + 30 = (x + 5)(x + 6).$$

$$\Delta i \otimes t i \varepsilon i n e . \quad 5 + 6 = 11, \text{ καὶ } 30 = 5 \cdot 6.$$

ε') Έὰν ἡ δοθεῖσα παράστασις εἶνε τῆς μορφῆς

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma,$$

δυνάμεθα, ἐνίστε, νὰ τὴν τρέψωμεν εἰς γινόμενον, ἐπαναφέροντες αὐτὴν εἰς τὴν προηγουμένην μορφήν.

"Εστω π. χ. ἡ παράστασις $3x^2 - x - 2$.

$$\text{Γράφομεν αὐτὴν ὡς } \frac{1}{3}(3 \cdot 3 x^2 - 3x - 3 \cdot 2).$$

$$\begin{aligned} \text{'Έὰν γράψωμεν ἀντὶ τοῦ } 3x \text{ τὸ } \omega, \text{ δηλαδὴ } 3x = \omega, \\ \text{ἔχομεν } 3x^2 - x - 2 = \frac{1}{3}(\omega^2 - \omega - 6). \end{aligned}$$

'Αναλύομεν τὸ $\omega^2 - \omega - 6$ εἰς τὸ $(\omega - 3)(\omega + 2)$.

Οὕτω ᔁρμεν

$$3x^2 - x - 2 = \frac{1}{3}(\omega - 3)(\omega + 2)$$

Γράφομεν ἀντὶ τοῦ ω τὸ 7σ ν του 3 x, καὶ ἔχομεν

$$\frac{1}{3} (3x - 3) (3x + 2) = \frac{3}{3} (x - 1) (3x + 2) \\ = (x - 1) (3x + 2).$$

"Ητοι $3x^2 - x - 2 = (x - 1)(3x + 2)$.

επ' Έὰν ἡ δοθεῖσα παράστασις εἶνε ἄθροισμα, ἢ διαφορά, δύο κύβων, ἀναλύεται εἰς γινόμενον ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαιρέσεως πολυωνύμου διὰ τοῦ x + α, ἢ τοῦ x - α. Οὕτω π. χ. τὸ $\alpha^3 - \beta^3$ διαιρεῖται διὰ τοῦ $\alpha - \beta$, καὶ δίδει πηλίκον $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$.

Ἐπομένως εἶνε $\alpha^3 - \beta^3 = (\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)$.

Ομοίως τὸ $\alpha^3 + \beta^3$ διαιρεῖται διὰ τοῦ $\alpha + \beta$, καὶ δίδει πηλίκον $\alpha - \alpha\beta + \beta^2$. "Αρα εἶνε $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2)$.

Κατὰ ταῦτα τὸ $x^6 + y^9 = (x^2 + y^3)(x^4 - x^2y^3 + y^6)$.

$$\begin{aligned} \text{Tὸ } (x-y)^3 + \omega^3 &= (x-y+\omega)[(x-y)^2 - (x-y)\omega + \omega^2] \\ &= (x-y+\omega)(x^2 - 2xy + y^2 - x\omega + y\omega + \omega^2). \end{aligned}$$

'Α σ κ ḥ σ ε ι σ

Ομάδας πρώτη. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα αἱ παραστάσεις

$$9x^4 + 26x^2y^2 + 25y^4, 4x^4 - 21x^2y^2 + 9y^4, 4x^4 - 29x^2y^2 + 25y^4, 4x^4 - 13x^2 + 1 \\ 4x^4 - 37x^2y^2 + 9y^4, 9x^4 - 15x^2 + 1, x^4 + x^2y^2 + y^4, x^4 + \beta^4, x^8 + \beta^8.$$

$$\lambda^4 + \lambda^2 + 1, 9x^8 - 15x^4 + 1, 16x^4 - 17x^2 + 1, 25x^4 + 31x^2y^2 + 16y^4.$$

Ομάδας δευτέρα. Ομοίως αἱ

$$x^2 - 7x - 8, x^2 + 9x + 8, x^2 - 3x - 18, x^2 - 9x + 18, x^2 + 4x - 5, \\ y^2 - 58y + 57, \alpha^2\beta^2 - 13\alpha\beta\gamma + 22\gamma^2, \alpha^2 + 17\alpha - 390, \alpha^2 - 7\alpha\beta + 10\beta^2, \\ \alpha^4 - 11\alpha^2\beta^3 + 30\beta^6, \alpha^2x^2 - 3ax - 54, \omega^2 + 9\omega y + 20y^2.$$

Ομάδας τρίτη. Επίσης αἱ

$$6x^2 - x - 2, 18x^2 + 9x - 2, 12x^2 - 7x + 1, 12x^2 - x - 13x^2 - 2x - 5, \\ 3x^2 + 4x - 4, 6x^2 + 5x - 4, 4x^2 + 13x + 3, 6x^2 + 17x + 12, 11\alpha^2 - 23\alpha\beta + 2\beta^2.$$

Ομάδας τετάρτη. Νὰ τράποῦν εἰς γινόμενα αἱ παραστάσεις

$$x^3 + 64, x^3y^3 - 64, 343 - x^3, \alpha^3\beta^3 + 243, 8\alpha^3 - \beta^6, 216\mu^3 + v^6, \\ x^3y^3 - 512\omega^3, 729y^3 - 64\omega^3, (\omega + 5)^3 - \alpha^3, (y - \omega)^3 + (y + \omega)^3.$$

§ 48. Εύρεσις τοῦ μεγέστου κοινοῦ διεκερέτου.

Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς 'Αριθμητικῆς) ὅτι

«διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν μ. κ. δ. ἀριθμῶν, ἀναλύομεν ἔκαστον αὐτῶν εἰς γινόμενον παραγόντων πρώτων, καὶ σχηματίζομεν τὸ

γινόμενον τῶν κοινῶν παραγόντων τῶν, καθενὸς τούτων λαμβανομένου μὲ τὸν ἐλάχιστον τῶν ἐκθετῶν του».

Ο ἀνωτέρῳ κανὼν ἴσχύει καὶ διὰ τὴν εὑρεσίν τοῦ μ. κ. δ. ἀκεραίων ἀλγεβρικῶν παραστάσεων, ἂν αὕται τρέπωνται εἰς γινόμενα. Ἡ ἀπόδειξις γίνεται ὁμοίως, ὅπως (καὶ ἐν τῇ Ἀριθμητικῇ) προκειμένου περὶ ἀριθμῶν.

Οὗτοι δὲ μ. κ. δ. τῶν

$$6 \alpha^2 \beta^3 = 2 \cdot 3 \cdot \alpha^2 \beta^3, \quad 9 \alpha^3 \beta^2, \quad 16 \alpha^4 \beta^3 = 2^4 \alpha^4 \beta^3 \\ \text{εἶνε τὸ} \quad \alpha^2 \beta^2.$$

Ο μ. κ. δ. τῶν

$$\alpha^2 - \alpha \beta = \alpha (\alpha - \beta), \quad \alpha^3 - 2 \alpha^2 \beta + \alpha \beta^2 = \alpha (\alpha - \beta)^2$$

$$\alpha^3 - \beta^3 = (\alpha - \beta) (\alpha^2 + \alpha \beta + \beta^2)$$

$$\text{εἶνε τὸ} \quad (\alpha - \beta).$$

Ασκήσεις. Νὰ εὑρεθῇ δὲ μ. κ. δ. τῶν παραστάσεων

$$120 \alpha^2 \text{ καὶ } 168 \cdot \tauῶν \quad 36 \alpha^3 x \text{ καὶ } 28 x^3 y \cdot \tauῶν \quad 36 x^3 \text{ καὶ } 27 x^4 \cdot$$

$$\tauῶν \quad (x-1)^2 (x+2)^3 \text{ καὶ } (x-1)(x+3)_3 \quad \tauῶν \quad x^2 - 16 \text{ καὶ } (x+4)^2,$$

$$\tauῶν \quad 35 x^2 (\mu + \nu)^2 (\mu - \nu)^3, \quad 20 x^3 (\mu + \nu)^2 (\mu - \nu)^2, \quad 45 x^4 (\mu + \nu)^3 (\mu - \nu)^3.$$

§ 49. Εὕρεσις τοῦ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου.—

Γνωρίζομεν (ἐν τῇ Ἀριθμητικῇ) ὅτι,

«διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐ. κ. π. ἀριθμὸν, ἀναλύομεν ἔκαστον αὐτῶν εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων καὶ σχηματίζομεν τὸ γινόμενον τῶν κοινῶν καὶ μὴ κοινῶν παραγόντων τῶν, ἔκάστου λαμβανομένου μὲ τὸν μέγιστον τῶν ἐκθετῶν του».

Ο ἀνωτέρῳ κανὼν ἴσχύει καὶ διὰ τὴν εὑρεσίν τοῦ ἐ. κ. π. ἀκεραίων ἀλγεβρικῶν παραστάσεων, ἂν αὕται τρέπωνται εἰς γινόμενα, ἢ δὲ ἀπόδειξις γίνεται ὅπως (ἐν τῇ Ἀριθμητικῇ) προκειμένου περὶ ἀριθμῶν.

Οὗτοι τὸ ἐ. κ. π. τῶν παραστάσεων

$$18 \alpha^3 \beta^2 = 2 \cdot 3^2 \cdot \alpha^3 \beta^2, \quad 9 \alpha \beta^2 = 3^2 \alpha \beta^2, \quad 12 \alpha \beta = 2^2 \cdot 3 \alpha \beta, \\ \text{εἶνε τὸ γινόμενον} \quad 2^2 \cdot 3^2 \cdot \alpha^3 \beta^2 = 36 \alpha^3 \beta^2.$$

Ομοίως τῶν 6 ($\alpha + \beta$), 5 ($\alpha + \beta)^2$ ($\alpha - \beta$), 9 ($\alpha + \beta$) ($\alpha - \beta)^2$ τὸ ἐ. κ. π. εἶνε $2^2 \cdot 3^2 (\alpha + \beta)^2 (\alpha - \beta)^2 = 36 (\alpha^2 - \beta^2)^2$.

Ασκήσεις. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐ. κ. π. τῶν παραστάσεων

- 1) $18x(x+2\beta)^3$, $9xy(x+2\beta)^2(x-2\beta)$, $18x^2y^2(x-2\beta)^2$.
- 2) $(\mu+1)^2$, $(\mu-1)$, $(\mu^2-2\mu+1)$, μ^3-1 .
- 3) (x^5+x^4) , (x^5+x) , $(x^5-x)^2$,
- 4) $(3x^4+3x)$, $(5x^3-5x)$, $10x^2+10x$.

§ 30. Περὶ κλάσματικῶν παραστάσεων.—

α') Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Αριθμητικῆς) ὅτι

«τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο ἀριθμῶν παρίσταται διὰ κλάσματος, ἔχοντος ἀριθμητὴν τὸν διαιρετέον καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρέτην».

Οὕτω καὶ τὸ πηλίκον δύο ἀλγεβρικῶν παραστάσεων, π. γ. τῶν ακαὶ β, παρίσταται ὑπὸ τοῦ κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$ τὸ δποῖον λέγεται ἀλγεβρικὸν κλάσμα. «Ητοι

«ἀλγεβρικὸν κλάσμα καλεῖται τὸ κλάσμα, τοῦ δποίου οἱ δροὶ εἶνε, ἐν γένει, ἀλγεβρικαὶ παραστάσεις παριστάνει δὲ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του».

β') Επειδή, οἷαιδίποτε καὶ ἄν εἴνε αἱ παραστάσεις, οἱ δροὶ τοῦ ἀλγεβρικοῦ κλάσματος παριστάνουν ἀριθμούς, ἔπειται ὅτι καὶ τὰ κλάσματα ταῦτα ἔχουν τὰς ἴδιότητας τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν. Οὕτω ἔχομεν τὴν ἔξῆς ἴδιότητα διὰ τὰ ἀλγεβρικὰ κλάσματα.

«Ἐὰν τοὺς δρους ἀλγεβρικοῦ τινος κλάσματος πολλαπλασιάσωμεν (διαιρέσωμεν) μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, ἡ ἀξία του δὲν μεταβάλλεται».

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν, ὅτι $\frac{\beta}{\alpha} = \frac{\beta\gamma}{\gamma\alpha}$, $\frac{\alpha\gamma}{\beta\gamma} = \frac{\alpha}{\beta}$.

Όμοιώς $\frac{57\alpha^3\beta\gamma^2}{38\alpha^2\beta\gamma^4} = \frac{3 \cdot 19 \cdot \alpha\beta\gamma^2}{2 \cdot 19 \cdot \alpha^2\beta\gamma^4} = \frac{3\alpha}{2\beta^2\gamma^2}$.

γ') Στηριζόμενοι εἰς τὴν ἀνωτέρῳ ἴδιότητα, δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν δοιθὲν κλάσμα ἀλγεβρικὸν εἰς ἄλλο ἵσοδύναμον μὲ αὐτὸν καὶ ἔχον δρους ἀπλουστέρους, ἢ μή, τοῦ δοθέντος.

§ 31. Απλοποίησις κλάσματος.—

α') Απλοποίησις ἀλγεβρικοῦ κλάσματος λέγεται ἡ πρᾶξις διὰ τῆς δροίας εὑρίσκομεν ἄλλο ἵσοδύναμόν του, καὶ ἔχον δρους ἀπλουστέρους.

Ίνα άπλοποιήσωμεν ἀλγεβρικὸν κλάσμα, διαιροῦμεν τοὺς ὅρους του διά τινος κοινοῦ διαιρέτου των. Οὕτω τὸ κλάσμα

$$\frac{(\alpha+5)(\alpha+3)}{(\alpha+3)(\alpha-2)} \quad \text{τρέπεται εἰς τὸ } \frac{(\alpha+5)}{(\alpha+2)},$$

ἀφοῦ οἱ ὅροι τοῦ δοθέντος διαιρεθοῦν διὰ τοῦ $(\alpha + 3)$.

6') *Ανάγρων καλεῖται κλάσμα, τοῦ ὅποίου οἱ ὅροι δὲν ἔχουν κοινὸν παράγοντα. Επομένως ἀνάγρωγον κλάσμα δὲν ἀπλοποιεῖται.*

γ') *Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς) ὅτι,*

«ἶνα κάμωμεν κλάσμα τι ἀνάγρωγον, ἀρνεῖ, νὰ διαιρέσωμεν τοὺς ὅρους του διὰ τοῦ μ. κ. δ. των».

Ο κανὼν οὗτος ἰσχύει καὶ διὰ τὰ ἀλγεβρικὰ κλάσματα, καὶ τὰς ἀλγεβρικὰς παραστάσεις, ἢ δὲ ἀπόδειξις γίνεται δυοῖς.

Οὕτω ἔχομεν ὅτι

$$\frac{4\alpha^2 \beta^2 \gamma}{6\alpha \beta^2 \gamma^3} = \frac{2^2 \alpha^2 \beta^2 \gamma}{2 \cdot 3 \alpha \beta^2 \gamma^3} = \frac{2 \alpha}{3 \gamma^2} \quad (\mu. \kappa. \delta. \varepsilon \text{ίνε } \delta \text{ } 2 \alpha \beta^2 \gamma).$$

$$\frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2 - \alpha} = \frac{(\alpha - 1)(\alpha + 1)}{\alpha(\alpha - 1)} = \frac{(\alpha + 1)}{\alpha}, \quad (\mu. \kappa. \delta. \varepsilon \text{ίνε } \delta \text{ } \alpha - 1).$$

$$\frac{(x+\alpha)^2 - \beta^2}{(x+\nu)^2 - \alpha^2} = \frac{(x+\alpha+\beta)(x+\alpha-\beta)}{(x+\beta+\alpha)(x+\nu-\alpha)} = \frac{x+\alpha-\beta}{x+\nu-\alpha} \quad (\mu. \kappa. \delta. \delta x + \alpha + \beta).$$

Ασκήσεις. Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ κάτωθι κλάσματα, ὥστε νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἀνάγρωγα ἴσοδύναμα πρὸς αὐτά.

$$\alpha') \frac{16 \alpha^2 \beta^2}{18 \alpha \beta^2}, \quad \beta') \frac{9 \alpha \beta^2 \gamma}{45 \alpha^2 \beta^2 \gamma^2}, \quad \gamma') \frac{46 x^2 y^3}{36 x^3 y^5}, \quad \delta') \frac{98 x y - 24 y^2}{24 x^2 - 32 x y},$$

$$\epsilon') \frac{8 x^2 + 24 \alpha x + 18 \alpha^2}{16 x^3 + 54 \alpha^3}, \quad \zeta') \frac{x^3 - y^3}{x^2 - y^2}, \quad \zeta') \frac{x^2 - y^2}{x^3 - y^3}, \quad \eta') \frac{x^2 - 9^4}{x^2 - 9^2}.$$

§ 52. Τροπὴ ἑτερωνύμων κλασμάτων εἰς ὁμώνυμα.—

Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς) ὅτι,

«διὰ νὰ τρέψωμεν ἑτερώνυμα κλάσματα εἰς ὁμώνυμα· 1) ἀναλύομεν τὸν παρονομαστὴν καθενὸς εἰς γινόμενον παραγόντων· 2) ενδιέσκομεν τὸ ἐ. κ. π. τῶν γινομένων τούτων· 3) διαιροῦμεν τὸ ἐ. κ. π. διὰ καθενὸς τῶν παρονομαστῶν· 4) ἐπὶ καθὲν τῶν

πηλίνων τῶν διαιρέσεων τούτων πολλαπλασιάζομεν τοὺς δρους καθενὸς τῶν ἀντιστοίχων κλασμάτων».

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἐργαζόμεθα, διὰ νὰ τρέψωμεν εἰς ὅμιλην μα ἀλγεβρικὰ κλάσματα, ἢ ἀλγεβρικὰς κλασματικὰς παραστάσεις. Ἡ ἀπόδειξης γίνεται ὁμοίως.

*Εστωσαν π. χ. τὰ κλάσματα

$$\frac{\beta}{6\alpha}, \quad -\frac{\alpha}{9\beta}, \quad \frac{1}{4\alpha^2\beta}, \quad \frac{1}{18\alpha^2\beta^3}$$

Τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρανομαστῶν εἶνε τὸ $3^2 \cdot 2^2 \cdot \alpha^2\beta^3$.

Διαιροῦντες αὐτὸ διὰ καθενὸς τῶν παρανομαστῶν, εὑρίσκομεν κατὰ σειρὰν $6\alpha\beta^3, 4\alpha^2\beta^2, 9\beta^2, 2$.

*Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δρους καθενὸς τῶν δοθέντων κλασμάτων ἀντιστοίχως ἐπὶ τὰ πηλίκα ταῦτα, εὑρίσκομεν τὰ ὅμιλην μα κλάσματα

$$\frac{6\alpha\beta^4}{36\alpha^2\beta^3}, \quad \frac{4\alpha^3\beta^2}{36\alpha^2\beta^3}, \quad \frac{9\beta^2}{36\alpha^2\beta^3}, \quad \frac{2}{36\alpha^2\beta^3}$$

*Ασκήσεις

Νὰ τραποῦν εἰς ὅμιλην μα τὰ κάτωθι κλάσματα ἀλλ' οὕτως, ὥστε τὰ γένα νὰ ἔχουν τὸ ἐ. κ. π. τῶν παρονομαστῶν τῶν δοθέντων.

- 1) $\frac{1}{x^2 - 1}, \quad \frac{1}{x}, \quad \frac{1}{x - 1}, \quad \frac{1}{x + 1}$
- 2) $\frac{\mu}{3x^3y^2}, \quad \frac{\nu}{8xy^3}, \quad \frac{\rho}{9x^4y^3}, \quad \frac{7}{24x^2y^4}$
- 3) $\frac{1}{4(x + \beta)^3}, \quad \frac{5}{8(x + \beta)^2(x - \beta)}, \quad \frac{9}{5(x - \beta)^2}$
- 4) $\frac{x^2}{(x^2 - 4)(x - 1)}, \quad \frac{x}{(x + 2)(x + 1)}, \quad \frac{3}{x^2 - 4x + 4}$
- 5) $\frac{x^2}{\rho(\alpha\mu + \mu^2)}, \quad \frac{x}{\rho^2(\alpha^2 - \alpha\mu)}, \quad \frac{1}{\rho^3(\alpha^2 - \mu^2)}$

§ 53. *Ἀριθμητικὴ τιμὴ ἀλγεβρικοῦ κλάσματος.—

Καλοῦμεν ἀριθμητικὴν τιμὴν ἀλγεβρικοῦ κλάσματος τὸν ἀριθμὸν ὁ ὁποῖος προκύπτει, ἐὰν εἰς τὰ γράμματα τοῦ κλάσματος δώσωμεν ἀριστεράς τιμὰς καὶ ἐκτελέσωμεν τὰς σημειωμένας πράξεις.

*Η ἀριθμητικὴ τιμὴ κλάσματος εἶνε συνήθως ἡ ἀριθμητικὴ Νείλου Σακελλαρίου, "Αλγεβρα, Ἑκδοσις τετάρτη 26) 2) 1924

τιμὴ τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τῆς ἀριθμητικῆς τιμῆς τοῦ παρονομαστοῦ του.
Π. χ. ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ κλάσματος

$$\frac{\alpha+1}{\alpha-2} \text{ ὅταν } \tauὸ \alpha = \muὲ 4, \text{ εἶνε ἵση πρὸς } \frac{4+1}{4-2} = \frac{5}{2}.$$

Ἡ τιμὴ τοῦ κλάσματος $\frac{2\alpha}{3\gamma^2}$ ὅταν εἴνε $\alpha = 1, \gamma = 2$, εἴνε ἵση

$$\muὲ \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 2^2} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

§ 34. Περὶ τῶν παραστάσεων $\frac{0}{0}$ καὶ $\frac{\alpha}{0}$ — .

α') Ἐγίστε οἱ ὅροι δοθέντος κλάσματος διά τινα δοθεῖσαν τιμὴν γράμματός τινος γίνονται ἵσοι μὲ μηδέν. Ἡ οὕτω προκύπτουσα τιμὴ τοῦ κλάσματος ἔχει τὴν μορφὴν $\frac{0}{0}$. Ἀλλ' ἡ παράστασις αὗτη εἴνε ἀδριστος. Διότι, πᾶς ἀριθμὸς πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ μηδὲν δίδει γινόμενον μηδέν. Διὰ τοῦτο, διὰ νὰ εὐθωμεν τὴν τιμὴν τοῦ δοθέντος κλάσματος, ἀντικαθιστῶμεν τὴν δοθεῖσαν τιμὴν τοῦ γράμματος εἰς τὸ κλάσμα, τὸ προκύπτον ἐκ τοῦ δοθέντος, μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν τῶν ὅρων του. Τὸ ἔξαγόμενον τῆς ἀντικαταστάσεως ταύτης θὰ παριστάνῃ τὴν ζητουμένην τιμὴν. Οὕτω π. χ. ἡ τιμὴ τοῦ κλάσματος $\frac{x^2 - \alpha^2}{x - \alpha}$ ὅταν εἴνε $x = \alpha$ δὲν εἴνε ἡ ἀδριστος παράστασις $\frac{0}{0}$ ἀλλ' ἡ 2α , τὴν δποίαν εὑρίσκομεν ἐκ τοῦ $\frac{x^2 - \alpha^2}{x - \alpha} = \frac{(x-\alpha)(x+\alpha)}{x - \alpha} = x + \alpha$,

ἐὰν τεθῇ ἐν τῷ $x + \alpha$ ἀντὶ τοῦ x τὸ α .

β') Ἐστω ὅτι ἡ τιμὴ κλάσματος τινος εἴνε $\frac{\alpha}{0}$, ὅπου α παριστάνει ἀριθμόν τινα διάφορον τοῦ μηδενός. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὗτὴν λέγομεν ὅτι,

«ἡ παράστασις $\frac{\alpha}{0}$ οὐδεμίαν ἔχει ἔννοιαν, ἢ ὅτι, ἡ τιμὴ τοῦ $\frac{\alpha}{0}$ εἴνε μεγαλυτέρα παντὸς ἀριθμοῦ δσονδήποτε μεγάλου».

Διότι, οὐδεὶς ἀριθμός, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ μηδέν, δύναται νὰ δώσῃ γινόμενον τὸν α . Ἔξ ἄλλου ὅμως, ἀνδ παρονομαστὴς εἴνε πολὺ μικρός, ἐστω 0,000. . . 1, τὸ κλάσμα

$$\frac{\alpha}{0,000....1} = \alpha \times \frac{1000....}{1} = 100 \alpha,$$

Δηλαδὴ εἶνε ἀριθμὸς πολὺ μέγας· καὶ ὅσω ὁ παρονομαστὴς ἐλαττώνεται καὶ πλησιάζει νὰ γίνῃ μηδέν, τόσῳ τὸ κλάσμα γίνεται μεγαλύτερον καὶ ὑπερβαίνει πάντα ἀριθμόν.

γ') Διὰ τοῦτο, «ἐν πάσῃ διαιρέσει πρέπει, νὰ ὑποθέτωμεν τὸν διαιρέτην διάφορον τοῦ μηδενός».

*Ασκήσεις

Νὰ εὑρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν κάτωθι κλασμάτων διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων

$$\alpha') \quad \frac{x^3 + 2x^4}{x} \quad \text{διὰ } x = 0. \quad \beta') \quad \frac{y^4 - \alpha^4}{(y^2 - \alpha^2)} \quad \text{διὰ } y = \alpha$$

$$\gamma') \quad \frac{x^2 - \alpha^2}{x^3 - \alpha^3} \quad \text{διὰ } x = \alpha. \quad \delta') \quad \frac{\alpha^4 - \beta^4}{\alpha^2 - \beta^2} \quad \text{διὰ } \alpha = \beta.$$

$$\varepsilon') \quad \frac{(x^2 + 2\alpha x + \alpha^2)(x - \alpha)}{x^2 - \alpha^2}. \quad \zeta') \quad \frac{x^4 - \alpha^4}{x - \alpha} \quad \text{διὰ } x = \alpha$$

$$\xi') \quad \frac{x^2 - 3x + 5}{x^2 - 2x + 1} \quad \text{διὰ } x = 1. \quad \eta') \quad \frac{\alpha^3 + 1}{\alpha^2 - 1} \quad \text{διὰ } \alpha = 1.$$

$$\theta') \quad \frac{x^3 + x^2 + x + 1}{x^3 + x^2 - x - 1} \quad \text{διὰ } x = -1. \quad \iota') \quad \frac{x^2 - 6x + 15}{x^2 - 8x + 15} \quad \text{διὰ } x = 5.$$

§ 55. Πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις κλασμάτων.—

Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς 'Αριθμητικῆς) ὅτι,

«διὰ νὰ προσθέσωμεν κλάσματα, 1) ἔὰν μὲν εἶνε δμώνυμα προσθέτομεν τοὺς ἀριθμητάς των, καὶ τὸ ἀθροισμα γράφομεν ἀριθμητήν, παρονομαστὴν δέ τὸν κοινὸν παρονομαστὴν των. 2) ἔὰν δ' εἶνε ἑτερώνυμα, τρέπομεν αὐτὰ εἰς δμώνυμα, καὶ ἀκολούθως προσθέτομεν τὰ δμώνυμα κλάσματα».

Ο ἀνωτέρῳ κανὼν ἴσχύει καὶ διὰ τὴν πρόσθεσιν ἀλγεβρικῶν κλασματικῶν παραστάσεων, ἀνάλογος δὲ καὶ διὰ τὴν ἀφαίρεσιν.

$$\begin{aligned} \text{Οὗτῳ } \text{ζηλούμεν } \text{ὅτι} \quad & \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha + \beta}{\gamma}. \\ & \frac{\alpha}{\mu} + \frac{\beta}{\nu} = \frac{\alpha\nu + \beta\mu}{\mu\nu}, \quad \frac{\alpha}{\gamma} - \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha - \beta}{\gamma}. \\ & \frac{20xy}{9} - \frac{25xy}{9} - \frac{4xy}{9} = -\frac{9xy}{9} = -xy. \\ & \frac{x}{5} - \frac{x}{4} = \frac{4x}{20} - \frac{5x}{20} = -\frac{x}{20}. \end{aligned}$$

Α συγκεντισμός

**Ομάδας πρώτη.* Νὰ εύρεθούν τὰ ἔξαγόμετα τῶν κάτωθι πράξεων.

$$1) \frac{x}{2} - \frac{x}{3} + \frac{x}{4} - \frac{x}{6}, \quad 2) \frac{2(x+3)}{7} - \frac{3(x-4)}{4} + \frac{5(x+5)}{12} + \frac{x+21}{21}$$

$$3) \frac{2}{2x+5} + \frac{3}{3x+7} - \frac{2(5x+12)}{(2x+5)(3x+7)} \quad (\text{δοκιμαῖ διὰ } x=2).$$

**Ομάδας δευτέρα.* **Ομοίως*

$$1) \frac{2\alpha+3\beta}{2\alpha-3\beta} - \frac{2\alpha-3\beta}{2\alpha+3\beta} + \frac{2(4\alpha^2+9\beta^2)}{(4\alpha^2-9\beta^2)}, \quad \text{δοκιμαῖ διὰ } \alpha=1, \beta=2,$$

$$2) \frac{4\alpha}{x^2-4} + \frac{\alpha}{x+2} - \frac{\gamma}{x^2-4x+4}, \quad 3) \frac{\alpha}{\alpha x+x^2} + \frac{\beta}{\alpha^2-\alpha x} + \frac{2\alpha}{\alpha^2-x^2}$$

(δοκιμαῖ διὰ $x=3$ $\alpha=\beta=\gamma=-1$).

**Ομάδας τρίτη.* **Ομοίως τοῦ*

$$1) 5x^2 + 3xy + 4y^2 + \frac{x^3+y^3}{x-y} \quad (\text{δοκιμὴ διὰ } x=-1, y=5).$$

$$2) \frac{1}{2x^2+2x} + \frac{3}{5x^3-5x} - \frac{3}{10x^2-10x} \quad (\text{δοκιμαῖ διὰ } x=-3).$$

$$3) \frac{4x^3}{x^4-16} - \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2}.$$

$$4) \frac{1}{(x-3)(x+5)} + \frac{1}{(5-x)(x-7)} + \frac{1}{(x-7)(3-x)} \quad (\text{δοκιμὴ διὰ } x=8).$$

$$5) \frac{\alpha\beta}{(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)} - \frac{\alpha\gamma}{(\beta-\gamma)(\beta-\alpha)} + \frac{\beta\gamma}{(\beta-\alpha)(\gamma-\beta)}$$

(δοκιμὴ διὰ $\alpha=1, \beta=7, \gamma=2$).

§ 56. Πολλαπλασιασμὸς κλισμάτων. —

α') "Εστω ὅτι θέλομεν νὰ εύρωμεν τὸ γινόμενον $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta}$ (ὑποτιθεμένου ὅτι οἱ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ εἶνε ἀκέραιοι ἀριθμοί).

Κατὰ τὸν γενικὸν δρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ (§ 8, α') ἐπειδὴ δεύτερος τῶν δοθέντων ἀριθμῶν, δ $\frac{\gamma}{\delta}$, γίνεται ἐκ τῆς μονάδος, ἐὰν λάβωμεν τὸ $\frac{1}{\delta}$ αὐτῆς καὶ τοῦτο πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ γ, ἐπειδὴ ὅτι $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta}$ σημαίνει, νὰ εύρωμεν τὸ $\frac{1}{\delta}$ τοῦ $\frac{\alpha}{\beta}$, καὶ τὸ

ἔξαγόμενον νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ γ. Άλλὰ τὸ $\frac{1}{\delta}$ τοῦ $\frac{\alpha}{\beta}$ εἶνε

$\frac{\alpha}{\beta \cdot \delta}$. Διότι $\frac{\alpha}{\beta \cdot \delta}$ ἐπὶ δ δίδει τὸν $\frac{\alpha}{\beta}$.

"Ωστε ἔχομεν $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta \cdot \delta} \cdot \gamma = \frac{\alpha \gamma}{\beta \cdot \delta}$.

· Ήτοι, «τὸ γινόμενον δύο κλασμάτων ἵσονται μὲ κλάσμα, ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμητῶν τῶν δοθέντων, παρονομαστὴν δὲ τὸ γινόμενον τῶν παρανομαστῶν τῶν».

· Ο κανών οὗτος ισχύει καὶ διὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν ἀλγεβρικῶν κλασματικῶν παραστάσεων, ἀποδεικνύεται δ' ὅμοιός.

Οὕτω π. χ. ἔχομεν

$$\frac{12x^2y}{7\omega\varphi} \cdot \frac{14\omega^2\varphi}{3xy^2} = \frac{12 \cdot 14 x^2 y \omega^2 \varphi}{7 \cdot 3 x y^2 \omega \varphi^2} = \frac{8x\omega}{y\varphi}$$

6') Δυνάμεθα νὰ ἀπλοποιοῦμεν τὸν ἀριθμητὴν ἐνὸς τῶν παραγόντων μὲ τὸν παρονομαστὴν ἐνὸς ἐξ αὐτῶν πρὸ τῆς ἐκτελέσεως τῆς πράξεως τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ἀν τοῦτο εἶνε δυνατόν.

$$\text{Π. χ. εἴνε } \frac{\alpha+x}{\alpha-x} \cdot \frac{\alpha-x}{\alpha^2+x^2} = \frac{\alpha+x}{\alpha^2+x^2}$$

$$\text{Ἐπίσης } \frac{x(\alpha+x)}{\alpha(\alpha-x)} \cdot \frac{\alpha^2(\alpha-x)^2}{x^2(\alpha+x)^2} = \frac{\alpha(\alpha-x)}{\alpha(\alpha+x)}$$

Ασκήσεις καὶ προβλήματα

· *Ομάς πρώτη.* Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἑξαγόμενα τῶν κάτωθι γινομένων

$$1) \quad \frac{\alpha x + \alpha y}{\gamma x + \gamma y} \cdot \frac{\gamma x^2 - \gamma y^2}{\beta x + \beta y}, \quad 2) \quad \frac{3x^2 - 6xy + 3y^2}{x+y} \cdot \frac{x^3 + y^3}{6x - 6y}$$

$$3) \quad \left(\frac{x^2+1}{x^3+x^2} - \frac{1}{x+1} \right) \cdot (x+1). \quad 4) \quad \left(1 + \frac{x^4 - 2x^2y^2 + y^4}{4x^2y^2} \right) (x^4 - 2x^2y^2 + y^4).$$

$$5) \quad \left(\frac{2x^2 + 3xy}{2x^2 - 3xy} \right)^2. \quad 6) \quad \frac{\alpha\gamma + \beta\gamma + \alpha\delta + \beta\delta}{\alpha\gamma - \beta\gamma - \alpha\delta + \beta\delta} \cdot \frac{\alpha\gamma - \beta\gamma + \alpha\delta - \beta\delta}{\alpha\gamma + \beta\gamma - \alpha\delta - \beta\delta}.$$

· *Ομάς δευτέρα.* 1) "Εγει τις 5λ δραχμάς. 'Εκ τούτων ἑξοδεύει πρῶτον τὸ τρίτον, ἔπειτα τὸ ἕβδομον καὶ τέλος τὰ $\frac{4}{9}$ τοῦ ἀρχικοῦ ποσοῦ. Πόσα τῷ ἔμειναν; $\frac{25\lambda}{63}$.

2) "Εγει τις $\beta - 1$ δραχμὰς καὶ ἑξοδεύει τὸ τέταρτον αὐτῶν καὶ τὰ $\frac{3}{7}$ τοῦ ὑπολογισμοῦ. Πόσα τῷ ἔμειναν; $\frac{3}{7}(\beta - 1)$.

3) "Εγει τις α δραχμὰς καὶ ἑξοδεύει πρῶτον 90 δργ. καὶ ἔπειτα τὰ $\frac{4}{9}$ τοῦ ὑπολογίου πόσαι δραχμαὶ τῷ μένουν; $\left(\frac{5\alpha}{9} - 50 \right)$.

4) "Εγει τις γ δραχμὰς καὶ γάνει πρῶτον τὰ $\frac{2}{7}$ αὐτῶν, ἔπειτα τὰ $\frac{2}{5}$ τοῦ ὑπολογίου καὶ 1 δραχμὴν τέλος γάνει πάλιν τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ νέου ὑπολογίου καὶ 1 δραχμὴν. Πόσαι δραχμαὶ τῷ ἔμειναν; $\frac{2\gamma}{7} - \frac{5}{3}$.

5) 'Απὸ μίαν βρύσιν τρέχουν 7 ὄκ. ὅδατος εἰς 5''· ἀπὸ ἄλλην 9 ὄκ. εἰς 4''. Πόσα τὸν ὁκάδες θὰ τρέξουν καὶ ἐκ τῶν δύο, ἐὰν ἡ μὲν πρώτη τρέχῃ ἐπὶ τ'', ἡ δὲ ἄλλη ὁκαὶ 2'' βραδύτερον, κλείσουν δὲ συγγρόνως; $\frac{73\tau}{20} - \frac{9}{2}$

37. Διαχείρεσις κλάσματων. —

Έστω ότι ζητεῖται νὰ εύρωμεν τὸ πηλίκον

$$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta}$$

Λέγω, ότι τοῦτο εἶναι ίσον μὲ $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$. Διότι θὰ ξέχωμεν
 $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma} = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$.

Ήτοι «διὰ νὰ διαιρέσωμεν παράστασίν τινα διὰ κλάσματος, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὴν δοθεῖσαν παράστασιν ἐπὶ τὸ ἀντίστροφον τοῦ δοθέντος κλάσματος». Οὕτω π. γ., τὸ

$$\frac{12\alpha^2}{\beta^2} : \frac{3\alpha\beta^2}{40} = \frac{12\alpha^2}{\beta^2} \cdot \frac{40}{3\alpha\beta^2} = \frac{120\alpha^2}{3\alpha\beta^4} = \frac{40\alpha}{\beta^4}.$$

$$\text{Τὸ } \frac{15(\alpha+\beta)}{22(\alpha-\beta)} : \frac{5(\alpha+\beta)^2}{11(\alpha-\beta)} = \frac{15(\alpha+\beta)}{22(\alpha-\beta)} \cdot \frac{11(\alpha-\beta)}{5(\alpha+\beta)^2} = \frac{3}{2(\alpha+\beta)}.$$

Ασκήσεις καὶ προβλήματα

Όμάς πρώτη. Νὰ εὑρέθων τὰ ἔκαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων

$$1) \frac{12x y^2}{7\alpha^2 \beta} : \frac{5x^2 y}{15\alpha \beta^2} \quad 2) \frac{12\alpha^2}{\beta^2} : \frac{3\alpha \beta^2}{10}$$

$$3) \alpha^3 : \left(\alpha^2 \cdot \frac{\alpha}{\beta} \right). \quad 4) \frac{9\gamma^2}{28\alpha^3 \beta^2} : \left(\frac{12\alpha^2 \beta}{7\gamma^2} : 4\beta^2 \gamma \right).$$

(δοκιμαὶ διὰ $x = y = 1$, $\alpha = 2$, $\beta = \gamma = 3$).

Όμάς δευτέρα. Όμοιως τῶν

$$1) \left(\frac{\alpha^2}{\beta^2} - \frac{\alpha}{\beta} - 1 \right) : \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}. \quad 2) \frac{\alpha^2 - \beta^2}{x^2 - y^2} : \frac{x^4 - \beta^4}{x^4 - 2x^2y^2 + y^4}.$$

$$3) \left(\frac{x-2}{3} - \frac{x-4}{5} \right) : \frac{6}{25} (\alpha+1). \quad 4) \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} \right) : \frac{x}{x^2-1}.$$

$$5) \frac{\alpha^2 + \alpha x + \alpha y + xy}{\alpha^2 - \alpha x - \alpha y + xy} : \frac{\alpha^2 - x x + \alpha y - x y}{\alpha^2 + \alpha x - \alpha y - xy}. \quad \text{δοκιμαὶ διὰ } x = y = 3.$$

$$6) \left(\frac{\alpha}{\alpha+2\beta} + \frac{\alpha}{\alpha-2\beta} \right) : \frac{2\alpha^2}{\alpha^2 - 4\beta^2}. \quad \alpha = \beta = 2.$$

Όμάς τρίτη. 1) "Εγει τις α δραγμάς. Τὸ ποσὸν τοῦτο αὐξάνει κατὰ τὸ πέμπτον αὐτοῦ. 'Εξοδεύει τὸ $\frac{1}{4}$ τῶν ὅσων οὔτω ξεγει, καὶ αὐξάνει ὅσα τῷ μέγουν κατὰ τὸ

$$\frac{1}{2} αὐτῶν. Πόσα ξεγει εἰς τὸ τέλος; \quad \frac{27\alpha}{20}.$$

$$2) "Εγει τις α δραγμάς, αὐξάνει αὐτὰς κατὰ τὸ $\frac{1}{4}$ τῶν. 'Εξοδεύει ξεπειτα$$

$$5 δραγμάς, καὶ τὸ ὑπολειψθὲν αὐξάνει κατὰ τὸ $\frac{1}{4}$ αὐτοῦ, ξεξοδεύει δὲ πάλιν 5 δραγμάς. Πόσας δραγμᾶς ξεγει εἰς τὸ τέλος;$$

$$\frac{25\alpha - 18\sigma}{16}.$$

3) Χωρικός τις ἔφερεν εἰς τὴν ἀγορὰν ($16\alpha + 30$) ὡὰ πρὸς πώλησιν. Ἐν πρώτοις ἐπώλησε τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν ὅσων ἔφερε καὶ ἔν ὠὸν ἐπὶ πλέον· ἔπειτα ἐκ τοῦ ὑπολοίπου τὸ $\frac{1}{2}$ καὶ ἀκόμη ἐν ὠόν. Όμοίως καὶ τρίτην καὶ τετάρτην φοράν. Πόσα ὡὰ τῷ ἔμειναν εἰς τὸ τέλος;

α.

§ 58. Σύνθετα κλάσματα.—

α') Σύνθετον κλάσμα καλεῖται κλάσμα τι, ἐὰν τούλαχιστον εἰς τῶν δρων του δὲν εἶνε ἀκέραιος.

Οὕτω τὸ κλάσμα

$$\frac{3x}{4x-1}$$

εἶνε σύνθετον.

β') Ἐπειδὴ πᾶν κλάσμα εἶνε πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του, ἔπειται ὅτι ἔχομεν

$$\frac{3x}{4x-1} = 3x \cdot \frac{4x-1}{4} = 3x \cdot \frac{4}{4x-1} = \frac{12x}{4x-1}$$

”Ητοι, «ἴνα κλάσμα σύνθετον καταστήσωμεν ἀπλοῦν, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμητὴν του διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του».

γ') Συντομώτερος τρόπος διὰ νὰ καταστήσωμεν σύνθετόν τι κλάσμα ἀπλοῦν, εἶνε δὲ ἔξῆς.

Ἐνδιόσκομεν τὸ ἐ. κ. π. τῶν παρονομαστῶν τῶν κλασμάτων τοῦ ἀριθμητοῦ καὶ παρονομαστοῦ τοῦ δοθέντος συνθέτου κλάσματος, καὶ ἐπ' αὐτὸ πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο δρους τοῦ δοθέντος κλάσματος.
”Εστω τὸ κλάσμα

$$\frac{\frac{\alpha}{\alpha-x} - \frac{\alpha}{\alpha+x}}{\frac{x}{\alpha-x} + \frac{x}{\alpha+x}}$$

Τὸ ἐ. κ. π. τῶν $\alpha-x$, καὶ $\alpha+x$ εἶνε τὸ γινόμενον αὐτῶν $(\alpha-x)(\alpha+x)$. Πολλαπλασιάζοντες τοὺς δρους τοῦ δοθέντος κλάσματος ἐπὶ τὸ γινόμενον τοῦτο, ενδιόσκομεν

$$\frac{\alpha(\alpha+x) - (\alpha-x)\alpha}{x(\alpha+x) + x(\alpha-x)} = \frac{\alpha^2 + \alpha x - \alpha^2 + \alpha x}{\alpha x + x^2 + \alpha x - x^2} = \frac{2\alpha x}{2\alpha x} = 1.$$

Διὰ νὰ ἀπλοποιήσωμεν τὸ κλάσμα

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 - x}}$$

πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους τοῦ συνθέτου κλάσματος

$$1 + \frac{1}{1 - x}$$

ἐπὶ $(1 - x)$ καὶ εὑρίσκομεν $\frac{1 - x}{2 - x}$. Ωστε ἀντὶ τοῦ δοθέντος ἔχομεν τὸ ἴσοδύναμόν του

$$1 + \frac{1}{1 - x}$$

Πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους τούτου ἐπὶ $2 - x$ καὶ εὑρίσκομεν

$$\frac{2 - x}{3 - 2x}$$

A σκήσεις

Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ κάτωθι κλάσματα

$$1) \frac{\frac{x}{\mu} + \frac{y}{\mu}}{\frac{\omega}{\mu}}. \quad 2) \frac{\frac{2\mu + v}{\mu + v} + 1}{1 + \frac{v}{\mu + v}} \quad (\deltaοκιμαὶ διὰ x = y = \omega = \mu = 4, v = 2)$$

$$3) \frac{\frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta} - 1}{\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} + 1}. \quad 4) \frac{\frac{x+1}{x-1}}{x - \frac{1}{x}} \quad (\deltaοκιμαὶ διὰ \alpha = 2, \beta = 1, x = 2)$$

$$5) \frac{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}}{\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\gamma} + \frac{\gamma}{\alpha}} \quad \begin{matrix} \deltaοκιμὴ \\ \text{διὰ } \alpha = 1 \\ \beta = -4, \gamma = 2. \end{matrix} \quad 6) \frac{x + y}{x + y + \frac{1}{x + y}}$$

$$7) \frac{\frac{x + \frac{1}{y}}{1}}{x + \frac{1}{y + \frac{1}{x}}} - \frac{1}{y(x y \omega + x + \omega)} \cdot \left(\begin{matrix} \deltaοκιμαὶ \\ \text{διὰ } x = 2 \\ y = \omega = 1 \end{matrix} \right).$$

$$8) \frac{\frac{x^2 - y^2 - \omega^2 - 2y\omega}{x^2 - y^2 - \omega^2 + 2y\omega}}{\frac{x - y - \omega}{x + y - \omega}} \quad \begin{matrix} \deltaοκιμαὶ \\ \text{διὰ } x = 3 \\ y = 1, \omega = -1. \end{matrix} \quad 9) \frac{\frac{x+y}{x-y} - \frac{x-y}{x+y}}{\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y}}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Ἐξισώσεις πρώτου βαθμοῦ μὲν α ἀγνωστον

§ 59. Ορισμοί.—

α') "Εστω ὅτι ἔχομεν τὴν ἴσοτητα $3x = 15$.

'Εκ τοῦ δρισμοῦ τῆς διαιρέσεως ενδίσκομεν ἀμέσως, ὅτι τὸ x ἔχει τὴν τιμὴν 5. Ἐπομένως, ἐὰν εἰς τὴν ἴσοτητα αὐτὴν θέσωμεν ἀντὶ τοῦ x τὴν τιμὴν 5, θὰ εὑρομεν

$$3 \cdot 5 = 15. \quad \text{Ητοι} \quad 15 = 15.$$

Διὰ πᾶσαν ἄλλην τιμὴν τοῦ x ἢ ἐν λόγῳ ἴσοτης δὲν δίδει ἀριθμοὺς ἵσους, ἥτοι δὲν ἀληθεύει. Ὁμοίως ἡ ἴσοτης $3x = 12$ ἀληθεύει διὰ μόνην τὴν τιμὴν $x = 4$, καθὼς εὐκόλως βλέπομεν, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν ἀντὶ τοῦ x τὸν 4.

'Εὰν ἔξι ἄλλου εἰς τὴν ἴσοτητα

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha$$

ἀντικατάστησωμεν τὸν α καὶ β δι' οἰωνδήποτε ἀριθμῶν π.γ. τῶν $\alpha = 1$ καὶ $\beta = 3$, ἢ τῶν $\alpha = 5$ καὶ $\beta = 7$, βλέπομεν ὅτι προκύπτουν ἀριθμοὶ ἵσοι $4 = 4$, $12 = 12$. 'Εκ τούτων συνάγομεν, ὅτι ὑπάρχουν ἴσοτητες ἀλγεβρικῶν παραστάσεων, αἱ δοποῖαι ἀληθεύουν μόνον, ὅταν τὸ γράμμα ἢ τὰ γράμματά των λάβουν ἀρμοδίας τιμὰς καὶ ἄλλαι, αἱ δοποῖαι ἀληθεύουν διὰ πάσας τὰς τιμὰς τῶν γραμμάτων των. Τὰς πρώτας καλοῦμεν ἐξισώσεις, τὰς δ' ἄλλας ταῦτα.

β') *Ἐξισωσις λέγεται ἡ ἴσοτης, ἡ δοποίᾳ ἀληθεύει μόνον ὅταν τὸ γράμμα ἢ τὰ γράμματα αὐτῆς λάβουν ἀρμοδίας τιμάς.*

γ') *Ταῦτης λέγεται ἡ ἴσοτης, ἡ δοποίᾳ ἀληθεύει διὰ πάσας τὰς τιμὰς καθενὸς τῶν γραμμάτων, τὰ δοποῖα περιέχει.*

δ') *Καλοῦμεν ἀγνώστους ἐξισώσεώς τινος τὰ γράμματα, τὰ δοποῖα πρέπει νὰ λάβουν ὠρισμένας τιμάς, διὰ νὰ ἀληθεύσῃ ἡ ἐξισωσις.*

ε') *Τιμαὶ τῶν ἀγνώστων λέγονται οἱ ἀριθμοί, οἱ δοποῖοι ἀντικαθισῶντες τοὺς ἀγνώστους ἐπαληθεύουν τὴν ἐξισωσιν. Αἱ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων ἐξισώσεώς τινος λέγονται καὶ φέρονται τῆς ἐξισώσεως.*

Σ') Συνήθως παριστάνομεν τοὺς ἀγνώστους ἔξισώσεως τινος διὰ τῶν τελευταίων γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου x, y, ω, φ, . . . , τοὺς δὲ γνωστοὺς ἀριθμοὺς διὰ τῶν α, β, γ, . . .

ζ') Λόνσις ἔξισώσεως λέγεται ἡ εὔρεσις τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων της, ἢ ἡ εὔρεσις τῶν ριζῶν της.

η') Ισοδύναμοι λέγονται δύο ἢ περισσότεραι ἔξισώσεις, ἐὰν ἐπαληθεύωνται διὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων, ἢτοι

« 1) ἐὰν πᾶσα ρίζα τῆς πρώτης ἔξισώσεως εἴνε καὶ ρίζα τῆς δευτέρας 2) πᾶσα ρίζα τῆς δευτέρας εἴνε ρίζα καὶ τῆς πρώτης ».

Θ') Αἱ ἑκατέρωθεν τοῦ σημείου τῆς ἴσοτητος παραστάσεις λέγονται μέλη τῆς ἔξισώσεως, (πρῶτον ἢ ἀριστερόν, καὶ δεύτερον ἢ δεξιόν).

ε') Ἐξίσωσίς τις λέγεται ἀριθμητική, ἐὰν οὐδεὶς τῶν ὅρων τῆς περιέχῃ γράμματα ἐκτὸς τῶν ἀγνώστων ἐγγράμματος δέ, ἀν τούναντίον. Οὕτω ἡ ἔξισωσις $8x + 12x - 3 = 4x$ εἴνε ἀριθμητική, ἐνῶ ἡ $3x - 5a = 8\beta + 2$ εἴνε ἐγγράμματος.

§ 60. Ιδεότητες τῶν ἔξισώσεων.—

α') « Ἐὰν εἰς τὰ μέλη ἔξισώσεως προσθέσωμεν (ἢ ἀφαιρέσωμεν) τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, προκύπτει ἔξισωσις ἴσοδύναμος».

Πράγματι, ἔστω ἡ ἔξισωσις $8x = 32$.

Ἐὰν εἰς τὰ μέλη αὐτῆς προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, π. γ. τὸν 6, προκύπτει $8x + 6 = 32 + 6$,

ἡ ὅποια, λέγω ὅτι εἴνε ἴσοδύναμος μὲ τὴν δοθεῖσαν. Διότι, ἡ τιμὴ τοῦ x εἰς τὴν πρώτην ἔξισωσιν εἴνε δ 4, καθὼς εὐκόλως φαίνεται, καὶ εἴνε

$$8 \cdot 4 = 32.$$

‘Αλλ’ ἀν εἰς ἴσους ἀριθμοὺς προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, προκύπτουν ἴσοι. Ἡτοι θὰ εἴνε καὶ $8 \cdot 4 + 6 = 32 + 6$. (1)

‘Αντικαθιστῶμεν καὶ εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν τὸ x διὰ τοῦ 4. Ενδίσκομεν ἐκ μὲν τοῦ πρώτου μέλους τῆς $8 \cdot 4 + 6$, ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου $32 + 6$.’ Άλλὰ τὰ ἔξαγόμενα αὐτὰ εἴνε ἴσα, ὡς εἴδομεν (1). “Ωστε ἡ ρίζα 4 τῆς πρώτης ἔξισώσεως εἴνε ρίζα καὶ τῆς δευτέρας ἔξισώσεως. Καὶ ἀντιστρόφως” ἡ ρίζα τῆς δευτέρας εἴνε καὶ τῆς πρώτης ἔξισώσεως. Διότι, ἐπειδὴ ἡ δευτέρα ἔξισωσις ἔχει τὴν ρίζαν 4, θὰ ἔχωμεν, ἀν ὑέσωμεν εἰς αὐτὴν ἀντὶ τοῦ x τὸ 4,

$$8 \cdot 4 + 6 = 32 + 6$$

"Αν δὲ ἀπὸ τοῦτος Ἰσους αὐτοὺς ἀριθμοὺς ἀφαιρέσωμεν τὸν 6, θὰ
ἔχωμεν

$$8.4 = 32$$

(2).

Θέτομεν τώρα καὶ εἰς τὴν δοθεῖσαν ἔξισωσιν ἀντὶ τοῦ χ τὴν φίζαν
4 τῆς δευτέρας. Εὑρίσκομεν ἐκ μὲν τοῦ πρώτου μέλους της 8. 4, ἐκ δὲ
τοῦ δευτέρου τὸ 32. 'Αλλ' αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ εἶναι Ἰσοι (2). 'Επομένως
ἡ φίζα τῆς δευτέρας ἔξισώσεως εἶναι φίζα καὶ τῆς πρώτης.

6' *) 'Εν γένει, ἔστω ἡ ἔξισωσις

$$\sigma(x, y, \dots) = \varphi(x, y, \dots) \quad (1),$$

ὅπου τὸ $\sigma(x, y, \dots)$ καὶ $\varphi(x, y, \dots)$ παριστάνουν τὸ πρῶτον
καὶ δευτέρον μέλος τῆς ἔξισώσεως, τὰ δὲ x, y, \dots τοὺς ἀγνώστους
αὐτῆς. Λέγω ὅτι ἡ ἔξισωσις

$$\sigma(x, y, \dots) + a = \varphi(x, y, \dots) + a \quad (2)$$

ὅπου τὸ a παριστάνει οἷονδήποτε ἀριθμόν, εἶναι Ἰσοδύναμος μὲτην
δοθεῖσαν.

Διότι, ἀν ὑποτεθῇ ὅτι ἐλύσαμεν τὴν πρώτην ἔξισωσιν, καὶ εὑρομεν
τὰς τιμὰς $x = \lambda, y = \mu, \dots$ τῶν ἀγνώστων, θὰ εἶναι

$$\sigma(\lambda, \mu, \dots) = \varphi(\lambda, \mu, \dots).$$

Θέτομεν καὶ εἰς τὴν ἔξισωσιν (2) ἀντὶ τοῦ x, y, \dots τὰ λ, μ, \dots δτε
ἐκ μὲν τοῦ πρώτου μέλους εὑρίσκομεν $\sigma(\lambda, \mu, \dots) + a$, ἐκ δὲ τοῦ
δευτέρου $\varphi(\lambda, \mu, \dots) + a$. 'Αλλ' ἀφοῦ οἱ ἀριθμοὶ $\sigma(\lambda, \mu, \dots)$ καὶ
 $\varphi(\lambda, \mu, \dots)$ εἶναι Ἰσοι, καὶ οἱ $\sigma(\lambda, \mu, \dots) + a, \varphi(\lambda, \mu, \dots) + a$
εἶναι Ἰσοι. Δηλαδὴ αἱ φίζαι τῆς (1) εἶναι φίζαι καὶ τῆς (2). Καὶ ἀντι-
στρόφως ἀν ὑποτεθῇ ὅτι εὑρήκαμεν τὰς τιμὰς $x = \lambda', y = \mu', \dots$
τῆς ἔξισώσεως (2), θὰ ἔχωμεν ὅτι

$$\sigma(\lambda', \mu', \dots) + a = \varphi(\lambda', \mu', \dots) + a.$$

"Αν θέσωμεν καὶ εἰς τὴν (1) $x = \lambda', y = \mu', \dots$ θὰ εὗρομεν ἀπὸ
μὲν τὸ πρῶτον μέλος $\sigma(\lambda', \mu', \dots)$, ἀπὸ δὲ τὸ δευτέρον $\varphi(\lambda', \mu', \dots)$.
'Αλλ' ἀφοῦ τὸ $\sigma(\lambda', \mu', \dots) + a$ εἶναι Ἰσον μὲ τὸ $\varphi(\lambda', \mu', \dots) + a$,
ἔπειται ὅτι καὶ $\sigma(\lambda', \mu', \dots) = \varphi(\lambda', \mu', \dots)$.

Δηλαδὴ αἱ φίζαι τῆς ἔξισώσεως (2) εἶναι φίζαι καὶ τῆς (1). 'Επο-
μένως αἱ ἔξισώσεις (1) καὶ (2) εἶναι Ἰσοδύναμοι.

γ') «Ἐὰν τὰ μέλη ἔξισώσεως πολλαπλασιάσωμεν (ἢ διαιρέσωμεν) μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν (διάφορον τοῦ μηδενός), προκύπτει ἔξισωσις ἵσοδύναμος».

$$\text{Έστω } \pi. \chi. \text{ ἢ } \text{ἔξισωσις} \quad 7x = 35.$$

$$\text{Λέγω } \delta\text{τι καὶ } \eta \quad \frac{7x}{3} = \frac{35}{3}$$

ἡ δοία προκύπτει ἐκ τῆς πρώτης, ἀν διαιρέσωμεν τὰ μέλη της διὰ τοῦ 3, εἶνε ἵσοδύναμος πρὸς αὐτήν. Διότι, καθὼς εὐκόλως φαίνεται, ἡ οἵζα τῆς πρώτης εἶνε $\eta x = 5$. Ἄρα, ἀντικαθιστῶντες ἀντὶ τοῦ x τὸν 5 εἰς τὴν δοθεῖσαν, ἔχομεν

$$7.5 = 35.$$

Ἄντικαθιστῶμεν εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν τὸ x διὰ τοῦ 5. Εὗρι-
σκομεν ἀπὸ μὲν τὸ πρῶτον μέλος $\frac{7.5}{3}$, ἀπὸ δὲ τὸ δεύτερον $\frac{35}{3}$.

Ἄλλὰ τὰ ἔξιγύμενα αὐτὰ εἶνε ἵσα. Διότι προκύπτουν ἀπὸ τοὺς ἵσους ἀριθμοὺς 7.5 καὶ 35, ἀφοῦ τοὺς διαιρέσωμεν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ 3.

Ἐπομένως ἡ οἵζα $x = 5$ τῆς πρώτης ἔξισώσεως εἶνε οἵζα καὶ τῆς δευτέρας. Καὶ ἀντιστρόφως ἀποδεικνύεται δτι, ἐὰν εὑρεθῇ ἡ οἵζα τῆς

δευτέρας ἔξισώσεως $\frac{7x}{3} = \frac{35}{3}$, αὐτὴ θὰ εἶνε οἵζα καὶ τῆς πρώτης

$$7x = 35. \text{ Διότι } \eta \text{ οἵζα αὐτὴ } \text{εἶνε } \eta 5, \text{ καὶ } \theta\text{ὰ } \text{εἶνε } \frac{7.5}{3} = \frac{35}{3}.$$

Ἄλλὰ τότε καὶ 7.5 εἶνε ἵσον μὲ 35. Δηλαδὴ καὶ ἡ πρώτη ἔξισωσις ἔπαληθεύεται διὰ τὴν αὐτὴν τιμὴν τοῦ $x = 5$.

δ' *) Γενικῶς ἀποδεικνύεται δτι ἡ ἔξισωσις

$$\sigma(x, y, \dots) = \varphi(x, y, \dots)$$

εἶνε ἵσοδύναμος μὲ τὴν

$$\sigma(x, y, \dots). \varrho = \varphi(x, z, \dots) \varrho,$$

ὅπου τὸ ϱ εἶνε ἀριθμός τις διάφορος τοῦ μηδενός. Ἡ ἀπόδειξις γίνεται, καθὼς καὶ ἡ προηγούμενη (β^{**}).

ε') Ἐπειδή, ὅταν πολλαπλασιάσωμεν τὰ δύο μέλη ἔξισώσεώς τινος ἐπὶ μηδὲν προκύπτει $0 = 0$, ἡ δὲ διαιρεσίς διὰ τοῦ μηδενὸς εἶνε ἀδύνατος ($\S 54$, γ'), ἐπειτα δτι, ἡ ἀνωτέρω ἴδιότης δὲν ἀληθεύει, ὅταν ὁ ἀριθμὸς μὲ τὸν ὁποῖον πολλαπλασιάζομεν ἥδιαιροῦμεν τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως εἶνε ψυδέν.

ζ') "Αν δο πολλαπλασιαστής, ή δο διαιρέτης, είνε παράστασις, ή δο ποία περιέχει γράμματα, διάφορα τῶν ἀγνώστων τῆς ἔξισώσεως, ή νέα ἔξισωσις είνε ίσοδύναμος μὲ τὴν δοθεῖσαν μόνον διὰ τὰς τιμᾶς τῶν γραμμάτων, αἱ δοποίαι δὲν μηδενέζουν τὴν παράστασιν. Π. χ. ἂν δο πολλαπλασιαστής ή δο διαιρέτης είνε α — β, πρέπει τὸ α — β νὰ είνε διάφορον τοῦ μηδενὸς (σημειώνομεν δ' αὐτὸ οὗτο

$$\alpha - \beta \neq 0 \text{ ή } \alpha \neq \beta.$$

Διότι, ἂν είνε $\alpha - \beta = 0$, ἐπανερχόμεθα εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν, τὴν δοποίαν ἔξισωσαμεν.

ζ') "Αν δο πολλαπλασιαστής ή δο διαιρέτης είνε παράστασις, ἔχουσα ἔνα ή περισσοτέρους ἀγνώστους τῆς δοθείσης ἔξισώσεως, ή προκύπτουσα ἔξισωσις δὲν είνε πάντοτε ίσοδύναμος μὲ τὴν δοθεῖσαν. Π. χ. ή ἔξισωσις $3x = 4$, καὶ ή $3x(x - 2) = 4(x - 2)$ δὲν είνε ίσοδύναμοι. Διότι, ή δευτέρα ἔχει τὴν φράσην 2, καθὼς φαίνεται, ἀν θέσωμεν ἀντὶ τοῦ x τὸ 2 εἰς αὐτήν, ἐνῶ ή πρώτη δὲν τὴν ἔχει.

§ 61. Μεταφορὰ ὄρου ἀπὸ ἐν μέλος ἴσοτητος εἰς ἄλλο.—

α') "Εστω ή ἔξισωσις $x - \beta = a$.

Ἐὰν εἰς τὰ μέλη αὐτῆς προσθέσωμεν τὸν ἀριθμὸν β , λαμβάνομεν

$$x - \beta + \beta = a + \beta.$$

'Επειδὴ $- \beta + \beta = 0$ μὲ μηδέν, μένει $x = a + \beta$.

Τὸ αὐτὸ έξαγόμενον προκύπτει, καὶ ἐὰν εἰς τὴν δοθεῖσαν ἔξισωσιν μεταφέρωμεν τὸ $- \beta$ ἐκ τοῦ πρώτου μέλους εἰς τὸ δεύτερον μὲ τὸ ἀντίθετον σημεῖον. Ομοίως ἐκ τῆς ἔξισώσεως

$$x + \beta = a, \text{ λαμβάνομεν } x = a - \beta,$$

ἐὰν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς δοθείσης τὸν β , ή ἀν μεταφέρωμεν τὸ β εἰς δεύτερον μέλος μὲ ἀντίθετον σημεῖον. "Οδεν

"εἰς πᾶσαν ἔξισωσιν δυνάμεθα νὰ μεταφέρωμεν δρον τινὰ ἐκ τοῦ ἑνὸς μέλους εἰς τὸ ἄλλο μὲ ἡλλαγμένον τὸ σημεῖόν του».

"Ἐκ τούτου ἔπειται ὅτι,

"ἀν δρος τις ὑπάρχῃ εἰς τὰ μέλη ἔξισώσεως μὲ τὸ αὐτὸ σημεῖον, δυνάμεθα νὰ τὸν παραλείπωμεν, καὶ ή προκύπτουσα ἔξισωσις είνε ίσοδύναμος πρὸς τὴν δοθεῖσαν».

$$6') \text{ Εστω } \eta \text{ ἔξισωσις \quad } \gamma - x = a - \beta \quad (1)$$

Ἐὰν μεταφέρωμεν καθένα ὅρον της εἰς τὸ ἄλλο μέλος αὐτῆς μὲ
ἀντίθετον σημεῖον, εὑρίσκομεν

$$\beta - a = x - \gamma, \quad \eta \quad x - \gamma = \beta - a \quad (2)$$

Ἡ ἔξισωσις (2) προκύπτει ἐκ τῆς (1) καὶ ἐὰν ἀλλάξωμεν τὸ ση-
μεῖον καθενὸς τῶν ὅρων της. «Ωστε,

«ἐὰν ἀλλάξωμεν τὰ σημεῖα πάντων τῶν ὅρων ἔξισώσεως, προ-
κύπτει ἔξισωσις ἰσοδύναμος».

γ') Προφανῶς ἔχομεν ὅτι η ἔξισωσις $A = B$ (ὅπου τὸ A καὶ B
παριστάνουν τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον μέλος της) εἶναι ἰσοδύναμος μὲ
τὴν $A - B = B - B = 0$, ἢ μὲ τὴν $A - B = 0$.

§ 62 'Απαλοιφὴ τῶν παρονομαστῶν ἔξισώσεως.—

α') Καλοῦμεν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν ἔξισώσεως τὴν
εὑρεσιν ἰσοδυνάμου αὐτῆς ἀνευ παρονομαστῶν.

$$\text{Έστω } \eta \text{ ἔξισωσις \quad } \frac{x}{3} - \frac{x-1}{11} = x - 9.$$

Ἐὰν τὰ δύο ἵσα πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ ἐ. κ. π. τῶν παρονομα-
στῶν 3 καὶ 11, δηλαδὴ ἐπὶ 33, καὶ ἀπλοποιήσωμεν, εὑρίσκομεν τὴν
 $11x - 3x + 3 = 33x - 297$.

Ἡ ἔξισωσις αὗτη εἶναι ἀπηλλαγμένη παρονομαστῶν καὶ ἰσοδύνα-
μος μὲ τὴν δοθεῖσαν.

6') Εν γένει, «ἐὰν ἔξισωσις ἔχῃ ὅρους κλασματικούς, δυνάμεθα
να εὑρωμεν ἰσοδύναμόν της ἀνευ παρονομαστῶν, ἐὰν 1) εὑρωμεν
τὸ ἐ. κ. π. τῶν παρονομαστῶν τῶν κλασμάτων 2) πολλαπλα-
σιάσωμεν τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως ἐπὶ τὸ εὑρεθὲν ἐ. κ. π. 3) ἀπλο-
ποιήσωμεν τοὺς ὅρους τῶν κλασμάτων».

$$\text{Έστω } \pi. \chi. \eta \text{ ἔξισωσις } \frac{x-4}{x-5} - \frac{x-5}{x-6} = \frac{x-7}{x-8} - \frac{x-8}{x-9}$$

Τὸ ἐ. κ. π. τῶν παρονομαστῶν εἶναι

$$(x-5). \quad (x-6). \quad (x-8). \quad (x-9).$$

Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως ἐπὶ τὸ ἐ. κ. π. καὶ
ἀπλοποιοῦντες εὑρίσκομεν

$(x-4)(x-6)(x-8)(x-9) - (x-5)^2(x-8)(x-9)$
 $= (x-7)(x-5)(x-6)(x-9) - (x-8)^2(x-5)(x-6)$,
 ἡ δοπία εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν δοθεῖσαν καὶ ἀπηλλαγμένη παρο-
νομαστῶν.

γ') Διὰ συντομίαν, ἀντὶ νὰ πολλαπλασιάζωμεν τὰ μέλη ἐπὶ τὸ ἐ. κ. π. τῶν παρονομαστῶν καὶ νὰ ἀπλοποιοῦμεν, ἀρκεῖ, νὰ πολλαπλασιάζωμεν καθένα ἀριθμητὴν τῶν ὅρων τῆς ἔξισώσεως ἐπὶ τὸ πηλίκον τοῦ ἐ. κ. π. διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ ὅρου τούτου, καὶ νὰ παραλείπωμεν τοὺς παρονομαστάς. Π. χ. διὰ τὴν ἔξισωσιν

$$\frac{3x}{4} - \frac{2x-1}{5} - 1 = \frac{2}{3}$$

ἔχομεν τὴν ἴσοδύναμον

$$\begin{array}{cccc} 15 & 12 & 60 & 20 \\ \underline{3x} & \underline{2x-1} & \underline{1} & \underline{2} \\ \frac{3x}{4} - \frac{2x-1}{5} - \frac{1}{1} = \frac{2}{3} & & & (\text{ἐ. κ. π. } 60). \end{array}$$

Ἐνῶ οἱ ἀριθμοὶ 15, 12, 60, 20 εἶνε τὰ ἀντίστοιχα πηλίκα τοῦ ἐ. κ. π. 60 διὰ καθενὸς τῶν παρονομαστῶν 4, 5, 1, 3. Ἐπὶ τὰ πηλίκα αὐτὰ θὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀντίστοιχους ἀριθμητὰς τῶν ὅρων, χωρὶς νὰ λάβωμεν ὃν' ὅψιν πλέον τοὺς παρονομαστάς. Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πολλαπλασιασμῶν εὑρίσκομεν

$$45x - 24x + 12 - 60 = 40.$$

§ 63. Λύσις ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ μὲ ἔνα ἄγνωστον.—

α') Πρώτου βαθμοῦ (\neq ἀπλῆ) λέγεται μία ἔξισωσις, ἔχουσα ἓνα ἄγνωστον, ἐὰν μετὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν τῆς καὶ τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὅμοιών ὅρων, προκύπτῃ ἔξισωσις εἰς τὴν ὁποίαν, δοῦτος περιέχεται εἰς πρῶτον βαθμόν.

Οὕτω αἱ ἔξισώσεις $3x - 7 = 14 - 4x$, $\alpha x + \beta = \gamma$ εἶνε πρώτου βαθμοῦ.

β') Ἐστω διτὶ θέλομεν νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν

$$3x - 7 = 14 - 4x.$$

Ἐὰν τὸν ὅρον $-4x$ μεταφέρωμεν εἰς τὸ πρῶτον μέλος, τὸν δὲ -7 εἰς τὸ δεύτερον, εὑρίσκομεν τὴν ἴσοδύναμον ἔξισωσιν

$$3x + 4x = 14 + 7.$$

Ἐπτελοῦντες εἰς αὐτὴν τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὅμοιών ὅρων εὑρίσκομεν

$$7x = 21.$$

Ἐὰν τὰ μέλη ταύτης διαιρέσωμεν διὰ τοῦ συντελεστοῦ 7 τοῦ x, προκύπτει ἡ ἔξισωσις $x = 3$, ἵτις εἶνε ἴσοδύναμος μὲ τὴν δοθεῖσαν καὶ ἀληθεύει, ἀν τὸ x γίνη ἵσον μὲ 3. "Ἄρα καὶ ἡ φίζα τῆς δοθεῖσης εἶνε ἡ 3.

^γΕστω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισωσις

$$1 - 4(x - 2) = 7x - 3(3x - 1).$$

Ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν τοῦ — 4 ἐπὶ ($x - 2$) καὶ τοῦ — 3 ἐπὶ ($3x - 1$) εὑρίσκομεν,

$$1 - 4x + 8 = 7x - 9x + 3.$$

Εἰς αὐτὴν μεταφέρομεν τοὺς ὅρους, τοὺς ἔχοντας τὸν x εἰς τὸ πρῶτον μέλος, τοὺς δὲ ἄλλους εἰς τὸ δεύτερον, ὅτε προκύπτει ἡ

$$- 4x + 9x - 7x = 3 - 1 - 8,$$

καὶ μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὅμοίων ὅρων $- 2x = - 6$.

Διαιροῦντες τὰ μέλη ταύτης διὰ τοῦ συντελεστοῦ τοῦ x, εὑρίσκομεν ὅτι ἡ ζητουμένη τιμὴ τοῦ x εἶνε ἡ $x = \frac{6}{2} = 3$.

^γΕστω ἀκόμη ἡ ἔξισωσις

$$\frac{x}{3} - \frac{x-1}{11} = x - 9.$$

Διὰ νὰ λύσωμεν ταύτην, εὑρίσκομεν ἴσοδύναμόν της ἀνευ παρονομαστῶν, πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη της ἐπὶ τὸ ἐ. κ. π. 3.11 τῶν παρονομαστῶν 3 καὶ 11, ἢ καθένα τῶν ἀριθμητῶν ἀντιστοίχως ἐπὶ 11· 3· 33· 33 καὶ εὑρίσκομεν

$$11x - 3x + 3 = 33x - 297.$$

Ἐογαζόμενοι ἐπ' αὐτῆς ὡς ἀνωτέρῳ εὑρίσκομεν $x = 12$.

^{γ'}Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι

«διὰ νὰ λύσωμεν ἔξισωσιν πρώτου βαθμοῦ μὲ ἕνα ἀγνωστον 1) εὑρίσκομεν ἴσοδύναμόν της ἀνευ παρονομαστῶν 2) ἐκτελοῦμεν τὰς σημειωμένας πράξεις εἰς τὴν ἴσοδύναμον 3) χωρίζομεν τοὺς ὅρους, οἱ ὅποιοι ἔχουν τὸν ἀγνωστον, ἀπὸ τοὺς μὴ ἔχοντας αὐτόν, ἐν τῇ νέᾳ ἔξισώσει 4) ἐκτελοῦμεν ἀναγωγὴν τῶν ὅμοίων ὅρων, καὶ διαιροῦμεν τὰ μέλη τῆς τελευταίας διὰ τοῦ συντελεστοῦ τοῦ ἀγνώστου».

§ 64. Ἐπαλήθευσις ἐξισώσεως. —

Ἐὰν μετὰ τὴν λύσιν δοθείσης ἐξισώσεως ἀντικαταστήσωμεν εἰς αὐτὴν ἀντὶ τοῦ ἀγνώστου τὴν εὐρεθεῖσαν τιμήν του, θὰ εὑρωμεν δύο ἀριθμοὺς. Ισους ἡ μίαν ταῦτα ὡς πρὸς τὰ ἄλλα γράμματα, ἐὰν ἔχῃ τοι-
αῦτα. Ἡ ἐργασία αὐτῇ διὰ τῆς δοπίας δεικνύομεν, ὅτι ἡ εὐρεθεῖσα
τιμὴ τοῦ ἀγνώστου ἀληθεύει τὴν ἐξισωσιν, λέγεται ἐπαλήθευσις τῆς
ἐξισώσεως. Π. χ. ἐαν λύσωμεν τὴν ἐξισωσιν

$$\frac{x-\alpha}{5} = 2 \alpha,$$

εὑρίσκομεν $x = 11 \alpha$. Ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν δοθεῖσαν ἀντὶ τοῦ x

τὸ 11α , εὑρίσκομεν $\frac{11 \alpha - \alpha}{5} = 2 \alpha$

ἢ $11 \alpha - \alpha = 10 \alpha$, ἢ $10 \alpha = 10 \alpha$, ἡ δοπία εἶνε ταῦτα.

§ 65. Διερεύνησις τῆς ἐξισώσεως $\alpha x - \beta = 0$. —

α') Ἐκ πάσης ἐξισώσεως, ἔχουσης ἔνα ἀγνωστον, τὸν x , εἰς πρῶ-
τον βαθμόν, προκύπτει ίσοδύναμός της τῆς μορφῆς $\alpha x = \beta$, μετὰ
τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν, τὸν χωρισμὸν τῶν δρῶν, οἱ
δοπίοι ἔχουν τὸν x ἀπὸ ἐκείνους οἱ δοπίοι δὲν τὸν ἔχουν, καὶ τὴν
ἀναγωγὴν τῶν δμοίων δρῶν. Τὸ α καὶ β θὰ εἶνε ἀριθμοὶ γνωστοί,
ἢ παραστάσεις γνωσταί. Ὁταν λέγωμεν, ὅτι θὰ διερευνήσωμεν τὴν
ἐξισωσιν $\alpha x = \beta$, ἐννοοῦμεν ὅτι θὰ ζητήσωμεν νὰ ἀπαντήσωμεν εἰς
τὰς ἐξῆς ἐρωτήσεις 1) ἡ ἐξισωσις $\alpha x = \beta$ ἔχει μίαν φίζαν, ἢ δύναται
νὰ ἔχῃ καὶ περισσοτέρας; 2) τὶ πρέπει νὰ εἶνε τὰ α καὶ β διὰ νὰ
ἔχῃ μίαν φίζαν, καὶ τὶ διὰ νὰ ἔχῃ περισσοτέρας, ἢ καμμίαν;

β') Ἐὰν λύσωμεν τὴν ἐξισωσιν $\alpha x = \beta$, εὑρίσκομεν $x = \frac{\beta}{\alpha}$

Παρατηροῦμεν, ὅτι ἂγ τὸ α εἶνε διάφορον τοῦ μηδενός, ἡ τιμὴ^β
 $\frac{\beta}{\alpha}$ εἶνε ὠρισμένη καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν, ὅτι ἡ δο-
θεῖσα ἐξισωσις ἔχει μίαν μόνην φίζαν, ἢ μίαν μόνην λύσιν.

γ') Ἐὰν εἶνε $\alpha = 0$, καὶ $\beta \neq 0$, θὰ ἔχωμεν $0 \cdot x = \beta$, ἢ $0 = \beta$, τὸ
δοπίον εἶνε ἀδύνατον, καὶ λέγομεν ὅτι ἡ δοθεῖσα ἐξισωσις εἶνε ἀδύ-
νατος, ἢ ὅτι δὲν ἔχει καμμίαν λύσιν.

δ') Ἐὰν εἶνε $\alpha = 0$, καὶ $\beta = 0$, θὰ ἔχωμεν, ὅτι $0 \cdot x = 0$, ἢ $0 = 0$

καὶ προφανῶς τὸ x δύναται νὰ λάβῃ οἰανδήποτε τιμήν, λέγομεν

δέ, ὅτι ἡ δοθεῖσα ἔξισωσις εἶνε ταῦτό της (59, γ') καὶ ἔχει ἀπείρους φύσις τὸ πλῆθος.

ε') Πρόδει εὐκολίαν παραμέτεμεν τὸν κατωτέρῳ πίνακα τῶν περιπτώσεων τῆς λύσεως τῆς ἔξισώσεως τοῦ πρώτου βαθμοῦ α $x = \beta$.

Δύσεις τῆς ἔξισώσεως $a x = \beta$.

1) *Αν εἶνε $a \neq 0$ καὶ β οἰονδήποτε ὑπάρχει ψίᾳ φίζα, ἢ $x = \frac{\beta}{a}$*

2) *Αν εἶνε $a=0$, $\beta \neq 0$ δὲν ὑπάρχει καμία φίζα.*

3) *Αν εἶνε $a=0$, $\beta=0$ ὑπάρχουν ἀπειροι φίζαι (ταῦτα).*

A συγγρεις

Ομάς πρώτη. Νὰ γίνῃ ἡ λύσις καὶ ἡ ἐπαλγήθευσις τῶν ἔξισώσεων.

$$\alpha') \quad 3(x+4)=(x+2), \quad \beta') \quad \frac{x}{2} = 3,$$

$$\gamma') \quad \frac{3x}{2} - 4 = 4 + \frac{x}{4},$$

$$\delta') \quad 17x - 4(2x - 5) = 6(3x - 5) + 5(2x - 4) - 2.$$

$$\varepsilon') \quad \frac{3x}{2} + \frac{2x}{3} + \frac{3x}{4} + \frac{4x}{5} + \frac{5x}{6} = \frac{7x}{12} + 238.$$

$$\zeta') \quad \frac{2(3x-5)}{5} - \frac{5(5x+10)}{12} = \frac{7(3x+2)}{4} - 71.$$

$$\eta') \quad x - \left(\frac{x}{2} - \frac{2x}{3}\right) - \left(\frac{3x}{4} - \frac{4x}{6}\right) - \frac{6x}{7} = 66.$$

$$\theta') \quad \left(x + \frac{2}{3}\right) \left(x + \frac{3}{2}\right) = (x+5)(x-5).$$

$$\iota') \quad \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{6}\right).$$

$$\iota\alpha') \quad \frac{1}{(x-1)(x-2)} + \frac{2}{(x-2)(x-3)} + \frac{16}{(x-3)(x-4)} = \frac{19}{(x-2)(x-4)}$$

$$\iota\beta') \quad \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x-2)^2} - \frac{4(x-1)}{x^2(x-2)^2} + \frac{4}{x^2(x-2)} = 0.$$

$$\iota\gamma') \quad \frac{2x^3}{x^4-16} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{x-2}.$$

$$\iota\delta') \quad \frac{1}{2x^2+2x} + \frac{1}{5x^3-5x^2} - \frac{1}{2x^2-2x} = 0.$$

Ομάδας δεντρέρα. Λύσατε καὶ ἐπαληθεύσατε τὰς ἔξι σώσεις.

$$\alpha') (z+\beta) x + (z-\beta) x = 2z^3. \quad \beta') \frac{x}{\alpha \beta} + \frac{x}{\alpha \gamma} = \frac{1}{\beta \gamma}.$$

$$\gamma') \alpha (v x - \mu + \beta) = \beta (\mu - v x + \rho).$$

$$\delta') \alpha (x - z - 3) = ?(1 - x).$$

$$\varepsilon') 2 \mu (x - \mu) - 2v (v - x) = (\mu + v)^2 - (\mu - v)^2.$$

$$\varsigma') (x+z)^2 - (x+\beta)^2 = \beta - z.$$

$$\zeta') (x+1)^2 - \alpha(5-2z-x) = (x-2z)^2 - 5.$$

$$\eta') \frac{x}{z} + \frac{x}{z+\beta} = 2z+\beta. \quad \theta') \frac{\beta x + z}{2 z^2 \beta} + \frac{x-1}{3 \beta^2} = \frac{3 \beta^2 + 7 z^2}{6 z^2 \beta (z-\beta)},$$

$$\iota') \frac{2x+3\beta}{x(x-z)} + \frac{3x-5z}{(x-z)(x-\beta)} = \frac{5}{x-\beta}.$$

$$\alpha') \frac{2x+3}{z} + \frac{3x-2\beta+z-1}{3\alpha\beta+z^2} = \frac{2x+1}{z+3\rho} + + \frac{3}{z},$$

$$\varepsilon') \frac{8z}{(x+2)^2} + \frac{8\beta}{(x-2)^2} - \frac{(z+\beta)x^4}{(x^2-4)^2} = -(z+\beta).$$

§ 66. Έφαρμογή τῶν ἔξι σώσεων τοῦ πρώτου βαθμοῦ εἰς τὴν λύσιν προβλημάτων.—

α') Γνωρίζομεν (§ 17, δ') ὅτι, ἂν K παριστάνῃ κεφάλαιόν τι, Τ τὸν τόκον του εἰς χρόνον X καὶ E τὸ ἐπιτόκιον, πρὸς τὸ ὅποιον ἔτοκίσθη, θὰ ἔχωμεν τὸν τύπον

$$T = \frac{K \cdot E \cdot X}{100} \quad (1)$$

Ο τύπος οὗτος δίδει τὴν τιμὴν τοῦ T, ἐὰν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τοῦ K, E, X. Εὰν ὑποτεθοῦν γνωστὰ τὰ K, E, X, καὶ ἄγνωστον τὸ T ὁ (1) εἶναι ἔξισωσις πρώτου βαθμοῦ ὡς πρὸς T. Εκ τῆς (1) δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν τὸ K, ἢ τὸ E, ἢ τὸ X, ἐὰν τὰ ἀντίστοιχα τοία ἄλλα ποσὰ εἶναι γνωστά. Πρὸς τοῦτο, ἀρκεῖ νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν (1) ὡς πρὸς K, ἢ ὡς πρὸς E, ἢ ὡς πρὸς X, ὑποθέτοντες καθεμίαν φορὰν τὰ ἄλλα γνωστά. Παρατηροῦμεν λοιπόν, ὅτι μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἔξισώσεων δυνάμεθα, ἐνίστε, νὰ λύωμεν διάφορα προβλήματα ἀπὸ ἔνα καὶ μόνον τύπον, ὁ ὅποιος συνδέει τὰ ποσὰ τῶν προβλημάτων.

δ') Επίσης ἐν τῇ Γεωμετρίᾳ, Φυσικῇ καὶ Χημείᾳ δυνάμεθα, ἐνίστε, διὰ τῆς χορήσεως τῶν ἔξισώσεων νὰ λύωμεν διάφορα προβλήματα, τῶν ὅποιων ἢ λύσις συνδέεται μὲ τὴν λύσιν σχετικοῦ πρὸς αὐτά

προβλήματος. Οὗτω π. χ. ἐὰν Ε παριστάνη τὸ ἐμβαδὸν τραπεζίου, τὸ δποῖον ἔχει βάσεις α καὶ β, ὑψος δὲ υ, θὰ ἔχωμεν ὡς γνωστόν,

$$E = \frac{(\alpha + \beta) \cdot \upsilon}{2} \quad (2)$$

Δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ υ, τοῦ α, ἢ τοῦ β, ἐὰν λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν (2), θεωροῦντες καθεμίαν φορὰν τὰς ἄλλας ποσότητας γνωστάς. Οὗτω π. χ. εὑρίσκομεν ὅτι τὸ

$$\beta = \frac{2 E - \alpha \cdot \upsilon}{\upsilon}.$$

²Αν ε εἶνε τὸ εἰδικὸν βάρος ἐνὸς σώματος καὶ ω ὁ ὅγκος του, τὸ βάρος του β θὰ εἶνε $\beta = \epsilon \omega$. (3)

Ἐὰν θέλωμεν νὰ εῦρωμεν τὸ ε, ἢ τὸ ω ἐκ τῶν δύο ἄλλων ἀντιστοίχως, ἀρκεῖ, νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν (3) ὡς πρὸς ε, ἢ ὡς πρὸς ω, θεωροῦντες τὰς ἄλλας ποσότητας ἀντιστοίχως γνωστάς.

$$\text{Οὗτο ἔχομεν } \epsilon = \frac{\beta}{\omega}, \quad \text{καὶ} \quad \omega = \frac{\beta}{\epsilon}.$$

γ') Εἰς πᾶν πρόβλημα διακρίνομεν δεδομένα καὶ ζητούμενα, τὰ δποῖα πάντοτε εἶνε ἀριθμοί. Διὰ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος εὑρίσκομεν τὰ ζητούμενα, τὰ δποῖα ὡς ἀγνωστα παριστάνομεν συνήθως διὰ τῶν γραμμάτων x, y, ω, , τὰ δὲ γνωστὰ διὰ ἀριθμῶν, ἢ διατῶν α, β, γ,

δ') Διὰ νὰ λυθῇ πρόβλημά τι, πρέπει τὰ ζητούμενα αὐτοῦ νὰ πληροῦν δρισμένας τινὰς ἀπαιτήσεις. Τὰς ἀπαιτήσεις αὐτὰς καλοῦμεν δρους τοῦ προβλήματος.

ε') Έκείνους ἐκ τῶν δρων, οἱ δποῖοι δρίζουν τὰς σχέσεις, τὰς δποίας πρέπει νὰ ἔχουν τὰ ζητούμενα πρὸς τὰ δεδόμενα, καλοῦμεν ἐπιτάγματα. Τὰ ἐπιτάγματα γίνονται γνωστὰ κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος. Π. χ. εἰς τὸ πρόβλημα

«νὰ εὔρεθῇ ἀριθμός, τοῦ δποίου τὸ διπλάσιον νὰ τὸν ὑπερβαίνῃ κατὰ 6»,

τὸ ἐπίταγμα εἶνε ὅτι,

«τὸ διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ εἶνε μεγαλύτερον αὐτοῦ κατὰ 6».

Ἐπομένως, ἐὰν δ ζητούμενος ἀριθμὸς παρασταθῇ διὰ τοῦ x, τὸ διπλάσιόν του θὰ εἶνε 2 x. Ἐπειδὴ τὸ 2 x θὰ ὑπερβαίνῃ τὸν x κατὰ 6, πρέπει αἱ δύο παραστάσεις 2 x καὶ x + 6 νὰ εἶνε

ἴσαι. Οὕτω ἔχομεν νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν
ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν

$$2x = x + 6$$

$$x = 6.$$

Σ') Ἐνίστε ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς παριστάνει ποσόν τι, τὸ ὅποιολ
ἔνεκα τῆς φύσεως τοῦ προβλήματος ὑπόκειται εἰς ὅρους τινάς, τοὺς
ὅποιους πρέπει νὰ πληροῖ. Τοὺς τοιούτους ὅρους καλοῦμεν περιορι-
σμούς. Π. χ. ἂν διὰ τῆς λύσεως προβλήματός τινος ζητῆται τὸ πλή-
θος ἀνθρώπων, δυνάμεθα ἐκ τῶν προτέρων νὰ εἴπωμεν, ὅτι ὁ ζητού-
μενος ἀριθμὸς πρέπει νὰ εἴνε ἀκέραιος καὶ θετικός.

ζ') Ἐν γένει διὰ τὴν λύσιν προβλήματός τινος ἐργαζόμεθα ὡς ἔξης.

1) *Εὐρίσκομεν τὴν ἔξισωσιν τοῦ προβλήματος. Απλαδὴ ἐκφρά-
ζομεν δι' ἔξισώσεως τὰς σχέσεις, αἱ δοῦται συνδέοντα τὰ ζητούμενα
μὲ τὰ δεδομένα.*

1) *Λύσουμεν τὴν ἔξισωσιν. Οὕτω εὐρίσκομεν, τὶς εἴνε ὁ ἀρι-
θμός, ὁ δοῦτος δύναται νὰ λύσῃ τὸ πρόβλημα.*

3) *Ἐξετάζομεν, ἀν ὁ ἐκ τῆς λύσεως εὑρέθεις ἀριθμὸς πληροῖ
καὶ τὸν περιορισμὸν τοῦ προβλήματος.*

§ 67. Λύσεις ἀπλῶν προβλημάτων.—

(Πρόβλημα 1). «Τὸ τετραπλάσιον ἀριθμοῦ τινος εἴνε ἵσον μὲ
τὸν ἀριθμόν, αὐξηθέντα κατὰ 60. Ποῖος εἴνε ὁ ἀριθμός;».

Ἔστω x εἴνε ὁ ζητούμενος ἀριθμός. Τὸ τετραπλάσιόν του θὰ
είνε $4x$, τὸ δὲ $x + 60$ παριστάνει τὸν ἀριθμὸν αὐξηθέντον κατὰ 60.

Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος θὰ είνε τὸ $4x = x + 60$.

$$\text{Λύοντες δ' αὐτὴν εὐρίσκομεν } x = 20.$$

(Πρόβλημα 2). «Ο Ἰωάννης ἔχει τετραπλάσια μῆλα ἢ ἡ Μαρία,
καὶ οἱ δύο δὲ μαζὶν ἔχουν 45. Πόσα μῆλα ἔχει παθεῖς;».

Ἐὰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὰ μῆλα τῆς Μαρίας, τοῦ Ἰωάννου
θὰ παρασταθοῦν διὰ τοῦ $4x$, τῶν δύο δὲ μαζὶ διὰ τοῦ $4x + x$.
Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος τὸ ἄθροισμα αὐτὸς εἴνε 45.

$$\text{Ωστε ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν } x + 4x = 45.$$

$$\text{Ἐκ τῆς λύσεως δ' αὐτῆς εὐρίσκομεν } x = 9.$$

Ητοι ἡ μὲν Μαρία ἔχει 9 ὁ δὲ Ἰωάννης 36 μῆλα.

(Πρόβλημα 3). «Τὸ ἀθροισμα δύο ἀριθμῶν εἶνε 25· τὸ ἔξαπλάσιον τοῦ μεγαλυτέρου ἐλλατωθὲν κατὰ τὸ τετραπλάσιον τοῦ μικροτέρου δίδει 150· ποῖοι εἶνε οἱ ἀριθμοί;»

Ἐὰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν μεγαλύτερον τῶν ἀριθμῶν, ὁ μικρότερος θὰ εἴνε $25 - x$, τὸ ἔξαπλάσιον τοῦ μεγαλυτέρου $6x$, τὸ δὲ τετραπλάσιον τοῦ μικροτέρου $4(25 - x)$. Ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος ἡ διαφορὰ $6x - 4(25 - x)$ εἴνε 150, ἔπειται ὅτι θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν

$$6x - 4(25 - x) = 50$$

Ἐκ τῆς δοποίας εὑρίσκομεν $x = 15$.

Ἄρα οἱ δύο ἀριθμοὶ εἴνε οἱ 15 καὶ 10.

(Πρόβλημα 4). «Ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς εἶνε τριπλασία τῆς τοῦ γένους του· πρὸ δὲ 8 ἑτῶν ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς ἦτο τριπλασία τῆς τοῦ γένους του. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ ἡλικίαι των».

Ἐὰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὴν ἡλικίαν τοῦ γένους, ἡ τοῦ πατρὸς ἡ παρασταθῆ διὰ τοῦ $3x$. Ἡ ἡλικία τοῦ γένους πρὸ 8 ἑτῶν ἦτο $x - 8$, τοῦ δὲ πατρὸς $3x - 8$. Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τὸ $3x - 8$ εἴνε τετραπλάσιον τοῦ $x - 8$. Ἐπομένως ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν

$$3x - 8 = 4(x - 8),$$

Ἐκ τῆς δοποίας εὑρίσκομεν $x = 24$. Ἡτοι ἡ ἡλικία τοῦ γένους εἴνε 24 τοῦ δὲ πατρὸς 72 ἔτη.

(Πρόβλημα 5). «Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμός, δ ὁ δοποῖος προστιθέμενος εἰς τὸν δρονὸς τοῦ κλάσματος $\frac{7}{11}$ τὸ κάμνει 150 μέρη $\frac{1}{4}$ ».

Ἐὰν παραστήσωμεν διὰ τοῦ x τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν

$$\frac{7+x}{11+x} = \frac{1}{4}$$

Ἐκ τῆς δοποίας εὑρίσκομεν $x = -\frac{17}{3} = -5\frac{2}{3}$.

(Πρόβλημα 6). «Ορθογωνίου τινὸς ἡ μὲν βάσις εἴνε 4 μ. μεγαλυτέρα τῆς πλευρᾶς τετραγώνου 150 μέρηνάμου του, τὸ δὲ ὕψος 3 μ. μικρότερον. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ διαστάσεις του».

Ἐὰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὴν πλευρὰν τοῦ τετραγώνου, τὸ ἐμβαδόν του θὰ εἴνε $x \cdot x = x^2$. Ἡ βάσις τοῦ ὄρθογωνίου θὰ παρασταθῆ τότε διὰ τοῦ $x + 4$, τὸ δὲ ὕψος του διὰ $x - 3$. Τὸ ἐμβα-

δὸν τοῦ δρυθογωνίου θὰ εἶνε $(x + 4)(x - 3)$. Ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος τὸ δρυθογώνιον καὶ τὸ τετράγωνον εἶνε λισοδύναμα, θὰ ἔχωμεν τὴν ἑξίσωσιν

$$(x + 4)(x - 3) = x^2, \quad \text{ἢ} \quad x^2 + 4x - 3x - 12 = x^2,$$

ἐκ τῆς ὁποίας ενδρίσκομεν $x = 12$. Ὡστε ἡ μὲν βάσις τοῦ δρυθογώνιου ἔχει μῆκος 16 μ. τὸ δὲ ὑψος 9 μ.

(Πρόβλημα 7). «*Ο Α ἐκτελεῖ ἐν ἔργον εἰς 7 ἡμέρας. Ο Β ἐκτελεῖ αὐτὸν εἰς 5 ἡμέρας. Εὰν ἔργασθοῦν καὶ οἱ δύο μαζὸν εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἐκτελέσουν τὸ ἔργον;*»

Ἐὰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ εἰς x ἡμέρας ἐκτελοῦν καὶ οἱ δύο, μαζὸν ἔργαζόμενοι, ὀλόκληρον τὸ ἔργον, εἰς 1 ἥμ. Θὰ ἐκτελοῦν τὸ $\frac{1}{x}$ τοῦ ἔργου. Ἐξ ἄλλου ἀφοῦ, ὁ Α εἰς 7 ἡμέρας ἐκτελεῖ τὸ ἔργον, εἰς 1 ἥμ. Θὰ ἐκτελῇ τὸ $\frac{1}{7}$, ὁ δὲ Β εἰς 1 ἥμ. τὸ $\frac{1}{5}$ τοῦ ἔργου. Καὶ οἱ δύο μαζὸν εἰς 1 ἡμέραν ἐκτελοῦν τὸ $\frac{1}{7} + \frac{1}{5}$ τοῦ ἔργου.

$$\text{Ἐπομένως ἔχομεν τὴν ἑξίσωσιν } \frac{1}{7} + \frac{1}{5} = \frac{1}{x}$$

ἐκ τῆς ὁποίας ενδρίσκομεν τὸ $x = 2 \frac{11}{12}$. Ὡστε καὶ οἱ δύο μαζὸν ἔργαζόμενοι, θὰ ἐκτελέσουν τὸ ἔργον εἰς $2 \frac{11}{12}$ ἥμ.

(Πρόβλημα 8). «*Εχει τις 100 οίνου τῶν 4,5 δρ. κατ' ὀκτῶν. Πόσον οίνον τῶν 6 δρ. κατ' ὀκτῶν πρέπει ν' ἀναμείξῃ, διὰ νὰ κοστίζῃ 5 δρ. ἡ ὀκτᾶ τοῦ μείγματος;*».

Ἐστω x δκ. τὸ ζητούμενον ποσὸν τοῦ οίνου. Τοῦτο θὰ τιμᾶται 6. x δρ. Τὸ μείγμα θὰ εἴνε $(100+x)$ δκ., θὰ τιμᾶται δὲ 5. $(100+x)$ δρ. Ο οίνος τῶν 100 δκ. τιμᾶται 4,5. 100 δρ. Επομένως θὰ ἔχωμεν τὴν ἑξίσωσιν

$$5. (100 + x) = 4,5. 100 + 6. x$$

Ἔξι ἦς ενδρίσκομεν $x = 50$. Ἡτοι πρέπει νὰ θέσῃ 50 δκ. τῶν 6 δρ.

(Πρόβλημα 9). «*Δύο κινητὰ ἀναχωροῦν ἐκ δύο τόπων συγχρόνως, κινοῦνται δμαλῶς καὶ διευθύνονται πρὸς συνάντησίν των. Τὸ πρῶτον διαγύνει 5 χμ. τὴν ὡραν, τὸ δὲ δεύτερον 5,5 χμ. Εἰς*

τίνα ἀπόστασιν ἀπὸ τὸν πρῶτον τόπον θὰ συναντηθοῦν, ἀνὴρ ἀπόστασις τῶν δύο τόπων εἶναι **60 χμ**»;

Ἐάν παραστήσωμεν διὰ τοῦ χιλίου ζητούμενην ἀπόστασιν, τὸ πρῶτον κινητὸν θὰ τὴν διανύσῃ εἰς $\frac{x}{5}$ ὡρας. Τὸ δεύτερον θὰ διανύσῃ

(**60 - x**) χμ. καὶ ταῦτα εἰς $\frac{60-x}{5,5}$ ὡρας. Ἐάλλον αὐτοὶ οἱ χρόνοι εἶναι

$$\text{ήσοι. } \text{Αρα } \frac{x}{5} = \frac{60-x}{5,5}$$

$$\text{ἔξι } \frac{1}{7} \text{ επεται } \quad x = 28 \frac{4}{7} \text{ χλ.}$$

(Πρόβλημα 10). «**40 δικαῖοι ἀλμυροῦ** ὕδατος περιέχουν 3,4 δικαῖοι. **Πόσον** **καθαρὸν** **ὕδωρ** **πρέπει** **νὰ φύωμεν** **εἰς** **αὐτό**, **ἴνα** **40 δικαῖοι**, **τοῦ** **νέου** **κράματος** **περιέχῃ** **2 δικαῖοι**. **ἀλλατος;**»

Ἐστω χ αἱ ζητούμεναι ὄπαδες τοῦ ὕδατος. Τὸ νέον κράμα θὰ ἔχῃ ($40 + x$) δικαῖοι, καὶ θὰ περιέχῃ τὸ αὐτὸν ἄλλας 3,4 δικαῖοι, τὸ ὄποιον εἶχε τὸ πρῶτον κράμα. Ἐάλλα αἱ 40 δικαῖοι θὰ περιέχουν ἥδη 2 δικαῖοι. **Ἄρα** αἱ ($40 + x$) θὰ περιέχουν $\frac{2}{40}$ ($40 + x$). Τοῦτο δὲ θὰ εἶναι

$$\text{ήσον μὲ } 3,4 \text{ δικαῖοι. } \text{Ητοι } \frac{2(40+x)}{40} = 3,4$$

Ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἔξισώσεως ταύτης εὑρίσκομεν $x = 28$ δικαῖοι.

(Πρόβλημα 11). «**Πατήρ τις** εἶναι **αἲτων**, **ο** **δὲ** **νέος** **τοῦ** **β** **εἴτων** **πάτερ** **ἡ** **ἥλικία** **τοῦ** **πατρὸς** **θὰ εἴνει**, **ἡ** **ἥτοι**, **τριπλασία** **τῆς** **τοῦ** **νεοῦ**;»

Ἐάν παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν διὰ τοῦ χιλίου, ἡ ἥλικία τοῦ πατρὸς μετὰ τοῦ εἴτη θὰ εἴναι $a + x$, τοῦ δὲ νεοῦ $\beta + x$. Ἐπειδὴ ἡ ἥλικία τοῦ πατρὸς θὰ εἴναι τριπλασία τῆς τοῦ νεοῦ, θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν

$$a + x = 3(\beta + x),$$

$$\text{ἐκ τῆς ὄποιας εὑρίσκομεν } 2x = a - 3\beta, \text{ καὶ } x = \frac{a - 3\beta}{2}$$

Διερεύνησις. Ἐάν τὸ $a - 3\beta$ εἴναι ἀριθμὸς θετικός, τὸ ζητούμενον θὰ συμβῇ εἰς τὸ μέλλον. Ἐάν δὲ εἴναι ἀρνητικός, ἔγινεν εἰς τὸ παρελθόν· καὶ ἀνείναι $a - 3\beta = 0$, τὸ $x = 0$. **Ητοι** ἡ σημερινὴ ἥλικία τοῦ πατρὸς εἴναι τριπλασία τῆς τοῦ νεοῦ.

(Πρόβλημα 12). «**Tὸ ἀθροισμα δύο ἀριθμῶν** εἶναι a , **ἡ δὲ διαφορά των δ.** **Ποῖοι** εἶναι οἱ δύο ἀριθμοί;»

Ἐὰν διὰ τοῦ καὶ παραστήσωμεν τὸν μικρότερον τῶν ἀριθμῶν, ὁ μεγαλύτερος θὰ παριστάνεται διὰ τοῦ $x + \delta$, τὸ δὲ ἄθροισμά των διὰ τοῦ $x + x + \delta$. Ὡστε ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν

$$x + x + \delta = a,$$

ἐκ τῆς ὁποίας εὑρίσκομεν $x = \frac{a - \delta}{2}$. Οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ εἰνε-

οἱ $\frac{a - \delta}{2}$, καὶ $\frac{a - \delta}{2} + \delta = \frac{a + \delta}{2}$.

(Πρόβλημα 13). «Ἐργάτης τις τελειώνει ἔργον τι εἰς αἱ ἡμέρας, δεύτερος τις τελειώνει τὸ αὐτὸν ἔργον εἰς βῃμέρας εἰς πόσας ἡμέρας τελειώνουν τὸ ἔργον καὶ οἱ δύο, μαζὶ ἐργαζόμενοι;»

Ἐὰν διὰ τοῦ καὶ παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, παρατηροῦμεν, ὅτι ἀφοῦ εἰς καὶ ἡμέρας τελειώνουν 1 ἔργον, εἰς 1 ἥμ. τελειώνουν τὸ $\frac{1}{x}$ τοῦ ἔργου. Όμοίως, ἀφοῦ δὲ πρῶτος ἐργάτης εἰς αἱ ἡμέρας τελειώνει 1 ἔργον, εἰς 1 ἥμ. θὰ τελειώνῃ τὸ $\frac{1}{\alpha}$ τοῦ ἔργου, δὲ δεύτερος τὸ $\frac{1}{\beta}$ αὐτοῦ. Επομένως καὶ οἱ δύο ἐργάται, μαζὶ ἐργαζόμενοι, θὰ τελειώνουν εἰς 1 ἥμ. τὸ $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ τοῦ ἔργου. Ὡστε ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{1}{x}$, ἐκ τῆς ὁποίας εὑρίσκομεν $x = \frac{\alpha \beta}{\alpha + \beta}$. Ἡτοι καὶ οἱ δύο ἐργάται, μαζὶ ἐργαζόμενοι, τελειώνουν τὸ ἔργον εἰς $\frac{\alpha \beta}{\alpha + \beta}$ ἡμέρας.

(Πρόβλημα 14). «Απὸ τοῦ σημείου A κινεῖται σημεῖόν τι διαλῶς μὲ ταχύτητα τὴ μέτρων καὶ δευτερόλεπτον κατὰ τὴν φορὰν ΑΓ. δ δευτερόλεπτα βραδύτερον κινεῖται ἀπὸ τοῦ σημείου B, κειμένου μὲτρα δύπισθεν τοῦ A, ἄλλο σημεῖον ἐπίσης διαλῶς καὶ μὲ ταχύτητα τὴ κατὰ δευτερόλεπτον κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν μὲ τὸ πρῶτον. Πότε θὰ συναντηθοῦν τὰ δύο κινητά;».

Ἄς ὑποθέσωμεν, ὅτι τὰ κινητὰ θὰ συναντηθοῦν μετὰ καὶ δευτερόλεπτα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς κινήσεως τοῦ πρώτου σημείου. Εἶνε φανερόν, ὅτι τὸ δεύτερον σημεῖον θὰ κινῆται καὶ δ δευτερόλεπτα μέχρι τῆς συναντήσεως. Ο δρόμος, τὸν ὅποιον θὰ διανύσῃ τὸ πρῶτον θὰ εἴνεται x , ἐκεῖνος δὲ τὸν ὅποιον θὰ διανύσῃ τὸ δεύτερον θὰ εἴνεται

$\tau' (x - \delta)$. Έπομένως θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν $\tau' (x - \delta) = \tau x + \mu$. Διότι ὁ δρόμος τοῦ δευτέρου, δ $\tau' (x - \delta)$, εἶναι ἵσος μὲ τὸν δρόμον τὸ x , τὸν δποῖον διήγνυσεν τὸ πρῶτον, ηὗξημένον κατὰ τὴν ἀπόστασιν μ , καθ' ἣν ἡτο δπίσω τὸ δεύτερον, ἀφοῦ τοῦτο ἔφθασε τὸ πρῶτον. Λύοντες τὴν ἀνωτέρῳ ἔξισωσιν εὑρίσκομεν

$$x = \frac{\mu + \tau' \delta}{\tau' - \tau}$$

Διερεύνησις. "Αν τὸ $\tau' - \tau$ εἶναι ὑετικὸς ἀριθμός, δηλαδὴ ἂν τὸ τ' εἶναι μεγαλύτερον τοῦ τ , ἢ συνάντησις θὰ γίνη εἰς τὸ μέλλον. "Αν $\tau' - \tau$ εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός, δηλαδὴ ἂν τὸ τ' εἶναι μικρότερον τοῦ τ , ἢ συνάντησις ἔγινεν εἰς τὸ παρελθόν. Διότι, ἢ τιμὴ τοῦ x θὰ εἴναι ἀρνητικὴ (ὑποτίθεται ὅτι τὸ τ , τ' , δ , καὶ μ εἴναι ὑετικοὶ ἀριθμοί). "Αν $\tau' - \tau$ εἶναι ἵσον μὲ μηδέν, ἢ συνάντησις δὲν θὰ γίνῃ ποτέ. Διότι, ἢ τιμὴ τοῦ x εἴναι κλάσμα, ἔχον ἀριθμητὴν ἀριθμὸν τινα ὠρισμένον, καὶ παρονομαστὴν μηδέν. "Αρα ἡ τιμὴ αὐτὴ εἴναι ἀπείρως μεγάλη (54, β').

Προβλήματα πρὸς λύσιν

Όμάδας πρώτη. 1) Τίνος ἀριθμοῦ τὸ ὄκταπλάσιον τὸν 10, ἀποτελούμενον ἀπὸ τὸν 100, λειτουργεῖ μὲ 10;

10.

2) Εάν εἴς τὸ τρίτον $\left(\frac{1}{2}\right)$ ἀριθμοῦ προστεθῇ τὸ τέταρτον $\left(\frac{1}{5}\right)$ του καὶ 2 (1) προκύπτει 5 (2). Ποιὸς εἴναι ὁ ἀριθμός; $5 - \frac{1}{7} \left(1 - \frac{3}{7}\right)$.

3) Ποιὸν ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τοὺς 3 (9) καὶ 10 (5), ὥστε νὰ προκύπτουν ἀριθμοὶ ἔχοντες λόγον $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{4}\right)$, $\frac{1}{2} \left(-10 \frac{1}{3}\right)$.

4) Εάν διψήφιον ἀριθμόν, τοῦ ὅποιού τὸ ἀθροίσμα τῶν ψηφίων εἴναι 9 (8), αὐξήσωμεν κατὰ 27 (18), λαμβάνομεν τὸν ἀριθμόν, ὁ ὅποιος προκύπτει, ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν ψηφίων τοῦ δοθέντος. Ποιὸς εἴναι ὁ ἀριθμός (σελίς 44. Όμάδα δευτέρα 2).

36 (35)

5) Παιδίον λέγεται. Εάν προσθέσω τὸ ἥμισυ $\left(\text{τὸ } \frac{1}{3}\right)$, τὸ τρίτον (καὶ 3) καὶ τὸ $\frac{1}{4} \left(\text{τὸ } \frac{1}{5}\right)$ τῶν μῆλων μου καὶ 20 (καὶ τὸ $\frac{1}{4}$) ἀκόμη, οὐκ ἔχω 150 (50) μῆλα. Πόσα μῆλα ἔχει τὸ παιδίον;

120 (60),

✓ 6) Αφού ἔξωδευσέ τις 20 (30) δραχ. ἐκ τῶν γρημάτων του, καὶ τὰ $\frac{3}{4} \left(\frac{5}{8} \right)$ τοῦ
ὑπολοίπου, τοῦ ἔμειναν 10 (3) δρ. Πόσας δραχμὰς εἶγεν ἐξ ἀρχῆς; 60 (38).

✓ 7) Ο Α λέγει εἰς τὸν Β' ἔχω 3 (4) πλάσια μῆλα ἢ σύ. Ο Β ἀπαντᾷ: δός μου
16 (12) ἐκ τῶν ἰδικῶν σου, καὶ θὰ ἔχωμεν ἵσσον ἀριθμὸν μῆλων. Πόσα μῆλα
εἶχε καθεῖς; ὁ Β' 16(8).

**Ομάδας δευτέρα.* ✓ 1) Εἰς τινα συναγαστροφὴν ἦσαν τριπλάσιοι ἄνδρες ἢ γυναικεῖς.
Μετὰ τὴν ἀναγρήσην 4 (3) ἀνδρῶν μετὰ τῶν συζύγων τοῦ ἔμειναν πενταπλάσιοι
ἄνδρες ἢ γυναικεῖς. Πόσοι ἦσαν ἄνδρες καὶ γυναικεῖς ἐξ ἀρχῆς; 24· 8 (18· 6).

✓ 2) Χωρικὴ ἐπώλησε τὸ $\frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \right)$ τῶν ὡδῶν, τὰ ὅποια εἶγε, καὶ $\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)$ ὡοῦ, γωρίς
νὰ θραύσῃ κανέν. Ἐπώλησε πάλιν τὸ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \right)$ τῶν ὑπολοίπων καὶ $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right)$ τοῦ ὡοῦ,
γωρίς νὰ θραύσῃ κανέν. Τρίτην καὶ τετάρτην φορὰν ἐπώλησεν ὁμοίως (τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ
ὑπολοίπου καὶ $\frac{1}{3}$ ὡοῦ· τὸ $\frac{1}{3}$ καὶ $\frac{2}{3}$ ὡοῦ). Πόσα εἶγεν ἐξ ἀρχῆς; ἀν τῆς ἔμειναν
1 (8) ὡς; 31 (49).

✓ 3) Ἡρωτήθη τις πόσην ἡλικίαν ἔγει, καὶ ἀπεκρίθη: μετὰ μ (21) ἔτη θὰ εἴνε ν (3)
φορᾶς μέγαλυτέρα ἐκείνης τὴν ὥραν εἶγε πρὸ μ (5) ἔτῶν. Πόσα εἴνε ἡ ἡλι-
κία του:

$$\frac{\mu (v+1)}{v-1} \quad (8).$$

✓ 4) Χωρικὴ ἐσκόπευε νὰ πωλήσῃ ὅσα ὡὰ εἶχε πρὸς 50 (70) λ. ἔκαστον. Ἐπειδὴ
ἐθραύσθησαν 3 (1), ἐπώλησε τὰ ὑπόλοιπα πρὸς 60 (80) λ, καὶ δὲν ἔζημιαθη. Πόσα
εἶγεν ἐξ ἀρχῆς; 18 (8)

✓ 5) "Εγιασέ τις τὰ $\frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)$ τῶν γρημάτων του καὶ 1 (3) δρχ. Ἐκέρδισεν ἔπειτα

τὰ $\frac{3}{5} \left(\frac{1}{2} \right)$ τῶν ὅσων οὕτω εἶχε καὶ 1 (3) δρχ. Τέλος ἔκαστε τὰ $\frac{5}{6} \left(\frac{2}{3} \right)$ τῶν ὅσων

οὕτω εἶχε καὶ 1 (3) δρχ. Οὕτω εἶχε 8,5 (10) δρ. Πόσα εἶγεν ἐξ ἀρχῆς; 108 (54).

**Ομάδας τρίτη.* 1) Πόσον 110 (130) δρ. πρόκειται νὰ διανεμηθῇ μεταξὺ τριῶν
προσώπων εἰς τρόπον, ώστε ὁ δευτέρος νὰ λάθῃ 30 δρ. ὀλιγωτέρας (περισσοτέρας) τοῦ
πρώτου, καὶ ὁ τρίτος διπλάσια τοῦ δευτέρου πόσα θὰ λάθῃ καθεῖς; ὁ α 50 (10).

2) Τὸ βάρος τῆς οὐρᾶς ἵγιος γῆτο τὸ $\frac{1}{4} \left(\frac{1}{5} \right)$ τοῦ ὅλου βάρους του. Τὸ σῶμά του ἔχει για 5 (11) ὄκ., ἡ δὲ κεφαλὴ του τὸ $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} \right)$ τοῦ ὅλου βάρους του. Πόσας ἀνάδας ἔχει για τὸ βάρος;

12 (20).

3) Κρουνός πληροῖ δεξιμενὴν εἰς 3 $\left(3 \frac{1}{2} \right)$ ὥρα. Ἀλλος τὴν πληροῦν, ἂν ρέουν καὶ οἱ τρεῖς συγγρόνως;

$1 \frac{1}{3} \left(1 \frac{263}{605} \right)$.

4) Βρύσις πληροῖ δεξιμενὴν εἰς 2 (4, 5), δευτέρα εἰς 4 $\left(4 \frac{1}{3} \right)$ καὶ τρίτη εἰς 6 (5,5) ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας θὰ πληρωθῇ ἡ δεξιμενή, ἂν ἀνοίξῃ ἡ πρώτη (δευτέρα), μετὰ μίαν δὲ ὥραν καὶ αἱ ἄλλαι δύο;

$1 \frac{6}{11} \left(2 \frac{173}{817} \right)$.

'Ουδέ τετάρτη (κινήσεως). 1) "Εκ τινος τόπου ἀνεγάρησε πεζός, διατρέχων 60 (80) γλ. καθ' ἡμέραν. Μετὰ 4 (3) ἡμέρας ἀναγωρεῖ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τόπου ἄλλος μὲ τὴν ἐντολήν, νὰ φύσῃ τὸν πρῶτον εἰς 8 (6) ἡμ. Πόσα γμ. πρέπει νὰ διανύῃ αὐτὸς καθ' ἡμέραν;

90 (120).

2) 'Εκ δύο τόπων, ἀπεγόντων 575 (216,75) γλ. ἀναγωροῦν δύο ταχυδρόμοι, διευθυνόμενοι πρὸς συναντήσιν των. 'Εὰν ὁ εἰς διανύῃ 60 (10,5) γμ., ὁ δὲ ἄλλος 55 (50) γμ. καθ' ἡμέραν, πότε θὰ συναντηθοῦν;

5 (2,39.).

3) 'Από σημείου Α κινεῖται σῶμά τι, διανύον 32 (τ) μ. εἰς 4'' (δ) καὶ διευθύνεται πρὸς τὸ Β. Μετὰ 3'' (ρ) ἀναγωρεῖ ἐκ τοῦ Α ἄλλο σῶμα πρὸς τὴν σφράν AB κινούμενον, καὶ διανύον 60 (τ') μ. εἰς 5'' (δ') πότε καὶ ποῦ. Θὰ συναντήσῃ τὸ

πρῶτον;

$6 \cdot 72 \left(\frac{\delta\sigma\tau}{\delta\tau' - \delta\tau} \right)$.

4) 'Από τόπον Α ἀναγωρεῖ ἀμαξοστοιχία καὶ διευθύνεται πρὸς τὸν Β, διανύουσα 30 (45,5) γμ. καθ' ὥραν 1 $\left(1 \frac{3}{4} \right)$ ὥρας βραδύτερον ἀναγωρεῖ ἐκ τοῦ Α διευθυνομένη πρὸς τὸ Β ἀμαξοστοιχία, διανύουσα 60 $\left(50 \frac{1}{2} \right)$ γμ. καθ' ὥραν. Μετὰ πόσας

ὥρας καὶ εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ Α θὰ φύσῃ ἡ δευτέρα τὴν πρώτην:

2 ὥρ. 60 γμ. (17 ὥρ. 10,5')

5) Ποδηλάτης ἀναγωρεῖ ἀπό τινος τόπου, διανύων 12 (8,75) γμ. τὴν ὥραν 3 $\left(2 \frac{1}{3} \right)$ ὥρ. βραδύτερον ἀναγωρεῖ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τόπου, ἄλλος διανύων

46 (15,5) γμ. τὴν ὥραν α') πότε θὰ προηγήσαι: δὲ πρῶτος τοῦ δευτέρου 12 $\left(9 \frac{1}{3} \right)$:

χμ.; β') πότε θὰ προηγήσει διατάξεις πρώτου $50 \left(26 \frac{5}{6}\right)$ χμ;

$$9 \cdot 24,5 \left(3 \frac{79}{81}, 9 \frac{1}{3}\right)$$

¶ 6) Τὴν 10 (12) πρωτηγὴν ἀναγωρεῖ ποδηλάτης ἀπό τόπου A, διανύων 12 (15) γχμ. καθ' ὧραν ποίαν ὡραν πρέπει νὰ ἀναγωρήσῃ δεύτερος ἐκ τοῦ A, ὅπει διανύων 16 (20) γχμ. καθ' ὧραν νὰ φθάσῃ τὸν πρώτον εἰς 3 (2,5) ὥρ.; 11 (50').

7) Ἀπὸ δύο τόπων ἀναγωροῦν συγχρόνως δύο ὁδοιπόροι: πρὸς συνάντησιν ὁ εἰς τοῦ ἄλλου ὁ εἰς χρειάζεται 7 (5) ὥρ. διὰ νὰ διανύσῃ τὴν ἀπόστασιν τῶν τόπων, ὁ δὲ δεύτερος 2 ὥρ. ὀλιγότερον (περισσότερον) τοῦ πρώτου. Πότε θὰ συναντηθοῦν;

$$2 \text{ ὥρ. } 55' \left(2 \frac{11}{12}\right)$$

8) Ἀπὸ σημείου περιφερείας κύκλου ἀναγωροῦν δύο κινητὰ καὶ διανύουν ἀντιστοίχως α^0 καὶ β^0 ($\alpha > \beta$) εἰς 1''. Πότε θὰ συναντηθοῦν (διὰ νὴν φοράν); α') ἢν διευθύνωνται ἀντιθέτως, β') πρὸς τὴν αὐτὴν φοράν; 360: ($\alpha \pm \beta$) [360. ν. ($\alpha \pm \beta$)]

9) Ἀπὸ σημείου περιφερείας ἀναγωροῦν δύο κινητά, διανύοντα αὐτὴν εἰς γρόνους t_1 καὶ t_2 ($t_1 > t_2$): πότε θὰ συναντηθοῦν διὰ 1ην, 2ην, . . . νὴν φοράν, ἢν κινοῦνται πρὸς τὴν αὐτὴν (ἀντιθετον) φοράν;

$$\frac{t_1 - t_2}{t_1 + t_2} \cdot v$$

10) Ἀπὸ σημείου περιφερείας ἀκτῖνος ρ ἀναγωροῦν δύο κινητὰ μὲ ταχύτητας t_1 καὶ t_2 : πότε θὰ συναντηθοῦν διὰ νὴν φοράν, ἢν ἔχουν ἀντιθετον (τὴν αὐτὴν) φοράν;

$$\left(\frac{2\pi \rho v}{t_1 \pm t_2}\right)$$

11) Μετὰ πόσην ὡραν ἀπό τῆς μεσημβρίας συμπίπτουν οἱ δείκται τῶν ὥρων καὶ πρώτων λεπτῶν ὥρολογίους:

$$\left(1 \frac{1}{11} \text{ ὥρ.}\right)$$

12) Πότε μετὰ μεσημβρίαν οἱ αὐτοὶ δείκται συγματίζουν ὁρθὴν γωνίαν διὰ 1ην, 2ην, 3ην φοράν;

$$\left(\frac{3}{11}, \frac{6}{11}, \dots\right)$$

13) Πότε μετὰ μεσημβρίαν οἱ αὐτοὶ δείκται συγματίζουν γωνίαν α^0 διὰ 1ην, 2ην, 3ην .. φοράν;

$$\left(\frac{\alpha}{330}, \frac{360-\alpha}{330}\right)$$

14) Ηότε μετὰ μεσημβρίαν ὁ δείκτης τῶν δευτερολέπτων διγραμμεῖ τὴν γωνίαν τῶν ἄλλων διὰ πρώτην φοράν;

$$\left(1' \frac{780''}{1427}\right)$$

15) Κύρων διώκει ἀλώπεκα, ἣτις ἀπέχει 60 (40) πηδήματά της. "Οταν αὗτη κάμνει 9 (10) πηδήματα ὁ κύρων κάμνει 6 (5). Ἐλλὰ τὰ 3 πηδήματα αὐτοῦ ἴσοδυναμοῦν μὲ 7 αὐτῆς. Μετὰ πόσα πηδήματά του θὰ τὴν φθάσῃ ὁ κύρων;" 72 (120)

'Ομάς πέμπτην. (γεωμετρικά). | 1) 'Ορθογωνίου τριγώνου ἡ διαφορὰ τῶν ὀξειῶν γωνιῶν του εἶνε 20^0 ($15^0 18' 42''$): πόση εἶνε καθεμία τῶν γωνιῶν; 35^0 ($37^0 20' 54''$).

2) Ισοσκελούς τριγώνου ή γωνία της κορυφής είναι $\frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right)$ των παρά την βάσιν. Πόσαι είναι αἱ γωνίαι του; $360 \left(51 \frac{3}{7} \right)$.

3) Νὰ εὑρεθοῦν αἱ γωνίαι τετραπλεύρου, ἐὰν καθέμια είναι κατὰ 20° (30°) μεγαλυτέρα τῆς προηγουμένης της. $66^\circ, \dots (45^\circ, \dots)$.

4) Πόσας πλευρὰς ἔχει κανονικὸν πολύγωνον, τοῦ ὅποίου καθεμία γωνία είναι 144° ($1,5$ δὲθ); $10 (8)$.


5) Ποιαὶ είναι αἱ γωνίαι τετραπλεύρου, ἐὰν είναι μεταξύ των καθώς οἱ ἀριθμοὶ

$$1 \left(\frac{1}{2} \right) : 2 \left(\frac{3}{4} \right) : 3 \left(\frac{2}{3} \right) : 4 (!); \quad \text{ἢ } \alpha' 36^\circ \left(\frac{24}{35} \text{ δὲθ.} \right).$$

§ 68.* **Περὶ τῆς γραφικῆς πραστάσεως τῶν συναρτήσεων**
 $y=ax, \quad y=ax+\beta.$

α') Η συνάρτησις $y=ax$, παριστάνει πάντοτε μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν, διερχομένην διὰ τοῦ O .

Διότι, ἔστω πρῶτον ὅτι τὸ a είναι θετικὸς ἀριθμὸς π. χ. δ 1, ὅτε



(Σγ. 4)


ἡ συνάρτησις είναι $y=x$. Εάν εἰς τὴν ἀνεξάρτητον μεταβλητὴν x δώσωμεν κατὰ σειρὰν τὰς τιμὰς $0 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$, (1) αὐξανομένας κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν 1, ἡ συνάρτησις λαμβάνει ἀντιστοίχως τὰς τιμὰς

Ο·1·2·3, (2) ανξανομένας κείται τόπων αντὸν ἀριθμὸν 1. Εὰν σημειώσωμεν ἐπὶ τοῦ ἀξονος τῶν x (σχ. 4) τὰ σημεῖα, τὰ δῆποτα παριστάνουν τὰς τιμὰς (1) τοῦ x , καὶ ἀντίστοιχα σημεῖα ἐπὶ τοῦ ἀξονος τῶν y , τὰ δῆποτα παριστάνουν τὰς τιμὰς (2) τοῦ y , παρατηροῦμεν ὅτι τὰ σημεῖα τὰ παριστάνοντα τὰ ἀντίστοιχα ζεύγη τῶν τιμῶν $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,2)$, ..., κείνται ἐπὶ μιᾶς εὐθείας γραμμῆς, τῆς $\Omega\Gamma$.

Ἐὰν εἰς τὸν x δώσωμεν τὰς τιμὰς $-1, -2, -3$
εὐρίσκομεν ὅτι τὸ y λαμβάνει τὰς τιμὰς $-1, -2, -3$
τὰ δὲ σημεῖα τὰ δῆποτα παριστάνοντα τὰ ζεύγη

$$(-1, -1), \quad (-2, -2), \dots$$

κείνται ἐπὶ τῆς εὐθείας $\Omega\Gamma'$, ἡ δῆποτα εἶναι προέκτασις τῆς $\Omega\Gamma$.



(Σχ. 5)

Ἐπομένως ἡ συνάρτησις $y=x$ παριστάνει τὴν εὐθείαν $\Gamma\Gamma'$ (σχ. 4).

6') Ἐστω ὅτι τὸ a εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός, π.γ. $\delta = -2$. Εὑρίσκομεν καθ' ὄμοιον τρόπον, ὅτι ἡ συνάρτησις $y=-2x$ παριστάνει τὴν εὐθείαν $\Gamma_1\Gamma_1'$ (σχ. 4).

7') Ὁμοίως ἐργαζόμεθα, ἐὰν τὸ a ἔχῃ ἄλλην οἰανδήποτε τιμὴν θετικὴν ἢ ἀρνητικὴν, καὶ παρατηροῦμεν ὅτι ἡ συνάρτησις $y=ax$ παριστάνει εὐθεῖαν γραμμήν, διερχομένην διὰ τοῦ O .

8') Τὴν συνάρτησιν $y=ax+\beta$ δυνάμεθα ν' ἀπεικονίσωμεν, ἐὰν εἰς τὴν τεταγμένην καθενὸς σημείου

της εύθειας, τὴν δποίαν παριστάνει ἡ $y=ax$, προσθέσωμεν τὴν ποσότητα β . Ἀλλὰ τοῦτο σημαίνει, νὰ μεταφέρουμεν τὴν εύθειαν $y=ax$ παραλλήλως πρὸς τὸν ἔαυτὸν τῆς ἀντὶ ἡ κάτιον καθόσον τὸ β εἶνε ἀριθμὸς θετικός, ἢ ἀρνητικός.

Ἐπομένως ἡ συνάρτησις $y=ax+\beta$ παριστάνει εύθειαν γραμμὴν (βλ. σχ. 5 τὰς εύθειας $\Delta\Delta'$, $\Delta_1\Delta_1'$).

ε') Διὰ νὰ εὔρωμεν τὶ παριστάνει ἡ ἔξισωσις $y=\beta$ παρατηροῦμεν, ὅτι οἰανδήποτε τιμὴν καὶ ἀν ἔχῃ τὸ x , καὶ τὸ y ίσοῦται μὲν β . Ἡτοι, ἡ ἔξισωσις $y=\beta$ παριστάνει πάντα τὰ σημεῖα, τὰ δύοια ἔχοντα τεταγμένην ἵσην μὲν β . Προφανῶς τὰ σημεῖα ταῦτα κεῖνται ἐπ' εύθειας παραλλήλου πρὸς τὸν ἄξονα τῶν x καὶ ἀπεχούσης ἀπόστασιν β ἀπ' αὐτοῦ. Ἐπομένως, καὶ ὅταν τὸ a εἶνε ἵσον μὲν μηδέν, ἡ συνάρτησις $y=ax+\beta$ παριστάνει εύθειαν γραμμὴν, παραλλήλον πρὸς τὸν ἄξονα τῶν x .

Ασκήσεις. Εὕρετε τὰς εύθειας, τὰς ὁποίας παριστάνονται συναρτήσεις

$$\alpha') y=3x. \quad \beta') y=2x+3. \quad \gamma') y=\frac{3}{4}x. \quad \delta') y=x-\frac{2}{3}.$$

$$\varepsilon') y=\frac{x}{2}+5. \quad \sigma\tau') y=-\frac{5x}{6}-\frac{1}{8}. \quad \zeta') y=+8. \quad \eta\vartheta) y=-\frac{1}{2}.$$

(θέσσατε $x=0, 1, 2, \dots$)

§ 69*). Γεωμετρικὴ παράστασις τῆς ρίζης ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ. —

α') Ἔστω μία ἔξισωσις τοῦ πρώτου βαθμοῦ π. χ. ἡ $3x-6=0$.

Ἐὰν τὸ πρῶτον μέλος τῆς παραστήσωμεν διὰ τοῦ y , ἔχομεν τὴν συνάρτησιν $y=3x-6$.

Διὰ τὴν τιμὴν τοῦ x , ἡ δποία ἐπαληθεύει τὴν δοθεῖσαν ἔξισωσιν, δηλαδὴ τὴν $x=2$, τὸ y εἶνε ἵσον μὲν μηδέν. Τὸ σημεῖον τὸ παραστάνον τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν $(2,0)$ κεῖται ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν x καὶ εἰς ἀπόστασιν 2 μονάδων μήκους ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. Ο τῶν ἄξονων. Ἐπειδὴ δὲ ὡς εἴδομεν, ἡ συνάρτησις $y=3x-6$ παριστάνει εύθειαν γραμμὴν, ἐπεται ὅτι ἡ ρίζα τῆς δοθεῖσης ἔξισώσεως παριστάνεται ὑπὸ τοῦ σημείου, εἰς τὸ διποῖον ἡ ἐν λόγῳ εύθεια τέμνει τὸν ἄξονα τῶν x . Ἐκ τούτου καὶ ἀλλων ὅμοιων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι,

β') «διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ σημεῖον, τὸ παριστάνον τὴν ρίζαν ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ $ax+\beta=0$, ἀρκεῖ, νὰ εὔρωμεν τὸ σημεῖον $x=-\frac{\beta}{a}$ ἐπὶ τὸν ἄξονος τῶν x , ἡ νὰ κατασκευάσωμεν τὴν

ευθεῖαν, τὴν δποίαν παριστάνει ἡ συνάρτησις $y=a x + \beta$, καὶ νὰ εὑρωμεν τὸ σημεῖον εἰς τὸ δποῖον αὕτη τέμνει τὸν ἄξονα τῶν x .

§ 70 *) Κατασκευὴ εὐθείας ἐκ τῆς ἔξισώσεως κύτης. —

α') Υπάρχει σύντομος τρόπος συμφώνως πρὸς τὸν δποῖον δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν τὴν εὐθεῖαν, τὴν δποίαν παριστάνει ἡ ἔξισώσης $y=a x + \beta$, καὶ ἡτις καλεῖται ἔξισώσης τῆς εὐθείας. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ σημεῖον τὸ δποῖον ἡ ἀγνωστος εὐθεία τέμνει τὸν ἄξονα τῶν x , ἡ τεταγμένη y εἶνε ἵση μὲ μηδέν. "Αν λοιπὸν θέσωμεν τὸ y ἵσον μὲ μηδὲν εἰς τὴν ἔξισώσιν, θὰ ἔχωμεν

$$a x + \beta = 0,$$

$$\text{ἐκ τῆς δποίας εὐρίσκομεν} \quad x = -\frac{\beta}{a}$$

Οὕτω εὐρίσκομεν τὸ σημεῖον, τὸ δποῖον παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν $\left(-\frac{\beta}{a}, 0 \right)$ ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν x , καὶ εἰς τὸ δποῖον ἡ εὐθεία τέμνει τὸν ἄξονα τῶν x .

β') Ομοίως παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ σημεῖον εἰς τὸ δποῖον ἡ εὐθεία τέμνει τὸν ἄξονα τῶν y , ἔχει τετμημένην ἵσην μὲ μηδέν. "Αν λοιπὸν θέσωμεν εἰς τὴν διθεῖσαν ἔξισώσιν ἀντὶ τοῦ x τὸ μηδὲν, θὰ εὑρωμεν

$$y = \beta.$$

Τὸ σημεῖον τὸ παριστάνον τὸ ζεῦγος $(0, \beta)$ ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν y , εἶνε ἐκεῖνο εἰς τὸ δποῖον ἡ εὐθεία τέμνει τὸν ἄξονα τῶν y .

γ') Ἐκ τούτων ἐπεται ὅτι

"διὰ νὰ κατασκευάσωμεν εὐθεῖαν, δταν δοθῇ ἡ ἔξισώσης τῆς, θέτομεν εἰς τὴν ἔξισώσιν τὸ $y = \mu$ 0, καὶ λύομεν τὸ ἔξαγόμενον ὡς πρὸς x , δ δὲ προκύπτων ἀριθμὸς δρίζει τὸ σημεῖον, εἰς τὸ δποῖον ἡ εὐθεία τέμνει τὸν ἄξονα τῶν x . θέτομεν εἰς τὴν ἔξισώσιν $x = \mu$ 0, καὶ λύομεν τὸ ἔξαγόμενον ὡς πρὸς τὸ y , οὕτω δ' εὐρίσκομεν τὸ σημεῖον, εἰς τὸ δποῖον ἡ εὐθεία τέμνει τὸν ἄξονα τῶν y συνδέομεν τὰ δύο οὕτω εὐρεθέντα σημεῖα τῶν ἄξονων δι' εὐθείας, ἡτις εἶνε ἡ ζητουμένη».

δ') "Ηστω ἡ ἔξισώσης $y = 3x - 5$.

Θέτομεν $y = 0$, καὶ ἔχομεν $3x - 5 = 0$, ἐκ τῆς δποίας εὐρίσκομεν

$$x = + \frac{5}{3}$$

Θέτομεν $x = 0$, καὶ μένει $y = -5$. "Η εὐθεία, τὴν

δποίαν παριστάνει ή δοθεῖσα ἔξισωσις διέρχεται διὰ τοῦ σημείου $(+\frac{5}{3}, 0)$ τοῦ ἀξονος τῶν x, καὶ τοῦ (0, -5) τοῦ ἀξονος τῶν y. Συνδέοντες τὰ σημεῖα αὗτὰ δι' εὐθείας, λέγομεν τὴν εὐθεῖαν, τὴν δποίαν παριστάνει ή ἔξισωσις $y=3x-5$.

ε') Εάν ή δοθεῖσα ἔξισωσις εἴνε τῆς μορφῆς $y=a x$, π. χ. ή ἔξισωσις $y=2x$, παρατηροῦμεν ὅτι, διὰ $x=0$ εἴνε καὶ τὸ $y=0$. Επομένως, ή εὐθεῖα διέρχεται διὰ τῆς ἀρχῆς O τῶν ἀξόνων. Διὰ νὰ εὔρωμεν καὶ ἐν ἄλλῳ ἀκόμη σημείον της, θέτομεν $x=1$ (ἢ ἄλλην τινὰ τιμὴν διάφορον τοῦ μηδενὸς) καὶ εὑρίσκομεν $y=2$. Εὑρίσκομεν τὸ σημεῖον τὸ παριστάνον τὸ ζεῦγος (1, 2) καὶ ή ζητούμενη εὐθεῖα εἴνε ή διερχομένη διὰ τῆς ἀρχῆς O καὶ διὰ τοῦ σημείου τούτου (1, 2).

Ασκήσεις. Κατατευάσατε τὰς εὐθείας τὰς ὁποίας παριστάνουν αἱ ἔξισώσεις,

α') $y=3x$. β') $y=3x+1$. γ') $y=-2x$. δ') $y=-7x+1$.

ε') $y=\frac{1}{2}x-1$. σ') $3y-2x=2$. ζ') $\frac{1}{2}y-\frac{3}{4}x-1=0$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

Συστήματα ἔξισώσεων πρώτου βαθμοῦ.

§ 21. Θροισμού.

α) Εστωσαν δύο ἔξισώσεις, καθεμία τῶν δποίων ἔχει δύο ἀγνώστους x καὶ y, καὶ καθένα εἰς πρῶτον βαθμόν,

αὶ $x+y=10$, $x-y=2$.

Αὗται ἀληθεύουν διὰ τὴν αὗτὴν τιμὴν καθενὸς τῶν ἀγνώστων $x=6$, $y=4$, καὶ λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν σύστημα δύο ἔξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους.

Ἐν γένει, καλοῦμεν σύστημα ἔξισώσεων τὸ σύνολον δύο ή περισσοτέρων ἔξισώσεων, τὰς ὁποίας ἐπαληθεύουν αἱ αὗται τιμαὶ τῶν ἀγνώστων των.

β') Καλοῦμεν λόγον συστήματος τινος ἔξισώσεων τὴν εὐρεσίν τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων των, αἱ δποῖαι ἐπαληθεύουν τὰς ἔξισώσεις τοῦ συστήματος.

γ') Δύο (ἢ περισσότερα) συστήματα ἔξισώσεων λέγονται ισοδύναμα, ἐὰν ἐπαληθεύωνται διὰ τὰς αὗτὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων.

Εἶνε φανερόν, ὅτι ἐὰν εἰς σύστημα ἀντικαταστήσωμεν μίαν (ἢ

περισσοτέρας) τῶν ἔξισώσεων του δι' ίσοδυνάμων των προκύπτει σύστημα ίσοδύναμον. Κατὰ ταῦτα τὸ τυχὸν σύστημα

$$A_1=B_1, \quad A_2=B_2, \quad A_3=B_3,$$

ὅπου τὰ A_1, B_1, \dots παριστάνουν τὰ μέλη τῶν ἀντιστοίχων ἔξισώσεων, εἶναι ίσοδύναμον πρὸς τὸ σύστημα

$$A_1-B_1=0, \quad A_2-B_2=0, \quad A_3-B_3=0, \quad (\S\ 61\ \gamma).$$

§ 72. Τίδιότητες τῶν συστημάτων.—

α') «Ἐὰν εἰς σύστημα ἔξισώσεων προσθέσωμεν δύο (ἢ περισσοτέρας) αὐτῶν κατὰ μέλη, καὶ ἀντικαταστήσωμεν μίαν τῶν προστεθεισῶν διὰ τῆς προκυψάσης, εὑρίσκομεν σύστημα ίσοδύναμον πρὸς τὸ δοθέν».

Ἐστω τὸ σύστημα

$$(1) \quad A_1-B_1=0, \quad A_2-B_2=0, \quad A_3-B_3=0.$$

Λέγω ὅτι εἶναι ίσοδύναμον πρὸς τὸ

$$(2) \quad A_1-B_1=0, \quad (A_1+A_2)-(B_1+B_2)=0, \quad A_3-B_3=0$$

τὸ δποῖον προέκυψεν ἐκ τοῦ (1), ἀφοῦ ἐπροσθέσαμεν τὰς δύο πρώτας του ἔξισώσεις κατὰ μέλη, καὶ ἀντικαταστήσαντες τὴν δευτέραν του διὰ τῆς προκυψάσης. Διότι διὰ τὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων, αἱ δποῖαι ἐπαληθεύουν τὸ (1), θὰ ἔχωμεν

$$\text{τιμὴ τοῦ } A_1 - \text{τιμὴ τοῦ } B_1 = 0$$

$$\text{τιμὴ τοῦ } A_2 - \text{τιμὴ τοῦ } B_2 = 0$$

$$\text{τιμὴ τοῦ } A_3 - \text{τιμὴ τοῦ } B_3 = 0.$$

Ἐπομένως καὶ ἡ τιμὴ τοῦ $A_1 - \text{τιμὴ τοῦ } B_1 = 0$,

$$\text{τιμὴ τοῦ } (A_1+A_2) - \text{τιμὴ τοῦ } (B_1+B_2) = 0.$$

$$\text{τιμὴ τοῦ } A_3 - \text{τιμὴ τοῦ } B_3 = 0.$$

Ἡτοι διὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων ἐπαληθεύεται καὶ τὸ (2).

Ομοίως δεικνύεται ὅτι, διὰ τὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων αἱ δποῖαι ἐπαληθεύουν τὸ (2) ἐπαληθεύεται καὶ τὸ (1).

β') «Ἐὰν εἰς σύστημα ἔξισώσεων μία αὐτῶν εἶναι λυμένη πρὸς ἕνα τῶν ἀγνώστων, καὶ ἀντικαταστήσωμεν τοῦτον διὰ τῆς τιμῆς του εἰς τὰς ἄλλας (ἢ εἰς τινας μόνον), εὑρίσκομεν σύστημα ίσοδύναμον πρὸς τὸ δοθέν».

*Εστω τὸ σύστημα (1)

$$\left\{ \begin{array}{l} x = A_1(y, \omega, \dots) \\ A_2(x, y, \omega, \dots) = 0 \\ A_3(x, y, \omega, \dots) = 0, \end{array} \right.$$

ὅπου τὰ A_1, A_2, A_3 εἶνε μέλη τῶν ἔξισώσεων, περιέχοντα, ἐν γένει,
τὸν ἀγνώστους, x, y, ω, \dots . Λέγω δὲ τὸ σύστημα τοῦτο εἶνε ἰσο-
δύναμον πρὸς τὸ

$$(2) \quad \left\{ \begin{array}{l} x = A_1(y, \omega, \dots), \\ A_2(A_1, y, \omega, \dots) = A_2' = 0 \\ A_3(A_1, y, \omega, \dots) = A_3' = 0 \end{array} \right.$$

ὅπου τὰ A_2', A_3' παραστάνουν τὰ ἔξαγόμενα τῶν A_2, A_3 , ἀφοῦ ἀντε-
κατεστάθη τὸ x ὑπὸ τοῦ ἵσου του $A_1(y, \omega, \dots)$.

Πράγματι, ἀν ἀληθεύσῃ τὸ σύστημα (1) ἢ (2), τὸ x καὶ τὸ A , θὰ
γίνουν ἵσοι ἀριθμοὶ (μετὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν ἀγνώστων ὑπὸ^{τῶν τιμῶν των)}. Ἀλλὰ τότε, καὶ τὸ (2) ἢ τὸ (1) θὰ ἀληθεύσῃ διὰ τὰς
αὐτὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων. Διότι, τὸ (2) διαφέρει τοῦ (1) κατὰ τὸ
ὅτι, ἀντὶ τοῦ x ἔχει τεθῆ εἰς τὴν θέσιν του τὸ A_1 . Ἀλλὰ καὶ τὰ δύο
ταῦτα θὰ εἶνε ἵσοι ἀριθμοὶ μετὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν ἀγνώστων
ὑπὸ τῶν ἐν λόγῳ τιμῶν των.

§ 73. Μέθοδος λύσεως συστήματος δύο ἔξισώ- σεων μὲ δύο ἀγνώστους.—

Πρὸς λύσιν δοθέντος συστήματος δύο ἔξισώσεων πρώτου βαθμοῦ
μὲ δύο ἀγνώστους μεταχειριζόμεθα, συνήθως, τὰς ἔξης μεθόδους,
στηριζομένας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω ἴδιοτήτων.

α') *Μέθοδος τῶν ἀντιθέτων συντελεστῶν.* Διὰ τῆς μεθόδου ταύ-
της μετασχηματίζομεν τὰς δοθείσας ἔξισώσεις (ἢ μίαν αὐτῶν) εἰς τρο-
πον, ὥστε οἱ συντελεσταὶ τοῦ ἀγνώστου x (ἢ τοῦ y) νὰ εἶνε ἀντιθετοι.
Ἀκολούθως προσθέτομεν τὰς νέας ἔξισώσεις, ὥστε νὰ προκούψῃ ἔξι-
σωσις μὲ ἕνα μόνον τῶν ἀγνώστων. Λύοντες τὴν ἔξισωσιν ταύτην,
ενδιόσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ ἑνὸς τῶν ἀγνώστων. Ταύτην δὲ ἀντικαθι-
στῶντες εἰς μίαν τῶν δοθεισῶν, ενδιόσκομεν ἔξισωσιν, ἔχουσαν μόνον
τὸν ἄλλον ἀγνώστον, τοῦ ὅποιου ενδιόσκομεν τὴν τιμὴν, ἐὰν λύσωμεν
τὴν τελευταίαν ταύτην.

*Εστω τὸ σύστημα

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x + 3y = 8, \\ 3x + 4y = 11. \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{r} 3 \\ -2 \end{array} \right.$$

Διὰ νὰ ἔξαλείψωμεν τὸν x , πολλαπλασιάζομεν τὴν πρώτην ἔξισω-

σιν ἐπὶ 3 καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ — 2. Οὕτω προκύπτει τὸ

ἰσοδύναμον σύστημα

$$\left| \begin{array}{l} 6x + 9y = 24 \\ -6x - 8y = -22. \end{array} \right.$$

Προσθέτοντες τὰς ἔξισώσεις ταύτας κατὰ μέλη, εὑρίσκομεν $y=2$. Διὰ νὰ εὑρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ x ἢ ἐργαζόμεθα δύμοιως, ἀπαλείφοντες τὸν y , ἢ θέτομεν εἰς μίαν τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων, π. χ. εἰς τὴν πρώτην, ἀντὶ τοῦ y τὴν τιμὴν του 2, ὅτε εὑρίσκομεν

$$2x + 6 = 8, \quad \text{ἐκ τῆς ὁποίας προκύπτει } x=1.$$

"Εστω τὸ σύστημα

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x+y}{10} + \frac{x-y}{2} = 0, \\ \frac{x+y}{5} + \frac{x-y}{2} = 1. \end{array} \right.$$

Απαλείφοντες τοὺς παρανομαστὰς καθεμιᾶς τῶν ἔξισώσεων τούτων καὶ ἐκτελοῦντες ἀναγωγὴν τῶν δύμοιών ὅρων, εὑρίσκομεν

τὸ ἰσοδύναμον σύστημα

$$\left| \begin{array}{l} 12x - 8y = 0, \\ 7x - 3y = 10. \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} -3 \\ 8 \end{array}$$

Πολλαπλασιάζομεν τὴν πρώτην τούτων ἐπὶ — 3, τὴν δὲ δευτέραν ἐπὶ 8, καὶ εὑρίσκομεν — $36x + 24y = 0$, $56x - 24y = 80$. Διὰ προσθέσεως τούτων εὑρίσκομεν τὴν $20x = 80$, ἐκ τῆς ὁποίας προκύπτει $x=4$.

Τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ x ἀντικαθιστῶμεν εἰς μίαν τῶν προηγουμένων καὶ λύομεν ὡς προς y , ὅτε εὑρίσκομεν $y=6$. Διὰ νὰ κάμωμεν τὴν ἐπαλήθευσιν, θέτομεν εἰς τὸ δοθὲν σύστημα ἀντὶ τοῦ x καὶ y τὰς τιμὰς 4 καὶ 6 ἀντιστοίχως, καὶ βλέπομεν ὅτι, καὶ αἱ δύο ἔξισώσεις ἐπαληθεύονται.

6') "Εστω τὸ γενικὸν σύστημα

$$\left| \begin{array}{l} \alpha x + \beta y = \gamma, \\ \alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1. \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} \alpha, \\ -\alpha_1 \end{array}$$

Πολλαπλασιάζομεν ἀντιστοίχως τὰς ἔξισώσεις ἐπὶ α_1 καὶ — α , ὅτε οὕτω προκύπτουν

$$\left| \begin{array}{l} \alpha \alpha_1 x + \alpha_1 \beta y = \alpha_1 \gamma, \\ -\alpha \alpha_1 x - \alpha \beta_1 y = \alpha \gamma_1. \end{array} \right.$$

Διὰ προσθέσεως αὐτῶν κατὰ μέλη εὑρίσκομεν

$$(\alpha_1 \beta - \alpha \beta_1) y = \alpha_1 \gamma - \alpha \gamma_1.$$

ἐκ τῆς ὁποίας λαμβάνομεν

$$y = \frac{x_1 \gamma - \alpha \gamma_1}{x_1 \beta - \alpha \beta_1} = \frac{\alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma}{\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta}$$

Όμοιώς ενδίσκομεν

$$x = \frac{\gamma \beta_1 - \gamma_1 \beta}{\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta}$$

γ') Διὰ νὰ μετασχηματίσωμεν τὰς ἔξισώσεις δοθέντος συστήματος εἰς τρόπον, ὥστε οἱ συντελεσταὶ τοῦ ἑνὸς τῶν ἀγνώστων νὰ εἰνε ἀντίθετοι, ἀρκεῖ, νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀντιστοίχως τὰς ἔξισώσεις ἐπὶ τὰ πηλίκα τοῦ ἐ. κ. π. τῶν συντελεστῶν τοῦ ἐν λόγῳ ἀγνώστου διὰ καθενὸς ἐξ αὐτῶν. Π. χ. ἂν ἔχωμεν τὸ σύστημα

$$12x + 5y = 17, \quad -8x + 7y = -1,$$

τὸ ἐ. κ. π. τῶν 12 καὶ 8 εἰνε τὸ 24. Πολλαπλασιάζομεν τὴν πρώτην τῶν ἔξισώσεων ἐπὶ 24:12=2, καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ 24:8=3, καὶ λαμβάνομεν

$$\begin{array}{r|l} 2 & 12x + 5y = 17, \\ 3 & -8x + 7y = -1. \\ \hline & 24x + 10y = 34, \\ & -24x + 21y = -3. \end{array}$$

Διὰ προσθέσεως τούτων προκύπτει $31y = 31$,

ἐκ τῆς ὁποίας ενδίσκομεν $y = 1$, καὶ ἀκολούθως $x = 1$.

"Ἡ ἀνωτέρω μέθοδος λέγεται συνήθως μέθοδος τῶν ἀντιθέτων συντελεστῶν, ἢ μέθοδος διὰ τῆς προσθέσεως."

δ') *Μέθοδος τῆς ἀντικαταστάσεως.*" Εστω πρός λύσιν τὸ σύστημα

$$2x + 3y = 8, \quad 3x + 4y = 11. \quad (1)$$

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ σύστημα τὸῦτο διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀντικαταστάσεως, ἀπομονοῦμεν τὸν ἐνα τῶν ἀγνώστων, π. χ. τὸν x , ἔστω εἰς τὴν πρώτην τῶν ἔξισώσεων. "Ητοι, λύομεν αὐτὴν ὡς πρός x , θεωροῦντες τὸν y ὡς γνωστὸν. Οὕτω λαμβάνομεν

$$x = \frac{8-3y}{2}$$

Τὴν τιμὴν ταύτην ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν δευτέραν τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων (1) καὶ ενδίσκομεν $3 \cdot \frac{8-3y}{2} + 4y = 11$.

Λύομεν ταύτην ὡς πρός y καὶ ενδίσκομεν $y = 2$.

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ x , ἀντικαθιστῶμεν τὸ y διὰ ταῦ

$$2 \text{ εἰς μίαν τῶν δοθεισῶν, ή εἰς τὴν τιμὴν τοῦ x = \frac{8-3}{2} y}$$

$$\text{ὅτε εὑρίσκομεν } x = \frac{8-6}{2} = 1.$$

ε') *Μέθοδος τῆς συγκρίσεως.* Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὸ σύστημα

$$2x + 3y = 8, \quad 3x + 4y = 11.$$

Διὰ νὰ τὸ λύσωμεν διὰ τῆς μεθόδου τῆς συγκρίσεως, ἀπομονοῦμεν τὸν ἔνα τῶν ἀγνώστων, π.χ. τὸν x, εἰς τὴν πρώτην καὶ δευτέραν ἔξισωσιν τοῦ συστήματος. Ἡτοι, λύομεν καθεμίαν τῶν ἔξισώσεων τούτων ὡς πρὸς τὸν x, θεωροῦντες τὸν y ὡς γνωστόν.

$$\text{Οὕτω εὑρίσκομεν ἐκ μὲν τῆς πρώτης } x = \frac{8-3}{2} y$$

$$\text{ἐκ δὲ τῆς δευτέρας } x = \frac{11-4y}{3}$$

Ἐπειδὴ αἱ δύο αὐταὶ τιμαὶ τοῦ y πρέπει νὰ εἶνε τίσαι, ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν

$$\frac{8-3}{2} = \frac{11-4y}{3}$$

ἐκ τῆς δύοις εὑρίσκομεν $y=2$. Διὰ νὰ εῦρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ x, ἔργαζόμεθα καθὼς καὶ εἰς τὰ προηγούμενα παραδείγματα, καὶ εὑρίσκομεν

$$x = 1.$$

'Α σκήσεις

Όμάδας πρώτη. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα καὶ διὰ τῶν τριῶν μεθόδων, νὰ γίνῃ καὶ ἡ ἐπαλγήθευσίς των.

$$\alpha') 4x+2y=81 \quad \beta') 6x-7y-3=0 \quad \gamma') 5x-8y=1$$

$$9x+3y=5. \quad 9x-11y=-7. \quad 3x=21-2y.$$

$$\gamma \delta') \alpha x+\beta y=\beta^2, \quad \varepsilon') (\alpha-\beta) x=3 (\alpha+\beta)-3, \quad \gamma \sigma') x+y-\alpha+\beta \\ \alpha x+2y=\alpha^2. \quad x+y=4. \quad \beta x+\alpha y=2\alpha\beta$$

Όμάδας δευτέρα. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα διὰ τῆς καταλληλοτέρας μεθόδου καὶ νὰ γίνῃ καὶ ἡ ἐπαλγήθευσίς των.

$$\alpha') x+y=15, \quad \beta') x+y=\alpha^2, \quad \gamma') 7x+14y=181, \\ x-y=40. \quad x-y=\beta^2. \quad 7x-14y=-60.$$

$$\delta') x=9y+35, \quad \varepsilon') 1,7x-0,8y+33, \quad \gamma') y=\alpha^2 x+\beta^2, \\ x=13y+42. \quad 1,8x=10y-14,5. \quad y=\beta^2 x+\alpha^2.$$

Όμάδας τρίτη. Νὰ λυθοῦν καὶ νὰ ἐπαλγηθευθοῦν τὰ συστήματα

$$\alpha') 8(x-5)=3(y+7), \quad \beta') 3(x+3y)+8(6x+y)=15 \\ 9(x+6)=4(y+11). \quad 4(9x-y)+2x+2y=19.$$

$$\gamma') \quad \frac{x}{5} + \frac{y}{4} = 6 \frac{5}{6}, \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 9 \frac{1}{3}.$$

$$\varepsilon') \quad \frac{2x+3y+4}{3x+4y+5} = \frac{3}{4},$$

$$\frac{3x+7y+5}{4y+9y+22} = \frac{1}{2}$$

$$\zeta') \quad \frac{3}{x} + \frac{4}{y} = \frac{10}{xy}, \\ \frac{5}{3x} + \frac{3}{4y} = \frac{49}{12xy}$$

$$\delta') \quad \frac{4x-1}{2} + \frac{2y-5}{5} = 24,$$

$$\frac{5x+1}{9} - \frac{2-5y}{8} = 15.$$

$$\sigma') \quad \frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = \alpha^2 \beta,$$

$$\frac{x}{\alpha^2} + \frac{y}{\beta^2} = -\beta^2.$$

$$\eta') \quad \frac{4x+7y}{5x-8y} = \frac{25\alpha^2-\beta^2}{15\beta^2-\alpha^2}, \\ \frac{x+7\alpha^2}{y+8\beta^2} = \frac{9\alpha^2+\beta^2}{\alpha^2+3\beta^2}$$

§ 74 *) Διερεύνησες τοῦ συστήματος τῆς μορφής

$$(1) \quad \begin{cases} \alpha x + \beta y = \gamma, \\ \alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1. \end{cases}$$

α.) Έὰν λύσωμεν τὸ σύστημα τοῦτο διὰ τινος τῶν ἀνωτέρω μεθόδων, εὑρίσκομεν τὰς ἔξης τιμὰς τῶν x καὶ y

$$x = \frac{\gamma \beta_1 - \gamma_1 \beta}{\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta} \quad y = \frac{\alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma}{\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta} \quad (2)$$

β.) Έὰν δὲ κοινὸς παρονομαστὴς $(\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta)$ εἶνε διάφορος τοῦ μηδενὸς, δηλαδὴ ἂν εἴνε

$$\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta \neq 0, \quad \text{ἢ} \quad \alpha \beta_1 \neq \alpha_1 \beta$$

$$\text{ἢ} \quad \frac{\alpha}{\alpha_1} \neq \frac{\beta}{\beta_1}$$

τὸ δποῖον προκύπτει, ἐὰν τοὺς ἀνίσους ἀριθμούς $\alpha \beta_1$, $\alpha_1 \beta$ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ $\alpha_1 \beta_1$, ὑποτιθεμένου διαφόρου τοῦ μηδενός, αἱ τιμαὶ (2) τῶν x καὶ y εἶνε ἐντελῶς ὁρισμέναι. Τότε καθὼς βλέπομεν, τὸ δούλευν σύστημα ἔχει μίαν μόνην λύσιν, τὴν (2).

γ.) Έὰν δὲ παρονομαστὴς $\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta$ εἶνε ἵσος μὲν μηδέν, ἀλλ' οἱ ἀριθμηταὶ τῶν κλασμάτων (2) διάφοροι τοῦ μηδενός, τὸ σύστημα δὲν ἐπιδέχεται καμμίαν λύσιν. Διότι, ἂν τὰς τιμὰς (2) γράψωμεν οὕτω

$$(\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta) x = \gamma \beta_1 - \gamma_1 \beta, \quad (\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta) y = \alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma,$$

$$\text{θὰ} \quad 0 = \gamma \beta_1 - \gamma_1 \beta, \quad 0 = \alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma,$$

τὸ δποῖον ἀντιβαίνει εἰς τὴν ὑπόθεσιν, ὅτι οἱ ἀριθμηταὶ τῶν κλασμάτων (2) εἶνε διάφοροι τοῦ μηδενός. Ἄλλὰ καὶ ἔξ αὐτῶν τῶν τιμῶν (2) τῶν x καὶ y παρατηροῦμεν ὅτι, καθεμία τῶν διαιρέσεων, τὰς δποίας

παριστάνουν τὰ κλάσματα (2) εἰνε ἀδύνατος, ἀφοῦ δὲ διαιρέτης εἰνε μηδέν, δὲ διαιρετέος ποσότης ὁρισμένη καὶ διάφορος τοῦ μηδενὸς (§54, γ'). Ἐπειδὴ αἱ τιμαὶ τῶν κλασμάτων (2) αὐξάνουν εἰς ἄπειρον, ὅταν παρονομαστής των τελεῖ γίνη μηδέν, διά τοῦτο, θὰ λέγωμεν ὅτι, ὅταν εἰνε

$$\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta = 0, \quad \gamma \beta_1 - \gamma_1 \beta = 0, \quad \alpha_1 \gamma - \alpha_1 \gamma = 0,$$

τὸ σύστημα εἰνε ἀδύνατον, ἵνα ἐπιδέχεται μίαν λύσιν, ἀλλ' αἱ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων ὑπερβαίνουν πάντα ἀριθμόν, ἵνα εἰνε ἄπειροι.

δ') Ἐὰν δὲ παρονομαστής τῶν κλασμάτων (2) καὶ τούλάχιστον εἰς τῶν ἀριθμητῶν των εἰνε ἵσος μὲν μηδέν, δηλαδὴ ἂν εἰνε π. χ. $\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta = 0, \gamma \beta_1 - \gamma_1 \beta = 0$, τὸ σύστημα ἐπιδέχεται ἄπειρον πλῆθος λύσεων.

Διότι ἐκ τῆς

$$\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta = 0$$

ἔχομεν εὐκόλως

$$\frac{\alpha}{\alpha_1} = \frac{\beta}{\beta_1}$$

Ομοίως ἐκ τῆς

$$\gamma \beta_1 - \gamma_1 \beta = 0$$

λαμβάνομεν

$$\frac{\beta}{\beta_1} = \frac{\gamma}{\gamma_1}$$

Συγκρίνοντες τὰς ἀναλογίας ἔχομεν

$$\frac{\alpha}{\alpha_1} = \frac{\beta}{\beta_1} = \frac{\gamma}{\gamma_1}$$

"Αν τούς ἵσους τούτους λόγους παραστήσωμεν διὰ τοῦ ρ, θὰ

εἰνε

$$\frac{\alpha}{\alpha_1} = \frac{\beta}{\beta_1} = \frac{\gamma}{\gamma_1} = \rho.$$

"Αρα

$$\alpha = \alpha_1 \rho, \beta = \beta_1 \rho, \gamma = \gamma_1 \rho.$$

Τὰς τιμὰς αὐτὰς τῶν α, β, γ θέτομεν εἰς τὴν ἔξισωσιν
 $\alpha x + \beta y = \gamma$ τοῦ συστήματος (1), ὅτε προκύπτει

$$\alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1 \rho.$$

Διαιροῦντες διὰ τοῦ ρ (ὑποτιθεμένου διαφόρου τοῦ μηδενὸς)

ἔχομεν

$$\alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1.$$

Αλλ' αὐτὴ εἰνε ἡ δευτέρα ἔξισωσις τοῦ συστήματος (1).

"Ωστε τὸ σύστημα (1) περιορίζεται κατὰ τὴν περίπτωσιν αὐτὴν εἰς μίαν μόνην ἔξισωσιν, τὴν $\alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1$.

Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν ταύτην, δίδομεν εἰς τὸν ἕνα τῶν δύο ἀγνώστων, ἔστω εἰς τὸν y , μίαν οἰανδήποτε τιμὴν, π. χ. τὴν $y = 1$, ὅτε ἔχομεν $\alpha_1 x + \beta_1 = \gamma_1$.

"Εκ ταύτης ενδισκούμεν

$$x = \frac{\gamma_1 - \beta_1}{\alpha_1}.$$

Ἐὰν εἰς τὸν γ δώσωμεν ἄλλας τιμάς, π. γ. τὰς 0· 2. .
θὰ ἔχωμεν διὰ τὸν x τὰς τιμάς

$$x = \frac{\gamma_1}{\alpha_1}, \quad \frac{\gamma_1 - 2\beta_1}{\alpha_1}, \dots$$

Ἐκ τούτων παρατηροῦμεν ὅτι, δυνάμεθα νὰ δώσωμεν ἀπειρον πλῆθος τιμῶν εἰς τὸν γ, καὶ ἀκολούθως εὑρίσκουμεν καὶ ἀπειρον πλῆθος ἀντιστοιχουσῶν τιμῶν τοῦ x. Διὰ τοῦτο, τὸ δοθὲν σύστημα κατὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐπιδέχεται ἀπειρον πλῆθος λύσεων, καὶ θὰ τὸ καλοῦμεν ἀδύοισιστον.

ε') Ἐὰν εἶνε $a = a_1 = \beta = \beta_1 = 0$, τὰ δὲ γ καὶ γ_1 ,

ἡ ἐν ἔκ τούτων διάφορον τοῦ μηδενὸς, τὸ σύστημα εἶνε ἀδύνατον.
Διότι, τὰ μὲν πρῶτα μέλη τῶν ἔξισώσεων (1) γίνονται μηδὲν, τὰ δὲ δευτέρα, ἡ τὸ ἐξ αὐτῶν, θὰ εἶνε διάφορον τοῦ μηδενὸς, τὸ δοιον ἀντιβαίνει εἰς τὴν ὑπόθεσιν.

Τέλος, ἐὰν εἶνε καὶ τὰ γ, γ_1 ἵσα μὲ μηδὲν, αἱ ἔξισώσεις (1) εἶνε ταῦτότητες, καὶ ἐπαληθεύονται δι' οἵασδήποτε τιμάς τῶν x καὶ y.

στ') Ἀνακεφαλαιοῦντες τὸ ἀνωτέρῳ ἔχομεν τὸν ἔξης πίνακα

$$\text{Αύσις τοῦ συστήματος} \quad \left| \begin{array}{l} a x + \beta y = \gamma \\ a_1 x + \beta_1 y = \gamma_1. \end{array} \right.$$

1) ἀν εἶνε $\frac{a}{a_1} \neq \frac{\beta}{\beta_1}$, τὸ σύστημα ἔχει μίαν μόνην λύσιν, τὴν $x = \frac{\gamma \beta_1 - \beta \gamma_1}{a \beta_1 - \beta a_1}, \quad y = \frac{a \gamma_1 - \gamma a_1}{a \beta_1 - \beta a_1}$

2) ἀν εἶνε $\frac{a}{a_1} = \frac{\beta}{\beta_1} \neq \frac{\gamma}{\gamma_1}$ τὸ σύστημα εἶνε ἀδύνατον.

3) ἀν εἶνε $\frac{a}{a_1} = \frac{\beta}{\beta_1} = \frac{\gamma}{\gamma_1}$ τὸ σύστημα εἶνε ἀδύοιστον

4) ἀν εἶνε $a, \beta, \gamma, a_1, \beta_1, \gamma_1 = 0$, εἶνε ἀδύοιστον.

5) ἀν εἶνε $a, \beta, a_1, \beta_1 = 0$, καὶ $\gamma \neq \gamma_1$ καὶ $\gamma_1 \neq 0$, τὸ σύστημα εἶνε ἀδύνατον.

ζ') Ἐστω τὸ σύστημα $\lambda x + y = 2$, $x + y = 2\lambda$, διόπου τὸ λ ὑποτίθεται ὅτι εἶνε ποσότης γνωστή. Ἐχομεν $a \beta_1 - a_1 \beta = \lambda - 1$.

Ἐπομένως, ἐὰν τὸ λ εἶναι διάφορον τῆς 1, τὸ σύστημα ἔχει μίαν λύσιν, τὴν

$$x = \frac{2(1-\lambda)}{\lambda-1} = -2, \quad y = \frac{2(\lambda^2-1)}{\lambda-1} = 2(\lambda+1).$$

Ἐὰν τὸ $\lambda=1$ τὸ $\alpha_1\beta-\alpha_1\beta=0$, καὶ τὸ σύστημα γίγεται, ἀν θέσω-
μεν ἀντὶ λ τὸ 1, $x+y=2$, $x-y=2$.

Ἡτοι τὸ σύστημα ἔχει μίαν μόνην ἔξισωσιν, καὶ εἶναι ἀδόριστον.

Ασκήσεις. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα καὶ νὰ διερευνηθοῦν διὰ τὰς δια-
φόρους τιμὰς τοῦ λ .

$$\alpha') \quad \lambda x + y = 2 \quad \beta') \quad \lambda x - 2y = \lambda \quad \gamma') \quad x + (3\lambda - 1)y = 0$$

$$x + y = 2. \quad (\lambda - 1)x - y = 1. \quad x + 2y = \lambda - 4,$$


$$\delta') \quad y = \lambda x + 2 \quad \varepsilon') \quad x + y = \lambda \quad \sigma') \quad (\lambda^2 - 1)x - y = \lambda$$

$$3y - \lambda = x + 3. \quad \lambda x + y = 1. \quad 2x - y = \lambda - 1.$$

§ 25.) Γεωμετρικὴ παράστασις τῶν ριζῶν συστή-
ματος δύο ἔξισώσεων.—

Ἐστω τὸ σύστημα $3x - 2y = 6, \quad x - 2y = 4$.

Αύοντες αὐτὸς εὑρίσκομεν $x = 1, y = -\frac{3}{2}$. Τὸ σημεῖον, τὸ
δποῖον παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν $(1, -\frac{3}{2})$



(Σχ. 6)

κεῖται ἐπὶ καθεμιᾶς τῶν εὐθειῶν E_1, E_2 , τὰς ὅποιας παριστάνουν ἀντι-
στοίχως αἱ ἔξισώσεις τοῦ συστήματος. Ἐπομένως, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ
σημεῖον τοῦτο, ἀρκεῖ νὰ κατασκευάσωμεν καθεμίαν τῶν εὐθειῶν
τοῦ συστήματος, καὶ τὸ σημεῖον τῆς τομῆς των παριστάνει τὰς ρί-
ζας τοῦ συστήματος (σχ. 6).

Ασκήσεις. Εύρετε τό σημείον τῆς τομῆς τῶν εὐθειῶν

$$\alpha') 4x - 5y = 1 \quad \beta') \frac{3}{4}x - 9y - 5 = 0 \quad \gamma') \frac{3}{4}x - \frac{5}{8}y - \frac{1}{2} = 0$$

$$3x + 7y = 6 \quad x - 3y = 0 \quad x + 9y - 7 = 0.$$

$$\delta') \frac{x+1}{3} = \frac{y+4}{2} \quad \varepsilon') \frac{x-y}{3} - \frac{x+y}{z} + 1 = 0 \quad \sigma\tau') \frac{1}{x} - \frac{2}{y} = \frac{2}{xy}$$

$$x - 2y = 0, \quad x - 7y = 0. \quad x + y = 3$$

§ 76. Συστήματα ἔξισώσεων πρώτου βαθμού μὲ περισσοτέρους τῶν δύο ἀγνώστων.—

α') Εάν ἔχωμεν ἐν σύστημα τριῶν ἔξισώσεων μὲ τρεῖς ἀγνώστους π. χ.

$$(1) \left\{ \begin{array}{l} x + 2y + 3w = 14, \\ 2x + y + w = 7, \\ 3x + 2y + 2w = 13, \end{array} \right.$$

δυνάμεθα νὰ τὸ λύσωμεν διὰ μιᾶς τῶν μέθοδων, τὰς δποίας ἐγνωρίσαμεν. Οὕτω διὰ τῆς μεθόδου τῶν ἀντιμέτων συντελεστῶν, ἀπαλείφομεν τὸν x μεταξὺ τῶν δύο πρώτων ἔξισώσεων ἐκ τῶν (1) καὶ ἔχομεν

$$\begin{array}{r|l} 2 & x + 2y + 3w = 14 \\ -1 & 2x + y + w = 7 \\ \hline & 3y + 5w = 21. \end{array}$$

Ἀπαλείφομεν τὸν x μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τρίτης τῶν (1) καὶ ἔχομεν

$$\begin{array}{r|l} 3 & x + 2y + 3w = 14 \\ -1 & 3x + 2y + 2w = 13 \\ \hline & 4y + 7w = 29. \end{array}$$

Λύομεν τὸ $3y + 5w = 21$, $4y + 7w = 29$
καὶ εὐρίσκομεν τὰς τιμὰς $w = 3$, $y = 2$.

Ἐάν τὰς τιμὰς τῶν w καὶ y ἀντικαταστήσωμεν εἰς μίαν τῶν (1), εὑρίσκομεν εὐκόλως καὶ τὴν τιμὴν τοῦ x = 1.

β') Τὸ ἀνωτέρῳ σύστημα λύομεν καὶ διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀντικαταστάσεως ὡς ἔξης. Λύομεν τὴν μίαν τῶν (1), ἔστω τὴν πρώτην ὡς πρὸς τὸν ἑνα τῶν ἀγνώστων, π, χ. ὡς πρὸς x, θεωροῦντες τοὺς ἄλλους δύο ὡς γνωστούς. Οὕτω εὑρίσκομεν τὴν ἔξισωσιν

$$x = 14 - 2y - 3w. \quad (2)$$

Ταύτην θέτομεν εἰς τὰς ἄλλας τῶν (1) καὶ οὕτω θὰ ἔχωμεν τὰς κάτωθι δύο ἔξισώσεις μὲ δύο ἀγνώστους

$$2(14 - 2y - 3\omega) + y + \omega = 7$$

$$3(14 - 2y - 3\omega) + 2y + 2\omega = 13$$

ἡ μετὰ τὴν διάταξιν $3y + 5\omega = 21$, $4y + 7\omega = 29$,
ἐκ τῶν ὁποίων εὑρίσκομεν τὴν τοῦ y καὶ ω . Ἀκολούθως τὰς τιμὰς
τούτων ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν (2) καὶ εὑρίσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ x .

γ') Τὸ δοθὲν σύστημα (1) λύομεν καὶ διὰ τῆς μεθόδου τῆς συγκρί-
σεως ὡς ἔξῆς. Ἀπομονοῦμεν ἑνα τῶν ἀγνώστων, π. χ. τὸν x , εἰς καθε-
μίαν τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων (1), θεωροῦντες τοὺς ἄλλους δύο ἀγνώ-
στους ὡς γνωστούς.

Τὴν πρώτην τῶν οὕτω εὑρίσκομένων τιμῶν τοῦ x ἔξισώνομεν μὲ
τὴν δευτέραν καὶ τὴν τρίτην, καὶ λαμβάνομεν δύο ἔξισώσεις μέ δύο
ἀγνώστους. Οὗτο ἔχομεν σύστημα δύο ἔξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους, τὸ
δοποῖον λύομεν, καὶ εὑρίσκομεν τὰς τιμὰς τῶν y καὶ ω . Ἀκολούθως
εὑρίσκομεν καὶ τὴν τιμὴν τοῦ x , ἀφοῦ ἀντικαταστήσωμεν τὸ y καὶ τὸ
 ω διὰ τῶν τιμῶν των.

δ') Ἐν γένει, διὰ νὰ λύσωμεν σύστημα μὲ ἔξισώσεων μὲ μὲ ἀγνώστους
εἰς πρῶτον βαθμόν, ἀπαλείφομεν μεταξὺ τῆς πρώτης τῶν δοθεισῶν καὶ
ἐκάστης τῶν ($\mu - 1$) ἄλλων ἑνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀγνωστον. Οὗτο προκύ-
πτουν ($\mu - 1$) νέας ἔξισώσεις μὲ ($\mu - 1$) ἀγνώστους. Αὗται μὲ τὴν πρώ-
την τῶν δοθεισῶν ἀποτελοῦν σύστημα ἰσοδύναμον μὲ τὸ δοθὲν. Εἰς τὸ
σύστημα τοῦτο ἐργαζόμεθα διοίως, λαμβάνοντες τὰς νέας ($\mu - 1$) ἔξι-
σώσεις του ἀπὸ τῆς δευτέρας καὶ ἔξῆς. Οὗτο, προκύπτουν ($\mu - 2$) ἔξισώ-
σεις μὲ ($\mu - 2$) ἀγνώστους. Αὗται μὲ τὰς δύο πρώτας ἔξισώσεις τοῦ δευτέ-
ρου συστήματος ἀποτελοῦν σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ δοθὲν. Οὗτο
προχωροῦντες, θὰ εὑρωμεν σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ δοθὲν μὲ μὲ ἔξι-
σώσεις. Ἐκ τῶν ἔξισώσεων τούτων ἡ τελευταία θὰ ἔχῃ ἑνα ἀγνωστον· ἡ
προτελευταία δύο· ἡ πρὸ αὐτῆς τρεῖς· καὶ οὕτω καθεξῆς, ἡ πρώτη θὰ
ἔχῃ μὲ ἀγνώστους. Λύοντες τὴν τελευταίαν, εὑρίσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ
ἔνδος ἀγνώστου. Εἰσάγομεν τὴν τιμὴν τούτου εἰς τὴν προηγούμενην ἔξι-
σώσιν καὶ λύομεν αὐτὴν, καὶ οὕτω καθεξῆς μέχρι τῆς πρώτης.

Α σ κ η σ εις

‘Ομάς πρώτη. Νὰ λυθοῦν καὶ ἐπαληθευθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα.

$$\alpha') 3x - 5y + 6\omega = 9 \quad \beta') 9x + 8y + 2\omega = 30 \quad \gamma') \frac{x}{2} + y = 3,$$

$$4x + 7y - 6\omega = 13. \quad 8x + 3y - 9\omega = 36, \quad \frac{y}{3} - \omega = 2,$$

$$2x + 3y - 4\omega = 12. \quad x + 2y - 9\omega = 37. \quad \frac{\omega}{4} + x = 7,$$

$$\delta') \quad x + y + \omega = 15$$

$$0,5x + 0,3y + 0,6\omega = 8,3$$

$$0,8x + 0,9y + 0,6\omega = 2.$$

Όμάδας δευτέρα. Όμοιως τὰ

$$\alpha') \quad \alpha^3 + \alpha^2 x + \alpha y + \omega = 0$$

$$\beta^3 + \beta^2 x + \beta y + \omega = 0$$

$$\gamma^3 + \gamma^2 x + \gamma y + \omega = 0.$$

$$\varepsilon') \quad 9x + 8y + 8\omega = 38$$

$$\frac{3}{5}x + y + 8\omega = 38$$

$$x + 9y + 7\omega = 39.$$

$$\beta') \quad \frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = \gamma (z + \beta)$$

$$\frac{x}{\beta} + \frac{\omega}{\gamma} = \alpha (\beta - \gamma)$$

$$\frac{y}{\gamma} + \frac{\omega}{\alpha} = \beta (z + \gamma).$$

$$\gamma') \quad x + y + \omega = 0$$

$$(\beta + \gamma)x + (\gamma + z)y + (z + \omega)\omega = 0$$

$$\beta\gamma x + \alpha\gamma y + \alpha\beta\omega = 1.$$

$$\delta') \quad x + y + \omega = 1$$

$$\alpha x + \beta y + \gamma\omega = k$$

$$\alpha^2 x + \beta^2 y + \gamma^2 \omega k^2.$$

$$\epsilon') \quad 5x + 3y - 2\omega + \varphi = 9 \quad \sigma') \quad 6x + 2y + \omega + 7\varphi = 14 \quad \zeta') \quad \alpha x + \rho (y + \omega + \varphi) = k$$

$$3x + 4y + 3\omega - 2\varphi = 12$$

$$9y + 6x + \omega + 3\varphi = 29$$

$$\beta y + \varphi (\omega + x + \varphi) = \lambda$$

$$6x + 2y - 4\omega + 3\varphi = 10$$

$$8\omega + 6\varphi + y + x = 22$$

$$\gamma\omega + \varphi (\varphi + x + y) = \mu$$

$$2x + 5y - \omega + 4\varphi = 25.$$

$$6\varphi + \omega + y + 7x = 35.$$

$$\delta\varphi + \varphi (x + y + \omega) = v.$$

Όμάδας τρίτην. 1) Ενίστε πρός λύσιν συστήματός τίνος πρό της έφαρμογῆς τῶν γνωστῶν μεθόδων μεταχειρίζομεθα τεχνώσματά τινα, στηρίζομενα ἐπὶ τῶν θεμελιώδῶν νόμων καὶ ἴδιοτήτων. Τὸ εἰδός τούτων δὲν εἶναι ὁρισμένον καὶ φανερόν διὰ καθένα σύστημα, ἀλλ᾽ ἔχαρτάται: ἐκ τῆς συνηθείας καὶ τῆς δεξιότητος τοῦ νοῦ περὶ τὴν λύσιν. Οὕτω π. γ. πρός λύσιν τοῦ συστήματος

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} x + 6y + 7\omega = 30 \\ x : y : \omega = 6 : 8 : 3, \end{array} \right.$$

$$\text{γράφομεν τὴν δευτέραν ως } \frac{x}{6} = \frac{y}{8} = \frac{\omega}{3}$$

Κατὰ γνωστὴν ἴδιοτητα τῶν ἵσων κλασμάτων 0x εἶναι (καὶ ἔνεκα τῆς πρώτης ἔξιστωσεως)

$$\frac{x}{6} = \frac{6y}{48} = \frac{7\omega}{21} = \frac{x+6y+7\omega}{75} = \frac{30}{75} = \frac{2}{5}$$

$$\text{Έπομένως } x = \frac{12}{5} = 2 \frac{2}{5}, y = \frac{16}{5} = 3 \frac{1}{5}, \omega = \frac{6}{5} = 1 \frac{1}{5}$$

2) Λύσατε καὶ ἐπαληθεύσατε τὰ κάτωθι συστήματα

$$\alpha') \quad \frac{1}{4}x + \frac{1}{5}y + \frac{1}{6}\omega = 9,$$

$$x : y = 7 : 4, \quad y : \omega = 8 : 17.$$

$$x + y + \omega = ?$$

$$x : y = \alpha : \beta$$

$$x : \omega = \gamma : \delta.$$

$$\gamma') \quad x + y = 5$$

$$y + \omega = 8$$

$$\omega + \varphi = 9$$

$$\varphi + x = 9.$$

$$\delta') \quad x + y + \omega = ?$$

$$x + y + \varphi = ?$$

$$x + \omega + \varphi = ?$$

$$y + \omega + \varphi = ?$$

$$\varepsilon') \quad \mu x = \gamma y = \varphi \omega$$

$$\sigma \tau') \quad \frac{x}{\alpha} = \frac{y}{\beta} = \frac{\omega}{\gamma} = \frac{\varphi}{\delta}$$

$$\alpha x + \beta y + \gamma \omega = \delta.$$

$$\alpha x + \beta y + \gamma \omega = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$\zeta') \quad \frac{1}{3x - 2y + 1} + \frac{1}{x + 2y - 3} = \frac{5}{12}, \quad \begin{cases} 0 \text{ σατε} \\ x + 2y - 3 = \omega, \\ 3x - 2y + 1 = \varphi. \end{cases}$$

$$\frac{1}{x + 2y - 3} - \frac{1}{3x + 2y + 1} = \frac{1}{12}.$$

$$\eta') \quad \frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y} = \mu$$

$$\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y} = \nu.$$

$$\theta') \quad 4 \sqrt{x} - 5 \sqrt{y} = 12$$

$$16x - 25y = 84.$$

$$\iota') \quad \frac{xy}{x+y} = \frac{12}{7}$$

$$\frac{y\omega}{y+\omega} = \frac{49}{5}$$

$$\frac{x\omega}{x+\omega} = \frac{39}{25}.$$

$$\alpha') \quad \frac{\gamma y}{\alpha x + \beta y} = \gamma$$

$$\frac{x\omega}{\alpha\omega + \gamma x} = \beta$$

$$\frac{y\omega}{\beta\omega + \gamma y} = \alpha.$$

$$\beta') \quad xy\omega = \alpha(y\omega - \omega x - xy) = \beta(\omega x - x y - y\omega) = \gamma(xy - y\omega - \omega x).$$

Όμας τετάρτην. Ι) 'Εξηγήσατε τὴν διερεύνησιν τοῦ συστήματος
 $\alpha x + \beta y = \gamma$
 $\alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1$ γραφικῶς. ἔτοι α') τὶ σημαίνει γεωμετρικῶς τὸ ὅτι τὸ σύστημα
 ἐπιδέχεται μίαν λύσιν, ἀπειρον πλῆθος λύσεων, ὅτι εἶναι ἀδύνατον;

2) Τὶ σημαίνει γεωμετρικῶς τὸ ὅτι τρεῖς ἑξισώσεις μὲν δύο ἀγνώστους x καὶ y
 ἐπαληθεύονται διὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς των ἀγνώστων των;

§ 77. Άπλα προβλήματα συστημάτων.—

(Πρόβλημα 1). «'Εὰν δὲ A δώσῃ 10 δρ. εἰς τὸν B , θὰ ἔχῃ οὗτος
 τριπλάσια τοῦ A . 'Εὰν δὲ B δώσῃ 20 δρ. εἰς τὸν A , θὰ ἔχῃ δὲ A
 διπλάσια τοῦ B . Πόσας δραχμὰς εἶχε καθεὶς;»

'Εὰν διὰ τοῦ x παρασήσωμεν τὰς δραχμὰς τοῦ A καὶ διὰ τοῦ y
 τὰς τοῦ B , δώσῃ δὲ 10 δρ. δὲ A εἰς τὸν B , τὰ μὲν χρήματα τὰ ὄποια
 θὰ μείνουν εἰς τὸν A θὰ παριστάνωνται διὰ τοῦ $(x-10)$ τὰ δὲ τοῦ B
 διὰ τοῦ $(y+10)$. Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ πραβλήματος θὰ ἔχωμεν

$$3(x-10) = y+10$$

'Εὰν δὲ B δώσῃ 20 δρ. εἰς τὸν A , θὰ εἴναι $x+20=2(y-20)$,

“Ωστε ἔχομεν τὸ σύστημα

$$y+10 = 3(x-10),$$

$$2(y-20) = x+20,$$

ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ὄποιου εὑρίσκομεν, ὅτι $y = 28$ δρ., $x = 44$ δρ.

(Πρόβλημα 2.) «'Εάν κλάσματος τινος διπλασιασθῇ ὁ ἀριθμητής, δ δὲ παρανομαστὴ; ἐλαττωθῇ κατὰ 1, γίνεται ἵσον μὲ $\frac{1}{2}$.

'Εάν διπλασιασθῇ ὁ παρανομαστῆς, αὐξηθῇ δ' ὁ ἀριθμητῆς του κατὰ 1, γίνεται ἵσον μὲ $\frac{1}{7}$. Νὰ εὑρεθῇ τὸ κλάσμα».

"Εστω x ὁ ἀριθμητῆς καὶ y ὁ παρονομαστῆς τοῦ ζητούμενου κλάσματος. 'Αφ' ἐνὸς μὲν θὰ ἔχωμεν συμφώνως μὲ τὴν ἐκφόνησιν

$$\frac{2x}{y-1} = \frac{1}{2}, \text{ εἰς ἄλλου δὲ } \frac{x+1}{2y} = \frac{1}{7}$$

$$\text{ἵτοι τὸ σύστημα } \frac{2x}{y-1} = \frac{1}{2}, \quad \frac{x+1}{2y} = \frac{1}{7}$$

$$\text{Λύοντες τοῦτο, εὑρίσκομεν } x = 5 \quad y = 21.$$

$$\text{Ἐπομένως τὸ ζητούμενον κλάσμα εἶνε τὸ } \frac{5}{21}$$

(Πρόβλημα 3). «Δύο κινητὰ ἀναχωροῦν ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου καὶ ψ' ἀπέχουν τὸ ἐν τοῦ ἄλλου 12 μ. μὲν, ἐὰν κινηθῶν ἐπὶ 12'' πρὸς τὴν αὐτὴν φοράν, 204 μ. δὲ ἐὰν πρὸς ἀντιθέτους. Πόση εἶνε ἡ ταχύτης καθενὸς (κινουμένου δμαλῶς)»;

"Εστω x ἡ ταχύτης τοῦ πρώτου καὶ y ἡ τοῦ δευτέρου. Μετὰ 12'' τὸ πρώτον θὰ διατρέξῃ 12 x τὸ δεύτερον 12 y μέτρα, ἡ δὲ ἀπόστασίς των θὰ εἶνε τότε $(12x - 12y)$ μ., ἐὰν ἔχουν τὴν αὐτὴν φοράν καὶ $(12x + 12y)$ μ. ἐὰν ἀντιθέτον. Κατὰ τὴν ἐκφόνησιν τοῦ προβλήματος θὰ ἔχωμεν τὸ ἔξις σύστημα-

$$12x - 12y = 12, \quad 12x + 12y = 204,$$

$$\text{ἐκ τῆς λύσεως τοῦ διπλοῦ εὑρίσκομεν } x = 9 \mu, y = 8 \mu.$$

(Πρόβλημα 4). «'Εάν εἰς τὸ διπλάσιον ἀριθμοῦ προστεθῇ τὸ τετραπλάσιον ἄλλου, προκύπτει ἀδροισμα 22. 'Εάν εἰς τὸ τριπλάσιον τοῦ πρώτου προστεθῇ τὸ πενταπλάσιον τοῦ δευτέρου, προκύπτει 29. Ποῖοι εἶνε οἱ δύο ἀριθμοὶ;»

"Εάν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν πρώτον καὶ διὰ τοῦ y τὸν δευτέρον ἀριθμὸν, τὸ διπλάσιον τοῦ πρώτου θὰ εἶνε $2x$, τὸ δὲ τετραπλάσιον τοῦ δευτέρου $4y$. Κατὰ τὴν ἐκφόνησιν τοῦ προβλήματος ἔχομεν

$$2x + 4y = 22.$$

Ἐξ ἄλλου τὸ τριπλάσιον τοῦ πρώτου 3 x καὶ τὸ πενταπλάσιον τοῦ δευτέρου 5 y ἔχουν ἀθροισμα 29. Ὡστε ἔχομεν τὸ σύστημα

$$2x + 4y = 22, \quad 3x + 5y = 29,$$

ἐκ τῆς λύσεως τοῦ δποίου εὑρίσκομεν $x = 3$, $y = 4$.

(Πρόβλημα 5). «Παιδίον λέγει εἰς ἄλλο· ἐὰν μοῦ δώσῃς τὸ ἥμισυ τῶν μῆλων σου, θὰ ἔχω 40 μῆλα. Τὸ ἄλλο ἀπαντᾷ· δός μου τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν ἰδικῶν σου διὰ νὰ ἔχω 35. Πόσα εἶχε τὸ παθέν;

Ἐὰν διὰ x παραστήσωμεν τὰ μῆλα τοῦ πρώτου καὶ διὰ y τοῦ δευτέρου, κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος θὰ ἔχωμεν τὸ σύστημα

$$x + \frac{y}{2} = 40, \quad y + \frac{x}{2} = 35.$$

Λύοντες αὐτὸν εὑρίσκομεν ὅτι $x = 30$, $y = 20$ μῆλα.

(Πρόβλημα 6). «Ἔχει τις δύο εἴδη οίνου τῆς πρώτης ποιότητος ἡ δικαίη τιμᾶται α δρ. τῆς δὲ δευτέρας β δρ. πόσας δικάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ παθὲν είδος, ὅστε νὰ σχηματίσῃ ιρᾶμα μ δικάδων καὶ νὰ τιμᾶται ἡ δικαίη γ δρ. ;»

Ἐστω ὅτι θὰ θέσῃ x δκ. ἐκ τῆς πρώτης ποιότητος καὶ y ἐκ τῆς δευτέρας. Θὰ ἔχωμεν προφανῶς $x + y = \mu$, $\alpha x + \beta y = \gamma\mu$,

ἐκ τῶν δποίων εὑρίσκομεν $x = \mu \frac{\beta - \gamma}{\beta - \alpha}$, $y = \mu \frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}$.

Ἔνα ὑπάρχη μία λύσις τοῦ συστήματος, πρέπει νὰ είνε $\beta - \alpha \neq 0$, ἢ $\beta \neq \alpha$. Καὶ ἂν εἰνε $\beta > \alpha$, πρέπει καὶ $\beta \geq \gamma$, $\gamma \geq \alpha$, ὅστε αἱ τιμαὶ τοῦ x καὶ y νὰ είνε θετικαί, ἢ μηδέν. Ἄν εἰνε $\beta < \alpha$, πρέπει καὶ $\beta \leq \gamma$, $\gamma \leq \alpha$ διὰ τὸν χύτην λόγον. Ἄν εἰνε $\beta = \alpha$, τὸ πρόβλημα είνε ἀδύνατον, ἐκτὸς ἂν εἰνε καὶ $\beta = \gamma$, ὅτε καταντᾶ ἀριστον. Ἐν γένει, διὰ νὰ ἐπιδέχεται λύσιν τὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ είνε $\beta > \gamma > \alpha$, ἢ $\beta < \gamma < \alpha$, δηλαδὴ τὸ γ πρέπει νὰ κεῖται μεταξὺ τῶν α καὶ β.

(Πρόβλημα 7). «Τριψηφίου ἀριθμοῦ τὸ ἀθροισμα τῶν ψηφίων είνε 21· τὸ ἀθροισμα τῶν ἀκρων ψηφίων του είνε· διπλάσιον του μεσαίου· ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὰ ψηφία τῶν ἑκατοντάδων καὶ δεκάδων, δ ἀριθμὸς ἔλαττωνται κατὰ 90. Νὰ εὑρεθῇ δ ἀριθμός».

Ἐὰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων τοῦ ἀριθμοῦ, διὰ τοῦ y τῶν δεκάδων, καὶ διὰ τοῦ w τῶν μονάδων,

ὅτι ἀριθμὸς παριστάνεται ὑπὸ τοῦ $100x + 10y + \omega$. Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος θὰ ἔχωμεν τὸ σύστημα

$$x + y + \omega = 21, \quad x + \omega = 2y$$

$$100y + 10x + \omega = 100x + 10y + \omega = 90$$

εἰκ τῆς λύσεως τοῦ ὅποιου εὐρίσκομεν, ὅτι

$$x = 8, y = 7, \omega = 6.$$

Ἐπομένως δὲ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι δὲ 876.

(Πρόβλημα 8). «Ο Α καὶ Β μαζὸν ἔργαζόμενοι, τελειώνουν ἐν ἔργον εἰς 5 ἡμ., δὲ Α καὶ Γ εἰς 6, δὲ δὲ Β καὶ Γ εἰς 5, 5 ἡμ. (τὸ αὐτὸν ἔργον). Εἰς πόσας ἡμέρας καθεὶς μόνος τῶν Α, Β, Γ, δύναται νὰ τὸ ἐκτελέσῃ;»

Ἐστω ὅτι εἰς x, y, ω , ἡμέρας δύναται ἀντιστοίχως δὲ A, B, G νὰ ἐκτελέσῃ μόνος τὸ ἔργον. Ο Α εἰς μίαν ἡμέραν θὰ ἐκτελέσῃ τὸ $\frac{1}{x}$ μέρος τοῦ ἔργου, δὲ B τὸ $\frac{1}{y}$, καὶ δὲ G τὸ $\frac{1}{\omega}$. Αρα δὲ A καὶ B εἰς μίαν ἡμέραν ἐκτελοῦν $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ τοῦ ἔργου. Άλλ' αὐτὸν εἶναι $\frac{1}{5}$. Διότι ἀφοῦ οἱ δύο εἰς 5 ἡμ. ἐκτελοῦν τὸ ἔργον, εἰς 1 ἡμέραν ἐκτελοῦν τὸ $\frac{1}{5}$ τοῦ ἔργου. Ωστε ἔχομεν ὅτι

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{5}$$

Κατὰ ἀνάλογον τρόπον σκεπτόμενοι ἔχομεν τὸ σύστημα

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{5} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{\omega} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{\omega} = \frac{2}{11} \end{array} \right. \quad \left(\frac{1}{5,5} = \frac{1}{11} \right)$$

Προσθέτοντες ταύτας κατὰ μέλη, καὶ διαιροῦντες διὰ 2, ἔχομεν

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{\omega} = \frac{181}{660}$$

Αφαιροῦντες ἀπὸ αὐτῆς τὴν πρώτην ἔξισωσιν τῶν (1), εὑρίσκομεν

$$\frac{1}{\omega} = \frac{49}{660}. \quad \text{Αρα } \omega = \frac{660}{49} = 13 \frac{23}{49}$$

Όμοιώς εὑρίσκομεν $\frac{1}{y} = \frac{71}{660}$, $y = 9 \frac{21}{71}$, $\frac{1}{x} = \frac{61}{660}$, $x = 10 \frac{50}{61}$

Προβλήματα πρόσιν

Όμιλος πρώτη. 1) 2 (3) ὅκ. ζαχάρεως καὶ 3 (4) ὅκ. καφὲ ἐκόστιζον 9, 12 (14,94) δρ. · 3 (4) ὅκ. ζαχάρεως καὶ 2 (5) ὅκ. καφὲ τῶν αὐτῶν ποιοτήτων ἐκόστιζον 7,68 (18,92) δρ. Πόσον ἔτιμάτο ἡ ὄκκη καθευνός; 0,96·2,4. (0,98·3).

2) "Εγει τις κεφαλίου 5400 (8100) δρ. καὶ ἂλλο 6500 (3600) δρ., λαμδάνει δὲ καὶ ἔτος τόκον 384 (462) δρ. καὶ ἐπ τῶν δύο. Ἐὰν τὸ πρώτον ἔτοκιζετο πρὸς τὸ ἐπιτόκιον τοῦ δευτέρου, καὶ τούναντίον, θὰ ἐλάμβανε 5 $\frac{1}{2}$ (24) δρ. περισσότερας (όλιγωτέρας) ὡς τόκον ἡ πρίν. Τίνα τὰ ἐπιτόκια; 3,5·3. (4·3,5).

3) Νὰ εύρεθοισην δύο ἀριθμοί, τῶν ὅποιων τὸ ἄθροισμα, τὸ γινόμενον (ἢ διαφορὰ), καὶ τὸ πηλίκον (γινόμενον) νὰ εἴναι τοσα (ὡς 5:3 16). 0,5·—1 (16·4).

4) Ποσὸν 8100 (8600) δρ. νὰ μοιρασθῇ εἰς τρία πρόσωπα, ὥστε τὰ μερίδια τοῦ α' καὶ β' νὰ εἴναι ὡς 2: 3 (2: 3)· τοῦ δὲ β' καὶ γ' ὡς 3: 4 (5:6). Ποῖα τὰ μερίδια; 1800· 2700· 3600 (2000· 3000· 3600).

5) Ἀγοράζει τις δύο εἴδη ὑφάσματος, ἐκ μὲν τοῦ πρώτου 5 (8) μ. ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου 6 (10) μ. ἀντὶ 122 (132) δρ. Ἐπειδὴ ὁ ἔμπορος ἐνῆλκαξε τὰ δύο εἴδη, ἐξημαθη (ἐκερδίσεν) ὁ ἀγοραστής 2 (6) δρ. Πόσον ἔτιμάτο τὸ μέτρον καθευνός εἴδους; 10·12 (9·6).

6) Ἡ διαφορὴ δύο ἀριθμῶν εἴναι 10 (13). Τό πηλίκον τοῦ μεγαλυτέρου διὰ τοῦ μικροτέρου είναι 2 (3), τὸ δὲ ὑπόλοιπον 3 (1). Τίνες οἱ ἀριθμοί; 17·7. (19·6).

7) Δύο δυνάμεις, ἐνεργοῦσαι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου, ὁμορρόπως μέν, ἔχουν συνισταμένην 16 (23) γρ., ἀντιρρόπως δὲ 2 (7) γρ. Πόση εἴναι ἡ ἔντασης καθεμιᾶς τούτων; 9·7. (15·8).

8) Ἐὰν εἰς τοὺς ὥρους κλάσματος τινος προστεθῇ 1 (2) προκύπτει $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)$.

Ἐὰν ἀφαιρεθῇ 1 (2) προκύπτει $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} \right)$. Ποῖον εἴναι τὸ κλάσμα; $\frac{3}{7} \left(\frac{3}{8} \right)$.

9) Ὁ Α λέγει εἰς τὸν Β δός μου 10 (20) ἐκ τῶν μῆλων σου καὶ θὰ ἔχω $1 - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right)$ τῶν ἰδικῶν σου. Ὁ Β ἀπαντᾷ, δός μου 10 (20) ἐκ τῶν ἰδικῶν σου, διὰ νὰ ἔχω τετραπλάσια τῶν ἰδικῶν σου. Πόσα εἴχε καθείς; 20·30. (40·60).

Όμιλος δευτέρα. (κινήσεως). 1) Ἐκ δύο σημείων, ἀπεγόντων δ (1500) μ. ἀναχωροῦν συγγρόνως δύο κινητά, ὁμαλῶς καὶ ἀντιθέτως κινούμενα. "Οταν συνηντήθη σαν τὸ πρώτον εἴχε διατρέξει δ' (300) μ. περισσότερα ποῦ ἄλλου. Τίς ὁ λόγος τῶν ταχυτήτων των; Διερεύνησις (30:20).

2) Ἀπό δύο τόπων ἀπεγόντων δ (1500) μ. ἀναχωροῦν δύο κινητὰ καὶ συναντῶντα μετὰ t_1 (10). Ἐὰν ηὕτανετο ἡ ταχύτης τοῦ πρώτου κατὰ λ (20) $^{\circ}/_{\circ}$, θὰ συνηντῶντο μετὰ t_2 (12)'. Τίνες εἴναι αἱ ταχύτητές των; Διερεύνησις (12, 5· 137,5)

3) Από τῶν ἀκρων τόξου κύκλου α^0 (45°) κυριοῦται: ἐπ' αὐτοῦ δύο κινητὰ ἀντιθέτως, καὶ συναντῶνται μετὰ τ_4'' (3''). Εὖ κυριοῦται πρὸς τὴν αὐτὴν φοράν, συναντῶνται μετὰ τ_2'' (5''). Πόσων μοιρῶν τόξου διαγύει καθὲν κινητὸν εἰς 1'';

Διερεύνησις. (12·3).

Ομάς τρίτη. (Γεωμετρικά). 1) Αἱ πλευραὶ τριγώνου εἴνε α (8) μ., β (10) μ., γ (12) μ. Πόσου εἴνε τὸ μῆκος τῶν πλευρῶν ὥμοιον του τριγώνου, ἔχοντος περίμετρον τ (60) μ.; 16· 20· 24

2) Τρεῖς κύκλοι ἐφάπτονται μεταξὺ των ἔξωτερικῶν. Πόσαι εἴνε αἱ ἀκτίνες των, ἐὰν αἱ ἀποστάσεις τῶν κέντρων των εἴνε α (4), β (5), γ (8); (3·5·0·5·4·5).

3) Ἡ βάσις καὶ τὸ ὑψός ὁρθογωνίου εἴνε ὡς μ.:γ (3:4). "Αν ἡ βάσις του αὐξηθῇ κατὰ α (2), τὸ δὲ ὑψός του κατὰ β (5), τὸ ἐμβαδόν του αὔξανεται κατὰ γ (30). Τίνες αἱ διαστάσεις του; (2 $\frac{14}{23}$, 3 $\frac{11}{23}$)

4) Δύο κύκλων ἐφαπτόμενων ἔξωτερικῶν (ἔσωτερικῶν) ἡ ἀπόστασις τῶν κέντρων εἴνε 0, 30 (4) μ. Πόσαι εἴνε αἱ ἀκτίνες των, ἐὰν ἔχουν λόγον 2:3 (5:4); 0, 12· 0, 18 (20·16).

5) Εὖ αὐξηθῇ ἡ βάσις τριγώνου κατὰ 1 (2) μ. καὶ ἐλαττωθῇ τὸ ὑψός του κατὰ 2 (2) μ. ἐλαττοῦται (αὔξανεται) τὸ ἐμβαδόν του κατὰ 7 (2) μ². Εὖ ἐλαττωθῇ ἡ βάσις του κατὰ 2 (3) μ., καὶ αὐξηθῇ τὸ ὑψός του κατὰ 3 (2) μ., τὸ ἐμβαδόν του ἐλαττοῦται (ἐλαττοῦται) κατὰ 10 (15) μ². Πόση εἴνε ἡ βάσις καὶ τὸ ὑψός του; 38· 64 (12·16).

Ομάς τετάρτη. 1) Νὰ εὑρεθῇ διψήφιος ἀριθμός, τοῦ ὁποίου τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων εἴνε $\frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)$ τοῦ τῶν μονάδων. "Αν γραφοῦν τὰ ψηφία του κατ' ἀντίστροφον τάξιν, προκύπτει ἀριθμός κατὰ 18 (15) μεγαλύτερός του. 46 (ἀδύνατον).

2) Νὰ εὑρεθῇ τριψήφιος ἀριθμὸς, περιεγγύμενος μεταξὺ 400 (200) καὶ 500 (300), ὥστε τὸ ἀθροίσμα τῶν ψηφίων του νὰ εἴνε 9 (8). "Αν ἀντιστραφῇ ἡ τάξις τῶν ψηφίων του προκύπτει ἀριθμός ἵσος μὲ $\frac{36}{47} \left(\frac{2}{3} \right)$ τοῦ α'. 423 (ἀδύνατον.).

3) Νὰ εὑρεθῇ τριψήφιος ἀριθμός, τοῦ ὁποίου τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων εἴνε $\frac{3}{5} \left(\frac{1}{3} \right)$ τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο ἀλλων. "Αν γραφοῦν τὰ ψηφία του κατ' ἀντίστροφον τάξιν προκύπτει ἀριθμός κατὰ 198 (200) μεγαλύτερος αὐτοῦ. 345 (ἀδύνατον).

4) Εὖ παρεμβάλωμεν μεταξὺ τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων καὶ δεκάδων διψήφιου ἀριθμοῦ τὸν 4 (5), τὸ ἀθροίσμα τῶν δύο ἀριθμῶν εἴνε 604 (392). Εὖ διαιρέσωμεν τὸν διέτερον ἀριθμὸν διὰ τοῦ πεντάου, εύρισκομεν πηλίκον 9 (9) καὶ ὑπόλοιπον 34 (32). Νὰ εὑρεθῇ ὁ ἀριθμός. 57 (36).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ

Περὶ ἀνισοτήτων

§ 78. 'Ορισμοί.—

α') Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς) ὅτι ἐὰν δύο ἀριθμοί, π. γ. στὸ 9 καὶ 15, εἰναι ἄνισοι, σημειώνομεν τὴν σχέσιν των αὐτῶν διὰ τοῦ $9 < 15$. Ὅμοιώς, ἂν δύο ἀλγεβρικαὶ παραστάσεις ἢ μεγέθη π. γ. α καὶ β εἰναι ἄνισα, καὶ τὸ α μεγαλύτερον τοῦ β, σημειώνομεν διὰ τοῦ $\beta < \alpha$, ἢ $\alpha > \beta$.

«*Η σχέσις αὐτη παλεῖται ἀνισότητος μεταξύ τῶν α καὶ β, ἐννοοῦμεν δὲ δι’ αὐτῆς, ὅτι ἡ διαφορὰ α—β εἰναι ἀριθμὸς θετικός.*»

β') Αἱ ποσότητες α καὶ β λέγονται ὅροι τῶν δύο μελῶν, ἢ ἀπλῶς ρέλη τῆς ἀνισότητος.

γ') Δύο ἀνισότητες τῆς μορφῆς $\alpha > \beta$, καὶ $\gamma > \delta$, ἢ τῆς μορφῆς $\alpha < \beta$, καὶ $\gamma < \delta$ λέγονται ὁμοιόστροφοι, ἐνῶ αἱ $\alpha < \beta$, καὶ $\gamma > \delta$ ἔτεροι στροφοι.

δ') «*Οταν λέγωμεν, ὅτι θὰ προσθέσωμεν, ἀφαιρέσωμεν κλπ. δύο (ἢ περισσοτέρας) ἀνισότητας, θὰ ἐννοοῦμεν, ὅτι θὰ προσθέσωμεν, ἀφαιρέσωμεν κλπ. τὰ ἀντίστοιχα πρῶτα καὶ δεύτερα μέλη ὁμοιοστρόφων ἀνισοτήτων.*»

§ 79. 'Ιδεότητες ἀνισοτήτων.—

α') «*Πᾶς θετικὸς ἀριθμὸς εἰναι μεγαλύτερος τοῦ μηδενός πᾶς δὲ ἀρνητικὸς εἰναι μικρότερος τοῦ μηδενός.*»

Διότι, ἂν ὁ α εἴναι θετικός, θὰ ἔχωμεν $\alpha - 0 = \alpha = \thetaετικός$.
"Αρα $\alpha > 0$.

'Ἐνῶ διὰ τὸν ἀρνητικὸν — α θὰ ἔχωμεν

$0 - (-\alpha) = +\alpha = \thetaετικός$. "Αρα $0 > \alpha$.

β') «*Εὰν τὰ μέλη ἀνισότητος αὐξήσωμεν πατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, ἢ πολλαπλασιάσωμεν (διαιρέσωμεν) μὲ τὸν αὐτὸν θετικὸν ἀριθμόν, προκύπτει ἀνισότητος δμοιόστροφος πρὸς τὴν δοθεῖσαν.*»

Διότι ἔστω διι εἴναι $\alpha > \beta$, ὅτε θὰ εἴναι καὶ $\alpha = \beta + x$, ὅπου x παριστάνει θετικὸν ἀριθμόν, ὅστις προστιθέμενος εἰς τὸν

μικρότερον β, δίδει ἄθροισμα τὸν α. Ἐὰν τὸ μ παριστάνῃ ἔνα ἀριθμόν, θὰ ἔχωμεν, ὡς γνωστὸν (§ 60, α')

$$\alpha \pm \mu = \beta + x \pm \mu, \quad \text{ἄρα} \quad \alpha \pm \mu > \beta \pm \mu.$$

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἐκ τῆς $\alpha = \beta + x$, ἔχομεν $\alpha \mu = \beta \mu + x \mu$. Ἐπομένως $\alpha \mu > \beta \mu$, ἐὰν τὸ μ, ἄρα καὶ τὸ μ x εἶναι θετικοί. Ομοίως ἐκ τῆς αὐτῆς ισοτητος ἔχομεν $\frac{\alpha}{\mu} = \frac{\beta}{\mu} + \frac{x}{\mu}$, καὶ $\frac{\alpha}{\mu} > \frac{\beta}{\mu}$, ἐὰν μ, ὅτε καὶ $\frac{x}{\mu}$, εἶναι θετικός.

γ') «Ἀν προσθέσωμεν δύο διμοιστρόφους ἀνισότητας (ἢ πολλαπλασιάσωμεν, ἀν τὰ μέλη τῶν εἶναι θετικά), προκύπτει ἀνισότης διμοιστροφος πρὸς τὴν δοθεῖσαν».

Διότι ἔστωσαν αἱ $\alpha > \beta$, $\gamma > \delta$, καὶ $\alpha = \beta + x$, $\gamma = \delta + y$, δπου x καὶ y παριστάνουν ἀριθμοὺς θετικούς. Ἐγομεν ὡς γνωστὸν (διὰ προσθέσεως τῶν ισοτήτων κατὰ μέλη)

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta + x + y, \quad \text{ἄρα} \text{ εἶναι καὶ} \quad \alpha + \gamma > \beta + \delta.$$

Ἐπίσης ἐκ τῶν ισοτήτων $\alpha = \beta + x$, $\gamma = \delta + y$. ἔπειται (διὰ πολλαπλασιαστοῦ κατὰ μέλη), ὅτι

$$\alpha \gamma = \beta \delta + \beta y + \delta x + xy, \quad \text{ἄρα} \text{ εἶναι} \quad \alpha \gamma > \beta \delta, \\ \text{ἕποτιθεμένου} \text{ ὅτι} \text{ ὅλοι} \text{ οἱ} \text{ ἀριθμοὶ} \text{ εἶναι} \text{ θετικοί.}$$

δ') «Ἀν τὰ μέλη ἀνισότητος πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ—1, προκύπτει ἀνισότης ἑτερόστροφος».

Διότι ἔστω $\alpha > \beta$, καὶ $\alpha = \beta + x$.

$$\text{Θὰ} \text{ ἔχωμεν} \quad \alpha (-1) = \beta (-1) + x (-1).$$

Ἐξ οὗ καὶ $-\beta = -\alpha + x$, $\text{ἄρα} \quad -\alpha < -\beta$.

ε') Ἀλλαι ιδιότητες ἀφορῶσαι τὴν ἀφαίρεσιν ἢ διαίρεσιν ἑτερόστροφων ἀνισοτήτων δύνανται νὰ ἔξαχθοῦν εἰκόλως ἐκ τῶν ἀνωτέρω, ἐπειδὴ καθεμία ἀφαίρεσις ἢ διαίρεσις δύναται νὰ μετατραπῇ εἰς πρόσθεσιν ἢ πολλαπλασιασμόν ἀντιστοίχως.

Οὗτω, ἐκ τῆς $\alpha > \beta$, καὶ τῆς $\gamma < \delta$ ἔπειται $\alpha - \gamma > \beta - \delta$.

Διότι, ἐκ τῆς $\gamma < \delta$ $\text{ἔπειται} \quad \text{ἢ} \quad -\gamma > -\delta$,

Ἐκ δὲ τῶν $\alpha > \beta$, $-\gamma > -\delta$, $\text{ἔχομεν} \quad \alpha - \gamma > \beta - \delta$.

Όμοιώς ἐκ τῆς $\alpha > \beta$, καὶ $\gamma < \delta$ ἔπειται ἢ $\frac{\alpha}{\gamma} > \frac{\beta}{\delta}$,

ἔὰν τὰ μέλη τῶν δοθεισῶν εἶνε θετικά. Διότι ἐκ τῆς $\gamma < \delta$ ἔπειται διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ $\frac{1}{\gamma\delta}$, ἢ $\frac{1}{\gamma} > \frac{1}{\delta}$. Ἐκ τῶν $\frac{1}{\gamma} > \frac{1}{\delta}$, $\alpha > \beta$ ἔχομεν $\frac{\alpha}{\gamma} > \frac{\beta}{\delta}$.

στ') Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἀνωνέρων ἴδιοτήτων εὐρίσκομεν ὅτι, «*ἄν εἰς τινα ἀνισότητα μεταφέρωμεν καθὲν μέλος της εἰς τὸ ἄλλο μὲ ἀντίθετον σημεῖόν του, κροκύπτει ἀνισότης δμοιόστροφος πρὸς τὴν δοθεῖσαν*».

ζ') «*Δοθείσης ἀνισότητός τυνος, ἔχούσης παρονομαστάς, δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἄλλην δμοιόστροφον, ἀπηλλαγμένην παρονομαστῶν*».

§ 80. Λύσις ἀνισότητος πρώτου βαθμοῦ.—

α') Καλοῦμεν ἀνισότητα πρώτου βαθμοῦ τὴν ἔχουσαν ἔνα ἀγνωστὸν εἰς πρῶτον βαθμόν.

β') Λύσις ἀνισότητος πρώτου βαθμοῦ λέγεται ἡ εὑρεσις τῶν τιμῶν τοῦ ἀγνώστου, αἴτινες ἐπαληθεύουν τὴν ἀνισότητα.

γ') Διὰ τὴν λύσιν ἀνισότητος πρώτου βαθμοῦ ἐργαζόμεθα ὅπως καὶ διὰ τὴν λύσιν ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ, ἔχοντες ὑπ' ὅψιν τὰς ἀνωτέρω ἴδιοτητας τῶν ἀνισοτήτων.

$$\text{Π. γ. διὰ τὴν ἀνισότητα } (2x + 3) - (x + 1) > 5 \\ \text{ἔχομεν} \quad \quad \quad 2x + 3 - x - 1 > 5.$$

'Ἐκ ταύτης μετὰ τὴν μεταφορὰν τῶν 3 καὶ — 1 εἰς τὸ δεύτερον μέλος καὶ τὴν ἀναγωγὴν, ἔχομεν $x > 3$. Δηλαδὴ πάντες οἱ ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι εἶνε μεγαλύτεροι τοῦ 3, ἐπαληθεύουν τὴν δοθεῖσαν ἀνισότητα.

δ') "Εστὼ ὅτι ζητοῦμεν τοὺς ἀκεραίους ἀριθμούς, οἱ ὅποιοι ἐπαληθεύουν τὰς ἀνισότητας $x + 3 < 4$, $x - 5 > -8$.

'Ἐκ τῆς πρώτης ἔχομεν $x < 1$.

"Ωστε τὴν πρώτην ἐπαναληθεύουν οἱ ἀκέραιοι $-1, -2, -3, \dots$

'Ἐκ τῆς δευτέρας εὐρίσκομεν $x > -3$.

"Ητοι τὴν δευτέραν ἐπαληθεύουν οἱ ἀριθμοὶ $-2 \cdot -1 + 1 + 2 \dots$

'Ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν λύσεων συνάγομεν ὅτι οἱ $-1, -2$ ἐπαληθεύουν καὶ τὰς δύο δοθείσας ἀνισότητας.

*Ασκήσεις

'Ομάς πρώτη. Νὰ εὔρεθοιν οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι ἐπαληθεύουν τὰς κάτωθι ἀνισότητας,

$$\alpha') 7x + 5 > 0, \quad \beta') -3x > \frac{5}{3} \quad \gamma') -4x - 9 > 0.$$

$$\frac{1}{2}x + 6 < 0 \quad 9x - 28 > 0. \quad 9x - 13 > 0.$$

$$\delta') 9x + 7 > 0, \quad \varepsilon') -7x - 48 > 0, \quad \sigma') 0,6x - 5 > 0,25(x - 1), \\ 9x - 13 > 0. \quad -9x + 32 > 0. \quad 0,5x - 1 < 0,7x - 3.$$

'Ομάς δευτέρα. 1) 'Εὰν ἀπὸ ἴστητα ἀφαιρέσωμεν ἀνισότητα, λαμβάνομεν ἀνισότητα ἑτερόστροφον τῆς δοθείσης.

2) 'Εὰν ἀνισότητα πολλαπλασιάσωμεν μὲν ἑτερόστροφόν της, ἔχουσαν μέλη ἀρνητικά, προκύπτει ἀνισότης ἑτερόστροφος τῆς πρώτης

3) 'Εὰν ἴστητα διαιρέσωμεν μὲν ἀνισότητα, ἔχουσαν μέλη θετικά (ἀρνητικά), προκύπτει ἀνισότης ἑτερόστροφος (όμοιόστροφος).

'Ομάς τρίτη. 1) 'Εὰν ἐκ δύο ἀριθμῶν ὁ α' εἴνε μεγαλύτερος τοῦ β' , τὸ ἄθροισμά των εἴνε μεγαλύτερον τοῦ διπλασίου τοῦ β' , ἀλλὰ μικρότερον τοῦ διπλασίου τοῦ α' .

2) 'Εὰν ἐκ τριῶν ἀριθμῶν καθεὶς εἴνε μικρότερος τοῦ ἄθροισματος τῶν δύο ἄλλων, καὶ οἱ τρεῖς εἴνε θετικοί.

3) 'Εὰν ἐκ τριῶν ἀριθμῶν καθεὶς εἴνε μικρότερος τοῦ ὄθροισματος τῶν δύο ἄλλων, καθεὶς ἐξ αὐτῶν εἴνε μεγαλύτερος τῆς διαφορᾶς τῶν δύο ἄλλων.

4) 'Εὰν εἴνε $\alpha > \beta$, θὰ εἴνε καὶ $\alpha^2 > \alpha\beta$, ἢν τὸ α εἴνε θετικός, καὶ $\alpha^2 < \alpha\beta$, ἢν τὸ α εἴνε ἀρνητικός.

5) 'Εὰν εἴνε $\alpha > 1$, θὰ εἴνε καὶ $\alpha^m > 1$, ἐὰν μ. εἴνε θετικός ἀριθμός. "Αν δ' εἴνε $\alpha < 1$ θὰ εἴνε καὶ $\alpha^m < 1$.

Περὶ δυνάμεων μὲν ἐκθέτας ἀκεραίους ἀρνητικούς.

§ 81. Ορισμὸς καὶ ἴδεο τητες. —

$\alpha')$ Γνωρίζομεν ὅτι εἴνε

$$\alpha^4 = \alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \quad \alpha^3 = \alpha, \alpha, \alpha, \quad \alpha^2 = \alpha, \alpha$$

$$\alpha^1 = \alpha^2 : \alpha = \alpha, \quad \alpha^0 = \alpha : \alpha = 1.$$

Διὰ ταῦτα θὰ λέγωμεν ὅτι τὸ α^{-1} ισοῦται μὲν 1 : $\alpha = \frac{1}{\alpha}$

$$a^{-2} = \text{μὲ } \frac{1}{a} : a = \frac{1}{a^2}, \quad a^{-3} = \frac{1}{a^2} : a = \frac{1}{a^3}, \quad a^{-4} = \frac{1}{a^4}$$

καὶ γενικῶς, $a^{-v} = \frac{1}{a^v}.$

Ὅτιοι «δύναμις ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτην ἀκέραιον ἀριθμούν ἀριθμὸν παριστάνει τὴν ἀντίστροφον τιμὴν τῆς δυνάμεως, τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ, ἔχουσαν ἐκθέτην τὸν ἀντίθετον ἐκθέτην τοῦ δοθέντος».

6') Αἱ Ἰδιότητες, τὰς δοποίας ἐγνωρίσαμεν διὰ τὰς δυνάμεις μὲ ἐκθέτας ἀκέραιούς καὶ θετικούς ἀριθμοὺς ἀποδεικνύονται εὐκόλως καὶ ὅταν οἱ ἐκθέται εἰνε ἀριθμοὶ ἀριθμοὶ καὶ ἀκέραιοι. Οὕτω π.χ. ἔχουμεν ὅτι

$$a^{-3} \cdot a^{-5} = \frac{1}{a^3} \cdot \frac{1}{a^5} = \frac{1}{a^8} = a^{-8} = a^{-3-5}.$$

$$a^{-\mu} : a^{-v} = \frac{1}{a^\mu} : \frac{1}{a^v} = \frac{1}{a^\mu} \cdot a^v = a^v : a^\mu = a^{v-\mu} = a^{-\mu-(-v)}$$

$$(\alpha \beta)^{-v} = \frac{1}{(\alpha \beta)^v} = \frac{1}{a^v \beta^v} = a^{-v} \cdot \beta^{-v}$$

7') Εὰν εἶνε $\alpha > \beta$, θὰ εἶνε καὶ $\alpha^\mu > \beta^\mu$,

ἄν οἱ α, β , εἶνε θετικοὶ ἀριθμοὶ τὸ δὲ μ καὶ ἀκέραιος.

Διότι, θὰ εἶνε $\alpha^2 > \beta^2$ (§ 79, β'). Όμοιώς $\alpha^3 > \beta^3$, καὶ γενικῶς, $\alpha^\mu > \beta^\mu$.

8') Εὰν εἶνε $\alpha > \beta$, θὰ εἶνε $\alpha^{-\mu} < \beta^{-\mu}$
ἄν α, β εἶνε θετικοὶ ἀριθμοὶ τὸ δὲ μ καὶ ἀκέραιοις.

Διότι τότε θὰ εἶνε $\frac{1}{\alpha} < \frac{1}{\beta}$ η $\alpha^{-1} < \beta^{-1}$.

Όμοιώς $\alpha^{-2} < \beta^{-2}, \dots, \alpha^{-\mu} < \beta^{-\mu}$.

Α σ κή σ εις

Όμας πρώτη. 1) Νὰ εὑρεθοῦν δὰ $x = 1, -2, -3$, αἱ τιμαὶ τῶν

$$a') \quad 5^{x-1} + 7^x + 3^{x-1}. \quad \beta') \left(\frac{1}{3} \right)^2 x-2 \left(\frac{1}{2} \right)^3 x-1 \left(\frac{1}{4} \right)^4 x$$

$$2) \quad \text{Όμοιώς } \frac{x}{x-1} \cdot \frac{\beta'}{\beta' 4-2} \cdot \gamma' 2^5 \cdot 2 \cdot 2^0 \cdot 2^{-2}.$$

$$\delta') \left((\alpha^{v+1}) \right)^{\circ} \cdot \varepsilon') \left(\frac{2}{3} \right)^{-3} \sigma\tau') \frac{1}{(0,1)^{-3}}$$

$$3) \quad \text{Νὰ } \text{ὑπολογισθοῦν } \alpha \text{ κάτωθι: παραστάσεις, καὶ } \eta \text{ εὑρεθοῦν } \tauὰ \text{ ἐξαγόμενά των } \gamma \text{ ωρὶς } \text{ἀριθμούς } \text{ἐκθέτας,}$$

$$\alpha') \alpha^{-3} \cdot \alpha^{-4} \cdot \alpha^0 \cdot \alpha^5. \quad \beta') 2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1 \cdot 2^{-3}. \quad \gamma') 7^8 \cdot 7^{-9}. \quad \delta') (2\alpha\beta)^{-3}.$$

$$\epsilon') 5^3 : 5^{-4}, \quad \sigma\tau') x^v x^{-2v} : x^{-v}, \quad \zeta') (3 \alpha^{-3} \beta^2 \gamma^{-4})^{-2}$$

Ομάδας δευτέρα. 1) Έὰν τὰ μέλη ἀνισότητος εἶνε ἀριθμοί θετικοί, καὶ τὰ ὑψώσωμεν εἰς τὴν αὐτὴν δύναμιν μὲ ἐκθέτην ἀρνητικόν, πρακτύπτει ἀνισότης ἐτερόστροφος.

2) Έὰν εἶνε $\alpha > 1$ ($\alpha < 1$), θὰ εἶνε καὶ $\alpha^m < 1$ ($\alpha^m > 1$), ἐὰν τὸ μ εἶνε ἀριθμός ἀρνητικός, τὸ δὲ α θετικός.

3) Έὰν εἶνε $\alpha > 1$, θὰ εἶνε, $\alpha^{-3} < \alpha^{-2} < \alpha^{-1} < \alpha^0 < \alpha^1 < \alpha^2$

4) Έὰν τὸ α εἶνε ἀριθμός θετικός καὶ μικρότερος τῆς 1, θὰ εἶνε καὶ $\alpha^3 > \alpha^{-2} > \alpha^{-1} > \alpha^0 > \alpha^1 > \alpha^2 > \alpha^3 > \dots$

Περὶ ἐκθετικῶν ἔξισώσεων

§ 82. Ὁρισμοί.—

α') Καλοῦμεν ἐκθετικὸν ἔξισωσιν τὴν ἔξισωσιν ἐν ᾧ ὁ ἄγνωστος εἶνε ἐκθέτης δυνάμεως, ἔχοντος βάσιν ἀριθμόν τινα ἢ παράστασιν γνωστήν. Π.χ. αἱ ἔξισώσεις

$$5^{x^2-x+2} = 1, \quad \alpha^{2x+3} = \alpha^2$$

εἶνε ἐκθετικὰ ἀξιώσεις

Αἱ μέχρι τοῦδε γνωστὰὶ ἀξιώσεις λέγονται ἀλγεβρικαὶ, ποὺς διάκρισιν ἀπὸ τῶν ἐκθετικῶν.

β') Εκθετικὴ τις ἔξισωσις λέγεται πρώτου βαθμοῦ, ἀν ὁ (ἐν τῷ ἐκθέτῃ) ἄγνωστος περιέχεται εἰς πρῶτον βαθμόν. Οὕτω ἡ δευτέρα τῶν ἀνωτέρω ἔξισώσεων εἶνε πρώτου βαθμοῦ.

γ') Λόσις ἐκθετικῆς ἔξισώσεως λέγεται ἡ εὗρεσις τῶν τιμῶν τοῦ ἀγνώστου τῆς, αἵτινες τὴν ἐπαληθεύουν.

§ 83. Λύσις ἐκθετικῶν ἔξισώσεων πρώτου βαθμοῦ.—

α') Η λύσις ἐκθετικῆς ἔξισώσεως ἀνάγεται, ἐνίστε, εἰς τὴν λύσιν ἀλγεβρικῆς ἔξισώσεως. Τοῦτο γίνεται, ἀν φέρωμεν τὴν δοθεῖαν ἔξισωσιν εἰς μορφὴν τοιαύτην, ὅστε τὸ μὲν β' μέλος τῆς νὰ εἴνε ἡ μονάς, τὸ δὲ πρῶτον δύναμις ἀριθμοῦ τινος, ἢ παραστάσεως γνωστῆς, διαφόρου τοῦ μηδενὸς, τῆς ὁποίας ὁ ἐκθέτης περιέχει τὸν ἄγνωστον τῆς δοθείσης ἔξισώσεως. Ακολούθως, θέτομεν τὸν ἐκθέτην τῆς δυνάμεως ταύτης ἵσον μὲ μηδὲν καὶ ἔχομεν νὰ λύσωμεν ἀλγεβρικὴν ἔξισωσιν.

Οὕτω, ἔστω πρὸς λύσιν ἡ ἐκθετικὴ ἔξισωσις $3^{3x} = \frac{1}{27}$

Δίδομεν εἰς αὐτὴν τὴν μορφὴν $3^{3x} \cdot 27 = 1$, ἢ $3^{3x} \cdot 3^3 = 3^{3x+3} = 1$.

Ἐκ ταύτης ἔχομεν $3x + 3 = 0$.

Ἐκ τῆς ὁποίας ἔπειται, ὅτι $x = -1$.

Ἐστι ρπὸς λύσιν ἡ ἔξισωσις $3^{2x+5} = 2^{2x+5}$

Γράφομεν αὐτὴν οὕτω $3^{2x+5} : 2^{2x+5} = 1$, ή $\left(\frac{3}{2}\right)^{2x+5} = 1$.

Ἐκ ταύτης ἔχομεν $2x + 5 = 0$, καὶ $x = -2 \frac{1}{2}$

Ἔστω ἀκόμη ἡ ἔξισωσις $2^{x-1} - 2^{x-3} = 3^{x-3} + 3^{x-4}$

Δίδομεν εἰς αὐτὴν τὴν μορφήν

$$\frac{2^{x-1} - 2^{x-3}}{3^{x-3} + 3^{x-4}} = \frac{2^x \cdot 2^{-1} - 2^x \cdot 2^{-3}}{3^x \cdot 3^{-3} + 3^x \cdot 3^{-4}} = 1. \text{ H } \frac{2^x \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right)}{3^x \left(\frac{1}{27} + \frac{1}{81} \right)} = \frac{\frac{3}{8} 2^x}{\frac{4}{81} 3^x}$$

$$\frac{3 \cdot 81 \cdot 2^x}{4 \cdot 8 \cdot 3^x} = \frac{3^5 2^x}{2^5 \cdot 3^x} = \frac{2^x}{3^x} \cdot \frac{2^{-5}}{3^{-5}} = \frac{2^{x-5}}{3^{x-5}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{x-5} = 1,$$

καὶ $x - 5 = 0$, έξ οὖτος $x = 5$.

Ε') Κατ' ἀνάλογον τρόπον ἡ λύσις συστήματος ἐκθετικῶν ἔξισώσεων μὲ περισσοτέρους τοῦ ἑνὸς ἀγνώστους ἀνάγεται, ἐνίοτε, εἰς τὴν λύσιν ἀλγεβρικοῦ συστήματος ἔξισώσεων.

A σκήσεις

Ομάδας πρώτη. Νὰ λυθοῦν καὶ ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις.

$$\alpha') \alpha^x + \mu = \alpha^{2x}. \quad \beta') \alpha^{3x+2} = \alpha^{x+4}, \quad \gamma') \gamma^{2-5x} = \gamma^x + 3$$

$$\delta') \beta^{(2x+1)(3x+4)} = \beta^{(3x+1)(2x+5)} \quad \varepsilon') (a^x)^{x+3} = z^{x+2x}$$

$$\sigma') z^{2x+3} \cdot z^{3x+1} = z^{5x+6}. \quad \zeta') 2^{2x} = 32.$$

$$\eta') (-2)^x = 16, \quad \theta') -2^x = -32, \quad \iota') 100^{2x+3} = 100.$$

Ομάδας δευτέρα. Νὰ λυθοῦν καὶ ἐπαληθευθοῦν τὰ συστήματα

$$\mu^x \cdot \mu^y = \mu^8 \quad \alpha^{2x} \cdot \alpha^{3y} = \alpha^8 \quad 5^{3x} \cdot 5^{4y} = (5^6)^3$$

$$\alpha') \frac{\mu^x}{\mu^y} = \mu^{-2}. \quad \beta') \frac{\alpha^{2x}}{\alpha^3 y} = z^{-6}. \quad \gamma') \frac{5^2 x}{5^7 x} = 5^{-17}.$$

Περὶ τῶν διξῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν

§ 84. Ορεσμοί.—

α') Ως γνωστὸν (ἐκ τῆς 'Αριθμητικῆς) καλοῦμεν τετραγωνικὴν διὰν ὁζαν ἀριθμοῦ τὸν ἀριθμόν, δῆτις ὑψούμενος εἰς τὸ τετράγωνον, δίδει τὸν δοθέντα.

Κατ' ἀνάλογον τρόπον «καλοῦμεν τρίτην, τετάρτην, . . . , μυστὴν διὰν ὁζαν ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ τὸν ἀριθμόν, δῆτις, ὑψούμενος εἰς τὴν τρίτην, τετάρτην, . . . , μυστὴν δύναμιν, δίδει τὸν δοθέντα».

6') Τὴν τετραγωνικὴν φίλαν ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ α παριστῶμεν διὰ τοῦ $\sqrt{\alpha}$ ἢ διὰ τοῦ $\alpha^{\frac{1}{2}}$

Ομοίως παριστῶμεν τὴν 3ην, 4ην, . . . , μυοστὴν φίλαν ἀριθμοῦ α διὰ τοῦ $\sqrt[3]{\alpha}$, $\sqrt[4]{\alpha}$, . . . , $\sqrt[\mu]{\alpha}$
 ἢ διὰ τοῦ $\alpha^{\frac{1}{3}}$, $\alpha^{\frac{1}{4}}$, . . . , $\alpha^{\frac{1}{\mu}}$

γ') Τὸ σύμβολον $\sqrt{-}$ λέγεται φιλικόν, ἡ ὑπ' αὐτῷ ποσότης υπόρρηξις ποσότης, ὁ δὲ ἀριθμός, ὃστις δεικνύει τὴν τάξιν τῆς φίλης υπορρήξου ποσότητος λέγεται δείκτης τῆς φίλης. Οὕτω εἰς τὴν παραστασιν $\sqrt[\mu]{\alpha}$ υπόρρηξις ποσότης εἶναι ἡ α, δείκτης δὲ τῆς φίλης ὁ μ.

δ') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι

«δύναμις ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην θετικὴν ηλασματικήν μονάδα, παριστάνει φίλαν τῆς βάσεως της, τῆς δποίας τὴν τάξιν δρεῖται ὁ παρονομαστής τοῦ ἐκθέτου».

Οὕτω τὸ $2^{\frac{1}{5}}$ παριστάνει τὴν πέμπτην φίλαν τοῦ 2, παριστάνεται δὲ τοῦτο καὶ ὑπὸ τοῦ $\sqrt[5]{2}$, ἵτοι εἶνε $2^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{2}$.

Ἐν γένει, τὸ $\alpha^{\frac{1}{\mu}}$ παριστάνει τὴν μυοστὴν φίλαν τοῦ α, ἵτοι τὸ $\sqrt[\mu]{\alpha}$ καὶ εἶνε $\alpha^{\frac{1}{\mu}} = \sqrt[\mu]{\alpha}$.

ε') Ρίζα τις ἀριθμοῦ λέγεται ἀρτίας τάξεως, ἂν ὁ δείκτης τῆς φίλης του εἶναι ἀρτιος ἀριθμός περιττῆς δὲ τάξεως ἂν ὁ δείκτης εἶναι περιττός. Οὕτω τὸ $\sqrt[5]{\alpha}$ παριστάνει φίλαν περιττῆς τάξεως τοῦ α (τὴν 5ην). Τὸ $\sqrt[8]{\alpha}$ παριστάνει φίλαν ἀρτίας τάξεως τοῦ α (τὴν 8ην).

Α σημειώσεις.

✓1) Τι σημαίνει $3^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[3]{-4}$, $\left(\alpha^{\frac{1}{\nu}}\right)^{\frac{1}{2}}$, $(x y)^{\frac{1}{\mu}}$, $125^{\frac{1}{3}}$, $64^{\frac{1}{6}}$

2) Γράψατε συμβολικῶς τὸν ἀριθμόν, ὃστις ψευδεμένος εἰς τὴν τετραγωνικὴν δύναμιν δίδει ἔξαγγενον 18 (149).

$$\text{Να είναι θεού τα } \sqrt[1]{2}, \sqrt[2]{\alpha^2}, \sqrt[3]{\alpha^3}, \sqrt[4]{1}, \sqrt[5]{\alpha}, \sqrt[6]{\alpha},$$

4) "Αν άριθμόν τινα υψώσωμεν εἰς τὴν νυστήν δύναμιν, καὶ τοῦ ἐξαγομένου ἐξαγάγωμεν τὴν νυστήν ρίζαν, εὑρίσκομεν αὐτὸν τὸν ἀριθμόν, ἢ τὸν ἀντίθετόν του.

$$(\sqrt[3]{\alpha^3} = \alpha, \text{ ἢ τὸν εἶναι περιττός, } \sqrt[3]{\alpha^3} = \pm \alpha, \text{ ἢ τὸν ἄρτιος). \text{ Διατί;}$$

5) Εὕρετε τὰ $(a + \sqrt{-\beta})(a - \sqrt{-\beta})$, $(a + \sqrt{\alpha^2 - 1})(a - \sqrt{\alpha^2 - 1})$.

6) Τρέψατε τὰς ἐπομένας παραστάσεις εἰς γινόμενα δύο παραγόντων.

$$\alpha') x - y, \beta') x^2 - y, \gamma') \alpha^2 - 2\beta, \delta') 4x - 2\beta, \varepsilon') 16 - x, \sigma') 25 - 9\beta.$$

§ 83. Πληθιος ρεξῶν ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ.—

α') «Πᾶς θετικὸς ἀριθμὸς ἔχει δύο ρίζας ἀρτίας τάξεως ἀντιθέτους (μίαν θετικὴν καὶ μίαν ἀρνητικήν)».

Διότι, θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀριθμός, υψούμενος εἰς ἀρτίαν δύναμιν, δίδει ἐξαγόμενον θετικὸν ἀριθμὸν (§ 10, β'). Οὔτω π. γ.

$$\text{ή } \sqrt{-25} = \pm 5. \quad \text{Διότι } 5^2 = 25, \quad (-5)^2 = 25.$$

$$\text{H } \sqrt[4]{16} = \pm 2. \quad \text{Διότι } 2^4 = 16, \quad (-2)^4 = 16.$$

β') «Πᾶς θετικὸς ἀριθμὸς ἔχει μίαν ρίζαν περιττῆς τάξεως (θετικήν)».

Διότι μόνον θετικὸς ἀριθμός, υψούμενος εἰς περιττὴν δύναμιν δίδει ἐξαγόμενον θετικὸν ἀριθμὸν (§ 10, β'). Οὔτω εἶχομεν ὅτι

$$\text{ή } \sqrt[3]{-27} = +3. \quad \text{Διότι, } (+3)^3 = 27. \quad \text{H } \sqrt[5]{-32} = +2.$$

$$\text{Διότι, } (+2)^5 = 32.$$

γ') «Πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς ἔχει μίαν ρίζαν περιττῆς τάξεως (ἀρνητικήν)».

Διότι, μόνον ἀρνητικὸς ἀριθμός, υψούμενος εἰς περιττὴν δύναμιν, δίδει ἐξαγόμενον ἀρνητικὸν ἀριθμὸν (§ 10, β'). Οὔτω π. γ.

$$\text{ή } \sqrt[3]{-8} = -2. \quad \text{Διότι, } (-2)^3 = -8. \quad \text{H } \sqrt[5]{-32} = -2.$$

$$\text{Διότι, } (-2)^5 = -32.$$

δ') «Πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς δὲν ἔχει ρίζαν ἀρτίας τάξεως».

Διότι, οὐδεὶς ἐκ τῶν γνωστῶν ἀριθμῶν (θετικός, ἢ ἀρνητικός), ὑψούμενος εἰς ἀρτίαν δύναμιν, δίδει ἔξαγομένον ἀρνητικὸν ἀριθμόν.

$$\varepsilon') \quad \text{Έστω } \text{ἢ} \quad \sqrt[3]{-8}. \text{ Αὗτη} = \mu \text{ὲ} -2.$$

$$\text{Παρτηροῦμεν } \text{ὅτι} \quad \sqrt[3]{-8} = 2. \quad \text{Άρα} \quad - \sqrt[3]{-8} = -2$$

$$\text{Ἐπομένως} \quad \sqrt[3]{-8} = -\sqrt[3]{8}.$$

«Ητοι, «ἡ ρίζα περιττῆς τάξις ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ ἵσοῦται μὲ τὴν ἀρνητικὴν ρίζαν, τὴν ἔχουσαν τὸν αὐτὸν δείκτην, τοῦ ἀντιθέτου τοῦ ἀριθμοῦ».

§ 86. Έξισώσεις διώνυμοι.—

α') 'Εξισωσίς τις. ἔχουσα ἔνα ἄγνωστον, λέγεται διώνυμος, ἀν ἔχῃ δύο δρους, ἐκ τῶν δποίων ὁ εἰς ἔχει τὴν ἄγνωστον εἰς τινα βαθμόν. Οὕτω ἡ ἔξισωσις $\alpha x + \beta = 0$ εἶνε διώνυμος καὶ πρώτου βαθμοῦ. 'Η $x^3 - 27 = 0$ εἶνε δυώνυμος καὶ τρίτου βαθμοῦ.

β') 'Εν γένει, πᾶσα διώνυμος ἔξισωσις βαθμοῦ μ ἔχει τὴν μορφὴν $x^{\mu} = a$

ὅπου τὸ μ παριστάνει ἀκέραιον καὶ θετικὸν ἀριθμόν, τὸ δὲ α ἀλγεβρικόν.

γ') Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν διώνυμον ἔξισωσιν $x^{\mu} = a$ ἀρκεῖ νὰ εῦρωμεν τὰς ρίζας τῆς μυστῆς τάξεως τοῦ α. Διότι, ἐκάστη μυστή ρίζα τοῦ α παριστάνει ἀριθμόν, ὃστις ὑψούμενος εἰς μυστήν δύναμιν δίδει τὸν α. "Ητοι, αἱ ρίζαι τῆς μυστῆς τάξεως τοῦ α εἶνε αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $x^{\mu} = a$.

"Εχοντες ὑπ' ὄψιν τὰ περὶ τοῦ πλήθους τῶν ριζῶν ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ ἔχομεν τὸν κατωτέρῳ πίνακα.

Piçai τῆς διωνύμου ἔξισώσεως $x^{\mu} = a$.

- 1) ἀν εἶνε α θετικὸς καὶ μ ἀρτιος, ἔχει δύο ρίζας ἀντιθέτους.
- 2) ἀν εἶνε α θετικὸς καὶ μ περιττός, ἔχει μίαν ρίζαν θετικήν.
- 3) ἀν εἶνε α ἀρνητικὸς καὶ μ περιττός, ἔχει μίαν ρίζαν ἀρνητικήν.
- 4) ἀν εἶνε α ἀρνητικός, καὶ μ ἀρτιος, δὲν ἔχει ρίζαν.

δ') Ούτω ἡ ἐξίσωσις $x^4=16$ ἔχει δύο ρίζας ἀντιθέτους τὰς $x=-2$, $x=2$. **γ')** Ήτοι εἶναι $x=\sqrt[4]{16}=\pm 2$. **Η** ἐξίσωσις $x^5=-32$, ἔχει μίαν ρίζαν, τὴν $x=-2$. **Θ** Ητοι εἶναι $x=\sqrt[5]{-32}=-2$. **Ενῶ** ἡ ἐξίσωσις $x^2=-25$ δὲν ἔχει ρίζαν.

ε') Έν τοῖς ἐξῆς δὲν κρησιμοποιοῦμεν ἀριθμὸν ἀρνητικόν, τοῦ ὅποιον ζητεῖται ρίζα ἀρτίας τάξεως, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει τοιαύτη.

στ') Έκ τῶν δύο (ἀντιθέτων) ρίζων θετικοῦ ἀριθμοῦ θὰ θεωροῦμεν μόνον τὴν θετικήν, ἐν ὅσῳ δὲν ἀναφέρομεν διτι θεωροῦμεν καὶ τὰς δύο.

$$\text{Ασκήσεις. 1)} \quad \text{Εὑρέτε τὰς τιμὰς τοῦ} \quad \alpha') \quad (\alpha^2)^{\frac{1}{z}}.$$

$$\beta') \quad \sqrt[3]{(\alpha\beta)^3}. \quad \gamma') \quad (x^4y^4)^{\frac{1}{4}}. \quad \delta') \quad (\alpha^6)^{\frac{1}{3}}. \quad \varepsilon') \quad \sqrt{x^6}.$$

$$2) \quad \text{Ομοίως τὰ} \quad \alpha') \quad 4^{\frac{1}{2}} + 8^{\frac{1}{3}} - 16^{\frac{1}{4}}.$$

$$\beta') \quad 3) \quad (\alpha^4)^{\frac{1}{2}} + 4\alpha^2 - 5\sqrt[3]{\alpha^6}. \quad \gamma') \quad \left(\sqrt[3]{\alpha^2}\right)^3 \cdot \left(\sqrt[4]{x:y}\right)^3 \cdot \sqrt[4]{x:y}$$

$$3) \quad \text{Επίσης τοῦ} \quad \alpha') \quad (3+\sqrt{-2})(3-\sqrt{-2}).$$

$$\beta') \quad 25^{\frac{1}{2}} + 16^{\frac{1}{4}} + \sqrt[3]{-27} + \sqrt[3]{-125}.$$

4) Τρέψατε εἰς γινόμενα τὰς παραπομένας

$$\alpha') \quad \alpha x^{\frac{1}{3}} + \beta x^{\frac{1}{3}} - \gamma x^{\frac{1}{3}}.$$

$$\beta') \quad \alpha \sqrt[3]{2} + \alpha \sqrt[3]{3} - \beta \sqrt[3]{2} - \beta \sqrt[3]{3}.$$

$$\gamma') \quad \alpha x^{\frac{1}{\mu}} + \alpha y^{\frac{1}{\nu}} + \beta \sqrt[\mu]{x} + \beta \sqrt[\nu]{y}.$$

5) Λύσατε τὰς ἐξίσωσεις

$$\alpha') \quad x^4 - 625 = 0. \quad \beta') \quad x^5 = 32. \quad \gamma') \quad x^6 = 729. \quad \delta') \quad x^5 + 1 = 0.$$

$$\epsilon') \quad \frac{x^3-1}{5} + \frac{x^3+5}{2} = 3. \quad \sigma') \quad 5x^2 + 10 = 6x^2 + 1.$$

$$\zeta') \quad 6x^2 - \frac{1}{6} = 5x^2 + \frac{11}{9}. \quad \eta') \quad \frac{15}{8-x} + \frac{7}{2-3x} = 2.$$

Δυνάμεις μὲν ἐνθέτας πλασματικούς.

§ 87. Θρεμμοί.—

$$\alpha') \quad \text{Έστω ἡ δύναμις} \quad \alpha^{\frac{3}{4}},$$

$$\text{Παρατηροῦμεν ὅτι εἰνε } a^{\frac{3}{4}} = a^{3 \cdot \frac{1}{4}} = (a^3)^{\frac{1}{4}}.$$

’Αλλὰ $(a^3)^{\frac{1}{4}}$ παραστάνει τὴν τετάρτην ρίζαν τοῦ a^3 .

$$\text{”Αρα εἰνε } a^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{a^3}.$$

$$\text{”Ομοίως εὑρίσκομεν } a^{\frac{\mu}{\nu}} = a^{\mu \cdot \frac{1}{\nu}} = (a^\mu)^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^\mu}.$$

”Ητοι, «δύναμις ἀριθμοῦ μὲν ἐκθέτην θετικὸν κλάσμα παριστάνει ρίζαν μὲν δείκτην τὸν παρονομαστὴν τοῦ ἐκθέτου, ὑπόρρριξον δι’ ἔχουσαν τὴν βάσιν τῆς δυνάμεως μὲν ἐκθέτην τὸν ἀριθμητὴν τοῦ ἐκθέτου».

$$6') \text{ Παρατηροῦμεν ὅτι εἰνε } a^{\frac{1}{4} \cdot 3} = \left(a^{\frac{1}{4}} \right)^3 = \left(\sqrt[4]{a} \right)^3.$$

$$\text{”Ομοίως ὅτι } a^{\frac{\mu}{\nu}} = a^{\frac{1}{\nu} \cdot \mu} = \left(a^{\frac{1}{\nu}} \right)^\mu = \left(\sqrt[\nu]{a} \right)^\mu.$$

”Ητοι, «δύναμις ἀριθμοῦ μὲν ἐκθέτην θετικὸν κλάσμα παριστάνει δύναμιν ρίζης μὲν δείκτην τὸν παρονομαστὴν τοῦ ἐκθέτου, ἐκθέτην δι’ ἔχουσαν τὸν ἀριθμητήν τοῦ κλασματικοῦ ἐκθέτου».

$$\gamma') \text{ Κατὰ ταῦτα τὸ } a^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{a^3} = \left(\sqrt[4]{a} \right)^3.$$

$$\text{”Ομοίως τὸ } a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^\mu} = \left(\sqrt[\nu]{a} \right)^\mu.$$

”Ητοι, αἱ παραστάσεις $\sqrt[\nu]{a^\mu}$, $\left(\sqrt[\nu]{a} \right)^\mu$ εἰνε ἴσοδύναμοι.

$$\delta') \text{ ”Εστω ἡ δύναμις } a^{-\frac{5}{6}}.$$

$$\text{Παρατηροῦμεν ὅτι εἰνε } a^{-\frac{5}{6}} = a^{-5 \cdot \frac{1}{6}} = \left(a^{-5} \right)^{\frac{1}{6}}$$

$$\text{”Αλλὰ } a^{-5} = \frac{1}{a^5} \quad (\S \ 81, \ a')$$

$$\text{”Αρα } a^{-\frac{5}{6}} = \left(a^{-5} \right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{1}{a^5} \right)^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{\frac{1}{a^5}} = \frac{1}{\sqrt[6]{a^5}} = \frac{1}{a^{\frac{5}{6}}}.$$

$$\text{”Ομοίως εὑρίσκομεν } a^{-\frac{\mu}{\nu}} = \left(a^{-\mu} \right)^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{\frac{1}{a^\mu}} = \frac{1}{\sqrt[\nu]{a^\mu}} = \frac{1}{a^{\frac{\mu}{\nu}}}.$$

“Ητοι, «δύναμις ἀριθμοῦ μὲν ἐκθέτην ἀρνητικὸν κλάσμα παριστάνει τὴν ἀντίστροφον τιμὴν τῆς δυνάμεως τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ ἔχουσαν ἐκθέτην τὸν ἀντίθετον τοῦ δοθέντος».

Ασκήσεις. 1) Τι σημαίνει α') $a^{-\frac{1}{2}}$; β') $a^{-4\frac{1}{5}}$; γ') $a^{-\frac{3}{8}}$;

δ') $25^{-\frac{1}{2}}$; ε') $32^{-\frac{1}{4}}$; ζτ') $64^{-\frac{1}{2}}$;

2) Εὕρετε τὰ α') $\left(3+2^{-\frac{1}{2}}\right)\left(3-2^{-\frac{1}{2}}\right)$, β') $\left(\alpha+\beta^{-\frac{1}{2}}\right)\left(\alpha-\beta^{-\frac{1}{2}}\right)$.

γ') $4^{-\frac{1}{2}} + 8^{-\frac{1}{3}} - 16^{-\frac{1}{4}}$. δ') $3(a^4)^{-\frac{1}{2}} + 4a^{-2} - 5a^{-\frac{5}{6}}$.

3) Δείξατε μὲν τὴν βούθειαν τῶν κλασματικῶν ἐκθετῶν ὅτι, ἡ ρίζα θετικῆς δυνάμεως ἀριθμοῦ δὲν μεταβάλλεται, ἂν τὸν ἐκθέτην καὶ δείκτην τῆς πολλαπλασιάσωμεν μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

§ 88. Ιδιότητες δυνάμεων μὲν κλασματικούς ἐκθέτας. —

α') «Τὸ γινόμενον δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲν ἐκθέτην κλασματικοὺς εἰνε δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτας τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν τῶν παραγόντων».

“Εστω τὸ γινόμενον $a^{\frac{\mu}{v}} \cdot a^{\frac{x}{\lambda}}$. Λέγω ὅτι τοῦτο = μὲν $a^{\frac{\mu}{v} + \frac{x}{\lambda}}$

Διότι, ἔχομεν $a^{\frac{\mu}{v}} + \frac{x}{\lambda} = a^{\frac{\lambda\mu + x v}{v\lambda}} = \left(a^{\lambda\mu + x v}\right)^{\frac{1}{v\lambda}}$

Αλλὰ τὸ $\left(a^{\lambda\mu + x v}\right)^{\frac{1}{v\lambda}}$ παριστάνει τὸν ἀριθμὸν, δστις ὑψούμενος εἰς τὴν $v\lambda$ δύναμιν δίδει τὸν $a^{\lambda\mu + x v}$.

Τὴν ιδιότητα ταύτην ἔχει ὅμως καὶ τὸ $a^{\frac{\mu}{v}} \cdot a^{\frac{x}{\lambda}}$.

Διότι, ἂν τοῦτο ὑψώσωμεν εἰς τὴν $v\lambda$ δύναμιν, ἔχομεν

$\left(a^{\frac{\mu}{v}} \cdot a^{\frac{x}{\lambda}}\right)^{\lambda v} = \left(a^{\frac{\mu}{v}}\right)^{\lambda v} \cdot \left(a^{\frac{x}{\lambda}}\right)^{\lambda v} = a^{\lambda\mu + x v} = a^{\lambda\mu + x v}$

Ἐπομένως εῖνε $a^{\frac{\mu}{v}} \cdot a^{\frac{x}{\lambda}} = a^{\frac{\mu}{v} + \frac{x}{\lambda}}$.

Κατ' ἀνάλογον τρόπον ἀποδεικνύεται ἡ ἴδιότης καὶ διὰ περισσοτέρους παραγοντας.

6') «Γινόμενον παραγόντων ὑψοῦται ὡς δύναμιν μὲν ἐκθέτην κλασματικόν, ἀν ἔκαστος τῶν παραγόντων ὑψωθῆ εἰς τὴν δύναμιν ταύτην».

"Εστω ὅτι ἔχομεν τὸ $(\alpha \beta)^{\frac{\mu}{\nu}}$. Λέγω ὅτι τοῦτο = μὲν $\alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \beta^{\frac{\mu}{\nu}}$.

Διότι, τὸ $(\alpha \beta)^{\frac{\mu}{\nu}} = (\alpha \beta)^{\mu \cdot \frac{1}{\nu}} = ((\alpha \beta)^\mu)^{\frac{1}{\nu}} = (\alpha^\mu \beta^\mu)^{\frac{1}{\nu}}$

"Αλλὰ τὸ $(\alpha^\mu \cdot \beta^\mu)^{\frac{1}{\nu}}$ παριστάνει τὸν ἀριθμὸν, ὃστις ὑψούμενος εἰς τὴν νυοστὴν δύναμιν, δίδει τὸ $\alpha^\mu \cdot \beta^\mu$.

Τὴν ἴδιότητα ταύτην ἔχει ὅμως καὶ τὸ $\alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \beta^{\frac{\mu}{\nu}}$.

Διότι, ἂν τοῦτο ὑψωθῆ εἰς τὴν νυοστὴν δύναμιν ἔχομεν

$(\alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \beta^{\frac{\mu}{\nu}})^\nu = (\alpha^{\frac{\mu}{\nu}})^\nu \cdot (\beta^{\frac{\mu}{\nu}})^\nu = \alpha^\mu \cdot \beta^\mu$.

"Αρα εἶνε $(\alpha \beta)^{\frac{\mu}{\nu}} = \alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \beta^{\frac{\mu}{\nu}}$.

γ') «Διὰ νὰ ὑψώσωμεν δύναμιν ἀριθμοῦ εἰς δύναμιν μὲν ἐκθέτην κλασματικόν, ἀρνεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δύο ἐκθέτας».

"Εστω ὅτι ζητεῖται τὸ $(\alpha^{\frac{\mu}{\nu}})^{\frac{x}{\lambda}}$. Λέγω ὅτι τοῦτο = μὲν $\alpha^{\frac{\mu}{\nu} \cdot \frac{x}{\lambda}}$

Διότι, τὸ $\alpha^{\frac{\mu}{\nu} \cdot \frac{x}{\lambda}} = \alpha^{\frac{\mu x}{\nu \lambda}}$

"Αλλὰ τὸ $\alpha^{\frac{\mu x}{\nu \lambda}}$ παριστάνει τὸν ἀριθμόν, ὃστις ὑψούμενος εἰς τὴν $\nu \lambda$ δύναμιν δίδει τὸν $\alpha^{\mu x}$. Τὴν ἴδιότητα ταύτην ἔχει ὅμως καὶ τὸ

$(\alpha^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \cdot)^{\frac{x}{\lambda}}$.

Διότι, ἂν τοῦτο ὑψώσωμεν πρῶτον εἰς τὴν λ. δύναμιν ἔχομεν

$$\left[\left(a^{\frac{u}{v}} \right)^{\frac{z}{\lambda}} \right]^{\lambda} = \left(a^{\frac{u}{v}} \right)^z = a^{\frac{u}{v} \cdot z}.$$

"Αν δὲ τοῦτο ὑψώσωμεν εἰς τὴν νυστήν δύναμιν ἔχομεν

$$\left(a^{\frac{u}{v} \cdot z} \right)^v = a^{\frac{u \cdot v}{v} \cdot v} = a^{u \cdot z}$$

"Αριστερά εἶνε $\left(a^{\frac{u}{v}} \right)^{\frac{z}{\lambda}} = a^{\frac{u}{v} \cdot \frac{z}{\lambda}}$.

δ') «Διὰ νὰ ὑψώσωμεν κλάσμα εἰς δύναμιν μὲ ἐκθέτην κλασματικόν, ἀρκεῖ νὰ ὑψώσωμεν καθένα τῶν δρῶν του εἰς τὴν δύναμιν ταύτην».

"Εστω τὸ $\left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{u}{v}}$. Λέγω ὅτι τοῦτο = μὲ $\frac{\alpha^{\frac{u}{v}}}{\beta^{\frac{u}{v}}}$

Διότι τὸ $\left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{u}{v}} \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{1}{v}} = \left[\left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^u \right]^{\frac{1}{v}} = \left(\frac{\alpha^u}{\beta^u} \right)^{\frac{1}{v}}$

"Αλλὰ τὸ $\left(\frac{\alpha^u}{\beta^u} \right)^{\frac{1}{v}}$ παριστάνει τὸν ἀριθμόν, ὃστις ὑψούμενος εἰς τὴν νυστήν δύναμιν, δίδει τὸν $\frac{\alpha^u}{\beta^u}$. Τὴν ἴδιότητα ταύτην ἔχει

ὅμως καὶ τὸ $\frac{\alpha^{\frac{u}{v}}}{\beta^{\frac{u}{v}}}$.

Διότι. ἂν τοῦτο ὑψώσωμεν εἰς τὴν νυστήν δύναμιν, ἔχομεν

$$\left(\frac{\alpha^{\frac{u}{v}}}{\beta^{\frac{u}{v}}} \right)^v = \left(\frac{\alpha^{\frac{u}{v}}}{\beta^{\frac{u}{v}}} \right)^u = \frac{\alpha^{\frac{u}{v} \cdot v}}{\beta^{\frac{u}{v} \cdot v}} = \frac{\alpha^u}{\beta^u}$$

"Αριστερά εἶνε $\left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{u}{v}} = \frac{\alpha^{\frac{u}{v}}}{\beta^{\frac{u}{v}}}$.

§ 89. Πολλαπλασιασμὸς καὶ διείρεσες ριζῶν ἀριθμῶν.

α') "Εστω, ὅτι ζητεῖται τὸ γινόμενον $\sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\nu]{\beta}$.

Λέγω ὅτι τοῦτο = μὲν $\sqrt[\nu]{\alpha\beta}$.

$$\text{Διότι, τὸ } \sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\nu]{\beta} = \alpha^{\frac{1}{\nu}} \cdot \beta^{\frac{1}{\nu}} = (\alpha\beta)^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{\alpha\beta}.$$

"Ομόδιος ενδρίσκομεν ὅτι $\sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\nu]{\beta} \cdot \sqrt[\nu]{\gamma} \dots \sqrt[\nu]{\lambda} = \sqrt[\nu]{\alpha\beta\gamma\dots\lambda}$

"Ητοι, «τὸ γινόμενον ριζῶν ἀριθμῶν, ἔχουσῶν τὸν αὐτὸν δείκτην, ἵσοῦται μὲν τὴν ρίζαν τοῦ γινομένου τῶν ἀριθμῶν, τὴν ἔχουσαν τὸν δείκτην τῶν παραγόντων».

β') "Εστω τὸ γινόμενον $\sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\mu]{\beta}$. Λέγω ὅτι τοῦτο = μὲν $\sqrt[\mu\nu]{\alpha^\mu \beta^\nu}$

$$\begin{aligned} \text{Διότι } \tauὸ \sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\mu]{\beta} &= \alpha^{\frac{1}{\nu}} \cdot \beta^{\frac{1}{\mu}} = \alpha^{\frac{\mu}{\mu\nu}} \cdot \beta^{\frac{\nu}{\mu\nu}} = \left(\alpha^{\frac{\mu}{\mu}} \cdot \beta^{\frac{\nu}{\nu}} \right)^{\frac{1}{\mu\nu}} \\ &= \sqrt[\mu\nu]{\alpha^\mu \cdot \beta^\nu}. \end{aligned}$$

"Ητοι, «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ρίζας ἀριθμῶν, ἔχουσας διαφόρους δείκτας, τρέπομεν αὐτὰς εἰς ἀλλας ἵσοδυνάμους των, ἔχουσας τὸν αὐτὸν δείκτην, καὶ ἀκολούθως πολλαπλασιάζομεν ταῦτας».

γ') "Εστω, ὅτι ζητεῖται τὸ πηλίκον $\sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\nu]{\beta}$. Λέγω ὅτι τοῦτο = μὲν $\sqrt[\nu]{\alpha \cdot \beta}$.

$$\begin{aligned} \text{Διότι } \tauὸ \sqrt[\nu]{\alpha} : \sqrt[\nu]{\beta} &= \alpha^{\frac{1}{\nu}} : \beta^{\frac{1}{\nu}} = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{1}{\nu}} = (\alpha : \beta)^{\frac{1}{\nu}} \\ &= \sqrt[\nu]{\alpha : \beta}. \end{aligned}$$

"Ητοι, «τὸ πηλίκον ριζῶν δύο ἀριθμῶν, ἔχουσῶν τὸν αὐτὸν δείκτην, ἵσοῦται μὲν τὴν ρίζαν τοῦ πηλίκου τῶν ἀριθμῶν, ἔχουσαν τὸν δείκτην τῶν δοθεισῶν».

δ') "Εσιω ὅτι ζητεῖται τὸ πηλίκον $\sqrt[\nu]{\alpha} : \sqrt[\mu]{\beta}$. Λέγω ὅτι τοῦτο = μὲν $\sqrt[\mu\nu]{\alpha^\mu : \beta^\nu}$.

$$\text{Διότι, τὸ } \sqrt[\nu]{\alpha} : \sqrt[\mu]{\beta} = \alpha^{\frac{1}{\nu}} : \beta^{\frac{1}{\mu}} = \alpha^{\frac{\mu}{\mu\nu}} : \beta^{\frac{\nu}{\mu\nu}} = \left(\frac{\alpha^{\mu}}{\beta^{\nu}} \right)^{\frac{1}{\mu\nu}}$$

$$= \left(\alpha^{\mu} : \beta^{\nu} \right)^{\frac{1}{\mu\nu}} = \sqrt[\mu\nu]{\alpha^{\mu} : \beta^{\nu}}$$

”Ητοι, «διὰ νὰ διαιρέσωμεν ρίζας δύο ἀριθμῶν, ἔχοντας διαφόρους δείκτας, τρέπομεν αὐτάς εἰ; ἄλλας λιστυνάμους των, ἔχοντας τὸν αὐτὸν δείκτην, καὶ ἀκολούθως διαιροῦμεν ταύτας».

§ 90. Ιδεότητες τῶν ριζῶν ἀριθμῶν.—

α') «Δυνάμεθα παράγοντά τινα, ἐκτὸς ριζικοῦ κείμενον, νὰ εἰσαγάγωμεν καταλλήλως ἐντὸς αὐτοῦ».

Οὕτω π. γ. ἂν ἔχωμεν τὸ γινόμενον $\sqrt[\nu]{\beta}$, παρατηροῦμεν
ὅτι $\alpha = \sqrt[\nu]{\alpha^{\nu}}$. "Αρά $\alpha \sqrt[\nu]{\beta} = \sqrt[\nu]{\alpha^{\nu}} \cdot \sqrt[\nu]{\beta} = \sqrt[\nu]{\alpha^{\nu} \beta}$.

β') «Δυνάμεθα ἐνίστε νὰ ἀντικαταστήσωμεν ρίζαν ἀριθμοῦ δι' ἄλλης ἔχοντος μικρότερον δείκτην».

$$\text{Οὕτω π. γ. } \sqrt[3]{\alpha^5} = \sqrt[3]{\alpha^3 \cdot \alpha^2} = \left(\alpha \cdot \alpha^2 \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\left(\alpha^3 \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\alpha^2 \right)^{\frac{1}{3}} = \alpha^{\frac{3}{3}} \cdot \alpha^{\frac{2}{3}} = \alpha \cdot \alpha^{\frac{2}{3}} = \alpha \sqrt[3]{\alpha^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{'Επίσης } \sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} &= \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} + \sqrt[3]{3^3 \cdot 3} \\ &= 2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{3} = 5\sqrt[3]{3}. \end{aligned}$$

γ') «Ἐὰν εἰς τὸν παρανομαστὴν κλάσματος ὑπάρχουν ριζικά, δυνάμεθα ἐνίστε νὰ εὑρώμενον λιστυνάμον του μὲ παρονομαστὴν ἀπηλλαγμένον ριζικοῦ».

Οὕτω, ἂν ἔχωμεν τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{\sqrt[\mu]{\beta}}$ πολλαπλασιάζομεν τοὺς

$$\text{ὅρους του ἐπὶ } \sqrt[\mu]{\beta^{\mu-1}}, \text{ ὅτε } \frac{\alpha}{\sqrt[\mu]{\beta}} = \frac{\alpha \sqrt[\mu]{\beta^{\mu-1}}}{\sqrt[\mu]{\beta} \cdot \sqrt[\mu]{\beta^{\mu-1}}}$$

$$= \frac{\alpha \sqrt[μ]{\beta^μ - 1}}{\sqrt[μ]{\beta^μ}} = \frac{\alpha \sqrt[μ]{\beta^μ - 1}}{\beta}$$

$$\text{Π. χ. τὸ } \frac{\sqrt[3]{\alpha}}{\sqrt[3]{\frac{2}{2}}} = \frac{\alpha \sqrt[3]{\frac{2^2}{2}}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{2^2}{2}}} = \frac{\alpha \sqrt[3]{\frac{4}{2}}}{2}$$

* Αν εξωμεν π. χ. τὸ κλάσμα

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{5}}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{5}}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{5}}$$

$$2\sqrt[3]{6}$$

πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους του ἐπὶ τὸ
καὶ λαμβάνομεν τὸ ισοδύναμόν του

Τούτου πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους ἐπὶ
καὶ εὑρίσκομεν τὸ ισοδύναμόν του

$$\frac{1}{\sqrt[12]{12}} \left(\sqrt[12]{12} + \sqrt[12]{18} - \sqrt[12]{30} \right) = \frac{1}{12} \left(2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{30} \right).$$

A σκήσεις

* Ομάς πρώτη. 1) Νὰ τραποῦν αἱ κάτωθι φέζαι εἰς ισοδυνάμους τινα, ἐχούσας τὸν ἐλάχιστον κοινὸν δείκτην.

$$\checkmark \quad \alpha') \sqrt[3]{\alpha}, \sqrt[6]{\alpha}, \sqrt[6]{\alpha}, \beta') \sqrt[4]{\alpha}, \sqrt[6]{\beta}, \sqrt[12]{\gamma}, \gamma') \sqrt[3]{\alpha}, \sqrt[3]{\beta}, \sqrt[3]{\gamma}$$

$$2) \quad \text{Νὰ γίνῃ ἀναγωγὴ τῶν φεζῶν } \sqrt[4]{\frac{64}{64}}, \sqrt[6]{\frac{48}{48}}, \sqrt[3]{\frac{16}{16}}, \sqrt[2μ]{\alpha^μ}$$

* Ομάς δευτέρα. 1) Νὰ εύρεθοῦν τὰ γινόμενα

$$\checkmark \quad \alpha') \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{20}, \beta') \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{2}, \gamma') \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{30}$$

$$\checkmark \quad \delta') \sqrt[3]{xy} \cdot \sqrt{\frac{x}{y}}, \epsilon') \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[5]{x}, \sigma\tau') \sqrt[3]{2x} \cdot \sqrt[3]{3\beta}, \sqrt[4]{5\alpha\beta}$$

$$\checkmark \quad \zeta') \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{2}, \eta') \sqrt[4]{x} \cdot \sqrt[3]{y}, \theta') \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[5]{y}$$

2) Νὰ οπολογισθοῦν τὰ

$$\checkmark \quad \alpha') \left(\sqrt[3]{\alpha} + \sqrt[3]{\beta} - \sqrt[3]{\gamma} \right)^2, \beta') \left(2\sqrt[3]{\alpha} + 8\sqrt[3]{\alpha^2} \right) \sqrt[3]{\alpha}$$

$$\gamma') \left(\sqrt[3]{\alpha} + \sqrt[3]{\alpha} - \sqrt[4]{\alpha} \right) \cdot \sqrt[3]{\alpha}, \delta') \left(2^{\frac{1}{2}} + 3^{\frac{1}{2}} \right) \left(4 - 3^{\frac{1}{3}} \right)$$

$$\epsilon') \left(\alpha^{\frac{1}{2}} \pm \beta^{\frac{1}{2}} \right)^2, \sigma\tau') \left(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} + 1 \right)^2, \zeta') \left(2^{-\frac{1}{2}} + 3^{-\frac{1}{2}} - 1 \right)^2$$

Ομάδας τρίτην. 1) Εις τὰς κάτωθι παραστάσεις ὁ πρὸ τοῦ φιλικοῦ παράγων νὰ εἰσαγθῇ καταλλήλως ἐντὸς αὐτοῦ.

$$\alpha') \sqrt[4]{x-1}, \beta') \sqrt[3]{5}, \gamma') \sqrt[3]{\frac{3}{x}}, \delta') \sqrt[3]{\frac{5}{x^2}}.$$

2) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ πηλίκα

$$\alpha') \sqrt{24} : \sqrt{2}, \beta') \sqrt[3]{7000} : \sqrt[3]{875}, \gamma') \frac{\sqrt[3]{x^4}}{\sqrt[3]{x^5}}.$$

$$\delta') \sqrt{xy} : \sqrt{\frac{x}{y}}, \varepsilon') \sqrt[3]{6x^4} : \sqrt[3]{2x}, \sigma\tau') \sqrt{\frac{3xy}{\omega}} : \sqrt{\frac{2x^3y}{\omega^3}}. \checkmark$$

3) Τρέψατε τὰ κάτωθι κλάσματα εἰς ισοδύναμα των μὲν φητούς παρανομαστάς.

$$\alpha') \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{2}}, \beta') \frac{1+\sqrt{-3}}{\sqrt{-3}}, \gamma') \frac{x}{\sqrt[3]{\beta}}, \delta') \frac{4\sqrt{-2}}{\sqrt[3]{-3}}, \varepsilon') \frac{1}{\sqrt[3]{3\sqrt{-2}}}.$$

$$\sigma\tau') \frac{3}{\sqrt[4]{2}}, \zeta') \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[5]{x}}, \eta') \frac{x}{x-\sqrt{\alpha}}, \theta') \frac{x-\sqrt{x^2-1}}{x+\sqrt{x^2-1}}.$$

Περὶ ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν

ΦΙ. Ορισμοί.—

α') "Εστω ὅτι ζητεῖται ἡ $\sqrt{-2}$.

"Επειδὴ $1^2=1$, καὶ $2^2=4$, συνάγομεν ὅτι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 2 περιέχεται μεταξὺ 1 καὶ 2. "Επομένως αὕτη θὰ είνε ἵση μὲν 1 καὶ μέρος τῆς μονάδος· ἥτοι ἔχει μορφὴν 1,

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὰ δέκατα τῆς ρίζης, ὑψώνομεν εἰς τὸ τετράγωνον τοὺς ἀριθμοὺς 1,1· 1,2· 1,3·.. καὶ εὑρίσκομεν ὅτι ἡ ρίζα περιέχεται μεταξὺ τῶν 1,4 καὶ 1,5. Διότι $(1,4)^2 = 1$, $96 \cdot (1,5)^2 = 2,25$. "Αρα θὰ είνε τῆς μορφῆς 1, 4

Καθ' ὅμιον τρόπον προχωροῦντες εὑρίσκομεν, ὅτι ἡ ρίζα περιεχεται μεταξύ 1,41 καὶ 1,42. "Επομένως ὅτι ἔχει τὴν μορφὴν 1,41

$$\frac{16}{5} \\ \hline 80$$

“Ομοίως προχωροῦντες, παρατηροῦμεν ὅτι δὲν εύρισκεται ὠρισμένος τις ἀριθμὸς ὃς τετραγωνικὴ ὁὗτα τοῦ 2, ἀλλ’ ὅτι προκύπτει ἀριθμὸς δεκαδικὸς μὲν ἀπειρα δεκαδικὰ ψηφία, μὴ περιοδικά. Διότι, ἔστω ὅτι προκύτει ὃς τετραγωνικὴ ὁὗτα τοῦ 2 δεκαδικός τις ἀριθμὸς μὲν ὠρισμένον πλῆθος ψηφίων, ἢ περιοδικός. Οὗτος δύναται νὰ γραφῇ ὑπὸ μορφὴν ἐνὸς κλάσματος ἀναγώγου.” Εστω τοῦτο τὸ $\frac{\lambda}{\mu}$. Ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Διότι ἀφοῦ τὸ λ καὶ μ εἶναι ἀριθμοί, οἱ δοῦλοι δὲν ἔχουν κοινὸν διαιρέτην, καὶ τὸ κλάσμα $\frac{\lambda^2}{\mu^2}$ εἶναι ἀνάνωγον. “Ἄρα δὲν δύναται νὰ ἴσοῦται μὲν τὸν ἀκέραιον ἀριθμὸν 2.

Κατ’ ἀνάλογον τρόπον ἐργαζόμενοι, διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν $\sqrt[3]{5}$, τὴν $\sqrt[4]{3}$ κλπ., παρατηροῦμεν ὅτι αὗται εἶναι ἀριθμοὶ μὲν ἀπειρα δεκαδικὰ ψηφία μὴ περιοδικά.

Τοὺς νέους τούτους ἀριθμοὺς καλοῦμεν ἀσυμμέτρονς ἀριθμούς.

β') “Ητοι «ἀσύμμετρον ἀριθμὸν καλοῦμεν τὸν ἀριθμόν, ὅστις ἔχει ἀπειρον πλῆθος δεκαδικῶν ψηφίων, μὴ περιοδικῶν».

γ') Τοὺς μέχρι τοῦδε γνωστοὺς (ἀκέραιοις καὶ κλασματικοὺς) ἀριθμοὺς καλοῦμεν συμμέτρονς ἀριθμοὺς πρὸς διάκρισιν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀσυμμέτρων.

Οὕτω οἱ ἀριθμοὶ

8,3415721812 , 4,35718403

3,12567149 , 6,77178127145

λέγονται ἀσύμμετροι.

§ 92. Πράξεις ἐπὲ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν.—

α') “Οταν λέγωμεν ἄθροισμα ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν, π. χ. τῶν 1,73205 + 1,41421 ἐννοοῦμεν τὸν ἀριθμόν, τὸν δοῦλον εὑρίσκομεν κατὰ τὸν ἔξης τρόπον. Σχηματίζομεν ἀπὸ καθένα τῶν δοθέντων ἀριθμῶν τὰς προσεγγιζούσας τιμάς

1·	1,7·	1,73·	1,732·	1,7320·	1,73205
----	------	-------	--------	---------	-------------------

1·	1,4·	1,41·	1,414·	1,4142·	1,41421
----	------	-------	--------	---------	-------------------

Προσθέτομεν τὰς ἀντιστοίχους πρώτας, δευτέρας, τρίτας ἀνωτέρω τιμάς, καὶ εὑρίσκομεν τοὺς ἀριθμοὺς

2·	3,1·	3,14·	3,146·	3,1462·	3,14626
----	------	-------	--------	---------	-------------------

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι μία ὡρισμένη ὁμάς ψηφίων μένει ἀμετάβλητος. Οὕτω ἀπὸ τὸν τέταρτον ἀριθμὸν καὶ ἔξῆς δὲν μεταβάλλονται τὰ ψηφία 3· 1· 4· 6· ἀπὸ δὲ τοῦ πέμπτου καὶ ἔξῆς τὰ 3· 1· 4· 6· 2. Τὴν πορείαν αὐτὴν ἀκολουθοῦντες, δυνάμεθα νὰ ὠρίσωμεν δσαδήποτε ψηφία, τα δποῖα δὲν μεταβάλλονται, δηλαδὴ θὰ εὔρωμεν ἀσύμμετρόν τινα ἀριθμόν, καὶ τοῦτον θὰ καλοῦμεν ἄθροισμα τῶν δοθέντων ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν.

6') Κατ' ἀνάλογον τρόπον δοίζομεν τὸ γινόμενον δύο ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν, ἐν πολλαπλασιάζωμεν τὰς προσεγγιζούσας ἀντιστοίχους τιμὰς αὐτῶν.

γ') Καλοῦμεν διαφορὰν δύο ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν, π. χ. τῶν α καὶ β, τὸν ἀριθμόν, δ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸ β δίδει τὸν α. Κατ' ἀνάλογον τρόπον τὸ πηλίκον τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν α καὶ β, ἥτοι τὸ α : β, θὰ εἴνε ἀριθμός, δ ὁποῖος πολλαπλασιάζόμενος ἐπὶ β δίδει γινόμενον τὸν α.

Κατ' ἀναλογίαν δοίζομεν τὴν δύναμιν ἀσυμμέτρου τινός ἀριθμοῦ α. Οὕτω τὸ α³ θὰ εἴνε τὸ γινόμενον α. α. α, ἐνῶ τὸ α⁻³ θὰ φανερώνῃ τὸ πηλίκον $\frac{1}{\alpha^3}$.

Κατὰ ταῦτα, διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν διαφορὰν τῶν ἀσυμμέτρων

1,73205 1,41421

σχηματίζομεν πρῶτον τὰς προσεγγιζούσας τιμὰς τῶν δοθέντων. Ἀφαιροῦμεν ἀκολούθως ἀντιστοίχως ἀπὸ τῆς πρώτης τὴν δευτέραν, καὶ οὕτω εύροισκομεν 0· 0,3· 0,32· 0,318· 0,3168· 0,31784. Λαμβάνομεν ἔκεινα τὰ ψηφία, τὰ δποῖα ἐν τῇ πορείᾳ τοῦ λογισμοῦ δὲν μεταβάλλονται. Κατὰ ταῦτα ἡ ζητουμένη διαφορὰ εἴνε 0,3178. . . .

δ') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεται ὅτι, τὸ ἄθροισμα (ἥ το γινόμενον) ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν διατηρεῖται ἀμετάβλητον, ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν προσθετέων (ἥ τῶν παραγόντων). Ἐπίσης εἴνε εὔκολον νὰ διακρίνωμεν, ὅτι αἱ θεμελιώδεις ἴδιότητες τῶν δυνάμεων ἰσχύουν καὶ δι' ἀσύμμετρον βάσιν.

§ 93*.) Γεωμετρικὴ παράστασις ἀσυμμέτρου ἀριθμοῦ.—

α') Διὰ νὰ παραστήσωμεν ἀσύμμετρόν τινα ἀριθμὸν π. χ. τὸν 2,314379 . . . λαμβάνομεν τὸν σύμμετρον ἀριθμὸν, δστις προσεγγίζει περισσότερον τὸν δοθέντα, ἔστω τὸν 2,31437· τὸ σημείον, τὸ

ὅποιον παριστάνει τὸν ἀριθμὸν τοῦτον θὰ λέγωμεν ὅτι παραστάνει τὸν δοθέντα ἀσύμμετρον. Διότι, ἐν γένει, δὲν εἶναι εὔκολον, νὰ εύρωμεν τὸ σημεῖον, τὸν παριστάνον δοθέντα ἀσύμμετρον ἀριθμό.

6) Ἐν τούτοις, δι' ὧδισμένους τινάς ἀσυμμέτρους ἀριθμοὺς δυνάμεθα διὰ γέωμετρικῆς τινος κατασκευῆς νὰ εύρωμεν τὸ ἐν λόγῳ σημεῖον. Εὰν π. χ. κατασκευάσωμεν ἐν δρυθογώνιον καὶ ίσοσκελὲς τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρὰς ἵσας μὲ 1, ἢ ὑποτείνουσά του θὰ εἶναι ἵση, ὡς γνωστὸν, μὲ τὴν $\sqrt{2}$. Εὑρίσκομεν λοιπὸν τὸ σημεῖον, τὸ παριστάνον τὴν $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν, ἐὰν λάβωμεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Ο τμῆμα ἵσον μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὑποτείνουσαν.

§ 94*) Δυνάμεις μὲ ἐκθέτεις ἀσυμμέτρους.—

Νὰ ὑψώσωμεν ἀριθμόν τινα εἰς δύναμιν μὲ ἐκθέτην ἀσύμμετρον π. χ. $3^{\sqrt{\frac{1}{2}}} = 3^{1,414\dots}$ σημαίνει νὰ λάβωμεν τὸν ἀριθμόν, τὸν ὃποιον εὑρίσκομεν κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον.

Σχηματίζομεν τὰς δυνάμεις

$$3^{1,4} = 3^{\frac{14}{10}} = 3^{\frac{7}{5}} = 3 \cdot \sqrt[5]{9} = 4, \dots$$

$$3^{1,41} = 3^{\frac{141}{100}} = 3 \cdot \sqrt[100]{3^{141}} = 4,7 \dots$$

$$3^{1,414} = 3^{\frac{1414}{1000}} = 3^{\frac{707}{500}} = 3 \cdot \sqrt[500]{3^{1414}} = 4,72 \dots$$

καὶ οὕτω καθεξῆς. Παρατηροῦμεν, ὅτι εἰς τοὺς προκύπτοντας ἀριθμοὺς ὧδισμένη ὄμάς ψηφίων ἀπό τινος μένει ἀμετάβλητος. Οὕτω ἔξακολουθοῦντες, δυνάμεια νὰ δρίσωμεν ὁσαδήποτε ψηφία, τὰ δποῖα διατηροῦνται ἀμετάβλητα προσδιορίζομεν δηλαδὴ τοιουτορόπως ἔνα ἀσύμμετρον ἀριθμόν, καὶ τοῦτον θὰ καλοῦμεν

$$\text{ώς } 3^{1,414} \text{ ή } 3^{\sqrt{\frac{1}{2}}}.$$

95*) Περὶ τῆς ἐκθετικῆς συγχροτήσεως $y=a^x$.—

Ἐστω ἡ ἔξισωσις $y=a^x$, ὅπου τὸ a εἶναι θετικὸς ἀριθμός.

α') «*H συνάρτησις $y=a^x$, αὐξάνει αὐξάνοντος τοῦ x, ἐὰν τὸ a εἶναι μεγαλύτερον τῆς μονάδος».*

«*Ητοι, ἐὰν εἰς τὴν x δώσωμεν τιμὴν τινά θετικὴν μ., καὶ ἄλλην τοιαύτην μ+ν λέγω ὅτι εἶναι $a^{μ+ν} > a^n$, ἐὰν εἶναι $a > 1$.*

Διότι τότε θὰ εἶναι καὶ $a^n > 1$. Εὰν τὰ μέλη τῆς ἀνισότητος

ταύτης πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ a^u , εὑρίσκουμεν $a^{u+v} > a^u$. Εὰν μὲν εἶναι ἀρνητικοὶ ἀριθμοί, θὰ ἔχωμεν $a^v < 1$, καὶ $a^{u+v} < a^u$.

"Ητοι, ἡ δύναμις a^{u+v} ἡ ἔχουσα τὸν μικρότερον ἐκθέτην εἶναι μικροτέρα τῆς a^v , ἔχούσης μεγαλύτερον ἐκθέτην.

6') «Ἐὰν εἶναι $a < 1$ ἡ συνάρτησις a^x ἐλαττοῦται, αὐξάνοντος τοῦ x ».

Διότι, ἂν εἶναι $a < 1$, θὰ εἶναι $a^v < 1$. Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς ἀνισότητος ταύτης ἐπὶ a^u , ἔχομεν $a^{u+v} < a^v$, ὑποθέτοντες τοὺς μ., ν. θετικούς. Εὰν μ. καὶ ν. εἶναι ἀρνητικοί, θὰ ἔχωμεν $a^v > 1$, καὶ $a^{u+v} > a^v$.

γ') "Αν κάμωμεν τὴν ἀπεικόνισιν τῶν τιμῶν τῆς συναρτήσεως $y=a^x$ παρατηροῦμεν, ὅτι εἰς καθεμίαν τιμὴν τοῦ x ἀντιστοιχεῖ μία θετικὴ τιμὴ τοῦ y . Ἀλλὰ καὶ τούναντίον, ἂν δοθῇ θετική τις τιμὴ τοῦ y μεγαλυτέρα (μικροτέρα) τῆς μονάδος, ἀντιστοιχεῖ εἰς αὐτὴν μία θετικὴ (ἀρνητικὴ) τοῦ x .

Περὶ φανταστικῶν καὶ μιγάδων ἀριθμῶν

§ 96. Ορισμοί. —

α') Εὰν θέλωμεν νὰ δεχθῶμεν, ὅτι καὶ οἱ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ ἔχουν φέταν ἀρτίας τάξεως, παραδεχόμενα νέον εἶδος ἀριθμῶν, τοὺς ὃποίους θὰ καλοῦμεν φανταστικοὺς ἀριθμούς, τοὺς δὲ μέχρι τοῦδε γνωστοὺς πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τούτων πραγματικούς.

β') Οἱ φανταστικοὶ ἀριθμοὶ σχηματίζονται ως ἔξης. Τὴν τετραγωνικὴν φέταν τῆς ἀρνητικῆς μονάδος θὰ καλοῦμεν φανταστικὴν μονάδα, καὶ θὰ τὴν παραστάνωμεν διὰ τοῦ συμβόλου i . "Ωστε θὰ ἔχωμεν $i = \pm \sqrt{-1}$, καὶ $i^2 = -1$.

Ἐκ τῆς φανταστικῆς μονάδος, ἢ μέρους αὐτῆς γίνονται διὰ τῆς ἐπαναλήψεως οἱ φανταστικοὶ ἀριθμοί.

Π. χ. ἔχομεν ὅτι $2i = i + i$, $3i = i + i + i$,

$$\frac{4}{9}i = \frac{1}{9}i + \frac{1}{9}i + \frac{1}{9}i + \frac{1}{9}i$$

Κατ' ἀνάλογον τρόπον σχηματίζονται καὶ οἱ ἀρνητικοὶ φανταστικοὶ ἀριθμοὶ ἐκ τῆς $-i$, ὅπως καὶ οἱ ἀρνητικοὶ πραγματικοὶ ἐκ τῆς -1 . Π. χ. εἶναι $-4i = (-i) + (-i) + (-i) + (-i)$.

γ') Οὗτοι ἡ ἀρτίας τάξεως φέταν ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ δύναται νὰ παρασταθῇ δι' ἀριθμοῦ φανταστικοῦ.

Π. χ. ἡ τετραγωνικὴ φέτα τοῦ -25 γράφεται ως ἔξης

$$\sqrt{-25} = \sqrt{(-1) \cdot 25} = \sqrt{i^2 \cdot 25} = \pm i\sqrt{25} = \pm 5i.$$

Καὶ γενικῶς θὰ εἶνε $\sqrt{-z^2} = \sqrt{(-1) \cdot z^2} = \sqrt{1^2 \cdot z^2} = \pm i$.

Οὕτω $\sqrt{-8} = \sqrt{(-1) \cdot 8} = \sqrt{1^2 \cdot 8} = \pm i \sqrt{8}$.

δ') Καὶ διὰ τὸ νέον τοῦτο σύστημα τῶν ἀριθμῶν δεχόμεθα, ὅτι
ἰσχύουν οἱ θεμελιώδεις νόμοι τῶν πρᾶξεων. Κατὰ ταῦτα ἔχομεν
ὅτι $a \cdot b = a \beta i = i \alpha \beta$.

ε') Τὸ ἀλγεβρικὸν ἄρθροισμα φανταστικοῦ καὶ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ
καλοῦμεν **μιγάδα ἀριθμόν**. Οὕτω οἱ $3 - 5i, -8 + 4i, 9 - 7i$ εἶνε ἀρι-
θμοὶ μιγάδες. Ἡ γενικὴ μορφὴ τοῦ μιγάδος ἀριθμοῦ εἶνε $a + bi$, ὅπου
καὶ b εἶνε πραγματικοὶ ἀριθμοὶ οἰοιδήποτε.

στ') Δύο μιγάδες ἀριθμοὶ λέγονται **συνυγεῖς**, ἐὰν διαφέρουν κατὰ
τὸ σημεῖον τοῦ φανταστικοῦ μέρους των. Π. χ. οἱ $7 + 3i, 7 - 3i$ λέγον-
ται συνυγεῖς μιγάδες.

§ 97. Πρόξεις ἐπὶ φανταστικῶν καὶ μιγάδων ἀρι- θμῶν.—

α') Ἡ πρόσθεσις καὶ ἡ ἀφαίρεσις φανταστικῶν ἀριθμῶν δίδει,
ἐν γένει, φανταστικὸν ἀριθμόν. Π. χ. εἶνε $8i + 5i = 13i$.

‘Ομοίως, $-17i - 6i = -23i, 24i - 5i = 19i$.

β') Ὁ πολλαπλασιασμὸς φανταστικῶν ἀριθμῶν δίδει γινόμενον
πραγματικὸν ἀριθμόν, ἐὰν τὸ πλῆθος τῶν φανταστικῶν παραγόντων
εἴνε ἀριτον. Οὕτω ἔχομεν ὅτι $i \cdot i = i^2 = -1$.

$$(-i) \cdot (-i) = (-i)^2 = i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = +1.$$

$$\text{Γενικῶς } i^{4v} = +1, i^{4v+1} = i, i^{4v+2} = -1, \\ i^{4v+3} = -i, \quad \text{α. i. } \beta i = -\alpha \beta,$$

ὅπου τὸ v παριστάνει ἀριθμὸν ἀκέραιον.

γ') Ἡ διαίρεσις τῶν φανταστικῶν ἀριθμῶν θεωρεῖται, ὡς συνή-
θως, ἀντίστροφας πρᾶξις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Οὕτω ἔχομεν

$$\alpha i : \beta i = \frac{\alpha i}{\beta i} = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \alpha : \beta i = \frac{\alpha i}{\beta i^2} = -\frac{\alpha}{\beta} i.$$

δ') Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν τεσσάρων πρᾶξεων ἐπὶ μιγάδων ἀριθμῶν
δίδει ἔξαγόμενα, ἐν γένει, μιγάδας ἀριθμούς. Οὕτω ἔχομεν ὅτι

$$1) \quad (\alpha + \beta i) + (\gamma + \delta i) = \alpha + \gamma + (\beta + \delta) i.$$

$$2) \quad (\alpha - \beta i) - (\gamma - \delta i) = \alpha - \gamma - (\beta - \delta) i.$$

$$3) \quad (\alpha + \beta i)(\gamma + \delta i) = \alpha \gamma + \beta \gamma i + \alpha \delta i + \beta \delta i = \alpha \gamma - \beta \delta + (\beta \gamma + \alpha \delta) i.$$

$$4) \quad (\alpha + \beta i)(\gamma + \delta i) = \frac{\alpha + \beta i}{\gamma + \delta i} = \frac{(\alpha + \beta i)(\gamma - \delta i)}{(\gamma + \delta i)(\gamma - \delta i)} = \frac{\alpha \gamma + \beta \delta + (\beta \gamma - \alpha \delta) i}{\gamma^2 + \delta^2}.$$

§ 98. Ιδεότητες φανταστικῶν καὶ μεγάλων ἀριθμῶν. —

α') «Τὸ ἄθροισμα δύο συζυγῶν μιγάδων ἀριθμῶν εἶνε ἀριθμός πραγματικός».

Οὕτω τὸ ἄθροισμα $(\alpha + \beta i) + (\alpha - \beta i) = 2\alpha$.

β') Εὰν ζητήται τὸ γινόμενον τῶν συζυγῶν $\alpha + \beta i$, $\alpha - \beta i$ ἔχομεν $(\alpha + \beta i)$ $(\alpha - \beta i) = \alpha^2 + \alpha\beta i - \alpha\beta i - \beta^2 i^2 = \alpha^2 + \beta^2$.

Ητοι, «τὸ γινόμενον δύο συζυγῶν μιγάδων ἀριθμῶν εἶνε πραγματικὸς ἀριθμός, καὶ ίσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν τοῦ ἐνδεικτικοῦ».

γ') Εὰν δύο μιγάδες ἀριθμοὶ $\alpha + \beta i$ καὶ $\gamma + \delta i$ εἶνε μεταξύ των ίσοι, θὰ ἔχωμεν $\alpha + \beta i = \gamma + \delta i$.

Ἐκ τῆς ίσότητος ταύτης προκύπτει $(\alpha - \gamma) + (\beta - \delta)i = 0$

$$\text{η} \quad (\alpha - \gamma) = (\delta - \beta)i.$$

Ἅγιοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον τὰ δύο ίσα, εὐρίσκουμεν

$$(\alpha - \gamma)^2 = (\delta - \beta)^2 i^2 = -(\delta - \beta)^2.$$

Ἄλλ' αὕτη ἀληθεύει μόνον, ὅταν $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$, διότε καὶ τὰ δύο μέλη εἶνε ίσα μὲ μηδέν, ἐνῶ εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν θὰ ἔχωμεν ὅτι θετικός τις ἀριθμὸς ίσοῦται μὲ ἀρνητικόν.


Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι, «ἔὰν δύο μιγάδες ἀριθμοὶ εἶνε ίσοι μεταξύ των, θὰ εἶνε χωριστὰ ίσα τὰ πραγματικά καὶ τὰ φανταστικά μέρη των» καὶ ὅτι μία ίσότης μεταξὺ δύο μιγάδων ἀριθμῶν ἄγει εἰς δύο ίσότητας μὲ πραγματικοὺς ἀριθμούς.

§ 99*). Γεωμετρικὴ παράστασις μεγάλων. —

α') Καθὼς παρεστήσαμεν τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμούς διὰ σημείων τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν, οὕτω δυνάμενα νὰ παραστήσωμεν τοὺς φανταστικοὺς ἀριθμούς διὰ σημείων ὡς ἔξης.

Ἐπὶ τὴν εὐθείαν x' x (σχ. 7) φέρομεν τὴν κάθετον y' y διὰ τοῦ σημείου O. Τὸ ἀκρον τημήματος, τὸ ὅποιον λαμβάνομεν ίσον μὲ τὴν μονάδα του μήκους, θὰ παριστάνῃ τὴν φανταστικὴν μονάδα i. Κατ' ἀνάλογον τρόπον εὐρίσκομεν τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον παριστάνει τοὺς ἀριθμοὺς $2i$, $3i$, ..., βi , ἔὰν λάβωμεν ἀπὸ τοῦ O τημῆμα ίσον μὲ 2 , 3 , ..., β μονάδας μήκους πρὸς τὴν φορὰν Oy. Εὰν λάβωμεν τὰ ἀντίστοιχα σημεῖα πρὸς τὴν φορὰν Oy', θὰ ἔχωμεν τὴν παράστασιν τῶν ἀριθμῶν $-i$, $-2i$, $-3i$, ..., $-\beta i$ (σχ. 7).

6') Διὰ νὰ παραστήσωμεν μιγάδα ἀριθμὸν π. χ. τὸν $3+4i$, εὑρίσκομεν τὸ σημεῖον A_3 ἐπὶ τῆς x' x , τὸ παριστάνον τὸν ἀριθμὸν 3, καὶ τὸ B_4 τὸ παριστάνον τὸν 4 i ἐπὶ τῆς y' y . Ακολούθως σχηματίζομεν τὸ δόρυφογόνιον $O A_3 B_4 \Gamma$, καὶ ἡ τετάρτη κορυφὴ του Γ παριστάνει τὸν ἀριθμὸν $3+4i$. Καθὼς βλέπομεν τὸ σημεῖον Γ ἔχει τετμη-



(Σχ. 7)

μένην 3 καὶ τεταγμένην 4. Εν γένει θὰ λέγωμεν ὅτι, ὁ μιγάς ἀριθμὸς $\alpha+\beta i$ παριστάνεται ὑπὸ τοῦ σημείου, τὸ δοποῖον ἔχει τετμημένην α καὶ τεταγμένην β ὡς πρὸς ἄξονας x' x , y' y .

'Ασκήσεις. 1) Παραστήσατε διὰ σημείων τοὺς μιγάδας.

$$\alpha') 2 - \frac{3}{4}i. \quad \beta') 5+3i. \quad \gamma') 6-5i. \quad \delta') -\frac{3}{4} - \frac{5}{8}i.$$

2) Εὑρέτε τὰ σημεῖα, τὰ παριστάνοντα τοὺς μιγάδας

$$\alpha') 4+5i. \quad \beta') 3-4i. \quad \gamma') -\frac{3}{4}i. \quad \delta') 5+2i. \quad \varepsilon') 6-3i.$$

καὶ τὰντίστοιχα ἀθροίσματα, διαφοράς, γινόμενα, πηλίκα των ἀνὰ δύο.

3) Εὑρέτε τὸ ἀθροίσμα τῶν τριῶν πράτων ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν. Τὴν διαφορὰν τῶν γ' καὶ δ' .

4) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων, καὶ νὰ παρασταθοῦν αὐτὰ διὰ σημείων.

$$\alpha') (5+3i), (7+3i). \quad \beta') (8+2i), (3-4i). \quad \gamma') (2-7i), (9-2i).$$

$$\delta') (6+7i) : (6-7i). \quad \varepsilon') (11-8i) : (11+8i). \quad \sigma') (14+15i) : (14-15i).$$

$$\zeta') (3+i\sqrt{-2}) (4-3i\sqrt{-2}). \quad \eta') (9-7i\sqrt{-3}) : (5+4i\sqrt{-3}).$$

$$\theta') \sqrt{\alpha+\beta i}, \sqrt{\alpha-\beta i}. \quad \iota') (1+i)^2. \quad \tau') (1-i)^2.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Περὶ ἔξισώσεων δευτέρου βαθμοῦ

§ 100. Ορεσμοί.—

α') Εξίσωσίς τις λέγεται δευτέρου βαθμοῦ ὅς πρὸς ἓνα ἄγνωστον (ἢ περισσοτέρους) ἀν εἶνε ἵσοδύναμος μὲν ἄλλην, τῆς δποίας τὸ πρῶτον μέλος εἶνε πολυώνυμον δευτέρου βαθμοῦ ὅς πρὸς τὸν ἄγνωστον (τὸν ἀγνώστους), τὸ δὲ δεύτερον μηδέν.

$$\text{Π. γ. αἱ ἀξιώσεις } 3x^2 - 4x + 6 = 0, \\ 7x^2 + 6 = 0, \quad 2x + x^2 + 1 = 0, \quad \frac{x^2 - 1}{2} + \frac{5}{3} = 0$$

εἶνε β' βαθμοῦ ὅς πρὸς x, καὶ x, y.

β') Γενικὴ μορφὴ ἔξισώσεως β' βαθμοῦ. Εάν δοθῇ ἔξισωσίς β' βαθμοῦ μὲν ἓνα ἄγνωστον, τὸν x, καὶ κάμωμεν ἀπαλοιφὴν τῶν παρανομαντῶν τῆς, μεταφορὰν πάντων τῶν ὅρων εἰς τὸ αἱ μέλος τῆς νέας, καὶ ἀναγωγὴν τῶν ὁμοίων ὅρων, λαμβάνομεν ἔξισωσιν ἵσοδύναμον μὲ τὴν δοθεῖσαν, ἥτις, ἐν γένει, ἔχει τὴν μορφὴν

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0. \quad (1)$$

Τὰ a, β, γ παριστάνουν ἀριθμοὺς ἢ παραστάσεις γνωστάς, καὶ καλοῦνται συντελεσταί, τὸ δέ γ καὶ σταθερὸς ὅρος τῆς ἔξισώσεως (1) ἥτοι τοιωνύμου a x² + β x + γ, εἶνε δέ a ≠ 0.

γ') Μορφαὶ ἔξισώσεως β' βαθμοῦ. Εάν ἐν τῇ (1) οἱ συντελεσταὶ εἶνε διάφοροι τοῦ μηδενός, ἢ ἔξισωσίς λέγεται πλήρης, εάν δὲ εἶνε β = 0, ἢ γ = 0, ὅτε θὰ ἔχῃ τὴν μορφὴν

$$\alpha x^2 + \gamma = 0, \quad \text{ἢ } \alpha x^2 + \beta x = 0, \quad \text{λέγεται μὴ πλήρης.}$$

δ') Αἱ φίζαι ἔξισώσεως, αἱ δποίαι εὐρίσκονται ἀκριβῶς (ἀκέραιοι ἢ κλασματικοὶ ἀριθμοὶ) καλοῦνται σύμμετροι, ἐνῷ αἱ εὐρίσκομεναι κατὰ προσέγγισιν (ἵσοινται δὲ μὲν ἀσυμμέτρους ἀριθμοὺς) ἀσύμμετροι. Αἱ σύμμετροι καὶ ἀσύμμετροι φίζαι καλοῦνται μὲν ἐν ὅνομα πραγματικά, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τὰς φανταστικάς, αἱ δποίαι προκύπτουν, εάν ἡ τιμὴ τοῦ ἀγνώστου ἔχῃ ὑπόρροιζον ποσότητα ἀρνητικήν.

§ 101. Ιδεότης τῶν ἔξισώσεων.—

«Ἐάν ἔξισώσεως ὑψώσωμεν τὰ μέλη εἰς τὸ τετράγωνον, προκύπτει ἔξισωσίς, ἔχουσα τὰς φίζας τῆς δοθείσης καὶ τῆς προ-

κυπτούσης ἐκ τῆς δοθείσης, ἀν διλάξωμεν τὸ σημεῖον τοῦ ἑνὸς μέλους τῆς.

"Εστω ἡ ἔξισωσις $A = B$, (1) ὅπου Α καὶ Β παριστάνονται τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως. Εάν ταύτης ὑψώσωμεν τὰ μέλη εἰς τὸ τετράγωνον, προκύπτει ἡ ἔξισωσις $A^2 = B^2$, (2). Λέγω ὅτι αὕτη ἔχει τὰς ωρίας τῆς $A = B$, καὶ τῆς $A = -B$. Τῷ ὅντι, πᾶσαι αἱ ωρία τῆς (1) εἶναι ωρία καὶ τῆς (2). Διότι, ἀν ἐν τῇ (1) θέσωμεν ἀντὶ τῶν ἀγνώστων τὰς ωρίας τῆς, θὰ ἔχωμεν ὅτι

$$\text{ἡ τιμὴ τοῦ } A = \text{μὲ τὴν τιμὴν τοῦ } B.$$

"Αρα καὶ (ἡ τιμὴ τοῦ A)² = μὲ (τὴν τιμὴν τοῦ B)².

Παρατηροῦμεν ἡδη ὅτι ἡ (2) εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν

$$A^2 - B^2 = 0.$$

Αὕτη γράφεται καὶ οὕτω $(A - B)(A + B) = 0$.

"Ινα αὕτη ἐπαληθεύεται, πρέπει καὶ ἀρκεῖ εἰς τῶν παραγόντων $A - B$, καὶ $A + B$ νὰ εἶναι ἵσος μὲ μηδέν. Εάν εἶναι $A - B = 0$, ἐπαληθεύεται ἡ (1). "Αν δὲ εἶναι $A + B = 0$, ἐπαληθεύεται ἡ $A = -B$. "Αρα ἡ $A^2 = B^2$ ἔχει τὰς ωρίας τῆς $A = B$, καὶ τῆς $A = -B$.

§ 102. Λύσις τῆς ἔξισώσεως $ax^2 + \gamma = 0$.

α') "Εστω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισωσις $5x^2 - 48 = 2x^2$. (1)

Μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὁμοίων ὅρων ἔχομεν τὴν ἰσοδύναμόν της $3x^2 = 48$. Διαιροῦμεν διὰ 3 τὰ δύο ἵσα, ὅτε προκύπτει $x^2 = 16$. "Εξάγομεν τὴν τετραγωνικὴν ωρίαν τῶν δύο ἵσων, καὶ ἔχομεν ὅτι $x = \pm 4$. Δηλαδὴ αἱ ωρία εἶναι αἱ 4, -4.

Παρατηροῦμεν ὅτι εἶναι περιττὸν νὰ γράψωμεν πρὸ τοῦ x τὸ \pm . Διότι οὕτω θὰ ἔχωμεν $\pm x = \pm 4$, δηλαδὴ $+x = +4, -x = -4$, καὶ $+x = -4, -x = -4$, ἥτοι πάλιν $x = \pm 4$.

β') "Εν γένει, πρὸς λύσιν τῆς μὴ πλήρους ἔξισώσεως $ax^2 + \gamma = 0$ μεταφέρομεν τὸ γ εἰς τὸ δεύτερον μέλος, ὅτε προκύπτει $ax^2 = -\gamma$.

Διαιροῦμεν διὰ τοῦ a καὶ ἔχομεν $x^2 = -\frac{\gamma}{a}$, ἐξάγοντες δὲ τὴν τετραγωνικὴν ωρίαν τῶν δύο μελῶν ἔχομεν

$$x = \pm \sqrt{-\frac{\gamma}{a}}$$

γ') Έάν τὸ — $\frac{\gamma}{\alpha}$ είνε ἀριθμὸς θετικός, αἱ ρίζαι θὰ είνε πραγματικαί, ἀν δὲ ἀρνητικός, αἱ ρίζαι θὰ είνε φανταστικοὶ ἀριθμοὶ συνυγεῖς. Δηλαδή, ἀν τὰς δύο ρίζας τῆς ἔξισώσεως παραστήσωμεν διὰ τῶν q_1 , q_2 θὰ είνε, $q_1 = \sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}$, $q_2 = -\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}$

εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν, εἰς δὲ τὴν δευτέραν

$$q_1 = i \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}}, \quad q_2 = -i \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}}$$

"Εστω π. χ. ἡ ἔξισώσις $5x^2 + 25 = 0$.

Μεταφέρομεν τὸ 25 εἰς τὸ δεύτερον μέλος, ὅτε ἔχομεν $5x^2 = -25$. Διαιρόῦμεν διὰ τοῦ 5, ὅτε ἔχομεν $x^2 = -5$. Εξάγοντες τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἔχομεν,

$$x = \sqrt{-5} = \sqrt{(-1) \cdot 5} = \sqrt{i^2 \cdot 5}, \quad \text{καὶ} \quad x = \pm i \sqrt{5}$$

$$\text{ἢ} \quad q_1 = i \sqrt{5}, \quad q_2 = -i \sqrt{5}.$$

'Ασκήσεις. Νὰ λύθοῦν καὶ ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις.

$$\alpha') \quad 4x^2 - 3 = x^2 + 6. \quad \beta') \quad 5x^2 + 6 = 6x^2 + 2. \quad \gamma') \quad 9x^2 - \frac{1}{5} = 3x^2 + 15.$$

$$\delta') \quad \frac{x^2 - 9}{3} = \frac{x^2 - 1}{2} \cdot \varepsilon') \quad \frac{3x^2 - 5}{6} + \frac{x^2 + 2}{3} = 7.$$

$$\sigma\tau') \quad \frac{6}{7x^2} - \frac{4}{9x^2} = \frac{4}{25} \cdot \varepsilon') \quad \frac{1}{x-1} - \frac{4}{x+1} = \frac{1}{3}.$$

$$\eta') \quad \alpha x^2 + \beta = \gamma. \quad \theta') \quad \alpha x^2 + \beta = \beta x^2 + \alpha. \quad \iota') \quad x^2 + 2\lambda x + \mu = \lambda(2x + 1).$$

§ 103. Λύσεις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x = 0$.

$$\alpha') \quad \text{"Εστω ἡ ἔξισώσις} \quad 3x^2 + 5x = 0.$$

$$\text{Γράφομεν αὐτὴν οὕτω} \quad x(3x+5) = 0.$$

"Ινα τὸ γινόμενον $x(3x+5)$ γίνη μηδέν, ἀρκεῖ ὅ εἰς τῶν παραγόντων του νὰ γίνῃ ἵσος μὲ μηδέν. Δηλαδὴ θὰ είνε ἡ $x = 0$, ἢ $3x+5 = 0$.

"Ἐκ ταύτης εὑρίσκομεν $x = -\frac{5}{3}$. "Επομένως αἱ ρίζαι τῆς δοθείσης ἔξισώσεως είνε 0, καὶ $-\frac{5}{3}$.

$$\beta') \quad \text{'Εν γένει, ἔστω ἡ μὴ πλήρης ἔξισώσις} \quad \alpha x^2 + \beta x = 0.$$

Γράφομεν αὐτὴν οὕτω $x(\alpha x + \beta) = 0$, ἐκ τῆς δύοιας προκύπτει, ὅτι αἱ ρίζαι τῆς δοθείσης είνε αἱ 0 καὶ $-\frac{\beta}{\alpha}$.

Ασκήσεις. Νὰ λυθοῦν καὶ ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξι σώσεις

$$\alpha') \quad 6x^2 - 8x + 7x^2 = 12x^2 - 8x. \quad \beta') \quad \frac{3}{4}x^2 = 7 \cdot \frac{x}{3} - \frac{x}{2}.$$

$$\gamma') \quad \frac{x^2}{\alpha} + \frac{x}{\beta} = \frac{x^2 + \alpha x}{\alpha \beta}. \quad \delta') \quad \frac{x^2}{\alpha^2 - \beta^2} - \frac{x^2}{\alpha + \beta} = \frac{x^2 - x}{\alpha - \beta}.$$

§ 104. Λύσεις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$.

α') Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισώσιν $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ μεταφέρομεν τὸ γ εἰς τὸ δεύτερον μέλος, καὶ ἔχομεν τὴν ἴσοδύναμόν της

$$\alpha x^2 + \beta x = -\gamma.$$

Προσπαθοῦμεν τώρα νὰ καταστήσωμεν τέλειον τετράγωνον τὸ πρῶτον μέλος ταύτης. Πρὸς τοῦτο, πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη αὐτῆς ἕπι 4 α καὶ προσθέτομεν εἰς αὐτὰ τὸ τετράγωνον τοῦ β . Οὕτω λαμβάνομεν

$$4\alpha^2 x^2 + 4\alpha\beta x + \beta^2 = \beta^2 - 4\alpha\gamma,$$

$$(2\alpha x + \beta)^2 = \beta^2 - 4\alpha\gamma.$$

Ἐξάγοντες τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τῶν μελῶν ταύτης ἔχομεν

$$2\alpha x + \beta = \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}.$$

$$\text{Έκ ταύτης εὑρίσκομεν } x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}.$$

"Ητοι, ἂν καλέσωμεν ϱ_1, ϱ_2 τὰς ρίζας τῆς δοθείσης ἔξισώσεως, θὰ ἔχωμεν

$$\boxed{\varrho_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}, \quad \varrho_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}$$

β') Έφαρμόζοντες τοὺς τύπους τούτους, εὑρίσκομεν τὰς ρίζας οἵας οἴασδήποτε τῶν μορφῶν ἔξισώσεως τοῦ β' βαθμοῦ.

"Εστω π.χ., ὅτι ζητεῖται νὰ λυθῇ ἡ ἔξισώσις $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

Τὸ $\alpha = 3$, τὸ $\beta = -5$, τὸ $\gamma = 2$. Αντικαθιστῶντες εἰς τοὺς ἀνωτέρω τύπους τὰς τιμὰς ταύτας εὑρίσκομεν

$$\varrho_1 = \frac{5 + \sqrt{25 - 24}}{6}, \quad \varrho_2 = \frac{5 - \sqrt{25 - 24}}{6}. \quad \text{Ητοι } \varrho_1 = 1, \text{ καὶ } \varrho_2 = \frac{2}{3}$$

Α σημειώσεις.

Ομάδας πρώτη. Λύσατε καὶ ἐπαληθεύσατε τὰς ἔξι σώσεις

$$\alpha') \quad 3x^2 - 3x = 8. \quad \beta') \quad 3x^2 - \frac{2}{3}x = 25. \quad \gamma') \quad x^2 - \frac{3}{4}x = 3x + 1.$$

$$\delta') \quad \frac{7x}{5} - \frac{5}{3x} = \frac{20}{3}. \quad \varepsilon') \quad \frac{3}{x+3} + \frac{5}{x} = 2. \quad \sigma\tau') \quad \frac{2}{x-1} = \frac{3}{x-2} + \frac{2}{x-4}.$$

$$\zeta') \quad (x+2)(2x+1) + (x-1)(3x+2) = 57.$$

$$\text{v'}) \frac{x-5}{x+3} + \frac{x-8}{x-3} = \frac{80}{x^2-9} + \frac{1}{2}, \quad \theta') \frac{2x+1}{7-x} + \frac{4x+1}{7+x} = \frac{45}{49-x^2} + 1.$$

$$\text{v'}) \frac{x+1}{x^2-4} + \frac{1-x}{x+2} = \frac{2}{5(x-2)},$$

Ομάδας δευτέρα. Όμως τας α') $x^2 + 2ax = 3a^2$. β') $2a^2 x^2 + ax - 1 = 0$.

$$\gamma') \frac{2x^2}{3} + \frac{ax}{4} = 11a(x-3a). \quad \delta') \frac{3x^2}{4} + \frac{x}{2a} = \frac{3}{2a^2}.$$

$$\varepsilon') \frac{2a+x}{2a-x} + \frac{a-2x}{a+2x} = \frac{8}{3}. \quad \alpha') \frac{x+a}{\beta-a} + \frac{\beta-a}{x+a} = 2.$$

$$\zeta') \frac{1}{x+\beta+x} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{x}. \quad \eta') \lambda x^2 - 1 = \frac{x(\lambda^2 - \mu^2)}{\lambda \mu}.$$

$$\theta') \frac{x^2}{3\lambda-2x} - \frac{\lambda^2-4x^2}{4\alpha-6\lambda} = \frac{x}{2}. \quad \iota') \frac{x+3\beta}{8x^2-12x\beta} - \frac{3\beta}{9\beta^2-4x^2} - \frac{\alpha+3\beta}{(2\alpha+3\beta)(x-3\beta)} = 0.$$

Όμάδας τρίτην. 1) Εάν ο συντελεστής του x^2 της δοθείσης εξισώσεως είναι τέλειον τετράγωνον ἀκεραίου, προσθέτομεν εἰς τὰ μέλη της τὸ τετράγωνον τοῦ πηλίκου τοῦ συντελεστοῦ του x διὰ τοῦ διπλασίου τῆς τετραγωνικῆς ρίζας τοῦ συντελεστοῦ του x^2 .

Οὕτω διὰ τὴν εξισώσιν $4x^2 - 23x = -30$, προσθέτομεν τὸ

$$\left(\frac{23}{4}\right)^2 \text{ καὶ } \text{εγγραμμένη } 4x^2 - 23x + \left(\frac{23}{4}\right)^2 = \frac{529}{16} - 30 = \frac{49}{16}. \quad \text{Εξ οὗ}$$

$$\left(2x - \frac{23}{4}\right)^2 = \frac{49}{16}, \text{ καὶ } 2x - \frac{23}{4} = \frac{7}{4}, \quad 2x - \frac{23}{4} = -\frac{7}{4}, \text{ ἐκ τῶν}$$

$$\text{όποιών εὑρίσκομεν τὰς δύο ρίζας } x = 3 \frac{3}{4}, \text{ καὶ } x = 2.$$

2) Εάν ο συντελεστής του x^2 δὲν είναι τέλειον τετράγωνον, πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη τῆς εξισώσεως ἐπὶ κατάλληλον ἀριθμόν, ώστε ο συντελεστής του x^2 νὰ γίνῃ τέλειον τετράγωνον, καὶ ἀκολούθως προγωροῦμεν ὡς ἀνωτέρω. Εάν π. χ. ἔχωμεν τὴν εξισώσιν $-3x^2 + 5x = -2$ πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη ἐπὶ -3 , καὶ ἔχομεν $9x^2 - 15x = 6$, τὴν ὅποιαν λύομεν καὶ κατὰ τὰν ἀνωτέρω.

3) Ενίστε λύομεν εξισώσιν β' βαθμοῦ δι' ἀναλύσεως τοῦ τριωνύμου της εἰς γινόμενον δύο παραγόντων. "Εστω ἡ εξισώσις $x^2 + 7x - 60 = 0$. Επειδὴ τὸ $x^2 + 7x - 60 = (x+12)(x-5)$, (§ 47, θ'), ἡ δοθεῖσα εξισώσις γράφεται καὶ οὕτω $(x+12)(x-5) = 0$.

Ἐάν εἰς τῶν παραγόντων $x+12$ καὶ $x-5$ είναι ἴσος μὲ μηδέν, τὸ γινόμενον γίνεται μηδέν, καὶ ἡ εξισώσις ἐπαληθεύεται. Επομένως, ἂν θέσωμεν καθένα τούτων ἴσον μὲ μηδέν, 0^α ἔγωμεν $x+12 = 0$, $x-5 = 0$, ἐκ τῶν ὅποιών εὑρίσκομεν τὰς δύο ρίζας $x = -12$, $x = 5$.

4) Διὰ τῆς ἀνωτέρω μεθόδου δύναμεν ἐνίστητε νὰ εὔρωμεν τὰς ρίζας καὶ ἔξισώσεων ἀνωτέρου τοῦ δευτέρου βαθμοῦ. Π. γ. ἂν ἔχωμεν τὴν ἔξισώσαν $x^3 - x^2 - 6x = 0$, γράφομεν $x(x^2 - x - 6) = 0$, η $x(x-3)(x+2) = 0$. Αὕτη ἐπαλγθεύεται: ταῦτα εἰνε $x = 0$, $x = 3$, $x = -2$. "Ητοι αἱ ρίζαι τῆς δοθείσας εἰνε $0 \cdot 3 - 2$.

- 5) Νὰ λυθοῦν διὰ τῆς ἀνωτέρω μεθόδου καὶ νὰ ἐπαλγθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις
 α') $x^3 - 8 = 0$. β') $x^3 + 8 = 0$. γ') $x^4 - 16 = 0$. δ') $(3x^3 + 2x^2)(3x + 2) = 0$.
 ε') $x^3 + x^2 - 4(x+1) = 0$. στ') $x^3 - 27 - 13(x-3) = 0$.
 ζ') $x^2 - 4x - 5 = 0$. η') $5x^2 - 16x + 11 = 0$. θ') $(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) = 0$.
 ι') $(x-3)x(x-1)(\beta x-1) = 0$.

§ 103. Πεοὺς τοῦ εξδους τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$.

α') Εὰν πραστήσωμεν διὰ Q_1 , Q_2 τὰς ρίζας τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, θὰ ἔχωμεν κατὰ τάνωτέρῳ

$$Q_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}, \quad Q_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}$$

Εὰν τὸ $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ εἶνε θετικόν, αἱ ρίζαι εἶνε πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι. Διότι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ποσότητος θετικῆς δύναται νὰ εύρεθῇ ἀκριβῶς ἢ κατὰ προσέγγισιν καὶ εἶνε διπλῆ.

β') Εὰν τὸ $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ εἶνε τέλειον τετράγωνον, αἱ ρίζαι εἶνε σύμμετροι, ἄλλως ἀσύμμετροι.

γ') Εὰν τὸ $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ εἶνε ἵσον μὲ μηδέν, αἱ δύο ρίζαι εἶνε πραγματικαὶ καὶ ἵσαι μὲ $\frac{-\beta}{2\alpha}$

δ') Εὰν τὸ $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ εἶνε ἀρνητικόν, αἱ ρίζαι εἶνε φανταστικαὶ συζυγεῖς, ἐπειδὴ αἱ ρίζαι τοῦ ἀρνητικοῦ $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ εἶνε φανταστικαὶ συζυγεῖς, εἶνε δὲ αὗται αἱ

$$Q_1 = \frac{-\beta + i\sqrt{4\alpha\gamma - \beta^2}}{2\alpha}, \quad Q_2 = \frac{-\beta - i\sqrt{4\alpha\gamma - \beta^2}}{2\alpha}$$

ε') Έκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἔξῆς πίνακα

Εἶδος τῶν ριζῶν Q_1 , Q_2 τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$.

1) Εὰν εἶνε $\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$, αἱ Q_1 , Q_2 εἶνε πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι.

2) Εὰν εἶνε $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$, αἱ Q_1 , Q_2 εἶνε πραγματικαὶ καὶ ἵσαι μὲ $\frac{\beta}{2\alpha}$

3) Εὰν εἶνε $\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$, αἱ Q_1 , Q_2 εἶνε φανταστικαὶ συζυγεῖς.

"Εστω π. χ. ή ἔξισωσις $x^2 - 5x + 6 = 0$.
 Είνε, $\alpha = 1$, $\beta = -5$, $\gamma = 6$ $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 25 - 24 = 1$.
 Επομένως αἱ φίζαι της είνε πραγματικαὶ καὶ ἀνισοι.

"Εστω ή ἔξισωσις $3x^2 - 12x + 12 = 0$.
 Είνε $\alpha = 3$, $\beta = -12$, $\gamma = 12$, $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 144 - 144 = 0$.
 "Αρα αἱ φίζαι της είνε πραγματικαὶ καὶ ἴσαι.
 Διὰ τὴν ἔξισωσιν $2x^2 - 3x + 4 = 0$
 είνε $\alpha = 2$, $\beta = -3$, $\gamma = 4$, $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 9 - 32 = -23$.
 "Αρα αἱ φίζαι ταύτης είνε φανταστικαὶ συνγενεῖς.

'Α σ κ ή σ ε ι σ

"Ομάς πρώτη. Νὰ προσδιορισθῇ τὸ εἶδος τῶν φίζων τῶν κάτωθι: ἔξισώσεων γωρίς νὰ λυθοῦν.

$$\alpha') x^2 + 5x - 15 = 0. \quad \beta') x^2 - 5x + 15 = 0. \quad \gamma') x^2 + 3x + 9 = 0.$$

$$\delta') 6x^2 - x + 7 = 0. \quad \epsilon') 9x^2 + x - 33 = 0. \quad \sigma') 5x^2 + 8x + \frac{16}{5} = 0.$$

"Ομάς δευτέρα. 1) Νὰ εὑρεθῇ ή τιμὴ τοῦ μ, διὰ τὴν ὅποιαν ή ἔξισωσις $2\mu x^2 + (5\mu + 2)x + (4\mu + 1) = 0$ φίζει φίζεις. Είνε $\alpha = 2\mu$, $\beta = 5\mu + 2$, $\gamma = 4\mu + 1$. Διὰ νὰ είνε αἱ φίζαι ἴσαι, πρέπει νὰ φίζωμεν $(5\mu + 2)^2 - 8\mu(4\mu + 1) = 0$. Εάν αὐτὴν λύσωμεν ως πρὸς μ, εὑρέσχομεν $\mu = 2$ καὶ $\mu = -\frac{2}{7}$.

2) Όμοίως καὶ ἐπαληθεύσατε, τὰς ἔξισώσεις
 $\alpha') (\mu + 1)x^2 + (\mu - 1)x + \mu + 1 = 0. \quad \beta') (2\mu - 3)x^2 + \mu x + \mu - 1 = 0.$
 $\gamma') 2\mu x^2 + 3\mu x - 6 = 3x - 2\mu - x^2. \quad \delta') \mu x^2 + 9x - 10 = 3\mu x - 2x^2 + 2\mu.$

§ 106. Σχέσεις μεταξὺ συντελεστῶν καὶ ρεζῶν τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$.

α') Εκ τοῦ τέπου τῶν φίζων τῆς ἀνωτέρω ἔξισώσεως ἔχομεν
 $\varrho_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}, \quad \varrho_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \quad (1)$

Ἐὰν τὰς ίσότητας αὐτὰς προσθέσωμεν κατὰ μέλη, εύρισκομεν

$$\varrho_1 + \varrho_2 = \frac{-2\beta}{2\alpha} = -\frac{\beta}{\alpha}.$$

β') Εάν τὰς ίσότητας (1) πολλαπλασιάσωμεν κατὰ μέλη, ἔχομεν
 $\varrho_1 \cdot \varrho_2 = \frac{(-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma})(-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma})}{4\alpha^2}$

Εἰς τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἄθροισμα ἐπὶ τὴν διαφορὰν τῶν $(-\beta)$ καὶ $\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}$.

Τὸ γινόμενον αὐτὸ εἶνε ἵσον μὲ τὴν διαφορὰν τῶν τετραγώνων τῶν ἀριθμῶν, δηλαδὴ μὲ

$$\beta^2 - (\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma})^2 = \beta^2 - (\beta^2 - 4\alpha\gamma) = 4\alpha\gamma.$$

$$\text{Ἐπομένως } \text{ἔχομεν} \quad \varrho_1 \cdot \varrho_2 = \frac{4\alpha\gamma}{4\alpha^2} = \frac{\gamma}{\alpha}.$$

γ') Εὰν τὰς ἴσοτητας (1) ἀφαιρέσωμεν κατὰ μέλη, θὰ ἔχωμεν

$$\varrho_1 - \varrho_2 = \frac{\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{\alpha}$$

δ') Εκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἔξῆς πίνακα

$\text{Ἀν } \varrho_1, \varrho_2 \text{ εἶνε αἱ } \varrho\text{ίαι τῆς ἔξισώσεως } \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0,$ $\text{θὰ εἶνε } 1) \varrho_1 + \varrho_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, \quad 2) \varrho_1 \cdot \varrho_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$
--

$$3) \quad \varrho_1 - \varrho_2 = \frac{\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{\alpha}$$

ε') Ἀν ζητῆται νὰ εῦρωμεν τὸ ἄθροισμα $(\varrho_1^2 + \varrho_2^2)$ τῶν τετραγώνων τῶν ριζῶν τῆς ἀνωτέρω ἔξισώσεως, δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν ὡς ἔξῆς.

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ ϱ_1 καὶ ϱ_2 εἶνε $\varrho\text{ίαι αὐτῆς}$, θὰ εἶνε $\alpha\varrho_1^2 + \beta\varrho_1 + \gamma = 0, \quad \alpha\varrho_2^2 + \beta\varrho_2 + \gamma = 0.$ (2)

Εὰν ταύτας προσθέσωμεν κατὰ μέλη εὐρίσκομεν

$$\alpha(\varrho_1^2 + \varrho_2^2) + \beta(\varrho_1 + \varrho_2) + 2\gamma = 0, \quad \text{ἐκ τῆς ὅποιας εὐρίσκομεν} \\ \varrho_1^2 + \varrho_2^2 = -\frac{\beta(\varrho_1 + \varrho_2) + 2\gamma}{\alpha}. \quad \text{Ἀν ἀντὶ τοῦ } \varrho_1 + \varrho_2 \text{ θέσωμεν} \\ \text{τὸ } \tilde{\varrho} \text{ τοῦ } \frac{-\beta}{\alpha}, \text{ εὐρίσκομεν } \varrho_1^2 + \varrho_2^2 = \frac{\beta^2 - 2\alpha\gamma}{\alpha^2}.$$

στ') Εὰν θέλωμεν νὰ εῦρωμεν τὸ $(\varrho_1^3 + \varrho_2^3)$ πολλαπλασιάζομεν τὰς (2) ἐπὶ ϱ_1 καὶ ϱ_2 ἀντιστοίχως, προσθέτομεν τὰ ἔξαγόμενα κατὰ μέλη, καὶ ἀκολούθως λύομεν τὴν προκύπτουσαν ἴσοτητα ὡς πρὸς $\varrho_1^3 + \varrho_2^3$, ἀφοῦ ἀντικαταστήσωμεν τὸ $\varrho_1^2 + \varrho_2^2$ καὶ τὸ $\varrho_1 + \varrho_2$ διὰ τῶν ἵσων των, τὰ δόποια εὐρήκαμεν ἀνωτέρω.

A σκήσεις.

1) Εύρετε τὸ ἄθροισμα, τὸ γινόμενον, τὴν διαφοράν, τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων, καὶ τῶν κύβων, τῶν ριζῶν τῆς $x^2 + px + q = 0$, χωρὶς νὰ λυθῇ αὐτη.

2) Προσδιορίσατε τὸν λ , ὥστε τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $x^2 + (\lambda - 2)x - (\lambda + 3) = 0$ νὰ εἴναι ίσον μὲν δοθέντα ἀριθμὸν μ .

$$\lambda = 1 \pm \sqrt{\mu - 9}.$$

3) Ποία σχέσεις πρέπει νὰ ὑπάρχῃ μεταξὺ τῶν β καὶ γ , ἵνα αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ἔχουν λόγον λ ;

$$\frac{\beta^2}{\gamma} = \frac{(\lambda + 1)^2}{\lambda}.$$

4) Εύρετε σχέσιν μεταξὺ τῶν α , β , γ , ἵνα αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ εἴναι ἀνάλογοι τῶν μ καὶ ν .

$$\frac{(\mu + \nu)^2}{\mu \cdot \nu} = \frac{\beta^2}{\alpha \gamma}.$$

5) Προσδιορίσατε τὰ β , γ , ὥστε ἡ διαφορὰ τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $x^2 + \beta x + \gamma = 0$, νὰ εἴναι 4, τῶν δὲ κύβων τῶν 208, $\beta = \pm 8$, $\gamma = 12$.

6) Προσδιορίσατε τὸ ν , ὥστε αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $(\alpha - \beta)^2 x^2 + 2(\alpha^2 - \beta)x + \nu = 0$ εἴναι ἴσαι (ἀντίστροφοι).

$$(\alpha \pm \beta)^2.$$

7) Ποίαν τιμὴν πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ γ , ὥστε αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $3x^2 - 10x + \gamma = 0$ εἴναι φανταστικαί;

$$\gamma > \frac{25}{3}.$$

8) Προσδιορίσατε τὸ γ εἰς τρόπον, ὥστε αἱ ρίζαι ρ_1 καὶ ρ_2 τῆς ἔξισώσεως $x^2 - 8x + \gamma = 0$ νὰ πληροῦν τὰς ἔξιστις σχέσεις

$$\alpha') \rho_1 = \rho_2, \quad \beta') \rho_1 = 3\rho_2, \quad \gamma') \rho_1 \rho_2 = \pm 1, \quad \delta') 3\rho_1 = 4\rho_2 + 3.$$

$$\epsilon') \rho_1^2 + \rho_2^2 = 40, \quad 16 \cdot 12 \cdot \pm 1 \cdot 15 \cdot 12.$$

§ 107. Πώς εύρεσκομεν δύο ἀριθμούς, ὅταν γνωρίζωμεν τὸ ἄθροισμα καὶ τὸ γινόμενον αὐτῶν.—

"Εστω β τὸ ἄθροισμα καὶ γ τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν. Ζητεῖται νὰ εῦρωμεν τοὺς ἀριθμοὺς τούτους.

"Αν καλέσωμεν ϱ_1 , ϱ_2 τοὺς ἀριθμοὺς θὰ ἔχωμεν $\varrho_1 + \varrho_2 = \beta$, $\varrho_1 \cdot \varrho_2 = \gamma$. Επομένως τὰ ϱ_1 , ϱ_2 εἴναι αἱ ρίζαι μιᾶς ἔξισώσεως δευτέρου βαθμοῦ, τῆς δποίας ὁ συντελεστής τοῦ x^2 εἴναι ἡ μονάς, τοῦ x τὸ — β , δὲ σταθερὸς ὁρος εἴναι τὸ γ . Δηλαδὴ τῆς ἔξισώσεως

$$x^2 - \beta x + \gamma = 0.$$

Λύοντες τὴν ἔξισωσιν ταύτην εύρεσκομεν τοὺς ζητούμενους ἀριθμούς.

"**Ασκήσεις.** Νὰ εύρεθούν δύο ἀριθμοί, οἱ ὁποίοις ἔχουν ἄθροισμα 18· 14· 5 — 10· 5, γινόμενον δὲ 45· 49 — 12· 22· 6 ἀντίστοιχως.

§ 108. Τροπὴ διπλῶν τεινῶν ριζικῶν εἰς ἀπλᾶ.

Δοθείσης παραστάσεως τῆς μορφῆς $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$

ἔχούσης διπλοῦν ριζικόν, δυνάμεθα γὰ τρέψωμεν αὐτὴν εἰς ἀλλην,
ἔχουσαν ἀπλᾶ ριζικά, δταν τὸ $A^2 - B$ εἶνε τέλειον τετράγωνον.

Ἐάν ταῦτο συμβαίνῃ καὶ θέσωμεν $A^2 - B = \Gamma^2$

$$\text{θὰ δεῖξωμεν ὅτι εἶνε } \sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A+\Gamma}{2}} \pm \sqrt{\frac{A-\Gamma}{2}}.$$

$$\text{Διότι, ἀν θέσωμεν } \sqrt{A + \sqrt{B}} = \sqrt{\psi} + \sqrt{\omega}$$

$$\text{καὶ } \sqrt{A - \sqrt{B}} = \sqrt{\psi} - \sqrt{\omega}$$

θὰ ἔχωμεν, ὑψοῦντες τὰ ἵσα εἰς τὸ τετράγωνον

$$\begin{aligned} A + \sqrt{B} &= \psi + \omega + 2\sqrt{\psi\omega} \\ A - \sqrt{B} &= \psi + \omega - 2\sqrt{\psi\omega}. \end{aligned}$$

Προσθέτοντες τὰς ἴσοτητας ταύτας κατὰ μέλη, εὑρίσκομεν

$$A = \psi + \omega,$$

$$\text{ἀφαιροῦντες δὲ αὐτὰς } 2\sqrt{B} = 4\sqrt{\psi\omega}, \sqrt{\frac{B}{2}} = \sqrt{\psi\omega}.$$

Ἐκ ταύτης ἔχομεν ὑψοῦντες τὰ ἵσα εἰς τὸ τετράγωνον

$$\frac{B}{4} = \psi\omega$$

$$\text{Οὕτω εὑρήκαμεν } \psi + \omega = A, \text{ καὶ } \psi\omega = \frac{B}{4}.$$

Γνωρίζομεν τὸ ἄθροισμα A , καὶ τὸ γινόμενον $\frac{B}{4}$ τῶν ζητουμένων ἀριθμῶν ψ καὶ ω . Ἀρα οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ εἶνε ρίζαι τῆς ἔξισθωσεως $x^2 - Ax + \frac{B}{4} = 0$.

$$\text{Αἱ ρίζαι ταύτης εἶνε αἱ } \frac{A + \sqrt{A^2 - B}}{2}, \quad \frac{A - \sqrt{A^2 - B}}{2}.$$

$$\text{Ἔτοι, ἔχομεν } y = \frac{A + \Gamma}{2}, \quad \omega = \frac{A - \Gamma}{2} \quad (\text{ἐπειδὴ } \text{ὑποτίθεται } A^2 - B = \Gamma^2, \text{ καὶ } \sqrt{A^2 - B} = \Gamma).$$

$$\text{Επομένως είνε } \sqrt{A + V B} = V \sqrt{\gamma} + V \sqrt{\omega} = \sqrt{\frac{A + \Gamma}{2}} + \sqrt{\frac{A - \Gamma}{2}}$$

$$\sqrt{A - V B} = V \sqrt{\gamma} - V \sqrt{\omega} = \sqrt{\frac{A + \Gamma}{2}} - \sqrt{\frac{A - \Gamma}{2}}$$

$$\text{Ητοι } \sqrt{A \pm V B} = \sqrt{\frac{A + \Gamma}{2}} \pm \sqrt{\frac{A - \Gamma}{2}}, \text{ ἀν είνε } \Gamma = V A^2 - B.$$

$$\text{Εστω π. χ. τὸ } \sqrt{2 + V 3}.$$

$$\text{Έχομεν } A = 2, B = 3, A^2 - B = 4 - 3 = 1, \Gamma = 1.$$

$$\text{Επομένως } \sqrt{2 + V 3} = \sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (V 6 + V 2).$$

Ασκήσεις. Τρέψατε τὰς επομένας παραστάσεις εἰς ἄλλας ἵσας των, ἔχοντας ἀπλᾶ ριζικά.

$$\alpha') \sqrt{5 + 5 V 24} \cdot \beta') \sqrt{7 + 4 V 3} \cdot \gamma') \sqrt{8 + 4 V 3}.$$

$$\delta) \sqrt{\alpha^2 + \beta + 2 \alpha V \beta} \cdot \varepsilon') \sqrt{2 \alpha + 2 V \alpha^2 - \beta^2}.$$

$$\alpha\tau') \sqrt{\frac{\alpha^2}{4} + \frac{\gamma}{2} V \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{4}} \cdot \zeta') \sqrt{x + xy - 2x V \frac{y}{x}}$$

§ 109. Ηερὶ τοῦ σημείου τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως

$$a x^2 + \beta x + \gamma = 0.$$

Δοθείσης τῆς ἔξισώσεως $a x^2 + \beta x + \gamma = 0$, δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν, ποῖον είνε τὸ σημεῖον καθεμιᾶς τῶν ριζῶν τῆς ἀν είνε πραγματικά, χωρὶς νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ είνε $\varrho_1, \varrho_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$, καὶ $\varrho_1 + \varrho_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$ ἐπεται ὅτι ἔχομεν τὸν ἔξης πίνακα

$$\text{Σημεῖα τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως } a x^2 + \beta x + \gamma = 0.$$

1) "Αν είνε $\frac{\gamma}{\alpha} > 0$, αἱ ρίζαι είνε διμόσημοι· θετικαὶ μέν, ἀν είνε καὶ $-\frac{\beta}{\alpha} > 0$, ἀρνητικαὶ δέ, ἀν είνε καὶ $-\frac{\beta}{\alpha} < 0$.

2) "Αν είνε $\frac{\gamma}{\alpha} < 0$, αἱ ρίζαι είνε ἑτερόσημοι· ἀπολύτως μεγαλυτέρα ἡ θετικὴ μέν, ἀν είνε καὶ $-\frac{\beta}{\alpha} > 0$, ἡ ἀρνητικὴ δὲ, ἀν είνε καὶ $-\frac{\beta}{\alpha} < 0$.

3) "Αν είνε $\frac{\gamma}{\alpha} = 0$, ἡ μία ρίζα είνε ἵση μὲ μηδὲν, ἡ δὲ ἄλλη μὲ $-\frac{\beta}{\alpha}$.

"Εστω π. χ. ή $\hat{\epsilon}\xi\acute{\iota}\sigma\omega\sigma\varsigma$ $x^2 + 8x + 12 = 0$. "Έχομεν $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 64 - 48 = \theta\vartheta\tau$. "Αρα ϱ_1, ϱ_2 είναι διμόσιμοι τό $\varrho_1 + \varrho_2 = -8$, $\hat{\epsilon}\pi\mu\mu\acute{e}n\omega\varsigma$ καὶ αἱ δύο $\varrho\acute{\iota}\varsigma\alpha\iota$ είναι δρονητικαί.

Ασκήσεις. Εὑρέτε τό σημείον τῶν ριζῶν τῶν κάτωθι $\hat{\epsilon}\xi\acute{\iota}\sigma\omega\sigma\varsigma$, γιαρίς νὰ λυθοῦν καντα.

$$\alpha') x^2 - 8x + 12 = 0. \quad \beta') 5x^2 - 15x - 50 = 0. \quad \gamma') 7x^2 - 14x - 7 = 0.$$

$$\delta') 3x^2 - 6x - 12 = 0. \quad \varepsilon') 3x^2 + 12x + 4 = 0. \quad \sigma\tau') 5x^2 - 15x - 1 = 0.$$

§ 110. Τροπὴ τοῦ τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ εἰς γενόμενον παραγόντων.—

$\alpha')$ "Εστω ὅτι δίδεται τό τριωνυμον $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$.

Ζητεῖται νὰ τραπῇ εἰς γινόμενον παραγόντων. "Άς ὑποτεθῇ ὅτι ἐλύθη ή $\hat{\epsilon}\xi\acute{\iota}\sigma\omega\sigma\varsigma$

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0.$$

"Εστωσαν ϱ_1, ϱ_2 αἱ $\varrho\acute{\iota}\varsigma\alpha\iota$ τῆς, αἱ δποῖαι λέγονται καὶ $\varrho\acute{\iota}\varsigma\alpha\iota$ τοῦ δοθέντος τριωνύμου. Γνωρίζομεν ὅτι θὰ είναι

$$\varrho_1 + \varrho_2 = -\frac{\beta}{\alpha} \quad (1), \quad \varrho_1 \cdot \varrho_2 = \frac{\gamma}{\alpha} \quad (2)$$

"Υποθέτοντες ὅτι τό α είναι διάφορον τοῦ μηδενός, γράφομεν

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha \left(x^2 + \frac{\beta}{\alpha} x + \frac{\gamma}{\alpha} \right).$$

"Αντικαθιστῶντες ἀντὶ τοῦ $\frac{\beta}{\alpha}$ τὸ ἵσον του $-(\varrho_1 + \varrho_2)$ ἐκ τῆς (1),

$$\begin{aligned} \text{τὸ } \delta \varepsilon \frac{\gamma}{\alpha} \text{ διὰ τοῦ } \varrho_1, \varrho_2 \text{ ἐκ τῆς (2), εὑρίσκομεν } \delta \varepsilon \alpha x^2 + \beta x + \gamma \\ = \alpha [x^2 - (\varrho_1 + \varrho_2) \cdot x + \varrho_1 \cdot \varrho_2] = \alpha [x^2 - \varrho_1 \cdot x - \varrho_2 \cdot x + \varrho_1 \cdot \varrho_2] \\ \eta = \alpha [(x - \varrho_1) \cdot x - \varrho_2 \cdot (x - \varrho_1)] = \alpha (x - \varrho_1) \cdot (x - \varrho_2). \end{aligned}$$

$$\text{"Ητοι } \alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha (x - \varrho_1) \cdot (x - \varrho_2).$$

6) Διακρίνομεν ἥδη τὰς $\hat{\epsilon}\xi\acute{\iota}\sigma\omega\sigma\varsigma$ τρεῖς περιπτώσεις

1) "Αν είναι ϱ_1, ϱ_2 πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ, θὰ $\hat{\epsilon}\chi\omega\mu\mu\acute{e}$ ν $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha (x - \varrho_1) (x - \varrho_2)$.

2) "Αν είναι $\varrho_1 = \varrho_2$, θὰ $\hat{\epsilon}\chi\omega\mu\mu\acute{e}$ ν $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha (x - \varrho_1)^2$.

3) "Αν είναι $\varrho_1 = \gamma + \delta i, \varrho_2 = \gamma - \delta i$ (φανταστικαὶ συγγενεῖς), θὰ $\hat{\epsilon}\chi\omega\mu\mu\acute{e}$ ν $(x - \varrho_1) = (x - \gamma) - \delta i, x - \varrho_2 = (x - \gamma) + \delta i$

$$(x - \varrho_1) (x - \varrho_2) = [(x - \gamma) - \delta i] [(x - \gamma) + \delta i] = (x - \gamma)^2 + \delta^2.$$

"Αρα $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha [(x - \gamma)^2 + \delta^2]$.

γ') "Ητοι «τὸ τριώνυμον $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ τρέπεται εἰς γινόμενον τοῦ α ἐπὶ δύο πρωτοβαθμίους παράγοντας, ὡς πρὸς x , ἀν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ εἶνε πραγματικὰ καὶ ἀνισοὶ εἰς γινόμενον δὲ τοῦ α ἐπὶ ἐν τέλειον τετράγωνον, ἢ ἐπὶ τὸ ἄθροισμα δύο τετραγώνων, ἀν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως εἶνε ἵσαι, ἢ φανταστικά».

Π. χ. διὰ τὸ $2x^2 - 3x - 2$, τοῦ ὅποίου αἱ ρίζαι εἶνε $+2, -\frac{1}{2}$
ἔχομεν $2x - 3x - 2 = 2(x-2) \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right)$.

Διὰ τὸ $2x^2 - 12x + 18$, τοῦ ὅποίου αἱ ρίζαι εἶνε ἵσαι μὲ 3,
ἔχομεν $2x^2 - 12x + 18 = 2(x-3)^2$.

§ III. Πώς εὑρέσκομεν τριώνυμον β' βαθμοῦ ἐκ τῶν ριζῶν του.

"Οταν δοθοῦν αἱ ρίζαι ϱ_1, ϱ_2 ἐνὸς τριώνυμου β' βαθμοῦ ὡς πρὸς x , τοῦτο θὰ ίσοῦται μὲ $(x-\varrho_1)(x-\varrho_2) = x^2 - (\varrho_1 + \varrho_2)x + \varrho_1 \cdot \varrho_2$, πολλαπλασιασμένον τὸ πολὺ ἐπὶ παράγοντά τινα σταθερόν.

"Ητοι δυνάμεθα νὰ εὑρῷμεν τὸ τριώνυμον τοῦτο (παραλειπομένου τοῦ σταθεροῦ παράγοντος) ἐκ τῶν ριζῶν του.

Π. χ. τὸ τριώνυμον, τὸ ἔχον ρίζας τὰς 3 καὶ $\frac{1}{2}$ θὰ εἶνε ἵσον μὲ $(x-3) \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) = (x-3) \cdot \left(\frac{2x-1}{2}\right) = \frac{2x^2 - 7x + 3}{2}$, τὰ δὲ 3 καὶ $\frac{1}{2}$ θὰ εἶνε ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

*Α σκήσεις

'Ομᾶς πρώτη. 1) Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα τὰ τριώνυμα

α') $x^2 - 9x + 18$. β') $x^2 + 4x + 3$. γ') $2x^2 + 3x - 2$.

δ') $2x^2 + 12x + 18$. ε') $x^2 - 4x - 5$. στ') $x^2 - 5x + 6$.

2) Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ κάτωθι κλάσματα

α') $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 7x + 10} \cdot \beta') \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 4x - 5} \cdot \gamma') \frac{x^2 + 10x + 21}{2x^2 + 12x + 18}$

δ') $\frac{2x^2 - 2x - 12}{x^2 + x - 12} \cdot \varepsilon') \frac{x^2 - 6x + 5}{3x^2 + 6x - 9} \cdot \sigma\tau') \frac{x^2 - 9x + 18}{2x^2 - 12x + 18}$

'Ομᾶς δευτέρα. Εὕρετε ἔξισωσιν β' βαθμοῦ μὲ συντελεστὰς ἀκεραίους, ἔχουσαν ρίζας

α') $3, \frac{1}{2} \cdot \beta') 3 + \sqrt{-2}$ καὶ $3 - \sqrt{-2}$. γ') $4 + \frac{2}{\sqrt{-5}}$ καὶ $4 - \frac{2}{\sqrt{-5}}$.

δ') $\alpha + \beta, \alpha - \beta$. ε') $\alpha + \sqrt{\beta}, \alpha - \sqrt{\beta}$, στ') $\alpha + i\sqrt{\beta}, \alpha - i\sqrt{\beta}$.

ζ') $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha + \beta}$. η') $2\alpha + \beta, 2\alpha - \beta$. θ') $\alpha + \sqrt{\alpha}, \alpha - \sqrt{\alpha}$.

§ 112. Σημεζον τοῦ τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$, διὰ τὰς πραγματικάς τιμὰς τοῦ x .

α') "Εστω τὸ τριώνυμον $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$, καὶ ὅτι τὸ x λαμβάνει πραγματικάς τιμάς.

"Αν αἱ φίλα τους q_1, q_2 εἶνε πραγματικαὶ καὶ ἀνισοί, (ἔστω δὲ ὅτι εἶνε καὶ $q_1 < q_2$) θὰ ἔχωμεν $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - q_1)(x - q_2)$.

β') "Ας ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ x εἶνε μικρότερον τοῦ q_1 , καὶ ἐπομένως καὶ τοῦ q_2 . Τότε τὸ $(x - q_1)$ καὶ τὸ $(x - q_2)$ εἶνε ἀρνητικά. Τὸ $(x - q_1), (x - q_2)$ ὡς γινόμενον ἀρνητικῶν παραγόντων εἶνε θετικόν, τὸ δὲ $\alpha (x - q_1)(x - q_2)$ θὰ ἔχῃ τὸ σημεῖον τοῦ a .

γ') "Ας ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ x εἶνε μεγαλύτερον τοῦ q_2 , ἐπομένως καὶ τοῦ q_1 . Τότε τὸ $(x - q_1)$, καὶ $(x - q_2)$ εἶνε θετικά, ἐπίσης τὸ $(x - q_1)(x - q_2)$ εἶνε θετικόν τὸ δὲ $\alpha (x - q_1)(x - q_2)$ θὰ ἔχῃ τὸ σημεῖον τοῦ a .

δ') "Ας ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ x εἶνε μεγαλύτερον τοῦ q_1 , ἀλλὰ μικρότερον τοῦ q_2 . Δηλαδή, ἔστω ὅτι κεῖται μεταξὺ τῶν φίλων. Τότε τὸ $(x - q_1)$ εἶνε θετικόν, τὸ δὲ $(x - q_2)$ ἀρνητικόν τὸ $(x - q_1)(x - q_2)$ εἶνε ἀρνητικόν, ὡς γινόμενον δύο ἑτεροσήμων παραγόντων ἄρα τὸ $\alpha (x - q_1)(x - q_2)$ ἔχει σημεῖον ἀντίθετον τοῦ a .

ε') "Αν αἱ φίλα q_1, q_2 εἶνε ἵσαι ἢ φανταστικαί, διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x κειμένην ἐκτὸς τῶν φίλων, τὸ τριώνυμον ἔχει τὸ σημεῖον τοῦ a .

Διότι ἂν εἶνε $q_1 = q_2$, τὸ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - q_1)^2$.

"Ητοι ἔχει τὸ σημεῖον τοῦ a .

"Αν δὲ αἱ φίλα εἶνε φανταστικαὶ τὸ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ τρέπεται εἰς γινόμενον τοῦ a ἐπὶ τὸ ἀθροισμα δύο τετραγώνων, ἐπομένως ἔχει τὸ σημεῖον τοῦ a .

στ') 'Εκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι

«ὅταν τὸ x ἔχῃ τιμὴν πραγματικὴν, κειμένην ἐκτὸς τῶν φίλων τοῦ τριώνυμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$, τὸ τριώνυμον ἔχει τὸ σημεῖον τοῦ a , ἐνῷ διὰ τιμὴν τοῦ x , κειμένην μεταξὺ τῶν φίλων ἔχει σημεῖον ἀντίθετον τοῦ a ».

Άσκησεις.

'Ομάς πρώτη. Διὰ ποίας τιμὰς τοῦ x τὰ κάτωθι τριώνυμα θὰ ἔχουν τιμὰς θετικάς; ἀρνητικάς; μηδέν;

$$\alpha') 2x^2 - 16x + 24. \quad \beta') -2x^2 + 16x - 24. \quad \gamma') 2x^2 - 16x + 32.$$

$$\delta') -2x^2 + 16x - 32. \quad \epsilon') 2x^2 - 16x + 40. \quad \sigma\tau') -2x^2 + 16x - 40.$$

Όμαδας δευτέρα. 1) Δοθέντος άριθμου πραγματικού λ , νὰ εύρωμεν τὴν θέσιν του ὡς πρὸς καθεμίαν τῶν (πραγματικῶν) ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, χωρὶς νὰ λυθῇ αὐτῇ.

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἂν διὰ $x = \lambda$, τὸ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ἔγη τὸ σημεῖον τοῦ α , τὸ λ κεῖται ἐκτός τῶν ριζῶν ρ_1, ρ_2 . Μένει νὰ εύρωμεν, ἂν εἶνε μικρότερον τῆς μικροτέρας ρ_1 , ἢ μεγαλύτερον τῆς μεγαλυτέρας ρ_2 . "Αν εἶνε $\lambda < \rho_1$, θὰ εἴνε

$$\lambda < \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}, \quad \text{ἢ } \lambda < -\frac{\beta}{2\alpha}.$$

"Αν εἶνε $\lambda > \rho_2$, θὰ εἴνε καὶ $\lambda > \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$, ἢ : $> -\frac{\beta}{2\alpha}$. Αντιστρόφως, ἀποδείξατε διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς ὅτι ἂν εἶνε $\lambda < -\frac{\beta}{2\alpha}$, τότε εἴνε $\lambda < \rho_1$, καὶ ἂν εἶνε $\lambda > -\frac{\beta}{2\alpha}$ θὰ εἴνε καὶ $\lambda > \rho_2$. Εξ τούτων ὅρᾶται: ἡ θέσις τοῦ λ ὡς πρὸς τὰς ρίζας, καθ' ὅσον εἴνε $\lambda > -\frac{\beta}{2\alpha}$.

2) Τις ἡ θέσις τῶν 1, $\frac{3}{4}$, 5·—1 ὡς πρὸς τὰς ρίζας τῶν ἔξισώσεων

$$\alpha') x^2 + 3x - 2 = 0. \quad \beta') 2x^2 + 7x - 1 = 0. \quad \gamma) x^2 - 4x + 3 = 0.$$

3) Εὔρεσις τῶν πραγματικῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ κατὰ προσέγγισιν. 'Εὰν διὰ $x = \lambda_1, \lambda_2$ (λ_1, λ_2 εἶνε ἀριθμοὶ πραγματικοί) τὸ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ λαμβάνῃ τιμὰς ἑτεροσήμους, μεταξὺ τῶν λ_1, λ_2 περιέχεται μία τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως (ἔχουσας ρίζας πραγματικὰς καὶ ἀνίσους).

Διότι τὸ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - \rho_1)(x - \rho_2)$, ἂν ρ_1 καὶ ρ_2 αἱ ρίζαι του.

Διὰ: $x = \lambda_1$ γίνεται: $\alpha(\lambda_1 - \rho_1)(\lambda_1 - \rho_2)$.

Διὰ: $x = \lambda_2$ γίνεται: $\alpha(\lambda_2 - \rho_1)(\lambda_2 - \rho_2)$. "Αν λοιπὸν τὰ ἔξαγόμενα

αὐτὰ εἴνε ἑτερόσημα, τὸ πηλίκον των $\frac{(\lambda_1 - \rho_1)(\lambda_1 - \rho_2)}{(\lambda_2 - \rho_1)(\lambda_2 - \rho_2)}$ εἴνε ἀρνητικόν. "Αν ὁ παράγων $\frac{\lambda_1 - \rho_1}{\lambda_2 - \rho_1}$ εἴνε < 0 , ἔστω $\lambda_1 - \rho_1 > 0, \lambda_2 - \rho_1 < 0$, τότε $\lambda_1 > \rho_1, \lambda_2 < \rho_2$. Δηλαδὴ $\lambda_1 > \rho_1 > \lambda_2$. "Ητοι ἡ ρίζα ρ_1 περιέχεται μεταξὺ τῶν λ_1 καὶ λ_2 .

'Επὶ τῆς ιδιότητος αὐτῆς στηριζόμενοι, ἐργάζόμεθα ὡς ἔξῆς διὰ νὰ εύρωμεν τὰς (πραγματικὰς) ρίζας ἔξισώσεως κατὰ προσέγγισιν. "Εστω ἡ ἔξισωσις $8x^2 - 2x - 3 = 0$. Θέτομεν ἀντὶ τοῦ x δύο ἀριθμοὺς, ὥστε τὰ ἔξαγόμενα τὰ ὄποια θὰ εύρωμεν ἐκ τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ x εἰς τὸ $8x^2 - 2x - 3$ νὰ εἴνε ἑτερόσημα.

Διὰ $x = 0$ εύρισκομεν -3 , διὰ $x = 1$ ἔχομεν $+2$ ἐπομένως μεταξὺ 0 καὶ 1 περιέχεται μία ρίζα τῆς ἔξισώσεως. Λαμβάνομεν τώρα τὴν μέσην τιμὴν μεταξὺ 0 καὶ 1 . Δηλαδὴ θέτομεν $x = 0,5$. Ωτε εύρισκομεν $2 - 4 = -2$, ἐπομένως ἡ ρίζα περιέχεται μεταξὺ τοῦ $0,5$ καὶ τοῦ 1 .

"Η μέση τιμὴ μεταξὺ τοῦ $0,5$ καὶ 1 εἴνε $0,75$. Θέτομεν λοιπὸν $x = 0,75$ καὶ εύρισκομεν ἔξαγόμενον 0 . "Αρα $0,75$ εἴνε ρίζα τῆς ἔξισώσεως. Διὰ $x = -1$ ἔχομεν $8 + 2 - 3 = 7$. "Αρα ἡ ἄλλη ρίζα περιέχεται μεταξὺ 0 καὶ -1 . Προσεγγίσατε περισσότερον, ἢ εὕρετε αὐτήν.

§ 113. Λύσις ἀνισότητος δευτέρου βαθμοῦ.—

α') Καλοῦμεν ἀνισότητα β' βαθμοῦ τὴν ἀνισότητα, ἢτις ἔχει τὸν ἄγνωστόν της εἰς β' βαθμόν.

Πᾶσα ἀνισότης τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς ἕνα ἄγνωστον, τὸν δῆμον ὑποτίθεται ὅτι ἔχει, εἶναι ἐν γένει τῆς μορφῆς

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma > 0, \quad \text{ἢ} \quad \alpha x^2 + \beta x + \gamma < 0,$$

μετὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρανομαστῶν καὶ τὴν ἀναγωγὴν τῶν δῆμοίων δρων. Ἡ δευτέρα μορφὴ ἀνάγεται εἰς τὴν πρώτην, ἢν ἀλλάξωμεν τὰ σημεῖα πάντων τῶν δρων, ὅτε καὶ ἡ ἀνισότης ἀλλάσσει διεύθυνσιν. Ὡστε πᾶσα ἀνισότης τοῦ δευτέρου βαθμοῦ θὰ εἶναι τῆς μορφῆς

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma > 0,$$

ὅπου τὸ α δύναται νὰ εἶναι θετικὸν, ἢ ἀρνητικόν.

β') Λύσις τῆς ἀνισότητος $\alpha x^2 + \beta x + \gamma > 0$ λέγεται ἡ εὑρεσις τῶν τιμῶν τοῦ x, διὰ τὰς δῆμοις τὸ α x² + β x + γ εἶναι θετικόν. Πρὸς εὑρεσιν τῶν τιμῶν τούτων, τὰς δῆμοις θὰ καλοῦμεν ρίζας τῆς ἀνισότητος, παρατηροῦμεν ὅτι ἢν q_1, q_2 εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοί ($q_1 < q_2$) φίζαι τοῦ τριωνύμου, θὰ εἶναι $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - q_1)(x - q_2)$. Θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὰς τιμὰς τοῦ x, διὰ τὰς δῆμοις τὸ α (x - q₁). (x - q₂) εἶναι θετικόν.

γ') "Αν τὸ α εἶναι θετικόν, τὸ ἀνωτέρω γινόμενον γίνεται θετικὸν διὰ $x < q_1$, καὶ $x > q_2$. "Ωστε, ἢν εἶναι τὸ α > 0, φίζαι τῆς ἀνισότητος εἶναι πάντες οἱ ἀριθμοί, οἱ μικρότεροι τῆς μικροτέρας φίζης q_1 , καὶ οἱ μεγαλύτεροι τῆς μεγαλυτέρας q_2 .

δ') "Αν εἶναι α < 0, τότε διὰ τὰς τιμὰς τοῦ x, αἱ δῆμοι περιέχονται μεταξὺ τῶν q_1 καὶ q_2 τὸ γινόμενον α (x - q₁) (x - q₂) ἔχει σημεῖον ἀντίθετον τοῦ α, δηλαδὴ θετικόν. Ἐπομένως, ἢν εἶναι α < 0, αἱ φίζαι τῆς ἀνισότητος εἶναι πάντες οἱ ἀριθμοί, οἱ δῆμοι περιέχονται μεταξὺ τῶν q_1 καὶ q_2 .

ε') "Αν αἱ φίζαι q_1, q_2 εἶναι ἵσαι, καὶ εἶναι τὸ α > 0, τότε διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x διάφορον τῆς φίζης, τὸ γινόμενον α (x - q₁)² εἶναι θετικόν. Δηλαδὴ τότε πάντες οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι φίζαι τῆς ἀνισότητος. "Αν εἶναι τὸ α < 0, ἡ ἀνισότης δὲν ἔχει καμμίαν φίζαν. Διότι, τότε εἶναι

$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha (x - q_1)^2$ καὶ ἀφοῦ τὸ α εἶνε ἀρνητικὸν τὸ $\alpha(x - q_1)^2$ εἶνε ἀρνητικὸν διὰ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν τοῦ x .

στ') "Αν αἱ φίλαι q_1, q_2 εἶνε φανταστικαί, ἥτις ἀνισότητης ἔχει ὡς φίλας πάντα πραγματικὸν ἀριθμόν μὲν ἂν εἶνε $\alpha > 0$, οὐδεμίαν δὲ ἂν εἶνε $\alpha < 0$. Διότι τὸ τριώνυμον ἴσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τοῦτο α ἐπὶ τὸ ἀθροισμα δύο τετραγώνων, ἦτοι ἔχει τὸ σημεῖον τοῦ α διὰ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν τοῦ x .

"Εστω ὅτι ζητεῖται νὰ λυθῇ ἥτις ἀνισότητης $x^2 - 3x + 7 > 0$. Αἱ φίλαι τοῦ τριώνυμου εἶνε φανταστικαί, τὸ $\alpha = 1 > 0$, ἀρα ἥτις ἀνισότητης ἀληθεύει διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x .

"Εστω ἥτις ἀνισότητης $x^2 - x - 6 > 0$.

Αἱ φίλαι τοῦ τριώνυμου εἶνε αἱ 2 καὶ -3 , τὸ $\alpha = 1 > 0$. Ἐπομένως αἱ φίλαι τῆς ἀνισότητος εἶνε αἱ $x < -3$, καὶ $x > 2$.

* Α σκήσεις.

'Ομάδας πρώτη. 1) Νὰ λυθοῦν αἱ ἀνισότητες

$$\alpha') x^2 + 3x - 4 > 0. \quad \beta') -x^2 + 3x = 6 > 0. \quad \gamma') \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{4} < -2.$$

$$\delta') \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)} < 1. \quad \varepsilon') \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 3x - 2} \cdot \sigma') 3 + \frac{1}{3-x} > \frac{1}{5x+1}$$

2) Εὑρετε τὰς τιμὰς τοῦ x , τὰς ἐπαληθευόσας τὰς ἀνισότητας

$$\alpha') x^2 - 12x + 32 > 0, \quad x^2 - 13x + 22 < 0. \quad \beta') 5x^2 - 7x + 1 < 0,$$

$$x^2 - 9x + 30 > 0. \quad \gamma') (x-1)(x^2 - 3x + 2) > 0. \quad 4x^2 + 5x + 1 < 0.$$

'Ομάδας δευτέρα. Νὰ λυθοῦν αἱ ἀνισότητες

$$\alpha') (x-\alpha)(x-\beta), (x-\gamma) > 0. \quad \beta') (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta) > 0.$$

$$\gamma') 4x^3 - 10x^2 + 48x < 0. \quad \delta') 3x^3 - 5x^2 + 2x > 0. \quad \varepsilon') x^3 - x^2 + 4x < 0.$$

ὅταν εἶνε $\alpha < \beta < \gamma < \delta$.

(Γράψατε τὴν γ') π.γ. οὗτω x ($4x^3 - 10x^2 + 48$) < 0 .)

'Ομάδας τρίτη. 1) Μεταξὺ τίνων ἀριθμῶν πρέπει νὰ περιέχεται ὁ μ , ὥστε ἥξεσθαις $\mu x^2 + (\mu - 1)x + 2\mu = 0$ ἔχῃ τὰς φίλας τῆς πραγματικάς, ἵσας, φανταστικάς;

2) Ποίαν τιμὴν πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ λ , ἵνα ἥτις ἀνισότητης $x^2 + 2x + \lambda > 10$ ἐπαληθεύεται διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x ;

§ 114. *) Μεταβολὴ τοῦ τριώνυμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$, διὰ πάσας τὰς πραγματικὰς τιμὰς τοῦ x .

α') Καλοῦμεν ἀρνητικὸν ἀπειρον, καὶ παριστάνομεν αὐτὸ μὲ τὸ σύμβολον $-\infty$ τὸν ἀριθμόν, δστις εἶνε μικρότερος παντὸς ἀρνητικοῦ

ἀριθμοῦ, ὃσονδήποτε μικροῦ. Καλοῦμεν θετικὸν ἀπειρον, καὶ παριστάνομεν αὐτῷ μὲ τὸ σύμβολον $+\infty$ τὸν ἀριθμόν, ὃστις εἶνε μεγαλύτερος παντὸς θετικοῦ ἀριθμοῦ, ὃσονδήποτε μεγάλου.

6') "Εστω τὸ τριώνυμον $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$.

Θέλομεν νὰ εῦρομεν πῶς μεταβάλλεται τοῦτο, ὅταντὸ x μεταβάλλεται ἀπὸ $-\infty$ μέχρι τοῦ $+\infty$ λαμβάνον ἐν συνεχείᾳ πάσας τὰς ἐνδιαμέσους πραγματικὰς τιμάς. Γράφομεν τὸ τριώνυμον ὡς ἔξης.

$$\begin{aligned} \alpha x^2 + \beta x + \gamma &= \alpha \left(x^2 + \frac{\beta}{\alpha} x + \frac{\gamma}{\alpha} \right) + \frac{\beta^2}{4\alpha^2} - \frac{\beta^2}{4\alpha^2} \\ &= \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\gamma}{\alpha} - \frac{\beta^2}{4\alpha^2} \right] \\ &= \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2} \right]. \end{aligned}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἂν μὲν εἶνε τὸ $\alpha > 0$, τὸ τριώνυμον θὰ ἔχῃ τὸ σημεῖον τῆς ποσότητος, ἡ ὥποια εἶνε ἐντὸς τῶν ἀγκυλῶν· ἂν δ' εἶνε $\alpha < 0$, θὰ ἔχῃ τὸ ἀντίθετον σημεῖον τῆς ἐν ἀγκύλαις ποσότητος.

γ') "Εστω ὅτι τὸ a εἶνε θετικόν. "Οταν τὸ $x = -\infty$, τὸ $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2$ εἶνε ἵσον μὲ $+\infty$, ἐὰν δὲ ἀπὸ αὐτοῦ ἀφαιρεθῇ ὁ ὠρισμένος ἀριθμὸς $\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}$, μένει πάλιν $+\infty$. "Ωστε διὰ $x = -\infty$ τὸ τριώνυμον γίνεται $+\infty$.

"Εὰν τὸ x αὐξάνῃ, λαμβάνομεν τιμὰς ἀρνητικάς, ἀλλ' ἀπολύτως μεγαλυτέρας τοῦ $\frac{\beta}{2\alpha}$, τὸ $x + \frac{\beta}{2\alpha}$ εἶνε ἀρνητικόν, ἀλλὰ τὸ τετράγωνόν του $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2$ εἶνε θετικόν, καὶ ἐλλαττοῦται διηνεκῶς.

"Οταν τὸ x γίνῃ ἵσον μὲ $-\frac{\beta}{2\alpha}$, τὸ $x + \frac{\beta}{2\alpha}$ γίνεται ἵσον μὲ μηδέν, τὸ δὲ τριώνυμον μὲ $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}$. a. "Οταν τὸ x αὐξάνῃ ἀπὸ τῆς τιμῆς $-\frac{\beta}{2\alpha}$ διηνεκῶς μέχρις ὅτου γίνει $+\infty$, ἡ ποσότης $x + \frac{\beta}{2\alpha}$ εἶνε θετική, καὶ αὐξάνει διηνεκῶς ἀπὸ τοῦ μηδενὸς μέχρι τοῦ $+\infty$. "Αρα καὶ τὸ τριώνυμον αὐξάνει ἀπὸ τῆς τιμῆς $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}$ μέχρι τοῦ $+\infty$.

δ') "Εστω ὅτι τὸ α εἶνε ἀρνητικόν. Ὅταν τὸ x = — ∞ τὸ τριώνυμον εἶνε — ∞. Ὅταν $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ τὸ τριώνυμον λσοῦται μὲ — $\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}$. α, καὶ διὰ x = + ∞ γίνεται πάλιν = μὲ — ∞.

"Ητοι ἐνῶ ὅταν εἶνε τὸ α > 0 διὰ x = — ∞ ... — $\frac{\beta}{2\alpha}$... + ∞ τὸ τριώνυμον ἐλαττοῦται ἀπὸ + ∞ μέχρι τοῦ $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha}$ καὶ ἔπειτα αὐξάνει μέχρι τοῦ + ∞, ὅταν τὸ εἶνε α < 0 διὰ x = — ∞ ... — $\frac{\beta}{2\alpha}$... + ∞ αὐξάνει ἀπὸ — ∞ γίνεται λίσον μὲ $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha}$ καὶ ἐλαττοῦται πάλιν μέχρι τοῦ — ∞.

ε') "Οταν μία τῶν τιμῶν, τὰς ὁποίας λαμβάνει μεταβλητὴ ποσότης, εἶνε μεγαλυτέρα ὅλων τῶν ἄλλων της, λέγομεν ὅτι αὐτὴ εἶνε μέγιστον τῆς μεταβλητῆς. Τούναντίον, ἐὰν μία τῶν τιμῶν μεταβλητῆς ποσότητος εἶνε ἡ μικροτέρα τῶν ἄλλων της, καλοῦμεν αὐτὴν ἐλάχιστον τῆς μεταβλητῆς.

στ') 'Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι,
ὅταν τὸ α εἶνε θετικόν, τὸ τριώνυμον $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ἔχει ἐλάχιστον διὰ x = — $\frac{\beta}{2\alpha}$. Ὅταν τὸ α εἶνε ἀρνητικόν, ἔχει μέγιστον διὰ x = — $\frac{\beta}{2\alpha}$.

"Ἐστω π. χ. τὸ τριώνυμον $3x^2 - 6x + 7$.

Τὸ α = 3 > 0, ἕρα ἔχει ἐλάχιστον διὰ x = — $\frac{\beta}{2\alpha} = \frac{6}{6} = 1$.

Θέτοντες x = 1 εὑρίσκομεν ὅτι τὸ ἐλάχιστον εἶνε 4.

'Α σ κή σ εις.

Όμάς πρώτη. Διὰ καθὼν τῶν κάτωθι τριώνυμων νὰ εὔρεθῇ τὸ μέγιστον ἢ ἐλάχιστον (καὶ διὰ τίνα τιμὴν τοῦ x).

α') $-x^2 + 4x + 3$. β') $19x^2 - 6x + 3$. γ') $x^2 - 7x + 13$.

δ') $7x^2 - 6x + 3$. ε') $15x^2 + 12x - 7$. στ') $-x^2 + 3x - 6$.

Όμάς δευτέρα. 1) Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ μέγιστον ἢ ἐλάχιστον τοῦ α x² + β x + γ ἐργαζόμεθα καὶ ὡς ἔτης.

Θέτομεν $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = y$ καὶ παρατηροῦμεν ὅτι διὰ νὰ γίνῃ τὸ τριώνυμον λίσον μὲ τὸ y, θὰ ἔχωμεν $\alpha x^2 + \beta x + \gamma - y = 0$. Ἀλλὰ διὰ νὰ ἔχῃ ἡ λίσησις αὐτὴ ρίζας πραγματικάς, πρέπει νὰ εἶνε $\beta^2 - 4\alpha\gamma + 4\alpha y \geq 0$, ἢ $4\alpha y \geq 4\alpha\gamma - \beta^2$.

Επομένως, ἂν μὲν εἴνε τὸ $\alpha > 0$ θὰ ἔχωμεν $y \geq \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$. Δηλαδὴ τὸ $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha} \text{ ή τὸ } -\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha}$ είνε τὸ ἐλάχιστον τοῦ τριωνύμου. "Αν δὲ εἴνε τὸ $\alpha < 0$ τότε εἴνε $y \leq \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$. Δηλαδὴ τὸ $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$, η τὸ $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha}$ είνε τὸ μέγιστον τοῦ τριωνύμου.

2) Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέγιστον η τὸ ἐλάχιστον τοῦ $\frac{\beta(x^2 + x^2)}{2(x + x)}$.

$$\text{Θέτομεν } y = \frac{\beta(x^2 + x^2)}{2(x + x)},$$

$$\eta \quad \beta x^2 - 2y x + \alpha(\alpha\beta - 2y) = 0.$$

Διὰ νὰ είνε αἱ ρίζαι τῆς

έξιστωσις ταύτης πραγματικαὶ, πρέπει νὰ ἔχωμεν

$$y^2 - \alpha\beta(\alpha\beta - 2y) \geq 0, \quad \eta \quad y^2 + 2\alpha\beta y - \alpha^2\beta^2 \geq 0.$$

"Εὰν τὴν τελευταῖαν αὐτὴν ἀνισότητα λύσωμεν ὡς πρὸς y , ἔχομεν ὅτι

$$y \leq -\alpha\beta(1 + \sqrt{2}) \quad \text{καὶ } y \geq \alpha\beta(-1 + \sqrt{2}).$$

"Επομένως τὸ $y = -\alpha\beta(1 + \sqrt{2})$

είνε μέγιστον, τὸ δὲ

$$y = \alpha\beta(-1 + \sqrt{2}) \text{ ἐλάχιστον τῆς δοθείσης παραστάσις. "Αν εἰς}$$

τὴν (1) θέσωμεν διαδογικῶς ἀντὶ τοῦ y τὰς δύο αὐτὰς τιμάς, καὶ λύσωμεν τὴν προ-

κύπτουσαν έξιστωσιν ὡς πρὸς x , εὑρίσκομεν ὅτι τὸ μέγιστον ἀντιστοιχεῖ εἰς

$$x = -\alpha(1 + \sqrt{2}), \text{ τὸ δὲ ἐλάχιστον εἰς } x = \alpha(-1 + \sqrt{2}).$$

3) Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέγιστον η ἐλάχιστον τῶν

$$\alpha') \frac{\alpha+x}{\alpha-x} + \frac{\alpha-x}{\alpha+x} \cdot \beta' \left(\frac{(x-\alpha)(x-\beta)}{x} \cdot \gamma' \right) \frac{4x^2 + 1}{x^2 - 2x + 1} \cdot \delta' \left(\frac{1-2x^2}{x^2+4x+4} \right).$$

§ 113*). Γεωμετρικὴ παράστασις τῆς μεταβολῆς τοῦ τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$. —


α') "Εστω τὸ τριώνυμον $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$.

Διὰ νὰ παραστήσωμεν γραφικῶς τὴν μεταβολὴν του, θέτομεν $y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, (1) καὶ διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

6') "Οταν τὸ α εἴνε θετικόν. Γνωρίζομεν (§ 114) ὅτι, ὅταν τὸ x αὐξάνεται ἀπὸ $-\infty$ μέχρι $-\frac{\beta}{2\alpha}$, τὸ y ἐλαττοῦται ἀπὸ $+\infty$ μέχρι τοῦ $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$. Επομένως η γραμμή, τὴν διποίαν παριστάνει

ἡ έξιστωσις (1), (ἄν τὰς τιμάς τοῦ x θεωρήσωμεν ὡς τετυημένας τὰς δὲ τοῦ y ὡς τεταγμένας σημείων ὡς πρὸς ἄξονας δρυθογωνίους $(0, 0)$, $(0, y)$ θὰ ἔχῃ ἑνα κλάδον, δ διποίος θὰ ἀναγωρῇ ἀπὸ ἓν σημείον, τὸ διποίον κείται ἐν τῇ γωνίᾳ y $0x'$ καὶ είνε πολὺ μεμακρυσμέ-

νον (ἔχει τετμημένην $-\infty$ καὶ τεταγμένην $+\infty$), διέρχεται δὲ κατερχόμενος διὰ τοῦ σημείου A, τὸ δποῖον ἔχει τετμημένην $-\frac{\beta}{2\alpha}$. καὶ τεταγμένην $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ ($\Sigma\chi.$ 8).




($\Sigma\chi.$ 8)

Όταν τὸ x ἀπὸ τῆς τιμῆς $-\frac{\beta}{2\alpha}$ αὐξάνεται εἰς τὸ $+\infty$, ἡ ἔξισωσις (1) παριστάνει ἄλλον κλάδον τῆς γραμμῆς, δ ὅποιος ἀνέρχεται ἀπὸ τὸ σημεῖον A καὶ ἀπομακρύνεται πρὸς ἓν σημείον πολὺ μεμακρυσμένον ἐν τῇ γωνίᾳ x o y, ἔχον τετμημένην καὶ τεταγμένην ἵσας μὲ $+\infty$.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι ἡ ἔξισωσις (1) ὅταν τὸ a είναι θετικὸν παριστάσει τὴν καμπύλην ΒΑΓ ($\Sigma\chi.$ 8).

γ') "Οταν τὸ a είναι ἀρνητικόν. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὅταν τὸ x αὐξάνεται ἀπὸ $-\infty$ μέχρι τοῦ $-\frac{\beta}{2\alpha}$, τὸ y αὐξάνεται ἀπὸ $-\infty$ μέχρι τοῦ $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$. Ἐπομένως, διὰ τὰς τιμὰς αὐτὰς ἡ ἔξισωσις (1) παριστάνει ἕνα κλάδον, δ ὅποιος ἔρχεται ἀπὸ ἓν σημείον πολὺ μεμακρυσμένον καὶ κείμενον ἐν τῇ γωνίᾳ x' o y', τοῦ δποίου τετμημένη καὶ τεταγμένη είναι ἵσας μὲ $-\infty$, καταλήγει δὲ εἰς τὸ σημεῖον A', τοῦ δποίου ἡ μὲν τετμημένη ἵσοῦται μὲ $-\frac{\beta}{2\alpha}$ ἡ δὲ τεταγμένη μὲ $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ ($\Sigma\chi.$ 9)."

Όταν τὸ x αὐξάνεται ἀπὸ $\frac{-\beta}{2\alpha}$ μέχρι τοῦ $+\infty$, τὸ τριώνυμον, ἀριστερῶς καὶ τὸ y , ἐλαττοῦται ἀπὸ $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ μέχρι τοῦ $-\infty$, καὶ ἡ ἔξι-
σωσις (1) διὰ τὰς πυμὰς αὐτὰς παριστάνει κλάδον καμπύλης γραμ-



(Σχ. 9)

ηῆς, ὃ ὅποῖς ἀρχεται ἀπὸ τὸ σημεῖον A' καὶ τελειώνει εἰς ἐν σημεῖον πολὺ μεμακρυσμένον, κείμενον ἐν τῇ γωνίᾳ x ο y , καὶ ἔχον τετμημένην καὶ τεταγμένην ἵσας μὲν $+\infty$ καὶ $-\infty$ ἀντιστοίχως (Σχ. 9).


Σ) Διὰ νὰ εὑρωμεν ποῦ ἡ καμπύλη τέμνει τὸν ἄξονα τῶν y , παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ σημεῖον τῆς τομῆς θὰ ἔχωμεν $x = 0$. "Αλλ' ἀν θέσωμεν $x = 0$ εἰς τὴν (1) εὐρίσκομεν $y = \gamma$. "Ωστε ἡ καμπύλη τέμνει τὸν y ο y' εἰς τὸ σημεῖον Γ_1 , ἢ τὸ Γ_1' , ἔχον τεταγμένην ἵσην μὲν γ . "Αν ϱ_1 , ϱ_2 εἶνε αἱ φίζαι τοῦ τριώνυμου, διὰ $x = \varrho_1$, ϱ_2 ἔχομεν $y = 0$. "Επεται ὅτι ἡ καμπύλη τέμνει τὸν ἄξανα τῶν x εἰς τὰ σημεῖα, τὰ ἔχοντα τετμημένην ϱ_1 καὶ ϱ_2 . "Αν τὰ ϱ_1 , ϱ_2 εἶνε φανταστικά, ἡ καμπύλη δὲν τέμνει τὸν ἄξονα τῶν x .

ε) Ἡ καμπύλη τὴν ὅποιαν παριστάνει ἡ ἔξισωσις (1) καλεῖται συνήθως παραβολὴ, τῆς ὅποιας ἡ θέσης ἀλλάσσει μετὰ τοῦ σημείου τοῦ a , καὶ τῶν συντελεσῶν τοῦ τριώνυμου.

"Εστω τὸ τριώνυμον $y = x^2 - 5x + 4$.

$$\text{Έκομεν } y = \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

"Όταν τὸ x αὐξάνεται ἀπὸ $-\infty$ μέχρι τοῦ $\frac{5}{2}$, τὸ $(x - \frac{5}{2})^2$ ἐλαττοῦται ἀπὸ $+\infty$ μέχρι τοῦ μηδενός, τὸ δὲ γι y ἐλαττοῦται ἀπὸ $+\infty$ μέχρι τοῦ $-\frac{9}{4}$. Οὗτως ἡ καμπύλη ἔχει κλάδον $B A$ (Σχ. 10), ἐρχόμενον ἀπὸ τὸ σημεῖον, τὸ διποῖον ἔχει τετμημένην καὶ τεταγμένην $-\infty$ καὶ $+\infty$ ἀντιστοίχως καὶ περατούμενον εἰς τὸ σημεῖον $A\left(\frac{5}{2}, -\frac{9}{4}\right)$. "Όταν τὸ x αὐξάνεται ἀπὸ $\frac{5}{2}$ μέχρι τοῦ $+\infty$, τὸ $(x - \frac{5}{2})^2$ αὐξάνεται ἀπὸ τὸ 0 μέχρι τοῦ $+\infty$, τὸ δὲ γι y



(Σχ. 10)

αὐξάνεται ἀπὸ $-\frac{9}{4}$ μέχρι τοῦ $+\infty$. Ἡ καμπύλη λοιπὸν ἔχει καὶ δεύτερον κλάδον $A\Gamma$, ὃ διποῖος ἀνέρχεται ἐκ τοῦ σημείου $A\left(\frac{5}{2}, -\frac{9}{4}\right)$ καὶ ἀπομακρύνεται εἰς τὸ ἄπειρον μέχρι τοῦ σημείου, τὸ διποῖον ἔχει συντεταγμένας $+\infty$ καὶ $+\infty$ (Σχ. 10).

Διὰ $x = 0$ τὸ γ εἶνε ἵσον μὲ 4. Ἐφαρμόζεται τὸν ἀξονα τῶν γ εἰς τὸ σημεῖον $\Gamma_1(0,4)$. Η καμπύλη τέμνεται τὸν x εἰς τὸ σημεῖον $(1,0)$ καὶ $(4,0)$ ἐπειδὴ εἶνε $q_1 = 1, q_2 = 4$.

Ασκήσεις. Νὰ ἑξετασθῇ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ τῶν

$$\alpha') \quad y = x^2 - x - 3. \quad \beta') \quad y = 3x^2 - 7x + 3.$$

$$\gamma') \quad y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 2x - 3}. \quad \delta') \quad y = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x - 3}. \quad \text{Ἐν τῇ } \gamma' \text{ διὰ } x = -1$$

καὶ $x = 3$ τὸ γ = ∞. Διὰ 1: $x = 0$, ἢ $x = \infty$ τὸ γ = 1. Αἱ εὐθεῖαι $x = -1, x = 3, y = 1$ λέγονται ἀσύμπτωτοι τῆς γραμμῆς γ'.
γ'

Ἐξισώσεις ἀναγόμεναι εἰς ἔξισώσεις β' βαθμοῦ.

§ 116. Διτετράγωνοι ἔξισώσεις. —

α') Καλοῦμεν ἔξισώσιν τια μὲ ἓνα ἄγνωστον διτετράγωνον, ἐὰν μετὰ τὰς ἀναγωγὰς ἔχῃ τὴν μορφὴν $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$. (1)

β') Πρὸς λύσιν τῆς ἀνωτέρῳ ἔξισώσεως γράφομεν

$$x^2 = y, \quad \text{ὅτε } x^4 = y^2, \quad \text{καὶ ἀντὶ τῆς (1) } \overset{\text{ἔχομεν}}{t} \text{ τὴν} \\ \alpha y^2 + \beta y + \gamma = 0. \quad (2)$$

Ἐὰν λύσωμεν τὴν (2) θὰ εὑρομεν τὰς τιμὰς τοῦ γ, καὶ ἔστωσαν αὗται αἱ y_1 καὶ y_2 . Διὰ νὰ εῦρομεν τὰς ρίζας τῆς (1), δηλαδὴ τὰς τιμὰς τοῦ x, θέτομεν εἰς τὴν ἴσοτητα $x^2 = y$ ὅπου γ τὴν τιμὴν του y_1 καὶ y_2 , ὅτε ἔχομεν τὰς ἔξισώσεις $x^2 = y_1, x^2 = y_2$ ἐπι τῶν ὅποιων εὐρίσκομεν $x = \pm \sqrt{y_1}, \quad x = \pm \sqrt{y_2}$

$$\therefore \quad x = +\sqrt{y_1}, \quad -\sqrt{y_1}, \quad +\sqrt{y_2}, \quad -\sqrt{y_2}.$$

Ἄλλ' αἱ τιμαὶ y_1 καὶ y_2 εἶνε καθὼς γνωρίζομεν

$$y_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}, \quad y_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}.$$

Ἐπομένως ἂν παραστήσωμεν διὰ q_1, q_2, q_3, q_4 τὰς ρίζας τῆς (1)

$$\text{θὰ } \overset{\text{ἔχωμεν}}{q_1} = \sqrt{\frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}, \quad q_2 = -\sqrt{\frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}$$

$$q_3 = \sqrt{\frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}, \quad q_4 = -\sqrt{\frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}$$

Ἐστιω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισώσις $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.

Ἐχομεν $\alpha = 1, \beta = -10, \gamma = 9$.

$$\text{Έπομένως } \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} = \frac{10 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{10 \pm 8}{2} = 9 \cdot 1$$

καὶ $\varrho_1 = -3, \varrho_2 = -1, \varrho_3 = 1, \varrho_4 = 3.$
 Εστω ἡ ἔξισωσις $x^4 + x^2 - 12 = 0.$

Εἶναι $a = 1, \beta = 1, \gamma = -12,$

καὶ $\frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{-1 \pm 7}{2} = 3 - 4.$

Έπομένως εἶναι $\varrho_1 = -\sqrt{3}, \varrho_2 = \sqrt{3}, \varrho_3 = 2i, \varrho_4 = -2i.$

Ασκήσεις. Νὰ λυθοῦν καὶ ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις

$\alpha') x^4 - 10x^2 + 9 = 0. \quad \beta') x^4 - 14x^2 = 5. \quad \gamma') x^4 + 5x^2 = \frac{11}{4}.$

$\delta') x^4 - \frac{7x^2}{3} = \frac{2}{3}. \quad \varepsilon') 3x^4 - 14x^2 = 5. \quad \pi') 4x^4 - 37x^2 + 9 = 0.$

$\zeta') x^2 \beta^2 x^4 - (\alpha^4 + \beta^4) x^2 + \alpha^2 \beta^2 = 0. \quad \eta') x^4 + 4\alpha\beta x^2 - (\alpha^2 - \beta^2)^2 = 0.$

$\theta') \gamma^4 x^4 + (x^2 \gamma^2 - \beta^2 \gamma^2) x^2 - x^2 \beta^2 = 0. \quad \iota') x^4 + x^2 - 2x^4 + 3 = 0.$

§ 117. Ανάλυσις διτετραγώνου τριωνύμου εἰς γινόμενον παραγόντων.—

Εστω τὸ τριώνυμον

$$\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma.$$

Ἐὰν θέσωμεν $x^2 = y$ τρέπεται αὐτὸς εἰς τὸ $\alpha y^2 + \beta y + \gamma.$

Άλλ' ἂν y_1 καὶ y_2 εἶναι αἱ ρίζαι τούτου, θά ἔχωμεν καθὼς γνωρίζομεν ὅτι, $\alpha y^2 + \beta y + \gamma = \alpha(y - y_1)(y - y_2).$

Ἐπαναφέροντες ἀντὶ τοῦ y τὸ x^2 , εὑρίσκομεν

$$\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = \alpha(x^2 - y_1)(x^2 - y_2)$$

ἢ $= (x + \sqrt{y_1})(x - \sqrt{y_1})(x + \sqrt{y_2})(x - \sqrt{y_2}).$

Ἄρα $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = \alpha(x - \varrho_1)(x - \varrho_2)(x - \varrho_3)(x - \varrho_4),$

ὅπου $\varrho_1, \varrho_2, \varrho_3, \varrho_4$ εἶναι αἱ ρίζαι τοῦ διθέντος τριωνύμου.

Ασκήσεις.

Ομάς πρώτη. 1) Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα παραγόντων τὰ

$\alpha') 4x^4 - 17x^2 + 1. \quad \beta') 7x^4 - 35x^2 + 28. \quad \gamma') x^4 - 13x^2 + 36.$

2) Εὔρετε τὴν διτετραγώνου ἔξισωσιν, ἡ ἥποια ἔχει ρίζας τὰς

$\alpha') \pm 3, \pm 1. \quad \beta') \pm \alpha, \pm \sqrt{\alpha}. \quad \gamma') \pm 0,5, \pm 4i. \quad \delta') \pm 3, \pm i.$

Ομάς δευτέρα. 1) Εὔρετε τὸ σημεῖον τοῦ τριωνύμου $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$, ὅταν τὸ x εἴναι ἐκτὸς τῶν ρίζῶν του $\varrho_1, \varrho_2, \varrho_3, \varrho_4$. (ἄν εἶναι $\varrho_1 < \varrho_2 < \varrho_3 < \varrho_4$). Δηλαδὴ ἂν $x < \varrho_1$, ἢ $x > \varrho_4$. Καὶ ὅταν τὸ x κείται μεταξὺ δύο ρίζων, δηλαδὴ ἂν εἶναι $\varrho_1 < x < \varrho_2, \varrho_2 < x < \varrho_3$, καὶ $\varrho_3 < x < \varrho_4$. (Διακρίνατε δύο περιπτώσεις ὅταν $\alpha > 0$ καὶ ὅταν $\alpha < 0$).

2) Εἰς τὴν ἔξισωσιν $2x^2 - (\lambda^2 + 1)x + (\lambda^2 + 3) = 0$ τίνα τιμὴν πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ λ , διὰ νὰ διαφέρουν αἱ ρίζαι της κατὰ 1;

§ 118. Λύσεις ἐξισώσεων μὲριζούμενά.—

α') Εξίσωσίς τις λέγεται μὲριζούμενή, ἀντὶ τοῦλάχιστον ἐν οικείοντι ὑπὸ τὸ διποῖον ὑπάρχει ὁ ἄγνωστος τῆς ἐξισώσεως.

$$\text{Οὕτω αἱ } \sqrt[3]{2x+6} = 2, \quad 4 + \sqrt{x^3+5} = x-1 \\ \text{λέγονται ἐξισώσεις μὲριζούμενά.}$$

$$\text{β') } " \text{Εστω ὅτι } \sqrt[3]{2x+6} = 2.$$

$$\text{Διὰ νὰ } \sqrt[3]{2x+6} = 2 \quad 2x+6 = 2^3 = 8. \\ \text{Λύοντες } x = 1 \quad x = 1.$$

$$\text{Θέτοντες } x = 1 \text{ εἰς τὴν δοθεῖσαν, } \sqrt[3]{2 \cdot 1 + 6} = \sqrt[3]{8} = 2.$$

$$" \text{Ητοι } \sqrt[3]{2x+6} = 2 \quad x = 1.$$

$$" \text{Εστω } \sqrt[3]{2x+6} = x-1.$$

Διὰ νὰ $\sqrt[3]{2x+6} = x-1$, πρῶτον ἀπομονώνομεν αὐτό, Δηλαδή, μετασχηματίζομεν τὴν ἐξίσωσιν εἰς ἄλλην, ἡ ὅποια νὰ $\sqrt[3]{2x+6} = x-1$ τὸ οικείον εἰς τὸ ἐν μέλος της.

$$\text{Οὕτω } \sqrt[3]{2x+6} = x-1 \quad \sqrt[3]{x^3+5} = x-5.$$

Τώρα ὑψοῦμεν τὰ ἵσα εἰς τὸ τετράγωνον, ὅτε λαμβάνομεν τὴν ἐξίσωσιν $x^2 + 5 = (x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$, ἢ $10x = 20$, ἢ τις δὲν εἶνε, ἐν γένει, λισοδύναμος μὲ τὴν δοθεῖσαν (§ 101).

$$\text{Λύοντες } x^2 - 10x + 25 = 20 \quad x = 2.$$

"Εὰν θέσωμεν $x = 2$ εἰς τὴν δοθεῖσαν ἐξίσωσιν καὶ λάβωμεν μόνον τὴν θετικὴν φράσην τοῦ $\sqrt[3]{2^3+5} = \sqrt[3]{9}$, δηλαδὴ μόνον τὸ 3, παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ἐξίσωσις δὲν ἐπαληθεύεται. "Αν διμως λάβωμεν καὶ τὴν ἀρνητικὴν τιμὴν — 3 τῆς $\sqrt[3]{9}$, ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις ἐπαληθεύεται διὰ $x = 2$.

"Εκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεται ὅτι

γ') «Διὰ νὰ λύσωμεν ἐξίσωσιν μὲριζούμενή, ἀπομονώνομεν τὰ φράσεις, ὑψοῦντες τὰ μέλη τῆς νέας ἐξισώσεως εἰς τὴν αὐτὴν δύναμιν, νὰ προκύψῃ ἐξίσωσις χωρὶς φράση. Ἀκολούθως λύομεν τὴν ἐξίσωσιν ταύτην, καὶ δοκιμάζομεν, ἀν αἱ φράσεις δοθείσης ἐξισώσεως».

"Αν $\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+8} = 7$,
υψοῦντες τὰ ἵσα εἰς τὸ τετράγωνον εὑρίσκομεν, ἀφοῦ ἀπομονώσω-
μεν τὸ οἷον δύναμεν τὸ τετράγωνον εὑρίσκομεν

$$2\sqrt{(x+5)(2x+8)} = 36 - 3x.$$

"Υψοῦντες πάλιν τὰ ἵσα εἰς ταῦτα τὸ τετράγωνον εὑρίσκομεν

$$4(x+5)(2x+8) = (36-3x)^2$$

καὶ μετὰ τὰς πρότεινες καὶ τὴν ἀναγωγὴν $x^2 - 288x + 1136 = 0$.
Αἱ οὖται ταύτης εἰνε $x = 4, x = 284$.

Θέτοντες $x = 4$ καὶ $x = 284$ εἰς τὴν δοθεῖσαν, εὑρίσκομεν ὅτι
μόνον ἡ $x = 4$ τὴν ἐπαληθεύει.

'Ασκήσεις. 1) Νὰ λυθοῦν αἱ ἔξισώσεις καὶ νὰ ἐπαληθευθοῦν

$$\alpha') \sqrt{x+4} = 7. \quad \beta') \sqrt{36+x} = \sqrt{x+2}. \quad \gamma') x + \sqrt{25-x^2} = 7. \quad (45 \cdot 64 \cdot 3 \text{ καὶ } 4).$$

$$\delta') \sqrt{1+\sqrt{x^2-x^2}} = x-1. \quad \varepsilon') \sqrt{2+\sqrt{x-5}} = \sqrt{13-x}.$$

$$\sigma') \frac{\sqrt{4x+20}}{\sqrt{4} + \sqrt{x}} = \frac{4 - \sqrt{x}}{\sqrt{x}}. \quad (1 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 4).$$

$$2) \text{'Ομοιώς αἱ } \alpha') 3.9^{\frac{x}{2}+1.5} - 9.9^{\frac{x}{2}} = 9.2^{\frac{x+3}{2}} + 8.9^{\frac{x}{2}+0.5}$$

$$\beta') \sqrt[3]{7^{2x-3}} + \sqrt[3]{7^{2x+3}} = 7^3 + 7^5. \quad \gamma') \frac{\sqrt{x+x} + \sqrt{x-x}}{\sqrt{x+x} - \sqrt{x-x}} = \sqrt{\beta}.$$

$$\delta') \frac{(1-\alpha x) \cdot \sqrt{1+\beta x}}{(1+\alpha x) \cdot \sqrt{1-\beta x}} = 1. \quad \left(\text{'Απ. } \frac{2\alpha \sqrt{\beta}}{1+\beta}, \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{2\alpha}{\beta}-1} \right).$$

§ 119. Ἐξισώσεις τριώνυμοι.—

α') Καλοῦμεν ἔξισώσιν τινα τριώνυμον, ἂν τὸ πρῶτον μέλος
της (ὅταν τὸ δεύτερον εἴνε μηδὲν) ἀποτελῆται ἀπὸ τρεῖς δρούς.
Οὕτω ἡ γενικὴ ἔξισώσις τοῦ β' βαθμοῦ λέγεται καὶ τριώνυμος.
Ἐπίσης καὶ ἡ ἔξισώσις $x^6 - 19x^3 - 216 = 0$ λέγεται τριώνυμος, ἀλλ'
εἶνε ἑκτου βαθμοῦ.

β') Η λύσις τριώνυμου ἔξισώσεως (ἀνωτέρου τοῦ β' βαθμοῦ)
ἀνάγεται, ἐνίστε, εἰς τὴν λύσιν ἔξισώσεων β' βαθμοῦ.

γ') "Εστω π. χ. ἡ ἔξισώσις $x^6 - 19x^3 - 216 = 0$.

Πρὸς λύσιν αὐτῆς θέτομεν $x^3 = y$, διε $x^6 = y^2$.

Οὕτω ἡ δοθεῖσα ἔξισώσις γίνεται $y^2 - 19y - 216 = 0$.

- Λύοντες αὐτὴν εὐρίσκομεν $y = 27$, καὶ $y = -8$.
 "Αν θέσωμεν ἀντὶ τοῦ y τὸ x^3 , θὰ ἔχωμεν $x^3 = 27$, $x^3 = -8$.
 'Εκ τούτων εὑρίσκομεν δύο μόνον φίλας τῆς δοθείσης ἐξισώσεως τοῦ ἑκτοῦ βαθμοῦ τὰς $x = 3$, $x = -2$, ἐνῶ ἔχει ἐν ὅλῳ ἕξ φίλας.
- Διότι, ἀποδεικνύεται ὅτι ἐξισώσις τις δευτέρου, τρίτου, .. βαθμοῦ ἔχει δύο, τρεῖς, ... φίλας (πραγματικάς ή φανταστικάς).
 "Εστω ή ἐξισώσις $x^8 - 97x^4 + 1296 = 0$.
 Θέτομεν $x^4 = y$, δτε $x^8 = y^2$.

- 'Αντικαθιστῶντες εἰς τὴν δοθείσαν ἐξισώσιν εὐρίσκομεν $y^2 - 97y + 1296 = 0$.
 Λύοντες αὐτὴν εὐρίσκομεν $y = 81$, καὶ $y = 16$.
 'Επομένως εἶνε καὶ $x^4 = 81$, $x^4 = 16$.
 "Αριθμοῦ ± 3 , $x = \pm 2$
 εἶνε αἱ τέσσαρες φίλας ἐκ τῶν δικτῶν τῆς δοθείσης ἐξισώσεως.

'Ασκήσεις. Νὰ λυθοῦν αἱ ἐξισώσεις

$$\alpha') x^6 + 4x^3 = 96. \quad \beta') x^{10} - 12x^5 = 56133. \quad \gamma') \alpha x^{11} + \beta x^9 + \gamma x^7 = 0.$$

$$\delta) \frac{\alpha}{x^4} - \frac{2x^9}{x^2} = \frac{3x^2}{x}. \quad \epsilon) 2x\sqrt{x^3} = -3\sqrt{x}. \quad \sigma) \sqrt[3]{x} - 5\sqrt[3]{x^2} = -18.$$

§ 120. Περὶ ἀντίστροφων ἐξισώσεων.—

α) Ἐξισώσις τις (τῆς δόποιας τὸ μὲν δευτέρον μέλος εἶνε μηδέν, τὸ δὲ πρῶτον εἶνε πολυώνυμον, διατεταγμένον κατὰ τὰς δυνάμεις τοῦ ἀγνώστου) λέγεται ἀντίστροφος, ἀν οἱ συντελεσταὶ τῶν δρων, τῶν ἀπεχόντων ἵσον ἐκ τῶν ἄκρων, εἶνε ἵσοι ή ἀντίθετοι (ὅταν τὸ πολυώνυμον δὲν ἔχῃ μεσαῖον δρόν ἀν εἶνε ἀριθμὸς βαθμοῦ).

Οὗτοι ή ἐξισώσις $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$, παλεῖται ἀντίστροφος τοῦ τρίτου βαθμοῦ, καθὼς καὶ ή $\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = 0$.
 "Η $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$, καὶ ή $\alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0$.
 παλοῦνται ἀντίστροφοι τοῦ τετάρτου βαθμοῦ.

β') Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$, παρατηροῦμεν ὅτι, ἂν θέσωμεν $x = -1$ εἰς αὐτήν, ή ἐξισώσις ταυτοποιεῖται. "Αριθμὸς τὸ πρῶτον μέλος τῆς διαιρεῖται διὰ τοῦ ($x+1$).
 "Αν ἑκτελέσωμεν τὴν διαιρεσιν τοῦ $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha$ διὰ τοῦ $x + 1$, εὐρίσκομεν πηλίκην τὸ $\alpha x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha$ (§ 46).

Ἐπομένως ἔχομεν

$$\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = (x + 1) [\alpha x^2 + (\beta - \alpha) x + \alpha] = 0.$$

Ἡ μία οὖτα τῆς δοθείσης ἐξισώσεως εἶναι προφανῶς ἡ $x = -1$, αἱ δὲ δύο ἄλλαι θὰ εὑρεθοῦν, ἀν λύσωμεν τὴν ἐξισώσιν τοῦ δευτέρου βαθμοῦ

$$\alpha x^2 + (\beta - \alpha) x + \alpha = 0.$$

γ') Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν ἐξισώσιν $\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = 0$, παρατηροῦμεν ὅτι ἐπαληθεύεται διὰ $x = 1$. Ἀρα τὸ πρῶτον μέλος τῆς διαιρεῖται διὰ $x - 1$. Ἀν κάμωμεν τὴν διαιρεσιν, εὑρίσκομεν ὅτι $\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = (x - 1) [\alpha x^2 + (\alpha + \beta) x + \alpha]$. Εἶναι φανερόν, ὅτι ἡ μία οὖτα τῆς δοθείσης ἐξισώσεως εἶναι ἡ $x = 1$, αἱ δὲ δύο ἄλλαι θὰ εὑρεθοῦν, ἀν λύσωμεν τὴν ἐξισώσιν τοῦ δευτέρου βαθμοῦ

$$\alpha x^2 + (\alpha + \beta) x + \alpha = 0.$$

δ') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ λύσωμεν τὴν ἀντίστροφον ἐξισώσιν τοῦ τετάρτου βαθμοῦ

$$\alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0.$$

Γράφομεν αὐτὴν ὡς ἐξῆς

$$\alpha (x^4 - 1) + \beta x (x^2 - 1) = 0,$$

ἢ

$$\alpha (x^2 - 1)(x^2 + 1) + \beta x (x^2 - 1) = 0.$$

ἢ

$$(x^2 - 1) [\alpha (x^2 + 1) + \beta x] = 0.$$

Εἶναι φανερὸν ὅτι αἱ δύο οὖται θὰ εὑρεθοῦν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἐξισώσεως $x^2 - 1 = 0$, αἱ δὲ δύο ἄλλαι ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἐξισώσεως $\alpha (x^2 + 1) + \beta x = 0$. Ἡ πρώτη ἔχει οὖτας $+1$ καὶ -1 .

ε') Ἐστω ἡ ἐξισώσις $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon = 0$ (1). Διαιροῦμεν τὰ μέλη τῆς διὰ τοῦ x^4 καὶ εὑρίσκομεν

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma + \frac{\delta}{x} + \frac{\epsilon}{x^2} = 0$$

$$\text{ἢ } \alpha \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + \beta \left(x + \frac{1}{x} \right) + \gamma = 0. \quad (2)$$

Θέτομεν

$$x + \frac{1}{x} = y, \text{ ὅτε } \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 = y^2, \text{ ἢ } x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = y^2$$

$$\text{καὶ } x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2.$$

Ἀν ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὴν ἐξισώσιν (2) τὰς τιμὰς τῶν $x^2 + \frac{1}{x^2}$, καὶ $x + \frac{1}{x}$ εὑρίσκομεν $\alpha (y^2 - 2) + \beta y + \gamma = 0$, ἡ ὁποία εἶναι δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς y .

"Αν λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν αὐτήν, εὑρίσκομεν, ὅτι γένει, δύο τιμὰς τοῦ y , τὰς δύοις ἃς παραστήσωμεν διὰ y_1 καὶ y_2 . Ἀντικαθιστῶμεν καθεμίαν τῶν τιμῶν τοῦ y εἰς τὴν $x + \frac{1}{x} = y$, καὶ

$$\text{ἔχομεν } x + \frac{1}{x} = y_1, \quad x + \frac{1}{x} = y_2$$

$$\text{ἢ } x^2 - xy_1 + 1 = 0, \quad x^2 - xy_2 + 1 = 0.$$

"Ητοι δύο ἔξισώσεις δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς x , τὰς δύοις ἐὰν λύσωμεν, θὰ εὑρῷμεν τὰς τέσσαρας ρίζας τῆς δοθείσης ἔξισώσεως.

$$\text{Π. χ. } \text{ἔστω } \text{ἡ } \text{ἔξισωσις } 6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0.$$

Γράφομεν αὐτὴν ως ἔξισης

$$6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 35\left(x + \frac{1}{x}\right) + 62 = 0.$$

$$\text{Θέτομεν } x + \frac{1}{x} = y,$$

$$\text{ὅτε εὑρίσκομεν } 6(y^2 - 2) - 35y + 62 = 0, \text{ ἢ } 6y^2 - 35y + 50 = 0.$$

$$\text{Αἱ ρίζαι τῆς } \text{ἔξισώσεως } \text{αὐτῆς } \text{εἰνε } \text{αἱ } \frac{5}{2} \text{ καὶ } \frac{10}{3}.$$

$$\text{Ἐπομένως } \text{αἱ } \text{ρίζαι } \text{τῆς } \text{δοθείσης } \text{ἔξισώσεως } \text{θὰ } \text{εὑρεθοῦν}, \text{ ἐὰν λύσωμεν } \text{τὰς } \text{ἔξισώσεις } x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}, \text{ καὶ } x + \frac{1}{x} = \frac{10}{3},$$

$$\text{ἢ } \text{τὰς } 2x^2 - 5x + 2 = 0 \text{ καὶ } 3x^2 - 10x + 3 = 0.$$

$$\text{Αἱ ρίζαι τούτων } \text{εἰνε } \text{αἱ } 2 \text{ καὶ } \frac{1}{3}.$$

"Ανὰ δύο οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ εἰνε λντίστροφοι, καθὼς βλέπομεν.

Ἀσκήσεις. 1) Νὰ λυθοῦν αἱ ἔξισώσεις

$$\alpha') x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0. \quad \beta') x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} = 41.$$

$$\gamma') x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0. \quad \delta') 3x^3 - 13x^2 + 13x - 3 = 0.$$

$$\epsilon') 2x^3 + 7x^2 + 7x + 2 = 0. \quad \sigma') 2x^4 + 5x^3 - 5x - 2 = 0.$$

$$2) \text{ Ἡ } \text{ἔξισωσις } \text{τοῦ } \text{πέμπτου } \text{βαθμοῦ } \alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0 \text{ } \text{ἀνάγεται: } \text{εἰς } \text{τὴν } \alpha x^4 + (\beta - \alpha) x^3 + (\alpha - \beta) x^2 + (\beta - \alpha) x + \alpha = 0 \text{ } \text{ἐπειδὴ } \text{ἡ } \text{δοθείσα } \text{ἐπαληθεύεται: } \text{διὰ } x = -1. \text{ } \text{Πῶς } \text{γίνεται: } \text{τοῦτο;}$$

$$3) \text{ Ἡ } \text{ἔξισωσις } \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 - \gamma x^2 - \beta x - \alpha = 0 \text{ } \text{ἐπαληθεύεται: } \text{διὰ } x = 1, \text{ καὶ } \text{ἀνάγεται: } \text{oὗτο } \text{εἰς } \text{τὴν } \text{ἔξισωσιν}$$

$$\alpha x^4 + (\alpha + \beta) x^3 + (\alpha + \beta + \gamma) x^2 + (\alpha + \beta) x + \alpha = 0.$$

Πῶς γίνεται: τοῦτο; Πῶς εὑρίσκομεν τὰς ρίζας τῶν ἀντιστρόφων ἔξισώσεων τοῦ πέμπτου βαθμοῦ;

4) Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις

$$\alpha') x^5 - 4x^4 + 3x^3 + 3x^2 - 4x + 1 = 0. \quad \beta') 2x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 3x - 2 = 0.$$

§ 121. Συστήματα δευτέρου βαθμοῦ.—

α') Ένω τὴν λύσιν συστημάτων ἔξισώσεων τοῦ πρώτου βαθμοῦ ἀνάγομεν εἰς τὴν λύσιν μιᾶς ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ μὲ ἐνα- ἄγνωστον, βαθμὸν εἰς περιπτώσεις τινὰς ἀνάγομεν τὴν λύσιν συστήματος β' βαθμοῦ εἰς τὴν λύσιν ἔξισώσεως τοῦ δευτέρου βαθμοῦ μὲ ἐνα ἄγνωστον. "Ητοι καταντῶμεν εἰς μίαν ἔξισωσιν τοῦ δευτέρου βαθμοῦ μὲ ἐνα ἄγνωστον, καὶ ἀφοῦ διὰ τῆς λύσεως ταύτης εὑρῷμεν τὰς τιμὰς τοῦ ἑνὸς ἀγνώστου, ἀντικαθιστῶντες αὐτὰς εἰς τὰς ἄλλας ἔξισώσεις τοῦ συστήματος, εὑρίσκομεν βαθμηδὸν τὰς τιμὰς τῶν ἄλλων ἀγνώστων.

β') Τοῦτο συμβαίνει π. χ. ἐὰν ἐκ δύο ἔξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους ἡ μία εἴνε πρώτου βαθμοῦ. Διότι, ἀντικαθιστῶντες τὴν τιμὴν τοῦ ἑνὸς ἀγνώστου ἐκ τῆς ἔξισώσεως, ἡ δοπία ἔχει τοὺς δύο εἰς πρώτον βαθμόν, εἰς τὴν ἄλλην ἔξισωσιν, εὑρίσκομεν ἔξισωσιν μὲ ἐνα ἄγνωστον εἰς δευτέρον βαθμόν.

γ') Τὸ αὐτὸ συμβαίνει ἐπίσης, ἐὰν εἰς δοθὲν σύστημα δύο ἔξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους δευτέρου βαθμοῦ οἱ ἀντίστοιχοι συντελεσταὶ τῶν ὅρων τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους ἔχουν τὸν αὐτὸν λόγον. Διότι διὰ τῆς ἀπαλοιφῆς τῶν ὅρων τούτων προκύπτει ἔξισωσις μὲ δύο ἀγνώστους εἰς πρῶτον βαθμόν.

"Εστω π. χ. τὸ σύστημα $3x^2 - 5x y - 4y^2 - 8x + 7y = 8,$

$$9x^2 - 15x y + 12y^2 + 11x - 3y = 32.$$

"Αν πολλαπλασιάσωμεν τὴν πρώτην ἐπὶ — 3 καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ 1, προσθέσωμεν δὲ τὰ ἔξαγόμενα κατὰ μέλης, εὑρίσκομεν τὴν ἔξισωσιν

$$35x - 24y = 8.$$

'Εὰν λύσωμεν ταύτην ὡς πρὸς τῶν ἀγνώστων καὶ ἀντικαταστήσωμεν τὴν τιμὴν τοῦ εἰς μίαν τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων, προκύπτει μία ἔξισωσις δευτέρου βαθμοῦ μὲ ἐνα ἄγνωστον.

δ') Εὰν καθεμία τῶν δύο ἔξισώσεων τοῦ συστήματος, ἐκτὸς τῶν σταθερῶν ὅρων, περιέχῃ μόνον ὅρους μὲ τὸ x^2 καὶ y^2 , διὰ διαιρέσεως λαμβάνομεν μίαν ἔξισωσιν ἔχουσαν ὡς ἀγνώστον τὸ $\frac{x}{y}$.

'Εὰν λύσωμεν ταύτην, μὲ τὴν βοήθειαν τῆς, δυνάμεθα νὰ λύσωμεν καθεμίαν τῶν δοθεισῶν, πρὸς εὗρεσιν τῶν τιμῶν τοῦ x καὶ y.

"Εστω π. χ. τὸ σύστημα $x^2 + 3x y - 5y^2 = 208, x y - 2y^2 = 16.$

Έκ τούτων διὰ διαιρέσεως τῆς πρώτης διὰ τῆς δευτέρας εὑρίσκομεν τὴν ἔξισωσιν $\frac{x^2 + 3xy - 5y^2}{xy - 2y^2} = \frac{208}{16} = 13$,

ἐκ τῆς δοπίας ἀν διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμητὴν καὶ παρανομαστὴν τοῦ πρώτου μέλους διὰ τοῦ y^2 , εὑρίσκομεν τὴν

$$\frac{\frac{x^2}{y^2} + 3 \frac{x}{y} - 5}{\frac{x}{y} - 2} = 13$$

$$\frac{x}{y} - 2$$

$$\frac{x^2}{y^2} + 3 \frac{x}{y} - 5 = 13 \left(\frac{x}{y} - 2 \right)$$

$$\frac{x^2}{y^2} - 10 \frac{x}{y} + 21 = 0.$$

Θεωροῦντες ὡς ἄγνωστον τὸν λόγον $\left(\frac{x}{y} \right)$ καὶ λύοντες τὴν τελευταίαν ἔξισωσιν εὑρίσκομεν $\frac{x}{y} = 7$, καὶ $\frac{x}{y} = 3$,

ἐκ τῶν δοπίων προκύπτει $x = 7y$, $x = 3y$.

Αντικαθιστῶντες τὰς τιμὰς αὐτὰς εἰς τὴν δευτέρουν τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων, εὑρίσκομεν $5y^2 = 16$ καὶ $y^2 = 16$, ἐκ τῶν δοπίων εὑρίσκομεν τὰς τιμὰς τοῦ y , καὶ ἀκολούθως τὰς τιμὰς τοῦ x .

ε) Αξία προσοχῆς εἶνε ἡ περίπτωσις καθ' ἥν ἐκ τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων εὑρίσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ x y , καὶ τὸ $(x+y)$, ἢ τὸ $(x-y)$. Διότι, ἐὰν εὔρωμεν $\pi.$ $x+y=a$, καὶ $x-y=b$, τότε τὰ x , y εἶνε αἱ φάσαι τῆς ἔξισώσεως τοῦ δευτέρου βιαθμοῦ, ἡ δοπία εἶνε τῆς μορφῆς $\omega^2 - a\omega + b = 0$.

Ἐάν εὔρωμεν ὅτι εἶνε $x-y=a$, καὶ $x+y=b$, τότε τὸ x , καὶ $(-y)$ εἶνε φάσαι τῆς ἔξισώσεως $\omega^2 - a\omega - b = 0$, Ἐπειδὴ τὸ γινόμενον x , $(-y) = -b$.

Α σκήσεις.

Ομάς πρώτη. Νὰ λύθουν καὶ ἐπαληθευθοῦν τὰ συστήματα.

$$\alpha') \quad 6x - 7x = 184 \quad \beta') \quad 3xy - 5x = 192 \quad \gamma') \quad 7x^2 - 3y^2 = 135 \\ 5x + 6y = 70. \quad 3x - 4y = 8. \quad 7x - 3y = 27.$$

$$\delta') \quad 5x^2 + 3y^2 = 2300 \quad \epsilon') \quad \frac{15}{x} + \frac{22}{y} = 5 \quad \sigma') \quad \frac{9}{x} - \frac{8}{y} = 1 \\ 3x - 2y = 40. \quad x + y = 16. \quad 2x + y = 10.$$

$$\zeta') \frac{5x-3y}{2x-y} = \frac{20}{9} \quad \eta') \frac{7}{x^2} - \frac{2}{y^2} = 103 \quad \theta) \frac{3}{x^2} - \frac{5}{y^2} + 33 = 0$$

$$x^2 + y^2 = 74, \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 11, \quad \frac{1}{x} - \frac{1}{y} + 1 = 0.$$

$$\epsilon') x - \sqrt{2y+4} = 9 \quad \alpha') \frac{7x+12y}{12x+7y} = \frac{26}{31} \quad \beta') \frac{8}{x} + \frac{9}{y} = 7.$$

$$3x-2y = 3, \quad 7x^2-12y^2 = 144, \quad 3x-y = 3.$$

Όμιλος δευτέρα. (Έκ της μιᾶς τῶν δύο έξισεων εὑρίσκομεν έξισεων πρώτου βαθμοῦ ὡς πρός τοὺς δύο άγνώστους).

$$\alpha') 9x^2 + 5x-7y = 25 \quad \beta') 2x^2-3xy + 9x = 29$$

$$(x+y)^2-3(x+y) = 10, \quad (x-y)^2+7(x-y) = 30,$$

$$\gamma') 44x^2-11xy + 4y^2 = 221 \quad \delta') 8x^2-2xy + 7y^2 = 527$$

$$(2x-3y)^2 + 4(2x-3y) = 5, \quad (3x+y)^2-9(3x+y)-20=0.$$

$$\epsilon') \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 21 \quad \sigma') \frac{2x+3y}{13} = \frac{4}{2x-3y}$$

$$(x+y+7)(x+y-5) = 64, \quad (12-x+y)(x-y+1) = 12(x-y).$$

$$\zeta') 4x^2-20xy + 25y^2-12x + 30y = -9$$

$$5x^2-7xy + 4y^2-3x + 2y = 46.$$

$$\eta') 9x^2-12xy + 4y^2+12x-8y + 4 = 0$$

$$3x^2-5xy + y^2+x+y+6 = 0.$$

$$\theta') 3(8x^2 + 7y^2-4) = 20(5x^2-11y^2 + 6)$$

$$\sqrt{27x-36y+4} = 6x-8y-3.$$

$$\iota') 7(x-2\sqrt{21x-6y-2}) = 2(y-25)$$

$$13x^2-3y^2 = 4,$$

Όμιλος τρίτη. (Προσδιορίζεται πρώτον ὁ λόγος $\frac{x}{y}$).

$$\alpha') x^2+y^2 = 100 \quad \beta') x^2-y^2 = 56 \quad \gamma') 24y(x-5y) = (x+2y)(5x-28y)$$

$$x:y = 3:4, \quad x:y = 9:5, \quad 5x^2-12y^2 = 32.$$

$$\delta') x^2+xy+y^2 = 79 \quad \epsilon') x^2-xy+y^2 = 91 \quad \sigma') (x+4)^2 = xy$$

$$(x+y):(x-y) = 5:2, \quad (x+y):(x-y) = 8:3, \quad y^2 = (y+9)(x+4)$$

$$\zeta') (x^2+y^2)(x+y) = 1080 \quad \eta') (x^2-y^2)(2x-3y) = 192$$

$$(x^2+y^2)(x-y) = 540, \quad (x^2-y^2)(3x+y) = 1344.$$

Όμιλος τετάρτη. (Θεωρήστε νέας μεταβλητὰς τὰ $x+y$, xy : $x-y$).

$$\alpha') x^2-xy = 14 \quad \beta') x^2+y^2 = 73 \quad \gamma') x^2+y^2 = 97 \quad \delta') x^2+y^2 = 586$$

$$xy-y^2 = 10, \quad x+y = 24, \quad xy = 36, \quad x+y = 34.$$

$$\epsilon') x^2+y^2 = 125, \quad \sigma') x^2+y^2 = 585, \quad \zeta') x^2+y^2 = \frac{25}{36}$$

$$3xy = 150, \quad 4xy = 258, \quad 6xy = 2.$$

$$\eta') x^2+xy+y = 121 \quad \theta') x^2-y^2 = 87 \quad \iota') x^2+xy = 187$$

$$x^2+xy+x = 61, \quad x-y = 3, \quad y^2+xy = 102.$$

$$\alpha') x^2+9y^2 = 136 \quad \beta') 3(x+y)^2-5(x+y) = 50$$

$$x-3y = 4, \quad 5(x-y)^2+6(x-y) = 11.$$

**Ομάς πέμπτη.* (Θεωρήσατε νίας μεταβλητὰς τὰ x y , $x^2 + y^2$ ἢ τὸ $x \pm y$),

$$\alpha') x+y = 21 - \sqrt{xy} \quad \beta') 2(x^2+y^2)^2 - 7(x^2+y^2) = 1479$$

$$x^2+y^2 = 257. \quad 3x^2y^2 - 2 \frac{1}{2} xy - 275 = 0.$$

$$\gamma') x^2 + y^2 = \sqrt{x^2y^2 + 273} \quad \delta') x^3 - y^3 = 24(x-y)$$

$$x:y+y:x = 4 \frac{1}{4}. \quad x-3:y = 2 \frac{xy-1}{xy+2y}.$$

$$\varepsilon') x+y + \sqrt{x+y-2} = 14 \quad \sigma') \frac{2(x+y)-7}{5(x+y-4)} = \frac{5}{6} - \frac{2}{x+y}$$

$$\frac{x^2y^2}{3} - \frac{3xy}{4} = 174. \quad \mathbf{x:y = 40:y:(x+3y).}$$

**Ομάς έκτη.* Νὰ λυθοῦν τὰ συστήματα

$$\alpha') x^3+y^3 = \frac{1}{3} \quad \beta') x^3-y^3 = 728$$

$$\frac{x+y+5}{2} - \frac{4}{x+y+1} = 1. \quad \sqrt{\frac{x-y+2}{x-y-1}} + \sqrt{\frac{x-y-1}{x-y+2}} = \frac{5}{2}.$$

$$\gamma') x^3+y^3 = 973 \quad \delta') x^3+y^3 = 19 \quad \varepsilon') x^3-y^3 = 341$$

$$(x-y)^2 - 7(x+y) = 90 - xy. \quad x+y = 4. \quad x-y = 11.$$

$$\sigma\tau') \sqrt{-x}(\sqrt{-x^3} + \sqrt{-y^3}) = 273 \quad \zeta') \frac{xy}{x^2+y^2+\omega^2} = 72$$

$$x\sqrt{-xy} + y^2 = 364. \quad \frac{x+y+\omega}{x+y+\omega} = 29.$$

$$\eta') x^2 - y\sqrt{-xy} = 535 \quad \theta') x^2+y^2 = 40 \quad \frac{y^2+\omega^2-x(y+\omega)}{xy-\omega} = 25$$

$$y^2 = x\sqrt{-xy} - 234. \quad \frac{\omega^2+x^2-y(\omega+x)}{x+y-8} = 16 \quad \frac{y^2+y^2-\omega(x+y)}{y^2} = 9.$$

§ 122. Προβλήματα ἔξισώσεων τοῦ 6' βαθμοῦ.—

Διὰ τὴν λύσιν προβλήματός τυνος ἔξισώσεως τοῦ β' βαθμοῦ ἀκολουθοῦμεν τὴν πορείαν, τὴν δόποίαν ἡκολουθήσαμεν καὶ διὰ τὴν λύσιν τῶν προβλήματων τῶν ἔξισώσεων τοῦ πρώτου βαθμοῦ. Πρὸς ἐφαρμογὴν λύομεν ἀπλᾶ τινα προβλήματα ἔξισώσεων τοῦ δευτέρου βαθμοῦ.

(Πρόβλημα 1). «Τίνος ἀριθμοῦ τὸ ἄθροισμα τοῦ τετραγώνου τοῦ καὶ τοῦ διπλασίου τοῦ ἀριθμοῦ ηὐξημένον κατὰ 1 λειπεῖται μὲ 86;».

Ἐστω x ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς, τὸν ὅποιον ζητοῦμεν. Ἐπειδὴ τὸ τετράγωνον τοῦ x εἶνε x^2 , τὸ διπλάσιον τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ θὰ εἶνε $3x^2$, τὸ δὲ διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ $2x$. Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν $3x^2 + 2x + 1 = 86$.

Λύοντες ταύτην εύρισκομεν $x = 5$, $x = -\frac{17}{3}$. Επομένως δέ ζητούμενος ἀριθμός εἶνε δέ 5 ή δέ $-\frac{17}{3}$.

(Πρόβλημα 2). «Διὰ τίνος ἀριθμοῦ πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸν 96, ἵνα τὸ πηλίκον ὑπερβαίνῃ κατὰ 4 τὸν διαιρέτην;»

Αν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, θά ἔχωμεν $\frac{96}{x} - x = 4$, η̄ $x^2 + 4x - 96 = 0$.

Λύοντες αὐτὴν εύρισκομεν $x = 8$.

(Πρόβλημα 3). «Τὸ γινόμενον τῶν δρων κλάσματος εἶνε 120, οἱ δροι θὰ ἤσαν ἵσοι, ἐὰν ἀφγροῦμεν 1 ἀπὸ τὸν παρονομαστήν καὶ ἐπροσθέτομεν 1 εἰς τὸν ἀριθμητήν. Ποῖον εἶνε τὸ κλάσμα;»

Ἐὰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν ἀριθμητήν, δέ παρανομαστὴς θά εἶνε $\frac{120}{x}$ καὶ θὰ ἔχωμεν $x + 1 = \frac{120}{x} - 1$ η̄

$$x(x+2) = 120 \quad \text{καὶ} \quad x = 10, \quad x = -12.$$

Επομένως τὸ ζητούμενον κλάσμα θὰ εἴης η̄ τὸ $\frac{10}{12}$, η̄ τὸ $\frac{12}{10}$.

(Πρόβλημα 4). «Τις εἶνε δέ ἀριθμός, τοῦ δόποιου τὰ $\frac{3}{4}$ αὐξάνομενα κατὰ 1 δίδουν 16 διηρημένον διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, τὸν δόποιον ἀποτελοῦν τὸ $\frac{4}{5}$ τοῦ ζητουμένου πλὴν 15;»

Αν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν $\left(\frac{3}{4}x + 1\right) = \frac{16}{\left(\frac{4}{5}x - 15\right)}$

Ἐκ τῆς δόποιας εύρισκον $x = 20$, καὶ $x = -\frac{31}{12}$.

(Πρόβλημα 5). «Νὰ εὑρεθοῦν δύο ἀριθμοὶ περιττοὶ διαδοχικοὶ τοιοῦτοι, ὡστε η̄ διαφορὰ τῶν τετραγώνων των νὰ εἴη 8000.»

Ἐστωσαν $2x - 1$, καὶ $2x + 1$ οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι. Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν θὰ ἔχωμεν $(2x + 1)^2 - (2x - 1)^2 = 8000$, η̄ $8x = 8000$, καὶ $x = 1000$.

Επομένως οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ θὰ εἴηνε 2001, καὶ 1999.

(Πρόβλημα 6). «Τρεῖς ἀριθμοὶ εἰνὲ ἀνάλογοι τῶν 3·2·5· τὸ ἀθροίσμα τῶν τετραγώνων των εἰνε ἵσον μὲ 342· νὰ εὑρεθοῦν οἱ ἀριθμοὶ».

"Εστωσαν $3x$, $2x$, $5x$ οἱ τρεῖς ἀριθμοί. Θὰ ἔχωμεν ὅτι

$$9x^2 + 4x^2 + 25x^2 = 342,$$

ἐκ τῆς δοπίας εὑρίσκομεν $x = \pm 3$. Ἐπομένως οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ εἰνε $\pm 9 \cdot \pm 6 \cdot \pm 15$.

(Πρόβλημα 7). «Νὰ εὑρεθοῦν τρεῖς ἀκέραιοι διαδοχικοὶ ἀριθμοὶ τοιοῦτοι, ὥστε τὸ γινόμενόν των νὰ ἴσοιται μὲ τὸ πενταπλάσιον τοῦ ἀθροίσματός των».

"Εστωσαν $x-1$, x καὶ $x+1$ οἱ τρεῖς ἀριθμοί.

$$\text{Θὰ } \overset{\text{ἔχωμεν}}{(x-1) \cdot x \cdot (x+1)} = 5(x-1+x+x+1)$$

$$\text{ἢ } (x^2-1) \cdot x = 15x.$$

Ἐκ ταύτης εὑρίσκομεν $x = \pm 4$, καὶ $x = 0$. Ἀρα οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ εἰνε οἱ 3·4·5, ἢ οἱ $-5 \cdot -4 \cdot -3$, ἢ οἱ $-1 \cdot 0 \cdot +1$.

(Πρόβλημα 8). «Νὰ εὑρεθοῦν τρεῖς ἀριθμοὶ ἀκέραιοι διαδοχικοὶ τοιοῦτοι, ὥστε δὲ κύβος τοῦ μεγαλυτέρου των νὰ ἴσοιται μὲ τὸ τριπλάσιον τοῦ ἀθροίσματος τῶν κύβων τῶν δύο ἄλλων».

"Εστωσαν x , $x+1$, καὶ $x+2$ οἱ τρεῖς διαδοχικοὶ ἀκέραιοι ἀριθμοί. Θὰ ἔχωμεν

$$(x+2)^2 = 3[(x+1)^3 + x^3]$$

$$\text{ἢ } 5x^3 + 3x^2 - 3x - 5 = 0.$$

Ἡ ἔξισωσις αὕτη εἰνε ἀντίστροφος τοῦ τρίτου βαθμοῦ, τῆς δοπίας ἡ μία ρίζα εἰνε 1, αἱ δὲ δύο ἄλλαι φανταστικαί. Ἐπομένως οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ εἰνε οἱ 1·2·3.

(Πρόβλημα 9). «Ἐγευματισαν 15 ἀτομα· πάντες οἱ ἀνδρες ἐπλήρωσαν 36 δρχ., καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες 36 δρχ. Πόσοι ἦσαν οἱ ἀνδρες, πόσαι αἱ γυναῖκες, κοι πόσα ἐξώδευσε καθεὶς, ἐὰν καθεμία γυνὴ ἐδαπάνησε 2 δρχ. διλγώτερον καθενὸς ἀνδρός;»

"Εστω x ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν, δτε $15 - x$, θὰ εἰνε ὁ ἀριθμὸς τῶν γυναικῶν. Ἡ δαπάνη καθενὸς ἀνδρὸς θά εἰνε $\frac{36}{x}$ καθεμιᾶς δέ γυναικὸς $\frac{36}{15-x}$. Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ προβλήματος θὰ

$$\text{Έχωμεν } \frac{36}{15-x} = \frac{36}{x} - 2$$

$$\text{η} \quad x^2 - 54x + 270 = 0, \quad \text{καὶ} \quad x = \frac{51 \pm 39}{2}.$$

Ἐκ τῶν δύο σημείων ἀπορρίπτεται τὸ +, διότι ὅταν $x = \frac{51+39}{2} = 45$ θὰ ἔχωμεν 45 ἄνδρας, ἐνῶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἥσαν 15. Ὡστε εὐρίσκομεν 6 ἄνδρας καὶ 9 γυναῖκας.

(Πρόβλημα 10 *). «Σῶμά τι ἐργίφθη κατακορύφως πρὸς τὰ ἄνω (ἐν τῷ κενῷ) μὲν ἀρχικὴν ταχύτητα α. Μετὰ πόσον χρόνον θὰ φθάσῃ εἰς ὑψος ν;»

Τὸ σῶμα κινεῖται πρὸς τὰ ἄνω μὲν κίνησιν ὅμαλῶς ἐπιβραδυνομένην. Ἀν λοιπὸν παραστήσωμεν διὰ τοῦ τὸν ζητούμενον χρόνον, θὰ ἔχωμεν τοὺς ἔξις τύπους, γνωστοὺς ἐκ τῆς Φυσικῆς

$$v = at - g \frac{t^2}{2}, \quad t = a - gt, \quad (1)$$

ὅπου τὸ τ παριστάνει τὴν ταχύτητα τοῦ κινητοῦ κατὰ τὴν στιγμὴν t , καὶ g τὴν ἐπιτάχυνσιν. Ἐκ τῆς πρώτης ἔξισώσεως εὐρίσκομεν $:gt^2 - 2at + 2v = 0$.

Ἐκ τῆς λύσεως ταύτης εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ t .

Διερεύνησις. Ἡ συνθήκη διὰ νὰ εἶνε αἱ φίζαι πραγματικά εἶνε $\alpha^2 - 2gv > 0$, ἢ $v < \frac{\alpha^2}{2g}$. Ἐπομένως $v = \frac{\alpha^2}{2g}$ εἶνε τὸ μέγιστον ὕψος, εἰς τὸ διποῖον δύναται νὰ φθάσῃ τὸ κινητόν, ἀν φιφθῇ μὲ ταχύτητα ἀρχικὴν a . Ἐὰν εἶνε $v = \frac{\alpha^2}{2g}$ αἱ δύο φίζαι εἶνε ἔσαι μὲ $\frac{\alpha}{g}$. Ἐπομένως φίειάζεται $\frac{x}{g}$ χρόνον, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ μέγιστον ὕψος τὸ κινητόν. Εἰς τὸ ἀνώτατον αὐτὸ σημεῖον θὰ ἔχῃ ταχύτητα ἔσην μὲ μηδέν. Ἀντικαθιστῶντες πράγματι εἰς τὴν δευτέραν τῶν ἔξισώσεων (1) τὸ t διὰ τοῦ $\frac{x}{g}$, εὐρίσκομεν ἔξαγόμενον ἔσον μὲ μηδέν. Ἡτοι $t = a - \frac{g\alpha^2}{g} = 0$. Ἐὰν εἶνε $v < \frac{\alpha^2}{2g}$ αἱ δύο φίζαι τῆς πρώτης τῶν ἔξισώσεων (1) εἶνε πραγματικά, ἀνιστοι καὶ θετικαί, ὁ δὲ ὁ τύπος ὁ διποῖος δίδει αὐτὰς εἶνε ὁ

$$t = \frac{\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 2gv}}{g}$$

Καὶ αἱ δύο αὐταὶ τιμαὶ τοῦ τὸ ἀριθμόζουν εἰς τὸ πρόβλημα. Διότε τὸ σῶμα διέρχεται δύο φοράς διὰ καθενὸς σημείου, κειμένου ἐντὸς τοῦ ὕψους v , μίαν ἀνερχόμενον καὶ μίαν κατερχόμενον. Αἱ δύο αὐταὶ στιγμαὶ εἰνεὶ λσαπεχεῖς ἀπὸ τῆς στιγμῆς $\frac{a}{g}$ κατὰ τὴν ὅποιαν τὸ κινητὸν φθάνει εἰς τὸ μέγιστον ὕψος του. Εἰνεὶ εὔκολον νὰ ἴδωμεν, ὅτι κατὰ τὰς δύο αὐτὰς στιγμὰς αἱ ταχύτητες εἰνεὶ ἴσαι καὶ ἀντίθετοι.

Ἐὰν τεθῇ $v = 0$, θὰ ἔχωμεν $t = 0$, καὶ $t = \frac{2a}{g}$.

Τὸ $\frac{2a}{g}$ παριστάνει τὸν χρόνον μετὰ τὸν ὅποιον τὸ κινητὸν ἐπαναπίπτει εἰς τὸ σημεῖον ἐκ τοῦ ὅποιου ἀνεχώρησεν. "Οὐδὲν δὲ χρόνος καθ' ὃν γίνεται ἡ ἀνάβασις λοιποῦται μὲ τὸν χρόνον καθ' ὃν γίνεται ἡ κατάβασις τοῦ κιτητοῦ.

(Πρόβλημα 11 *). «Νὰ εὑρεθῇ τὸ βάθος φρέατος ἀν ἐπέρασαν τὸ δεύτερα λεπτὰ ἀφ' ὅτου ἀφέθη νὰ πέσῃ λίθος ἐκ τοῦ στομίου του, μέχρις ὅτου ἡκούσθη ὁ κρότος, ὁ παραχθεὶς ἐκ τῆς πτώσεως τοῦ λίθου εἰς τὸν πυθμένα τοῦ φρέατος. (Ἡ ἀντίστασις τοῦ ἀέρος παραβλέπεται)».

Παριστάνομεν διὰ τοῦ x τὸ βάθος τοῦ φρέατος, καὶ διὰ τὴν ταχύτητα τοῦ ἥχου εἰς τὸν ἀέρα.

"Ο χρόνος τὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη.

- 1) Ἀπὸ τὸν χρόνον t_1 , τὸν ὅποιον χρειάζεται ὁ λίθος διὰ νὰ πέσῃ.
- 2) Ἀπὸ τὸν χρόνον t_2 τὸν ὅποιον χρειάζεται ὁ ἥχος διὰ νὰ ἀνέλθῃ ἐκ τοῦ πυθμένος τοῦ φρέατος εἰς τὴν ἀπόστασιν x .

Ἐχομεν τὸν ἔξῆς τύπον (ἐκ τῆς Φυσικῆς) $x = \frac{1}{2} g t_1^2$

ὅστις δίδει τὸ διάστημα διὰ τοῦ χρόνου κατὰ τὴν ὅμαλῶς ἐπιταχυνομένην κίνησιν, ὅποια εἰνεὶ καὶ ἡ πτῶσις τοῦ λίθου.

$$\text{Έκ ταύτης προκύπτει } t_1 = \sqrt{\frac{2x}{g}} \quad (1)$$

Έκ τοῦ τύπου $x = \tau \cdot t_2$, ὅστις δίδει τὸ διάστημα διὰ τῆς ταχύτητος τ καὶ τοῦ χρόνου t_2 κατὰ τὴν ὅμαλὴν κίνησιν τοῦ ἥχου, εὑρίσκομεν $t_2 = \frac{x}{\tau}$.

"Έχομεν λοιπὸν τὴν ἔξισωσιν

$$\sqrt{\frac{2x}{g}} + \frac{x}{\tau} = t, \quad \text{ἢ} \quad \sqrt{\frac{2x}{g}} = t - \frac{x}{\tau} \quad (2)$$

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν, ὑψοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον καὶ διατάσσοντες κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ x

$$g x^2 - 2\tau(gt + \tau)x + g\tau^2 t^2 = 0 \quad (3)$$

'Επειδὴ τὸ t_1 εἶνε θετικόν (1) ἢ (2) τὸ ἵσον τοῦ $t - \frac{x}{\tau}$, πρέπει νὰ εἶνε

$$t - \frac{x}{\tau} > 0, \quad \text{ἢ} \quad x < \tau t. \quad (4)$$

"Ινα αἱ φίζαι τῆς (3) εἶνε πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ, πρέπει νὰ εἶνε θετικὸν τὸ $\tau^2(\tau + g t)^2 - g^2 \tau^2 t^2$, ἢ τὸ $\tau^3(\tau + 2gt)$, τὸ ὅποιον πράγματι συμβαίνει. 'Εξ ἄλλου παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ γινόμενον τῶν φίζῶν εἶνε $t^2 \tau^2$, τὸ δὲ ἀνθροισμά των $\frac{2\tau(gt + \tau)}{g}$, ἀτινα εἶνε θετικά. 'Επομένως αἱ δύο φίζαι εἶνε θετικαί.


'Αλλ' ἐπειδὴ πρέπει νὰ εἶνε (4) τὸ $x < \tau t$ (καὶ τὸ γινόμενον τῶν φίζῶν εἶνε $\tau \cdot t \cdot \tau \cdot t$, εἶνε δὲ αὗται ἀνισοὶ), ἔπειται ὅτι ἡ μία τῶν φίζῶν εἶνε μεγαλυτέρα τοῦ $\tau \cdot t$ καὶ ἡ ἄλλη μικροτέρα, ἥτις καὶ θὰ εἶνε δεκτὴ διὰ τὸ πρόβλημα.

'Ἐκ τῆς λύσεως τῆς (3) εὐρίσκομεν τὴν ζητουμένην τιμήν, ἡ ὅποια ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ σημεῖον πλὴν τοῦ φίζικοῦ. "Ητοι ἔχομεν

$$x = \frac{\tau}{g} \left(\tau + gt - \sqrt{\tau(\tau + 2gt)} \right).$$

(Πρόβλημα τῆς χρυσῆς τομῆς 12 *). «Δοθεῖσαν εὐθεῖαν μήκους a νὰ διαιρέσωμεν εἰς μέσον καὶ ἀκρον λόγον». *

'Εὰν παραστήσωμεν διὰ τοῦ x τὸ μῆκος τῆς δοθείσης εὐθείας καὶ ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ σημεῖον Γ διαιρεῖ τὴν $(AB) = a$ εἰς δύο



(Σχ. 11)

μέρη, τὰ $(AG) = x$ καὶ $(GB) = a - x$, ἐκ τῶν ὅποιων τὸ x εἶνε μέσον ἀνάλογον τῶν a , καὶ $a - x$, θὰ ἔχωμεν $\frac{a}{x} = \frac{x}{a-x}$
ἢ $x^2 + ax - a^2 = 0$.

Ἐκ τῆς λύσεως ταύτης εὑρίσκομεν

$$x = \frac{-\alpha + \sqrt{5\alpha^2}}{2} = \frac{\alpha(\pm \sqrt{5}-1)}{2}$$

Διερεύνησοις. ΑἽ δύο ρίζαι τῆς ἔξισώσεως εἰνε πραγματικαὶ καὶ μὲ σημεῖα ἀντίθετα, ἐπειδὴ τὸ γινόμενόν των εἶνε — α^2 . Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ $\sqrt{5}$ περιέχεται μεταξὺ 2 καὶ 3. Ἐπομένως ἡ πρώτη ρίζα, ἡ ἀντιστοιχοῦσα εἰς τὸ σημεῖον σὺν τοῦ ριζικοῦ, θὰ εἶνε θετικὴ καὶ μικροτέρα τοῦ α , ἀρά δίδει τὴν ζητουμένην λύσιν. Ἡ ἄλλη ρίζα ἀπορρίπτεται ὡς ἀρνητική. "Ωστε ἔχομεν

$$x = \frac{\alpha(\sqrt{5}-1)}{2}. \quad \text{Τὸ σημεῖον } \Gamma \text{ κεῖται πέραν τοῦ μέσου τῆς } AB$$

ἀπὸ τοῦ A. Διότι τὸ x ἔχει τιμὴν μεγαλυτέραν τοῦ $\frac{\alpha}{2}$.

(Πρόβλημα 13). «Νὰ μερισθῇ δ 27 εἰς δύο μέρη τοιαῦτα, ὥστε τὸ τετραπλάσιον τοῦ τετραγώνου τοῦ πρώτου να ἡ τὸ πενταπλάσιον τοῦ τετραγώνου τοῦ δευτέρου νὰ ἀποτελοῦν 1620».

Ἐὰν διὰ τοῦ x καὶ y παραστήσωμεν τὰ δύο μέρη, θὰ ἔχωμεν

$$x + y = 27, \quad 4x^2 + 5y^2 = 1620.$$

Απαλείφοντες τὸν x εὑρίσκομεν $y^2 - 24y + 144 = 0$ καὶ $y = 12$. Ἀρα $x = 15$, καὶ $y = 12$.

(Πρόβλημα 14). «Νὰ εὑρεθοῦν αἱ διαστάσεις δροθογωνίου, τοῦ δποίου ἡ διαγώνιος εἶνε 17 μ. τὸ δὲ ἔμβαδὸν 120 (μ^2)».

Ἐὰν διὰ x καὶ y παραστήσωμεν τὰς ζητουμένας διαστάσεις, ἔχομεν $x y = 120$, $x^2 + y^2 = 17^2 = 289$.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ συστήματος εὑρίσκομεν $x = 15$, $y = 8$.

(Πρόβλημα 15). «Εἰς κύκλον διαμέτρου 25 μ. νὰ ἐγγραφῇ δροθογωνίον, τοῦ δποίου αἱ πλευραὶ νὰ ἔχουν διαφορὰν 17 μ.».

Ἄν διὰ τοῦ x, y παραστήσωμεν τὰς ζητουμένας διαστάσεις, θὰ ἔχωμεν $x - y = 17$, $x^2 + y^2 = 25^2 = 625$.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ συστήματος εὑρίσκομεν $x = 24$, $y = 7$.

(Πρόβλημα 16). «Δίδεται τρίγωνόν τι $ABΓ$. Νὰ προσδιορισθῇ σημεῖον Δ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς AB , ὃστε ἂν ἀπὸ τούτου ἀχθῇ παράλληλος πρὸς τὴν ἀπέναντι τῆς κορυφῆς A πλευρὴν, νὰ διαρήται τὰ τρίγωνα εἰς δύο μέρη ἵσοδύναμα».

Παριστάνομεν διὰ τοῦ α τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς ΑΒ καὶ διὰ τὴν ρήτην ζητούμενην ἀπόστασιν ΑΔ. Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ τρίγωνα ΑΒΓ, ΑΔΕ (ΑΕ εἶνε παράλληλος τῆς ΓΒ) θὰ εἶναι ὅμοια, ὡς ἔχοντα τὰς γωνίας των ἵσας. Ἐπομένως τὰ ἐμβαδά των θὰ εἶναι ἀνάλογα τῶν τετραγώνων τῶν ὁμοιούγων των πλευρῶν. Ἡτοι θὰ

$$\text{εἶνε } \frac{(\Delta \text{DE})}{(\Delta \text{BG})} = \frac{x^2}{\alpha^2}.$$

'Αλλ' ὁ λόγος αὐτὸς ἴσος ἔται μὲ $\frac{1}{2}$ κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τιῦ προβλήματος' ἥτοι ἔχομεν $\frac{x^2}{\alpha^2} = \frac{1}{2}$ καὶ $x^2 = \frac{\alpha^2}{2}$, $x = \frac{\alpha\sqrt{2}}{2}$ (ἀπορριπτούμενης τῆς ἀρνητικῆς τιμῆς τοῦ x).

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Όμάς πρώτη. 1) Τίνος ἀριθμοῦ τὸ $\frac{1}{4} \left(\frac{1}{6} \right)$ ἐπὶ τὸ $\frac{1}{5} \left(\frac{1}{11} \right)$ αὐτοῦ συσται μὲ 80 (16,5); 40 (33).

2) Διὰ τίνος ἀριθμοῦ διαιρούμενος ὁ 147 (384), δίδει τὸ 3 (6) πλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ; 7 (8).

3) Τίς ὁ μικρότερος δύο ἀριθμῶν, διαιφερόντων κατὰ 3 (7), ἢν ἔχουν γινόμενον 54 (198); 6·9 (11·18).

4) Τίς ἀκέραιος ἀριθμός εἶνε κατὰ 29 (55) μικρότερος τοῦ τετραγώνου, τοῦ κατὰ μονάδα μικροτέρου του; 7·4 (9·6).

5) Εὕρετε δύο ἀριθμούς, ἔχοντας γινόμενον 2 (1), ἢν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀντιστρόφων των ἴσος μὲ 1 $\frac{5}{12}$ (2). $\frac{3}{2}, \frac{4}{3}$ (1·1).

6) Εὕρετε κλάσμα, τοῦ ὅποίου ὁ ἀριθμητὴς εἶνε κατὰ 4 (1) μικρότερος (μεγαλύτερος) τοῦ παρανομαστοῦ. Ἐὰν αὐξηθῇ (ἐλαττωθῇ) ὁ ἀριθμητὴς κατὰ 7 (1) καὶ ἐλαττωθῇ ὁ παρανομαστὴς κατὰ 5 (1) διαιφέρει τοῦ προηγουμένου κατὰ $1 \frac{1}{15}$ (4) $\pm \frac{11}{5}$ (ἀόριστον).

Όμάς δευτέρα. 1) Τίς ἀκέραιος ἀριθμός εἶνε κατὰ 29 (55) μικρότερος τοῦ τετραγώνου, τοῦ κατὰ μονάδα μικροτέρου του; 7·4 (9·6).

2) Εὕρετε διψήφιον ἀριθμὸν δστις, ἢν προστεθῇ εἰς τὸν 9 (27) νὰ δίδῃ τὸν προκύπτοντα δι' ἐναλλαγῆς τῶν ψηφίων του. ἢν διαιφεθῇ δὲ διὰ τοῦ γινομένου τῶν ψηφίων του νὰ δίδῃ 6 (2) 12 (36).

3) Ἐπλήρωσέ τις 160 (300) δρχ. διὰ καφὲ καὶ 180 (500) δρχ. διὰ τέιον, ἔλαβε δὲ 40 (60) γρ. καφὲ ἐπὶ πλέον τοῦ τείου. Πόσον ἐκόστιζε τὸ χρ. τοῦ καφέ, ἢν τοῦ τείου ἐκόστιζε 5 (5) δρχ. ἐπὶ πλέον; 2,5 (2,34).

4) Εἰς ἑκδρομὴν αἱ γυναικεῖς ἡσαν 3 (7) ὀλιγώτεραι (περισσότεραι) τῶν ἄνδρων. "Αν οἱ ἄνδρες ἐπλήρωσαν ἐν ὅλῳ 1750 (1800 δρχ. αἱ γυναικεῖς 800 (500) δρχ. πόσοι ἡσαν ἄνδρες καὶ γυναικεῖς, ἐὰν καθεὶς τῶν ἄνδρων ἐπλήρωσε 50 (100) δρχ. περὶ σαστέρον ἡ καθεμία γυνῆ;

15 ἢ 7 (ἀδύνατον).

5) Εἰς 27 (50) πρόσωπα ἐπληρώθησαν 21 (65,4) δρχ. διὰ τοὺς ἄνδρας καὶ 42 (80) διὰ τὰς γυναικας. Πόσαι ἡσαν αἱ γυναικεῖς, ἂν καθεμία ἐπληρώνετο 1,50 (2) δρχ. ὀλιγώτερον τοῦ ἄνδρος; 21 (ἀδύνατον).

6) Εἰς πόσας ὥρας διανύει κινητὸν δρόμον 180 (250) χμ. ἐὰν ἐκέρδιζε (ἔχανε) 40' (6 ᾁρ.), διανύον 9 (5) χμ. καθ' ὥραν ἐπὶ πλέον (ὀλιγώτερον); 4 (20,78).

7) Ἐπλήρωσαν δι' οἶνον 30 (50) δρχ. Ἐὰν ἡ φιάλη ἐκόστιζε 25 (50) λ. ὀλιγώτερον (περισσότερον) θὰ ἐλάμβανε 4 (2) φιάλας περισσοτέρας (ὸλιγωτέρας). Πόσας φιάλας ἡγόρασε; 20 (ἀδύνατον).

8) Ἐπλήρωσέ τις διὰ τέτον 224 (350) δρχ. Ἐπειὸν τὸ χιλιόγρ. ἐκόστιζε 0,6 (1) δρχ. περισσότερον (ὸλιγώτερον) ἢ ὅσον ἐνόμιζεν, ἔλαβε 3 (10) χρ. ὀλιγώτερον (περισσότερον). Πόσον ἐκόστιζε τὸ χιλιόγρ.; 6,4 (6,44...).

9) Ἐμπορος μετεπώλησεν ἔπιπλον ἀντὶ 144 (39) δρχ., κερδίσας τόσα τοῖς ἐκατόν, ὅσον τὸ ἡγόρασε. Πόσον ἐπλήρωσε διὰ τὴν ἀγοράν του; 80 (30).

10) Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμὸς ἀκέραιος, τοῦ ὁποίου τὸ ἄθροισμα (ἢ διαφορὰ) μὲν (ἀπὸ) τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν του εἴνε 272 (1332). 256 (1369).

Όμιλος τρίτη. 1) Κεφαλαίον ἐτοκίσθη πρὸς πρὸς 4 % κατ' ἔτος. Πολλαπλασιάζομενον ἐπὶ τὸν τόκον του εἰς 5 μῆνας γίνεται $117041 \frac{2}{3}$. Πόσον ἦτο; 2650.

2) Ποσὸν 86 $\frac{1}{4}$ δρχ. πρόκειται νὰ μοιρασθῇ εἰς πτωχούς. Ἐὰν οὗτοι ἡσαν κατὰ 6 ὀλιγώτεροι, θὰ ἐλάμβανεν ἔκκπτος 2 δρχ. περισσοτέρος. Πόσοι εἴνει οι πτωχοί; 54.

3) Δύο ἔμποροι πωλήσαντες ὑφάσματα, ὁ α' 3 πήγ. ὀλιγώτερον τοῦ β', ἔλαβον μαζὶ 35 δρχ. "Αν ὁ α' ἐπώλει ὅσον ὁ β', θὰ ἐλάμβανεν 24 δρχ. "Αν ὁ β' ἐπώλει ὅσον ὁ α', θὰ ἐλάμβανε 12,5 δρχ. Πόσους πήγεις ἐπώλησε καθεὶς;

15 ἢ 5·18 ἢ 8.

4) Δύο ἔμποροι ἐκέρδισαν ἐξ ἐπιχειρήσεως 660 δρχ., ἐνῶ ὁ α' εἶχε διαθέσει 600 δρχ. περισσοτέρας τοῦ β', Πόσας δρχ. εἶχε διαθέσει ὁ α', ἐὰν ἐλαβεν ἐν ὅλῳ 3960 δρχ.; 3600.

5) Δύο ἔμποροι κατέθεσαν ὁμοῦ 5000 δρχ. δι' ἐπιχειρήσιν καὶ ἔλαβεν ὁ μὲν α' 2544 δρχ. μετὰ 9 μῆνας, ὁ δὲ β' 2860 δρχ., μετὰ 15 μ. Πόσας δρχ. + απέθεσε καθεὶς; 2400·2600

6) Κεφαλαιον 1300 δργ. ἔχωρίσθη εἰς δύο ἀνισαχ μέρη, τὰ ὅποια, τοκισθέντα
μὲ διάφορα ἐπιτόκια, ἔδιδον τὸν αὐτὸν ἑτάσιον τόκον. Ἐὰν τὸ α' ἐτοκίζετο μὲ
τὸ ἐπιτόκιον τοῦ β', θὰ ἔδιδεν ἑτασίας 360 δργ. Ἐὰν τὸ β' ἐτοκίζετο μὲ τὸ ἐπιτόκιον
τοῦ α', θὰ ἔδιδε 490 δργ. Τίνα τὰ ἐπιτόκια;

7·6.

*Ομάς τετάρτη. (Γεωμετρικά). 1) Πόσον εἶνε τὸ πλῆθος σημείων μεταξὺ^{τῶν}
ὅποιων δυνάμεθα νὰ φέρωμεν 78 (300) εὐθείας, συνδεούσας αὐτὰ ἀνὰ δύο;

13 (25).

2) Ποιὸν πολύγωνον ἔχει 104 (189) διαγωνίους;

16 (21).

3) Ἐκ δύο πολυγώνων τὸ α' ἔχει 6 (4) πλευρὰς ἐπὶ πλέον τοῦ β'

καὶ 3 $\frac{1}{3} \left(3 - \frac{8}{9} \right)$ φορὰς περισσοτέρας διαγωνίους πόσας πλευρὰς ἔχει καθέν;

τὸ α' 9 (6).

4) Ἐὰν αἱ πλευραὶ τετραγώνου αὐξηθοῦν κατὰ 3 (2) μ., τὸ ἐμβαδὸν τοῦ
νέου θὰ εἴνε 2,25 $\left(1 - \frac{9}{16} \right)$ φορὰς τοῦ ἀρχικοῦ. Πόση εἶνε ἡ πλευρά του;

6 (8).

5) Πόσον εἶνε τὸ μῆκος τῶν πλευρῶν ὁρθογωνίου τριγώνου, ἔχοντος ἐμβαδὸν
150 (270) (μ^2) ἂν ὁ λόγος τῶν καθέτων πλευρῶν του εἴνε $\frac{3}{4} \left(\frac{5}{12} \right)$;

15·20 (15·36).

6) Ισοσκελοῦς τριγώνου ἡ βάσις εἶνε κατὰ 19 (22) μ. καθέν δὲ τῶν σκελῶν
τῶν κατὰ 8 (9) μ. μεγαλύτερον τοῦ ὕψους του. Πόση εἶνε ἡ βάσις του;

40 ἢ 24. (40 ἢ 30).

7) Τίνες αἱ διαστάσεις ὁρθογωνίου, ἔχοντος ἐμβαδὸν 192 (91) (μ^2) ἂν διαφέ-
ρουν κατὰ 4 (ἔχουν ἀθροισμα 20) μ.;

16·12 (13·7).

8) Ρόμβου ἡ πλευρὰ ἔχει μῆκος 17 (25) μ. αἱ δὲ διαγώνιοι διαφορὰν 14 (34) μ.
Πόσον μῆκος ἔχει ἡ μικροτέρα διαγώνιος του;

16 (14).

9) Τίνες αἱ διαστάσεις ὁρθογωνίου ἐγγεγρ. εἰς κύκλον ἀκτῖνος 12,5 μ., ἂν ἡ
διαφορά των εἴνε 17 μ.;

24·7.

10) Εὕρετε τὰς πλευρὰς δύο τετραγώνων, ἐγόντων ἀθροισμα ἐμβαδὸν 8621
ἄν τὸ γινόμενον τῶν διαγωνίων των εἴνε 8540.

61·70.

*Ομάς πέμπτη. (Συστημάτων). 1) Δύο βρύσεις, τρέχουσαι μαζύ, πληροῦν
δεξαμενὴν εἰς 2 $\frac{2}{5}$ (18) ὥρ. Ἡ 6' (α') μόνη χρειάζεται 2 (27) ὥρ. ἐπὶ πλέον
τῆς α' (β'). Εἰς πόσον χρόνον ἔκαστη τὴν πληροῦ μόνη;

6·4. (54·27),

2) Δύο ἐργάται, ἐργαζόμενοι χωριστά, χρειάζονται 25 ὥρας διὰ νὰ τελειώσῃ
ἔκαστος τὸ $\frac{1}{2}$ ἔργου. "Αν είργάζοντο μαζύ, θὰ ἐχρειάζοντο 12 ὥρ. δι' ὀλόκληρον
τὸ ἔργον. Πόσον χρόνον ἐχρειάζετο ἔκαστος διὰ τὸ ἔργον:

30·20.

3) Δύο ἐπιχειρηματίαι κατέθεσαν όμοιο 2000 δρχ., ὁ α' διὰ 2 μῆνας καὶ ὁ β' διὰ 8 μ. 'Ο α' ἔλαβεν ἐν δλω 1800 δρχ., ὁ δὲ β' 900 δρχ. Πόσα ἐκέρδισεν ἕκαστος ; 300·400.

4) Δύο κεφάλαια ἔχοντα ἄθροισμα 30000 δρχ., ἐτοκίσθησαν πρὸς 6 %. Τό α' ἔμεινε 4 μῆνας ἐπὶ πλέον καὶ ἐδώκε τόκον 1280 δρχ., τὸ δε β' 840 δρχ. Τίνα τὰ κεφάλαια ; 16000·14000.

5) Νὰ εὔρεθούν 4 ἀριθμοί, ἀποτελοῦντες ἀνάλογίαν, ἃν τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων των εἴνε 62,5, ὁ α' ὑπερβαίνη τὸν β' κατὰ 4, ὁ δὲ γ' τὸν δ' κατὰ 3. 6·2·4,5·1,5.

6) Εὕρετε διψήφιον ἀριθμόν, ὅστις διαιρούμενος διὰ τοῦ γινομένου τῶν ψηφίων του δίδει 5 $\frac{1}{3}$, ἐλαττούμενος δὲ κατὰ 9 δίδει τὸν προκύπτοντα δι' ἀντιστοφῆς τῶν ψηφίων του ; 32.

7) Εὕρετε τριψήφιον ἀριθμόν, τοῦ ὁποίου τὸ β' ψηφίον εἴνε μέσον ἀνάλογον τῶν δύο ἄλλων, ὁ λόγος τοῦ ἀριθμοῦ πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του εἴνε ὡς 124 : 7 δι' ἀντιστροφῆς τῶν ψηφίων του δὲ προκύπτει ὁ ἀριθμός ηὗξημένος κατὰ 594. 248.

8) Εὕρετε τρεῖς ἀριθμούς, ἃν δὲ β' εἴνε μέσος ἀνάλογος τῶν ἄλλων τὸ ἄθροισμά των εἴνε 21, τῶν δὲ τετραγώνων των 189. 12·6·3.

9) Εἰς δεξαμενὴν ρέει τὸ ὅδωρ βρύσεως ἐπὶ $\frac{3}{5}$ τοῦ χρόνου, καθ' ὃν ἄλλη βρύσις μόνη θὰ τὴν ἐπλήρωνε. Κλείσται ἡ α' βρύσις καὶ ἀνοίγεται ἡ β' μέχρις ὅτου πληρωθῇ ἡ δεξαμενή. 'Εὰν καὶ αἱ δύο ἡνοίγοντο μαζί, θὰ ἐπληρούστο εἰς 6 ὥρας ὀλιγώτερον, θὰ ἔτρεχον δ' ἐκ τῆς α' τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ ἐκ τῆς β', ἀφ' ὅτου ἐκλείσθῃ ἡ α'. Εἰς πόσον χρόνον καθεμία βρύσις πληροῖ τὴν δεξαμενὴν ; 15 10

***Ομάς ἔκτη.** (Φυσικῆς). 1) Πόσον χρόνον χρειάζεται λίθος διὰ νὰ πέσῃ εἰς τὸν πυθμένα φρέατος βάθους 44,1 μ. ἀφιέμενος ἐκ τοῦ στομίου του ; 3'.

2) Πόσον χρόνον χρειάζεται λίθος, ριπτόμενος κατακορύφως, ἵνα ἀνέλθῃ εἰς ūψος 122, 5 μ. καὶ ἐπαναπέσῃ ; 10'.

3) Πόσην ἀρχικὴν ταχύτητα πρέπει νὰ δώσωμεν εἰς λίθον, ἃν ριφθῇ κατακορύφως, ἵνα ἀνέλθῃ εἰς ūψος 122, 5 μ.; 49'.

4) Πότε θὰ φθάσῃ εἰς ūψος 1460 μ. σφαῖρα, ριπτομένη κατακορύφως πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἀναχωροῦσα μὲ ἀρχικὴν ταχύτητα 185 μ.;

5) Ποίαν πίεσιν ἔχασκει σφαῖρα 41 γιλιογράμμων ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου, ἐκνισσορροπῆ δύναμιν 9 κρ.; 40.

6) Εἰς πόσα δευτερολέπτα κυλίεται σφαῖρα ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου κατὰ 39,2 μ. μῆκος καὶ ūψος 10 μ., ἐκ τῶν ἀνω πρὸς τὰ κάτω ; 5,6''.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Περὶ προσδων

§ 123. Πρόοδος ἀριθμητικής.—

α') Ἀριθμητικὴ πρόοδος καλεῖται σειρὰ ἀριθμῶν, ἔκαστος τῶν ὅποιών γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου του διὰ τῆς προσθέσεως τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

β') Οἱ ἀποτελοῦντες τὴν πρόοδον ἀριθμοὶ λέγονται ὅροι τῆς προσδόου, ὁ δὲ ἀριθμός, ὁ ὅποιος προστιθέμενος εἰς καθένα ὅρον δίδει τὸν ἐπόμενόν του, λέγεται λόγος τῆς προσδόου.

γ') Ἀριθμητικὴ πρόοδος λέγεται αὔξουσα, ἐὰν ὁ λόγος τῆς εἶνε ἀριθμὸς θετικός, φθίνουσα δέ, ἐὰν εἶνε ἀρνητικός.

Οὕτω ἡ σειρὰ 1, 2, 3, 4, 48
εἶνε πρόοδος ἀριθμητικὴ αὔξουσα μὲ λόγον 1, καθώς καὶ

ἡ σειρὰ 1, 3, 5, , 53 μὲ λόγον 2

ἡ δὲ 35, 30, 25 0 εἶνε πρόοδος ἀριθμητικὴ φθίνουσα μὲ λόγον —5.

δ') Εάν διὰ τοῦ α παραστήσωμεν τὸν πρῶτον ὅρον ἀριθμητικῆς τινος προόδου καὶ διὰ τοῦ ω τὸν λόγον τῆς, ὁ δεύτερος ὅρος θὰ παριστάνεται ὑπὸ τοῦ α + ω, ὁ τρίτος ὑπὸ τοῦ α + 2 ω κ.ο.κ. "Ωστε οἱ ὅροι τῆς προσδόου θὰ εἶνε

α, α + ω, α + 2 ω, α + 3 ω,

ε') Εάν δοθῇ ὁ πρῶτος ὅρος καὶ ὁ λόγος ἀριθμητικῆς τινος προόδου, δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν οἰονδήποτε ὅρον αὐτῆς.

Πράγματι, ἐὰν α εἶνε ὁ πρῶτος ὅρος καὶ ω ὁ λόγος τῆς προόδου, θὰ ἔχωμεν ὅτι ὁ 2ος ὅρος εἶνε α + ω, ὁ 3ος ὅρος εἶνε α + 2 ω, ὁ 4ος ὅρος εἶνε α + 3 ω, καὶ οὕτω καθεξῆς. "Ἄρα,
«ἔκαστος ὅρος ἀριθμητικῆς προσδόου ισοῦται μὲ τὸν πρῶτον ὅρον τῆς, αὐξηθέντα κατὰ τὸ γινόμενον τοῦ λόγου ἐπὶ τὸν ἀριθμόν, ὁ δποῖος παριστάνει τὸ πλῆθος τῶν προηγουμένων του ὅρων».

Οὕτω ὁ 30ος ὅρος ισοῦται μὲ α + 29 ω.

στ') Έάν διὰ τοῦ ν παραστήσωμεν τὸ πλῆθος τῶν ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου καὶ διὰ τοῦ τὸν τελευταῖον ὅρον της, οἱ προηγούμενοί του θὰ εἰνε (ν—1) τὸ πλῆθος.

$$\text{''Αρα } \theta\ddot{\alpha} \text{ } \xi\chi\omega\mu\epsilon\nu\eta\sigma\tau\text{ } \delta\tau\text{ } \tau = \alpha + (\nu - 1) \omega.$$

Π. χ. ἂν ζητῆται ὁ 13ος ὅρος ἀριθμητικῆς προόδου, τῆς ὁποίας ὁ πρῶτος ὅρος εἰνε 3 καὶ ὁ λόγος 5, ξχομεν

$$\alpha = 3, \quad \omega = 5, \quad \nu = 13.$$

$$\text{''Επομένως } \delta\ 13o\varsigma = 3 + (13 - 1). 5 = 63.$$

ξ') Εστω ὅτι ζητεῖται ἡ ἀριθμητικὴ προόδος, τῆς ὁποίας ὁ δέκατος ὅρος εἰνε 31 καὶ ὁ εἰκοστὸς 61. "Έχομεν ὅτι

$$\delta\ 10o\varsigma = \alpha + 9 \omega = 31, \quad \delta\ 20o\varsigma = \alpha + 19 \omega = 61.$$

Αφαιροῦντες ἐκ τῆς δευτέρας ισότητος τὴν πρώτην, εὑρίσκομεν

$$10 \omega = 30, \quad \text{καὶ} \quad \omega = 3.$$

''Επομένως $\alpha = 4$. "Αρα ἡ προόδος εἰνε 4, 7, 10, 13, . . .

Ασκήσεις. 1) Εὕρετε τὸν 10ον ὅρον

$$\alpha' \quad \tau\eta\varsigma \text{ προόδου } 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot \dots \quad \beta' \quad \tau\eta\varsigma -3 \cdot -1 \cdot + 1 \cdot \dots$$

2) Εὕρετε τὸν 8ον ὅρον τῆς

$$\alpha, \alpha + 3 \beta, \alpha + 6 \beta, \dots \quad (\alpha + 21 \beta).$$

§ 124. "Αθροισμα ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου.—

α') Διὰ νὰ εῦρωμεν τύπον, ὁ ὁποῖος δίδει τὸ ἀθροισμα τῶν ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου, στηριζόμενα (πρὸς εὐκολίαν) εἰς τὴν ἔξης ἰδιότητα,

«ἐν πάσῃ ἀριθμητικῇ προόδῳ τὸ ἀθροισμα δύο ὅρων, ἴσων ἀπεχοντων ἀπὸ τῶν ἀκρων ὅρων, ἴσοιται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν ἀκρων ὅρων».

Πράγματι, ἔστω ἡ προόδος $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \kappa, \lambda, \tau$, (1) καὶ λόγος αὐτῆς ὁ ω , τὸ δὲ πλῆθος τῶν ὅρων της ν .

"Έχομεν ὅτι

$$\beta = \alpha + \omega, \quad \gamma = \alpha + 2 \omega,$$

'Επίσης ὅτι

$$\tau = \lambda + \omega, \quad \tau = \kappa + 2 \omega,$$

''Επομένως

$$\lambda = \tau - \omega, \quad \kappa = \tau - 2 \omega^4$$

Προσθέτοντες κατὰ μέλη τὰς

$$\beta = \alpha + \omega, \quad \lambda = \tau - \omega,$$

ενδρίσκομεν $\beta + \lambda = \alpha + \tau$.

Όμοιώς ἐκ τῶν ισοτήτων $\gamma = \alpha + 2\omega$, $\kappa = \tau - 2\omega$
ενδρίσκομεν, προσθέτοντες κατὰ μέλη $\gamma + \kappa = \alpha + \tau$.

6') "Εστω ὅτι ζητεῖται τὸ ἀθροισμα τῶν ὅρων τῆς (1). "Ας παραστήσωμεν τὸ ζητούμενον ἀθροισμα διὰ τοῦ Σ , ἥτοι ἂς θέσωμεν

$$\Sigma = \alpha + \beta + \gamma + \dots + \kappa + \lambda + \tau$$

$$\text{η} \quad \Sigma = \tau + \lambda + \kappa + \dots + \gamma + \beta + \alpha.$$

"Αν προσθέσωμεν τὰς ισότητας αὐτὰς κατὰ μέλη, ενδρίσκομεν

$$2\Sigma = (\alpha + \tau) + (\beta + \lambda) + (\gamma + \kappa) + \dots + (\tau + \alpha).$$

"Επειδὴ καθὲν τῶν ἐν παρενθέσει ἀθροισμάτων εἶναι ίσον μὲν $(\alpha + \tau)$, τὸ δὲ πλῆθος των εἶναι ὅσον τὸ πλῆθος τῶν ὅρων, δηλαδὴ ν
ἔχομεν $2\Sigma = (\alpha + \tau) \cdot v$. $\epsilon\tilde{\epsilon}\tilde{\xi}$ οὖν ενδρίσκομεν $\Sigma = \frac{(\alpha + \tau) \cdot v}{2}$. (2)

"Ητοι, τὸ ἀθροισμα τῶν ὅρων ἀριθμητικῆς τινος προόδου ισοῦται μὲν τὸ ήμιάθροισμα τῶν ἀκρων ὅρων τῆς, ἐπὶ τὸν ἀριθμόν, δοποῖος φανερώνει τὸ πλῆθος τῶν ὅρων τῆς".

γ') Εὰν εἰς τὴν ισότητα (2) γράψωμεν ἀντὶ τοῦ τὸ ίσον του $\alpha + (v - 1)\omega$, ὅπου ω παριστάνει τὸν λόγον τῆς προόδου, ενδρίσκομεν $\Sigma = \frac{[\alpha + \alpha + (v - 1)\omega]v}{2} = \frac{2\alpha + (v - 1)\omega}{2} \cdot v$ (3)

"Ο τύπος αὐτὸς χρησιμεύει, νὰ ενδρίσκωμεν τὸ ἀθροισμα Σ , ὅταν γνωρίζωμεν τὸν πρῶτον ὅρον, τὸν λόγον καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὅρων τῆς προόδου.

Π. χ. ἂν ζητῆται τὸ ἀθροισμα δέκα ὅρων τῆς προόδου

$$2, 5, 8, \dots$$

ἔχομεν $\alpha = 2$, $\omega = 3$, $v = 10$. Επομένως ἂν ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὸν ἀνωτέρῳ τύπον (3), ενδρισκομεν

$$\Sigma = \frac{4 + 9.3}{2} \cdot 10 = 155.$$

Ασκήσεις. Εὕρετε τὰ ἀθροίσματα τῶν προόδων

α') $5 \cdot 3 \cdot 1 \dots$ (ἐκ δέκα ὅρων). β') $-4 \cdot -1 \cdot 2 \dots$ (ἐξ ἑπτὰ ὅρων).

γ') $\alpha, 4\alpha, 7\alpha, \dots$ (ἐκ ν ὅρων). δ') $\frac{10}{15}, \frac{7}{15}, \frac{4}{15}, \dots$ (ἐξ 21 ὅρων).

ε') Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμα πάντων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπό τοῦ 1 μέχρι τοῦ v (150). $\frac{v(v+1)}{2}$ (11325)..

§ 125. Περὶ παρεμβολῆς ἀριθμητικῶν ὄρων.—

Δοθέντων δύο ἀριθμῶν, ζητεῖται νὰ παρεμβάλωμεν μεταξύ των ὅσουςδήποτε ἀριθμούς, οἱ ὅποιοι μετὰ τῶν δοθέντων νὰ ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόοδον.

Ἐὰν διὰ τῶν αἱ καὶ τὸ παραστήσωμεν τοὺς δύο δοθέντας ἀριθμοὺς καὶ διὰ τοῦ τὸ πλῆθος τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι θὰ παρεμβληθοῦν, τὸ πλῆθος τῶν ὅρων τῆς προόδου, τὴν ὅποιαν ζητοῦμεν νὰ σχηματίσωμεν, θὰ εἴνε $(v + 2)$. Ο τελευταῖος τῆς ὅρος θὰ εἴνε δ τ. Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν $\tau = a + (v + 1) \omega'$, ὅπου τὸ ω' παριστάνει τὸν λόγον τῆς προόδου. Ἐκ τῆς ἀνωτέρω ισότητος ἔχομεν

$$\omega' = \frac{\tau - a}{v + 1}.$$

Οὕτω δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν τὴν ζητούμενην πρόοδον ἀφοῦ γνωρίζομεν τὸν πρῶτον ὅρον, τὸν λόγον καὶ τὸν τελευταῖον ὅρον αὐτῆς.

Ἄν π. χ. ζητῆται μεταξὺ τῶν 1 καὶ 4 νὰ παρεμβληθοῦν 18 ἀριθμοὶ οὖτες, ὥστε νὰ ἀποτελέσουν πρόοδον ἀριθμητικὴν μετὰ τῶν δοθέντων, ἔχομεν $a = 1$, $\tau = 4$, $v = 16$.

Ἐπομένως θὰ εἴνε, $\omega' = \frac{4 - 1}{16 + 1} = \frac{3}{17}$.

Ἄρα ή ζητούμενη πρόοδος εἴνε ή 1, $1 \frac{3}{17}$, $1 \frac{6}{17}$, 4.

Ἄσκήσεις καὶ προβλήματα.

Όμάς πρώτη. 1) Μεταξὺ τῶν 1 καὶ 2 (17) νὰ παρεμβληθοῦν 9 (3) ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι μετὰ τῶν δοθέντων νὰ ἀποτελέσουν πρόοδον ἀριθμητικήν.

0,1 (5,25).

2) Ὡρολόγιον κτυπά τὰς ὥρας ἀπὸ τῆς πρώτης μέχρι τῆς διωδεκάτης. Πόσα κτυπήματα κάμνει ἐντός ημερονυκτίου;

156.

3) Πόσον ἀξίζει ἐμπόρευμα, ὃν πληρώνεται εἰς 12 δόσεις, καὶ ή α' δόσης εἴνε 10 δρ., ή β' 15 δρ., ή γ' 20 δρ. κ. ο. κ.;

450.

4) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμα πάντων τῶν περιττῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ $300 (2v + 1)$.

$15 \cdot ^2 (v + 1)^2$.

5) "Ἄν ὁ 2ος καὶ ὁ 7ος ὅρος ἀριθμητικῆς προύδου ἔχουν ἀθροισμα 92, ὁ δὲ 4ος καὶ ὁ 11ος 71, τίνες εἴνε οἱ τέσσαρες ὅροι;

54, 75, 47, 75, 37, 75, 23, 25.

6) Εὕρετε πρόοδον ἀριθμητικὴν ἐκ 12 ὥρων, ὃν τὸ ἀθροισμα τῶν τεσσάρων μέσων ὥρων τῆς εἴνε 74, τὸ δὲ γινόμενον τῶν ἀκρων 70.

(2 5·8 . . . 35).

7) Εὐρετε ἀριθμητικὴν ποσόδον ἐκ 3 (11) ὥρων, ἐχόντων ἄρθροις μικρά 38 (176) γινόμενον (διαφορὰν τῶν ἄκρων των) δὲ 1287 (80). 9 11 . . . (· 4 . . .).

8) Εὕρετε τοὺς πέντε ὄρους ἀριθμητικῆς προσόδου, ἂν τὸ γινόμενον των (τὸ
ἄθροισμα τῶν ἀντιστρόφων των) εἴης $12320 \left(\frac{137}{180} \right)$, τὸ δὲ ἄθροισμα των
40 (45). 25.. (3'6).

9) Νὰ εὔρεθῇ ὁ νός ὅρος καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς προόδου

$$1, \frac{v-1}{v}, \frac{v-2}{v}, \frac{v-3}{v}, \dots \quad \left[\text{A.} \pi. \frac{1}{v}, \frac{(v+1)}{2} \right].$$

$$10) \quad \text{Νὰ εὐρεθῇ ὁ νός ὅρος καὶ τὸ ἔθρον: σμα τῶν ν πρώτων ὅρων τοῖς σειρᾶς$$

$$\frac{v^2 - 1}{v}, \quad v, \quad \frac{v^2 + 1}{v}, \quad \frac{v^2 + 2}{v}, \quad \dots \dots \left[\text{ΑΝ.} \frac{v^2 + (v-2)}{v}, \quad \frac{(2v^2 + v) - 3}{2} \right].$$

Οὐάς δεντέρα. 1) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων (τῶν κύβων) τῶν ἀπεργίων διαδοχικῶν ἀριθμῶν ἀπό τοῦ 1 μέχρι τοῦ ν.

[Παριστάνομεν διὰ S_1 , S_2 τὸ ἄθροισμα τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων των ἀντιστοίχως ἀπὸ 1 μέρος τοῦ ν.

$$\begin{array}{ll} \text{"Εχομεν} & (\alpha + \beta)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3. \\ \text{Θετομεν} & \beta = 1, \quad \delta\tau \quad (\alpha + 1)^3 = \alpha + 3\alpha^2 \cdot 1 + 3 \cdot \alpha \cdot 1^2 + 1. \end{array}$$

⁷Αντικαθιστῶμεν τώρα τὸ α διὰ τῶν 1, 2, 3, ν

$$2^3 = (1+1)^3 = 1^3 + 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1$$

$$3^3 = (2+1)^3 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 1$$

$$4^3 = (3+1)^3 = 3^3 + 3 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3 + 1$$

$$(v+1)^3 = v^3 + 3 \cdot v^2 + 3 \cdot v + 1$$

Προσθέτοντες ταύτας κατὰ μέλη εὑρίσκομεν

$$(v+1)^3 = 1 + 3 S_2 + 3 S_1 + v$$

$$(v+1)^3 = 1 + 3S_2 + 3 \cdot \frac{v(v+1)}{2} + v,$$

ἢ οὐ προσδιορίζομεν τὸ S₂.

Διὰ νὰ εὑραμεν τὸ ἄθροισμα τῶν κύβων S_3 , θὰ γρητιμοποιήσωμεν καθ' ὅμοιον τρόπον τὸν τύπον $(\alpha + 1)^4 = \alpha^4 + 4\alpha^3 + 6\alpha^2 \cdot 1^2 + 4\alpha \cdot 1^3 + 1^4$

$$(\nu + 1)^4 = 1 + 4S_3 + 6S_2 + 4S_1 + \nu.$$

2) Νὰ εὑρεθοῦν τέσσαρες ἀριθμοί, ἀποτελούντες ἀριθμητικὴν πρόσοδον, ἐχν τὸ
ἀθροισμά των εἶνε 20, καὶ τὸ τῶν ἀντιστρόφων των $1 \frac{1}{24}$. 2·4·6·8.

§ 126. Πρόσδος γεωμετρικής.

α.) Γεωργετρικὴ πρόσοδος καλεῖται σειρὰ ἀριθμῶν, τῶν δποίων ἔκαστος γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου του διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν. Οἱ ἀποτελοῦντες τὴν πρόσδον ἀριθμοὶ

λέγονται ὅροι τῆς προόδου, δὲ ἀριθμὸς ἐπὶ τὸν ὅποιον πολλα-
πλασιάζεται ὅρος τις, διὰ νὰ δώσῃ τὸν ἐπόμενόν του λέγεται
λόγος τῆς προόδου.

6') Γεωμετρικὴ πρόοδος λέγεται αὐξηση, ἐὰν ὁ λόγος τῆς εἶνε
μεγαλύτερος τῆς μονάδος, φθίνουσα δέ, ἢν εἶνε μικρότερος αὐτῆς.
Κατὰ ταῦτα ἡ σειρὰ τῶν ἀριθμῶν

$$1, 2, 4, 8, 16, \dots, 64$$

ἀποτελεῖ πρόοδον γεωμετρικὴν αὐξησην, τῆς ὅποιας ὁ λόγος εἶνε

$$2. \text{ Ομοίως οἱ ἀριθμοὶ } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \dots \frac{1}{64}$$

ἀποτελοῦν φθίνουσαν γεωμετρικὴν πρόοδον, ἔχουσαν λέγον $\frac{1}{2}$.

γ') Ἐν διὰ τοῦ α παραστήσωμεν τὸν πρῶτον ὅρον γεωμετρι-
κῆς τινος προόδου καὶ διὰ τοῦ ω τὸν λόγον αὐτῆς, ὁ δεύτερος ὅρος
τῆς θὰ εἴνει α ω. Διότι γίνεται ἐκ τοῦ α διὰ πολλαπλασιασμοῦ
ἐπὶ ω. Ο τρίτος ὅρος θὰ παριστάνεται ὑπὸ α. ω. ω = α. ω², ὁ
τέταρτος ὑπὸ τοῦ α ω³ κ. ο. κ. Ωστε ἡ πρόοδος θὰ παριστάνε-
ται οὕτω α, α ω, α ω², α ω³, α ω⁴,

Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι ὅταν δοθῇ ὁ πρῶτος ὅρος καὶ ὁ
λόγος γεωμετρικῆς τινος προόδου, δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν οἰονδή-
ποτε ὅρον τῆς. Οὕτω ὁ 2ος ὅρος = μὲ τὸν πρῶτον ὅρον ἐπὶ¹
τὸν λόγον. ὁ 3ος ὅρος = μὲ τὸν πρῶτον ὅρον ἐπὶ¹
τὴν β' δύναμιν τοῦ λόγου. ὁ 4ος ὅρος = μὲ τὸν πρῶτον ἐπὶ¹
τρίτην δύναμιν τοῦ λόγου κ. ο. κ.

δ') Ἐν γένει, «ὁ τυχῶν ὅρος γεωμετρικῆς προόδου ἰσοῦ-
ται μὲ τὸν πρῶτον ὅρον τῆς ἐπὶ τὴν δύναμιν τοῦ λόγου, τὴν
ἔχουσαν ἐκθέτην τὸν ἀριθμὸν τῶν προηγουμένων του ὅρων».

Κατὰ ταῦτα, ἐὰν διὰ τοῦ τ παραστήσωμεν τὸν νυοστὸν ὅρον
γεωμετρικῆς προόδου, ἔχούσης πρῶτον ὅρον τὸν α καὶ λόγον τὸν
ω, θὰ ἔχωμεν $\tau = \alpha \omega^{v-1}$.

Π. χ. ὁ δέκατος ὅρος τῆς προόδου 2, 6, 18, . . . εἶνε ὁ 2.3⁹,

$$\text{Ο ἐνδέκατος ὅρος τῆς προόδου } 9, 3, \frac{1}{3} \dots$$

$$\text{εἶνε ὁ } 9 \cdot \frac{1}{3^{10}} \cdot \text{ Διότι εἶνε } \alpha = 9, \omega = \frac{1}{3} \cdot$$

Ο ἔκτος ὅρος τῆς προόδου $\frac{13}{10}, \frac{13}{100}, \dots$ εἰς τὴν ὁποίαν εἶνε $a = \frac{13}{10}$, $\omega = \frac{1}{10}$, θὰ εἶνε $\frac{13}{10} \cdot \frac{1}{10^5}$.

§ 127. "Αθροισμα όρων γεωμετρικής προόδου."

α') "Εστω ἡ γεωμετρικὴ πρόοδος $a, a\omega, a\omega^2, a\omega^3, \dots, a\omega^{(v-1)}$ ἐκ ν ὅρων. Εὰν διὰ Σ παραστήσωμεν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν, θὰ ἔχωμεν $\Sigma = a + a\omega + a\omega^2 + \dots + a\omega^{(v-1)}$, (1)

Ἐὰν τῆς ἴσοτητος ταύτης πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέλη ἐπὶ ω , ἀφαιρέσωμεν δὲ ἀπὸ τὸ ἔξαγόμενον

$$\Sigma\omega = a\omega + a\omega^2 + a\omega^3 + \dots + a\omega^v$$

τὴν (1) (κατὰ μέλη) προκύπτει

$$\Sigma\omega - \Sigma = a\omega^v - a, \quad \text{ἢ} \quad \Sigma(\omega - 1) = a\omega^v - a,$$

ἐκ τῆς ὁποίας εὑρίσκομεν $\Sigma = \frac{a\omega^v - a}{\omega - 1} = \frac{a}{1 - \omega} - \frac{a\omega^v}{1 - \omega}$ (2).

β') "Ας ὑποθέσωμεν ὅτι ἡ δοθεῖσα γεωμετρικὴ πρόοδος εἶνε φθίνουσα καὶ ὅτι ἔχει ἀπείρους ὅρους.

Τότε ὁ ὅρος τῆς $a\omega^{v-1} = \tau$ θὰ εἶνε ἀριθμὸς ἐλάχιστος, ἐὰν τὸ ν εἶνε πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς καὶ θὰ τείνῃ νὰ γίνη ἵσος μὲ τὸ μηδέν, ὅταν τὸ ν αὐξάνῃ ὑπὲρ πάντα ἀριθμόν. Διὰ τοῦτο ἐὰν εἰς τὸ ἄθροισμα (2) γράψωμεν ἀντὶ τοῦ $a\omega^v$ τὸ ἵσον αὐτοῦ $a\omega^{(v-1)}$. ω , καὶ ἀντὶ τοῦ $a\omega^{(v-1)}$ τὸ τ , θὰ ἔχωμεν

$$(3) \quad \Sigma = \frac{a}{1 - \omega} - \frac{\tau\omega}{1 - \omega}, \quad \text{ἢ} \quad \Sigma = \frac{\tau\omega - a}{\omega - 1} \quad (4).$$

Παραλείποντες ἐν τῷ (3) τὸν $\frac{\tau\omega}{1 - \omega}$ ἐπειδὴ εἶνε ἐλάχιστος ἀριθμὸς καὶ τείνει νὰ γίνῃ μηδὲν καθ' ὅσον λαμβάνομεν περισσοτέρους ὅρους τῆς φινιούσης προόδου, μένει ὡς ἄθροισμα τὸ

$$\Sigma = \frac{a}{1 - \omega} \quad (5)$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω (4) καὶ (5) συνάγομεν ὅτι

γ') «Τὸ ἄθροισμα τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου ἴσουται μὲ κλάσμα, ἔχον ἀριθμητὴν μὲ τὴν διαφορὰν τοῦ πρώτου ὅρου ἀπὸ τοῦ γινομένου τοῦ τελευταίου ὅρου ἐπὶ τὸν λόγον αὐτῆς, παρονομαστὴν δὲ τὸν λόγον ἡλαττωμένον κατὰ μονάδα».

δ) «Τὸ ἄθροισμα τῶν δρων φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου, ἔχούσης ἀπείρους δρους, εἰνε ὅσον μὲ κλάσμα, ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸν πρῶτον δρον τῆς προόδου, παρονομαστὴν δὲ τὴν μονάδα ἡλιατωμένην κατὰ τὸν λόγον τῆς προόδου».

Κατὰ ταῦτα τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπείρων δρων τῆς σειρᾶς

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

εἰς τὴν δοποίαν εἶνε $\omega = \frac{1}{2}$, $\alpha = 1$, θὰ εἴνε

$$\Sigma = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2.$$

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπείρων δρων $\frac{25}{100}$, $\frac{25}{100^2}$, $\dots \dots \dots$

εὑρίσκομεν ἐὰν παρατηρήσωμεν ὅτι $\alpha = \frac{25}{100}$, $\omega = \frac{1}{100}$ καὶ
ἔφαρμόσωμεν τὸν τύπον (5), δτε ἔχομεν

$$\Sigma = \frac{25}{100 \left(1 - \frac{1}{100} \right)} = \frac{25}{99}.$$

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπείρων δρων τῆς προόδου

$$4, 2, 1, \frac{1}{2}, \dots \dots \dots \text{ εἴνε } \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8.$$

'Ασκήσεις καὶ προβλήματα

Ομάς πρώτη. 1) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα ἑκάστης τῶν προόδων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀπείρους δρους.

$$\alpha') \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9} \dots \dots \dots \beta') \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \dots \dots \dots$$

$$\gamma') 2, -1 \frac{1}{3}, \frac{8}{9}, \dots \dots \delta') 0,8686 \dots \dots \varepsilon') 0,54444 \dots \dots$$

2) Εὗρετε τὸν εἰκοστὸν δρον καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν εἰκοσι τῶν προόδων

$$\alpha') 1, 3, 9, 27, \dots \dots \beta') 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots \dots$$

3) Νὰ εὑρεθῇ ὁ πρῶτος καὶ ὁ τελευταῖος δρος γεωμετρικῆς προόδου διὰ τὴν ὁποίαν εἴνε $\omega = \frac{1}{4}$, $v = 6$, $\Sigma = 2730$.

4) Νὰ εὑρεθῇ ὁ πρῶτος δρος καὶ τὸ ἄθροισμα γεωμετρικῆς προόδου εἰς τὴν ὁποίαν εἴνε $\tau = 384$, $\omega = 2$, $v = 8$. Απ. 3765.

5) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα πρὸς τὸ ὁποῖον τείνει ἡ σειρᾶ

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{4}{16} + \dots \left[\begin{array}{l} \text{Γράψατε αὐτὸ ως ἐξῆς} \\ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \right) + \left(\frac{1}{8} + \dots \right) \dots \end{array} \right]$$

6) Ποῦ τείνει τὸ ἀθροισμα τῶν ἀπείρων δρων τῆς σειρᾶς

$$\sqrt{\frac{2}{2-1}} + \frac{1}{2-\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \dots \quad (\text{Απ. } 4+3\sqrt{2}).$$

7) "Αν εἶνε $\alpha > \beta$, νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ἀπείρων δρων τῶν

$$\alpha' \alpha v + \beta \alpha v^{-1} + \beta^2 \alpha v^{-2} + \dots \beta') \alpha + \beta + \frac{\beta^2}{\alpha} + \frac{\beta^3}{\alpha^2} + \dots$$

$$\left(\cdot \text{Απ. } \frac{\alpha v+1}{\alpha-\beta}, \frac{\alpha^2}{\alpha-\beta} \right).$$

Όμας δεντέρα. 1) 'Εν τετραγώνῳ (ισοπλεύρῳ τριγώνῳ) πλευρᾶς α συνδέονται μέσα τῶν πλευρῶν του καὶ εὑρίσκομεν νέον τοιοῦτον. Τό αὐτό ἐπαναλαμβάνομεν εἰς τὸ νέον τοῦτο καὶ οὕτω καθεξῆς. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ἐμβαδῶν καὶ τῶν περιμέτρων τῶν ἀπείρων τούτων τετραγώνων (τριγώνων).

$$\text{Απ. } 2\alpha^2 \left(\frac{\alpha^2 \sqrt{3}}{z} \right).$$

2) 'Εν κύκλῳ ἀκτίνος ρ ἑγγράφομεν τετράγωνον, εἰς τοῦτο κύκλον εἰς τὸν κύκλον τετράγωνον κ. ο. κ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν κύκλων καὶ τῶν τετραγώνων.

$$2\pi\rho^2, 4\rho^2.$$

3) Νὰ εὑρεθοῦν αἱ γωνίαι τετραπλεύρου, ἂν ἀποτελοῦν γεωμετρικὴν πρόσοδον καὶ ἡ 4η εἶνε 9πλασία τῆς β'. $9 \cdot 27 \cdot 81 \cdot 243.$

4) Νὰ μερισθῇ ὁ 221 εἰς τρία μέρη, ἀποτελοῦντα γεωμετρικὴν πρόσοδον καὶ τῆς ὅποιας ὁ γ' δρος νὰ ὑπερβαίνῃ τὸν α' κατὰ 136. $17 \cdot 51 \cdot 153.$

5) Τὸ ἀθροισμα τῶν τριῶν δρων γεωμετρικῆς προσόδου εἶνε 248, ἡ διαφορὰ τῶν ἄκρων δρων εἶνε 192. Τίνεις οἱ τρεῖς δροι;

$$8 \cdot 40 \cdot 200.$$

6) Δείξατε ὅτι ἐν γεωμετρικῇ πρόσοδῳ τὸ γινόμενον δύο δρων, ἀπεγόντων ίσου μὲν τῶν ἄκρων, ίσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων.

§ 128. Περὶ παρεμβολῆς γεωμετρικῶν δρων.—

Δίδονται δύο ἀριθμοὶ α καὶ β ζητεῖται δὲ νὰ παρεμβάλωμεν μεταξὺ αὐτῶν ν ἄλλους, οἵτινες μετὰ τῶν δοθέντων ν' ἀποτελοῦν γεωμετρικὴν πρόσοδον.

'Εὰν καλέσωμεν ω' τὸν λόγον τῆς προσόδου, ἐπειδὴ τὸ πλῆθος τῶν δρων αὐτῆς θὰ εἶνε $(v+2)$, δ τελευταῖος δρος β θὰ ίσοῦται μὲ τὸν πρῶτον α ἐπὶ τὴν $(v+1)$ δύναμιν τοῦ λόγου ω' . "Ητοι θὰ ἔχωμεν $\beta = \alpha \cdot \omega'^{(v+1)}$, ἐκ τῆς δποιας εὑρίσκομεν

$$\omega'^{(v+1)} = \frac{\beta}{\alpha}, \quad \text{ἢ} \quad \omega' = \sqrt[\nu+1]{\frac{\beta}{\alpha}}.$$

"Επομένως ή ζητουμένη πρόσοδος θὰ εἶνε ή

$$\alpha, \alpha \sqrt[\nu+1]{\frac{\beta}{\alpha}}, \alpha \sqrt[\nu+1]{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2}, \dots, \beta.$$

Π. χ. ἂν ζητῆται νὰ παρεμβληθοῦν 9 ἀριθμοὶ μεταξὺ τῶν 1 καὶ 2, οἵτινες μετὰ τῶν δούλευτων ν' ἀποτελέσουν γεωμετρικὴν πρόσοδον, ἔχομεν $v = 9$, $\text{ἄρα } \omega' = \sqrt[10]{2} = 2^{\frac{1}{10}}$.

Ἐπομένως ἡ πρόσοδος εἶναι $1, 2^{\frac{1}{10}}, 2^{\frac{2}{10}}, 2^{\frac{3}{10}}, \dots \dots 2$.

Ασκησις. Νὰ παρεμβληθοῦν μεταξὺ τῶν 161 (3) καὶ 4347 (243) δύο (τρεῖς) ἀριθμοί, ὥστε νάποτε λεσθῆ γεωμετρικὴ πρόσοδος.

Περὶ λογαριθμῶν

§ 129. Ὁρισμοί.—

α') Ἐὰν ἀριθμός τις εἴναι δύναμις τοῦ 10, δὲ ἐκθέτης τῆς δυνάμεως ταύτης λέγεται **λογάριθμος** τοῦ ἀριθμοῦ ὡς πρὸς βάσιν 10.

Οὕτω ὁ ἀριθμὸς 100 εἶναι ἡ δευτέρα δύναμις τοῦ 10, ἢτοι ἔχομεν ὅτι $10^2 = 100$ καὶ δὲ ἐκθέτης 2 λέγεται λογάριθμος τοῦ 100 ὡς πρὸς τὴν βάσιν 10. Ὁμοίως, ἐπειδὴ $10^3 = 1000$, δὲ 3 λέγεται λογάριθμος τοῦ 1000 ὡς πρὸς βάσιν 10.

β') Ἐν γένει, ἔὰν δοθείει τις ἀριθμός, ἔστω ὁ A, εἴναι δύναμις τις τοῦ 10, π.χ. ἂν εἴναι $10^\alpha = A$, δὲ ἐκθέτης αὐτοῦ δυνάμεως ταύτης τοῦ 10 λέγεται λογάριθμος τοῦ A ὡς πρὸς βάσιν 10, καὶ σημειώνεται οὕτω λογ. A = a, ἀπαγγέλλεται δὲ ὡς ἔξῆς

δ λογάριθμος τοῦ A εἶναι ίσος μὲν a.

γ') Ἐπειδή, καθὼς γνωρίζομεν, εἴναι $10^1 = 10$, καὶ $10^0 = 1$, ἐπειταὶ ὅτι «δ λογάριθμος τοῦ 10 (ὡς πρὸς βάσιν 10) εἶναι ίσος μὲν 1, δὲ λογάριθμος τῆς μονάδος μὲν μηδέν».

§ 130. Ἰδιότητες τῶν λογαρίθμων.—

α') Ἐκ τοῦ ἀνωτέρῳ ὁρισμοῦ τῶν λογαρίθμων ἐπειταὶ ὅτι, οἱ λογάριθμοι ἔχουν τὰς ἴδιότητας τῶν ἐκθετῶν δυνάμεων τῆς αὐτῆς βάσεως. Πράγματι γνωρίζομεν ὅτι

$$(1) \quad 10^\alpha \cdot 10^\beta = 10^{\alpha+\beta} \quad (\S\ 16, \alpha')$$

$$(2) \quad 10^\alpha : 10^\beta = 10^{\alpha-\beta} \quad (\S\ 16, \sigma')$$

$$(3) \quad (10^\alpha)^\gamma = 10^{\alpha \cdot \gamma} \quad (\S\ 16, \gamma').$$

Ἐὰν δὲ θέσωμεν $10^\alpha = A$, $10^\beta = B$, θὰ εἴναι

$\alpha = \log. A$, $\beta = \log. B$. $\text{Ἄρα } \alpha + \beta = \log. A + \log. B$.

6') 'Εκ τῆς (1) ἔχομεν ὅτι $A \cdot B = 10^{\alpha} \cdot 10^{\beta} = 10^{\alpha+\beta}$,
ἐκ τῆς δούλως ἐπεταί, ὅτι λογ. $(A \cdot B) = \alpha + \beta = \lambda\text{ογ. } A + \lambda\text{ογ. } B$.
"Ητοι «δ λογάριθμος τοῦ γινομένου δύο ἀριθμῶν ισοῦται μὲ τὸ
ἀθροισμα τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν τούτων».

γ') 'Εκ τῆς (2) ἔχομεν ὅτι $A : B = 10^{\alpha} : 10^{\beta} = 10^{\alpha-\beta}$.
"Ητοι λογ. $(A : B) = \alpha - \beta = \lambda\text{ογ. } A - \lambda\text{ογ. } B$.

"Επομένως «δ λογάριθμος τοῦ πηλίκου δύο ἀριθμῶν ισοῦται
μὲ τὴν διαφορὰν τοῦ λογαρίθμου τοῦ διαιρέτου ἀπὸ τοῦ λογα-
ρίθμου τοῦ διαιρετέου».

δ') 'Εκ τῆς (3) ἔχομεν ὅτι $A^v = (10^{\alpha})^v = 10^{\alpha \cdot v}$.
"Ητοι, λογ. $(A^v) = \alpha \cdot v = \nu. \lambda\text{ογ. } A$.

"Αρα «δ λογάριθμος δυνάμεως ἀριθμοῦ ισοῦται μὲ τὸν ἑκθέ-
την τῆς δυνάμεως, πολλαπλασιασμένον ἐπὶ τὸν λογάριθμον τῆς
βάσεως».

ε') "Η ἴδιότης **6'**) ισχύει καὶ διὰ περισσοτέρους τῶν δύο παρα-
γόντων. Π. χ. ἂν θέλωμεν τὸν λογ. $(A \cdot B \cdot \Gamma)$, παρατηροῦμεν ὅτι
(θεωροῦντες τὸ γινόμενον $A \cdot B$ ὡς ἕνα ἀριθμὸν) ἔχομεν

$$\begin{aligned} \text{λογ. } (A \cdot B \cdot \Gamma) &= \text{λογ. } [(A \cdot B) \cdot \Gamma] = \text{λογ. } (A \cdot B) + \text{λογ. } \Gamma \\ &= \text{λογ. } A + \text{λογ. } B + \text{λογ. } \Gamma. \end{aligned}$$

στ') "Η ἴδιότης **6'**) ἀληθεύει καὶ δταν δ ἑκθέτης τῆς δυνάμεως
εἶνε κλασματικὸς ἥ καὶ ἀρνητικὸς ἀριθμός. Πράγματι, ἂν θέλωμεν τὸν

λογάριθμον τοῦ $A^{\frac{\mu}{v}}$ καὶ θέσωμεν $\psi = A^{\frac{\mu}{v}}$ ὑψώσωμεν
δὲ τὰ ἵσα μέλη τῆς ισότητος ταύτης εἰς τὴν v δύναμιν, θὰ ἔχωμεν
 $\psi^v = A^{\mu}$. "Αν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους
τῶν δύο τούτων ἵσων, ἔχομεν λογ. $\psi^v = \text{λογ. } (A^{\mu})$ καὶ
κατὰ τὴν ἴδιότητα **6'**) εἶνε $v. \lambda\text{ογ. } \psi = \mu. \lambda\text{ογ. } A$,
ἐκ τῆς δούλως εὐρίσκομεν λογ. $\psi = \frac{\mu}{v} \cdot \lambda\text{ογ. } A$.

"Ητοι λογ. $\left(A^{\frac{\mu}{v}} \right) = \frac{\mu}{v} \cdot \lambda\text{ογ. } A$.

'Επίσης ἂν θέλωμεν τὸν λογάριθμον τοῦ $A^{-\mu}$, παρατηροῦμεν
ὅτι (\S 81, α') εἶνε $A^{-\mu} = \frac{1}{A^{\mu}}$. "Επομένως κατὰ τὴν

Ιδιότητα γ') ἔχομεν λογ. $(A^{-\mu}) = \lambda \text{ογ.} \left(\frac{1}{A^\mu} \right) = \lambda \text{ογ. } 1 - \lambda \text{ογ. } A^\mu -$
 $= 0 - \mu \cdot \lambda \text{ογ. } A = - \mu \cdot \lambda \text{ογ. } A.$

ζ') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπετοι ὅτι «δ λογάριθμος τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἀριθμοῦ ισοῦται μὲ τὸ ἥμισυ τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ».

Διότι εἶνε λογ. $\sqrt{A} = \lambda \text{ογ.} \left(A^{\frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{2} \cdot \lambda \text{ογ. } A.$

η') Ἐν γένει, «δ λογάριθμος οἰασδήποτε ρίζης ἀριθμοῦ ισοῦται μὲ τὸν λογάριθμον τοῦ ἀριθμοῦ, διῃρημένον διὰ τοῦ δείκτου τῆς ρίζης».

Οὕτω ἔχομεν ὅτι λογ. $\sqrt[\nu]{A} = \lambda \text{ογ.} \left(A^{\frac{1}{\nu}} \right) = \frac{1}{\nu} \cdot \lambda \text{ογ. } A.$

Κατὰ τάνωτέρω ἔχομεν

λογ. $105 = \lambda \text{ογ. } (3 \cdot 5 \cdot 7) = \lambda \text{ογ. } 3 + \lambda \text{ογ. } 5 + \lambda \text{ογ. } 7.$

λογ. $\left(5 \frac{2}{3} \right) = \lambda \text{ογ.} \left(\frac{17}{3} \right) = \lambda \text{ογ. } 17 - \lambda \text{ογ. } 3.$

λογ. $(81) = \lambda \text{ογ. } (3^4) = 4 \cdot \lambda \text{ογ. } 3.$

*Ασκήσεις. Νὰ δειχθῇ ἡ ἀλγθεια τῶν κάτωθι ισοτήτων

α') λογ. $15 = \lambda \text{ογ. } 3 + \lambda \text{ογ. } 5.$ β') λογ. $55 = \lambda \text{ογ. } 11 + \lambda \text{ογ. } 5.$

γ') λογ. $2 \frac{1}{3} = \lambda \text{ογ. } 7 - \lambda \text{ογ. } 3.$ δ') λογ. $49 = 2 \cdot \lambda \text{ογ. } 7.$

§ 131. Τροπὴ ἀρνητικοῦ λογαρίθμου εἰς ξενον του ἔχοντα μόνον τὸν ἀκέραιον ἀρνητικόν. Χαρακτηριστικὸν λογαρίθμου.—

α') Ἐκ τῶν ισοτήτων $10^0 = 1 \cdot 10^1 = 10 \cdot 10^2 = 100, \dots$
 ἔχομεν ὅτι λογ. $1 = 0 \cdot \lambda \text{ογ. } 10 = 1 \cdot \lambda \text{ογ. } 100 = 2, \dots$

*Αφ' ἑτέρου ἔχομεν, ὡς γνωστον $(81, \alpha')$

$10^{-1} = 0, 1 \cdot 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = 0, 01, \dots$

*Αρα εἶνε λογ. $0,1 = - 1 \cdot \lambda \text{ογ. } 0,01 = - 2 \cdot \lambda \text{ογ. } 0,001 = - 3.$

β') *Εστιο ἀριθμὸς περιεχόμενος μεταξὺ τοῦ 1 καὶ 10, π. χ. δ 7.
 *Ἐπειδὴ εἰς τὴν τιμὴν $y = 7$ τῆς συναντήσεως $10^x = y$ ἀντιστοιχεῖ μία τιμὴ τοῦ x ($\S 95, \gamma'$) ἐπεται ὅτι ὑπάρχει λογάριθμος, τοῦ 7, καθὼς καὶ καθενὸς ἀριθμοῦ θετικοῦ. Εἶνε δὲ οὗτος θετικὸς μέν, ἀν δοθεῖς ἀριθμὸς εἶνε μεγαλύτερος τῆς μονάδος, ἀρνητικὸς δέ, ἀν μικρότερος τῆς μονάδος. *Ο λογάριθμος τοῦ 7 θὰ εἶνε μεγαλύτερος τοῦ λογαρίθμου τῆς μονάδος καὶ μικρό-

τερος του λογαριθμου του 10, ητοι ο λογάριθμος του 7 θα είνε μηδὲν σὺν μέρος της 1. Όμοιως σκεπτόμενοι, έχομεν ότι ο λογαριθμος καθενὸς τῶν ἀριθμῶν, οἱ δοποὶ περιέχονται μεταξὺ τῶν

1 καὶ 10 θὰ ισοῦται μὲν 0 + μέρος τῆς μονάδος μεταξὺ τῶν 10 καὶ 100 θὰ ισοῦται μὲν 1 + μέρος τῆς μονάδος

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἐὰν ἀριθμός τις περιέχεται μεταξὺ 0, 1 καὶ 1 θὰ ἔχῃ λογάριθμον μεγαλύτερον του λογαρίθμου του 0, 1 καὶ μικρότερον του λογαρίθμου τῆς μονάδος. Δηλαδή, ο λογάριθμος του ἀριθμοῦ αὐτοῦ θὰ είνε — 1 + μέρος τῆς μονάδος.

Όμοιως ο λογάριθμος καθενὸς ἀριθμοῦ περιεχομένου μὲν μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 0,01 καὶ 0,1 θὰ είνε — 2 + μέρος τῆς μονάδος* μεταξὺ τῶν 0,001 καὶ 0,01 θὰ είνε — 3 + μέρος τῆς μονάδος

Τὸ μέρος του λογαρίθμου ἀριθμοῦ τιος τὸ δοποῖον είνε μικρότερον τῆς μονάδος, ἐκφράζεται, συνήθως, διὰ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ (κατὰ προσέγγισιν). "Ωστε ο λογάριθμος ἀριθμοῦ θὰ είνε ἐν γένει, ἀκέραιος ἢ δεκαδικὸς ἀριθμός (κατὰ προσέγγισιν).

γ') Δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν λογάριθμον ἀριθμοῦ ὅλως ἀρνητικόν, εἰς ἄλλον, τοῦ δοποίου τὸ μὲν ἀκέραιον μέρος νὰ είνε ἀρνητικόν, τὸ δὲ δεκαδικὸν θετικόν.

"Εστω π.χ. ο ὅλως ἀρνητικὸς λογάριθμος ἀριθμοῦ τινος — 2,54327· ήτοι ο — 2 — 0,54327.

'Ἐὰν εἰς τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν προσθέσωμεν τὸν — 1 καὶ τὸν + 1 (τὸ δοποῖον δὲν μεταβάλλει τὴν ἀξίαν του), εύροισκομεν

— 3 + 1 — 0,54327.

'Αφαιροῦντες τὸ δεκαδικὸν μέρος 0,54327 ἀπὸ τῆς μονάδος, εύροισκομεν — 3 + 0, 45673, τὸ δοποῖον γράφεται, συνήθως, καὶ ὡς ἑξῆς $\overline{3}$, 45673.

Δηλαδὴ γράφομεν τὸ ἀρνητικὸν σημεῖον ὑπεράνω του ἀκεραιού μέρους, ἵνα δηλώσωμεν ότι τοῦτο μόνον είνε ἀρνητικόν, τὸ δὲ δεκαδικὸν μέρος θετικόν.

'Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ότι

«διὰ νὰ τρέψωμεν λογάριθμον ὅλως ἀρνητικὸν εἰς ἄλλον ίσον του, έχοντα μόνον τὸ ἀκέραιον μέρος ἀρνητικόν, αὐξάνομεν τὴν ἀπό-

λυτον τιμήν τοῦ ἀκεραίου τοῦ δοθέντος κατὰ 1· γράφομεν τὸ σημεῖον πλὴν ὑπεράνω τοῦ ἔξαγυμένου, δεξιά του δέ, ὡς δεκαδικὸν τὰ ὑπόλοιπα τῶν δεκαδικῶν ψηφίων τοῦ δοθέντος, τοῦ μὲν τελευταίου, ἀπὸ τοῦ 10, τῶν δ' ἄλλων ἀπὸ τὸ 9·.

δ') Τὰ ἀκέραιον μέρος (θετικόν, ἀριθμητικόν, ἢ μηδὲν) λογαρίθμου λέγεται χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου τούτου.

ε') Κατὰ ταῦτα, «δ λογάριθμος ἀριθμοῦ τινος ἀποτελεῖται, ἐν γένει, ἀπὸ δύο μέρη ἀπὸ τὸ χαρακτηριστικὸν (ἀκέραιον, θετικόν, ἢ ἀρνητικόν, ἢ καὶ μηδὲν) καὶ ἀπὸ δεκαδικὸν μέρος, τὸ δποῖον εἶναι θετικός ἀριθμὸς ἢ μηδέν».

Οὕτω εἰς τὸν λογάριθμον 3,52184 τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι 3, τὸ δὲ δεκαδικὸν μέρος τὸ 0,52184. Εἰς τὸν $\overline{2},78256$ τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι— 2, τὸ δὲ δεκαδικὸν 0,78256.

Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγομεν ὅτι

στ') «Ἐὰν ἀριθμὸς εἶναι μεγαλύτερος τῆς μονάδος, τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου του ἰσοῦται μὲ τὸν ἀριθμόν, δστις ἐκφράζει τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων τοῦ ἀκεραίου μέρους του, ἥλαττωμένον κατὰ μονάδα».

ζ') «Ἐὰν ἀριθμὸς εἶναι μικρότερος τῆς μονάδος (γραμμένος ὑπὸ δεκαδικὴν μορφὴν), τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου του εἶναι τόσαι ἀρνητικαὶ μονάδες, δση εἶναι ἡ τάξις τοῦ πρώτου σημαντικοῦ ψηφίου του, τοῦ κειμένου δεξιὰ τῆς ὑποδιαστολῆς».

η') «Ἐὰν τὸ χαρακτηριστικὸν λογαρίθμου εἶναι ἀριθμὸς θετικός, δ ἀντιστοιχῶν εἰς αὐτὸν ἀριθμὸς ἔχει τόσα ἀκέραια ψηφία δσας μονάδας ἔχει τὸ χαρακτηριστικὸν σὺν ἐν».

θ') «Ἐὰν τὸ χαρακτηριστικὸν δοθέντος λογαρίθμου εἶναι ἀριθμὸς ἀρνητικός, δ ἀντιστοιχῶν εἰς αὐτὸν ἀριθμὸς ἔχει ἀκέραιον μηδέν, καὶ τόσα μηδενικὰ μετὰ τὴν ὑποδιαστολήν, δσας μονάδας (ἀρνητικὰς) ἔχει τὸ χαρακτηριστικὸν πλὴν ἐν».

Οὕτω τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογ. 532,75 εἶναι τὸ 2. Διότι τὸ 532,75 εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 100, ἀλλὰ μικρότερον τοῦ 1000. Ἀρα δ λογάριθμος του θὰ εἶναι 2 + μέρος τι τῆς μονάδος.

Ο λογάριθμος τοῦ 5,3275 ἔχει χαρακτηριστικὸν 0. Διότι, δ

5,3275 είνε μεγαλύτερος τοῦ 1 καὶ μικρότερος τοῦ 10. "Αρα ὁ λογάριθμός του θὰ είνε 0 + μέρος της 1.

"Ο λογάριθμος τοῦ 0,045 ἔχει χαρακτηριστικόν — 2. Διότι ὁ 0,045 είνε μεγαλύτερος τοῦ 0,01 καὶ μικρότερος τοῦ 0,1. "Αρα ἔχει λογάριθμον — 2 + μέρος της 1.

"Ο λογ. 0,00652 ἔχει χαρακτηριστικὸν — 3. "Ο λογ. 0,0000732 ἔχει χαρακτηριστικὸν — 5.

ε') «Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ ἔχουν τὰ αὐτὰ ψηφία καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, διαφέρουν δὲ μόνον ὡς πρὸς τὴν θέσιν τῆς ὑποδιαστολῆς, οἱ λογάριθμοί των διαφέρουν μόνον κατὰ τὸ χαρακτηριστικόν των».

Πράγματι, ἔστω ἀριθμός τις, π. χ. ὁ 3271 καὶ ὁ λογάριθμός του 3,51468. Ἐὰν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν διαιρέσωμεν διὰ 100 π.χ. θὰ ἔχωμεν $3271 : 100 = 32,71$. Ο λογάριθμος τοῦ 32,71 = λογ. 3271 — λόγ. 100 (\S 130, γ'). "Ητοι λογ. 32,71 = $3,51468 - 2 = 1,51468$. Παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ δεκαδικὸν μέρος τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν 3271 καὶ 32,71 είνε τὸ αὐτό.

'Ἐν γένει, ἐὰν ἔχωμεν ὅτι $10^x = A$, καὶ πολλαπλασιάσωμεν τὰ δύο ἵσα ἐπὶ δύναμίν τινα τοῦ 10, ἔστω τὴν 10^y θὰ ἔχωμεν $10^x \cdot 10^y = A \cdot 10^3$, ἢ $10^{x+y} = A \cdot 10^3$. Ἐκ τούτου συνάγομεν ὅτι λογ. ($A \cdot 10^3$) = $a + 3$. Άλλ' ὁ λογ. $A = a$. "Επομένως λογ. ($A \cdot 10^3$) = $a + 3 = \text{λογ. } A + 3$. Όμοίως, ἂν διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 10^2 π.χ. τὰ μέλη τῆς ἴσοτητος $10^x = A$, ενδίσκομεν ὅτι λογ. ($A : 10^2$) = λογ. $A - 2$. "Ητοι ἐὰν ἀριθμός τις πολλαπλασιασθῇ (διαιρεθῇ) μὲ τὸ $10 \cdot 100 \cdot 1000 \dots$, ὁ λογάριθμός του αὔξανει (ἐλαττοῦται) κατὰ $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots$

'Ασκήσεις. Νὰ εὑρεθῇ τὸ χαρακτηριστικόν τῶν λογαρίθμων

α') λογ. 35. β') λογ. 4513. γ') λογ. 0,5. δ') λογ. 1,37. ε') λογ. 0,00132.
στ') λογ. $\frac{13}{3}$. ζ') λογ. 397, 452. η') λογ. $\frac{4}{250}$. θ') λογ. $62 \frac{4}{9}$. ι') λογ. $2 \frac{1}{7}$.

§ 132. Πράξεις ἐπὶ τῶν λογαρίθμων.—

α') Αἱ πράξεις ἐπὶ τῶν λογαρίθμων γίνονται καθὼς καὶ αἱ ἐπὶ τῶν δεκαδικῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν μὲ παραλλαγάς τινας, ὅταν οἱ λογάριθμοι ἔχουν ἀρνητικὸν χαρακτηριστικόν.

ε') *Πρόσθεσις.* Διὰ νὰ προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμούς 2,57834 καὶ $\overline{1},67943$, τοὺς μὲν δεκαδικοὺς προσθέτομεν ώς συνήθως, ὅταν δὲ φθάσωμεν εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν ἀκεραίων λέγομεν 1 τὸ κρατούμενον καὶ 2 = 3, καὶ — 1 = 2. Οὗτο εὑρίσκομεν ἀθροισμα 2,25777.

γ') *Αφαίρεσις.* Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ $\overline{5},67893$ τὸν $\overline{8},75928$, τοὺς μὲν δεκαδικοὺς ἀφαιροῦμεν ώς συνήθως, ὅταν δὲ φθάσωμεν εἰς τοὺς ἀκεραίους λέγομεν 1 τὸ κρατούμενον καὶ — 8 ἵσον — 7, διὰ τὴν ἀφαίρεσιν γίνεται + 7 καὶ σὺν — 5 = + 2. Ἐπομένως τὸ ὑπόλοιπον εἶναι 2,91965.

δ') *Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ ἀκέραιον.* Ἐστω ὅιτε θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν $\overline{5},62890$ ἐπὶ 3.

Ἐχομεν προφανῶς $\overline{5},62890 = - 5.3. + 0,62890.3$
 $= - 15 + 1,88670 = \overline{14}, 88\,670.$

ε') *Διαιρέσις δι' ἀκέραιον.* Ἐστω ὅιτε θέλομεν νὰ εῦρωμεν τὸ πηλίκον τοῦ $\overline{5},62891$ διὰ τοῦ 3.

Παρατηροῦμεν ὅτι $\overline{5},62891 : 3 = (-5 + 0,62891) : 3$

$= (\overline{6} + 1,62891) : 3 = - 2 + 0,54297 = \overline{2},54297.$

Ομοίως διὰ νὰ διαιρέσωμεν τὸ $\overline{4},67831$ διὰ τοῦ 3,
 ἔχομεν $\overline{4},67831 : 3 = (-4 + 0,67831) : 3$

$= (-6 + 2,67831) : 3 = - 2 + 0,89277, \text{ ή } \overline{2},89277.$

Ασκήσεις. 1) Νὰ προστεθοῦν οἱ ἀριθμοὶ $\overline{2},34987 \cdot \overline{6},97832 \cdot 9,82057$.

2) Νὰ ἀφαιρεθῇ ὁ $\overline{3},9809$ ἀπὸ $\overline{8},30467$ ὁ $\overline{9},93726$ ἀπὸ τὸν $\overline{3},86564$.

3) Νὰ πολλαπλασιασθῇ ὁ $\overline{9},30942$ ἐπὶ 3·7·42.

4) Νὰ διαιρεθῇ ὁ $\overline{9},93642$ διὰ 8·9·12· (μέχρις ὅτου τὰ πηλίκια ἔχουν πέντε δεκαδικὰ ψηφία).

§ 133. Πώς εὑρίσκομεν τὸν λογάριθμον ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν.—

α') «Καλοῦμεν λογάριθμον ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν μονάδος, ή $O, 1$ ή $O,01, \dots$ τὸν μικρότερον τῶν ἐκθετῶν δύο δυνάμεων τοῦ 10 , μεταξὺ τῶν δύοιών περιέχεται ὁ ἀριθμός, καὶ οἵτινες (ἐκθέται) διαιφέρουν κατὰ μονάδα, ή $O,1$ ή $O,01, \dots$ »

Οὕτω ἔὰν ἔχωμεν $10^{\circ} < A < 10^{\circ+1}$ τὸ ρ λέγεται λογάριθμος τοῦ α κατὰ προσέγγισιν μονάδος. Ἡτοι τὸ ρ εἶναι τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ A.

$$\text{''Αν } \tilde{\chi} \text{ωμεν} \quad 10^{\frac{\lambda}{10}} < A < 10^{\frac{\lambda+1}{10}}$$

τὸ $\frac{\lambda}{10}$ λέγεται λογάριθμος τοῦ Α κατὰ προσέγγισιν 0, 1.

6') Εστω διι ζητεῖται δ λογάριθμος τοῦ Α κατὰ προσέγγισιν 0,1. Αν παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν διὰ τοῦ $\frac{x}{10}$ θὰ
ζητηθεῖται $10^{\frac{x}{10}} < A < 10^{\frac{x+1}{10}}$

Υψοῦμεν τὰ ἄνισα εἰς τὴν 10ην δύναμιν καὶ εὑρίσκομεν

$$10^x < A^{10} < 10^{x+1}$$

Άλλ' ἐκ τῆς σχέσεως ταύτης παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ x εἶνε τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ A^{10} .

Ομοίως ἐργαζόμεθα, ἂν ζητοῦμεν τὸν λογάριθμον ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,01 ή 0,001,...

Ἐπομένως «διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν λογάριθμον ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,1 ή 0,01, ... ἀρκεῖ νὰ υψώσωμεν τὸν ἀριθμὸν εἰς τὴν 10ην, ή τὴν 100ην, ... δύναμιν, τοῦ ἔξαγομένου νὰ εὔρωμεν τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ λογαρίθμου του καὶ τοῦτο νὰ διαιρέσωμεν διὰ 10 ή 100...».

§ 134. Περὶ τῶν λογαριθμικῶν πενταψηφίων.—

α') Ενῷ δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ ἀκέραιον μέρος καὶ ὀσαδήποτε δεκαδικὰ ψηφία θέλομεν τοῦ λογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ (ως ἀνωτέρω εἴδομεν), ἐν τούτοις ή μέθοδος αὐτὴ εἶνε λίαν μακρὰ καὶ ἐπίπονος. Διὰ τοῦτο ὑπάρχουν πίνακες, οἵτινες λέγονται λογαριθμικοὶ πίνακες, περιέχοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ τῆς μονάδος καὶ ἔξῆς μέχρι τινός. Ἐπειδὴ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου δοθέντος ἀριθμοῦ εὐρίσκεται εὐκόλως (§ 131, στ', ζ'), διὰ τοῦτο οἱ λογαριθμικοὶ πίνακες περιέχουν ἑκάστου λογαρίθμου μόνον τὸ δεκαδικὸν μέρος, συνήθως, μὲ πέντε δεκαδικὰ ψηφία. Ἐν τούτοις ὑπάρχουν καὶ πίνακες, οἵ δοποῖοι περιέχουν τὸ δεκαδικὸν μέρος ἑκάστου λογαρίθμου μὲ ἐπτὰ δεκαδικὰ ψηφία ἔκαστον ή καὶ δώδεκα.

β') Συνήθως μεταχειριζόμεθα πίνακας λογαρίθμων πενταψηφίων, δηλαδὴ περιέχοντας τὸ δεκαδικὸν μέρος τῶν λογαρίθμων ἀκεραίων τινῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τῆς μονάδος καὶ ἔξῆς καὶ ἔκαστον

μὲ πέντε δεκαδικὰ ψηφία. Ή διάταξις αὐτῶν φαίνεται ἐκ τοῦ κατώτερω πίνακος.

γ') Αἱ δεκάδες τῶν ἀριθμῶν εἶνε γραμμέναι εἰς τὴν πρώτην στήλην, εἰς τὴν κορυφὴν τῆς ὁποίας ὑπάρχει τὸ γράμμα N (Nombres), αἱ δὲ μονάδες αὐτῶν εἰς τὴν ὁριζοντίαν σειρὰν μετὰ τοῦ N. Ο λογάριθμος καθενὸς ἀριθμοῦ εὑρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς γραμμῆς τῶν μονάδων καὶ τῶν δεκάδων τοῦ ἀριθμοῦ.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	69897	906	914	923	932	940	949	958	966	975
1	984	992	*001	*010	*018	*027	*036	*044	*053	*062
2	70070	079	088	096	105	114	122	131	140	148
3	157	165	174	183	191	200	209	217	226	234
4	243	252	260	269	278	286	295	303	312	321
5	329	338	346	355	364	372	381	389	398	406
6	415	424	432	441	449	458	467	475	481	492
7	501	509	518	526	535	544	552	561	569	578
8	586	595	603	612	621	627	638	646	655	663
9	672	680	689	697	706	714	723	731	740	749
510	757	766	774	783	791	800	809	817	825	834
1	842	851	859	868	876	885	893	902	910	919
2	927	935	944	952	961	969	978	986	995	*003

Ἐπειδὴ πολλοὶ ἔφεξῆς ἀριθμοὶ ἔχουν τὰ δύο πρῶτα ψηφία τῶν λογαρίθμων των κοινά, γράφονται ταῦτα ἀπαξ μόνον καὶ νοοῦνται ἐπαναλαμβανόμενα τὰ αὐτά, μέχρις ὅτου ἀλλαχθοῦν.

δ') Ο ἀστερίσκος ὅστις ἐνιαχοῦ ἀπαντᾷ, σημαίνει ὅτι τὰ παραλειπόμενα δύο πρῶτα ψηφία ἥλλαξαν καὶ πρέπει νὰ λάβωμεν τὰ ἀμέσως ἐπόμενα.

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν ὅτι

λογ. 500 = 2,69897.

λογ. 5000 = 3,69897.

λογ. 5017 = 3,70044.

λογ. 5063 = 3,70441.

λογ. 5129 = 3,71003.

§ 135. Χρῆσις τῶν λογαριθμικῶν πεντάκων.—

α') Τοὺς λογαριθμικοὺς πίνακας μεταχειρίζομεθα κατὰ τὰς ἔξης δύο περιπτώσεις.

«Οταν δοθέντος ἀριθμοῦ τινος, θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸν λογάριθμὸν του».

«Οταν δοθέντος λογαριθμοῦ τινός, θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸν ἀντιστοιχοῦντα εἰς αὐτὸν ἀριθμόν».

6') Περίπτωσις πρώτη. Έαν δοθεὶς ἀριθμὸς δὲν ἔχῃ περισσότερα τῶν τεσσάρων ψηφία, τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου του ὑπάρχει εἰς τοὺς πίνακας καὶ εὑρισκόμενον αὐτό, καθὼς εἴδομεν ἀνωτέρῳ. Οὗτῳ ἔχομεν τὸν λογάριθμον τοῦ ἀριθμοῦ, διότι γνωρίζομεν νὰ εὑρίσκωμεν τὸ χαρακτηριστικόν του (§ 131, στ', ζ').

Ασκήσεις. Νὰ εύρεθοῦν οἱ λογάριθμοι τῶν 0,003817·1,141·0,0845·107,3·1203 13,07·0,0013·0,00064124.

γ') Έαν δοθεὶς ἀριθμός, τοῦ δποίου ζητεῖται δ λογάριθμος εξχῇ ψηφία περισσότερα τῶν τεσσάρων, χωρίζομεν τὰ τέσσαρα πρῶτα δι' ὑποδιαστολῆς, ἀφοῦ προηγουμένως εὗρωμεν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ζητουμένου λογαρίθμου του. Έαν π. χ. ζητῆται δ λογάριθμος τοῦ ἀριθμὸν 50735, τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ζητουμένου λογαρίθμου εἶνε 4, χωρίζοντες δὲ τὰ 4 πρῶτα ψηφία δι' ὑποδιαστολῆς, ἔχομεν τὸν ἀριθμὸν 5073,5. Ἐπειδὴ, ὡς γνωστὸν (§ 131, i'), τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ τούτου καὶ τοῦ δοθέντος εἶνε τὸ αὐτό, ἔπειται δτι ἀρκεῖ νὰ εὗρωμεν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ 5073,5. Ἄλλ' αὐτὸς περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν 5073 καὶ 5074. Ἀρα δ λογάριθμος τοῦ 5073,5 θὰ περιέχεται μεταξὺ τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν 5073 καὶ 5074. Εκ τῶν πινάκων εὑρίσκομεν δτι

$$\text{λογ. } 5073 = 3,70526, \quad \text{λογ. } 5074 = 3,70535.$$

Η διαφορὰ τῶν δύο τούτων λογαρίθμων εἶνε 9 ἑκατοστὰ τοῦ χιλιοστοῦ. Τώρα σκεπτόμεθα ὡς ἔξῆς.

"Οταν δ ἀριθμὸς ἀπὸ 5073 αὐξηθῇ κατὰ 1 καὶ γίνη 5074, δ λογάριθμός του αὐξάνεται κατὰ 9 μονάδας τῆς πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως. "Οταν δ ἀριθμὸς αὐξηθῇ κατὰ 0,5 διὰ νὰ γίνη 5073,5 δ λογάριθμός του θὰ αὐξηθῇ κατὰ $9,0,5 = 4,5$ ἢ κατὰ 5 περίπου ἑκατοστὰ τοῦ χιλιοστοῦ. "Ωστε, πρέπει εἰς τὸν λογάριθμον 3,70526 νὰ προσθέσωμεν 5 ἑκατοστὰ χιλιοστοῦ, Λνα ἔχωμεν τὸν λογάριθμον τοῦ 5073,5. Ἐκτελοῦντες τὴν πρόσθεσιν, εὑρίσκομεν δτι

$$\text{λογ. } 5073,5 = 3,70531. \quad \text{Άρα δ λογ. } 50735 = 4,70531.$$

Έαν δοθεὶς ἀριθμὸς εἶνε 5,0735 τὸ μὲν χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου του θὰ εἶνε 0, τὸ δὲ δεκαδικὸν μέρος του θὰ εἶνε τὸ

αὐτὸν πρὸς τὸ τοῦ λογαρίθμου τοῦ 50735 (§ 131, i'). Ἐπομένως
θὰ ἔχωμεν δτι λογ. 5,0735 = 0,70531.

δ') Περίπτωσις δευτέρα. Ἐάν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ δοθέντος λογαρίθμου εὑρίσκεται εἰς τοὺς πίνακας, εὑρίσκομεν ἀπέναντι αὐτοῦ τὰ τέσσαρα ψηφία τοῦ ξητούμενου ἀριθμοῦ.

Ἐστω π. χ. ὅτι δὲ δοθεὶς λογάριθμος εἶναι δὲ 3,70140. Τὸ δεκαδικὸν μέρος εὑρίσκεται εἰς τὸν ἀνωτέρω πίνακα καὶ δὲ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς εἶναι δὲ 5028. Ἐπειδὴ τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι 3, δὲ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς ἔχει τέσσερα ἀκέραια ψηφία (§ 131, η). ἄρα εἶναι ἀκριβῶς δὲ 5028. Καθ' ὅμοιον τρόπον εὑρίσκομεν ὅτι εἰς τὸν λογάριθμον 1,70552 ἀντιστοιχεῖ δὲ ἀριθμὸς 0,5076. Εἰς τὸν λογάριθμον 0,70995 ἀντιστοιχεῖ δὲ ἀριθμὸς 5,128.

ε') Ἀν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ δοθέντος λογαρίθμου δὲν ὑπάρχῃ εἰς τοὺς πίνακας, θὰ περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν δεκαδικῶν μερῶν τῶν λογαρίθμων δύο διαδοχικῶν ἀριθμῶν.

Ἐστω π. χ. δτι δίδεται ὁ λογάριθμος 2,70169 καὶ ζητεῖται
ὅλητιστοιχῶν εἰς αὐτὸν ἀριθμός. Τὸ δεκαδικὸν μέρος αὐτοῦ εὑρί-
σκεται μεταξὺ τοῦ 0,70169 καὶ τοῦ 0,70174 τῶν ἀριθμῶν 5031
καὶ 5032. Οἱ λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν τούτων διαφέρουν, ὡς βλέ-
πομεν, κατὰ 9 μονάδας τῆς πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως, ἐνώ οἱ
ἀριθμοὶ διαφέρουν κατὰ 1. Τώρα σκεπτόμεθα ὡς ἔξης.

⁷Αν δ λογάριθμος τοῦ 5031, δ ὅποιος εἶνε 3,70165, αὐξηθῇ κατὰ 9 μονάδας τῆς πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως, δ ἀριθμὸς αὐξάνεται κατὰ 1. ⁸Αν δ λογάριθμος αὐξηθῇ κατὰ 4 μονάδας τῆς πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως καὶ γίνῃ 3,70169 δ ἀριθμὸς θὰ αὐξηθῇ κατὰ $\frac{4}{9}$ τῆς μονάδος αὐτῆς, ἥτοι κατὰ 0,44... ⁹Ωστε δ ἀριθμός, τοῦ ὅποίου τὸ δεκαδικὸν μέρος εἶνε 0,70169 θὰ εἶνε δ 5031,44... Ἐπειδὴ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ δοθέντος λογαρίθμου εἶνε 2, δ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς ἔχει τρία ἀκέραια ψηφία. ¹⁰Αρα εἶνε δ 503,144.

Ασκήσεις, 1) Νὰ εύρεθοῦν οἱ λογάριθμοι τῶν ἀετοῦ

$$\alpha') 95348. \quad \beta') 6,8372. \quad \gamma') 0,98629. \quad \delta') 968 \frac{3}{8} . \quad \varepsilon') 3,6598. \quad \sigma\tau') 6,8347.$$

2) Νὰ εὑρεθῇ ὁ ξ ἐκ τοῦ δεδομένου λογαρίθμου του

$\alpha')$ λογ. $x = 0,63147$. $\beta')$ λογ. $x = 1,72127$. $\gamma')$ λογ. $x = 0,68708$.

$\delta')$ λογ. $x = \overline{3,92836}$. $\epsilon')$ λογ. $x = \overline{4,38221}$. $\sigma')$ λογ. $x = \overline{3,70082}$.

§ 136. Ἐφαρμογαὶ τῶν λογαρίθμων.—

α') Διὰ τῶν ὑδιοτήτων τῶν λογαρίθμων (§ 130) δυνάμεθα νὰ ἀναγάγωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν ἀριθμῶν εἰς τὴν πρόσθεσιν, τὴν διαιρέσιν εἰς τὴν ἀφαίρεσιν, τὴν ὑψώσιν εἰς δύναμιν εἰς πολλαπλασιασμὸν καὶ τὴν ἔξαγωγὴν οἵζης εἰς διαιρέσιν. Πράγματι, ἀν ζητοῦμεν τὸ γινόμενον δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν, εὑρίσκομεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀριθμῶν τούτων καὶ προσθέτομεν αὐτούς· τὸ ἄθροισμα τὸ διποῖν θὰ εὑρῷμεν θὰ εἴνε, ὡς γνωστόν, δ λογάριθμος τοῦ γινομένου τῶν ἀριθμῶν. Εὑρίσκομεν ἀκολούθως τὸν λογάριθμον αὐτὸν εἰς τοὺς πίνακας (ἢ τῇ βοηθείᾳ αὐτῶν), καὶ τὸν ἀντιστοιχοῦντα εἰς τοῦτον ἀριθμόν. Οὗτος θὰ παριστάνῃ προφανῶς τὸ ζητούμενον γινόμενον.

β') Διὰ νὰ εὕρῳμεν τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν, ἐργαζόμεθα διμοίως, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι θὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν λογάριθμον τοῦ διαιρετέου τὸν λογάριθμον τοῦ διαιρέτου.

γ') Νὰ εὑρεθῇ ὁ x , ἐὰν εἴνε $x = 72,214 \cdot 0,08203$.

Ἐὰν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο ἵσων, ἔχομεν (§ 130, β'),

$$\text{λογ. } x = \text{λογ. } 72,214 + \text{λογ. } 0,08203.$$

Ἐὑρίσκοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο παραγόντων, ἔχομεν

$$\text{λογ. } 72,214 = 1,85862, \quad \text{λογ. } 0,08203 = \overline{2,91397}.$$

Ἐπομένως, προσθέτοντες εὑρίσκομεν ὅτι $\text{λογ. } x = 0,77259$, τούτου δι' εὑρίσκοντες τὸν ἀντιστοιχοῦντα ἀριθμόν, ἔχομεν $x = 5,9236$.

δ') Νὰ εὑρεθῇ τὸ γινόμενον $-908,4 \cdot 0,05392 \cdot 2,117$.

Ἐὰν παραστήσωμεν τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ γινομένου διὰ τοῦ x καὶ λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων, εὑρίσκομεν

$$\text{λογ. } x = \text{λογ. } 908,4 + \text{λογ. } 0,05392 + \text{λογ. } 2,117.$$

Ἐκ τῶν πινάκων ἔχομεν ὅτι $\text{λογ. } 908,4 = 2,95828$,

$$\text{λογ. } 0,05392 = \overline{2,73175}, \quad \text{λογ. } 2,117 = 0,32572.$$

Διὰ προσθέσεως τούτων προκύπτει ὅτι λογ. $x = 2,01575.$

Ο ἀντίστοιχος ἀριθμὸς τοῦ λογαρίθμου τούτου εἶναι ὁ $103,69.$

Ἐπειδὴ τὸ ζητούμενον γινόμενον εἶναι ἀρνητικὸν ($\S\ 10, \alpha'$),
ἔπειται ὅτι $x = -103, 69.$

$\epsilon')$ Νὰ εὑρεθῇ τὸ πηλίκον $x = 5250 : 23,487.$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο ἵσων, ἔχομεν

$$\text{λογ. } x = \text{λογ. } 5250 - \text{λογ. } 23,487.$$

Ἐκ τῶν πινάκων εὑρίσκομεν

$$\text{λογ. } 5250 = 3,72916, \quad \text{λογ. } 23,487 = 1,37082.$$

Δι’ ἀφαιρέσεως τοῦ δευτέρου τούτων ἀπὸ τοῦ πρώτου εὑρίσκομεν ὅτι $\lambda o g. x = 2,34933.$

Ἐκ τούτου ἔπειται ὅτι $x = 223,53.$

$\sigma\tau')$ Νὰ εὑρεθῇ ὁ x , ἐὰν εἶναι $x = \frac{7,56.4667.567}{899,1.0.00337.23435}$

Ἐὰν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο ἵσων, εὑρίσκομεν

$$\text{λογ. } x = \text{λογ. } 7,56 + \text{λογ. } 4667 + \text{λογ. } 567$$

$$- \text{λογ. } 899,1 - \text{λογ. } 0,00337 - \text{λογ. } 234,35.$$

Ἐκ τῶν πινάκων εὑρίσκομεν

$$\text{λογ. } 7,56 = 0,81852, \quad \text{λογ. } 899,1 = 2,95381.$$

$$\text{λογ. } 4667 = 3,66904, \quad \text{λογ. } 0,00337 = \overline{3},52763.$$

$$\text{λογ. } 567 = 2,75358, \quad \text{λογ. } 23435 = 4,36986.$$

Ἐκ τούτων εὑρίσκομεν

$$\text{λογ. } 7,56 + \text{λογ. } 4667 + \text{λογ. } 567 = 7,30114,$$

$$\text{λογ. } 899,1 + \text{λογ. } 0,00337 + \text{λογ. } 23435. = 4,85130.$$

Δι’ ἀφαιρέσεως προκύπτει λογ. $x = 2,44983.$

Εὑρίσκοντες τὸν ἀντίστοιχον τούτου ἀριθμὸν, ἔχομεν $x = 281,73.$

$\zeta')$ Νὰ εὑρεθῇ τὸ x ἐξ τῆς ἴσοτητος $x = 376^3.$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων, ἔχομεν

$$\text{λογ. } x = 3. \text{ λογ. } 376.$$

$$\text{Ἐκ τῶν πινάκων εὑρίσκομεν } \text{λογ. } 376 = 2,57519.$$

Ἐπομένως λογ. $x = 3,2,57519 = 7,72557.$

Ἐκ τοῦ δόπιου προκύπτει $x = 53159000.$

η') Νὰ εὑρεθῇ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 0,000043461.

Ἐὰν θέσωμεν $x = \sqrt{0,000043461}$ καὶ λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων, εὗρίσκομεν λογ. $x = \frac{1}{2} \cdot \text{λογ. } 0,000043461$

ἢ λογ. $x = \frac{1}{2} \cdot 5,63989$, ἢ λογ. $x = 3,81995$, ἐκ τοῦ δποίου ἔπειται ὅτι $x = 0,0066062$.

θ') Νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τοῦ x ἐκ τῆς ἴσοτητος $81^x = 10$.

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων ἔχομεν

$$\text{λογ. } 81^x = \text{λογ. } 10,$$

$$\text{ἢ } x \cdot \text{λογ. } 81 = \text{λογ. } 10 = 1.$$

Ἄρα $x = \frac{1}{\text{λογ. } 81}$.

Εἶναι $\text{λογ. } 81 = 1,90849$.

Ἐπομένως καὶ $x = \frac{1}{1,90849} = \frac{1,00000}{1,90849} = 0,52397$.

Ήτοι $x = 0,52397$.

Ασκήσεις. 1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἑξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων διὰ λογαρίθμων

$$\alpha') 0,4326^3. \beta') 12 \frac{1}{3} \cdot \gamma') \sqrt[5]{0,07776}. \delta') 13 \frac{1}{5} \left(\begin{array}{l} \text{Απ.} & 0,0809579 \cdot 2,289428 \\ 0,6 \cdot 0,959322 \end{array} \right)$$

$$\epsilon') -875,6348 \cdot 62,82407. \sigma') \sqrt[15]{\frac{25,36496}{(0,0893462)^8}}. \quad \left(\begin{array}{l} \text{Απ.} & -55010,95 \\ 305498300 \end{array} \right).$$

2) Νὰ εὑρεθῇ ἡ περιφέρεια κύκλου, τοῦ ὁποίου ἡ διάμετρος εἴνε 2,51075. (7,8875).

3) Νὰ παρεμβληθοῦν 8 ἀριθμοὶ μεταξὺ τῶν 12 καὶ 23437500, ὥστε νὰ ἀποτελεσθῇ γεωμετρικὴ πρόσδοση. (ό λόγος = 5).

4) Νὰ εὑρεθῇ ἡ διάρκεια πτώσεως σώματος, πέπτοντος ἐν τῷ κενῷ ἄνευ ἀρχικῆς ταχύτητος, ἀπὸ ὕψους 4810 μ. (τῆς κορυφῆς τοῦ λευκοῦ ὅρους). (31,317").

137. Λύσεις ἐκθετικῶν ἐξισώσεων διὰ τῶν λογαρίθμων.

Ἐκθετικὰς ἐξισώσεις (σελ. 122) δυνάμενα, ἐνίστε, νὰ λύωμεν μὲ τὴν βοήθειαν τῶν λογαρίθμων.

"Εστω ἡ ἐξίσωσις $3^x = 729$.

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων, ἔχομεν

$$x \cdot \text{λογ. } 3 = \text{λογ. } 729 \text{ καὶ } x = \frac{\text{λογ. } 729}{\text{λογ. } 3} = \frac{2,86273}{0,47712} = 6,00002\dots$$

"Εστω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισωσις $2^{x^2-9x-24} = 4096.$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων ἔχομεν

$$(x^2 - 9x - 24). \text{λογ. } 2 = \text{λογ. } 4096.$$

"Ἄρα $x^2 - 9x - 24 = \frac{\text{λογ. } 4096}{\text{λογ. } 2} = 12.$

"Ητοι $x^2 - 9x - 24 = 12.$

Λύοντες δ' αὐτὴν εὑρίσκομεν $x = 12$ καὶ $x = -3.$

"Εστω ἡ ἔξισωσις $\left(\frac{3}{4}\right)^x = 51,5.$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων, ἔχομεν

$$x. \text{λογ. } \left(\frac{3}{4}\right) = \text{λογ. } 51,5. \text{Έξ οὖ } x = \frac{\text{λογ. } 51,5}{\text{λογ. } \frac{3}{4}} = -13,701.$$

"Ασκήσεις. Νὰ λυθοῦν αἱ ἔξισώσεις

$$\alpha') 3x = 177147. \quad \beta') 3^{\frac{x}{2}} = 768. \quad \gamma') 3^{\sqrt{x}} = 243. \quad (\text{Απ. } \frac{11 \cdot 12,09}{25})$$

$$\delta') 24^{3x-2} = 10000. \quad \epsilon') 5^{x^2-3x} = 625. \quad (\text{Απ. } 1,6327 \cdot 4 \text{ καὶ } -1).$$

$$\sigma\tau') x^{x^2-7x+12} = 1.$$

$$("Εχομεν (x^2 - 7x + 12). \text{λογ. } x = 0, \text{ εἰς οὖ } \eta \text{ λογ. } x = 0 \\ x = 1, \quad \eta \quad x^2 - 7x + 12 = 0. \quad "Ητοι x = 1, \eta 3, \eta 4).$$

$$\zeta') 6^{x^4 - 18x^2 + 86} = 7776. \eta') \alpha. \alpha^3. \alpha^5. \alpha^7 \dots \alpha^{2x-1} = v, (\text{Απ. } 3 \cdot 3, \left(\frac{\text{λογ. } v}{\text{λογ. } \alpha}\right)^{\frac{1}{2}}).$$

θ') Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα

$$x^4 + y^4 = 641, \quad \text{λογ. } (xy)^2 = 2.$$

(Απ. 2·5)

§ 138. Λύσεις ἐκθετικῶν ἔξισώσεων ἀνευ χρήσεως λογαριθμικῶν πινάκων.—

Δυνάμεθα ἐνίστε, νὰ λύσωμεν ἐκθετικὰς ἔξισώσεις ἀνευ τῆς βοηθείας τῶν λογαρίθμων πινάκων.

"Εστω ἡ ἔξισωσις $10^{(5-x)(6-x)} = 100.$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων, εὑρίσκομεν

$$(x-5). (x-6). \text{λογ. } 10 = \text{λογ. } 100.$$

"Ἄρα $(x-5). (x-6) = \text{λογ. } 10 = 2,$

$\eta) (x-5). (x-6) = 2.$

Λύοντες αὐτὴν εὑρίσκομεν $x = 7$ καὶ $x = 4.$

"Εστω ἡ ἔξισωσις $a^{(\beta-x)x} = a^x, \quad (\alpha \text{ θετικὸν καὶ } \neq 1)$

"Εχομεν $(\beta x - x^2). \text{λογ. } a = x. \text{λογ. } a \text{ καὶ } \beta x - x^2 = x.$ ἐκ τῆς δόποιας προκύπτει $x = 0 \text{ καὶ } x = \beta - 1.$

Ασκήσεις. 1) Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις ἄνευ τῆς γρήσεως τῶν λογαριθμικῶν πινάκων.

$$\alpha') 5^{\frac{x}{2}} - 7.5^{\frac{x}{2}} - 450 = 0. \quad \beta') 5 \cdot \lambda\text{oy. } x - \lambda\text{oy. } 288 = 3. \quad \lambda\text{oy. } \frac{x}{2}.$$

$$\gamma') \sqrt[x]{\alpha} = \alpha. \quad \delta') 2^{\frac{x+3}{2}} + 4^{\frac{x+1}{2}} = 320. \quad (\text{Απ. } \pm 4.3).$$

$$\epsilon') 2^{\frac{x}{2}} + 4^{\frac{x}{2}} = 272. \quad \sigma') \lambda\text{oy. } x = \lambda\text{oy. } 24 - \lambda\text{oy. } 8 \quad (\text{Απ. } 4.3).$$

$$\zeta') 2 \cdot \lambda\text{oy. } x = \lambda\text{oy. } 192 + \lambda\text{oy. } \frac{3}{4}. \quad \eta') 2^{x+1} + 4^x = 80. \quad (\text{Απ. } 12.3).$$

2) Νὰ λυθοῦν τὰ συστήματα

$$\alpha') x^2 + y^2 = 425, \quad \beta') x + y = 65,$$

$$\lambda\text{oy. } x + \lambda\text{oy. } y = 2. \quad \lambda\text{oy. } (x-y) = 3.$$

$$\gamma') 5x^2 - 3y^2 = 11300, \quad \left(\begin{array}{l} \text{Απ. } 20.5 \\ \lambda\text{oy. } x + \lambda\text{oy. } y = 3. \quad 25.40 \\ 20.20 \end{array} \right).$$

§ 139*). Περὶ τῶν λογαρίθμων ὡς πρὸς βάσεις
οἰκειόδηποτε.—

α') Καλοῦμεν λογάριθμον ἀριθμοῦ ὡς πρὸς βάσιν τινά, ἔστω τὴν β, τὸν ἔχθετν τῆς δυνάμεως τοῦ β, ἢ ὅποια ἰσοῦται μὲ τὸν δοθέντα ἀριθμόν.

Ἐπειδὴ εἶνε $2^3 = 8, \quad 3^4 = 81,$

ὁ λογάριθμος τοῦ 8 ὡς πρὸς βάσιν 2 εἶνε τὸ 3· ὁ λογάριθμος τοῦ 81 ὡς πρὸς βάσιν 3 εἶνε τὸ 4.

Ἐν γένει, ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἐκθετικὴν ἔξισωσιν $\beta^x = A,$ ἢ οἵα τῆς ἔξισώσεως ταύτης, δηλαδὴ ἢ τιμὴ τοῦ x, διὰ τὴν ὅποιαν ἐπαλήθευται ἢ ἔξισωσις, καλεῖται λογάριθμος τοῦ A ὡς πρὸς βάσιν 6, καὶ παριστάνεται συμβολικῶς οὕτω

$$\lambda\text{oy. } A = x.$$

β') Κατὰ τὰῦτα οἱ λογάριθμοι, τοὺς ὅποιους ἔξητάσαμεν ἐν τοῖς προηγούμενοις, ἔχουν βάσιν τὸν 10 καὶ διὰ τοῦτο τὸ σύστημα τῶν λογαρίθμων τούτων καλεῖται δεκαδικόν, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ ἄλλου οἰουδήποτε, τὸ ὅποιον δύναται νὰ ἔχῃ ἄλλην βάσιν.

γ') Παρατηρητέον ὅτι ἢ βάσις τῶν λογαρίθμων πρέπει νὰ εἶνε ἀριθμὸς θετικὸς καὶ διάφορος τῆς μονάδος. Διότι ἢ ἐκθετικὴ ἔξισωσις $1^x = A$

εἶνε ἀδύνατος διὰ τιμὴν τοῦ A διάφορον τῆς μονάδος, ἢ δὲ ἔξισωσις $(-\beta)^x = A$ δὲν ἐπιδέχεται πάντοτε λύσιν, καθὼς π. χ. ἢ

$$(-10)^x = 1000.$$

δ') Καλοῦμεν λογάριθμον ἀριθμοῦ τυνος A ως πρὸς βάσιν τινά β κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{v}$ τὸν ἀριθμὸν $\frac{x}{v}$ (ὅπου τὸ x εἶναι ἀκέραιος) ὡστε νὰ ἔχωμεν τὴν σχέσιν $\beta^{\frac{x}{v}} \leq A < \beta^{\frac{x+1}{v}}$.

*Ἐὰν ἔχωμεν $\beta^{\frac{x}{v}} = A$, τότε τὸ $\frac{x}{v} = \log_{\beta} A$. A.

*Ἐὰν τὰ ἀνωτέρω ἄνισα ὑψώσωμεν εἰς τὴν $v^{\text{η}}$ δύναμιν εὑρίσκομεν $\beta^x \leq A^v < \beta^{x+1}$.

ε') Ἐκ τούτου ἐπεται ὅτι «διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν λογάριθμον ἀριθμοῦ A ως πρὸς βάσιν β κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{v}$, ἀρκεῖ, νὰ ὑψώσωμεν τὸν A εἰς τὴν $v^{\text{η}}$ δύναμιν, τούτου νὰ εὔρωμεν τὸν λογάριθμον κατὰ προσέγγισιν μονάδος, καὶ τὸ ἔξαγόμενον νὰ διαιρέσωμεν διὰ v .

στ') Ἐκτὸς τῶν ἴδιοτήτων τὰς δοποίας ἐγνωρίσαμεν εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα τῶν λογαρίθμων (ἴσχύουν δὲ δι' οἰονδήποτε σύστημα καὶ ἀποδεικνύονται δομοίως), ἔχομεν ἀκόμη τὰς ἔξῆς.

«Οἱ λογάριθμοι ἀριθμοῦ ὡς πρὸς βάσεις ἀντιστρόφους εἶναι ἀντίθετοι».

*Ἡτοι λέγω ὅτι $\log_{1/\beta} A = -\log_{\beta} A$

Διότι, ἔστω ὅτι $\delta \log_{\beta} A = x$. Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν $\beta^x = A$.

*Ἐὰν λάβωμεν ἀντὶ τοῦ β^x τὸ γ σον του $\frac{1}{\beta^{-x}}$ ἢ τὸ $\left(\frac{1}{\beta}\right)^{-x}$ θὰ ἔχωμεν $\left(\frac{1}{\beta}\right)^{-x} = A$ Ἀλλὰ τοῦτο φανερώνει ὅτι λογ_{1/β} A = -x. Ἐπομένως λογ_β A = -λογ_{1/β} A.

ζ') «Οἱ λογάριθμοι τῶν ἀντιστρόφων ἀριθμῶν ὡς πρὸς τὴν αὐτὴν βάσιν εἶναι ἀντίθετοι».

Λέγω δηλαδὴ ὅτι $\log_{\beta} A = -\log_{\beta} \frac{1}{A}$.

Διότι, ἔστω x ὁ λογάριθμος τοῦ A ως πρὸς βάσιν τὴν β. Θὰ ἔχωμεν τότε $\beta^x = A$ καὶ ἀντιστρέφοντες τοὺς γίσους τούτους, θὰ ἔχωμεν $\frac{1}{\beta^x} = \frac{1}{A}$ ἢ καὶ $\beta^{-x} = \frac{1}{A}$.

*Ἡ γεύτης αὐτὴ φανερώνει ὅτι $\log_{\beta} \left(\frac{1}{A}\right) = -x$,

*Ἔπειτα $\log_{\beta} \left(\frac{1}{A}\right) = -\log_{\beta} A$.

η') Άλλαγὴ τῆς βάσεως τῶν λογαρίθμων. "Ας ὑποθέσωμεν ὅτι γνωρίζουμεν τὸν λογάριθμον ἐνδός ἀριθμοῦ, ἔστω τοῦ Α, ὡς πρὸς βάσιν β, καὶ ζητοῦμεν τὸν λογάριθμόν του ὡς πρὸς ἄλλην βάσιν, ἔστω τὴν β'. Δίδεται δηλαδὴ ὁ λογβ. Α καὶ ζητεῖται τὸ λογβ'. Α. "Εὰν παραστήσωμεν τὸν λογβ. Α διὰ τοῦ χ, ἥτοι, ἂν θέσωμεν λογβ. Α = χ, θὰ ἔχωμεν $\beta^x = \text{Α}$. "Αν τῶν ἵσων ἀριθμῶν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους ὡς πρὸς βάσιν β', θὰ ἔχωμεν, λογβ'. (β^x) = λογβ'. Α.

'Αλλ' εἰνε λογβ'. (β^x) = χ. λογβ'. β (§ 130, δ').

'Επομένως ἔχομεν χ. λογβ'. β = λογβ'. Α.

'Αντικαθίστωντες τὸ χ διὰ τοῦ ἵσου του. ἔχομεν

λογβ. Α. λογβ'. β = λογβ'. Α.

"Ητοι «Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν λογάριθμον ἀριθμοῦ ὡς πρὸς νέαν βάσιν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν λογάριθμόν του ὡς πρὸς τὴν παλαιὰν βάσιν ἐπὶ τὸν λογάριθμον τῆς παλαιᾶς βάσεως ὡς πρὸς τὴν νέαν».

"Ασκησις. Δείξατε ὅτι ὁ λογβ'. β. λογβ'. β' = 1.

Περὶ ἀνατοκισμοῦ καὶ χρεωλυσίας.

140. Προβλήματα ἀνατοκισμοῦ.—

α') Τὰ προβλήματα τόκου, εἰς τὰ δποῖα τὸ κεφάλαιον δὲν μένει τὸ αὐτὸ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ δανείου, ἀλλ' εἰς τὸ τέλος ὠρισμένου τινός χρόνου προστίθεται εἰς αὐτὸ δ τόκος του, δ δποῖος ἀποτελεῖ μετ' αὐτοῦ νέον κεφάλαιον, λέγονται προβλήματα ἀνατοκισμοῦ ἢ συνθέτου τόκου. 'Ενῶ ἐκεῖνα, τὰ δποῖα ἔξητάσαινεν ἐν τῇ Ἀριθμητικῇ λέγονται πρὸς διάκοισιν ἀπὸ τούτων προβλήματα ἀπλοῦ τόκου. "Ωστε, προβλήματα ἀνατοκισμοῦ λέγονται ἐκεῖνα, εἰς τὰ δποῖα δ τόκος προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον εἰς τέλος καθεμιᾶς χρονικῆς μονάδος καὶ ἀποτελεῖ μετ' αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον τῆς ἐπομένης χρονικῆς μονάδος.

β') (Πρόβλημα 1). «Δανείζει τις ποσδύν α δραχ. ἐπὶ ἀνατοκισμῷ μὲ τόκου τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα (ἐν ἔτοις, μίαν ἔξαμηνίαν, μίαν τριμηνίαν, κλπ.) τ δραχ. πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἐν δλῷ μετὰ ν χρονικὰς μονάδας;»

Πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ ἡ μία δραχμὴ εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα δίδει τόκον τ δρχ., αἱ α δρχ. εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα θὰ δώσουν τόκον α. τ δρχ.

Ἐπομένως τὸ κεφάλαιον α δρχ. καὶ δ τόκος του εἰς τὸ τέλος τῆς πρώτης χρονικῆς μονάδος θὰ είνε

$$\alpha + \alpha \tau = \alpha \cdot (1 + \tau) \text{ δρχ.}$$

Ἡτοι τὸ κεφάλαιον α πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν παράγοντα $(1 + \tau)$, ἵνα δώσῃ τὸ ζητούμενον ποσὸν εἰς τὸ τέλος τῆς πρώτης χρονικῆς μονάδης.

Ομοίως σκεπτόμενοι, εὑρίσκουμεν ὅτι τὸ κεφάλαιον α $(1 + \tau)$ εἰς τὸ τέλος μιᾶς ἀκόμη χρονικῆς μονάδος θὰ γίνη μετὰ τοῦ τόκου αὐτοῦ

$$\alpha (1 + \tau) \cdot (1 + \tau) \quad \text{ἢ} \quad \alpha (1 + \tau)^2.$$

Ωστε τὸ ἀρχικὸν πιεσὸν α δρχ. θὰ γίνη μετὰ τοῦ τόκου του εἰς τὸ τέλος τῆς δευτέρας χρονικῆς μονάδος

$$\alpha \cdot (1 + \tau)^2.$$

Καθ' ὅμοιων τρόπουν προχωροῦντες εὑρίσκον μεν ὅτι εἰς τὸ τέλος ν χρονικῶν μονάδων τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον α θὰ γίνη

$$\alpha \cdot (1 + \tau)^n.$$

Ἄν τὸ ποσὸν τοῦτο παραστήσωμεν διὰ τοῦ Σ θὰ ἔχωμεν

$$\Sigma = \alpha (1 + \tau)^n \quad (1)$$

Ἐκ τοῦ τύπου τούτου δυνάμεθα νὰ εὑρώμεν ἐν τῶν τὸ Σ, α, ν, τ τῇ βοηθείᾳ καὶ τῶν λογαρίθμων (ἀκριβῶς ἢ κατὰ προσέγγισιν), ὅταν γνωρίζωμεν τὰ τρία ἐξ αὐτῶν.

Ἐφαρμογή. «Δανειζει τις 1500 δρχ. ἐπὶ ἀνατοκισμῷ πρὸς 4% κατ' ἔτος πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἐν δλῷ μετὰ ἐξ ἔτη;»

Ἐνταῦθα ἔχομεν $\alpha = 1500$, $\nu = 6$, $\tau = 0,04$, διότι αἱ 100 δρχ. εἰς ἐν ἔτος φέρουν τόκον 4 δρχ. ἄρα ἡ 1 δρχ. εἰς ἐν ἔτος φέρει τόκον 0,04 δρχ., ζητεῖται δὲ τὸ Σ.

Ἐπομένως ἀντικαθιστῶντες εἰς τὸν τύπον (1) ἔχομεν

$$\Sigma = 1500 \cdot (1,04)^6.$$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων μελῶν ἔχομεν

$$\lambda\text{og. } \Sigma = \lambda\text{og. } 1500 + 6 \cdot \lambda\text{og. } (1,04).$$

Ἐκ τῶν πινάκων ἔχομεν $\lambda\text{og. } 1500 = 3,17609$
 $6 \cdot \lambda\text{og. } 1,04 = 6,01703 = 0,10218$, \ddots ἐξ ὧν προκύπτει
 διὰ προσθέσεως $\lambda\text{og. } \Sigma = 3,27827$ καὶ ἐκ τούτου $\Sigma = 1897,9$.

Ητοι δ τοκίσας τὰς 1500 δρχ. ἐπὶ ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος πρὸς 4 % θὰ λάβῃ μετὰ 6 ἔτη ἐν δλῳ 1897,90 δρχ.

γ') (Πρόβλημα 2), «Πόσας δραχμᾶς πρέπει νὰ τοκίσῃ τις ἐπ' ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος πρὸς 6 %, ἵνα μετὰ 15 ἔτη λάβῃ ἐν δλῳ 5000 δραχμάς;»

Έχομεν $\Sigma = 5000$, $\tau = 0,06$. $1 + \tau = 1,06$, $v = 15$,
καὶ ζητεῖται τὸ α.

Αντικαθιστῶντες εἰς τὸν τύπον (1) εὑρίσκομεν

$$5000 = a \cdot (1,06)^{15}.$$

Ἐὰν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἴσων τούτων ἀριθμῶν, εὑρίσκομεν λογ. $5000 = \text{λογ. } a + 15$. λογ. $1,06$ ἐκ τοῦ ὅποίου ἔχομεν λογ. $a = \text{λογ. } 5000 - 15$. λογ. $1,05$.

Ἐκ τῶν πινάκων εὑρίσκομεν λογ. $5000 = 3,69897$
 15 . λογ. $1,06 = 15,002531 = 0,37965$ καὶ ἐξ αὐτῶν δι' ἀφαιρέσεως λογ. $a = 3,31932$ ἐκ τοῦ ὅποίου ἔπειται ὅτι
 $a = 2086$ δρχ.

δ') (Πρόβλημα 3). «Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον 862 δρχ., ἀνατοκιζόμεναι κατ' ἔτος, γίνονται μετὰ 5 ἔτη 1048,70 δρχ.»

Έχομεν $a = 862$, $v = 5$, $\Sigma = 1048,70$
καὶ ζητεῖται τὸ τ.

Αντικαθιστῶντες τὰς τιμὰς ταύτας εἰς τὸν τύπον (1) εὑρίσκομεν $1048,70 = 862 \cdot (1 + \tau)^5$. Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο τούτων ἴσων εὑρίσκομεν λογ. $1048,70 = \text{λογ. } 862 + 5$. λογ. $(1 + \tau)$ ἐκ τοῦ ὅποίου ἔπειται ὅτι λογ. $(1 + \tau) = \frac{\text{λογ. } 1048,70 - \text{λογ. } 862}{5}$.

Ἐκ τῶν πινάκων εὑρίσκομεν λογ. $1048,70 = 3,02065$, λογ. $862 = 2,93591$, ἐκ τῶν ὅποίων ἔχομεν λογ. $1048,70 - \text{λογ. } 862 = 0,08474$ καὶ λογ. $(1 + \tau) = 0,08474 : 5 = 0,01695$, ἐκ τοῦ δποίου ἔπειται ὅτι $i + \tau = 1,0398$, καὶ $\tau = 0,0398$.

Αντὸς εἶνε ὁ τόκος τῆς μιᾶς δρχαμῆς εἰς 1 ἔτος, ἀρά τὸ ἐπιτόκιον 100 τ. θὰ εἶνε 3,98 δρχ.

ε') (Πρόβλημα 4). «*Μετὰ πόσον χρόνου 12589 δρχ. ἀνατοκιζόμεναι κατ' ἔτος πρὸς 5%* γίνονται *45818 δρχ.*»

"Εχομεν $a = 12589$, $\tau = 0,05$, $\Sigma = 45818$
καὶ ζητεῖται τὸ ν.

'Αντικαθιστῶντες εἰς τὸν τύπον (1) εὑρίσκομεν
 $45818 = 12589 \cdot (1,05)$.^v 'Εὰν λάβωμεν τὸν λογαρίθμους τῶν
δύο ἵσων, εὑρίσκομεν λογ. $45818 = \text{λογ. } 12589 + v. \text{ λογ. } 1,05$
ἐκ τοῦ δποίου προκύπτει ὅτι $v = \frac{\text{λογ. } 45818 - \text{λογ. } 12589}{\text{λογ. } 1,05}$.

'Εκ τῶν πινάκων ἔχομεν λογ. $45818 = 4,66104$
λογ. $12589 = 4,09999$, λογ. $1,05 = 0,02119$.

'Η διαφορὰ τῶν δύο πρώτων εἶνε 0,56105. 'Επομένως θὰ ἔχωμεν
 $v = \frac{0,56105}{0,02119} = 26$ ἔτη καὶ τι ἐπὶ πλέον.

στ') Διὰ νὰ εὗρωμεν καὶ τὸ ἀπαιτούμενον μέρος τοῦ 27ον
ἔτους, παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ τέλος του 26ου ἔτους αἱ 12589
δρχ. γίνονται 12589. (1,05)²⁶. 'Εὰν δὲ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ τοκισθῇ
μὲ ἀπλοῦν τόκον ἐπὶ η ἡμέρας, θὰ φέρῃ τόκον $\frac{12589 \cdot (1,0)^{26} \cdot \eta. 5}{36000}$
(τοῦ ἔτους λογιζομένου μὲ 360 ἡμέρας). 'Επομένως τὸ ἀρχικὸν κε-
φάλαιον θὰ γίνῃ μετὰ 26 ἔτη καὶ η ἡμέρας

$12589 \cdot (1,05)^{26} + 12589 \cdot (1,05)^{26} \frac{\eta. 5}{36000}$
η $12589 \cdot (1,05)^{26} \left(1 + \frac{\eta. 5}{36000}\right)$ τοῦτο δὲ εἶνε ἵσον μὲ τὸ 45818.
ἵτοι ἔχομεν $45818 = 12589 \cdot (1,05)^{26} \left(1 + \frac{5. \eta}{36000}\right)$
ἐκ τοῦ δποίου εὑρίσκομεν διὰ τῶν λογαρίθμων ὅτι εἶνε $\eta = 172$.
'Επομένως τὸ δάνειον διήρκεσε 26 ἔτη καὶ 172 ἡμέρας.

ζ') Τὸν ἀριθμὸν η εὑρίσκομεν μὲ ἴκανὴν προσέγγισιν καὶ ὡς
ξέñης. Εὑρίσκομεν πρῶτον τὸν ἀριθμὸν 12589 (1,05)²⁶ καὶ τοῦτον
ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ 45818. 'Η οὕτω προκύπτουσα διαφορὰ πα-
ριστάνει τὸν ἀπλοῦν τόκον τοῦ ποσοῦ τῶν 12589. (1,05)²⁶ δρχ. πρὸς 5%

εἰς τὸν ζητούμενον χρόνον. Ἐπομένως δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, λύοντες πρόβλημα ἀπλοῦ τόκου εἰς τὸ δποῖον ζητεῖται ὁ χρόνος.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

'Ομάς πρώτη. 1) Εἰς τὸ ἀγωτέρω πρόσθημα 400 εὑρετε τὸ η διὰ τοῦ ἐκτεθέντος τρόπου, λύοντες πρόσθημα ἀπλοῦ τόκου.

2) Πόσας δρχ. θὰ λάβῃ τις, ἐὰν ἀνατοκίσῃ κατ' ἔτος 5600 (160,45) δρχ. ἐπὶ 100 (17) ἔτη πρὸς 5 (3,5)%; 736407,2 (287, 95).

3) Πατὴρ κατέθεσεν εἰς τράπεζαν 750 (5876) δρχ. κατὰ τὴν γέννησιν τοῦ νιοῦ του ἐπ' ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος πρὸς 4,5 (4,5)%.. Πόσα θὰ λάβῃ ὁ υἱός του εἰς τὸ τέλος τοῦ 20 (25) ἔτους τῆς ηλικίας του; 1809,85 (17659,95).

4) Πόσην αὔξησιν παθοῖνει κεφάλαιον 100000 δρχ. εἰς 8 ἔτ. 8 μην., ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος πρὸς 4%;

'Ομάς δευτέρᾳ. 1) Ποῖον ἀρχικὸν κεφάλαιον γίνεται μετὰ τῶν τόκων του ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος πρὸς 3,5 (4,5)% εἰς 20 (10) ἔτη 3730,85 (14495); 1875,43 (9397,4).

2) Τις ἡ παροῦσα ἀξία κεφαλαίου 45896 (25130) δρχ., πληρωτέου μετὰ 15 ἔτη 210 ἡμ. (12,5 ἔτη) ἐπ' ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος πρὸς 8 (4)%; 43831,7 (15388).

3) Πόσον ποσὸν πρέπει νὰ τοκίσωμεν ἐπ' ἀνατοκισμῷ καθ' ἔξαμηνίαν πρὸς 4%; οὐα μετὰ 18 ἔτη γίνη 20000 δρχ.; 9804,4.

'Ομάς τρίτη. 1) Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατόν ἐτοκίσθη ἐπ' ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος κεφάλαιον 625 (3200) δρχ. ἐπὶ 15 (37) ἔτη, καὶ γίνει 1166,9 (11427,2) δρ.; 4,257 (3,5).

2) Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατόν λογαριάζεται ἢ τόκος, ἐὰν 1000 δρχ. εἰς 22 ἔτη γίνωνται 2247,7 δρ. ἀνατοκιζόμεναι;

3) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει ν' ἀνατοκισθῇ ἐν κεφάλαιον κατ' ἔτος. διὰ νὰ τετραπλασιασθῇ μετὰ 31 ἔτη; 4,5%.

'Ομάς τετάρτη. 1) Εἰς πόσον χρόνον, ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος, κεφάλαιον 3580 (25837), δρχ. πρὸς 4,5 (8)%, γίνεται 56000 (49853 δρχ.);

6 ἔτη 221 ἡμ. (8 ἔτη 193 ἡμ.).

2) Πότε κατετέθησαν 630 δρχ. εἰς τράπεζαν τινα ἐπ' ἀνατοκισμῷ πρὸς 4%, ἐὰν τὴν 1ην Ἀπριλίου 1909 εἴγον γίνει 969,80 δρχ.;

3) Έπει πόσον χρόνον πρέπει ν' ἀνατοικισθῇ κατ' ἔτος ποσόν τι πρὸς 3,5 %, διὰ νὰ διπλασιασθῇ, τριπλασιασθῇ, τετραπλασιασθῇ;

20 ἔτη 54 ἡμ. · 31 ἔτ. 336 ἡμ. · 40 ἔτ. 103 ἡμ.

4) Ο πληθυσμὸς ἐνὶς Κράτους αὐξάνεται κατ' ἔτος κατὰ τὸ ὄγδοηκοστὸν τοῦ προηγουμένου ἔτους. Μετὰ πόσα ἔτη θὰ διπλασιασθῇ, τριπλασιασθῇ ὁ πληθυσμὸς τοῦ;

56 περίπου.

5) Μία πόλις ἔχει 8000 κατοίκους καὶ ο πληθυσμὸς τῆς ἐλαττοῦται κατὰ 160 κατοίκους. Ἐὰν ἡ ἐλάττωσις ἐξακολουθήσῃ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν, μετὰ πόσα ἔτη θὰ ἔχῃ 5000 κατοίκους;

23 περίπου.

§ 141. Προβλήματα ἵσων καταθέσεων.—

α') (Πρόβλημα 1). «Καταθέτει τις εἰς τὴν τράπεζαν ἐπ' ἀνατοικισμῷ κατ' ἔτος πρὸς $4 \frac{1}{2} \%$ ποσὸν 2050 δρχ. εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους. Πόσα θὰ λάβῃ μετὰ 15 ἔτη;»

Ἡ πρώτη κατάθεσις τῶν 2050 δρχ. θὰ μείνῃ 15 ἔτη, ἀνατοικιζομένη πρὸς 4,5 %. Ἐπομένως θὰ γίνῃ 2500. ($1,045^{15}$).

Ἡ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ δευτέρου ἔτους γινομένη κατάθεσις θὰ μείνῃ μόνη 14 ἔτη ἐν τῷ τόκῳ ἀρα θὰ γίνῃ 2050. ($1,045^{14}$).

Ομοίως ἡ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ τρίτου ἔτους κατάθεσις θὰ γίνῃ 2500. ($1,045^{13}$) κ. ο. κ., ἡ δὲ τελευταία θὰ μείνῃ μόνον ἐν ἔτος καὶ θὰ γίνῃ 2050. ($1,045$).

“Ωστε τὸ ποσὸν τὸ διποῖον θὰ λάβῃ εἰς τὸ τέλος τῶν 15 ἔτῶν θὰ εἶνε 2050. ($1,045^{15}$) + 2050. ($1,045^{14}$) + ... + 2050. ($1,045$).

Παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ ἀθροισμα αὐτὸ εἶνε ἀθροισμα τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου, τῆς διποίας ὁ λόγος εἶνε ($1,045$). Ἐφαρμόζοντες λοιπὸν τὸν τύπον τοῦ ἀθροίσματος τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου, ($\S 127$, γ'), εὑρίσκομεν ὅτι τὸ ποσὸν Σ , τὸ διποῖον θὰ λάβῃ,

$$\text{εἶνε } \Sigma = \frac{2050 \cdot (1,045)^{15} \cdot (1,045) - 2050 \cdot (1,045)}{0,045}$$

$$\text{ἢ } \Sigma = 2050 \cdot (1,045) \cdot \frac{(1,045)^{15}-1}{0,045}.$$

Διὰ τῶν λογαρίθμων εὑρίσκομεν πρῶτον τὸ ($1,045^{15}$). Πρὸς τοῦτο ἔχομεν, ἐὰν θέσωμεν $x = (1,045)^{15}$,

$$\lambda\text{og. } x = 15. \lambda\text{og. } (1,045) = 0,28680,$$

ἐκ τοῦ ὅποίου ἔπειται ὅτι $x = 1,93554..$

$$\text{“} \Omega \sigma t e \text{ θὰ } \tilde{\chi} \omega m e n \Sigma = 2050. (1,045) \frac{0,93554}{0,045}$$

$$\Sigma = \frac{2050. 1,045. 935,54}{45} .$$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο ίσων ἔχομεν
λογ. $\Sigma = \log. 2050 + \log. 1,045 + \log. 935,54 - \log. 45.$

Ἐκ τῶν πινάκων ἔχομεν λογ. $2050 = 3,31175$

λογ. $1,045 = 0,01912$

λογ. $935,54 = 2,97107$

ἀθροισμα $\frac{6,30194}{}$

λογ. $45 = 1,65321$

καὶ ἀφαιροῦντες εὗρίσκομεν λογ. $\Sigma = 4,64873$, ἐκ τοῦ
δποίου προκύπτει $\Sigma = 44518^*$ ἡτοι μετὰ 15 ἔτη θὰ λάβῃ 44518 δρχ.

6') Ἐν γένει, ἐὰν καταθέτῃ τις εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστης χρονικῆς
μονάδος α δρχ. εἰς τινα τράπεζαν ἐπ' ἀνατοκισμῷ μὲ τόκον τ τῆς μιᾶς
δραχ. εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα, ζητήται δὲ πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ
μετὰ ν χρονικὰς μονάδας, παρατηροῦμεν, δι της πρώτης κατάθεσις θὰ γίνη

$$\alpha (1 + \tau)^v, \quad \text{ἡ δευτέρα} \quad \alpha (1 + \tau)^{v-1}$$

κ. ο. κ. ἡ τελευταία $\alpha (1 + \tau)$. $\text{“} \Omega \sigma t e \text{ εἰς τὸ τέλος τῶν } v \text{ χρονικῶν } \mu \nu \text{ μονάδων } \theta \text{ὰ λάβῃ } \alpha (1 + \tau) + \alpha (1 + \tau)^2 + \dots + \alpha (1 + \tau)^v.$ Ἀν
παραστήσωμεν τὸ ἀθροισμα αὐτὸ διὰ τοῦ Σ , θὰ ἔχωμεν

$$\Sigma = \alpha \cdot (1 + \tau) \frac{(1 + \tau)^v - 1}{\tau}, \quad \text{ἐκ τοῦ δποίου προσδιορίζεται τὸ } \Sigma \text{ διὰ τῶν λογαρίθμων, ἡ τὸ } \alpha, \text{ ἐὰν δοθῇ τὸ } \Sigma, \text{ τὸ } \tau, \text{ καὶ τὸ } v.$$

γ') (Πρόβλημα 2). «Καταθέτει τις εἰς τὸ τέλος ἑκάστης χρο-
νικῆς μονάδος α δραχμὰς ἐπὶ ἀνατοκισμῷ μὲ τόκον τ τῆς μιᾶς
δραχμῆς εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ
μετὰ ν χρονικὰς μονάδας;»

“Η πρώτη κατάθεσις θὰ μείνῃ ἐπὶ $(v-1)$ χρονικὰς μονάδας. Ἄρα
θὰ γίνῃ $\alpha (1 + \tau)^{v-1}$. Η δευτέρα θὰ μείνῃ $(v-2)$ χρονικὰς μονά-
δας, ἀραι θὰ γίνῃ $\alpha (1 + \tau)^{v-2}$ καὶ οὕτω καθεξῆς ἡ τελευταία θὰ
είνε μόνον α . $\text{“} \Omega \sigma t e \text{ θὰ } \tilde{\chi} \omega m e n$

$$\Sigma = \alpha + \alpha (1 + \tau) + \alpha (1 + \tau)^2 + \dots + \alpha (1 + \tau)^{v-1}$$

$$\text{ἢ} \quad \Sigma = \frac{\alpha (1 + \tau)^v - \alpha}{\tau} = \alpha \cdot \frac{(1 + \tau)^v - 1}{\tau}, \quad \text{ἐκ τοῦ δποίου προσ-}$$

διορίζεται τὸ Σ διὰ τῶν λογαρίθμων, ὅταν δοθῇ ἡ τιμὴ τῶν α, τ, ν.
Ἐκ τοῦ αὐτοῦ τύπου εὑρίσκομεν εὐκόλως διὰ τῶν λογαρίθμων τὸ α,
ὅταν γνωρίζωμεν τὸ Σ, ν, τ.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

1) Ἐμπορος καταθέτει εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστου ἔτους 350 δρχ. ἐκ τῶν κερδῶν του εἰς τὴν τράπεζαν ἐπ' ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος πρὸς 4 %. Πόσα θὰ λάθῃ εἰς τὸ τέλος τοῦ 20ου ἔτους; 10835,25.

2) Καταθέτει τις κατ' ἔτος μὲ σύνθετον τόκον 1000 δρχ. πρὸς 5 %. Μετὰ πόσον χρόνον θὰ λάθῃ 13210 δρχ. 11 ἔτ.

3) Ἡ διατροφὴ καὶ τὰ ἔξοδα τῶν σπουδῶν τέκνου κατεγράφοντο ὑπὸ τοῦ πατρὸς εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἔτους ἀνήρχοντο δὲ κατὰ μέσον ὅρον εἰς 2000 δρχ. ἐτησίως. Πόσα θὰ ἐγένοντο αὐτὰ μετὰ 3 ἔτη, ἐνν ἀνετοκίζοντο κατ' ἔτος πρὸς 3,5 %;

4) Πατήρ τις ἀποκτῆσας κόρην, θέλει νὰ καταθέτῃ κατ' ἔτος ποσόν τι ὥρισμένον δι' αὐτήν, ἵνα αὐτὰ ἀνατοκίζομενα κατ' ἔτος πρὸς 5 % γίνουν μετὰ 21 ἔτ. 25000 δρχ. Πόσα πρέπει νὰ είνε ἡ ἐτησία κατάθεσις; 666,57.

§ 142. Προβλήματα χρεωλυσέας. —

α') **Χρεωλυσία** λέγεται ἡ ἐντὸς ὥρισμένου χρόνου ἀπόσβεσις χρέους δι' ἵσων δόσεων, αἱ δόποιαι πληρώνονται κατ' ἵσα χρονικὰ διαστήματα. Τὸ ποσόν, τὸ δόποιον πληρώνεται εἰς τὸ τέλος ἑκάστου χρονικοῦ διαστήματος λέγεται **χρεωλύσιον**, καὶ χρησιμεύει μέρος μὲν αὐτοῦ διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν τόκων τοῦ χρέους, τὸ δὲ ὅλλο μέρος διὰ τὴν βαθμαίαν ἀπόσβεσιν τοῦ χρέους.

Τὸ χρέος ἔξιφλεῖται, ὅταν τὸ ἄθροισμα πάντων τῶν χρεωλυσίων μετὰ τῶν συνηθέτων τόκων τῶν ἀποτελέση ποσότητα ἵσην μὲ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνατοκιζομένου ἀρχικοῦ κεφαλαίου.

β') (Πρόβλημα 1). «*Ἐδανείσθη τις 18500 δρχ. πρὸς 4½ % ἐπ' ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος, μὲ τὴν συμφωνίαν νὰ ἔξιφλήσῃ τὸ χρέος του διὰ 12 ἵσων χρεωλυσίων, τὰ δόποια θὰ πληρώνωνται εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἔτους. Πόσον είνε τὸ χρεωλύσιον;*

Τὸ ἀρχικὸν ποσόν τῶν 18500 δρχ. θὰ γίνῃ μετὰ 12 ἔτη 18500. (1,045)¹². Ἐὰν διὰ τοῦ καὶ παραστήσωμεν τὸ ζητούμενον χρεωλύσιον, ἡ πρώτη δόσις ἐκ καὶ δραχμῶν θὰ γίνῃ κ. (1,045)¹¹, μετὰ 11 ἔτη, κατὰ τὰ ὅποια ὑποτίθεται ὅτι ἔμειναν εἰς τὸν τόκον.

Η δευτέρα δόσις θὰ γίνῃ $x \cdot (1,045)^{10}$, ἡ τρίτη $x \cdot (1,045)^9$, κ. ο. κ.
ἡ τελευταία θὰ μείνῃ x . Ἐπομένως τὸ ἀθροισμα τῶν πληρωθέντων
ποσῶν μετὰ τῶν τόκων των θὰ εἶνε

$$x + x \cdot (1,045) + x \cdot (1,045)^2 + \dots + x \cdot (1,045)^{11}$$

ἢ $x \cdot \frac{(1,045)^{12} - 1}{0,045}$. Άλλὰ τὸ ποσὸν αὐτὸ πρέπει νὰ εἶνε ὕσον
μὲ τὸ δφειλόμενον, συμφώνως πρὸς τὸ πρόβλημα. Ήτοι θὰ ἔχωμεν

$$x \cdot \frac{(1,045)^{12} - 1}{0,045} = 18500 \cdot (1,045)^{12},$$

ἐκ τῆς δποίας εὑρίσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ x διὰ τῶν λογαρίθμων.

γ') Πρὸς τοῦτο εὑρίσκομεν πρῶτον τὴν δύναμιν $(1,045)^{12}$ θέτον-
τες αὐτὴν ὕσην μὲ ψ , ὅτε εἶνε $\psi = (1,045)^{12}$

καὶ λογ. $\psi = 12 \cdot \log. (1,045) = 0,22944$, ἐκ τοῦ δποίου προ-
κύπτει ὅτι $\psi = 1,696$.

δ') Λύοντες τὴν ἀνωτέρῳ ἔξισωσιν ὡς πρὸς x μετὰ τὴν ἀντικα-
τάστασιν τοῦ $(1,045)^{12}$ διὰ τοῦ ὕσου τον 1,696 εὑρίσκομεν

$$x = \frac{18500 \cdot 0,045 \cdot 1696}{696} \text{ ἐκ τοῦ δποίου λαμβάνομεν}$$

$$\log. x = \log. 18500 + \log. 0,045 + \log. 1696 - \log. 696.$$

Ἐκ τῶν πινάκων εὑρίσκομεν

$$\log. 18500 = 4,26717$$

$$\log. 0,045 = \overline{2,65321}$$

$$\log. 1696 = \underline{\overline{3,22943}}$$

$$\text{ἀθροισμα } 6,14981$$

$\log. 696 = 2,84261$. Ἐπομένως $\log. x = 3,30720$, ἐκ
τοῦ δποίου ἔπειται ὅτι $x = 2028,6$ δρχ.

ε') Ἐν γένει, ἐὰν διὰ τοῦ α παραστήσωμεν τὸ δανειζόμενον πο-
σὸν ἐπ' ἀνατοκισμῷ καθ' ὁρισμένην χρονικὴν μονάδα, διὰ τοῦ τ
τὸν τόκον τῆς 1 δραχμῆς εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα, καὶ διὰ τοῦ
ν τὸ πλῆθος τῶν χρονικῶν μονάδων, τὸ μὲν κεφάλαιον θὰ γίνῃ
α $(1 + \tau)^v$, ἡ δὲ δλικὴ ἀξία τῶν ν δόσεων ἐκ x δρχ. θὰ
εἶνε $x + x \cdot (1 + \tau) + x \cdot (1 + \tau)^2 + \dots + x \cdot (1 + \tau)^{v-1}$

$$\text{ἢ } x \cdot \frac{(1 + \tau)^v - 1}{\tau}.$$

Έπομένως θὰ ἔχωμεν $x \frac{(1+\tau)^v - 1}{\tau} = a \cdot (1+\tau)^v$ (1)

ἐκ τοῦ δποίου δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ x.

στ') (Πρόβλημα 2). «Ποῖον κεφάλαιον δύναται νὰ δανεισθῇ τις, ἐὰν θέλῃ νὰ ἔξιφλήσῃ τὸ χρέος του εἰς 6 ἔτ. διὰ ἐτησίου χρεωλυσίου 8000 δρχ., τοῦ ἐπιτοκίου δυτος 4 % ;»

Έχομεν $x = 8000$, $v = 6$, $\tau = 0,04$,
 ζητεῖται δὲ τὸ a. Αντικαθιστῶντες εἰς τὸν τύπον (1) τὸς τιμᾶς τῶν x, v, τ εὑρίσκομεν $8000 \cdot \frac{(1,04)^6 - 1}{0,04} = a \cdot (1,04)^6$, ἐκ τοῦ δποίου προκύπτει $a = \frac{8000 \cdot [(1,04)^6 - 1]}{0,04 \cdot (1,04)^6}$. Υπολογίζομεν ἐν πρώτοις τὴν δύναμιν $(1,04)^6$, καὶ ἀκολούθως εὑρίσκομεν διὰ τῶν λογαρίθμων $a = 41900$. δρχ.

ζ') (Πρόβλημα 3). «Εἰς πόσα ἔτη ἔξιφλεῖται δάνειον 20000 δρ. διὰ χρεωλυσίου 1300 δρ., τοῦ ἐπιτοκίου δυτος 3 % ;»

Έχομεν $a = 20000$, $x = 1300$, $\tau = 0,03$.
 Αντικαθιστῶντες τὰς τιμᾶς ταύτας εἰς τὸν τύπον (1) εὑρίσκομεν $1300 \cdot \frac{(1,03)^v - 1}{0,03} = 20000 \cdot (1,03)^v$, ἐκ τοῦ δποίου ἔχομεν $1300 \cdot (1,03)^v - 1300 = 0,03 \cdot 20000 \cdot (1,03)^v$
 ἢ $(1,03)^v [1300 - 0,03 \cdot 20000] = 1300$
 καὶ $(1,03)^v = \frac{1300}{700} = \frac{13}{7}$.

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο ἵσων ἔχομεν
 ν. λογ. $(1,03) =$ λογ. 13 — λογ. 7, ἐκ τοῦ δποίου εὑρίσκομεν $v = 20,943$ ἔτη. Ήτοι ἡ ἔξιφλησις θὰ γίνη μετὰ 21 ἔτη, ὅλλα ἡ τελευταία δόσις θὰ εἶνε κατά τι μικροτέρα τῶν ἄλλων.

Πρόβληματα πρὸς λύσιν.

1) Πόσον εἶνε τὸ χρεωλύσιον, διὰ τοῦ ὁποίου ἔξιφλεῖται χρέος 100 (200) ἐκατομμυρίων δρχ., ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος πρὸς 4 (5) %, ἢν ἔξιφλῆται ἐντὸς 50 (80) ἔτῶν δι' ἵσων δόσεων;

4655000 (1020592).

2) Χρέος ἔξιφλεῖται δι' ἵσων ἑτησίων δόσεων ἐντὸς 30 (10) ἔτῶν. Πόσον ἦτο τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον, ἐὰν καθεμία δόσις εἴνε 3180 (421,5) δργ. καὶ τὸ ἐπιτόκιον 4,5 (4,5) %;

51800 (3335).

3) "Εμπορος ἔδανείσθη 450000 δργ. ἐπ' ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος πρὸς 5 %. Εὰν πληρώνῃ ἑτησίου γρεωλύτιον 30000 δργ., μετὰ πόσα ἔτη θὰ ἔξιφληθῇ τὸ γρέος του;

29· ἡ τελευταία δόσις 29655.

4) Ἡ ἔξιφλησις γρέους πρέπει νὰ γίνῃ εἰς 20 ἔτη γρεωλυτικῶς. Καθεμία δόσις (ἑτησία) θὰ εἴνε 461300 δργ., θὰ ἀρχίσῃ δὲ ἡ πληρωμὴ μετὰ τὸ 5ον ἔτος ἀπὸ τοῦ δανείου. Πόσον ἦτο τὸ ἀρχικῶς δανεισθὲν ποσόν, τοῦ ἐπιτοκίου ὅντος 4 1/2 %;

4815000.

5) Κράτος ἔδανείσθη ποσόν τι διὰ νὰ κατασκευάσῃ στόλον πρὸς 3 3/4 %. Ἡ γρεωλυτικὴ ἔξιφλησις του ἀρχεται: 3 ἔτη μετὰ τὴν σύναψιν τοῦ δανείου καὶ θὰ πληρώνωνται 158800 δργ. ἑτησίως ἐπὶ 10 ἔτη. Πόσον ἦτο τὸ δανεισθὲν ποσόν;

1167910.

6) Χρέος ἔξι 1,5 ἔκατομμαρίων δργ. πρέπει νὰ ἔξιφληθῇ διὰ 15 ἵσων δόσεων ἑτησίων, ἀρχομένων 5 ἔτη μετὰ τὴν σύναψιν τοῦ δανείου. Πόσον θὰ εἴνε τὸ γρεωλύτιον, τοῦ ἐπιτοκίου ὅντος 3 3/4 %;

149310,9.

7) Πρός ποιὸν ἐπιτόκιον πρέπει νὰ ἔξιφλήσῃ τις γρεωλυτικῶς δάνειον 20000 (10000) διὰ 16 (6) ἑτησίων δόσεων ἐκ 1780,3 δργ. (1907,62) ἐκάστην;

(Ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν ἔξισωσιν (1) (σελ. 221, ε') εὑρίσκομεν

$$\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau(1+\tau)^{16}} = \frac{20000}{1780,30} \quad (2)$$

Ἡ ἔξισωσις περιέχει τὸν ἄγνωστον τὸ εἰς τὸν 17ον βαθύμον. Διὰ τοῦτο ἡ λύσις τῆς, ἐν γένει, δὲν εἶναι γνωστή, καὶ καταφεύγωμεν εἰς προσεγγίσεις. Τὸ πρῶτον μέλος τῆς ἔξισωσεως θὰ εἴνε μεγαλύτερον, ὥσω ὃ τὸ εἴναι μικρότερος. Εὰν ἀντιτατασταθῇ τὸ τὸ διὰ μικροῦ ἀριθμοῦ, τὸ ἔξαγομενον θὰ εἴναι μεγαλύτερον τοῦ $\frac{20000}{1780,30}$. Θέτοντες π. χ. $\tau = 0,04$ εὑρίσκομεν

$$\frac{1}{0,04} \left(1 - \frac{1}{1,04^{16}} \right) = 25 \left(1 - \frac{1}{1,04^{16}} \right) = 14,652285,$$

ἐνῷ ἐκ τοῦ δευτέρου μέλους τῆς (2) εὑρίσκομεν τὸ 11,234. Θέτομεν λοιπὸν $\tau = 0,04$, ἔπειτα $\tau = 0,045$ $\tau = 0,0475$ κ. ο. κ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

Περὶ τῆς θεωρίας τῶν Συνδυασμῶν.

§ 143. Περὶ μεταθέσεων.—

α') "Ἄσ ποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν ν ἐν ὅλῳ ἀντικείμενα. ἐκ τῶν ὁποίων καθὲν δύναται νὰ διακρίνεται τῶν ἄλλων" π. χ. 7 φιάλας, 10 μῆλα, τοὺς 9 μονοψηφίους ἀριθμοὺς κ.λ.π. Παριστάνομεν αὐτὰ συμβολικῶς διὰ τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_v$, καὶ θὰ τὰ καλοῦμεν *στοιχεῖα*. Τὰ ν ταῦτα στοιχεῖα δύνανται νὰ τεθοῦν τὸ ἐν κατόπιν τοῦ ἄλλου κατὰ πολλοὺς τρόπους. Π. χ. ἂν ἔχωμεν μόνον δύο, α_1 καὶ α_2 , δύνανται νὰ τεθοῦν κατὰ τοὺς ἔξης δύο τρόπους $\alpha_1 \alpha_2, \alpha_2 \alpha_1$. "Ἄν ἔχωμεν τρία, τὰ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ δύνανται νὰ τεθοῦν κατὰ τοὺς ἔξης τρόπους τὸ ἐν κατόπιν τοῦ ἄλλου

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3, \alpha_1 \alpha_3 \alpha_2, \alpha_2 \alpha_1 \alpha_3, \alpha_2 \alpha_3 \alpha_1, \alpha_3 \alpha_1 \alpha_2, \alpha_3 \alpha_2 \alpha_1$.

Τὰ διάφορα αὐτὰ ἔξαγόμενα, τὰ ὁποῖα δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν μὲ τὰ δοθέντα στοιχεῖα, καλοῦμεν μεταθέσεις αὐτῶν.

'Ἐν γένει, «καλοῦμεν μεταθέσεις ν στοιχείων τὰ διάφορα ἔξαγόμενα, τὰ ὁποῖα εὑρίσκομεν, ἐὰν θέσωμεν καὶ τὰ ν στοιχεῖα τὸ ἐν κατόπιν τοῦ ἄλλου κα^{α'} δλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους, ὥστε νὰ διαφέρουν μεταξύ των κατὰ τὴν θέσιν τούλαχιστον ἐνδὸς στοιχείου».

β') Θὰ παριστάνωμεν συμβολικῶς τὰς μεταθέσεις ν στοιχείων διὰ τοῦ M_v , ἡ διὰ τοῦ $v!$ καὶ θὰ δείξωμεν ὅτι εἰνε $M_v = 1.2.3.4....v$.

γ') "Εστω ὅτι ἔχομεν $v = 2$, δηλαδὴ ἀς ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν τὰ δύο στοιχεῖα α_1, α_2 . Εἰνε φανερόν, ὅτι αἱ μεταθέσεις των εἰνε δύο, αἱ $\alpha_1 \alpha_2, \alpha_2 \alpha_1$. "Ἐπομένως $M_2 = 2 = 1.2$.

δ') 'Ἐὰν εἰνε τὸ $v = 3$, δηλαδὴ ἀν ἔχωμεν τὰ τρία στοιχεῖα $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ἐργαζόμεθα ὡς ἔξης, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ πλήθος τῶν μεταθέσεών των. Λαμβάνομεν τὰς μεταθέσεις τῶν δύο στοιχείων α_1, α_2 , τὰς $\alpha_1 \alpha_2, \alpha_2 \alpha_1$, καὶ εἰς καθεμίαν ἔξ αὐτῶν παραθέτομεν τὸ τρίτον στοιχεῖον α_3 εἰς ὅλας τὰς δυνατὰς θέσεις ὡς πρὸς τὰ ἄλλα στοιχεῖα. Οὕτω, ἀπὸ τὴν $\alpha_1 \alpha_2$ θὰ προκύψουν αἱ $\alpha_3 \alpha_1 \alpha_2, \alpha_1 \alpha_3 \alpha_2, \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$, ἀφοῦ θέσωμεν τὸ α_3 πρὸς τοῦ α_1 , μετὰ τὸ α_1 , καὶ μετὰ τὸ α_2 . 'Ομοίως ἐκ τῆς $\alpha_2 \alpha_1$ προκύπτουν καθ' ὅμοιον τρόπον αἱ

$\alpha_3 \alpha_2 \alpha_1, \alpha_2 \alpha_3 \alpha_1, \alpha_2 \alpha_1 \alpha_3$.

"Ητοι ἐν ὅλῳ ἔξ. Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ αἱ ἔξ αὐταὶ μεταθέσεις τῶν τριῶν στοιχείων εἶνε διάφοροι μεταξύ των. Διότι, ὅσαι προέκυψαν ἀπὸ τὴν $\alpha_1 \alpha_2$ διαφέρουν κατὰ τὴν θέσιν τοῦ τρίτου στοιχείου. Ἐπίσης διαφέρουν ὅσαι προέκυψαν ἀπὸ τὴν $\alpha_2 \alpha_1$, συγκρινόμεναι πρὸς ἑαυτάς. Συγκρινόμεναι δὲ αἱ τελευταῖαι πρὸς ἑκείνας αἱ ὅποιαι προέκυψαν ἀπὸ τὴν $\alpha_1 \alpha_2$ εἶνε διάφοροι. Διότι, διαφέρουν κατὰ τὴν θέσιν τῶν ἄλλων στοιχείων, τῶν α_1 καὶ α_2 . Τέλος παρατηροῦμεν, ὅτι ἐσχηματίσαμεν πάσας τὰς μεταθέσεις τῶν τριῶν στοιχείων διὰ τοῦ ἀνωτέρου τρόπου. Διότι, ἂν ὑπῆρχε καὶ ἄλλη τις, καὶ ἀποκόψωμεν τὸ στοιχεῖον α_3 ἀπ' αὐτῆς, θὰ προκύψῃ μία μετάθεσις τῶν δύο στοιχείων α_1, α_2 : ἂν δὲ ἐπαναφέρωμεν τὸ α_3 εἰς τὴν θέσιν του, εὑρίσκομεν πάλιν τὴν μετάθεσιν τῶν τριῶν στοιχείων. Ἀλλ' αὐτὸς ἀκριβῶς ἐκάμαμεν ἀνωτέρω, δηλαδὴ ἐλάβομεν πάσας τὰς μεταθέσεις τῶν δύο στοιχείων, καὶ ἐθέσαμεν τὸ νέον στοιχεῖον α_3 εἰς ὅλας τὰς δυνατὰς θέσεις καθεμιᾶς τῶν δύο· ἐπομένως, καὶ ἡ ὑποτεθεῖτα νέα μετάθεσις τῶν τριῶν στοιχείων ἔχει περιληφθῆ εἰς τὸν πίνακα τῶν σχηματισθεισῶν.

ε') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι, αἱ μεταθέσεις τριῶν στοιχείων προκύπτουν ἐκ τῶν μεταθέσεων τῶν δύο στοιχείων, ἀν εἰσαγάγωμεν τὸ τρίτον στοιχεῖον εἰς ὅλας τὰς δυνατὰς θέσεις καθεμιᾶς τῶν δύο στοιχείων. "Ωστε ἐκ τῶν M_2 προκύπτουν $M_2 \cdot 3$ καὶ ἔχομεν

$$M_3 = M_2 \cdot 3 = 1.2.3.$$

στ') Ἐὰν ἔχωμεν $v = 4$, δηλαδὴ ἂν ἔχωμεν τὰ στοιχεῖα $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, λαμβάνομεν τὰς μεταθέσεις

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3, \alpha_1 \alpha_3 \alpha_2, \alpha_2 \alpha_1 \alpha_3, \alpha_2 \alpha_3 \alpha_1, \alpha_3 \alpha_1 \alpha_2, \alpha_3 \alpha_2 \alpha_1$, τῶν τριῶν στοιχείων καὶ εἰς καθεμίαν τούτων θέτομεν τὸ α_4 εἰς ὅλας τὰς δυνατὰς θέσεις· δηλαδὴ κατὰ σειρὰν πρὸ τοῦ πρώτου, μεταξὺ πρώτου καὶ δευτέρου, μεταξὺ δευτέρου καὶ τρίτου, τελευταίον. Οὕτω ἔχομεν ἀπὸ καθεμίαν τῶν τριῶν τέσσαρας τῶν τεσσάρων, ἐπομένως

$$M_4 = M_3 \cdot 4 = 1.2.3.4$$

ζ') Καθ' ὅμοιον τρόπου προχωροῦντες, εὑρίσκομεν ὅτι εἶνε

$$M_5 = M_4 \cdot 5 = 1.2.3.4.5 = 5!$$

$$M_v = M_{v-1} \cdot v = 1.2.3.4 \dots (v-1).v = v!$$

'Ασκήσεις. 1) Δεῖξατε ὅτι αἱ μεταθέσεις τῶν τεσσάρων στοιχείων, αἱ σχηματισθεῖσαι κατὰ τὸν ἀνώτερον τρόπον, εἶνε διάφοροι μεταξύ των καὶ ὅτι εἶνε πᾶσαι.

2) Νὰ γενικευθῇ ἡ ἀπόδειξις πρὸς σχηματισμὸν τῶν μεταθέσεων v στοιχείων· δηλαδὴ νὰ δειχθῇ α') πῶς σχηματίζονται αὐταὶ ἐκ τῶν μεταθέσεων τῶν $(v-1)$ στοιχείων' β') ὅτι αἱ οὐστα σχηματίζομεναι εἶνε διάφοροι μεταξύ των γ') ὅτε εἶνε πᾶσαι.

3) Κατὰ πόσους τρόπους δύνανται νὰ παρακαλήσουν 18 ἀτομα περὶ τράπεζαν;

§ 144. Περὶ διατάξεων.—

α') Ὡποθέτομεν ὅτι ἔχομεν μ στοιχεῖα διάφορα μεταξύ των, τὰ
 $a_1, a_2, a_3, \dots \dots \dots a_\mu.$

Ἐὰν ἐκ τῶν μ τούτων στοιχείων λάβωμεν ν καθ' ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους, ὥστε τὰ ἔξαγόμενα τὰ ὅποια προκύπτουν (καὶ καθὲν τῶν ὅποιών ἔχει πάντοτε ν στοιχεῖα ἐκ τῶν μ) νὰ διαφέρουν μεταξύ των ἢ κατὰ τὴν φύσιν ἢ κατὰ τὴν θέσιν τουλάχιστον ἐνὸς τῶν στοιχείων των, τότε καλοῦμεν τὰ ἔξαγόμενα αὐτὰ διατάξεις τῶν μ στοιχείων ἀνὰ ν λαμβανομένων.

β') Θὰ παριστάνωμεν τὰς διατάξεις μ στοιχείων ἀνὰ ν διὰ τοῦ συμβόλου Δ_v^μ καὶ θὰ δείξωμεν ὅτι εἶνε

$$\Delta_v^\mu = \mu. (\mu - 1). (\mu - 2) \cdot \dots \cdot (\mu - v + 1).$$

γ') Παρατηρούμενον, ὅτι πρόπει νὰ εἶνε τὸ ν μικρότερον τοῦ μ.
 "Αν εἶνε $\mu = v$, θὰ ἔχωμεν μετανθέσεις μ στοιχείων.

δ') "Ας ὑποθέσωμεν ὅτι εἶνε $v = 1$. Δηλαδὴ ὅτι τὰ μ στοιχεῖα λαμβάνομεν ἀνὰ ἓν. Εἶνε φανερόν, ὅτι αἱ διατάξεις εἶνε ὄσα καὶ τὰ στοιχεῖα· ἥτοι αἱ $a_1, a_2, a_3, \dots \dots \dots, a_\mu$ καὶ ἐπομένως ἔχομεν ὅτι $\Delta_1^\mu = \mu$.

ε') "Εστω ὅτι εἶνε $v = 2$, δηλαδὴ ὅτι ἔχομεν μ στοιχεῖα καὶ θέλομεν νὰ σχηματίσωμεν τὰς διατάξεις των ἀνὰ δύο. Πρὸς τοῦτο λαμβάνομεν μίαν διάταξίν των ἀνὰ ἓν, ἔστι τὴν a_1 . Εἰς αὐτὸ τὸ στοιχεῖόν της παραθέτομεν καθὲν τῶν ἄλλων $a_2, a_3, \dots \dots a_\mu$. Οὕτω σχηματίζομεν διατάξεις τῶν μ ἀνὰ δύο" τὰς

$a_1 a_2, a_1 a_3, a_1 a_4, \dots \dots \dots a_1 a_\mu$

ἐν δῆλῳ ($\mu - 1$). Διότι ($\mu - 1$) εἶνε τὰ ἄλλα στοιχεῖα, τὰ ὅποια παραθέτομεν εἰς τὸ a_1 . Όμοίως ἐργαζόμεθα διὰ καθεμίαν ἄλλην τῶν διατάξεων ἀνὰ ἓν. Οὕτω ἀπὸ τὴν a_2 θὰ σχηματίσωμεν τὰς

$a_2 a_1, a_2 a_3, a_2 a_4, \dots \dots \dots, a_2 a_\mu$, κ. ο. κ. "Απὸ τὴν a_μ τὰς

$a_\mu a_1, a_\mu a_2, \dots \dots \dots, a_\mu a_{\mu-1}$.

στ') Παρατηροῦμεν ὅτι, αἱ οὕτω σχηματιζόμεναι διατάξεις τῶν ἀνὰ δύο εἶνε διάφοροι μεταξύ των. Διότι, ὅσαι ἔγιναν ἀπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν διάταξιν τῶν ἀνὰ ἓν διαφέρουν κατὰ τὴν φύσιν τοῦ δευτέρου στοιχείου, ὅσαι δὲ προέκυψαν ἐκ διαφόρων τῶν ἀνὰ ἓν διαφέρουν κατὰ τὸ πρῶτον στοιχεῖον. Εἶνε φανερόν, ὅτι αἱ οὕτω σχηματισθεῖσαι διατάξεις τῶν ἀνὰ δύο εἶνε πᾶσαι. Διότι, ἀν

ὑπῆρχε ἄλλη τις καὶ ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον στοιχεῖόν της, θὰ προκύψῃ μία τῶν ἀνὰ ἓν. Ἀλλ' ἀκριβῶς ἐλάβομεν πάσας τῶν ἀνὰ ἓν, καὶ παρεθέσαμεν εἰς καθεμίαν τούτων ὅλα τὰ ἄλλα στοιχεῖα. "Ἄρα καὶ ἡ ὑποτεθεῖσα νέα διάταξις τῶν ἀνὰ δύο πάντως περιέχεται εἰς τὰς σχηματισθείσας.

ζ') Έκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν δτι, αἱ διατάξεις τῶν μ ἀνὰ δύο εἶνε ἐν ὅλῳ Δ_1^{μ} . ($\mu - 1$). ἢτοι $\Delta_2^{\mu} = \Delta_1^{\mu}. (\mu - 1) = \mu. (\mu - 1)$. Διότι, ἀπὸ καθεμίαν τῶν ἀνὰ ἓν προκύπτουν $(\mu - 1)$ τῶν ἀνὰ δύο καὶ ἐκ τῶν Δ_1^{μ} προκύπτουν $\Delta_1^{\mu}. (\mu - 1)$.

η') Καθ' ὅμοιον τρόπον ἂν εἴνε $\nu = 3$, λαμβάνομεν καθεμίαν τῶν ἀνὰ δύο, παραθέτομεν καθέν τῶν ἄλλων στοιχείων, καὶ σχηματίζομεν τὰς διατάξεις τῶν ἀνὰ τρία. Οὕτω ἐκ τῆς $a_1 a_2$ σχηματίζομεν τὰς $a_1 a_2 a_3$, $a_1 a_2 a_4$, $a_1 a_2 a_5, \dots \dots \dots$, $a_1 a_2 a_{\mu}$ ἐν ὅλῳ $(\mu - 2)$. "Ωστε ἀπὸ καθεμίαν τῶν ἀνὰ δύο προκύπτουν $(\mu - 2)$ τῶν ἀνὰ τρία καὶ ἐκ τῶν Δ_2^{μ} προκύπτουν $\Delta_2^{\mu}. (\mu - 2)$. "Ωστε ἔχομεν $\Delta_3^{\mu} = \Delta_2^{\mu}. (\mu - 2) = \mu. (\mu - 1). (\mu - 2)$.

θ') Καὶ γενικώς, προχωροῦντες καθ' ὅμοιον τρόπον, εὐρίσκομεν δτι $\Delta_v^{\mu} = \Delta_{(v-1)}^{\mu}. (\mu - (\nu - 1)) = \mu. (\mu - 1). (\mu - 2). \dots (\mu - v + 1)$.

Ασκήσεις. 1) Δεῖξατε ὅτι αἱ διατάξεις τῶν μ στοιχείων ἀνὰ τρία, καθ' ὃν τρόπον ἐσχηματίζονται ἀνωτέρω, εἴνε διάφοροι μεταξύ των καὶ πᾶσαι.

2) Γενικεύσατε τὴν ἀπόδειξιν πρὸς εὑρεσιν τῶν διατάξεων μ στοιχείων ἀνὰ ν ἐκ τῶν διατάξεων ἀνὰ $(\nu - 1)$: δηλαδὴ δεῖξατε α') πρὸς σχηματίζονται αἱ ἀνὰ ν ἐκ τῶν ἀνὰ $(\nu - 1)$ β') ὅτι αἱ οὕτω σχηματίζόμεναι εἴνε διάφοροι μεταξύ των γ') ὅτι εἴνε πᾶσαι..

3) Πόσοι ἀριθμοὶ διφήροι: ὑπάρχουν, ἔχοντες σημαντικὰ ψηφία διάφορα μεταξύ των; Πόσοι: τριψήροι;

§ 145. Περὶ συνδυασμῶν.—

α') Υποθέτομεν δτι ἔχομεν μ στοιχεῖα διάφορα μεταξύ των, τὰ $a_1, a_2, a_3, \dots a_{\mu}$. Καλοῦμεν συνδυασμοὺς τῶν μ τούτων στοιχείων, ἀνὰ ν λαμβανομένων, τὰ διάφορα ἐξαγόμενα, τὰ διοῖα εὐρίσκομεν, ἐὰν λάβωμεν καθ' ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους ν ἐκ τῶν μ, οὕτως ὥστε τὰ ἐξαγόμενα αὐτιὰ νὰ διαφέρουν μεταξύ των κατὰ τὴν φύσιν τοῦλάχιστον ἐνδεικτικά.

β') Θὰ παριστάνωμεν τοὺς συνδυασμοὺς τῶν μ στοιχείων ἀνὰ ν διὰ τοῦ Σ_v^{μ} καὶ θὰ δείξωμεν δτι εἴνε

$$\Sigma_v^{\mu} = \frac{\Delta_v^{\mu}}{M_v} \frac{\mu. (\mu - 1). (\mu - 2). \dots . (\mu - v + 1)}{1. 2. 3. \dots . v}.$$

Πρὸς ἀπόδειξιν φανταζόμεθα ὅτι ἔχομεν ἐναὶ συνδυασμὸν τῶν μ ἀνὰ ν. Οὕτος ἔχει ν στοιχεῖα ἐκ τῶν μ (ὑποτίθεται ὅτι εἶνε ν < μ). Ἐν εἰς τὰ ν αὐτὰ στοιχεῖα κάμιωμεν ὅλας τὰς δυνατὰς ἐναλλαγὰς μεταξύ των, σχηματίζομεν τὰς μεταθέσεις τῶν ν τούτων στοιχείων, αἱ ὅποιαι εἶνε M_v, καθὼς γνωρίζομεν.

Τὸ αὐτὸν φανταζόμεθα ὅτι κάμιομεν εἰς τὰ ν στοιχεῖα καθενὸς συνδυασμοῦ, δόποτε προκύπτουν ἀπὸ καθένα M_v ἔξαγόμενα, τὰ δοποῖα μεταξύ των συγκρινόμενα (χωρίς νὰ λαμβάνωμεν ὑπ’ ὅψιν ὅτι εἶνε ν ἐκ τῶν μ) εἶνε μεταθέσεις ν ἀντικειμένων. Ἐπειδὴ ἀπὸ καθένα συνδυασμὸν προκύπτουν M_v τοιαῦτα ἔξαγόμενα; ἀπὸ τοὺς Σ_v^μ συνδυασμοὺς προκύπτουν Σ_v^μ. M_v τοιαῦτα. Ἀλλὰ καθὲν τῶν ἔξαγομένων τούτων, συγκρινόμενον πρὸς τὰ μ δοθέντα στοιχεῖα, εἶνε μία διάταξις τῶν μ ἀνὰ ν, ἐπειδὴ εἶνε ν στοιχεῖα ἐκ τῶν μ, τεθειμένα κατά τινα τρόπον. Αἱ διατάξεις αὐταὶ τῶν μ ἀνὰ ν εἶνε διάφοροι μεταξύ των. Διότι, ὅσαι προέκυψαν ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ συνδυασμοῦ διὰ τῆς μεταθέσεως τῶν στοιχείων του, διαφέρουν κατὰ τὴν θέσιν τῶν στοιχείων τούτων ὅσαι δὲ προέκυψαν ἀπὸ διαφόρους συνδυασμούς, θὰ διαφέρουν κατὰ τὴν φύσιν τοῦλάχιστον ἐνὸς στοιχείου. Τέλος, παρατηροῦμεν ὅτι αἱ Δ_v^μ αὐταὶ εἶνε πᾶσαι. Διότι, ἂν ὑπῆρχε καὶ ἄλλη τις, αὐτὴ θὰ εἴχε ν στοιχεῖα ἐκ τῶν μ κατά τινα τάξιν μεταξύ των τεθειμένα. Ἐπομένως, ἡ διάταξις αὐτὴ θὰ προκύπτῃ ἀπὸ συνδυασμὸν τινα τῶν μ ἀνὰ ν διὰ μεταθέσεως τῶν στοιχείων του, καὶ ἐπειδὴ ὅλων τῶν συνδυασμῶν μετενθέσαμεν τὰ στοιχεῖα, ἔπειται ὅτι καὶ ἡ διάταξις αὐτὴ δὲν εἶνε νέα, ἀλλὰ περιέχεται εἰς τὰς ἥδη σχηματισθείσας.

Ἐδείχθη λοιπὸν ὅτι εἶνε Σ_v^μ. M_v = Δ_v^μ, ἐξ οὗ ἔπειται ὅτι

$$\Sigma_v^{\mu} = \frac{\Delta_v^{\mu}}{M_v} \text{ καὶ ἀνἀντὶ τῶν } \Delta_v^{\mu} \text{ καὶ } M_v \text{ θέσωμεν τὰ } \zeta_{\sigma} \text{ των,}$$

$$\text{εὐρίσκομεν } \Sigma_v^{\mu} = \frac{\Delta_v^{\mu}}{M_v} = \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)\dots(\mu-v+1)}{1.2\dots v}$$

γ') Ἐὰν τοῦ τελευταίου αὐτοῦ κλάσματος πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δρους ἐπὶ τὸ γινόμενον $(\mu - v)$ $(\mu - v - 1)$ 3. 2. 1, εὐρίσκομεν

$$\sum_v^{\mu} = \frac{\mu(\mu-1)\dots(\mu-v+1)(\mu-v)\dots3.2.1}{1.2\dots v.(\mu-v).(\mu-v-1)\dots3.2.1}$$

$$\sum_v^{\mu} = \frac{1.2.3\dots(\mu-v)(\mu-v+1)\dots(\mu-1).\mu}{1.2.3\dots v.1.2.3\dots(\mu-v)}$$

$$\sum_v^{\mu} = \frac{M_{\mu}}{M_v. M_{(\mu-v)}} = \frac{\mu!}{v!(\mu-v)!}.$$

δ') «Ο ἀριθμὸς τῶν συνδυασμῶν μ στοιχείων ἀνὰ ν ισοῦται μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν συνδυασμῶν μ στοιχείων ἀνὰ ($\mu - v$)».

Πράγματι, εὑρήκαμεν ἀνωτέρῳ ὅτι εἶνε $\sum_v^{\mu} = \frac{\mu!}{v!(\mu-v)!}$

Διὰ νὰ εὕρωμεν τοὺς $\sum_{\mu-v}^{\mu}$ ἀρκεῖ ν' ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὴν τελευταίαν ισότητα τὸ ν διὰ τοῦ ($\mu - v$), ὅτε εὑρίσκομεν

$$\sum_{(\mu-v)}^{\mu} = \frac{\mu!}{(\mu-v)!(\mu-(\mu-v))!} = \frac{\mu!}{(\mu-v)!v!}$$

Αλλὰ τοῦτο εἶνε τὸ \sum_v^{μ} , ἕστα $\sum_v^{\mu} = \sum_{(\mu-v)}^{\mu}$.

Ασκήσεις. 1) Εὑρετε τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν

α') 7 στοιχείων ἀνὰ 3. β') 10 στοιχείων ἀνὰ 7.

γ') 25 στοιχείων ἀνὰ 17. δ') 12 ἀνὰ 6.

2) Κατὰ πόσους τρόπους δυνάμεθα νὰ συνδύσωμεν τὰ 7 ἡλιακὰ χρώματα, (προστιθεμένων τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος), πρὸς σχηματισμὸν τριγράμμου (διγράμμου) σημαίας;

§ 146. Περὶ τοῦ διεωνύμου τοῦ Νεύτωνος.—

α') Γνωρίζομεν ὅτι $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$

$$(x+a)^3 = x^3 + 3ax^2 + 3a^2 x + a^3.$$

Ἐὰν τὸ μ εἶνε ἀκέραιός τις καὶ θετικός ἀριθμός, θὰ δεῖξωμεν ὅτι

$$\text{εἶνε } (x+a)^{\mu} = x^{\mu} + \frac{\mu}{1} x^{\mu-1} a + \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} x^{\mu-2} a^2 + \dots$$

$$+ \frac{\mu(\mu-1)\dots(\mu-v+1)}{1.2.3\dots v} x^{\mu-v} a^v + \dots + a^{\mu}.$$

Πρὸς ἀπόδειξιν παρατηροῦμεν ὅτι εἶνε

$$(x+a)^{\mu} = \underbrace{(x+a)(x+a)\dots(x+a)}_{\mu \text{ φοράς}}.$$

Σχηματίζομεν πρῶτον τὸ γινόμενον τῶν μ παραγόντων

$$(x+\alpha), (x+\beta), (x+\gamma), \dots (x+\vartheta),$$

$$(x+\alpha), (x+\beta), (x+\gamma), \dots, (x+\vartheta).$$

Τὸ ἔξαγόμενον τοῦ γινομένου τούτου εὑρίσκεται, καθὼς γνω-
ρίζομεν, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν πρῶτον παράγοντα $(x+a)$
ἐπὶ τὸν δεύτερον $(x+\beta)$, τὸ ἔξαγόμενον ἐπὶ $(x+\gamma)$ κ. ο. κ. μέχρι
τοῦ τελευταίου $(x+\vartheta)$. Ἀν τὸ τελικὸν ἔξαγόμενον διατάξωμεν κατὰ
τὰς δυνάμεις τοῦ x , θὰ ἔχωμεν προφανῶς πολυώνυμον τοῦ x βαθμοῦ
μ. Τὸ ἔξαγόμενον τοῦτο εὑρίσκομεν καὶ ὡς ἔξῆς. Πολλαπλασιάζομεν
πάντας τοὺς πρῶτους ὅρους x τῶν διωνύμων παραγόντων, καὶ εὑρί-
σκομεν x^{μ} . Ἀκόλουθως πολλαπλασιάζομεν πάντας τοὺς πρῶτους
ὅρους x ἐκ τῶν $(\mu-1)$ διωνύμων παραγόντων, ἐπὶ τὸν δεύτερον ὅρον
τοῦ ὑπολειπομένου διωνύμου παραγόντος, καὶ εὑρίσκομεν $ax^{\mu-1}$, ἀν
ἐκ τοῦ πρῶτου διωνύμου παραγόντος λάβωμεν τὸν a καὶ ἐκ τῶν ἄλλων
τὸν x τὸ $\beta x^{\mu-1}$, ἀν ἐκ τοῦ δευτέρου παραγόντος λάβωμεν τὸν β καὶ
ἐκ τῶν ἄλλων τὸν x . Ομοίως ἔχομεν $\gamma x^{\mu-1}, \dots, \vartheta x^{\mu-1}$. τὸ δὲ ἄθροισμα
τούτων δίδει τὸν ὅρον $(a+\beta+\gamma+\dots+\vartheta) x^{\mu-1}$ τοῦ ἔξαγομένου, ὃ
διποῖς ἔχει τὸν x εἰς τὴν $(\mu-1)$ δύναμιν. Ἀκόλουθως λαμβάνομεν
τὸν x ἀπὸ $(\mu-2)$ διωνύμους παραγόντας, ἀπὸ δὲ τοὺς ὑπολειπομένους
δύο παραγόντας τοὺς δευτέρους ὅρους των, καὶ τοῦτο κάμνομεν καθ'
δλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους. Οὕτω εὑρίσκομεν

$$(ab+ac+\dots+ad+bc+\dots) x^{\mu-2}.$$

Καθ' ὅμοιον τρόπον προχωροῦντες, εὑρίσκομεν

$$(ab\gamma+abc+\dots) x^{\mu-3}$$

Τέλος λαμβάνομεν καὶ πολλαπλασιάζομεν μόνον τοὺς δευτέρους
ὅρους τῶν διωνύμων, ὅτε εὑρίσκομεν
 $ab\gamma\dots\vartheta$. Ωστε εὑρόήκαμεν

$$\begin{aligned} & (x+a)(x+\beta)(x+\gamma)\dots(x+\vartheta) \\ &= x^{\mu} + (a+\beta+\dots+\vartheta)x^{\mu-1} + (ab+ac+\dots)x^{\mu-2} \\ & \quad + (ab\gamma+\dots)x^{\mu-3} + \dots + ab\gamma\dots\vartheta \end{aligned}$$

Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι εἶνε $\alpha = \beta = \gamma = \dots = \vartheta$, θὰ ἔχωμεν

$$\begin{aligned} & (x+a)^{\mu} = x^{\mu} + (a+a+\dots+a)x^{\mu-1} \\ & \quad + (a^2+a^2+\dots)x^{\mu-2} + (a^3+a^3+\dots)x^{\mu-3} \\ & \quad + \dots + (a^{\nu}+a^{\nu}+\dots)x^{\mu-\nu} + \dots + a^{\mu} \end{aligned}$$

Τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων α τοῦ δευτέρου μέλους τῆς ἴσο-
τητος ταύτης εἶνε προφανῶς ὅσοι οἱ συνδυασμοὶ μ στοιχείων ἀνὰ

εν, ήτοι Σ_1^μ . Τὸ πλῆθος τῶν a^2 εἶνε Σ_2^μ , τῶν a_3 εἶνε Σ_3^μ κ. ο. κ.
τὸ πλῆθος τῶν a_v εἶνε Σ_v^μ . Ἐπομένως ἔχομεν ὅτι
 $(x + a)^\mu = x^\mu + \Sigma_1^\mu a x^{\mu-1} + \Sigma_2^\mu a^2 x^{\mu-2} + \dots +$

$$+ \dots + \Sigma_v^\mu a^v x^{\mu-v} + \dots + a^\mu.$$

Τέλος, ἀν ἀντὶ τῶν Σ_1^μ , $\Sigma_2^\mu, \dots, \Sigma_v^\mu$ γράψωμεν τὰ
ἴσα των, εὑρίσκομεν τὸν ζητούμενον τύπον

$$(x + a)^\mu = x^\mu + \frac{\mu}{1} x^{\mu-1} a + \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} x^{\mu-2} a^2 + \dots +$$

$$+ \frac{\mu(\mu-1) \dots (\mu-v+1)}{1.2.3 \dots v} x^{\mu-v} a^v + \dots + a^\mu.$$

Ἄν εἶνε $\mu = 4$ ἔχομεν

$$(x + a)^4 = x^4 + 4 x^3 a + 6 x^2 a^2 + 4 x a^3 + a^4.$$

Ἄν εἶνε $\mu = 5$ θὰ ἔχωμεν

$$(x + a)^5 = x^5 + 5 x^4 a + 10 x^3 a^2 + 10 x^2 a^3 + 5 x a^4 + a^5.$$

6') Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἔξαγόμενον τοῦ $(x-a)^\mu$, ἀρκεῖ νὰ ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὸν ἀνωτέρῳ γενικὸν τύπον τὸ a διὰ τοῦ $(-a)$. Τότε, ἐπειδὴ αἱ περιτταὶ δυνάμεις τοῦ $(-a)$ εἶνε ἀρνητικοὶ αἱ δὲ
άρτιαι θετικοὶ ἀριθμοί, θὰ ἔχωμεν

$$(x-a)^\mu = x^\mu - \frac{\mu}{1} x^{\mu-1} a + \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} x^{\mu-2} a^2$$

$$- \dots \pm \frac{\mu(\mu-1) \dots (\mu-v+1)}{1.2.3 \dots v} x^{\mu-v} a^v$$

$$\mp \dots \pm a^\mu.$$

Π. γ. θὰ εἶνε $(x-a)^3 = x^3 - 3 x^2 a + 3 x a^2 - a^3$
 $(x-a)^4 = x^4 - 4 x^3 a + 6 x^2 a^2 - 4 x a^3 + a^4$

§ 147. Ιδιότητες τοῦ διωνύμου.—

α') «Οἱ συντελεσταὶ τῶν δρῶν τοῦ διωνύμου $(x+a)^\mu$ τῶν
ἰσάκις ἀπεχόντων ἀπὸ τῶν ἀκρῶν δρῶν του εἶνε ἵσοι».

Πράγματι, οἱ μὲν συντελεσταὶ τῶν ἀκρῶν δρῶν x^μ καὶ a^μ εἶνε
ἴσοι μὲ τὴν μονάδα. Διὰ τοὺς ἄλλους συντελεστὰς παρατηροῦμεν
ὅτι ἀπὸ τοῦ δευτέρου καὶ ἑξῆς εἶνε ἵσοι μὲ

$$\Sigma_1^\mu, \Sigma_2^\mu, \Sigma_3^\mu, \dots, \Sigma_v^\mu, \dots, \Sigma_{\mu-2}^\mu, \Sigma_{\mu-1}^\mu.$$

Ἄλλὰ κατὰ τὴν ιδιότητα τῶν συνδυασμῶν (§ 145, δ') εἶνε

$\Sigma_1^\mu = \Sigma_{\mu-1}^\mu, \Sigma_2^\mu = \Sigma_{\mu-2}^\mu, \dots, \dots$ ἐξ ὧν ἐπεται
ἡ ιδιότης.

6') Ο συντελεστής οίουδήποτε δρου τοῦ διωνύμου $(x+a)$ εὑρίσκεται, ἐὰν δὲ συντελεστής τοῦ προηγουμένου του δρου πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸν ἐκδέιην τοῦ x ἐν αὐτῷ, καὶ τὸ γινόμενον διαιρεθῇ διὰ τοῦ ἐκδέτου τοῦ a ἐν τῷ δρῷ, τοῦ δποίου ζητεῖται διαντελεστής.

Οὕτω δὲ συντελεστής τοῦ δευτέρου δρου εἶναι $\frac{μ}{1}$ καὶ εὑρίσκεται ἐκ τοῦ συντελεστοῦ 1 τοῦ προηγουμένου του δρου, ἀν πολλαπλασιασθῇ τὸ 1 ἐπὶ τὸν ἐκδέτην μὲν τοῦ x εἰς τὸν πρῶτον δρον καὶ τὸ γινόμενον διαιρεθῇ διὰ τοῦ ἐκδέτου 1 τοῦ a εἰς τὸν δεύτερον δρον. Ἐκ τούτων ἔπειται, ὅτι οἱ συντελεσταὶ προχωροῦν αὐξανόμενοι μέχρι τοῦ μέσου δρου, ἐκεῖνοι δὲ ἐπαναλαμβάνονται οἱ αὐτοὶ συντελεσταὶ κατ' ἀντίθετον σειράν, ὥστε οἱ ισάκις ἀπέχοντες τῶν ἄρων νὰ εἶναι ίσοι.

γ') Τὸ πλῆθος τῶν δρων τοῦ διωνύμου $(x+a)^μ$ εἶναι $(μ+1)$. Διότι τὸ ἐξαγόμενον τοῦ $(x+a)^μ$ ἔχει πάντας τοὺς δρους πολυνύμου βαθμοῦ μὲν ὡς πρὸς τὸ x , ἢ ὡς πρὸς τὸ a . ἄρα ἔχει $(μ+1)$ δρους.

Συνδυάζοντες τὴν ἰδιότητα ταύτην μὲ τὴν προηγουμένην, παρατηροῦμεν ὅτι, ἀν τὸ μ εἶναι ἀριθμὸς ἀρτιος τὸ πλῆθος τῶν δρων εἶναι περιττὸς ἀριθμός, καὶ ὑπάρχει εἰς δρος, δὲ μεσαῖος, δὲ δποῖος ἔχει τὸν μέγιστον συντελεστήν. Ἀν τὸ μ εἶναι περιττὸς ἀριθμός, τὸ πλῆθος τῶν δρων εἶναι ἀρτιος ἀριθμός, καὶ τότε ὑπάρχουν δύο δροι μεσαῖοι, διαδοχικοὶ ίσοι μεταξύ των, οἱ μέγιστοι τῶν συντελεστῶν.

**Ασκήσεις.* Εὗρετε τὰ ἐξαγόμενα

$$(x+\alpha)^6, \quad (x-\alpha)^5, \quad \left(2x - \frac{1}{3}\right)^4, \quad (2x - \beta)^5, \quad \left(\frac{1}{2}x + 3\right)^6, \quad \left(\frac{2}{3}x - 5\right)^4.$$

§ 148. Περὶ Πιθανοτήτων.—

α') Ας ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν 15 κλήρους ἐιτὸς κυτίου ἡριθμημένους ἀπὸ 1 μέχρι 15. Εὰν ἐξαγάγωμεν ἔνα κλῆρον ἐκ τῶν 15, θέλομεν νὰ μάθωμεν, ποία εἶναι ἡ πιθανότης ὅτι δὲ κλῆρος, τὸν δποῖον θὰ ἐξαγάγωμεν, θὰ φέρῃ τὸν ἀριθμὸν 7.

Ἐπειδὴ καθεὶς τῶν 15 κλήρων ἔχει τὴν αὐτὴν πιθανότητα νὰ ἐξαχθῇ, ὅταν ἐξαγάγωμεν ἔνα, ἔπειται ὅτι ἡ πιθανότης τοῦ νὰ

ἔξαχθῇ εἰς, π. χ. δ 7, ὅταν ἔξαγωμεν ἔνα, θὰ εἶνε τὸ ἐν δέκατον πέμπτον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν δυνατῶν περιπτώσεων, ἢτοι τὸ $\frac{1}{15}$.

6') Ἐὰν ἐκ τῶν 15 κλήρων ἔξαγάγωμεν δύο, ή πιθανότης τοῦ νὰ ἔξαχθῇ εἰς ὁρισμένος ἔξ αὐτῶν, π. χ. δ 7, θὰ εἶνε προφανῶς $\frac{2}{15}$, ἀν δὲ ἔξαγάγωμεν τρεῖς θὰ εἶνε $\frac{3}{15}$ ή ο. κ.

γ') Κατὰ ταῦτα λέγομεν ὅτι «ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι θὰ συμβῇ τι παριστάνεται διὰ κλάσματος, τὸ δποῖον ἔχει ἀριθμητὴν μὲν τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐνοϊκῶν περιπτώσεων, παρονομαστὴν δὲ τὸν ἀριθμὸν πασῶν τῶν δυνατῶν περιπτώσεων, ὑποτιθεμένου, ὅτι πᾶσαι αἱ περιπτώσεις εἶνε ἔξ ἵσου πιθαναί».

δ') Πρὸς ἔφαρμογὴν τοῦ ὁρισμοῦ τούτου ἡς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἐντὸς κυτίου ἔχομεν 15 βῶλους τοῦ αὐτοῦ μεγέθους, ἀλλὰ τοὺς μὲν 6 λευκοὺς τοὺς δὲ 9 μαύρους. Θέλομεν νὰ μάθωμεν, ποία εἶνε ἡ πιθανότης, ἀν ἔξαχθῇ κατὰ τύχην εἰς βῶλος ἐκ τοῦ κυτίου, αὐτὸς νὰ εἶνε λευκός.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν αἱ δυναταὶ περιπτώσεις εἶνε 15. Διότι τόσοι εἶνε οἱ βῶλοι καὶ καθεὶς ἔξ αὐτῶν δύναται νὰ ἔξαχθῇ. Ὅταν ἔξαγάγωμεν ἔνα, αἱ εὐνοϊκαὶ περιπτώσεις εἶνε 6. Διότι τόσοι εἶνε οἱ λευκοὶ βῶλοι, ἀρα ἡ πιθανότης εἶνε $\frac{6}{15}$. Ἀν ἵητοῦμεν τὴν πιθανότητα τοῦ νὰ ἔξαχθῇ εἰς μαῦρος βῶλος, θὰ εἶνε $\frac{9}{15}$.

ε') Ἐὰν ἡ πιθανότης εἶνε ἵση μὲ τὴν μονάδα, τότε λέγομεν ὅτι ὑπάρχει βεβαιότης τοῦ νὰ συμβῇ τὸ ζητούμενον. Ἀν δὲ ἡ πιθανότης παριστάνεται διὰ τοῦ μηδενός, τότε λέγομεν ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμία πιθανότης τοῦ νὰ συμβῇ τὸ ζητούμενον, ἢ ὅτι εἶνε ἀδύνατον νὰ συμβῇ.

στ') Ἐν γένει, ἐὰν αἱ εὐνοϊκαὶ περιπτώσεις τοῦ νὰ συμβῇ τι, εἶνε αἱ τὸν ἀριθμόν, αἱ δὲ περιπτώσεις τοῦ ἐναντίου εἶνε β, ἡ πιθανότης τοῦ ὅτι θὰ συμβῇ τὸ πρῶτον θὰ εἶνε $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, ἢ δὲ πιθανότης τοῦ ὅτι δὲν θὰ συμβῇ θὰ εἶνε $\frac{\beta}{\alpha + \beta}$.

Ἐὰν παραστήσωμεν τὸν πρῶτον ἀριθμὸν διὰ τοῦ λ τὸν δεύτερον διὰ τοῦ μ, θὰ ἔχωμεν

$$\lambda + \mu = 1, \quad \lambda = 1 - \mu.$$

ζ') "Ας ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν δύο κύβους, τῶν ὁποίων αἱ ἔδραι φέρονται ἀντιστοίχως τοὺς ἀριθμοὺς $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$. "Αν ρίψωμεν αὐτοὺς κατὰ τύχην ἐπὶ τῆς τραπέζης, ποία εἶναι ἡ πιθανότης ὅτι οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἔδρων, αἱ ὁποῖαι θὰ ἔλθουν ἐπάνω, θὰ ἔχουν ἄθροισμα 8;

Αἱ δυναταὶ περιπτώσεις εἶναι 36. Διότι καθεὶς ἀριθμὸς τοῦ ἐνδέκατου κύβου δύναται νὰ συνδυασθῇ μὲ καθένα τῶν ἀριθμῶν τοῦ δευτέρου κύβου, ἐκ τούτων δὲ ἔχομεν ἄθροισμα 8, ὅταν εἶναι $2 + 6 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 2$. "Ητοι 5 ἐν δλῳ.

Ἐπομένως ἡ ζητουμένη πιθανότης εἶναι $\frac{5}{36}$.

η') Ἐντὸς κυτίου ἔχομεν δύο μαύρους βώλους καὶ δύο λευκούς τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Ἐξάγομεν κατ' ἀρχὰς ἕνα ἐξ αὐτῶν καὶ ἔπειτα δεύτερον, χωρὶς νὰ θέσωμεν τὸν ἔξαχθέντα ἐντὸς τοῦ κυτίου. Ποία εἶναι ἡ πιθανότης ὅτι καὶ οἱ δύο ἔξαχθέντες βῶλοι θὰ εἶναι λευκοί;

Ἡ πιθανότης τοῦ νὰ ἔξαχθῃ τὴν πρώτην φορὰν ὁ λευκὸς βῶλος εἶναι $\frac{1}{2}$. Ἐὰν ἔξαχθῃ ὁ λευκὸς βῶλος τὴν πρώτην φορὰν, θὰ μείνουν ἐντὸς τοῦ κυτίου δύο μαύροι καὶ εἰς λευκός. Ἐπομένως ἡ πιθανότης τοῦ νὰ ἔξαχθῃ τὴν δευτέραν φορὰν ὁ λευκὸς βῶλος. Θὰ εἶναι $\frac{1}{3}$. Ἡ ζητουμένη πιθανότης τοῦ νὰ ἔξαχθοῦν καὶ οἱ δύο λευκοὶ μετὰ τὰς δύο ἔξαγωγάς, λέγω ὅτι εἶναι $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Διότι, ἐν παραστήσωμεν διὰ τοῦ λ_1 , λ_2 τοὺς λευκοὺς βώλους, καὶ διὰ μ_1 , καὶ μ_2 τοὺς μαύρους, καὶ σχηματίσωμεν τὰς δυνατὰς περιπτώσεις θὰ ἔχωμεν

$$\lambda_1 \lambda_2, \lambda_1 \mu_1, \lambda_1 \mu_2, \lambda_2 \lambda_1, \lambda_2 \mu_1, \lambda_2 \mu_2$$

$$\mu_1 \lambda_1, \mu_1 \lambda_2, \mu_1 \mu_2, \mu_2 \lambda_1, \mu_2 \lambda_2, \mu_2 \mu_1.$$

"Ητοι 12 ἐν δλῳ, ἐκ τῶν ὁποίων δύο εἶναι αἱ πιθαναί, δηλαδὴ ἡ ἡ πιθανότης εἶναι $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ

- Σελίς 10 στίχος ἐκ τῶν κάτω 11 τὸ (jλ. 1,6°) εἰς (ηὗξημ. 1,6°)
 > 17 " ἐκ τῶν ἄνω 12 τὸ ζ') (1)³ εἰς (-1)³.
 " 26 > > > 11 τὸ β') $\sqrt{28} \alpha^2 \beta$ εἰς β') $\sqrt{28} \alpha^2 \beta$.
 " 30 > ἐκ τῶν κάτω 11 τὸ β') $\sqrt{\alpha^3 - 2\beta}$ εἰς β') $\sqrt{\alpha^3 - 2\beta}$ -
 " 48 > ἐκ τῶν ἄνω 5 τὸ +3x²β εἰς +3xβ².
 " 62 > > > " 16 τὸ (x-1) (x+3) εἰς (x+1) (x+3)³
 " 64 > ἐκ τῶν κάτω 7 τὸ x²-9⁴ εἰς x⁴-9⁴
 " 68 στίχος ἐκ τῶν ἄνω 12 τὸ x⁴-10 εἰς x⁴-16
 " 83 > > > 4 τὸ α (x-α-3 = εἰς α (x-α-3) =
 " > > > 7 τὸ = (x-2α) 2 5 εἰς (x-2α)²+5
 " > > > 10 τὸ + + $\frac{3}{\alpha}$ εἰς + $\frac{3}{\alpha}$
 " 91 " ἐκ τῶν κάτω 10 τὸ (8) εἰς (18)
 " 92 > ἐκ τῶν ἄνω 15 τὸ 60 (10,5) εἰς 60 (40,5)
 " " > > > 20 τὸ δρτ εἰς δρτ'
 " > > > 25 τὸ 2 ωρ. (17 ωρ. 10,5') εἰς 1 ωρ. (15 ωρ. 55,5')-
 " 93 > > > 15 τὸ t₁+t₂ εἰς t₁+t₂
 " 94 > > > 4 τὸ 66⁰... εἰς 60⁰...
 " 94 > > > 8 τὸ (!) εἰς (1)
 " 103 > ἐκ τῶν κάτω 11 τὸ ζ') x+y-α+β εἰς ζ') x+y=α+β
 " > > > 5 τὸ ε') 0,8 y+33 εἰς ε') = 0,8 y+33.
 " 104 > ἐκ τῶν ἄνω 4 τὸ 4y+9y+22 εἰς 4x+9y+22
 " > > > 5 τὸ - $\frac{25\alpha^2 - \beta^2}{15\beta^2 - \alpha^2}$ εἰς = $\frac{25\alpha^2 - \beta^2}{15\beta^2 - \alpha^2}$.
 " 108 > ἐκ τῶν ἄνω 4 τὸ $\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{2}$ εἰς $\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{2}$
 " 111 > > > 4 τὸ 3x+2y+1 εἰς 3x-2y+1
 133 στίχος 11 καὶ ἑζῆς ζ') τὸ Δυνάμεθα ἐνίστε νὰ ἀντικαταστήσωμεν
 κλπ. εἰς « Δυνάμεθα ἐνίστε παράγοντά τινα τῆς ὑπορρίζουν ποσότητος
 νὰ γράψωμεν καταλλήλως ὡς παράγοντα ἐκτὸς τοῦ φιζικοῦ».
 " 153 > ἐκ τῶν ἄνω 8 τὸ α') $\sqrt{5+5\sqrt{24}}$ εἰς α') $\sqrt{5+V^{24}}$
- Σελίς 159 στίχος ἐκ τῶν ἄνω 16 τὸ =6>0. εἰς --6>0.
 " " > > > > 17 τὸ <1 εἰς <0.
 " " > > > > 17 τὸ $\frac{x^2-3x+2}{x^2+3x-2}$ εἰς $\frac{x^2-3x+2}{x^2+3x-2} > 0$.
 " 169 > > > 13 τὸ 1·25 εἰς 1,25.
 " " > > > 15 τὸ $\sqrt{\alpha+x}$ $\sqrt{\alpha-x}$ εἰς $\sqrt{\alpha+x}-\sqrt{\alpha-x}$
 " 172 > ἐκ τῶν κάτω 12 τὸ -4x εἰς -4x².
 " 172 > ἐκ τῶν κάτω 1 τὸ -4x¹ εἰς -4x⁴.
 " 175 > ἐκ τῶν ἄνω 18 τὸ 6x 8y-3 εἰς 6x-8y-3.
 " 176 " > > > 4 τὸ δ') x³-y³ εἰς x²-y²

- Σελὶς 176 στίχος ἐκ τῶν ἄνω 18 τὸ y^2+u^2 εἰς x^2+y^2 .
 » 176 > ἐκ τῶν κάτω 7 τὸ «τοῦ τετραγώνου» εἰς «τοῦ τριπλασίου τοῦ τετραγώνου».
 » 183 > ἐκ τῶν ἄνω 9 τὸ $\pm \frac{11}{5}$ (ἀριθμού) εἰς $\frac{11}{15}$ (ἀδύνατον),
 » 184 * > » » 16 τὸ 272 εἰς 282
 » 185 > ἐκ τῶν κάτω 11 τὸ α' 9(6) εἰς β' 9(6).
-

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Περὶ τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν

§ 1.	Θετικοὶ καὶ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ	σελ.	3—5
§ 2. *	Παράστασις τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν διὰ σημείων	>	5—7
§ 3.	Σχέσις τῶν ἀριθμῶν πρὸς τὴν θετικὴν μονάδα	>	7

Πρόξεις ἐπὶ τῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν

§ 4.	'Ορισμοὶ	>	7—8
§ 5.	Πρόσθεσις	>	8—10
§ 6.	'Αφαιρεσις	>	10—11
§ 7.	'Εκτίλεσις οἰασδήποτε ἀφαιρέσεως	>	11—12
§ 8.	Πολλαπλασιασμός	>	13
§ 9.	Πῶς πολλαπλασιάζουμεν ἐπὶ ἀριθμητικὸν ἀριθμὸν	>	13—14
§ 10.	Περὶ τοῦ σημείου τοῦ γινομένου ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν	>	14
§ 11.	Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 1, η̄ ἐπὶ 0	>	14—15
§ 12.	Διαίρεσις	>	15—16
§ 13.	Περὶ τοῦ σημείου τοῦ πηλίκου ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν	>	16
§ 14.	Περὶ δυνάμεων μὲν ἐκήτας θετικοὺς καὶ ἀκεραίους ἀριθμούς	>	16—17
§ 15.	Περὶ τῶν συμβόλων α ¹ καὶ α ⁰	>	17—18
§ 16.	Θεμελιώδεις ἴδιοτητες τῶν δυνάμεων	>	18—21

ΚΕΕΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

Περὶ τῶν ἀλγεβρικῶν παραστάσεων

§ 17.	Χρῆσις γραμμάτων· γενικοὶ ἀριθμοὶ· ἀλγεβρικοὶ τύποι	>	21—22
§ 18.	'Ορισμὸς καὶ σκοπὸς τῆς 'Αλγεβρας	>	23—24
§ 19.	Συμβόλικὴ παράστασις πρόξειν	>	24—25
§ 20.	'Αλγεβρικὰ σύμβολα	>	25
§ 21.	'Ορισμὸς ἀλγεβρικῆς παραστάσεως	>	25
§ 22.	Εἴδη ἀλγεβρικῶν παραστάσεων	>	25—26
§ 23.	Περὶ μονωνύμων	>	26—27
§ 24.	Περὶ βαθμοῦ ἀκεραίου μονωνύμου	>	27—28
§ 25.	Περὶ ἀθροίσματος μονωνύμων	>	28

§ 26.	Περὶ ὁμοίων μονωνύμων καὶ ἀναγωγῆς αὐτῶν	>	28—29
§ 27.	Ἄριθμητικὴ τιμὴ ἀλγεβρικῆς παραστάσεως	>	29
§ 28.	Παραστάσεις ἰσοδύναμοι	>	29—30
§ 29.	Πῶς κάμνουμεν τὴν δοκιμὴν μιᾶς πράξεως	>	30
§ 30.	Περὶ πολυωνύμων	>	30
§ 31.	Βαθμός πολυωνύμου	>	31

*Περὶ συναρτήσεων *)*

§ 32.	Ἡ ἔννοια τῆς συναρτήσεως	>	31—33
§ 33.	Πίνακς τιμῶν συναρτήσεως	>	33—34
§ 34.	Ἀπεικόνισις τιμῶν συναρτήσεως	>	34—37

Πράξεις ἐπὶ τῶν πολυωνύμων

§ 35.	Πρόσθεσις πολυωνύμων	>	37—38
§ 36.	Ἀφαίρεσις πολυωνύμων	>	39
§ 37.	Περὶ γρήσεως παρενθέσεων καὶ ἀγκυλῶν	>	39—41
§ 38.	Πολλαπλασιασμὸς ἀκεραίων μονωνύμων	>	41—42
§ 39.	Πολλαπλασιασμὸς πολυωνύμου ἐπὶ ἀκέραιον μονώνυμον .	>	43—44
§ 40.	Πολλαπλασιασμὸς πολυωνύμου	<	44—47
§ 41.	Ἀξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοὶ	>	47—48
§ 42.	Διαιρέσις ἀκεραίων μονωνύμων	>	48—50
§ 43.	Διαιρέσις πολυωνύμου διὰ ἀκεραίου μονωνύμου .	>	50—51
§ 44.	Διαιρέσις πολυωνύμου διὰ πολυωνύμου	>	51—55
§ 45.	Περὶ τοῦ ὑπολοίπου διαιρέσεως πολυωνύμου, περιέχοντος τὸν κ., διὰ κ.—α	>	55—56
§ 46.	Εὑρεσις πηλίκων τινῶν ἀπό μνήμης	>	56—57
§ 47.	Ἀνάλυσις ἀλγεβρικῆς παραστάσεως εἰς γινόμενον παραγόντων	>	57—61
§ 48.	Εὑρεσις ταῦ μεγίστου κοινοῦ διαιρέτου	>	61—62
§ 49.	Εὑρεσις τοῦ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου	>	62—63
§ 50.	Περὶ κλασματικῶν παραστάσεων	>	63
§ 51.	Ἀπλοποίησις κλάσματος	>	63—64
§ 52.	Τροπὴ ἐτερωνύμων κλασμάτων εἰς ὄμωνυμα	>	64—65
§ 53.	Ἀριθμητικὴ τιμὴ ἀλγεβρικοῦ κλάσματος	>	65—66
§ 54.	Περὶ τῶν παραστάσεων $\frac{\alpha}{\beta}$ καὶ $\frac{\gamma}{\delta}$	>	66—67
§ 55.	Πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις κλασμάτων	>	67—68
§ 56.	Πολλαπλασιασμὸς κλασμάτων	>	68—69
§ 57.	Διαιρέσις κλασμάτων	>	70—71
§ 58.	Σύνθετα κλάσματα	>	71—72

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III

'Εξιοώσεις α' βαθμοῦ μὲν ἔνα ἄγνωστον

§ 59.	Όρισμοι	>	73—74
-------	-------------------	---	-------

γ'

§ 60. Ιδιότητες τῶν ἔξισώσεων	"	74—77
§ 61. Μεταφορὰ ὄρου ἀπὸ ἐν μέλος ἰστητος εἰς ἄλλο	"	77—78
§ 62. Ἀπαλοιφὴ τῶν παρανομαστῶν ἔξισώσεως	"	78—79
§ 63. Λύσις ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ μὲν ἕνα ἄγνωστον	"	79—80
§ 64. Ἐπαλήθευσις ἔξισώσεως	"	81
§ 65. Διερεύνησις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x - \beta = 0$	"	81—83
§ 66. Ἐφαρμογὴ ἔξισώσεων εἰς τὴν λύσιν προσδηλημάτων	"	83—85
§ 67. Λύσις ἀπλῶν προσδηλημάτων	"	85—94
§ 68*)Περὶ γραφικῆς παραστάσεως τῶν $y = a x$, $y = a x + b$	"	94—96
§ 69*)Γεωμετρικὴ παραστάσις τῆς ρίζης ἔξισώσεως α' βαθμοῦ	"	96—97
§ 70*)Κατασκευὴ εὐθείας ἐκ τῆς ἔξισώσεως τῆς	"	97—98

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

Συστήματα ἔξισώσεων πρώτου βαθμοῦ

§ 71. Ὁρισμοὶ	"	98—99
§ 72. Ιδιότητες τῶν συστημάτων	"	99—100
§ 73. Μέθοδοι λύσεως συστήματος δύο ἔξισώσεων	"	100—104
§ 74*)Διερεύνησις τοῦ συστήματος $\left\{ \begin{array}{l} \alpha x + \beta y = \gamma \\ \alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1 \end{array} \right.$	"	104—107
§ 75*)Γεωμετρικὴ παραστάσις τῶν ρίζῶν συστήματος	"	107—108
§ 76. Συστήματα ἔξισώσεων πρώτου βαθμοῦ μὲν περισσοτέρους τῶν δύο ἀγνώστους	"	108—111
§ 77. Ἀπλῶ προσδηλημάτων συστημάτων	"	111—116

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

Περὶ ἀνισοτήτων

§ 78. Ὁρισμοὶ	"	117
§ 79. Ιδιότητες ἀνισοτήτων	"	117—119
§ 80. Λύσις ἀνισότητος πρώτου βαθμοῦ	"	119—120

Περὶ δυνάμεων μὲν ἐκθέτεας ἀκεραιούς ἀρνητικούς

§ 81. Ὁρισμὸς καὶ ιδιότητες	"	120—122
---------------------------------------	---	---------

Περὶ ἐκθετικῶν ἔξισώσεων

§ 82. Ὁρισμοὶ	"	122
§ 83. Λύσις ἐκθετικῶν ἔξισώσεων α' βαθμοῦ	"	122—123

Περὶ τῶν ριζῶν ἀλγεβρικῶν ἀριθμῶν

§ 84. Ὁρισμοὶ	"	123—125
§ 85. Πλῆθος ριζῶν ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ	"	125—126
§ 86. Ἐξισώσεις διώνυμοι	"	126—127

Δυνάμεις μὲ ἐκθέτας κλασματικοῖς

§ 87. Όρισμοί	»	127—129
§ 88. Ιδιότητες δυνάμεων μὲ κλασματικούς ἐκθέτας	»	129—131
§ 89. Πολλαπλοσιασμός καὶ διαιρέσις ριζῶν ἀριθμῶν	»	132—133
§ 90. Ιδιότητες τῶν ριζῶν ἀριθμῶν	»	133—135

Περὶ δυναμέτρων ἀριθμῶν

§ 91. Όρισμοί	»	135—136
§ 92. Πράξεις ἐπὶ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν	»	136—137
§ 93*) Γεωμετρικὴ παράστασις ἀσυμμέτρου ἀριθμοῦ	»	137—138
§ 94*) Δυνάμεις μὲ ἐκθέτας ἀσυμμέτρους	»	138
§ 95*) Περὶ τῆς ἐκθετικῆς συναρτήσεως $y = ax^x$	»	138—139

Περὶ φανταστικῶν καὶ μηγάδων ἀριθμῶν

§ 96. Όρισμοί	»	139—140
§ 97*) Πράξεις ἐπὶ φανταστικῶν καὶ μηγάδων ἀριθμῶν	»	140
§ 98. Ιδιότητες φανταστικῶν καὶ μηγάδων ἀριθμῶν	»	141
§ 99*) Γεωμετρικὴ παράστασις μηγάδων	»	141—142

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Περὶ ἔξισώσεων δεντρέρων βαθμοῦ

§ 100. Όρισμοί	»	143
§ 101. Ιδιότης τῶν ἔξισώσεων	»	143—144
§ 102. Λόσις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \gamma = 0$	»	144—145
§ 103. Λόσις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x = 0$	»	145—146
§ 104. Λόσις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$	»	146—148
§ 105. Περὶ τοῦ εἰδούς τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$	»	148—149
§ 106. Σχέσεις μεταξὺ συντελεστῶν καὶ ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$	»	149—151
§ 107. Πώς εὑρίσκομεν δύο ἀριθμούς ὅταν γνωρίζωμεν τὸ ἄθροσμα καὶ τὸ γινόμενό των	»	151
§ 108. Τροπὴ διπλῶν τινων ριζῶν τῆς ἀπλᾶς	»	151—153
§ 109. Περὶ τοῦ σημείου τῶν ριζῶν τῆς $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$	»	153—154
§ 110. Τροπὴ τοῦ τριτονύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ εἰς γινόμενον παραγόντων	»	154—155
§ 111. Πώς εὑρίσκομεν τριτονύμον τοῦ β' βαθμοῦ ἐκ τῶν ριζῶν του	»	155
§ 112. Σημεῖον τοῦ τριτονύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ διὰ τὰς πραγματικὰς τιμὰς τοῦ x	»	156—157
§ 113. Λόσις ἀνισότητος β' βαθμοῦ	»	158—159
§ 114*) Μεταβολὴ τοῦ τριτονύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ διὰ πάσας τὰς πραγματικὰς τιμὰς τοῦ x	»	159—162
§ 115*) Γεωμετρικὴ παράστασις τῆς μεταβολῆς τοῦ τριτονύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$	»	162—166

Ἐξισώσεις ἀναγόμεναι εἰς ἔξισώσεις β' βαθμοῦ

§ 116. Διετερράγωνοι ἔξισώσεις	»	166—167
--	---	---------

§ 117. Ἀνάλυσις διτετραγώνου τριωνύμου εἰς γινόμενον παρα-	>	167
γόντων		
§ 118. Λύσις ἑξισώσεων μὲρική	>	168—169
§ 119. Ἐξισώσεις τριωνύμων	>	169—170
§ 120. Περὶ ἀντιστρόφων ἑξισώσεων	>	170—172
§ 121. Συστήματα δευτέρου βαθμοῦ	>	173—176
§ 122. Προβλήματα ἑξισώσεων β' βαθμοῦ	>	176—186

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Περὶ προσόδων

§ 123. Πρόσδοτοι ἀριθμητικαὶ	>	187—188
§ 124. Ἀθροισμα βρων ἀριθμητικῆς προσόδου	>	188—189
§ 125. Περὶ παρεμβολῆς ἀριθμητικῶν βρων	>	190—191
§ 126. Πρόσδοτοι γεωμετρικαὶ	>	191—193
§ 127. Ἀθροισμα βρων γεωμετρικῆς προσόδου	>	193—195
§ 128. Περὶ παρεμβολῆς γεωμετρικῶν βρων	>	195—196

Περὶ λογαρίθμων

§ 129. Ὁρισμοὶ	>	196
§ 130. Ἰδιότητες τῶν λογαρίθμων	>	196—198
§ 131. Τροπὴ ἀρνητικοῦ λογαρίθμου εἰς ἵσον του ἔχοντα μόνον τὸν ἀκέραιον ἀρνητικόν. Χαρακτηριστικὸν λογαρίθμου	>	198—201
§ 132. Πράξεις ἐπὶ τῶν λογαρίθμων	>	201—202
§ 133. Πώς εὑρίσκομεν τὸν λογαρίθμον ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν	>	202—203
§ 134. Περὶ τῶν λογαρίθμικῶν πινάκων	>	203—204
§ 135. Χρήσις τῶν λογαρίθμικῶν πινάκων	>	204—207
§ 136. Ἐφαρμογαὶ τῶν λογαρίθμων	>	207—209
§ 137. Λύσις ἐκθετικῶν ἑξισώσεων διὰ τῶν λογαρίθμων	>	209—210
§ 138. Λύσις ἐκθετικῶν ἑξισώσεων ἄνευ χρήσεως λογαρίθμικῶν πι- νάκων	>	210—211
§ 139. Περὶ τῶν λογαρίθμων ὡς πρὸς βάσιν οἰανδήποτε	>	211—212

Περὶ ἀνατοκισμοῦ καὶ χρεωλνοίας

§ 140. Προβλήματα ἀνατοκισμοῦ	>	213—218
§ 141. Προβλήματα ἵσων καταθέσεων	>	218—220
§ 142. Προβλήματα χρεωλυσίας	>	220—223

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

Περὶ τῆς θεωρίας τῶν Συνδνασμῶν

§ 143. Περὶ μεταθέσεων	>	224—225
§ 144. Περὶ διατάξεων	>	226—227
§ 165. Περὶ συνδυασμῶν	>	227—229
§ 146. Περὶ τοῦ διωνύμου τοῦ Νεύτωνος	>	229—231
§ 147. Ἰδιότητες τοῦ διωνύμου	>	231—232
§ 148. Περὶ πιθανοτήτων	>	232—234
Διορθωτά	>	235—236

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(Έγκεκριμ.) *Πρακτική Αριθμητική*, διὰ τὰ ἑλλην. σχολεῖα, τὰ ἀστικὰ καὶ τὰ ἀνώτερα Παρθεναγωγεῖα, ἐκδόσεις 1—8.

(Έγκεκριμ.) *Πρακτική Γεωμετρία*, διὰ τὰ ἑλλην. σχολεῖα τὰ ἀστικὰ καὶ τὰ ἀνώτερα Παρθεναγωγεῖα, ἐκδόσεις. 1—3.

(Έγκεκριμ.) *Στοιχειώδης Γεωμετρία*, διὰ τὰ Γυμνάσια.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στοιχεῖα Αναλυτικῆς Γεωμετρίας μέρος Α' μετὰ προλόγου ὑπὸ τοῦ 'Ακαδημαϊκοῦ κ. Κ. Καράθεοδωρῆ (Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου) ἐκ σελ. 288 + 1β', διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πολυτεχνείου, τῶν ἀνωτέρων στρατιωτικῶν Σχολῶν καὶ τοὺς μαθητὰς τῶν Πρακτικῶν Λυκείων.

Μαθήματα Γεωμετρίας τῆς θέσεως (λιθόγραφον) διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Πανεπιστημίου ἐκ σελ. 100.

Άριθ. Πρωτ. 13144

Εν Αθήναις τῇ 7 Μαΐου 1919

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόδει

τὸν κ. Νεῖλον Σικελλαρίου

'Ανακοινοῦμεν ὡς ὅτι δὲ ήμετέρας ἀποφάσεως τῇ 3 τοῦ λίξαντος ψυνδὲς ἐκδοθείσας καὶ τῇ 19 τοῦ αὐτοῦ δημοσιευθείσας ἐν τῷ διάθεμα 26 φύλλῳ τῆς 'Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἐνεκρίθη ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς σχολικοῦ ἔτους 1919—20 καὶ ἐφεξῆς τὸ πρός κοίσιν ὑποβληθὲν ἐν χειρογράφῳ ἴμετερον βιβλίον «Στοιχειώδης» "Αλγεβρα" διὰ τὰ Γυμνάσια.

Ο 'Υπουργός
ΔΙΓΚΑΣ

ΤΥΠΟΙΣ Ε. & Ι. ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ

Ταγκογό εφία Χαλκιοπούλου