

[Faint, illegible handwritten text or markings]

Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντίνου

Κ. Κωνσταντίνου
1926

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ

Τακτικού καθηγητού του Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου

Καθηγητὴς Διοσ. Γνωσάκης Φυσικῶν

Ἀθήναι 16 Ὀκτωβρίου 1926

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ,
ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

1927

ΑΘΗΝΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΔΕΛΗ
I - ΜΙΑΤΙΑΔΟΥ - I
1926

18597

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ Α

ΑΘΗΝΑ
1928

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εἰς τὸ ἐπίσημον πρόγραμμα τῶν Λυκείων μας δὲν περιλαμβάνεται ἀκόμη δευτεῶς καὶ ἡ Σφαιρικὴ Τριγωνομετρία. Καὶ ὅμως τὸ μάθημα τοῦτο εἶναι βεβαίως πολὺ χρησιμότερον, καὶ θεωρητικῶς καὶ ἐπὶ τὴν ἐποψὴν τῶν ἐφαρμογῶν, ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Γεωμετρίας, μὲ τὰ ὁποῖα, ὅχι ἀπαραιτήτως κατὰ τὴν γνώμη μου, ἔχει ἐπιβαρυνθῆ τὸ πρόγραμμα (π. χ. θεώρημα τοῦ Desargues. r —κόρυφα καὶ r —πλευρα. Ἀρμονικοὶ καὶ γεωμετρικοὶ σχηματισμοὶ κτλ.). Ἡ γνώσις τῶν κυριωτέρων τύπων τῆς Σφαιρικῆς Τριγωνομετρίας ἀποτελεῖ, πλὴν τῶν καθαρῶς γεωμετρικῶν ἐφαρμογῶν τῆς, τὴν βάσιν τῆς σπουδῆς τῆς Κοσμογραφίας, ὅταν πρόκειται νὰ διδαχθῆ κάπως βαθύτερον παρὰ ὡς ἀπλῆ περιγραφὴ τῶν οὐρανίων φαινομένων.

Ἄλλὰ ὅ,τι δὲν ἔπαρχει εἰς τὸ πρόγραμμα, δὲν ἐμποδίζεται βεβαίως ὁ καθηγητὴς τοῦ Λυκείου νὰ κάμῃ, ἂν θέλῃ: δηλαδή ἐν συνεχείᾳ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐδδθυγοράμμου Τριγωνομετρίας νὰ διδάξῃ (μετὰ τὴν Σφαιρομετρίαν ἐν τῇ Γεωμετρίᾳ) καὶ τοὺς κυριωτέρας τοιῶνιστοις τύπους τῆς Σφαιρικῆς (μὲ ὀλίγας ἐφαρμογὰς ἀπὸ τῆς Κοσμογραφίας, ἂν ἔχῃ καιρὸν).

Ἐπειδὴ τελευταῖον διδάσκω Σφαιρικὴν Τριγωνομετρίαν εἰς τοὺς πρωτοεῖς φοιτητάς, ἐνόμισα χρησίμον νὰ ἐκδώσω τὸ παρὸν σύντομον βιβλίον διὰ τὴν σπουδὴν τῆς Σφαιρικῆς Τριγωνομετρίας ἐν γένει. ἔχει γραφῆ (πλὴν τοῦ τελευταίου κεφαλαίου) τόσον ἀπλῶς, ὥστε νὰ εἶναι προσιτὸν καὶ εἰς τοὺς μαθητὰς τῶν Λυκείων.

Ἐκδίδω τὸ βιβλίον τοῦτο ὡς πρῶτον τόμον μᾶς σειρᾶς μικρῶν βιβλίων διὰ τὰ Λύκεια· τὰ βιβλία αὐτὰ συμπληρώνοντα καθ' ὅλας τὰς διευθύνσεις τὴν μαθηματικὴν καὶ ἐγκυκλοπαιδικὴν ἐν γένει μόρφωσιν τῶν μαθητῶν τῶν Λυκείων μας, θὰ συντελέσουν, ἰσχυρῶς, ὥστε νὰ παραγάγουν ταῦτα τελειότερον καὶ ταχύτερον τοῦς καρποὺς, χάριν τῶν ὁποίων ἰδιαιτέρως ἰδρώθησαν.

Ἀθήναι, Ἰανουάριος 1926.

Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

"Όσοι τύποι ἔχουν ἀστερίσκους, καθὼς καὶ τὸ τελευταῖον κεφάλαιον, εἶναι μόνον διὰ τοὺς εἰδικότερον ἀσχολουμένους μὲ τὰ μαθηματικά.

Κάθε αντίτυπον φέρει τὴν ὑπογραφήν μου.

N. Χαρτίλινγ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α') Σφαιρομετρία και Σφαιρική Τριγωνομετρία.

1. **Σφαιρομετρία.**—Καθώς τὸ μέρος τῆς *Γεωμετρίας* τὸ ἐξετάζον τὰ ἐπίπεδα σχήματα λέγεται **Ἐπιπεδομετρία**, οὕτω καὶ τὸ μέρος αὐτῆς τὸ ἐξετάζον τὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας μᾶς σφαιρας γραφόμενα σχήματα, δηλ. τὰ **σφαιρικά** σχήματα, λέγεται **Σφαιρομετρία**. Ὅπως δὲ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τὸ ἀπλούστερον καὶ σπουδαιότερον σχῆμα (εἰς τὸ ὁποῖον ἀνάγονται ὅλα τ' ἄλλα) εἶναι τὸ **εὐθύγραμμον τρίγωνον**, τὸ ἴδιον καὶ ἐπὶ τῆς σφαίρας: ἀπλούστερον καὶ σπουδαιότερον ἀπ' ὅλα τὰ σχήματα εἶναι τὸ **σφαιρικὸν τρίγωνον**, δηλ. τὸ τρίγωνον τὸ σχηματιζόμενον ἀπὸ τρία τόξα **μεγίστων** κύκλων τῆς σφαίρας.

2. **Σφαιρική τριγωνομετρία.**—Ἐπειδὴ ἡ γεωμετρικὴ κατασκευὴ τῶν ἐπιπέδων τριγώνων ἀπὸ τὰ γνωστὰ στοιχεῖα τῶν (τὴν ὁποίαν μᾶς διδάσκει ἡ γεωμετρία) ὑπόκειται εἰς σφάλματα, ἔνεκα τῆς ἀτελείας τῶν γεωμετρικῶν ὀργάνων, ἐξητήθη ἡ **ἀναλυτικὴ** ἐπίλυσις τῶν τριγώνων, δηλ. ἡ εὔρεσις τῶν ἀγνωστων στοιχείων τῶν ἀπὸ τύπου συνδέοντας τὰ ἄγνωστα αὐτὰ στοιχεῖα μὲ τὰ γνωστά. Τοὺς τύπους τούτους μᾶς παρέχει ἡ **εὐθύγραμμος** (ἢ **ἐπίπεδος**) **Τριγωνομετρία**. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ εἰς τὴν σπουδὴν τῶν σφαιρικῶν τριγώνων: ἡ γεωμετρικὴ κατασκευὴ αὐτῶν ἀπὸ τὰ γνωστὰ τῶν στοιχεῖα (ἐκτὸς τῆς δυσκολίας τῆς χαράξεως τῶν γραμμῶν ἐπὶ τῆς σφαίρας) ὑπόκειται εἰς σφάλματα ἀπὸ τὴν ἀτέλειαν τῶν γεωμετρικῶν μᾶς ὀργάνων. Ἐξήτησαν λοιπὸν οἱ Μαθηματικοὶ νὰ εὔρουν τύπους συνδέοντας τὰ ἄγνωστα μὲ τὰ γνωστὰ στοιχεῖα τῶν σφαιρικῶν τριγώνων, διὰ νὰ ἐμποροῦν νὰ ἐπιλύουν ἀναλυτικῶς τὰ σφαιρικὰ τρίγωνα. Τὸ μάθημα τὸ διδάσκον τοὺς τύπους τούτους λέγεται **Σφαιρική Τριγωνομετρία**.

3. **Χρησιμότης τῆς Σφαιρικῆς Τριγωνομετρίας.**—Ἡ Σφαιρική Τριγωνομετρία ἔχει πολλὰς καὶ σπουδαιότητας ἐφαρμογὰς. Ἐκτὸς τῆς εἰς καθαρῶς γεωμετρικὰ προβλήματα χρησι-

μοποιήσεώς της, αποτελεί την βάση της σπουδῆς τῆς *Σφαιρικῆς Ἀστρονομίας*. Ἐπίσης χρησιμεύει πολὺ καὶ εἰς τὴν σπουδὴν τῆς *Διαφορικῆς Γεωμετρίας*.

Β') Λήμματα ἀπὸ τὴν Σφαιρομετρίαν.

4. Τὰς ἐπομένους προτάσεις τὰς ἀναφέροντες χωρὶς ἀπόδειξιν, ὡς λήμματα ἀπὸ τὰ *Στοιχεῖα τῆς Γεωμετρίας* :

1ον) Εἰς κάθε σφαιρικὸν τρίγωνον ἀντιστοιχεῖ μία ἐπίκεντρος τριέδρος στερεὰ γωνία καὶ ἀντιστρόφως. Καὶ γενικῶς, εἰς κάθε σφαιρικὸν πολύγωνον ἀντιστοιχεῖ μία ἐπίκεντρος πολυέδρος στερεὰ γωνία καὶ ἀντιστρόφως. Αἱ πλευραὶ τοῦ σφαιρικοῦ πολυγώνου μετροῦν εἰς μοίρας τὰς ἐπιπέδους γωνίας τῆς στερεᾶς γωνίας, αἱ δὲ γωνίαι του τὰς διέδρους γωνίας τῆς στερεᾶς.

2ον) Εἰς δύο συμμετρικὰ πολύγωνα (δηλ. τῶν ὁποίων αἱ ἀντιστοιχοὶ κορυφαὶ κεῖνται ἀνά δύο εἰς τὰ ἄκρα μιᾶς διαμέτρου) ἀντιστοιχοῦν ἐπίκεντροι στερεαὶ γωνίαι κατὰ κορυφήν. Καὶ ἐπειδὴ αὐταὶ γενικῶς δὲν ἐφαρμόζονται, οὔτε τὰ συμμετρικὰ πολύγωνα γενικῶς ἐφαρμόζονται.

3ον) Εἰς κάθε σφαιρικὸν τρίγωνον κάθε πλευρὰ εἶναι μικρότερα ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἄλλων, ἀλλὰ μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν διαφορὰν τῶν.

4ον) Εἰς κάθε σφαιρικὸν τρίγωνον τὸ ἄθροισμα τῶν τριῶν πλευρῶν εἶναι μικρότερον ἀπὸ τὴν περιφέρειαν τοῦ μεγίστου κύκλου τῆς σφαίρας του.

5ον) Εἰς κάθε σφαιρικὸν τρίγωνον τὸ ἄθροισμα τῶν τριῶν γωνιῶν εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ δύο ὀρθάς, ἀλλὰ μικρότερον ἀπὸ ἕξ ὀρθάς. Καὶ κάθε γωνία του, ὅταν ἀϋξηθῇ κατὰ 2 ὀρθάς, ὑπερβαίνει τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἄλλων γωνιῶν.

6ον) Ἐν σφαιρικῶν τριγώνων εἰμπορεῖ νὰ ἔχη 1 ἢ 2 ἢ καὶ 3 ὀρθὰς γωνίας (*μονορθογώνιον, δισορθογώνιον, τρισορθογώνιον*).

7ον) *Περιπτώσεις ἰσότητος δύο σφαιρικῶν τριγώνων :*

α') Ἄν ἔχουν δύο ζεύγη πλευρῶν ἴσα καὶ τὰς δύο περιεχομένας γωνίας ἴσας, ἔχουν ἴσα καὶ ὅλα τ' ἄλλα στοιχεῖά των.

β') Ἄν ἔχουν ἓν ζεύγος ἴσων πλευρῶν καὶ τὰς προσκειμένας γωνίας ἀντιστοίχως ἴσας, ἔχουν ἴσα καὶ ὅλα τ' ἄλλα στοιχεῖά των.

γ') Ἄν αἱ πλευραὶ των εἶναι ἴσαι μίαν μὲ μίαν, εἶναι ἐπίσης καὶ αἱ γωνίαι των (αἱ ἀντικρῶ τῶν ἴσων πλευρῶν).

δ') Ἄν αἱ γωνίαι των εἶναι ἴσαι μία μὲ μίαν, εἶναι ἐπίσης

καὶ αἱ πλευραὶ τῶν (αἱ ἀντικρὺ τῶν ἴσων γωνιῶν).

8ον) Κάθε ἰσοσκελὲς σφαιρικὸν τρίγωνον ἔχει τὰς παρὰ τὴν βάσιν γωνίας τοῦ ἴσου. Καὶ ἀντιστρόφως.

9ον) Ἐάν εἷς ἐν σφαιρικὸν τρίγωνον μία πλευρὰ α εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ μίαν ἄλλην β , θὰ εἶναι καὶ ἡ ἀντικρὺ τῆς α γωνία Α μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν ἀντικρὺ τῆς β γωνίαν Β. Καὶ ἀντιστρόφως.

10ον) Ἐνὲς σφαιρικοῦ τριγώνου ΑΒΓ λέγεται ἐν ἄλλο, τὸ Α'Β'Γ' , **πολικόν**, ὅταν αἱ κορυφαὶ τοῦ ΑΒΓ εἶναι **πόλοι** τῶν πλευρῶν τοῦ Α'Β'Γ' . Ἐάν τὸ Α'Β'Γ' εἶναι πολικόν τοῦ ΑΒΓ , θὰ εἶναι καὶ τὸ ΑΒΓ πολικόν τοῦ Α'Β'Γ' .

11ον) Ἐάν δύο σφαιρικὰ τρίγωνα ΑΒΓ , Α'Β'Γ' εἶναι **πολικά** τὸ ἐν τοῦ ἄλλου, κάθε γωνία τοῦ ἑνὸς εἶναι παραπλήρωμα τῆς ἀντιστοίχου πλευρᾶς τοῦ ἄλλου (ἐκφρασθείσης διὰ μοιρῶν), δηλ.

$\text{Α} = \pi - \alpha$, $\text{Β} = \pi - \beta$, $\text{Γ} = \pi - \gamma$ καὶ $\text{Α}' = \pi - \alpha$, $\text{Β}' = \pi - \beta$, $\text{Γ}' = \pi - \gamma$.

12ον) Ὅταν δύο σφαιρικὰ τρίγωνα εἶναι **πολικά** τὸ ἐν τοῦ ἄλλου, αἱ ἀντίστοιχοί των ἐπίκεντροι τρίεδροι γωνία εἶναι **παραπληρωματικά**.

13ον) Κάθε μέρος τῆς σφαίρας, τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ δύο ἡμικυκλίων μεγίστων κύκλων τῆς, λέγεται **σφαιρικὸς ὄνυξ**. τὸ δὲ ἀντίστοιχον μέρος τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας λέγεται **σφαιρικὸς ἄτρακτος**. Καὶ **σφαιρικὴ πυραμὶς** λέγεται τὸ μέρος τῆς σφαίρας, τὸ ὁποῖον ἀποκόπτουν αἱ ἐπίπεδα ἔδρα μᾶς ἐπίκεντρον στερεᾶς γωνίας.

14ον) Ὁ λόγος δύο ἀτράκτων εἶναι ἴσος μὲ τὸν λόγον τῶν γωνιῶν των. Καὶ μέτρον κάθε ἀτράκτου (ἢ σφαιρικοῦ ὄνυχος) εἶναι ἡ γωνία του μὲν, ἂν ὡς μονάδα τῶν ἐπιφανειῶν (ἢ τῶν ὄγκων) ἐκλέξωμεν τὸν **ὀρθογώνιον** ἀτράκτου (ἢ τὸν ὀρθογ. σφαιρικὸν ὄνυχα) τὸ διπλάσιον δὲ τῆς γωνίας του, ἂν ἐκλέξωμεν ὡς μονάδα τῶν ἐμβαδῶν (ἢ τῶν ὄγκων) τὸ **τρισσορθογώνιον** σφαιρικὸν τρίγωνον (ἢ τὴν σφαιρικὴν πυραμίδα τὴν ἔχουσαν βάσιν τὸ τρισσορθογώνιον σφαιρικὸν τρίγωνον).

15ον) Δύο συμμετρικά σφαιρικά τρίγωνα εἶναι ἰσοδύναμα. Καὶ δύο τριγωνικά σφαιρικά πυραμίδες μὲ βάσεις συμμετρικά εἶναι ἰσοδύναμοι.

16ον) Ὅταν 3 μέγιστοι κύκλοι κόπτονται ἐπὶ τῆς σφαίρας

καὶ διαιροῦν τὴν ἐπιφανείαν τῆς εἰς τρίγωνα, τὸ ἄθροισμα τῶν ἔμβασδων δύο κατὰ κορυφὴν τριγώνων εἶναι ἴσον μὲ τὸν ἄτρακτον τὸν ἔχοντα γωνίαν τὴν γωνίαν τῆς κοινῆς κορυφῆς.

17ον) Ἐὰν ὡς μονάδα τῶν ἐπιφανειῶν ἐκλέξωμεν τὸ τρισσοθωγώνιον σφαιρικὸν τρίγωνον, τὸ ἔμβασδὸν κάθε σφαιρικοῦ τριγώνου εἶναι ἴσον μὲ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ἄθροίσματος τῶν γωνιῶν του ὑπὲρ τὰς 2 ὀρθάς, δηλ. ἴσον μὲ $(A+B+Γ)-π$.

Καὶ τὸ ἔμβασδὸν κάθε σφαιρικοῦ πολυγώνου μὲ n πλευράς, εἶναι ἴσον μὲ $(A+B+Γ+Δ+⋯+⋯)-(n-2)π$, δηλ. ἴσον μὲ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ἄθροίσματος τῶν γωνιῶν του ὑπὲρ τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν τοῦ ὁμωνύμου ἐπιπέδου πολυγώνου.

18ον) Ὁ ὄγκος κάθε τριγωνικῆς σφαιρικῆς πυραμίδος, ἂν ἐκλέξωμεν ὡς μονάδα τῶν ὄγκων τὴν τρισσοθωγώνιον σφαιρικὴν πυραμίδα (δηλ. τὸ $\frac{1}{8}$ τοῦ ὄγκου τῆς σφαίρας), εἶναι ἴσος μὲ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ἄθροίσματος τῶν γωνιῶν τῆς βάσεώς της ὑπὲρ τὰς δύο ὀρθάς.

ΜΕΡΟΣ Α΄.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Αἱ τρεῖς πρῶται ομάδες.

Α΄) Τύποι διὰ τὰ συνημίτονα τῶν πλευρῶν.

5. *Βασικοὶ τύποι.*—Καθὼς εἰς τὴν *Εὐθύγραμμον Τριγωνομετρίαν* εἶναι ἀνάγκη νὰ εὗρεθοῦν πρῶτα ἀπὸ τὸ σχῆμα, δηλ. *γεωμετρικῶς* μερικοὶ *βασικοὶ*, κατόπιν δὲ ὅλοι οἱ ἄλλοι τύποι ἔπονται ὡς *ἀναλυτικὴ συνέπεια* τῶν *βασικῶν* τούτων τύπων, οὕτω καὶ εἰς τὴν *Σφαιρικὴν Τριγωνομετρίαν* εἶναι ἀνάγκη ν' ἀποδείξωμεν πρῶτα *γεωμετρικῶς* ὀλίγους τύπους *βασικούς*, καὶ ἔπειτα ὅλοι οἱ ἄλλοι συνάγονται *ἀναλυτικῶς* ἀπὸ αὐτούς.

6. *Εὗρεσις τῶν βασικῶν τύπων.*—Τοῦ σφαιρικοῦ τριγώνου $ΑΒΓ$ ὀνομάζομεν $\alpha(=ΒΓ)$, $\beta(=ΓΑ)$, $\gamma(=ΑΒ)$ τὰ μήκη τῶν πλευρῶν καὶ A , B , Γ τὰς κατὰ σειρὰν ἀντικρυνὰς γωνίας. Κέντρον δὲ τῆς σφαίρας του (ἀκτίς=1) εἶναι τὸ K .

Ἐὰς ὑποθέσωμεν πρῶτα, ὅτι ὅλαι αἱ πλευραὶ τοῦ τριγώνου εἶναι μικρότεραι ἀπὸ 90° . Αἱ ἐφαπτόμεναι εἰς τὴν κορυφὴν A τῶν δύο πλευρῶν $ΑΒ$ καὶ $ΑΓ$, δηλ. αἱ εὐθείαι $ΑΒ'$ καὶ $ΑΓ'$, ὡς κάθετοι ἐπὶ τὴν ἀκτίνα $ΚΑ$, θὰ συναντήσουν τὰς ἀκτίνας $ΚΒ$, $ΚΓ$ εἰς δύο σημεῖα B' , Γ' . Κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν ἐπιματίσθησαν δύο ζεύγη τριγώνων : α') τὰ $ΚΑΒ'$, $ΚΑΓ'$ με *κοινὴν* πλευρὰν τὴν $ΚΑ=1$ καὶ β') τὰ $ΑΒΤ'$, $ΚΒΤ'$ με *κοινὴν* πλευρὰν τὴν $ΒΤ'$.

Ἐὰς ἐκφράσωμεν τὸ τετράγωνον τῆς κοινῆς αὐτῆς πλευρᾶς $ΒΤ'$ ἀπὸ τὸ ἐν καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο τρίγωνον. Ἐχομεν (κατὰ τὴν *Εὐθύγραμμον Τριγωνομετρίαν*):

$$(ΒΤ')^2 = (ΑΒ')^2 + (ΑΓ')^2 - 2(ΑΒ')(ΑΓ')\cos(B'ΑΓ')$$
 καὶ

$$(ΒΤ')^2 = (ΚΒ')^2 + (ΚΓ')^2 - 2(ΚΒ')(ΚΓ')\cos(B'ΚΓ')$$

καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα KAB' , $KAΓ'$ εὐρίσκωμεν
 $(AB') = (KA) \cdot \epsilon\phi\gamma = \epsilon\phi\gamma$, $(AΓ') = (KA) \cdot \epsilon\phi\beta = \epsilon\phi\beta$,

$KB' = \frac{KA}{\sigma\upsilon\nu\gamma} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\gamma}$, $KΓ' = \frac{KA}{\sigma\upsilon\nu\beta} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\beta}$, ἂν ἐξιτώσωμεν τὰς
 δύο ἴσας τιμὰς τοῦ $(BΓ')$, θὰ ἔχωμεν :

$$\epsilon\phi^2\gamma + \epsilon\phi^2\beta - 2\epsilon\phi\gamma \cdot \epsilon\phi\beta \cdot \sigma\upsilon\nu A = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\gamma} + \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\beta} - 2 \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma}$$

ἢ, ἂν θέσωμεν ἀντὶ $\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\gamma}$, $\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\beta}$ τὰς ἴσας τῶν ἐκφράσεις

$$1 + \epsilon\phi^2\gamma, 1 + \epsilon\phi^2\beta, -\epsilon\phi\gamma \cdot \epsilon\phi\beta \cdot \sigma\upsilon\nu A = 1 - \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma}$$

Ἡ σχέσηις δὲ αὐτὴ γράφεται καὶ ὡς ἑξῆς :

$$\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma + \eta\mu\beta\eta\mu\gamma\sigma\upsilon\nu A.$$

Ἐπειδὴ δὲ εἰμποροῦμεν νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ προηγούμενα εἰς ἐκά-
 στήν πλευρὰν τοῦ τριγώνου, ἔχομεν τελικῶς τοὺς ἑξῆς τρεῖς
βασικοὺς τύπους τῆς Σφαιρικῆς Τριγωνομετρίας :

$$(1) \begin{cases} \sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma + \eta\mu\beta\eta\mu\gamma\sigma\upsilon\nu A, \\ \sigma\upsilon\nu\beta = \sigma\upsilon\nu\gamma\sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\gamma\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu B, \\ \sigma\upsilon\nu\gamma = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma. \end{cases}$$

Οἱ τύποι αὐτοὶ ἀπεδείχθησαν μὲ τὴν ὑπόθεσιν, ὅτι καθε γωνία τοῦ τριγώνου εἶναι μικροτέρα τῶν 90° , ἰσχύουν ὅμως διὰ κάθε σφαιρικὸν τρίγωνον. Διότι, ἂς ὑποθέσωμεν :

1) Ὅτι μία πλευρὰ, π. γ. ἡ AB , εἶναι ~~μικροτέρα~~ ^{μεγαλύτερα} τῶν 90° .

Τότε τὴν προεκτείνω, ἕως ὅτου συναντήσῃ τὴν προέκτασιν τῆς $BΓ$: τὰ τόξα BAB' , $ΓAΓ'$ θὰ εἶναι τότε ἡμιπεριφέρειαι, ὥστε ἡ AB' ~~μικροτέρα~~ τῶν 90° . Ἀπὸ τὸ τρίγωνον λοιπὸν $AΓB'$ θὰ ἔχωμεν : $\sigma\upsilon\nu(\pi - \alpha) = \sigma\upsilon\nu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi - \gamma) + \eta\mu\beta\eta\mu(\pi - \gamma)\sigma\upsilon\nu(\pi - A)$, δηλ. πάλιν : $\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma + \eta\mu\beta\eta\mu\gamma\sigma\upsilon\nu A$.

2) Ὅτι καὶ αἱ δύο πλευραὶ τῆς γωνίας A εἶναι μικροτέρα ^{μικροτέρα} τῶν 90° . Τὰς προεκτείνωμεν ἕως εἰς τὸ A' , τὸ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετον τοῦ A . Ἀπὸ τὸ τρίγωνον τότε $A'BΓ$ εὐρίσκωμεν :

$$\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu(\pi - \beta) \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi - \gamma) + \eta\mu(\pi - \beta) \cdot \eta\mu(\pi - \gamma)\sigma\upsilon\nu A,$$

δηλ. πάλιν $\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma + \eta\mu\beta\eta\mu\gamma\sigma\upsilon\nu A$.

(Ἡ περίπτωσις τέλος, ὅπου ἡ AB ἢ αἱ AB καὶ $BΓ$ εἶναι ἴσαι μὲ 90° , εὐρίσκεται ὡς **ὀρθὴ** περίπτωσις τῶν προηγουμένων).

Μνημονικὸς κανὼν. Διὰ νὰ ἐνθυμούμεθα εὐκόλως τοὺς τύπους (1), παρατηροῦμεν, ὅτι τὰ δεύτερα μέλη τῶν, ἂν παραλεί-

εφ' ἧ δ' παράγων συνΑ, καταναυτὸν τὰ συνημίτονα τῶν διαφορῶν
 $\beta - \gamma$ ἢ $\gamma - \alpha$ ἢ $\alpha - \beta$.

7. *Χρησιμότης τῶν τύπων.* Κάθε τύπος ἀπὸ τοὺς (1) συν-
 δέει τὰς τρεῖς πλευρὰς τοῦ τριγώνου καὶ μίαν γωνίαν του. Χρη-
 σιμεῖται ἐπομένως διὰ νὰ εὐρεθῇ μία πλευρὰ ἀπὸ τὰς δύο ἄλλας
 καὶ τὴν γωνίαν τὴν ἀντικρυνὴν εἰς τὴν δοθεῖσαν πλευρὰν ἢ μία
 γωνία ἀπὸ τὰς τρεῖς πλευρὰς (ἂν λυθῇ πρὸς τὸ συνΑ ἢ συνΒ ἢ
 συνΓ).

Β') Τύποι διὰ τὰ ἡμίτονα τῶν πλευρῶν.

8. *Εὐρεσις τῶν τύπων.* Ἀπὸ τὴν πρώτην τῶν (1) εὐρίσκομεν:

$$\text{συνΑ} = \frac{\text{συνα} - \text{συνβσυνγ}}{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma} \quad \text{ἐπομένως καὶ :}$$

$$\begin{aligned} \eta\mu^2\text{Α} &= 1 - \text{συν}^2\text{Α} = 1 - \frac{(\text{συνα} - \text{συνβσυνγ})^2}{\eta\mu^2\beta \cdot \eta\mu^2\gamma} = \\ &= \frac{\eta\mu^2\beta\eta\mu^2\gamma - \text{συν}^2\alpha - \text{συν}^2\beta \cdot \text{συν}^2\gamma + 2\text{συνασυνβσυνγ}}{\eta\mu^2\beta\eta\mu^2\gamma} = \\ &= \frac{(1 - \text{συν}^2\beta)(1 - \text{συν}^2\gamma) - \text{συν}^2\alpha - \text{συν}^2\beta\text{συν}^2\gamma + 2\text{συνασυνβσυνγ}}{\eta\mu^2\beta \cdot \eta\mu^2\gamma} = \\ &= \frac{1 - \text{συν}^2\alpha - \text{συν}^2\beta - \text{συν}^2\gamma + 2\text{συνα} \cdot \text{συνβ} \cdot \text{συνγ}}{\eta\mu^2\beta \cdot \eta\mu^2\gamma} \quad \text{ὥστε :} \end{aligned}$$

$$\frac{\eta\mu^2\text{Α}}{\eta\mu^2\alpha} = \frac{1 - \text{συν}^2\alpha - \text{συν}^2\beta - \text{συν}^2\gamma + 2\text{συνα} \cdot \text{συνβ} \cdot \text{συνγ}}{\eta\mu^2\alpha \cdot \eta\mu^2\beta \cdot \eta\mu^2\gamma}$$

ἂν τώρα τρέψωμεν εἰς τὸν τύπον αὐτὸν τὰ γράμματα α, β, γ, κα-
 θὼς καὶ τὰ Α, Β, Γ, κυκλικῶς τὸ ἓν εἰς τὸ ἄλλο, βλέπομεν, ὅτι
 τὸ μὲν β' μέρος τῆς προηγουμένης ἰσότητος μένει τὸ ἴδιον (διότι
 εἶναι *συμμετρικὴ* παράστασις πρὸς τὰ γράμματα), τὸ δὲ α'
 γίνεται $\frac{\eta\mu^2\text{Β}}{\eta\mu^2\beta}$. ἐπίσης δὲ ἄλλη μία κυκλικὴ τροπὴ τῶν γραμμα-
 τῶν ἀφίνα πάλιν τὸ β' μέρος τὸ ἴδιον, τρέπει ὅμως τὸ α' εἰς
 τὸ $\frac{\eta\mu^2\text{Γ}}{\eta\mu^2\gamma}$. θὰ ἔχωμεν ἐπομένως τὰς ἰσότητας :

$$\frac{\eta\mu^2\text{Α}}{\eta\mu^2\alpha} = \frac{\eta\mu^2\text{Β}}{\eta\mu^2\beta} = \frac{\eta\mu^2\text{Γ}}{\eta\mu^2\gamma}$$

καὶ ἐπομένως καὶ τὰς ἑξῆς : $\frac{\eta\mu\text{Α}}{\eta\mu\alpha} = \frac{\eta\mu\text{Β}}{\eta\mu\beta} = \frac{\eta\mu\text{Γ}}{\eta\mu\gamma} \quad (2).$

(Τὸ σημεῖον ὄλων τῶν λόγων τούτων εἶναι +, διότι ἔχουν
 ἡμίτονα γωνιῶν καὶ τῶν μικροτέρων τῶν 180°).

Μνημονικὸς κανὼν. Οἱ τύποι (2) εὐρίσκονται ἀπὸ τοὺς ἀν-
 τιστοιχοὺς τύπους τῆς Εὐθυγράμμου Τριγωνομετρίας :

$\frac{\eta\mu A}{\alpha} = \frac{\eta\mu B}{\beta} = \frac{\eta\mu \Gamma}{\gamma}$, ἂν ἀντὶ α, β, γ , γράψωμεν $\eta\mu\alpha, \eta\mu\beta, \eta\mu\gamma$.

Γ') Τύποι μὲ 5 στοιχεῖα τοῦ τριγώνου.

9. **Εὐρέσις τῶν τύπων.** Ἐάν εἰς τὸν α' ἀπὸ τοὺς τύπους (1) θέσωμεν ἀντὶ $\sigma\upsilon\nu\beta$ τὴν τιμὴν τοῦ ἀπὸ τὸν β' τῶν (1), εὐρίσκομεν:

$$\begin{aligned} \sigma\upsilon\nu\alpha &= \sigma\upsilon\nu\gamma(\sigma\upsilon\nu\gamma\sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\gamma\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu B) + \eta\mu\beta \cdot \eta\mu\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu A, \\ \eta &: \sigma\upsilon\nu\alpha(1 - \sigma\upsilon\nu^2\gamma) = \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu B + \eta\mu\beta \cdot \eta\mu\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu A, \\ &\eta \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\gamma = \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu B + \eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu A, \\ &\text{δηλ. } \eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu A = \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\gamma - \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu B. \end{aligned}$$

Ἐάν τώρα θέσωμεν ἀντιστρόφως τὴν τιμὴν τοῦ $\sigma\upsilon\nu\alpha$ ἀπὸ τὸν α' τῶν τύπων (1) εἰς τὸν β' τῶν (1), θὰ εὐρωμεν τὸν ἐξῆς νέον τύπον: $\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu B = \sigma\upsilon\nu\beta \cdot \eta\mu\gamma - \eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu A$ · καὶ ἐπειδὴ τὰ ἴδια εἰμποροῦμεν νὰ κάμωμεν καὶ διὰ τὸν β' καὶ τὸν γ' τῶν τύπων (1), ἢ καὶ διὰ τὸν γ' καὶ τὸν α' , εὐρίσκομεν τὸ ὅλον τοὺς ἐξῆς 6 τύπους

$$(3) \left\{ \begin{aligned} \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu A &= \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\gamma - \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\gamma\sigma\upsilon\nu B, \\ \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu B &= \sigma\upsilon\nu\beta\eta\mu\gamma - \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma\sigma\upsilon\nu A, \\ \eta\mu\gamma\sigma\upsilon\nu B &= \sigma\upsilon\nu\beta\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\Gamma, \\ \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma &= \sigma\upsilon\nu\gamma\eta\mu\alpha - \eta\mu\gamma\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu B, \\ \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\Gamma &= \sigma\upsilon\nu\gamma\eta\mu\beta - \eta\mu\gamma\sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu A, \\ \eta\mu\gamma\sigma\upsilon\nu A &= \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta - \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma. \end{aligned} \right.$$

Οἱ τύποι αὗτοὶ συνδέουν 5 στοιχεῖα τοῦ τριγώνου.

Μνημονικὸς κανὼν. Τὰ β' μέλη τῶν τύπων (3), ἂν παραλειφθοῦν τὰ συνημίτονα τῶν γωνιῶν, κατανοοῦν ἡμίτονα διαφορῶς ἀρχίζει δὲ κάθε β' μέλος ἀπὸ τὸ συνημίτονον μίως πλευρῶς μὲ τὸ ἴδιον γράμμα τῆς γωνίας τοῦ α' μέλους.

10. **Μετασχηματισμὸς τῶν τύπων** (3). Ἐνῶ καθεὶς ἀπὸ τοὺς τύπους (1) καὶ (2) περιέχει 4 στοιχεῖα τοῦ τριγώνου (οἱ (1) 3 πλευρῶς καὶ μίαν γωνίαν, οἱ (2) δύο πλευρῶς καὶ 2 γωνίας), καθεὶς ἀπὸ τοὺς (3) περιέχει 5 στοιχεῖα. Εἰμποροῦμεν ὅμως νὰ τοὺς μετασχηματίσωμεν, ὥστε νὰ περιέχουν καὶ αὗτοὶ ἀπὸ 4 μόνον στοιχεῖα.

Αὐτὸ γίνεται ὡς ἐξῆς. Εἰς τὸν α' ἀπὸ τοὺς τύπους (3) θέτομεν τὴν τιμὴν τοῦ $\eta\mu\beta$ ἀπὸ τοὺς (2), δηλ. $\eta\mu\beta = \frac{\eta\mu\alpha\eta\mu B}{\eta\mu A}$ · τότε

εὐρίσκομεν $\frac{\eta\mu\alpha\eta\mu B\sigma\upsilon\nu A}{\eta\mu A} = \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\gamma - \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\gamma\sigma\upsilon\nu B$, δηλ.

$\eta\mu B \cdot \sigma\phi A = \sigma\phi\alpha \cdot \eta\mu\gamma - \sigma\upsilon\nu\gamma\sigma\upsilon\nu B$ · καὶ ὁ τύπος αὗτός περιέχει 4

μόνον στοιχεῖα ὁμοίως εὐρίσκομεν καὶ ὁ ἄλλους τύπους ἀπὸ τοὺς ὅ ἄλλους τύπους (3), ὥστε ἔχομεν τὸ ὅλον τοὺς ἐξῆς 6 τύπους :

$$(4) \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\beta\sigma\phi\Lambda = \sigma\phi\alpha.\eta\mu\gamma - \sigma\upsilon\gamma\gamma\sigma\upsilon\nu\beta, \\ \eta\mu\Lambda\sigma\phi\beta = \sigma\phi\beta.\eta\mu\gamma - \sigma\upsilon\gamma\gamma\sigma\upsilon\nu\Lambda, \\ \eta\mu\Gamma\sigma\phi\beta = \sigma\phi\beta.\eta\mu\alpha - \sigma\upsilon\gamma\gamma\sigma\upsilon\nu\Gamma, \\ \eta\mu\beta\sigma\phi\Gamma = \sigma\phi\gamma.\eta\mu\alpha - \sigma\upsilon\gamma\gamma\sigma\upsilon\nu\beta, \\ \eta\mu\Lambda\sigma\phi\Gamma = \sigma\phi\gamma.\eta\mu\beta - \sigma\upsilon\gamma\gamma\sigma\upsilon\nu\Lambda, \\ \eta\mu\Gamma\sigma\phi\Lambda = \sigma\phi\alpha.\eta\mu\beta - \sigma\upsilon\gamma\gamma\sigma\upsilon\nu\Gamma. \end{array} \right.$$

11. Παρατηρήσεις.

α') *Ἀριθμὸς τῶν στοιχείων τοῦ τριγώνου εἰς κάθε τύπον.*

Εὐρήκαμεν ἕως τώρα 3 ομάδας τύπων. Τῆς α' ομάδος κάθε τύπος περιέχει 4 στοιχεῖα τοῦ τριγώνου, δηλ. τὰς 3 πλευρὰς καὶ μίαν γωνίαν. Τῆς β' ομάδος κάθε ἀναλογία περιέχει πάλιν 4 στοιχεῖα τοῦ τριγώνου, δηλ. δύο πλευρὰς καὶ δύο γωνίας. Τῆς γ' ὅμως ομάδος κάθε τύπος περιέχει ὅ στοιχεῖα, δηλ. τὰς τρεῖς πλευρὰς καὶ δύο γωνίας ὅταν ὁμοῦ μετασχηματισθοῦν καὶ εἰσελθῶν αἱ σφαιρομετρικὰ (καθὼς εἶδομεν), τὰ στοιχεῖα γίνονται πάλιν μόνον 4.

β') *Προτιμότεροι τύποι.* Εἶναι προτιμότεροι οἱ τύποι ὅσοι περιέχουν 4 μόνον στοιχεῖα, διότι, καθὼς γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Σφαιρομετρίαν, ἀπὸ 3 μόνον στοιχεῖα τοῦ σφαιρικοῦ τριγώνου εἰμποροῦμεν νὰ κατασκευάσωμεν (γεωμετρικῶς) τὸ τρίγωνον καὶ ἐπομένως νὰ εὐρωμεν καὶ τ' ἄλλα τρία στοιχεῖά του.

γ') *Ἀνεξαρτησία τῶν τύπων.* Μεταξὺ τῶν 6 στοιχείων κάθε σφαιρικοῦ τριγώνου *τρεῖς μόνον σχέσεις εἰμποροῦν νὰ ὑπάρχουν* ἀνεξάρτητοι ἢ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην διότι, ἂν ὑπῆρχον 4 (ἢ καὶ περισσότεροι), τότε αἱ 4 αὐταὶ ἐξισώσεις θὰ ὄριζον 4 στοιχεῖα τοῦ τριγώνου, δηλ. τὸ τρίγωνον θὰ ὄριζετο ἀκριβῶς ἀπὸ τὰ ἄλλα δύο μόνον στοιχεῖά του, πράγμα ἀδύνατον, καθὼς γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Σφαιρομετρίαν. Πραγματικῶς δὲ, καθὼς εἶδομεν προηγουμένως, ἀρκεῖ οἱ 3 τύποι μιᾶς ομάδος μόνον νὰ εὐρεθοῦν γεωμετρικῶς, διὰ νὰ ἔπωνται ὡς ἀναγκαῖαι συνέπειαι καὶ οἱ τύποι τῶν ἄλλων ομάδων. Καὶ αἱ ἄλλαι ὅμως ομάδες, καθὼς καὶ ἄλλοι τύποι, τοὺς ὁποίους θὰ εὐρωμεν εἰς τὰ ἐπόμενα, χρησιμεύουν, διὰ νὰ εὐκολύνεται ἡ λύσις τῶν προβλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Πόλωσις τῶν προηγουμένων τύπων.

12. Πολικοὶ τύποι τῆς α' ομάδος. Ἀπὸ τοὺς τύπους τῶν τριῶν προηγουμένων ομάδων εἰμποροῦμεν νὰ εἰσάγωμεν ἄλλας ομάδας τύπων, μὲ γωνίας, ὅπου αἱ πρῶται περιέχουν πλευράς, καὶ πλευράς, ὅπου γωνίας. Αὐτὸ γίνεται εὐκόλα μὲ τὰς σχέσεις τῶν πολικῶν τριγώνων. Διότι, ἂν ἐφαρμόσωμεν κατὰ πρῶτον τοὺς τύπους τῆς α' ομάδος εἰς τὸ πολικὸν τρίγωνον Α'ΒΓ' τοῦ δοθέντος σφαιρικοῦ τριγώνου, θὰ ἔχωμεν:

$$\sigma\upsilon\nu\alpha' = \sigma\upsilon\nu\beta' \sigma\upsilon\nu\gamma' + \eta\mu\beta' \eta\mu\gamma' \sigma\upsilon\nu\alpha', \text{ κλπ.}$$

καὶ ἐπειδὴ εἶναι

$$\alpha' = \pi - A, \quad \beta' = \pi - B, \quad \gamma' = \pi - \Gamma,$$

$$A' = \pi - \alpha, \quad B' = \pi - \beta, \quad \Gamma' = \pi - \gamma,$$

οἱ τύποι γίνονται:

$$\sigma\upsilon\nu(\pi - A) = \sigma\upsilon\nu(\pi - B) \sigma\upsilon\nu(\pi - \Gamma) + \eta\mu(\pi - B) \eta\mu(\pi - \Gamma) \sigma\upsilon\nu(\pi - \alpha)$$

κλπ. δηλ. — $\sigma\upsilon\nu A = \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma - \eta\mu B \eta\mu \Gamma \sigma\upsilon\nu \alpha$ κλπ. ἢ καί:

$$(5) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sigma\upsilon\nu A = -\sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma + \eta\mu B \eta\mu \Gamma \sigma\upsilon\nu \alpha \\ \sigma\upsilon\nu B = -\sigma\upsilon\nu \Gamma \sigma\upsilon\nu A + \eta\mu \Gamma \eta\mu A \sigma\upsilon\nu \beta \\ \sigma\upsilon\nu \Gamma = -\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B + \eta\mu A \eta\mu B \sigma\upsilon\nu \gamma. \end{array} \right.$$

Οἱ τύποι αὐτοὶ συνδέουν τώρα τὰς τρεῖς γωνίας Α, Β, Γ τοῦ τριγώνου πρὸς μίαν πλευρὰν (ὁ καθείς), δηλ. διαφέρουν ἀπὸ τοὺς τύπους τῆς α' ομάδος κατὰ τὴν τροπὴν τῶν πλευρῶν εἰς γωνίας καὶ τῶν γωνιῶν εἰς πλευράς (καὶ κατὰ τὸ σημεῖον τοῦ α' ὄρου τοῦ β' μέλους): ἐπειδὴ δὲ εὐρέθησαν ἀπὸ τὸ πολικὸν τρίγωνον τοῦ δοθέντος, λέγονται πολικοὶ τύποι τῶν τύπων τῆς α' ομάδος.

13. Πολικοὶ τύποι τῆς β' ομάδος. Ἐν εἰς τοὺς τύπους τῆς β' ομάδος διὰ τὸ πολικὸν τρίγωνον:

$$\frac{\eta\mu\alpha'}{\eta\mu\alpha} = \frac{\eta\mu\beta'}{\eta\mu\beta} = \frac{\eta\mu\gamma'}{\eta\mu\Gamma}$$

θέσωμεν τὰς προηγουμένας τιμὰς τῶν α', β', γ', Α', Β', Γ' διὰ τῶν στοιχείων τοῦ δοθέντος τριγώνου εὐρίσκωμεν:

$$\frac{\eta\mu\Lambda}{\eta\mu\alpha} = \frac{\eta\mu\beta}{\eta\mu\beta} = \frac{\eta\mu\Gamma'}{\eta\mu\gamma}$$

δηλ. πάλιν τοὺς ἰδίους τύπους· ὥστε οἱ τύποι τῆς β' ομάδος εἶναι *πολικοὶ ἑαυτῶν*.

14. *Πολικοὶ τύποι τῆς γ' ομάδος.* Ἄν εἰς τὸν τύπον

$$\eta\alpha' \text{ συν} B' = \text{συν} \beta' \eta\mu\gamma' - \eta\mu\beta' \text{ συν} \gamma' \text{ συν} A'$$

θέσωμεν $\alpha' = \pi - A, \beta' = \pi - \beta$ κλπ. λαμβάνομεν:

$$\eta\mu(\pi - A) \text{ συν}(\pi - \beta) = \\ = \text{συν}(\pi - B) \eta\mu(\pi - \Gamma) - \eta\mu(\pi - B) \text{ συν}(\pi - \Gamma) \text{ συν}(\pi - \alpha),$$

δηλαδή ἔχομεν τοὺς ὅ *πολικούς* τύπους τῆς γ' ομάδος:

$$(6) \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu A \text{ συν} \beta = \text{συν} B \eta\mu \Gamma + \eta\mu B \text{ συν} \Gamma \text{ συν} \alpha \\ \eta\mu B \text{ συν} \gamma = \text{συν} \Gamma \eta\mu A + \eta\mu \Gamma \text{ συν} A \text{ συν} \beta \\ \eta\mu \Gamma \text{ συν} \alpha = \text{συν} A \eta\mu B + \eta\mu A \text{ συν} B \text{ συν} \gamma \\ \eta\mu A \text{ συν} \gamma = \text{συν} \Gamma \eta\mu B + \eta\mu \Gamma \text{ συν} B \text{ συν} \alpha \\ \eta\mu B \text{ συν} \alpha = \text{συν} A \eta\mu \Gamma + \eta\mu A \text{ συν} \Gamma \text{ συν} \beta \\ \eta\mu \Gamma \text{ συν} \beta = \text{συν} B \eta\mu A + \eta\mu B \text{ συν} A \text{ συν} \gamma. \end{array} \right.$$

Παρατήρησις. Εἰμποροῦμεν νὰ εὑρωμεν τοὺς τύπους αὐτοὺς καὶ μὲ ἄλλον τρόπον· ὁ ἔκτος π. χ. εὑρίσκεται, ἂν εἰς τὸν τύπον τῆς γ' ομάδος:

$$\eta\mu \alpha \text{ συν} B = \text{συν} \beta \cdot \eta\mu \gamma - \eta\mu \beta \text{ συν} \gamma \text{ συν} A$$

θέσωμεν ἀντὶ $\eta\mu \alpha, \eta\mu \beta, \eta\mu \gamma$ τὰ ἀνάλογά των ποσὰ $\eta\mu A, \eta\mu B, \eta\mu \Gamma$. Ἐπίσης δὲ καὶ οἱ λοιποὶ.

15. *Πολικοὶ τύποι τῆς ομάδος (4).* Μὲ τὴν πολικὴν τροπὴν τῆς ομάδος (4) ἢ καὶ ἀπὸ τοὺς (6) μὲ τὴν ἀπαλοιφὴν εἰς τὰς μέλη τῶν ἡμιτόνιων τῶν γωνιῶν ἀπὸ τοὺς τύπους τῆς (2) (δηλ.

$\eta\mu A = \frac{\eta\mu B}{\eta\mu \beta} \eta\mu \alpha$ κλπ.) εὑρίσκομεν καὶ τὴν ἐξῆς ομάδα τύπων:

$$(7) \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu \alpha \sigma\phi\beta = \sigma\phi B \eta\mu \Gamma + \text{συν} \Gamma \text{ συν} \alpha + \\ \eta\mu \beta \sigma\phi \alpha = \sigma\phi A \eta\mu \Gamma + \text{συν} \Gamma \text{ συν} \beta + \\ \eta\mu \beta \sigma\phi \gamma = \sigma\phi \Gamma \eta\mu A + \text{συν} A \text{ συν} \beta \\ \eta\mu \gamma \sigma\phi \beta = \sigma\phi B \eta\mu A + \text{συν} A \text{ συν} \gamma \\ \eta\mu \gamma \sigma\phi \alpha = \sigma\phi A \eta\mu B + \text{συν} B \text{ συν} \gamma \\ \eta\mu \alpha \sigma\phi \gamma = \sigma\phi \Gamma \eta\mu B + \text{συν} B \text{ συν} \alpha. \end{array} \right.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Τύποι τῶν ὀρθογωνίων καὶ τῶν ὀρθοπλευρῶν
τριγώνων.

α') Ὄρθογώνια τρίγωνα.

16. Ἐάν εἰς τὸν τύπον συνα = συνβσυνγ + ημβημγσυνΑ τῆς
α' ομάδος ὑποθέσωμεν $A = 90^\circ$, εὐρίσκομεν συνα = συνβσυνγ (8).
δηλ. **Τὸ συνημίτονον τῆς ὑποτείνουσῆς τοῦ ὀρθογωνίου**
τριγώνου εἶναι ἴσον μὲ τὸ γινόμενον τῶν συνημιτόνων τῶν
καθέτων πλευρῶν.

17. Ἐάν εἰς τὰς ἀναλογίας $\frac{\eta\mu\alpha}{\eta\mu\Lambda} = \frac{\eta\mu\beta}{\eta\mu\B} = \frac{\eta\mu\gamma}{\eta\mu\Gamma}$, θέσωμεν
 $A = 90^\circ$, εὐρίσκομεν:
(9) $\eta\mu\beta = \eta\mu\alpha\eta\mu\B$, $\eta\mu\gamma = \eta\mu\alpha\eta\mu\Gamma$, δηλ. **Τὸ ἡμίτονον ἐκάστης κα-**
θέτου πλευρᾶς τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι ἴσον μὲ
τὸ γινόμενον τοῦ ἡμιτόνου τῆς ὑποτείνουσῆς ἐπὶ τὸ ἡμί-
τονον τῆς ἀντικρυνῆς γωνίας. (Ἐντελῶς ὁμοίως, ὅπως καὶ εἰς
τὰ εὐθύγραμμα τρίγωνα, ὅπου ὅμως ἀντὶ ἡμιτόνων τῶν πλευ-
ρῶν ἔχομεν τὰς ἰδίας τὰς πλευράς).

18. Ἐάν εἰς τὸν τύπον συνΑ = -συνΒσυνΓ + ημβημΓ συνα
θέσωμεν $A = 90^\circ$, εὐρίσκομεν : (10) συνα = σφΒ·σφΓ, δηλ.
Τὸ συνημίτονον τῆς ὑποτείνουσῆς ὀρθογωνίου τριγώνου
εἶναι ἴσον μὲ τὸ γινόμενον τῶν συνεφαπτομένων τῶν παρα-
κειμένων γωνιῶν.

19. Ἐν γένει ἀπὸ τοὺς διαφόρους τύπους διὰ τὰ τυχόντα
σφαιρικά τρίγωνα εὐρίσκομεν ἀπλουστέρους διὰ τὰ ὀρθογώνια,
ἂν ὑποθέσωμεν τὴν μίαν γωνίαν ὀρθήν. Τοιοῦτοι τύποι εἶναι
οἱ ἑξῆς :

$$\begin{aligned} \epsilon\phi\beta &= \epsilon\phi\alpha\sigma\upsilon\eta\B, & \epsilon\phi\beta &= \eta\mu\beta\epsilon\phi\Gamma, \\ \epsilon\phi\gamma &= \epsilon\phi\alpha\sigma\upsilon\eta\Gamma, & \epsilon\phi\gamma &= \eta\mu\beta\epsilon\phi\B, \\ (11) \quad \sigma\upsilon\eta\B &= \sigma\upsilon\eta\beta\eta\mu\Gamma, & \sigma\upsilon\eta\Gamma &= \sigma\upsilon\eta\gamma\eta\mu\B \text{ κτλ.} \end{aligned}$$

Παρατήρησις. Πρὸς εὐκολωτέραν εὐρεσιν τῶν τύπων τούτων
χρησιμεύουν οἱ ἑξῆς δύο **μνημονικοὶ κανόνες** τοῦ Neper.

Θεωροῦμεν διὰ τὸ στοιχεῖον α ὡς **προσκειμένα** μὲν στοι-
χεῖα τὰ Β, Γ, ὡς **ἀντικείμενα** δὲ τὰ $\frac{\pi}{2} - \beta$, $\frac{\pi}{2} - \gamma$ (καὶ διὰ κυ-
κλικῆς τροπῆς εὐρίσκομεν καὶ τ' ἀντίστοιχα εἰς τὰ β καὶ γ).

Τότε : Κανὼν α' : Τὸ *συνημίτονον* τοῦ *τυχόντιος* στοιχείου (πλὴν τῆς ὀρθῆς γωνίας) εἶναι ἴσον μὲ τὸ *γινόμενον* τῶν *ἡμιτόνων* τῶν ἀντικειμένων του στοιχείων.

Κανὼν β' : Τὸ *συνημίτονον* τοῦ *τυχόντιος* στοιχείου εἶναι ἴσον μὲ τὸ *γινόμενον* τῶν *συνεφαπτομένων* τῶν *προσκειμένων* στοιχείων.

β') Ὀρθόπλευρα τρίγωνα.

20. Ἄν εἰς ἓν σφαιρικὸν τρίγωνον ἔχωμεν $\alpha = 90^\circ$, τὸ τρίγωνον λέγεται *ὀρθόπλευρον* καὶ οἱ γενικοὶ τύποι μᾶς δίδουν τότε τοὺς ἑξῆς :

$$(12) \begin{cases} \text{συν}A = -\text{συν}B\text{συν}G, \text{ἡμ}B = \text{ἡμ}A\text{ἡμ}B, \text{ἡμ}G = \text{ἡμ}A\text{ἡμ}G, \\ \text{εφ}B = -\text{εφ}A\text{συν}B, \text{εφ}G = -\text{εφ}A\text{συν}G, \text{εφ}B = \text{ἡμ}G\text{εφ}B, \\ \text{εφ}G = \text{ἡμ}B\text{εφ}G, \text{συν}A = -\text{σφβσφγ}, \text{συν}B = \text{συν}B\text{ἡμ}G, \text{συν}G = \\ \text{κ.τ.λ.} \qquad \qquad \qquad = \text{συν}G\text{ἡμ}B. \end{cases}$$

Οἱ τύποι δὲ αὐτοὶ εἶναι προφανῶς πολικοὶ τῶν τύπων τοῦ ὀρθογώνιου τριγώνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Μετασχηματισμὸς τῶν τύπων εἰς ὑπολογιστοὺς
διὰ τῶν λογαρίθμων.

Α'). Ὑπολογισμὸς τῆς πλευρᾶς τοῦ α' μέλους
εἰς τοὺς τύπους (1).

21. Τὸν τύπον: $\text{συν}A = \text{συν}B\text{συν}G + \text{ἡμ}B\text{ἡμ}G\text{συν}A$
τὸν γράφομεν ὡς ἑξῆς:

$$\text{συν}A = \text{συν}B(\text{συν}G + \text{εφ}B\text{ἡμ}G\text{συν}A),$$

ἔπειτα θέτομεν: $\text{εφ}B\text{συν}A = \omega$, ὅπου ω εἶναι μία βοηθητικὴ γωνία, ὑπολογιζομένη λογαριθμικῶς ἀπὸ τὴν σχέσιν αὐτήν· τότε ὁ τύπος μᾶς γίνεται:

$$\text{συν}A = \text{συν}B(\text{συν}G + \text{ἡμ}G\omega) = \text{συν}B \left(\frac{\text{συν}G\text{συν}\omega + \text{ἡμ}G\text{ἡμ}\omega}{\text{συν}\omega} \right)$$

$$\text{ἢ καὶ } \text{συν}A = \frac{\text{συν}B\text{σιν}(\omega - \gamma)}{\text{συν}\omega},$$

δηλ. ἔχομεν τρεῖς τύπους ὑπολογιστοὺς διὰ λογαρίθμων:

$$(13) \text{ συν} \alpha = \frac{\text{συν} \beta \text{ συν}(\omega_3 - \gamma)}{\text{συν} \omega_3}, \quad \text{συν} \beta = \frac{\text{συν} \gamma \cdot \text{συν}(\omega_1 - \alpha)}{\text{συν} \omega_1},$$

$$\text{συν} \gamma = \frac{\text{συν} \alpha \cdot \text{συν}(\omega_2 - \beta)}{\text{συν} \omega_2}$$

(ὅπου: $\epsilon\phi\omega_3 = \epsilon\phi\beta \text{ συν} A$, $\epsilon\phi\omega_1 = \epsilon\phi\gamma \text{ συν} B$, $\epsilon\phi\omega_2 = \epsilon\phi\alpha \text{ συν} \Gamma$).

B') Ὑπολογισμὸς τῆς γωνίας τοῦ α' μέλους εἰς τοὺς τύπους (5).

22. Ὁ τύπος $\text{συν} A = -\text{συν} B \text{ συν} \Gamma + \eta\mu B \eta\mu \Gamma \text{ συν} \alpha$ γράφεται $\text{συν} A = \text{συν} B (-\text{συν} \Gamma + \epsilon\phi B \eta\mu \Gamma \text{ συν} \alpha)$ καὶ ἂν θέσωμεν ὁμοίως: $\epsilon\phi B \text{ συν} \alpha = \epsilon\phi \Omega_3$, εὐρίσκομεν:

$$\text{συν} A = \text{συν} B (-\text{συν} \Gamma + \epsilon\phi \Omega_3 \eta\mu \Gamma) =$$

$$= \text{συν} B \cdot \left(-\frac{\text{συν} \Gamma \text{ συν} \Omega_3 + \eta\mu \Omega_3 \eta\mu \Gamma}{\text{συν} \Omega_3} \right),$$

δηλ. $\text{συν} A = -\frac{\text{συν} B \cdot \text{συν}(\Omega_3 + \Gamma)}{\text{συν} \Omega_3}$ καὶ ὁμοίως:

$$\text{συν} B = -\frac{\text{συν} \Gamma \text{ συν}(\Omega_1 + A)}{\text{συν} \Omega_1}, \quad \text{συν} \Gamma = -\frac{\text{συν} \alpha \text{ συν}(\Omega_2 + B)}{\text{συν} \Omega_2}. \quad (14)$$

Οἱ τρεῖς δὲ αὐτοὶ τύποι εἶναι προφανῶς καὶ οἱ πολικοὶ τῶν τριῶν προηγουμένων (13). (Τὰ $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ τρέπονται εἰς τὰ $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$).

Γ') Ὑπολογισμὸς τῶν γωνιῶν ἀπὸ τὰς πλευρὰς.

23. Ἐχομεν κατὰ πρῶτον λύοντες τὸν α' τύπον (1):

$$\text{συν} A = \frac{\text{συν} \alpha - \text{συν} \beta \text{ σιν} \gamma}{\eta\mu \beta \eta\mu \gamma},$$

διὰ νὰ κάμωμεν δὲ τὸν τύπον αὐτὸν (καὶ τοὺς δύο ἄλλους ὁμοίους τοῦ λογιστὸν διὰ λογαρίθμων, προχωροῦμεν ὡς ἐξῆς. Ἐχομεν:

$$1 - \text{συν} A = 2\eta\mu^2 \frac{A}{2} = 1 - \frac{\text{συν} \alpha - \text{συν} \beta \text{ σιν} \gamma}{\eta\mu \beta \eta\mu \gamma} = \frac{\eta\mu \beta \eta\mu \gamma - \text{συν} \alpha + \text{συν} \beta \text{ σιν} \gamma}{\eta\mu \beta \eta\mu \gamma},$$

$$\text{δηλ. } 2\eta\mu^2 \frac{A}{2} = \frac{\text{συν}(\beta - \gamma) - \text{συν} \alpha}{\eta\mu \beta \eta\mu \gamma} = \frac{2\eta\mu \left(\frac{\alpha + \beta - \gamma}{2} \right) \eta\mu \left(\frac{\alpha + \gamma - \beta}{2} \right)}{\eta\mu \beta \eta\mu \gamma},$$

$$\eta \text{ καὶ } \eta\mu \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau - \beta)\eta\mu(\tau - \gamma)}{\eta\mu \beta \cdot \eta\mu \gamma}} \quad (\delta\text{που } \tau = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2}).$$

καὶ ὁμοίως (διὰ κυκλικῆς τροπῆς):

$$\eta\mu \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau - \gamma)\eta\mu(\tau - \alpha)}{\eta\mu \gamma \cdot \eta\mu \alpha}}, \quad \eta\mu \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau - \alpha)\eta\mu(\tau - \beta)}{\eta\mu \alpha \cdot \eta\mu \beta}}. \quad (15)$$

(Αἱ ρίζαι θὰ εἶναι θετικές, διότι αἱ γωνίαι $\frac{A}{2}$, $\frac{B}{2}$, $\frac{\Gamma}{2}$, εἶναι ὀξείαι).

24. Ὁμοίως εὐρίσκομεν καὶ τύπους διὰ τὰ $\text{συν} \frac{A}{2}$, $\text{συν} \frac{B}{2}$, $\text{συν} \frac{\Gamma}{2}$ μὲ τὴν ἐξῆς σειρὰν πράξεων:

$$1 + \text{συν} A \equiv 2 \text{συν}^2 \frac{A}{2} = 1 + \frac{\text{συνα} - \text{συν} \beta \text{συν} \gamma}{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma} = \frac{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma + \text{συνα} - \text{συν} \beta \text{συν} \gamma}{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma}$$

$$= \frac{\text{συνα} - \text{συν}(\beta + \gamma)}{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma} = \frac{2\eta\mu\left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\beta + \gamma - \alpha}{2}\right)}{\eta\mu^2\eta\mu\gamma} = \frac{2\eta\mu\tau\eta\mu(\tau - \alpha)}{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma},$$

ὥστε :

$$\left. \begin{aligned} \text{συν} \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau - \alpha)}{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma}}, & \text{συν} \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau - \beta)}{\eta\mu\gamma\eta\mu\alpha}}, \\ \text{συν} \frac{\Gamma}{2} &= \sqrt{\frac{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau - \gamma)}{\eta\mu\alpha\eta\mu\beta}} \end{aligned} \right\} (16)$$

(ἔχουν δὲ καὶ πάλιν τὰ ριζικά τὸ θετικὸν σημεῖον). Καὶ ἂν διαιρέσωμεν τὰς (15) καὶ (16) κατὰ μέλη, εὐρίσκομεν :

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon\varphi \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau - \beta)\eta\mu(\tau - \gamma)}{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau - \alpha)}}, & \varepsilon\varphi \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau - \gamma)\eta\mu(\tau - \alpha)}{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau - \beta)}}, \\ \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} &= \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau - \alpha)\eta\mu(\tau - \beta)}{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau - \gamma)}} \end{aligned} \right\} (17)$$

Δ') Ὑπολογισμὸς τῶν πλευρῶν ἀπὸ τὰς γωνίας.

25. Λύομεν τὸν α' τύπον τῆς πολικῆς ομάδος (5) πρὸς συνα: $\text{συνα} = \frac{\text{συν} A + \text{συν} B \text{συν} \Gamma}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma}$ καὶ ἔπειτα προχωροῦμεν ὅπως καὶ πρὶν:

$$2\eta\mu^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{\text{συν} A + \text{συν} B \text{συν} \Gamma}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma} = \frac{\eta\mu B \eta\mu \Gamma - \text{συν} A - \text{συν} B \text{συν} \Gamma}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma} =$$

$$= - \frac{\text{συν} A + \text{συν}(B + \Gamma)}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma} = -2 \frac{\text{συν}\left(\frac{A + B + \Gamma}{2}\right)\text{συν}\left(\frac{B + \Gamma - A}{2}\right)}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma}$$

Βλέπομεν λοιπόν, ὅτι ἐδῶ παρουσιάζεται τὸ ἡμίθροισμα $\frac{A + B + \Gamma}{2}$ τῶν γωνιῶν, καθὼς εἰς τοὺς προηγουμένους τύπους τὸ ἡμίθροισμα $\frac{\alpha + \beta + \gamma}{2}$ τῶν πλευρῶν. Ὅπως δὲ ἐκεῖ ἐξεφράσαμε τοὺς τύπους συντομώτερον μὲ τὴν εἰσαγωγὴν τῆς ἡμιπεριμέτρου $\tau = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2}$ τοῦ σφαιρικοῦ τριγώνου, οὕτω καὶ ἐδῶ θὰ εἰσαγάγωμεν πρὸς συντόμωσιν τῶν τύπων τὴν σφαιρικὴν ὑπερο-

χών 2E, δηλ. θα λάβωμεν ὑπ' ὄψιν μας, ὅτι

$$\frac{A+B+\Gamma}{2} = E + \frac{\pi}{2} \cdot \text{τότε εἶναι καί :}$$

$$\frac{B+\Gamma-A}{2} = \frac{\pi}{2} - (A-E), \quad \frac{\Gamma+A-B}{2} = \frac{\pi}{2} - (B-E), \quad \frac{A+B-\Gamma}{2} = \frac{\pi}{2} - (\Gamma-E) \cdot \text{ὁ προηγούμενος λοιπὸν τύπος γίνεται :}$$

$$2 \eta\mu^2 \frac{\alpha}{2} = -2 \frac{\text{συν}\left(E + \frac{\pi}{2}\right) \text{συν}\left(\frac{\pi}{2} - (A-E)\right)}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma} = \frac{\eta\mu E \eta\mu (A-E)}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma}$$

Ὡστε ἔχομεν $\eta\mu \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu (A-E)}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma}}$

26. Καθ' ὅμοιον τρόπον, κατασκευάζοντες δηλ. τὸ ἄθροισμα $1 + \text{συνα} = 2 \text{συν}^2 \frac{\alpha}{2}$, εὐρίσκομεν καὶ τὸ $\text{συν} \frac{\alpha}{2}$.

Ἐχομεν δηλ. οὕτω τοὺς ἐξῆς 9 τύπους (μὲ τὰ ριζικά ὅλα θετικά):

$$(18) \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu (A-E)}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma}}, \quad \text{συν} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu (B-E) \eta\mu (\Gamma-E)}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma}}, \\ \quad \epsilon\varphi \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu (A-E)}{\eta\mu (B-E) \eta\mu (\Gamma-E)}}, \\ \eta\mu \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu (B-E)}{\eta\mu \Gamma \eta\mu A}}, \quad \text{συν} \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu (\Gamma-E) \eta\mu (A-E)}{\eta\mu \Gamma \eta\mu A}}, \\ \quad \epsilon\varphi \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu (B-E)}{\eta\mu (\Gamma-E) \eta\mu (A-E)}}, \\ \eta\mu \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu (\Gamma-E)}{\eta\mu A \eta\mu B}}, \quad \text{συν} \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu (A-E) \eta\mu (B-E)}{\eta\mu A \eta\mu B}}, \\ \quad \epsilon\varphi \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu (\Gamma-E)}{\eta\mu (A-E) \eta\mu (B-E)}}. \end{array} \right.$$

ΜΕΡΟΣ Β΄.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Τύποι ἀναλογιῶν.

A') Ἀναλογίαι τῶν ἐφαπτομένων.

27. Ἀπὸ τὸν εὐρεθέντα τύπον: $\frac{\eta\mu A}{\eta\mu B} = \frac{\eta\mu\alpha}{\eta\mu\beta}$ ἔπεται :

$$\frac{\eta\mu A + \eta\mu B}{\eta\mu A - \eta\mu B} = \frac{\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta}{\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta}, \quad \text{ἢ καὶ} \quad \frac{2\eta\mu \frac{1}{2}(A+B) \text{ συν } \frac{1}{2}(A-B)}{2\eta\mu \frac{1}{2}(A-B) \text{ συν } \frac{1}{2}(A+B)} =$$

$$= \frac{2\eta\mu \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \text{ συν } \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{2\eta\mu \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \text{ συν } \frac{1}{2}(\alpha + \beta)}, \quad \text{δηλ.} \quad \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A+B) \quad \varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha + \beta)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A-B) \quad \varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}$$

Ἔχομεν λοιπὸν καὶ τοὺς ἑξῆς τύπους :

$$(19) \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A+B)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A-B)} = \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha + \beta)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}, & \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(B+\Gamma)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(B-\Gamma)} = \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\beta + \gamma)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\beta - \gamma)}, \\ \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\Gamma + A)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\Gamma - A)} = \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\gamma + \alpha)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\gamma - \alpha)}. \end{array} \right.$$

Οἱ τύποι αὐτοὶ εἶναι ὅμοιοι μὲ τοὺς ἀντιστοίχους τῆς **Εὐθύγυρ. Τριγωνομετρίας**, περιέχουν ὅμως ἐφαπτομένας καὶ εἰς τὰ δεύτερα μέλη τῶν.

28. *Παρατήρησις.* Ἀπὸ τοὺς τύπους αὐτοὺς συνάγομεν καὶ τὴν ἑξῆς πρότασιν. *Εἰς κάθε σφαιρικὸν τρίγωνον τὸ ἄθροισμα δύο πλευρῶν καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀντικρυνῶν τῶν γωνιῶν ἢ εἶναι καὶ τὰ δύο συγχρόνως μεγαλύτερα ἀπὸ δύο ὀρθὰς ἢ καὶ τὰ δύο συγχρόνως μικρότερα ἀπὸ 2 ὀρθὰς.*

B') 'Αναλογίαι τοῦ Delambre ἢ τοῦ Gauss.

29. Ὁ γνωστός τύπος :

$$\eta\mu\frac{A+B}{2} = \eta\mu\frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu\frac{B}{2} + \sigma\upsilon\nu\frac{A}{2} \eta\mu\frac{B}{2},$$

ὅν τεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν ἡμιτόνων καὶ τῶν συνημιτόνων τοῦ β' μέλους ἀπὸ τοὺς τύπους (15) καὶ (16), γίνεται :

$$\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sqrt{\frac{\eta\mu^2(\tau-\beta)\eta\mu\tau\eta\mu(\tau-\gamma)}{\eta\mu^2\gamma\eta\mu\alpha\eta\mu\beta}} + \sqrt{\frac{\eta\mu^2(\tau-\alpha)\eta\mu\tau\eta\mu(\tau-\gamma)}{\eta\mu^2\gamma\eta\mu\alpha\eta\mu\beta}},$$

$$\begin{aligned} \text{ἢ καὶ : } \eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) &= \frac{1}{\eta\mu\gamma} \sqrt{\frac{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau-\gamma)}{\eta\mu\alpha\eta\mu\beta}} \cdot (\eta\mu(\tau-\beta) + \eta\mu(\tau-\alpha)) = \\ &= \frac{1}{\eta\mu\gamma} \sigma\upsilon\nu\frac{\Gamma}{2} (\eta\mu(\tau-\alpha) + \eta\mu(\tau-\beta)) = \frac{2\eta\mu\left(\frac{2\tau-\alpha-\beta}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{2\eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)} \sigma\upsilon\nu\frac{\Gamma}{2}, \end{aligned}$$

$$\text{δηλαδή : } \eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)} \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \text{ ὥστε ἔχομεν}$$

$$\text{τὴν ἀναλογίαν: } \frac{\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)} =$$

Ἐὰν δὲ ἐφαρμοσῶμεν τοὺς ἰδίους μετασχηματισμοὺς καὶ εἰς τὰ $\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)$, $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)$, $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$ καὶ κάμωμεν καὶ τὴν κυκλικὴν τροπὴν τῶν γραμμάτων, εὐρίσκομεν τὸ ὅλον τοὺς ἐξῆς τύπους:

$$(20) \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)}, \\ \frac{\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right)}, \\ \frac{\eta\mu\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta-\gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Lambda}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta+\gamma}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\Lambda}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{2}\right)}, \\ \frac{\eta\mu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\beta-\gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Lambda}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\beta+\gamma}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\Lambda}{2}\right) \eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)}, \end{array} \right.$$

$$(20) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\eta\mu\left(\frac{\Gamma+\Lambda}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta}{2}\right)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma-\alpha}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)}, \quad \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma+\Lambda}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma+\alpha}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta}{2}\right)}, \\ \frac{\eta\mu\left(\frac{\Gamma-\Lambda}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta}{2}\right)} = \frac{\eta\mu\left(\frac{\gamma-\alpha}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)}, \quad \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma-\Lambda}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)} = \frac{\eta\mu\left(\frac{\gamma+\alpha}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)}. \end{array} \right.$$

Οἱ 12 αὐτοὶ τύποι λέγονται *ἀναλογίαι τοῦ Delambre ἢ τοῦ Gauss*.

Μνημονικὸς κανὼν. Οἱ 4 πρώτοι τύποι τοῦ Delambre εὐρίσκονται ὡς ἑξῆς :

α') "Ἄν εἰς τὸν α' τρέψωμεν τὸ Β εἰς $-B$, τὸ β εἰς $-\beta$, τὸ α εἰς $\pi-\alpha$ καὶ τὸ γ εἰς $\pi-\gamma$, παράγεται ὁ β' ὁ κάτωθεν τοῦ α'.

β') "Ἄν εἰς τὸν α' τρέψωμεν τὸ Β εἰς $-B$, τὸ Α εἰς $\pi-A$, τὸ Γ εἰς $\pi-\Gamma$ καὶ τὸ β εἰς $-\beta$, παράγεται ὁ γ' ὁ παραπλεύρως τοῦ α'.

γ') "Ἄν τέλος εἰς τὸν γ' τρέψωμεν τὸ Β εἰς $-B$ τὸ β εἰς $-\beta$, τὸ α εἰς $\pi-\alpha$ καὶ τὸ γ εἰς $\pi-\gamma$, παράγεται ὁ δ'.

Πρὸς εὐκολωτέραν δὲ ἀπομνημόνευσιν χρησιμεύουν καὶ αἱ ἑξῆς δύο παρατηρήσεις : 1) οἱ λόγοι οἱ ἔχοντες *γωνίας* ἔχουν τριγωνομετρικὰς γραμμὰς *ἐτερωνόμους*, οἱ δὲ λόγοι μὲ *πλευρὰς* ἔχουν τριγ. γραμμὰς *ὁμωνόμους*· καὶ 2) ὅπου τὸ ἔχον τὰς γωνίας μέλος ἔχει +, τὸ ἄλλο μέλος ἔχει ἀντιστοίχως *συνημίτονα* καὶ ὅπου ἔχει $-$, τὸ ἄλλο ἔχει *ἡμίτονα*.

Γ') Ἀναλογίαι τοῦ Napier (Νέπερ).

30. Αὐταὶ εὐρίσκονται ἀμέσως ἀπὸ τὰς προηγουμένας (20), ἂν τὰς διαιρέσωμεν καταλλήλως ἀνὰ δύο κατὰ μέλη (ὀριζοντίως καὶ κατακορύφως):

$$(21) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\epsilon\varphi\left(\frac{A+B}{2}\right)}{\sigma\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}, \quad \frac{\epsilon\varphi\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{\epsilon\varphi\left(\frac{\gamma}{2}\right)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)}, \\ \frac{\epsilon\varphi\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\sigma\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right)} = \frac{\eta\mu\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}, \quad \frac{\epsilon\varphi\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\epsilon\varphi\left(\frac{\gamma}{2}\right)} = \frac{\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)}. \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l}
 \text{εφ}\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right) = \frac{\text{συν}\left(\frac{\beta-\gamma}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{A}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{\beta-\gamma}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{A}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\Gamma+A}{2}\right) = \frac{\text{συν}\left(\frac{\gamma-\alpha}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{B}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\Gamma-A}{2}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{\gamma-\alpha}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{B}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right) = \frac{\text{συν}\left(\frac{\beta+\gamma}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{A}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\beta-\gamma}{2}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{\beta+\gamma}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{A}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\gamma+\alpha}{2}\right) = \frac{\text{συν}\left(\frac{\gamma-\alpha}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{B}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\beta}{2}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{\gamma+\alpha}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{B}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\beta+\gamma}{2}\right) = \frac{\text{συν}\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right)}{\text{εφ}\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \\
 \text{συν}\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{B-\Gamma}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\beta-\gamma}{2}\right) = \frac{\text{συν}\left(\frac{\Gamma-A}{2}\right)}{\text{εφ}\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \\
 \text{συν}\left(\frac{\Gamma-A}{2}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{\Gamma-A}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\text{συν}\left(\frac{\Gamma+A}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{B}{2}\right)} \\
 \text{εφ}\left(\frac{\beta}{2}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{\Gamma+A}{2}\right)}{\text{σφ}\left(\frac{B}{2}\right)}
 \end{array} \right\} (21)
 \end{array}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Τύποι τῆς περιμέτρου καὶ τῆς σφαιρικῆς ὑπεροχῆς.

A') Σχέσεις μεταξὺ τ καὶ E .

31. "Αν εἰς τὴν α' ἀπὸ τὰς ἀναλογίας τοῦ Delambre (20) θέσωμεν ἀντὶ $\frac{A+B}{2}$ τὸ ἴσον τοῦ $\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\Gamma}{2} - E\right)$, εὐρίσκομεν:

$$\frac{\text{συν}\left(\frac{\Gamma}{2} - E\right)}{\text{συν}\left(\frac{\Gamma}{2}\right)} = \frac{\text{συν}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\text{συν}\left(\frac{\gamma}{2}\right)}, \text{ ἔπομένως θὰ εἶναι καὶ}$$

$$\frac{\text{συν}\left(\frac{\Gamma}{2} - E\right) - \text{συν}\left(\frac{\Gamma}{2}\right)}{\text{συν}\left(\frac{\Gamma}{2} - E\right) + \text{συν}\left(\frac{\Gamma}{2}\right)} = \frac{\text{συν}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) - \text{συν}\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{\text{συν}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) + \text{συν}\left(\frac{\gamma}{2}\right)}, \quad \eta \text{ καί:}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{2\eta\mu \frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma}{2} - E + \frac{\Gamma}{2}\right) \eta\mu \frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma}{2} - E - \frac{\Gamma}{2}\right)}{2\sigma\upsilon\upsilon \frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma}{2} - E + \frac{\Gamma}{2}\right) \sigma\upsilon\upsilon \frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma}{2} - E - \frac{\Gamma}{2}\right)} \\
 & = \frac{2\eta\mu\left(\frac{\alpha-\beta+\gamma}{4}\right) \eta\mu\left(\frac{\alpha-\beta-\gamma}{4}\right)}{2\sigma\upsilon\upsilon\left(\frac{\alpha-\beta+\gamma}{4}\right) \sigma\upsilon\upsilon\left(\frac{\alpha-\beta-\gamma}{4}\right)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{δηλαδή: } \varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right) \\ & \text{καὶ ἔπομένως καὶ } \varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{A-E}{2}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right) \\ & \varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{B-E}{2}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right) \end{aligned} \quad (22)$$

Ὁμοίως ἀπὸ τὸν β' τύπον τοῦ Delambre εὐρίσκομεν :

$$\begin{aligned} & \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}-E\right) - \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)} \\ & \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}-E\right) + \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)} \\ \text{ἢ καὶ } & \frac{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{E}{2}\right)}{2\eta\mu\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{E}{2}\right)} = \frac{-2\eta\mu\left(\frac{\alpha+\beta+\gamma}{4}\right)\eta\mu\left(\frac{\alpha+\beta-\gamma}{4}\right)}{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha+\beta+\gamma}{4}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha+\beta-\gamma}{4}\right)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{δηλαδή: } \varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)\sigma\varphi\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right) \\ & \text{καὶ ἔπομένως καὶ: } \varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)\sigma\varphi\left(\frac{A-E}{2}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right) \\ & \varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)\sigma\varphi\left(\frac{B-E}{2}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right) \end{aligned} \quad (23)$$

32. Ἄν διαιρέσωμεν κάθε τύπον ἀπὸ τοὺς (22) μὲ τὸν ἀντίστοιχόν του εἰς τοὺς (23), εὐρίσκομεν :

$$\begin{aligned} \varepsilon\varphi\left(\frac{A-E}{2}\right) &= \sqrt{\frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right)}}, \quad \varepsilon\varphi\left(\frac{B-E}{2}\right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right)}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right)}} \\ \varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right) &= \sqrt{\frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right)}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)}} \end{aligned} \quad (24)$$

33. Ὁ πολλαπλασιασμὸς ἑνὸς τυχόντος ἀπὸ τοὺς τύπους (22) ἐπὶ τὸν ἀντίστοιχόν του εἰς τοὺς (23) δίδει :

$$(25) \quad \varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right) = \sqrt{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)}.$$

Ὁ τύπος αὐτὸς ἐκφράζει τὴν σφαιρικὴν ὑπεροχὴν (ἔπομένως καὶ τὸ ἔμβαδὸν) τοῦ σφαιροτριγώνου (ἐπὶ τῆς σφαίρας μὲ ἀκτῖνα τὴν μονάδα) διὰ τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν γνωστὸν τύπον τῆς Εὐθυγράμ. Τριγωνομετρίας τὸν δίδοντα τὸ ἔμβαδὸν τοῦ τριγώνου διὰ τῶν πλευρῶν :

$$\varepsilon = \sqrt{\tau(\tau-a)(\tau-b)(\tau-\gamma)}$$

34. "Αν πολλαπλασιάσωμεν τώρα τὰς 3 ἑξισώσεις (24) κατὰ μέλη καὶ τὸ γινόμενόν των διαιρέσωμεν διὰ τῆς (25), θὰ εὔρωμεν τὸν ἑξῆς τύπον :

$$(26) \quad \sqrt{\sigma\varphi\left(\frac{E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{A-E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{B-E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right)} = \sigma\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)$$

Ὁ τύπος αὐτὸς εἴμπορεῖ νὰ εὔρεθῇ καὶ διὰ πολώσεως ἀπὸ τὸν (25) καὶ δίδει ἀντιστρόφως τὴν περίμετρον τ διὰ τῶν γωνιῶν τοῦ τριγώνου (ἐπὶ τῆς σφαιράς μετὰ ἀκτῖνα τὴν μονάδα).

B'). Πολιὴ ἀναλλοίωτος τοῦ Lhuillier.

35. "Αν τὴν (25) τὴν πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ $\sigma\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)$, τὴν (26) ἐπὶ $\varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)$ καὶ ἑξισώσωμεν τὰς δύο τιμὰς τοῦ γινομένου $\sigma\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)$, εὔρισκομεν:

$$(27) \quad \sigma\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-a}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-b}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right) = \\ = \varepsilon\varphi\left(\frac{E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{A-E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{B-E}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right) = 1,$$

δηλ. τὴν λεγομένην *παράστασιν τοῦ Lhuillier*, ἔχουσαν οἷτω δύο μορφάς, τὴν μίαν μετὰ τὰς πλευρὰς καὶ τὴν ἄλλην μετὰ τὰς γωνίας τοῦ τριγώνου.

36. Τέλος, ἂν τοὺς τύπους (23) τοὺς διαιρέσωμεν κατὰ σειρὰν διὰ $\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)$ καὶ θέσωμεν ἔπειτα ἀντὶ $\frac{L}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)} = \sigma\varphi\left(\frac{\tau}{2}\right)$ τὴν τιμὴν του ἀπὸ τὴν ἑξίσωσιν (26), εὔρισκομεν καὶ τοὺς ἑξῆς τύπους:

$$(28) \quad \left\{ \begin{array}{l} \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-a}{2}\right) = \frac{L}{\varepsilon\varphi\left(\frac{A-E}{2}\right)}, \quad \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-b}{2}\right) = \frac{L}{\varepsilon\varphi\left(\frac{B-E}{2}\right)}, \\ \varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right) = \frac{L}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right)} \end{array} \right.$$

(τοῦ L ἔχοντος τὴν β' ἔκφρασιν (27)), οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ πολικοὶ τῶν (24), δυναμένων νὰ γραφοῦν καὶ ὡς ἑξῆς :

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{A-E}{2}\right) = \frac{L}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-a}{2}\right)}, \quad \varepsilon\varphi\left(\frac{B-E}{2}\right) = \frac{L}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-b}{2}\right)}, \quad \varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma-E}{2}\right) = \frac{L}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)}$$

τοῦ L ἔχοντος τώρα τὴν α' ἔκφρασιν (27).

37. "Αν θεωρήσωμεν καὶ τὸ πολικὸν τρίγωνον τοῦ δοθέντος, ἐπειδὴ εὐρίσκομεν ἀμέσως $\tau' = \pi - E$ καὶ $E' = \pi - \tau$, βλέπομεν, ὅτι ἡ α' μορφή τῆς παραστάσεως τοῦ Lhuillier (27) τρέπεται εἰς τὴν $\sigma\phi\left(\frac{E'}{2}\right)\sigma\phi\left(\frac{A' - \beta'}{2}\right)\sigma\phi\left(\frac{B' - E'}{2}\right)\sigma\phi\left(\frac{\Gamma' - \tau'}{2}\right)$, καὶ ἡ β' εἰς τὴν $\sigma\phi\left(\frac{\tau'}{2}\right)\sigma\phi\left(\frac{\tau' - \alpha'}{2}\right)\sigma\phi\left(\frac{\tau' - \beta'}{2}\right)\sigma\phi\left(\frac{\tau' - \gamma'}{2}\right)$, συμπεραίνομεν λοιπόν, ὅτι καὶ ἡ μία καὶ ἡ ἄλλη μορφή τῆς παραστάσεως L μένουσι ἀναλλοίωτοι κατὰ τὴν μετάβασιν ἀπὸ ἑνὸς τριγώνου εἰς τὸ πολικὸν του.

Γ') Ἀκτὶς τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου.

38. "Αν K εἶναι τὸ σφαιρικὸν κέντρον καὶ Δ, Ε, Ζ, τὰ σημεῖα ἐπαφῆς τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου, ἔχομεν (καθὼς καὶ εἰς τὴν Εὐθ. Τριγων.): $AE = AZ = \tau - \alpha$, $BA = BZ = \tau - \beta$, $GE = \Gamma\Delta = \tau - \gamma$. Καὶ ἂν ἡ σφαιρικὴ ἀκτὶς τοῦ κύκλου, δηλ. τὸ τόξον μεγίστου κύκλου KZ, παρασταθῇ διὰ τοῦ ρ, εὐρίσκομεν ἀπὸ τὸν τύπον: $\eta\mu\sigma\phi\beta = \sigma\phi B\eta\mu\Gamma + \sigma\eta\mu\Gamma\sigma\eta\nu\alpha$ (α' τύπος ὁμάδος (7)), ἂν τὸν ἐφαρμόσωμεν εἰς τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον AKZ, ὅπου $\Gamma = Z = 90^\circ$, $B = \frac{A}{2}$, $\alpha = \tau - \alpha$, $\beta = \rho$:

$$\eta\mu(\tau - \alpha)\sigma\phi\rho = \sigma\phi\left(\frac{A}{2}\right), \text{ δηλ. } \sigma\phi\rho = \eta\mu(\tau - \alpha)\sigma\phi\left(\frac{A}{2}\right)$$

καὶ ἂν τεθῇ ἡ τιμὴ τῆς $\sigma\phi\left(\frac{A}{2}\right)$ (τύπ. 17), εὐρίσκομεν τελικῶς:

$$(29) \quad \sigma\phi\rho = \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau - \alpha)\eta\mu(\tau - \beta)\eta\mu(\tau - \gamma)}{\eta\mu\tau}}$$

δηλ. τύπον ἀντίστοιχον τοῦ τῆς Εὐθ. Τριγωνομετρίας:

$\rho = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}}$ (καὶ τρέπόμενον εἰς ἐκεῖνον, ἂν παραλείψωμεν τὰ σύμβολα $\sigma\phi$ καὶ $\eta\mu$).

Γ') Ἀκτὶς τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου.

39. "Αν ἀπὸ τὸ σφαιρικὸν κέντρον K τοῦ περὶ γ. κύκλου φέρωμεν τὰ τόξα μεγίστων κύκλων KB καὶ KA (εἰς τὸ μέσον Δ τῆς BG) καὶ θέσωμεν γων. KBG = γων. KGB = λ, γων. KGA = γων. KAG = μ, γων. KAB = γων. KBA = ν, θὰ εἶναι: $\mu + \nu = A$, $\nu + \lambda = B$, $\lambda + \mu = \Gamma$ καὶ ἐπομένως: $\lambda = \frac{B + \Gamma - A}{2} = \frac{\pi}{2} - (A - E)$ ἐπειδὴ δεξιὰ τὸν τύπον: $\eta\mu B\sigma\phi A = \sigma\phi\eta\mu\gamma - \sigma\eta\mu\gamma\sigma\eta\nu B$

(α' τύπος τῆς ομάδος (4), ἐφαρμοζόμενον εἰς τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ΚΔΒ (ΚΒ ≡ α ≡ Ρ (ἀκτίς τοῦ περιγ. κίκλου), ΒΔ ≡ γ ≡ $\frac{\alpha}{2}$, Β = γων. ΚΒΔ = λ, Α = Λ = 90°), εὐρίσκομεν : σφΡ = σφ($\frac{\alpha}{2}$) συνλ = $\frac{\alpha}{2}$ ημ(Α - Ε), ἂν θέσωμεν τὴν τιμὴν τῆς σφ($\frac{\alpha}{2}$) (τύποι (13), εὐρίσκομεν τελικῶς :

$$(30) \quad \sigma\phi P = \sqrt{\frac{\eta\mu(A-E)\eta\mu(B-E)\eta\mu(\Gamma-E)}{\eta\mu E}}$$

40. Ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι, ὅτι ἡ ἔκφρασις αὐτὴ τῆς σφΡ εἶναι ἡ πολικὴ τῆς ἐκφράσεως (29) τῆς εφρ' ὥστε ἔχομεν μεταξὺ τῶν δύο τριγώνων τὰς σχέσεις :

$$\epsilon\phi P \cdot \epsilon\phi\rho' = 1, \quad \epsilon\phi P' \cdot \epsilon\phi\rho = 1,$$

$$\delta\eta\lambda. \quad \rho' = \frac{\pi}{2} - P, \quad P' = \frac{\pi}{2} - \rho.$$

(Αἱ σχέσεις αὗται εἰμποροῦν καὶ γεωμετρικῶς νὰ δεῖχθῶν).

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

- 1) Κάθε γωνία σφαιρ. τριγώνου εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ τὸ Ε.
- 2) Νὰ δεῖχθῶν μὲ τοὺς τύπους τῆς Σφαιρ. Τριγωνομετρίας τὰ ἐξῆς θεωρήματα τῆς Σφαιρομετρίας : α') Ἐάν σφαιρικὸν τρίγωνον εἶναι ἰσοσκελές, ἔχει τὰς παρὰ τὴν βᾶσιν γωνίας τοῦ ἴσου καὶ ἀντιστρόφως. β') Κάθε πλευρὰ εἶναι μικροτέρα ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῶν 2 ἄλλων. γ') Τὸ ἄθροισμα τῶν τριῶν γωνιῶν εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ 180°.
- 3) Ἐάν ἓν σφαιρικὸν τρίγωνον εἶναι συγχρόνως καὶ ὀρθογώνιον καὶ ὀρθόπλευρον (Α = 90°, καὶ α = 90°), τί γίνονται οἱ τύποι ; καὶ τί ἄλλο συμβαίνει εἰς τὸ τρίγ. αὐτό ;
- 4) Νὰ μετατραποῦν εἰς λογιστοὺς διὰ λογαρίθμων καὶ οἱ τύποι τῆς 3ης ομάδος (3).
- 5) Κάθε δισορθογώνιον σφαιρ. τρίγωνον εἶναι καὶ δισορθόπλευρον καὶ ἀντιστρόφως.
- 6) Ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν ἑνὸς ὀρθογ. τριγώνου τῶν μικροτέρων ἀπὸ 90° εἶναι ἢ 3 ἢ 1 (ἀπὸ τὸν τύπον συνα = συνβσυνγ).
- 7) Εἰς πᾶν ὀρθογ. τρίγωνον καθεμία ἀπὸ τὰς γωνίας Β καὶ

Γ είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα από 90° , καθόσον ή άπέναντι πλευρά είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα από 90° .

8) Νά δειχθῆ, ὅτι :

$$\begin{aligned} \eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{B}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) &= \frac{s^2}{\eta\mu\alpha\eta\mu\beta\eta\mu\gamma}, \\ \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) &= \frac{\sigma\eta\mu\tau}{\eta\mu\alpha\eta\mu\beta\eta\mu\gamma}, \\ \varepsilon\varphi\left(\frac{A}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{B}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) &= \frac{s}{\eta\mu^2\tau}, \end{aligned}$$

$$\delta\upsilon\omicron\nu : s = \sqrt{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau-\alpha)\eta\mu(\tau-\beta)\eta\mu(\tau-\gamma)}.$$

9) Νά δειχθῆ, ὅτι :

$$\begin{aligned} \eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right) &= \frac{S\eta\mu E}{\eta\mu A\eta\mu B\eta\mu\Gamma}, \\ \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right) &= \frac{S^2}{\eta\mu E\eta\mu A\eta\mu B\eta\mu\Gamma}, \\ \varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\beta}{2}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\gamma}{2}\right) &= \frac{\eta\mu^2 E}{S}, \end{aligned}$$

$$\delta\upsilon\omicron\nu : S = \sqrt{\eta\mu E\eta\mu(A-E)\eta\mu(B-E)\eta\mu(\Gamma-E)}.$$

Αί δύο έκφράσεις s και S λέγονται *παρουστάσεις του Staudt*. Είναι δὲ οἱ τύποι τῆς ἀσκήσεως αὐτῆς οἱ πολικοὶ τῶν τύπων τῆς 8ης ἀσκήσεως. Ἐπίσης εἶναι :

$$\begin{aligned} \eta\mu A &= \frac{2s}{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma}, \quad \eta\mu B = \frac{2s}{\eta\mu\gamma\eta\mu\alpha}, \quad \eta\mu\Gamma = \frac{2s}{\eta\mu\alpha\eta\mu\beta}, \\ \eta\mu\left(\frac{E}{2}\right) &= \sqrt{\frac{\eta\mu\left(\frac{\tau}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)}}, \\ \sigma\upsilon\nu\left(\frac{E}{2}\right) &= \sqrt{\frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\tau}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)}}. \end{aligned}$$

10) Νά δειχθοῦν οἱ τύποι :

$$\begin{aligned} \eta\mu(A-E) &= \frac{s}{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right)}, \\ \eta\mu(B-E) &= \frac{s}{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)}, \\ \eta\mu(\Gamma-E) &= \frac{s}{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)}. \end{aligned}$$

11) Νὰ δειχθοῦν οἱ τύποι :

$$\sigma\upsilon\nu(A-E) = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\beta}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\gamma}{2}\right) - 1}{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right)},$$

$$\sigma\upsilon\nu(B-E) = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\beta}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\gamma}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) - 1}{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\beta}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\gamma}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)},$$

$$\sigma\upsilon\nu(\Gamma-E) = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\gamma}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\beta}{2}\right) - 1}{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\beta}{2}\right)},$$

12) Νὰ δειχθῆ, ὅτι : $\eta\mu\alpha = \frac{2S}{\eta\mu\beta\eta\mu\gamma}$ (καὶ οἱ ὅμοιοι κυκλικῶς),
καὶ $\eta\mu\alpha\eta\mu\beta\eta\mu\gamma\eta\mu\Delta\eta\mu\B\eta\mu\Gamma = 4S$.

13) Νὰ δειχθοῦν οἱ τύποι : $\sigma\varphi^2\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sigma\varphi\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sigma\varphi\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

καὶ οἱ ὅμοιοι (κυκλ.), $\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{B}{2}\right) = \frac{\eta\mu(\alpha+\gamma)}{2\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\gamma}$, $\eta\mu^2\left(\frac{B}{2}\right) = \frac{\eta\mu(\alpha-\gamma)}{2\sigma\upsilon\nu\gamma\eta\mu\alpha}$
καὶ οἱ ὅμοιοι (κυκλικῶς).

14) Νὰ δειχθοῦν οἱ τύποι :

$\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu(\beta-\gamma)\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\Lambda}{2}\right) + \sigma\upsilon\nu(\beta+\gamma)\eta\mu^2\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$ καὶ οἱ ὅμ. (κυκλ.)

$\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu(B+\Gamma)\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \sigma\upsilon\nu(B-\Gamma)\eta\mu^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0$ καὶ οἱ ὅμ. (κυκλ.)

$\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\B = \eta\mu(\beta-\gamma)\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\Lambda}{2}\right) + \eta\mu(\beta+\gamma)\eta\mu^2\left(\frac{\Lambda}{2}\right)$ καὶ οἱ ὅμ. (κυκλ.)

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ'.

ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ἐπίλυσις τῶν ὀρθογωνίων καὶ τῶν ὀρθοπλευρῶν
τριγώνων.

Α') Ὄρθογώνια τρίγωνα.

41. Ἐάν τὸ τρίγωνον εἶναι *τρισορθογώνιον*, εἶναι καὶ *τρισορθόπλευρον*, ἐπομένως ὅλα τὰ στοιχεῖά του εἶναι γνωστά,

“Αν δ’ εἶναι *διορθογώνιον* ($B = \Gamma = 90^\circ$), εἶναι καὶ *διορθοπλευρον* ($\beta = \gamma = 90^\circ$) (“Ασκήσις 5η): ἐπομένως ἀπὸ τὰ 6 στοιχεῖά του, τὰ 4 εἶναι γνωστά, τὰ δὲ δύο ἄλλα A καὶ a ἔχουν τὸ ἴδιον μέτρον (διότι $\text{συνα} = \text{συν}A$): ἂν λοιπὸν τὸ ἐν δοθῇ, εἶναι γνωστὸν καὶ τὸ ἄλλο.

Ὡστε ἀρκεῖ νὰ μάθωμεν τὴν ἐπίλυσιν τῶν *μονορθογωνίων* τριγώνων.

Περίπτωσης α’.

42. Δίδονται αἱ πλευραὶ β καὶ γ τῆς ὀρθῆς γωνίας A καὶ ζητοῦνται τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ($\alpha, \text{σφ}, \Gamma$). Θὰ ἔχωμεν (κατὰ τοὺς μνημονικοὺς κανόνας τοῦ Νέπερ). (σελ. 16): $\text{συνα} = \text{συν}\beta\text{συν}\gamma$, $\text{σφ}B = \text{σφ}\beta\eta\mu\gamma$, $\text{σφ}\Gamma = \text{σφ}\gamma\eta\mu\beta$. Οἱ δὲ τύποι αὐτοὶ ὀρίζουν προφανῶς *μονοτίμως* τὰ α, β, Γ .

Ἐπειδὴ ὁμοῦς ὁ ὀρισμὸς μιᾶς ἀγνώστου γωνίας γίνεται *ἀκριβέστερα* ἀπὸ τὴν ἐφαπτομένην της (ἢ τὴν συνεφαπτομένην), μετασχηματίζομεν τὸν α' τύπον, ὡς ἑξῆς:

$$\text{εφ}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \text{συνα}}{1 + \text{συνα}} = \frac{1 - \text{συν}\beta\text{συν}\gamma}{1 + \text{συν}\beta\text{συν}\gamma} = \frac{1 - \text{εφ}\omega}{1 + \text{εφ}\omega} (\text{εφ}\omega = \text{συν}\beta\text{συν}\gamma) \text{ ὥστε}$$

$\text{εφ}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \text{εφ}\left(\frac{\pi}{4} - \omega\right)$. Ὑπολογίζομεν λοιπὸν πρῶτα *ἐφαπτομένη* ω ὡς τὴν ω ἀπὸ τὸν τύπον $\text{εφ}\omega = \text{συν}\beta\text{συν}\gamma$ καὶ ἔπειτα τὴν α ἀπὸ

$$\text{τὸν τύπον } \text{εφ}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \text{εφ}\left(\frac{\pi}{4} - \omega\right).$$

Περίπτωσης β’.

43. Δίδονται αἱ δύο πλευραὶ a καὶ β . Ζητοῦνται τ’ ἄλλα στοιχεῖα (γ, B, Γ). Θὰ ἔχωμεν τώρα τοὺς τύπους:

$$\eta\mu B = \frac{\eta\mu\beta}{\eta\mu a}, \text{συν}\Gamma = \text{σφ}\alpha\text{εφ}\beta, \text{συν}\gamma = \frac{\text{συνα}}{\text{σιν}\beta},$$

ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ β' καὶ ὁ γ' ὀρίζουν *μονοτίμως* τὰ Γ καὶ γ ἄλλ’ ὁ α' δίδει διὰ τὴν γων. B δύο τιμὰς, ἀπὸ τὰς ὁποίας ὁμοῦς ἢ μία μόνον θὰ ἰσχύῃ, ἀναλόγως τῆς δοθείσης πλευρᾶς β , διότι β καὶ B εἶναι ἢ συγχρόνως μεγαλύτερα ἢ συγχρόνως μικρότερα ἀπὸ 90° . (“Ασκ. 7).

Παρατήρησις. Λιὰ νὰ ὑπάρχη λύσις, χρειάζεται προφανῶς ὁ περιορισμὸς: τὰ β' μέλη τῶν προηγουμένων τύπων νὰ εἶναι ἀπολύτως μικρότερα ἢ ἴσα μὲ τὴν μονάδα.

Ἐφαπτομενικοὶ τύποι εἶναι τώρα οἱ ἑξῆς :

$$\begin{aligned} \alpha') \quad \varepsilon\varphi\left(45^\circ - \frac{B}{2}\right) &= \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu(90^\circ - B)}{1 + \sigma\upsilon\nu(90^\circ - B)}} = \sqrt{\frac{1 - \eta\mu B}{1 + \eta\mu B}} = \sqrt{\frac{\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta}{\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta}} \\ &= \frac{2\eta\mu\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\sqrt{2\eta\mu\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}} = \frac{\varepsilon\varphi\frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\varepsilon\varphi\frac{1}{2}(\alpha + \beta)} \end{aligned}$$

$$\beta') \quad \varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\Gamma}{1 + \sigma\upsilon\nu\Gamma}} = \sqrt{\frac{\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\beta}{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta}} = \frac{\frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta}}{\sqrt{\frac{\eta\mu(\alpha + \beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta}}} = \sqrt{\frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\eta\mu(\alpha + \beta)}}$$

$$\begin{aligned} \gamma') \quad \varepsilon\varphi\left(\frac{\Upsilon}{2}\right) &= \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\Upsilon}{1 + \sigma\upsilon\nu\Upsilon}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\beta}}{1 + \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\beta}}} = \sqrt{\frac{\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha}} \\ &= \frac{2\eta\mu\frac{1}{2}(\alpha - \beta)\eta\mu\frac{1}{2}(\alpha + \beta)}{\sqrt{2\sigma\upsilon\nu\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu\frac{1}{2}(\alpha - \beta)}} = \sqrt{\varepsilon\varphi\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \varepsilon\varphi\frac{1}{2}(\alpha - \beta)}, \end{aligned}$$

Περίπτωσης γ'.

44. Δίδονται ἡ ἕποστίνουσα α καὶ μία ἀπὸ τὰς γωνίας, π.χ. ἡ Β.

Ἀπὸ τοὺς κανόνας τοῦ Neper ἔχομεν τοὺς τύπους :

$$\eta\mu\beta = \eta\mu\alpha\eta\mu B, \quad \varepsilon\varphi\gamma = \varepsilon\varphi\alpha\sigma\upsilon\nu B, \quad \sigma\varphi\Gamma = \sigma\upsilon\nu\alpha\varepsilon\varphi B.$$

(Ὁ α' τύπος δίδει πάλιν 2 τιμὰς διὰ τὴν β, ἀλλὰ θὰ ἐκλέξωμεν τὴν κατάλληλον, ὅπως καὶ πρὶν). Ἀντὶ τοῦ α' τύπου εὐρίσκομεν τὸν ἐφαπτομενικόν :

$$\varepsilon\varphi\left(45^\circ - \frac{\beta}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \eta\mu\beta}{1 + \eta\mu\beta}} = \sqrt{\frac{1 - \eta\mu\alpha\eta\mu B}{1 + \eta\mu\alpha\eta\mu B}} = \sqrt{\frac{1 - \varepsilon\varphi\omega}{1 + \varepsilon\varphi\omega}} = \sqrt{\varepsilon\varphi(45^\circ - \omega)}$$

(ὅπου $\varepsilon\varphi\omega = \eta\mu\alpha\eta\mu B$).

Περίπτωσης δ'.

45. Δίδονται αἱ γωνίαι Β καὶ Γ. Οἱ κανόνες τοῦ Neper παρέχουν : $\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\varphi B\sigma\varphi\Gamma$, $\sigma\upsilon\nu\beta = \frac{\sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu\Gamma}$, $\sigma\upsilon\nu\gamma = \frac{\sigma\upsilon\nu\Gamma}{\eta\mu B}$ καὶ οὕτως ὁρίζονται μονοτίμως τὰ ζητούμενα στοιχεῖα. Ἐφαπτομενικοὺς δὲ τύπους εὐρίσκομεν τοὺς ἑξῆς :

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}} = \sqrt{\frac{1 - \sigma\varphi B\sigma\varphi\Gamma}{1 + \sigma\varphi B\sigma\varphi\Gamma}} = \sqrt{\frac{\sigma\upsilon\nu(B + \Gamma)}{\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma)}}$$

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{\beta}{2}\right) = \sqrt{\frac{\eta\mu\Gamma - \sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu\Gamma + \sigma\upsilon\nu B}} = \sqrt{\frac{\eta\mu\Gamma - \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - B\right)}{\eta\mu\Gamma + \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - B\right)}}$$

$$\sqrt{\frac{2\eta\mu\left(\frac{B+\Gamma}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma-B}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B+\Gamma}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\eta\mu\left(\frac{\Gamma-B}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}} = \sqrt{\varepsilon\varphi\left(\frac{B+\Gamma}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{B-\Gamma}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{\varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma+B}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\Gamma-B}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}.$$

Περίπτωσης ε'.

46. Δίδονται ή μία πλευρά β και ή αντίκρουή γωνία Β. Έχομεν από τους κανόνας του Νεπερ τους τύπους :

$\eta\mu\alpha = \frac{\eta\mu\beta}{\eta\mu B}$, $\eta\mu\gamma = \frac{\varepsilon\varphi\beta}{\varepsilon\varphi B}$, $\eta\mu\Gamma = \frac{\sigma\upsilon\nu B}{\sigma\upsilon\nu\beta}$ (έχομεν λοιπόν τώρα δύο τιμάς δια τα β, γ, Γ).

Έφαπτομενικοί τύποι :

$$\alpha') \varepsilon\varphi\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \eta\mu\alpha}{1 + \eta\mu\alpha}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\eta\mu\beta}{\eta\mu B}}{1 + \frac{\eta\mu\beta}{\eta\mu B}}} = \sqrt{\frac{\eta\mu B - \eta\mu\beta}{\eta\mu B + \eta\mu\beta}}$$

$$= \sqrt{\frac{2\eta\mu\left(\frac{B-\beta}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B+\beta}{2}\right)}{2\eta\mu\left(\frac{B+\beta}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B-\beta}{2}\right)}} = \sqrt{\frac{\varepsilon\varphi\frac{1}{2}(B-\beta)}{\varepsilon\varphi\frac{1}{2}(B+\beta)}}$$

$$\beta') \varepsilon\varphi\left(45^\circ - \frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varphi B - \varepsilon\varphi\beta}{\varepsilon\varphi B + \varepsilon\varphi\beta}} = \sqrt{\frac{\eta\mu(B-\beta)}{\eta\mu(B+\beta)}}$$

$$\gamma') \varepsilon\varphi\left(45^\circ - \frac{\Gamma}{2}\right) = \sqrt{\varepsilon\varphi\frac{1}{2}(B+\beta) \cdot \varepsilon\varphi\frac{1}{2}(B-\beta)}.$$

Περίπτωσης ζ'.

47. Δίδονται μία κάθετος πλευρά, π.χ. ή β, και ή προσκειμένη γων. Γ.

Έχομεν πάλιν από τους κανόνας του Νεπερ τους τύπους :

$\varepsilon\varphi\alpha = \frac{\eta\mu\beta\eta\mu\Gamma}{\sigma\upsilon\nu^2\Gamma}$, $\varepsilon\varphi\gamma = \eta\mu\beta\varepsilon\varphi\Gamma$, $\sigma\upsilon\nu B = \sigma\upsilon\nu\beta\eta\mu\Gamma$. Καί αντί του γ' τύπου εφρίσκομεν τον έφαπτομενικόν :

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{1}{2}B\right) = \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu B}{1 + \sigma\upsilon\nu B}} = \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\beta\eta\mu\Gamma}{1 + \sigma\upsilon\nu\beta\eta\mu\Gamma}} = \sqrt{\frac{1 - \varepsilon\varphi\omega}{1 + \varepsilon\varphi\omega}} = \sqrt{\varepsilon\varphi(45^\circ - \omega)}$$

(ὅπου εφω \equiv συνβημΓ).

48. Ὑπάρχουν καὶ μερικὰ ἰδιαίτερα σφαιρικὰ τρίγωνα, ὅχι ὀρθογώνια, τῶν ὁποίων ἡ ἐπίλυσις ἀνάγεται ἀμέσως εἰς τὴν ἐπίλυσιν ὀρθογωνίων, π. χ.

α') Ἐάν $a = \beta$ ἢ $A = B$, τὸ τρίγωνον εἶναι ἰσοσκελὲς καὶ ἡ ἐπίλυσις του γίνεται, ἀφοῦ ἀναλυθῆ εἰς δύο ὀρθογώνια (μὲ τὸ τόξον τοῦ μεγίστου κύκλου, τοῦ ἐνώνυοντος τὴν κορυφὴν του μὲ τὸ μέσον τῆς βάσεως).

β') Ἐάν $a + \beta = 180^\circ$ ἢ $A + B = 180^\circ$, προεκβάλλομεν τὰς πλευρὰς a καὶ γ ἕως τὴν τομὴν των εἰς τὸ B' καὶ σχηματίζομεν οὕτω τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον $ΑΓΒ'$ ἐπιλύομεν τότε αὐτὸ (μὲ τὴν ἀνάλυσιν εἰς 2 ὀρθογώνια) καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἔπειτα ὑπολογίζομεν καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ δοθέντος.

Β') Ἐπίλυσις τῶν ὀρθοπλευρῶν τριγώνων.

49. Ἀρκεῖ καὶ πάλιν νὰ θεωρήσωμεν μόνον τὰ *μονορθόπλευρα* τρίγωνα· διότι τὰ *δισορθόπλευρα* εἶναι καὶ *δισορθογώνια* καὶ ἐπομένως, ὅταν μᾶς δοθῆ τὸ ἓν ἀπὸ τὰ δύο ἄλλα μένοντα στοιχεῖα, τὸ ἄλλο μετρεῖται ἀπὸ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν· ὅταν δὲ τὸ τρίγωνον εἶναι *τρισορθόπλευρον* εἶναι καὶ *τρισορθογώνιον*· ἐπομένως ὅλα τὰ στοιχεῖά του εἶναι γνωστά.

50. Ἡ ἐπίλυσις ἑνὸς *μονορθοπλευροῦ* τριγώνου εἰμφορεῖ νὰ γίνῃ εἴτε ἀπ' εὐθείας διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν τύπων τῶν *μονορθοπλευρῶν* τριγώνων (τύποι 12) εἴτε, συντομώτερον, διὰ τῆς ἐπίλυσεως κάθε φορὰν τοῦ ἀντιστοίχου *πολικοῦ* τριγώνου (τὸ ὁποῖον εἶναι τότε *ὀρθογώνιον*), ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ ὁποίου εὐρίσκομεν ἀμέσως καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀρχικοῦ. Αἱ ἕξ δυνατὰ περιπτώσεις εἶναι αἱ ἑξῆς:

Ἀρχικὸν τρίγωνον.

$$(a = 90^\circ)$$

Πολικὸν τρίγωνον.

$$(A' = 90^\circ)$$

Περίπτ. α'. Δίδονται B, Γ . Γνωστά $\beta' = 180^\circ - B$, $\gamma' = 180^\circ - \Gamma$.
Ζητοῦνται A, β, γ . Ζητοῦνται a', B', Γ' .

$$\text{Δύσις: } A = 180^\circ - a', \beta = 180^\circ - B', \gamma = 180^\circ - \Gamma'.$$

Περίπτ. β'. Δίδον. A, B (ἢ A, Γ). Γνωστά $a' = 180^\circ - A$, $\beta' = 180^\circ - B$.
Ζητοῦνται Γ, β, γ . Ζητοῦνται γ', B', Γ' .

$$\text{Δύσις: } \Gamma = 180^\circ - \gamma', \beta = 180^\circ - B', \gamma = 180^\circ - \Gamma'.$$

Περ.γ'. Δίδον. A, β (ἢ A, γ). Γνωστά $\alpha' = 180^\circ - A, B' = 180^\circ - \beta$.
Ζητοῦνται B, Γ, γ . Ζητοῦνται β', γ', Γ' .
Δύσεις: $B = 180^\circ - \beta', \Gamma = 180^\circ - \gamma', \gamma = 180^\circ - \Gamma'$.

Περ.πτ. δ'. Δίδονται β, γ . Γνωστά $B' = 180^\circ - \beta, \Gamma' = 180^\circ - \gamma$.
Ζητοῦνται A, B, Γ . Ζητοῦνται α', β', γ' .
Δύσεις: $A = 180^\circ - \alpha', B = 180^\circ - \beta', \Gamma = 180^\circ - \gamma'$.

Περ.ε'. Δίδον. B, β (ἢ Γ, γ). Γνωστά $\beta' = 180^\circ - B, B' = 180^\circ - \beta$.
Ζητοῦνται A, Γ, γ . Ζητοῦνται $\alpha', \gamma', \Gamma'$.
Δύσεις: $A = 180^\circ - \alpha', \Gamma = 180^\circ - \gamma', \gamma = 180^\circ - \Gamma'$.

Περ.ς'. Δίδον. B, γ (ἢ Γ, β). Γνωστά $\beta' = 180^\circ - B, \Gamma' = 180^\circ - \gamma$.
Ζητοῦνται A, Γ, β . Ζητοῦνται α', γ', B' .
Δύσεις: $A = 180^\circ - \alpha', \Gamma = 180^\circ - \gamma', \beta = 180^\circ - B'$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ἐπίλυσις ὁποίωνδήποτε σφαιρικῶν τριγῶνων.

Ἐχομεν πάλιν 6 διαφοροὺς περιπτώσεις.

Περίπτωσης α' .

51. Δίδονται α, β, γ . Ζητοῦνται A, B, Γ .

Ἐχομεν τοὺς τύπους:

$$\begin{aligned} \operatorname{εφ}\left(\frac{A}{2}\right) &= \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau-\beta)\eta\mu(\tau-\gamma)}{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau-\alpha)}}, & \operatorname{εφ}\left(\frac{B}{2}\right) &= \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau-\gamma)\eta\mu(\tau-\alpha)}{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau-\beta)}}, \\ \operatorname{εφ}\left(\frac{\Gamma}{2}\right) &= \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau-\alpha)\eta\mu(\tau-\beta)}{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau-\gamma)}} \end{aligned}$$

Δίδουν δὲ οἱ τύποι αὐτοὶ πραγματικὰς τιμὰς, διότι ὅλα τὰ ἡμίτονα τῶν ὑπορριζῶν εἶναι θετικά, ἀφοῦ $\alpha + \beta + \gamma < 360^\circ$ καὶ κάθε πλευρὰ μικροτέρα τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο ἄλλων. Πραγματικῶς τότε εἶναι:

$$\begin{aligned} \tau = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} < 180^\circ, & \quad \tau - \alpha = \frac{\beta + \gamma - \alpha}{2} > 0, & \quad \text{ἐπίσης καὶ } \tau - \beta > 0, \\ \tau - \gamma > 0. & & & \end{aligned}$$

Περίπτωσης β' :

52. Δίδονται A, B, Γ . Ζητοῦνται α, β, γ .

Θὰ χρησιμοποιήσωμεν τοὺς τύπους:

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu(A-E)}{\eta\mu(B-E)\eta\mu(\Gamma-E)}}, \quad \varepsilon\varphi\left(\frac{\beta}{2}\right) = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu(B-E)}{\eta\mu(\Gamma-E)\eta\mu(A-E)}}$$

$\varepsilon\varphi\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{\frac{\eta\mu E \eta\mu(\Gamma-E)}{\eta\mu(A-E)\eta\mu(B-E)}}$ (αί παρεχόμενα τιμαί εἶναι πάλιν πραγματικά, ἀφοῦ $2\delta\rho\theta. < A+B+\Gamma < 6\delta\rho\theta.$ καὶ κάθε γωνία ἀξηθεῖσα κατὰ $2\delta\rho\theta.$ ὑπερβαίνει τὸ ἄθροισμα τῶν ἄλλων δύο. Πραγματικῶς ἀπὸ τὰς ἰσότητας $2\delta\rho\theta. < A+B+\Gamma < 6\delta\rho\theta., A+2\delta\rho\theta. > B+\Gamma$ συμπεραίνομεν:

$$0 < A+B+\Gamma-2\delta\rho\theta. < 4\delta\rho\theta., \quad \eta \quad 0 < 2E < 4\delta\rho\theta.,$$

$0 < E < 2\delta\rho\theta.$ εἶναι δέ, καθὼς γνωρίζομεν, (ἄσκησις 1) καὶ κάθε γωνία ἀπὸ τὰς A, B, Γ μεγαλυτέρα ἀπὸ τὸ E: ὅστε ὅλα τὰ ἡμίτονα τῶν ὑπορρίζων εἶναι θετικά: ἐπομένως τὰ ριζικά πραγματικά.

Περίπτωσης γ':

53. Δίδονται 2 πλευραὶ α καὶ β καὶ μία γων. A ἀντικειμένη. Ζητοῦνται γ, B, Γ.

Πρῶτα εὐρίσκομεν τὴν B ἀπὸ τὴν ἀναλογίαν: $\frac{\eta\mu A}{\eta\mu \alpha} = \frac{\eta\mu B}{\eta\mu \beta}$,

$$\eta\mu B = \frac{\eta\mu \beta \eta\mu A}{\eta\mu \alpha}.$$

Ἐπειτα τὰ γ καὶ Γ ἀπὸ τὰς ἀναλογίας τοῦ Neper:

$$\frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha+\beta)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}\gamma} = \frac{\text{συν} \frac{1}{2}(A-B)}{\text{συν} \frac{1}{2}(A+B)} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A+B)}{\sigma\varphi\left(\frac{1}{2}\Gamma\right)} = \frac{\text{συν} \frac{1}{2}(\alpha-\beta)}{\text{συν} \frac{1}{2}(\alpha+\beta)},$$

$$\alphaὶ \delta\pi\omicron\iota\alpha\iota \mu\alpha\varsigma \delta\acute{\iota}\delta\omicron\upsilon\iota\nu \quad \varepsilon\varphi \frac{1}{2}\gamma = \varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha+\beta) \frac{\text{συν} \frac{1}{2}(A+B)}{\text{συν} \frac{1}{2}(A-B)},$$

$$\varepsilon\varphi \frac{1}{2}\Gamma = \frac{\text{συν} \frac{1}{2}(\alpha-\beta)}{\text{συν} \frac{1}{2}(\alpha+\beta) \varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A+B)}.$$

Περιορισμὸς. Πρέπει νὰ εἶναι $\eta\mu B < 1$, δηλ. $\eta\mu \beta \eta\mu A < 1$. Ἀπὸ τὰς δύο δὲ τιμὰς τῆς B δεκτὴ εἶναι ἐκείνη, ἢ ὅποια δίδει $A+B$ καὶ $\alpha+\beta$ συγχρόνως μικρότερα ἢ συγχρόνως μεγαλύτερα ἀπὸ 180° .

Περίπτωσης δ':

54. Δίδονται δύο γωνίαι, A καὶ B, καὶ μία ἀντικειμένη πλευ-

ρά η α. Ζητούνται Γ, β, γ. (Περίπτωσης πολική τῆς γ'), Ἡ ἐπίλυσις θὰ γίνῃ ἀπὸ τοὺς ἰδίους τύπους τῆς περιπτώσεως γ'.

Περίπτωσης ε'.

55. Δίδονται δύο πλευραὶ α καὶ β καὶ ἡ περιεχομένη γων. Γ. Ζητούνται γ, Α, Β.

Θὰ χρησιμοποιήσωμεν τοὺς τύπους τοῦ Neper :

$$\frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A+B)}{\sigma\varphi \frac{1}{2}\Gamma} = \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{1}{2}(\alpha-\beta)}{\sigma\upsilon\nu \frac{1}{2}(\alpha+\beta)}, \quad \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A-B)}{\sigma\varphi \frac{1}{2}\Gamma} = \frac{\eta\mu \frac{1}{2}(\alpha-\beta)}{\eta\mu \frac{1}{2}(\alpha+\beta)},$$

οἱ ὁποῖοι μᾶς δίδουν τὰ Α+Β καὶ Α-Β καὶ ἔπομ. καὶ τὰς γωνίας Α καὶ Β. Μετὰ τὴν εὔρεσιν τῶν Α καὶ Β, μία ἀπὸ τὰς ἄλλας ἀναλογίας τοῦ Neper τὰς περιεχούσας τὴν γωνίαν γ, μᾶς δίδει τὴν γ, π.χ. εὐρίσκομεν :

$$\varepsilon\varphi \frac{1}{2}\gamma = \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha+\beta) \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{1}{2}(A+B)}{\sigma\upsilon\nu \frac{1}{2}(A-B)}$$

Περίπτωσης ε')

56. Δίδονται δύο γωνίαι Α καὶ Β καὶ ἡ κοινὴ των πλευρὰ γ. Ζητούνται Γ, α, β.

(Περίπτωσης πολική τῆς ε').

$$\text{Αὶ ἀναλογία τοῦ Neper : } \frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha+\beta)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}\gamma} = \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{1}{2}(A-B)}{\sigma\upsilon\nu \frac{1}{2}(A+B)},$$

$$\frac{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}(\alpha-\beta)}{\varepsilon\varphi \frac{1}{2}\gamma} = \frac{\eta\mu \frac{1}{2}(A-B)}{\eta\mu \frac{1}{2}(A+B)} \quad \text{μᾶς δίδουν τὰ } \alpha+\beta, \alpha-\beta, \text{ ἔπομ.}$$

καὶ τὰς πλευρὰς α καὶ β. Ἐχοντες τώρα τὰς α καὶ β, εὐρίσκομεν τὴν γων. Γ ἀπὸ μίαν τῶν ἄλλων ἀναλογιῶν τοῦ Neper π. χ.

$$\text{ἔχομεν : } \sigma\varphi \frac{1}{2}\Gamma = \varepsilon\varphi \frac{1}{2}(A+B) \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{1}{2}(\alpha+\beta)}{\sigma\upsilon\nu \frac{1}{2}(\alpha-\beta)}$$

Παρατήρησις α'. Ἡ πλευρὰ γ εἰς τὴν ε' περίπτωσιν καὶ ἡ γων. Γ εἰς τὴν ε' εἴμποροῦν νὰ εὔρεθοῦν καὶ ἀπ' εὐθείας, ἡ πρώτη τῆ ἀπὸ τὸν τύπον : $\sigma\upsilon\nu\gamma = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$ καὶ ἡ δευτέ-

ρα ἀπὸ τὸν πολ. τύπον: $\text{συν}\Gamma = -\text{συν}A\text{συν}B + \eta\mu A\eta\mu B\text{συν}\gamma$, ἀφοῦ πρῶτα καὶ οἱ δύο γίνουν λογιστοὶ διὰ λογαρίθμων, καθὼς ἐμάθομεν.

Παρατήρησις β'. 1) Ἀπὸ τὰς 6 περιπτώσεις ἐπιλύσεως τοῦ τυχόντος: τριγώνου ἀνάγονται 3 εἰς 3 ἄλλας τοῦ πολικοῦ του τριγώνου. Εἰμποροῦμεν λοιπὸν νὰ λύσωμεν τὰς 3 καὶ ἐμμέσως, ἐπιλύοντες πρῶτον τὸ ἀρχικὸν σφαιρικὸν τρίγωνον: δηλαδὴ αἱ περιπτώσεις μὲ δεδομένα: 1) A, B, Γ, 2) A, B, γ, 3) A, B, α ἀνάγονται εἰς τὰς 4) α, β, γ, 5) α, β, Γ, 6) α, β, A.

2) Αἱ τέσσαρες περιπτώσεις μὲ δεδομένα: 1) α, β, Γ, 2) A, B, γ, 3) α, β, A, 4) A, B, α εἰμποροῦν νὰ λυθῶν καὶ μὲ τοὺς τύπους τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων διὰ καταλλήλου διαιρέσεως τοῦ ἀρχικοῦ εἰς δύο ὀρθογώνια.

Ἀριθμητικαὶ ἐφαρμογαί.

- 1) $\alpha = 113^{\circ}2'56''$, 64, $\beta = 82^{\circ}39'28''$, 40, $\gamma = 7^{\circ}54'31''$, 06.
[Ἀπ. $A = 116^{\circ}20'2''$, 20, $B = 75^{\circ}0'51''$, 60, $\Gamma = 70^{\circ}6'59''$, 16].
- 2) $\alpha = 113^{\circ}2'56''$, 64, $\beta = 82^{\circ}39'28''$, 40, $\Gamma = 138^{\circ}50'19''$, 69.
[Ἀπ. $\gamma = 137^{\circ}29'4''$, 60, $A = 116^{\circ}20'2''$, 20, $B = 104^{\circ}59'8''$, 38].
- 3) $\alpha = 113^{\circ}2'56''$, 64, $\beta = 82^{\circ}39'28''$, 40, $A = 116^{\circ}20'2''$, 20.
[Ἀπ. Λύσις α': $B = 75^{\circ}0'51''$, 60, $\Gamma = 70^{\circ}6'59''$, 16, $\gamma = 74^{\circ}54'31''$, 06.
Λύσις β': $B = 104^{\circ}59'8''$, 40, $\Gamma = 138^{\circ}50'13''$, 69, $\gamma = 137^{\circ}29'4''$, 64].
- 4) Ὄρθογώνιον τρίγωνον ἔχει: $\beta = 37^{\circ}48'12''$, $\gamma = 59^{\circ}44'16''$.
[Ἀπ. $B = 41^{\circ}55'45''$, $\Gamma = 70^{\circ}19'$, 15, $\alpha = 66^{\circ}32'6''$]
- 5) Ὄρθογ. τρίγωνον ἔχει: $\alpha = 83^{\circ}24'15''$, 3, $\beta = 34^{\circ}11'20''$, 1.
[Ἀπ. $\gamma = 82^{\circ}1'5''$, $\Gamma = 85^{\circ}29'41''$, $B = 34^{\circ}26'55''$].
- 6) Ὄρθογ. τρίγωνον ἔχει: $\alpha = 37^{\circ}40'20''$, $\beta = 31^{\circ}40'12''$.
[Ἀπ. $\gamma = 0^{\circ}26'37''$, $B = 89^{\circ}25'37''$, $\Gamma = 0^{\circ}43'32''$].
- 7) Ὄρθογ. τρίγωνον ἔχει: $\beta = 77^{\circ}21'50''$, $B = 83^{\circ}56'40$.
[Ἀπ. Λύσις α': $\alpha = 78^{\circ}53'20''$, $\gamma = 28^{\circ}14'31''$, $\Gamma = 28^{\circ}49'$, 57".
Λύσις β': $\alpha = 101^{\circ}6'40''$, $\gamma = 151^{\circ}45'29''$, $\Gamma = 151^{\circ}10'3''$].
- 8) Ὄρθογών. τρίγωνον ἔχει: $\beta = 77^{\circ}21'50''$, $B = 40^{\circ}40'40''$.
[Ἀπ. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον].
- 9) Ὄρθογών. τρίγωνον ἔχει: $\beta = 140^{\circ}5'$, $\Gamma = 62^{\circ}18'30''$.
[Ἀπ. $\gamma = 50^{\circ}42'43''$, $B = 132^{\circ}47'11'$].
- 10) Ὄρθογ. τρίγωνον ἔχει: $\alpha = 98^{\circ}14'24''$, $B = 55^{\circ}32'45''$.
[Ἀπ. $\Gamma = 101^{\circ}47'56''$, $\gamma = 104^{\circ}21'28''$].

- 11) Ὀρθογ. τρίγωνον ἔχει : $B=32^{\circ}23'19''$, $\Gamma=69^{\circ}12'25''$.
 [Ἀπ. $\alpha=53^{\circ}13'45''$, $\beta=25^{\circ}24'33''$, $\gamma=48^{\circ}29'31''$].
- 12) $\alpha=70^{\circ}14'20''$, $\beta=49^{\circ}24'10''$, $\gamma=38^{\circ}46'10''$.
 [Ἀπ. $A=110^{\circ}51'16''$, $B=48^{\circ}56'4''$, $\Gamma=38^{\circ}26'48''$].
- 13) $A=102^{\circ}14'12''$, $B=54^{\circ}32'24''$, $\Gamma=89^{\circ}5'46''$.
 [Ἀπ. $\alpha=104^{\circ}25'8''$, $\beta=53^{\circ}49'24''$, $\gamma=97^{\circ}44'18''$].
- 14) $\alpha=50^{\circ}30'20''$, $\beta=172^{\circ}48'$, $A=45^{\circ}28'10''$.
 [Ἀπ. Λύσις α' : $\gamma=153^{\circ}23'43''$, $\Gamma=155^{\circ}33'45''$, $B=58^{\circ}23'13''$.
 Λύσις β' : $\gamma=88^{\circ}28'56''$, $\Gamma=67^{\circ}26'17''$, $B=121^{\circ}36'46''$].
- 15) $\alpha=41^{\circ}10'$, $\beta=29^{\circ}50'$, $A=69^{\circ}30'$.
 [Ἀπ. $B=45^{\circ}3'51''$, $\gamma=43^{\circ}3'20''$, $\Gamma=76^{\circ}16'56''$].
- 16) $\alpha=68^{\circ}20'25''$, $\beta=52^{\circ}18'15''$, $\Gamma=117^{\circ}12'20''$.
 [Ἀπ. $A=56^{\circ}16'15''$, $B=45^{\circ}4'41''$, $\gamma=96^{\circ}20'44''$].

Μ Ε Ρ Ο Σ Δ'.

Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Εὔρεις τῶν θεμελιωδῶν τύπων διὰ τῆς Ἀναλυτικῆς Γεωμετρίας.

57. Λαμβάνομεν ὡς ἄξονα τῶν z τὴν ἀκτῖνα OA , τὴν ἐνώουσαν τὸ κέντρον τῆς σφαίρας μὲ μίαν ἀπὸ τὰς κορυφὰς τοῦ τριγώνου ὡς ἐπίπεδον δὲ τῶν xz λαμβάνομεν τὸ ἐπίπεδον OAB τῆς πλευρᾶς AB : ἄξονες τέλος τῶν x καὶ y εἶναι ἢ ἐπὶ τοῦ ἐπίπεδου OAB κάθετος ἐπὶ τὴν OA (ἄξ. τῶν x) καὶ ἢ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον zOx κάθετος (ἄξ. τῶν y).

58. *Εὔρεις τῆς α' ομάδος τύπων.* Ἔχομεν ἀπὸ τὰς θέσεις τῶν A, B, Γ πρὸς τοὺς ἄξονας καὶ ἀπὸ τὰς σχέσεις μεταξὺ εὐθυγράμμων καὶ πολικῶν συντεταγμένων :

$$x_1=0, y_1=0, z_1=1, x_2=\eta\mu\gamma, y_2=0, z_2=\sigma\upsilon\nu\gamma$$

$$x_3=\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu A, y_3=\eta\mu\beta\eta\mu A, z_3=\sigma\upsilon\nu\beta.$$

Ὡστε: $\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu(BO\Gamma) = x_2x_3 + y_2y_3 + z_2z_3 = x_2x_3 + z_2z_3 = \eta\mu\gamma\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu\gamma\sigma\upsilon\nu\beta.$

59. *Εὔρεις τῆς β' ομάδος τύπων.* Ἄς λάβωμεν τώρα ὡς

πολικὸν ἄξονα τὴν OB . τότε τὸ νέον y'_3 θὰ εἶναι προφανῶς τὸ ἴδιον μὲ τὸ παλαιὸν y_3 . ἀλλὰ: $y'_3 = \eta\mu\alpha\eta\mu(\pi - B) = \eta\mu\alpha\eta\mu B$,

ὥστε: $\eta\mu\beta\eta\mu A = \eta\mu\alpha\eta\mu B$ καὶ ἐπομένως: $\frac{\eta\mu A}{\eta\mu\alpha} = \frac{\eta\mu B}{\eta\mu\beta}$.

60. *Εὐρέσεις τῆς γ' ομάδος τύπων.*

$$\begin{aligned} \text{Ἐχ. } x_3 &= \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu A = \sigma\upsilon\nu(\chi O\Gamma) = \\ &= x'_3 \sigma\upsilon\nu(\chi O x') + y'_3 \sigma\upsilon\nu(\chi O y') + z'_3 \sigma\upsilon\nu(\chi O z') = \\ &= x'_3 \sigma\upsilon\nu\gamma + z'_3 \eta\mu\gamma = -\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu\gamma + \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\gamma. \end{aligned}$$

(διότι $x'_3 = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu(\pi - B) = -\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu B$, $z'_3 = \sigma\upsilon\nu\alpha$).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ἡ Εὐθύγραμμος Τριγωνομετρία ὡς ὀρική περίπτωσηίς τῆς Σφαιρικῆς.

61. Ὅσον ἡ ἀκτίς μιᾶς σφαίρας αὐξάνει, τόσον *ὀλιγώτερον καμπύλη* γίνεται ἡ ἐπιφάνεια αὐτῆς καὶ πλησιάζει ἐπομένως ὀλονὲν περισσότερο νὰ γίνῃ ἐπίπεδος. ὅταν δὲ τὸ κέντρον K ἀφανισθῇ εἰς τὸ ἄπειρον καὶ ἡ ἀκτίς AK γίνῃ ἄπειρος, τὸ γειτονικὸν τοῦ ἀκροῦ A τῆς ἀκτίνος αὐτῆς μέρος τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, τὸ μένον εἰς τὸ πεπερασμένον, κατατῖχῃ ἐπίπεδον. Αὐτὸ ἐννοοῦμεν, ὅταν λέγωμεν συντόμως, ὅτι τὸ ἐπίπεδον εἶναι σφαῖρα μὲ ἀκτίνα ἄπειρον.—Οἱ τύποι τῆς Σφαιρικῆς Τριγωνομετρίας ἀναφέρονται εἰς σφαῖραν μὲ ἀκτίνα τὴν μονάδα· διότι τότε μόνον κάθε πλευρὰ τοῦ σφαιρ. τριγώνου μετρεῖται ἀκριβῶς μὲ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν, μὲ τὸν ὁποῖον καὶ ἡ ἐπίκεντρος γωνία τῆς. Ἄς λάβωμεν τώρα σφαῖραν μὲ ἀκτίνα τυχοῦσαν ρ ὁμόκεντρον πρὸς τὴν ἀρχικὴν μὲ ἀκτίνα 1. Τὰ ἐπίπεδα τῶν διέδρων γωνιῶν ἑνὸς σφαιρικοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ ἐπὶ τῆς ἀρχικῆς σφαίρας σχηματίζουν προφανῶς ἐπὶ τῆς σφαίρας μὲ ἀκτίνα τὸ ρ ἓν σφαιρ. τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ ὅμοιον πρὸς τὸ ἄλλο, δηλ. μὲ ἴσας γωνίας, ἀλλὰ πλευρὰς ρ φορὰς μεγαλυτέρας. Ἄν λοιπὸν θέλωμεν νὰ ἐφαρμόσωμεν τοὺς τύπους τῆς Σφαιρ. Τριγωνομετρίας καὶ εἰς τὴν τυχ. σφαῖραν ἀκτίνος ρ , πρέπει προφανῶς εἰς τοὺς τύπους αὐτοὺς τὰς μὲν γωνίας νὰ τὰς ἀφήσωμεν τὰς ἰδίας, ἀλλὰ ἀντὶ τῶν α, β, γ νὰ θέσωμεν τὰ μέτρα τῶν ἐπίκεντρος γωνιῶν

τοῦ νέου τριγώνου, τῶν ἀντιστοιχουσῶν εἰς τὰς πλευράς του
 α' , β' , γ' , δηλ. νὰ γράψωμεν (ἀντὶ α , β , γ) $\frac{\alpha}{\rho}$, $\frac{\beta}{\rho}$, $\frac{\gamma}{\rho}$ #
 (διότι προφανῶς $\alpha' = \rho\alpha$, ἢ $\alpha = \frac{\alpha'}{\rho}$ κλπ.).

62. Ἡ πρώτη ὁμάς τῶν τύπων γίνεται λοιπὸν τώρα :

$$\begin{aligned} \text{συν}\left(\frac{\alpha}{\rho}\right) &= \text{συν}\left(\frac{\beta}{\rho}\right)\text{συν}\left(\frac{\gamma}{\rho}\right) + \eta\mu\left(\frac{\beta}{\rho}\right)\eta\mu\left(\frac{\gamma}{\rho}\right)\text{συν}A, \\ \text{συν}\left(\frac{\beta}{\rho}\right) &= \dots, \quad \text{συν}\left(\frac{\gamma}{\rho}\right) = \dots \end{aligned}$$

* Ἄν τώρα τὸ ρ αἰξάνη διαρκῶς καὶ κατατήσῃ ἄπειρον, οἱ τύποι
 αὐτοὶ πρέπει προφανῶς νὰ κατατήσουν τύποι τῆς Εὐθύγου. Τρι-
 γωνομετρίας, δηλ. τοῦ εὐθύγραμμου τριγώνου, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ
 ὄριον τοῦ σφαιρικοῦ.

Διὰ νὰ εἴσωμεν δὲ τὴν ὁρικὴν μορφήν τῶν τύπων τούτων,
 πρέπει νὰ στηριχθῶμεν εἰς τὰ ἐξῆς ἀναπτύγματα τοῦ ἡμιτόνου
 καὶ τοῦ ἀνημιτόνου ἑνὸς τόξου κατὰ τὰς δυνάμεις τοῦ τόξου,
 τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύονται εἰς τὰ ἀνώτερα μαθηματικά :

$$\begin{aligned} \eta\mu\chi &= \chi - \frac{\chi^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{\chi^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \frac{\chi^7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \dots \\ \text{συν}\chi &= 1 - \frac{\chi^2}{1 \cdot 2} + \frac{\chi^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{\chi^6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots \end{aligned}$$

*(ἢ διὰ διαφορικῶν
 λογισμῶν ὁρίσῃ
 μαθηματικῶν
 μετὰ τὸν ἄξονα)*

(Τὰ ἀναπτύγματα αὐτὰ ἀποτελοῦν σειράς, αἱ ὁποῖαι *συγκλί-
 σουν*, δηλ. ὅσους ὅρους των καὶ ἂν λάβωμεν (διότι εἶναι ἄπειροι
 κατὰ τὸ πλῆθος) ποτὲ δὲν ὑπερβαίνομεν ἓνα πεπερασμένον ἄ-
 ριθμόν).

* Ἄν λοιπὸν εἰς τοὺς προηγουμένους τύπους τῆς α' ὁμάδος
 θέσωμεν ἀντὶ $\eta\mu\chi$ καὶ $\text{συν}\chi$ τὰ ἴσα των ἀπὸ τ' ἀναπτύγματα αὐτὰ,
 εὐρίσκομεν (ἀντὶ χ τὸ τόξον τώρα ὀνομάζεται $\frac{\alpha}{\rho}$ ἢ $\frac{\beta}{\rho}$ ἢ $\frac{\gamma}{\rho}$):

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\alpha^2}{1 \cdot 2 \rho^2} + \frac{\alpha^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \rho^4} - \dots &= \left(1 - \frac{\beta^2}{1 \cdot 2 \rho^2} + \frac{\beta^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \rho^4} - \dots\right) \times \\ \times \left(1 - \frac{\gamma^2}{1 \cdot 2 \rho^2} + \frac{\gamma^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \rho^4} - \dots\right) &+ \left(\frac{\beta}{\rho} - \frac{\beta^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \rho^3} + \dots\right) \times \\ \times \left(\frac{\gamma}{\rho} - \frac{\gamma^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \rho^3} + \dots\right) &\text{συν}A \text{ ἢ, ἂν πολλαπλασιάσωμεν καὶ τὰ} \\ \text{τὰ 2 μέλη ἐπὶ } \rho^2 \text{ (ἀφοῦ πρώτα ἀφαιρέσωμεν τὴν 1, ἢ ὁποῖα εἶναι} & \\ \text{κοινὸς ὅρος καὶ εἰς τὰ 2 μέλη):} & \end{aligned}$$

$$-\frac{\alpha^2}{1 \cdot 2} + \frac{1}{\rho^2} (\dots) = -\frac{\beta^2}{1 \cdot 2} - \frac{\gamma^2}{1 \cdot 2} + \beta\gamma \text{συν}A + \frac{1}{\rho^2} (\dots)$$

ἐγράψαμεν δηλ. κοινὸν παράγοντα εἰς ὅλους τοὺς ὅρους τοῦ α' μέλους (πλὴν τοῦ α' ὅρου) καὶ εἰς ὅλους τοὺς ὅρους τοῦ β' μέλους (πλὴν τῶν 3 πρώτων ὅρων) τὸ $\frac{1}{\rho^2}$ (διότι ὅλοι αὐτοὶ τὸ ἔχουν).

Ἡ ἰσότης αὐτὴ ἰσχύει, ὅσον μεγάλος καὶ ἂν εἶναι ὁ ρ · ἂν λοιπὸν θέσωμεν $\rho = \infty$, γίνεται (διότι ὅλοι οἱ ὅροι, ποὺ ἔχουν παράγοντα τὸ $\frac{1}{\rho^2}$, μηδενίζονται): $-\frac{\alpha^2}{1.2} = -\frac{\beta^2}{1.2} + \frac{\gamma^2}{1.2} + \beta\gamma\sigma\upsilon\nu A$, δηλ. $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A$, ὁ γνωστὸς τύπος τῆς Εὐθυγράμ. Τριγωνομ. ὁ δίδων τὸ τετράγωνον μιᾶς πλευρᾶς τοῦ τυχ. τριγώνου.

63. Ἐπίσης, ἂν γράψωμεν τοὺς τύπους τῆς β' ομάδος ὑπὸ

τὴν μορφήν $\frac{\eta\mu\left(\frac{\alpha}{\rho}\right)}{\eta\mu A} = \frac{\eta\mu\left(\frac{\beta}{\rho}\right)}{\eta\mu B} = \frac{\eta\mu\left(\frac{\gamma}{\rho}\right)}{\eta\mu \Gamma}$ καὶ θέσωμεν ἀντὶ τῶν

$$\begin{aligned} \eta\mu\tau\acute{o}\nu\tau\omicron\nu\tau\acute{o}\nu\ \acute{\alpha}\nu\alpha\pi\tau\acute{\upsilon}\gamma\mu\alpha\tau\acute{\alpha}\ \tau\omega\nu,\ \epsilon\upsilon\acute{\rho}\iota\sigma\kappa\omicron\mu\epsilon\nu\ \&: \frac{\frac{\alpha}{\rho} - \frac{\alpha^3}{1.2.3\rho^3} + \dots}{\eta\mu A} = \\ = \frac{\frac{\beta}{\rho} - \frac{\beta^3}{1.2.3\rho^3} + \dots}{\eta\mu B} = \frac{\frac{\gamma}{\rho} - \frac{\gamma^3}{1.2.3\rho^3} + \dots}{\eta\mu \Gamma} \quad \eta\ \frac{\alpha - \frac{1}{\rho^2}(\dots)}{\eta\mu A} = \\ \frac{\beta - \frac{1}{\rho^2}(\dots)}{\eta\mu B} = \frac{\gamma - \frac{1}{\rho^2}(\dots)}{\eta\mu \Gamma} \end{aligned}$$

καὶ εἰς τὸ ὄριον (διὰ $\rho = \infty$) εὐρίσκομεν τὸν γνωστὸν τύπον τῆς Εὐθυγρ. Τριγωνομετρίας :

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$$

64. Ὅμοίως, ἂν εἰς τὴν τρίτην ομάδα τύπων:

$\eta\mu\left(\frac{\beta}{\rho}\right)\sigma\upsilon\nu A = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{\rho}\right)\eta\mu\left(\frac{\gamma}{\rho}\right) - \eta\mu\left(\frac{\alpha}{\rho}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\gamma}{\rho}\right)\sigma\upsilon\nu B$, κλπ. θέσωμεν τὰς τιμὰς τῶν $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{\rho}\right)$, $\eta\mu\left(\frac{\gamma}{\rho}\right)$ κλπ., εὐρίσκομεν:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\beta}{\rho} - \frac{\beta^3}{1.2.3\rho^3} + \dots\right)\sigma\upsilon\nu A = \\ & \left(1 - \frac{\alpha^2}{1.2.\rho^2} + \dots\right)\left(\frac{\gamma}{\rho} - \frac{\gamma^3}{1.2.3\rho^3} + \dots\right) - \left(\frac{\alpha}{\rho} - \frac{\alpha^3}{1.2.3\rho^3} + \dots\right) \times \\ & \times \left(1 - \frac{\gamma^2}{1.2.\rho^2} + \dots\right)\sigma\upsilon\nu B, \end{aligned}$$

ἐπομένως, ἀφοῦ πολλαπλασιάσωμεν πρῶτα ἐπὶ ρ καὶ ἔπειτα θέσωμεν $\rho = \infty$, ὁ τύπος κατατῆ :

βουν $A = \gamma - \alpha$ συν B , ή $\gamma = \alpha$ συν $B + \beta$ συν A , τύπος γνωστός έκφράζων τήν πλευράν ενός εὐθύγραμμου τριγώνου ὡς ἄθροισμα τῶν δύο τμημάτων, εἰς τὰ ὁποῖα τήν διαιρεῖ τὸ ἀντίστοιχον ὕψος.

Ὁμοίως εὐρίσκεται καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλον τύπον τῆς Σφαιρ. Τριγωνομετρίας ὁ ἀντίστοιχός του εἰς τὴν Εὐθύγραμμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.

Θεώρημα τοῦ Legendre. (Μυίνδρου)

65. Τὸ θεώρημα τοῦτο χρησιμεύει εἰς τὸν κατὰ προσέγγισιν ὑπολογισμόν τοῦ ἐμβαδοῦ ἑνὸς σφαιρικοῦ τριγώνου, ὅταν αἱ πλευραὶ του εἶναι πολὺ μικραὶ σχετικῶς μὲ τὴν ἀκτίνα τῆς σφαίρας, ἐπὶ τῆς ὁποίας εὐρίσκεται; καὶ εἶναι τὸ ἑξῆς :

Θεώρημα : Τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς σφαιρικοῦ τριγώνου μὲ πολὺ μικρὰς πλευρὰς ὡς πρὸς τὴν ἀκτίνα τῆς σφαίρας του εἶναι περίπου ἰσοδύναμον μὲ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ εὐθύγραμμου τριγώνου τοῦ ἔχοντος πλευρὰς ἰσομήκεις πρὸς τὰς τοῦ σφαιρικοῦ. Κάθε μία δὲ ἀπὸ τὰς γωνίας A, B, Γ , τοῦ εὐθύγραμμου τούτου τριγώνου εἶναι μικροτέρα ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχὴν τῆς τοῦ σφαιρικοῦ περίπου κατὰ $\frac{2E}{3}$ δηλ. κατὰ τὸ ἐν τρίτον τῆς σφαιρικῆς ὑπεροχῆς.

Ἡ ἀπόδειξις τοῦ θεωρήματος τούτου γίνεται ὡς ἑξῆς:

Γράφομεν τὸν τύπον τῶν ἡμιτόνων ὡς ἑξῆς:

$$\eta\mu A \eta\mu \frac{\beta}{\rho} = \eta\mu B \eta\mu \frac{\alpha}{\rho},$$

(ὅπου ρ πολὺ μεγάλον ἐν σχέσει μὲ τὰς πλευρὰς τοῦ τριγώνου), ἢ, ἂν ἀναπτύξωμεν τὰ ἡμίτονα τῶν πλευρῶν κατὰ τοὺς τύπους τῆς σελίδος 41: *κατὰ τὴν μέθ. Μαιχωφίτου τοῦτο*

$$\eta\mu A \left(\frac{\beta}{\rho} - \frac{\beta^3}{6\rho^3} + \dots \right) = \eta\mu B \left(\frac{\alpha}{\rho} - \frac{\alpha^3}{6\rho^3} + \dots \right).$$

ἢ ἂν πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ ρ καὶ ἔπειτα παραλείψωμεν τοὺς ὄρους τοὺς ἔχοντας παρονομαστὰς δυνάμεις τοῦ ρ μεγαλυτέρας ἀπὸ τὴν δευτέραν:

$$\beta \left(\eta\mu A - \frac{\beta^2}{6\rho^2} \eta\mu A \right) = \alpha \left(\eta\mu B - \frac{\alpha^2}{6\rho^2} \eta\mu B \right).$$

Εἶναι ὅμως προφανῶς: $2E\rho^2 = \varepsilon$ (ἔμβαδὸν τοῦ τριγώνου), ὥστε:

$$\beta(\eta\mu A - \frac{\beta^2 \eta\mu A \cdot E}{3\varepsilon}) = \alpha(\eta\mu B - \frac{\alpha^2 \eta\mu B \cdot E}{3\varepsilon}) \quad (\alpha)$$

ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ σφαιρ. τρίγ. εἶναι σχεδὸν εὐθύγραμμον, τὸ ἔμβαδὸν του ε διαφέρει ἀπὸ τὸ ἔμβαδὸν τοῦ ἐπιπέδου τριγώνου, δηλ. ἀπὸ τὸ $\frac{1}{2} \beta\gamma\eta\mu A = \frac{1}{2} \gamma\alpha\eta\mu B$ κατὰ ἓν ποσὸν δ , πολὺ μικρὸν καὶ παραλείψιμον· ἔχομεν ἐπομένως:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \beta\gamma\eta\mu A + \delta = \frac{1}{2} \gamma\alpha\eta\mu B + \delta$$

καὶ ἐπομένως οἱ ὅροι τῆς ἰσότητος (α)

$$\frac{\beta^2 \eta\mu A \cdot E}{3\varepsilon} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\alpha^2 \eta\mu B \cdot E}{3\varepsilon}$$

εἰμποροῦν νὰ γραφοῦν:

$$\frac{\beta^2 \eta\mu A \cdot E}{\frac{3}{2} \beta\gamma\eta\mu A + \delta} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\alpha^2 \eta\mu B \cdot E}{\frac{3}{2} \gamma\alpha\eta\mu B + \delta}$$

καὶ ἐπομένως διαφέρουν ἀπὸ τοὺς

$$\frac{\beta^2 \eta\mu A \cdot E}{\frac{3}{2} \beta\gamma\eta\mu A} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\alpha^2 \eta\mu B \cdot E}{\frac{3}{2} \gamma\alpha\eta\mu B}$$

κατὰ ποσὰ πολὺ μικρὰ καὶ παραλείψιμα: θ_1, θ_2 · ὥστε ἡ ἰσότης (α) γράφεται:

$$\beta(\eta\mu A - \frac{2E\beta}{3\gamma} - \theta_1) = \alpha(\eta\mu B - \frac{2E\alpha}{3\gamma} - \theta_2)$$

καὶ ἐπομένως, ἂν παραλείψωμεν τὰ θ_1, θ_2 , ἔχομεν:

$$\beta(\eta\mu A - \frac{2E\beta}{3\gamma}) = \alpha(\eta\mu B - \frac{2E\alpha}{3\gamma})$$

καὶ ἐπειδὴ $\beta = \gamma \sigma\upsilon\nu A + \alpha \sigma\upsilon\nu \Gamma$ (κατὰ παραλείψιν νέου πολὺ μικροῦ ποσοῦ) καὶ $\alpha = \gamma \sigma\upsilon\nu B + \beta \sigma\upsilon\nu \Gamma$ (κατὰ παραλείψιν ἄλλου πολὺ μικροῦ ποσοῦ), ἔχομεν:

$$\beta \eta\mu A - \frac{2E}{3} \left(\sigma\upsilon\nu A + \frac{\alpha}{\gamma} \sigma\upsilon\nu \Gamma \right) = \alpha \eta\mu B - \frac{2E}{3} \left(\sigma\upsilon\nu B + \frac{\beta}{\gamma} \sigma\upsilon\nu \Gamma \right)$$

$$\text{ἢ καὶ:} \quad \beta \left(\eta\mu A - \frac{2E}{3} \sigma\upsilon\nu A \right) = \gamma \left(\eta\mu B - \frac{2E}{3} \sigma\upsilon\nu B \right)$$

$$\text{ἢ καὶ:} \quad \beta \eta\mu \left(A - \frac{2E}{3} \right) = \gamma \eta\mu \left(B - \frac{2E}{3} \right)$$

(ἀρκεῖ μετὰ τὸ ἀνάπτυγμα τῶν ἡμιτόνων τῶν διαφορῶν νὰ θέσωμεν ἀντὶ $\sigma\upsilon\nu \frac{2E}{3}$ τὴν 1 καὶ ἀντὶ $\eta\mu \frac{2E}{3}$ τὸ $\frac{2E}{3}$).

Διὰ τὸ πολὺ μικρὸν λοιπὸν σφαιρ. τρίγωνον ὡς πρὸς τὴν ἀ-

κτίνα ρ , ισχύει περίπου ο τύπος τῆς ἀναλογίας τῶν πλευρῶν πρὸς τὰ ἡμίτονα τῶν γωνιῶν καὶ ἐπομένως εἶναι περίπου εὐθύγραμμον μὲ πλευρὰς τὸς ἰδίας καὶ γωνίας τὰς:

$$A \sim \frac{2E}{3}, \quad B \sim \frac{2E}{3}, \quad \Gamma \sim \frac{2E}{3}.$$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ἐφαρμογὰὶ τῆς Σφαιρικῆς Τριγωνομετρίας.

ἴδ. Ἐκ τῆς ποικίλης ἐφαρμογᾶς τῆς Σφαιρικῆς Τριγωνομετρίας εἰς τὴν Μαθηματικὴν Γεωγραφίαν, τὴν Σφαιρικὴν Ἀστρονομίαν κ.τ.λ. ἀναφέρονται ἐδῶ, μόνον ὡς παραδείγματα, τὰς ἐξῆς τρεῖς:

67. 1) *Νὰ εὐρεθῇ ἡ σφαιρικὴ ἀπόστασις δύο τόπων M καὶ M_1 τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς ἀπὸ τὰ δοθέντα γεωγραφικὰ μῆκη καὶ πλάτη τῶν τόπων αὐτῶν.*

Ἐὰν γεωγρ. συντεταγμέναί τοῦ M εἶναι $(AM) = \omega$, $(\Pi M) = \mu$ καὶ τοῦ M_1 αἱ $(A_1 M_1) = \omega_1$, $(\Pi M_1) = \mu_1$. Εἰς τὸ σφαιρ. τρίγωνον $\Pi M M_1$ (ΠM , ΠM_1 , τόξα τῶν μεσημβρινῶν τῶν M , M_1 καὶ $M M_1$, = τόξ. μεγίστου κύκλου) ἔχομεν: $M \Pi = 90^\circ - \omega$, $M_1 \Pi = 90^\circ - \omega_1$ καὶ γων. $M \Pi M_1 = \pm(\mu_1 - \mu)$.

Ὡστε ἔχομεν νὰ ἐπιλύσωμεν σφαιρικὸν τρίγωνον μὲ γνωστὰς δύο πλευρὰς καὶ τὴν περιεχομένην γωνίαν καὶ ἐπομένως:

$$\text{συν}(M M_1) = \frac{\text{συνασιν}(\beta - \varphi)}{\text{συν}\varphi}; \quad (\text{εφ}\varphi = \text{εφασιν}\Gamma).$$

68. 2) *Νὰ εὐρεθῇ (εἰς τετρ. μέτρα) τὸ ἐμβαδὸν ε ἐνὸς σφαιρικοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς ἀπὸ τὰς γεωγραφικὰς συντεταγμένας τῶν κορυφῶν του.*

Θὰ εὐρωμεν πρῶτα (κατὰ τὸ προηγούμενον) τὰς 3 πλευρὰς α , β , γ ἀπὸ τὰς γεωγρ. συντεταγμένας τῶν ἄκρων καὶ ἔπειτα τὸ ἐμβαδὸν ἀπὸ τοῦ τύπου:

$$\text{εφ}\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) = \sqrt{\text{εφ}\left(\frac{\tau}{2}\right)\text{εφ}\left(\frac{\tau-\alpha}{2}\right)\text{εφ}\left(\frac{\tau-\beta}{2}\right)\text{εφ}\left(\frac{\tau-\gamma}{2}\right)} \quad \text{καὶ } \varepsilon = 2E \cdot (6000000)^2.$$

69. 3) *Ν' ἀναχθῇ εἰς τὸν ὀριζόντιον ἡ μετρηθεῖσα κεκλι-*

μένη πρὸς αὐτὸν γωνία AOB : δηλ. νὰ ὑπολογισθῇ ἡ προβολὴ τῆς AOB ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου, ἢ A_1OB_1 , τὴν ὁποίαν σχηματίζουν αἱ τομαὶ OA_1 , OB_1 , τῶν κατακορύφων κύκλων ZOA , ZOB (Z τὸ ζενίθ τοῦ τόπου) μὲ τὸν ὀριζοντα. Εἶναι προφανῶς (εἰς μοίρας): $\gamma\omega\nu A_1OB_1 = \text{τόξ. } A_1B_1 = \text{δίεδρ. γων. } (ZOA_1, ZOB_1)$. Τοῦ σχηματιζομένου σφαιρικοῦ τριγώνου ZAB (ZA, ZB αἱ **ξενιδιακαὶ** ἀποστάσεις τῶν A, B ; AB τὸ τόξον τοῦ μεγίστου κύκλου τοῦ διὰ τῶν A, B διερχομένου) γνωρίζομεν καὶ τὰς τρεῖς πλευράς: τὴν AB (δοθ. γων. AOB) καὶ τὰς ξενιδιακὰς ἀποστάσεις ZA, ZB (μετρουμένας διὰ τοῦ **θεοδολίχου**). Ἐπομένως θὰ εὑρωμεν τὴν ἄγνωστον γωνίαν Z ἀπὸ τὸν τύπον :

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{Z}{2}\right) = \sqrt{\frac{\eta\mu(\tau-\alpha)\eta\mu(\tau-\beta)}{\eta\mu\tau\eta\mu(\tau-\gamma)}} \quad (\sigma = ZB, \beta = ZA, \gamma = AB).$$

Τ Ε Λ Ο Σ

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

α') Τύποι γωνιομετρικοί.

$$\eta\mu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1.$$

$$\eta\mu(90^\circ + \alpha) = \sigma\upsilon\nu\alpha.$$

$$\sigma\upsilon\nu(90^\circ + \alpha) = \pm\eta\mu\alpha.$$

$$\eta\mu(180^\circ \mp \alpha) = \pm\eta\mu\alpha.$$

$$\sigma\upsilon\nu(180^\circ \mp \alpha) = -\sigma\upsilon\nu\alpha.$$

$$\eta\mu(360^\circ - \alpha) = -\eta\mu\alpha.$$

$$\sigma\upsilon\nu(360^\circ - \alpha) = \sigma\upsilon\nu\alpha.$$

$$\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \pm \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha.$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \mp \eta\mu\alpha\eta\mu\beta.$$

$$\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha.$$

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha.$$

$$\eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}}.$$

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}}.$$

$$\varepsilon\varphi\alpha = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}, \quad \sigma\varphi\alpha = \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha}.$$

$$\eta\mu\alpha = \frac{\pm\varepsilon\varphi\alpha}{\sqrt{1 + \varepsilon\varphi^2\alpha}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \sigma\varphi^2\alpha}}.$$

$$\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \varepsilon\varphi^2\alpha}} = \frac{\pm \sigma\varphi\alpha}{\sqrt{1 + \sigma\varphi^2\alpha}}.$$

$$\varepsilon\varphi\alpha + \sigma\varphi\alpha = \frac{1}{\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha}.$$

$$\varepsilon\varphi(90^\circ \mp \alpha) = \pm\sigma\varphi\alpha.$$

$$\sigma\varphi(90^\circ \mp \alpha) = \pm\varepsilon\varphi\alpha.$$

$$\varepsilon\varphi(180^\circ \mp \alpha) = \mp\varepsilon\varphi\alpha.$$

$$\sigma\varphi(180^\circ \mp \alpha) = \mp\sigma\varphi\alpha.$$

$$\varepsilon\varphi(360^\circ - \alpha) = -\varepsilon\varphi\alpha.$$

$$\sigma\varphi(360^\circ - \alpha) = -\sigma\varphi\alpha.$$

$$\varepsilon\varphi(\alpha + \beta) = \frac{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta}{1 + \varepsilon\varphi\alpha \cdot \varepsilon\varphi\beta}.$$

$$\varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{2\varepsilon\varphi\alpha}{1 - \varepsilon\varphi^2\alpha}.$$

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \sigma\eta\eta\alpha}{1 + \sigma\eta\eta\alpha}}.$$

$$\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta = 2\eta\mu\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\sigma\eta\eta\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right).$$

$$\sigma\eta\eta\alpha + \sigma\eta\eta\beta = 2\sigma\eta\eta\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\sigma\eta\eta\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right).$$

$$\sigma\eta\eta\alpha - \sigma\eta\eta\beta = 2\eta\mu\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right).$$

$$\frac{\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta}{\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta} = \frac{\varepsilon\varphi\frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\varepsilon\varphi\frac{1}{2}(\alpha + \beta)}.$$

$$\frac{\sigma\eta\eta\alpha - \sigma\eta\eta\beta}{\sigma\eta\eta\alpha + \sigma\eta\eta\beta} = -\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right).$$

$$\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta = \frac{\eta\mu(\alpha + \beta)}{\sigma\eta\eta\alpha\sigma\eta\eta\beta}.$$

$$\sigma\varphi\alpha + \sigma\varphi\beta = \frac{\eta\mu(\beta + \alpha)}{\eta\mu\alpha\eta\mu\beta}.$$

$$\frac{\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\beta}{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta} = \frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\eta\mu(\alpha + \beta)}.$$

$$\frac{\sigma\varphi\alpha - \sigma\varphi\beta}{\sigma\varphi\alpha + \sigma\varphi\beta} = \frac{\eta\mu(\beta - \alpha)}{\eta\mu(\beta + \alpha)}.$$

β') *Αριθμητικά τιμαί.*

$$\eta\mu 45^\circ = \sigma\eta\eta 45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2}.$$

$$\eta\mu 30^\circ = \sigma\eta\eta 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

$$\sigma\eta\eta 30^\circ = \eta\mu 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}.$$

$$\eta\mu 18^\circ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}.$$

$$\sigma\eta\eta 18^\circ = \frac{1}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}.$$

$$\eta\mu 36^\circ = \frac{1}{4}\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}.$$

$$\sigma\eta\eta 36^\circ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}.$$

$$\sigma\eta\eta(22^\circ 30') = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}}.$$

$$\sigma\eta\eta(15^\circ) = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}}.$$

$$\varepsilon\varphi(30^\circ) = \sigma\varphi 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\varepsilon\varphi(45^\circ) = \sigma\varphi(45^\circ) = 1.$$

$$\varepsilon\varphi(60^\circ) = \sigma\varphi 30^\circ = \sqrt{3}.$$

γ') *Τύποι τριγωνομετρικοί.*

1) *Όρθογ. τρίγ.*

$$\beta = \alpha\sigma\eta\eta\Gamma = \alpha\eta\mu\beta.$$

$$\gamma = \alpha\eta\mu\Gamma = \alpha\sigma\eta\eta\beta.$$

$$\beta = \gamma\sigma\varphi\Gamma = \gamma\varepsilon\varphi\beta.$$

$$\gamma = \beta\varepsilon\varphi\Gamma = \beta\sigma\varphi\beta.$$

2) *Τυχ. τρίγ.*

$$\frac{\alpha}{\eta\mu\alpha} = \frac{\beta}{\eta\mu\beta} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = 2\rho \text{ (ἀκτίς περικύκλ.)}$$

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\eta\eta\alpha.$$

$$\eta\mu\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta\gamma}}.$$

$$\sigma\eta\eta\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{\beta\gamma}}.$$

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}}.$$

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}.$$

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}.$$

$$(\varepsilon\mu\beta.) \varepsilon = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} = \frac{\alpha\beta\gamma}{4\rho}.$$

(ἀκτίς ἔγγεγορ. κύκλ.)

$$\rho = \frac{\varepsilon}{\tau} = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}}.$$

$$P \cdot Q = \frac{\alpha\beta\gamma}{4\tau}.$$

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίς
Πρόλογος	3
Εισαγωγή :	
Α') Σφαιρομετρία και Σφαιρ. Τριγωνομετρία	5— 6
Β') Λήμματα από την Σφαιρομετρίαν	6— 8
Μέρος Α'. Θεμελ. ομάδες τύπων :	
Κεφ. Α'. Αί τρεις πρώται ομάδες:	
Α') Τύποι διὰ τὰ συνημίτονα τῶν πλευρῶν	9—11
Β') Τύποι διὰ τὰ ἡμίτονα τῶν πλευρῶν	11—12
Γ') Τύποι μετὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ τριγώνου	12—13
Κεφ. Β'. Πόλωσις τῶν προηγουμένων τύπων	14—15
Κεφ. Γ'. Τύποι τῶν ὀρθογ. καὶ ὀρθοπλ. τριγώνων:	
α') Ὄρθογώνια τρίγωνα	16—17
β') Ὄρθόπλευρα τρίγωνα	17
Κεφ. Δ'. Μετασχηματισμὸς τῶν τύπων εἰς ὑπολο- μιστοὺς διὰ τῶν λογαρίθμων :	
α') Ὑπολογισμὸς τῆς πλευρᾶς τοῦ α' μέλους	17—18
β') Ὑπολογισμὸς τῆς γωνίας τοῦ α' μέλους	18
γ') Ὑπολογισμὸς τῶν γωνιῶν ἀπὸ τὰς πλευρὰς	18—19
δ') Ὑπολογισμὸς τῶν πλευρῶν ἀπὸ τὰς γωνίας	19—20
Μέρος Β'. Οἱ σπουδαιότεροι ἄλλοι τύποι :	
Κεφ. Α'. Τύποι ἀναλογιῶν :	
Α') Ἀναλογίαι τῶν ἐφαπτομένων	21
Β) Ἀναλογίαι τοῦ Delambre (ἢ τοῦ Gauss)	22—23
Γ' Ἀναλογίαι τοῦ Napier	23—24
Κεφ. Β'. Τύποι τῆς περιμέτρου καὶ τῆς σφαιρ. ὑπερ.	
Α'. Σχέσεις μεταξὺ τ καὶ Ε	24—26
Β)) Πολικὴ ἀναλλοίωτος τοῦ Lhuillier	26—27
Γ') Ἀκτίς τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου	27
Δ') Ἀκτίς τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου	27—28
Ἀσκήσις	28—30
Μέρος Γ'. Ἐπίλυσις τῶν σφαιρ. τριγώνων.	
Κεφ. Α'. Ἐπίλυσις τῶν ὀρθογ. καὶ ὀρθοπλ. τριγών.	
Α') Ὄρθογώνια τρίγωνα	30—34
Β') Ὄρθόπλευρα τρίγωνα	34—35
Κεφ. Β'. Ἐπίλυσις ὀποιωνδ. σφαιρικῶν τριγώνων	35—38
Ἀριθμητικαὶ ἐφαρμογαί	38—39
Μέρος Δ'. Ἡ Σφαιρ. τριγων. ἀπὸ ἀνωτ. ἀπόψ.	
Κεφ. Α'. Εὐθ. τῶν θεμ. τύπων διὰ τῆς Ἀναλ. Γεωμετρ.	39—40
Κεφ. Β'. Ἡ Εὐθ. Τριγων. ὡς ὀρθὴ περίπτωσις Σφ.	40—43
Κεφ. Γ'. Θεώρημα τοῦ Legendre	43—45
Παράρτημα (Ἐφαρμογαὶ τῆς Σφ. Τριγωνομ.)	45—46
Οἱ κυριώτεροι τύποι τῆς Εὐθυγρ. Τριγωνομετρίας	46—47

Handwritten signature



024000028099

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Είς