

Κ. ΙΟΥΡΑΝΙΔΗΣ - Δ. Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ - Κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ  
Α. ΜΑΚΡΙΑΔΗΣ - Β. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΑΘΗΝΑ 1981

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέ απόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὰ δι-  
δακτικά βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυ-  
κείου τυπώνονται ἀπό τόν Ὀργανισμό Ἐκδόσεως  
Διδακτικῶν Βιβλίων καί μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ.

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β. ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβερνήσεως τα δι-  
δακτικά βιβλία του Δημοτικού Γυμνασίου και Λυ-  
κείου τακτώνονται υπό τον Οργανισμό Έκδοσης  
Διδακτικών Βιβλίων και μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ.

Κ. ΙΟΥΡΑΝΙΔΗΣ - Δ. Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ - Κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ  
Α. ΜΑΚΡΙΔΗΣ - Β. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΑΘΗΝΑΙ 1981

Α. ΙΟΥΡΑΚΙΝΗΣ - Α. Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣ - Κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ  
Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ - Β. ΜΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΕΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΑΘΗΝΑΙ 1981

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

### ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1. Τό σύνολο  $C$  τών μιγαδικών αριθμών
2. Γεωμετρική παράσταση τών μιγαδικών αριθμών
3. Γεωμετρικές εφαρμογές του μέτρου τών μιγαδικών αριθμών
4. Πολικές συντεταγμένες μιγαδικού αριθμού
5. Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού αριθμού
6. Ρίζες τών μιγαδικών αριθμών
7. Σύντομη άνακεφαλαίωση
8. Άσκήσεις για επανάληψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΙΝΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

1. Τίτλος
2. Τίτλος
3. Τίτλος
4. Τίτλος
5. Τίτλος
6. Τίτλος
7. Τίτλος
8. Τίτλος
9. Τίτλος
10. Τίτλος

## 1. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ C ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

### 1.1. Εισαγωγή

Στήν προηγούμενη τάξη μάθαμε ότι οι ρίζες τῆς δευτεροβάθμιας ἐξίσωσης

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0, \quad \alpha \neq 0, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R} \quad (1)$$

δίνονται ἀπό τόν τύπο

$$x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \quad (2)$$

\*Αν εἶναι  $\beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0$ , τότε οι ρίζες αυτές είναι πραγματικές. \*Αν όμως είναι  $\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$ , τότε ἡ (1) δέν ἔχει ρίζες στό  $\mathbf{R}$ . Στήν τελευταία αὐτή περίπτωση οι ρίζες τῆς (1) ἔχουν τή μορφή  $\kappa \pm \lambda i$  καί προκύπτουν ἀπό τόν τύπο (2), ἀν αὐτός γραφτεῖ<sup>(1)</sup>

$$x = -\frac{\beta}{2\alpha} \pm \frac{\sqrt{4\alpha\gamma - \beta^2}}{2\alpha} i \quad (3)$$

Οἱ ἀριθμοὶ  $\kappa \pm \lambda i$  ἀνήκουν σ' ἓνα σύνολο εὐρύτερο ἀπό τό  $\mathbf{R}$ , στό σύνολο τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

Εἰδικότερα ἡ ἐξίσωση  $x^2 = -1 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 0$  ἔχει ρίζες τίς  $\pm i$ , δηλαδή εἶναι  $i^2 = -1$  καί  $(-i)^2 = -1$ .

Μετά τίς παραπάνω παραδοχές καί τή διαπίστωση ὅτι  $i^2 = -1$  καταλήξαμε στό συμπέρασμα ὅτι οἱ μιγαδικοί ἀριθμοὶ «συμπεριφέρονται» ὅπως καί τὰ δίνονμα  $a + \beta x$  μέ  $x = i$ .

\*Ὅς θυμηθοῦμε μέ παραδείγματα πῶς ἐκτελοῦμε τίς βασικές πράξεις πρόσθεση καί πολλαπλασιασμό στό σύνολο τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν. Γιά τοὺς μιγαδικούς ἀριθμούς  $3 + 2i$  καί  $4 + 5i$  ἔχουμε:

$$1. \quad (3 + 2i) + (4 + 5i) = 3 + 2i + 4 + 5i = (3 + 4) + (2 + 5)i = 7 + 7i, \text{ καί γενικά} \\ (a_1 + \beta_1 i) + (a_2 + \beta_2 i) = (a_1 + a_2) + (\beta_1 + \beta_2)i \quad (4)$$

1. Ἡ μορφή αὐτή ὀφείλεται στόν Ἑλβετό μαθηματικό τοῦ 18ου αἰῶνα Euler (1707-1783) ὁ ὁποῖος συμβόλισε τήν  $\sqrt{-1}$  μέ τό  $i$  πού εἶναι τό ἀρχικό γράμμα τῆς λέξεως *imaginare* (φανταστικός). Προηγούμενως οἱ μαθηματικοὶ τοῦ 16ου αἰ. εἶχαν γράψει «τυπικά»  $\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma} = \sqrt{4\alpha\gamma - \beta^2} \cdot \sqrt{-1}$ , ὅταν  $\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$ .

Τόν 19ο αἰ. ὁ Γερμανὸς μαθηματικὸς Gauss (1777-1855) παρέστησε γεωμετρικά τοὺς μιγαδικούς ἀριθμούς μέ σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου καί ἀπέδειξε ἔτσι ὅτι οἱ μιγαδικοί ἀριθμοὶ εἶναι ἐξίσου συγκεκριμένοι (καί ὄχι φανταστικοί) ὅπως καί οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοί.

## I 1.2.

$$\begin{aligned} 2. \quad (3+2i) \cdot (4+5i) &= (3 \cdot 4) + (3 \cdot 5)i + (2 \cdot 4)i + (2 \cdot 5)i^2 \\ &= (3 \cdot 4) + (3 \cdot 5)i + (2 \cdot 4)i + (2 \cdot 5)(-1) \\ &= (3 \cdot 4 - 2 \cdot 5) + (3 \cdot 5 + 2 \cdot 4)i = 2 + 23i, \quad \text{καί γενικά} \end{aligned}$$

$$(a_1 + \beta_1 i) \cdot (a_2 + \beta_2 i) = (a_1 a_2 - \beta_1 \beta_2) + (a_1 \beta_2 + a_2 \beta_1) i \quad (5)$$

Ακόμα είναι φανερό ότι στο μιγαδικό αριθμό  $\alpha + \beta i$  μπορούμε να αντιστοιχίσουμε το διατεταγμένο ζεύγος  $(\alpha, \beta)$  και αντίστροφα. Στην επόμενη παράγραφο θά ορίσουμε τις βασικές πράξεις πρόσθεση και πολλαπλασιασμό στο σύνολο των διατεταγμένων ζευγών του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  έτσι, ώστε να το ταυτίσουμε με το σύνολο των μιγαδικών αριθμών.

## 1.2. Το σύνολο $\mathbf{C}$ σαν σύνολο διατεταγμένων ζευγών του $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ .

Θεωρούμε το σύνολο

$$\mathbf{C} = \{z | z = (\alpha, \beta), \alpha \in \mathbf{R}, \beta \in \mathbf{R}\}$$

καί τή γνωστή ισότητα των στοιχείων του

$$(\alpha_1, \beta_1) = (\alpha_2, \beta_2) \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \quad \text{καί} \quad \beta_1 = \beta_2. \quad (1)$$

Στο σύνολο  $\mathbf{C}$  ορίζουμε δύο βασικές πράξεις, τήν πρόσθεση και τόν πολλαπλασιασμό, μέ τά συνήθη σύμβολα  $''+''$ , και  $''\cdot''$ . Τό άθροισμα και τό γινόμενο δύο στοιχείων  $(\alpha_1, \beta_1)$  και  $(\alpha_2, \beta_2)$  του  $\mathbf{C}$  ορίζονται μέ τόν ακόλουθο τρόπο:

$$\text{Τό άθροισμα:} \quad (\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2) \quad (2)$$

$$\text{Τό γινόμενο:} \quad (\alpha_1, \beta_1) \cdot (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2, \alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \quad (3)$$

(Δείτε τή σκοπιμότητα αυτών των ορισμών παραβάλλοντάς τους μέ τούς τύπους (4) και (5) τής παραγράφου 1.1.).

\*Ας πάρουμε τώρα τό υποσύνολο  $\mathbf{R}'$  του  $\mathbf{C}$ , πού έχει για στοιχεία του όλα τά στοιχεία τής μορφής  $(\alpha, 0)$ , και άς κάνουμε μεταξύ αυτού και του  $\mathbf{R}$  τήν άμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

$$\mathbf{R}' \ni (\alpha, 0) \leftrightarrow \alpha \in \mathbf{R}$$

Για δύο στοιχεία  $(\alpha_1, 0)$  και  $(\alpha_2, 0)$  του  $\mathbf{R}'$  είναι

$$(\alpha_1, 0) + (\alpha_2, 0) = (\alpha_1 + \alpha_2, 0) \leftrightarrow (\alpha_1 + \alpha_2) \in \mathbf{R} \quad \text{καί}$$

$$(\alpha_1, 0) \cdot (\alpha_2, 0) = (\alpha_1 \alpha_2, 0) \leftrightarrow (\alpha_1 \cdot \alpha_2) \in \mathbf{R}$$

Δηλαδή: α) Τό άθροισμα δύο στοιχείων του  $\mathbf{R}'$  αντιστοιχίζεται άμφιμονοσήμαντα στό άθροισμα των αντίστοιχων στοιχείων του  $\mathbf{R}$ , και

β) Τό γινόμενο δύο στοιχείων του  $\mathbf{R}'$  αντιστοιχίζεται άμφιμονοσήμαντα στό γινόμενο των αντίστοιχων στοιχείων του  $\mathbf{R}$ .

Η διαπίστωση μας αυτή μάς επιτρέπει να «ταυτίσουμε» τό  $\mathbf{R}'$  μέ τό  $\mathbf{R}$  και να θεωρούμε έτσι ότι είναι  $\mathbf{R} \subset \mathbf{C}$ . Μετά από αυτό μπορούμε να γράφουμε:

$$(\alpha, 0) = \alpha \quad (4)$$

\*Αν όρίσουμε  $(\alpha, \beta)^2 = (\alpha, \beta) \cdot (\alpha, \beta)$  και συμβολίσουμε με  $i$  τό στοιχείο  $(0, 1)$ , τότε θά είναι:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

καί σύμφωνα μέ τήν (4)

$$i^2 = -1 \quad (5)$$

\*Επειδή όμως είναι  $(\beta, 0)i = (\beta, 0) \cdot (0, 1) = (0, \beta)$ , θά έχουμε:

$$(\alpha, \beta) = (\alpha, 0) + (0, \beta) = \alpha + (\beta, 0)i = \alpha + \beta i \quad (6)$$

\*Αρα: τό τυχόν στοιχείο  $(\alpha, \beta)$  τοῦ  $\mathbf{C}$  «ταυτίζεται» μέ τό γνωστό μας μιγαδικό αριθμό  $\alpha + \beta i$ . \*Έτσι τό σύνολο  $\mathbf{C}$  έφοδιασμένο μέ τίς πράξεις τής προσθέσεως καί τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, πού τά έξαγόμενά τους δίνουν οί ισότητες (2) καί (3), είναι τό σύνολο τῶν μιγαδικῶν αριθμῶν καί τά διατεταγμένα ζεύγη-στοιχεία τοῦ  $\mathbf{C}$ —όνομάζονται μιγαδικοί αριθμοί.

Στό λογισμό συνήθως οί μιγαδικοί αριθμοί χρησιμοποιοῦνται μέ τή μορφή  $\alpha + \beta i$  αντί  $(\alpha, \beta)$ . \*Η χρησιμότητα τής μορφῆς  $(\alpha, \beta)$  θά φανεί στή γεωμετρική τους παράσταση.

\*Η παραπάνω «ταύτιση»  $(\alpha, 0) = \alpha$  μᾶς επιτρέπει νά γράψουμε

$$\kappa \cdot (\alpha, \beta) = (\kappa \alpha, \kappa \beta), \quad \kappa \in \mathbf{R}. \quad (7)$$

### 1.3. \*Ιδιότητες τής προσθέσεως καί τοῦ πολλαπλασιασμοῦ στό $\mathbf{C}$ .

#### 1. \*Ιδιότητες τής προσθέσεως

Είναι φανερό ότι ή πρόσθεση, όπως όρίστηκε, έχει τίς ιδιότητες

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \quad (\text{άντιμεταθετική})$$

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3) \quad (\text{προσεταιριστική})$$

γιά όλα τά  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbf{C}$ .

\*Ακόμα ισχύουν οί ακόλουθες προτάσεις:

**Πρόταση 1.** \*Υπάρχει ένας καί μόνο μιγαδικός αριθμός  $\zeta^*$  τέτοιος, ώστε γιά όλους τούς μιγαδικούς αριθμούς  $z$  νά ισχύει:

$$z + \zeta^* = z \quad (1)$$

\*Απόδειξη. \*Αν είναι  $z = \alpha + \beta i$  καί  $\zeta^* = x + yi$ , τότε ή (1) γράφεται ισοδύναμα

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta i) + (x + yi) = \alpha + \beta i &\Leftrightarrow (\alpha + x) + (\beta + y)i = \alpha + \beta i \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha + x = \alpha \quad \text{καί} \quad \beta + y = \beta \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{καί} \quad y = 0 \end{aligned}$$

\*Αρα τό στοιχείο  $\zeta^* = 0 + 0i$  είναι τό μοναδικό πού ίκανοποιεί τήν (1)

### I 1.3.

για κάθε  $z \in \mathbf{C}$ . Το στοιχείο  $0 + 0i$  ονομάζεται ουδέτερο στοιχείο για την πρόσθεση στο  $\mathbf{C}$  και για εύκολία τό λέμε μηδέν και τό συμβολίζουμε μέ  $0$ .

**Πρόταση 2.** Για κάθε μιγαδικό αριθμό  $z$  υπάρχει ένας και μόνο μιγαδικός αριθμός  $z^*$  τέτοιος, ώστε νά ισχύει:

$$z + z^* = 0 \quad (2)$$

**Απόδειξη.** \*Αν είναι  $z = \alpha + \beta i$  και  $z^* = x + yi$ , τότε ή (2) γράφεται ισοδύναμα

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta i) + (x + yi) = 0 &\Leftrightarrow (\alpha + x) + (\beta + y)i = 0 + 0i \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha + x = 0 \text{ και } \beta + y = 0 \Leftrightarrow x = -\alpha \text{ και } y = -\beta \end{aligned}$$

\*Αρα ό μιγαδικός αριθμός  $z^* = (-\alpha) + (-\beta)i$  είναι ό μοναδικός για τό μιγαδικό αριθμό  $z = \alpha + \beta i$ , πού ικανοποιεί τή σχέση (2).

\*Ο μιγαδικός αριθμός  $(-\alpha) + (-\beta)i$ , πού για εύκολία τόν γράφουμε  $-\alpha - \beta i$  και τόν συμβολίζουμε μέ  $-z$ , ονομάζεται αντίθετος του  $z = \alpha + \beta i$  ή τό συμμετρικό στοιχείο του  $z = \alpha + \beta i$  για τήν πρόσθεση στο  $\mathbf{C}$ .

**Πρόταση 3.** Στο σύνολο  $\mathbf{C}$  ισχύει ή ισοδυναμία

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow z_1 + z = z_2 + z \quad (3)$$

**Απόδειξη.** α) 'Η συνεπαγωγή  $z_1 = z_2 \Rightarrow z_1 + z = z_2 + z$  για όλα τά  $z \in \mathbf{C}$  είναι φανερή από τόν όρισμό τής προσθέσεως.

β) Θα δείξουμε τήν συνεπαγωγή  $z_1 + z = z_2 + z \Rightarrow z_1 = z_2$ , πού αποτελεί τό νόμο τής διαγραφής στην πρόσθεση στο  $\mathbf{C}$ .

Πράγματι:

$$\begin{aligned} z_1 + z = z_2 + z &\Rightarrow (z_1 + z) + (-z) = (z_2 + z) + (-z) \\ &\Leftrightarrow z_1 + [z + (-z)] = z_2 + [z + (-z)] \\ &\Leftrightarrow z_1 + 0 = z_2 + 0 \\ &\Leftrightarrow z_1 = z_2 \end{aligned}$$

**Πρόταση 4.** 'Η εξίσωση  $z_1 + z = z_2$ ,  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$  (4) έχει μοναδική λύση στο  $\mathbf{C}$  τήν  $z = z_2 + (-z_1)$ .

**Απόδειξη.** \*Έχουμε διαδοχικά

$$\begin{aligned} z_1 + z = z_2 &\Leftrightarrow (z_1 + z) + (-z_1) = z_2 + (-z_1) \\ &\Leftrightarrow (z + z_1) + (-z_1) = z_2 + (-z_1) \\ &\Leftrightarrow z + [z_1 + (-z_1)] = z_2 + (-z_1) \\ &\Leftrightarrow z + 0 = z_2 + (-z_1) \\ &\Leftrightarrow z = z_2 + (-z_1). \end{aligned}$$

\*Η μοναδική λύση τής εξίσώσεως (4) ονομάζεται διαφορά του  $z_1$  από τό  $z_2$  και συμβολίζεται μέ  $z_2 - z_1$ . Δηλαδή είναι

$$z_2 - z_1 = z_2 + (-z_1) \quad (5)$$

\*Η πράξη, με την οποία βρίσκουμε τή διαφορά δύο μιγαδικών αριθμών, ονομάζεται **ἀφαίρεση**.

## II. Ίδιότητες του ὀλλαπλασιασμοῦ

Εἶναι φανερό ὅτι καί ὁ ὀλλαπλασιασμός ἔχει τῖς ἰδιότητες

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= z_2 \cdot z_1 && (\text{ἀντιμεταθετική}) \\ (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 &= z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) && (\text{προσεταιριστική}) \end{aligned}$$

καί ἀκόμη εἶναι πράξη ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν πρόσθεση, δηλαδὴ

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$$

γιά ὅλα τὰ  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbf{C}$ .

Θὰ δείξουμε ὅτι καί στὸν ὀλλαπλασιασμό ἰσχύουν ἀντίστοιχες προτάσεις με ἐκεῖνες πού δείξαμε στὴν πρόσθεση.

**Πρόταση 1'.** Ὑπάρχει ἕνας καί μόνο  $\zeta^* \in \mathbf{C}$  τέτοιος, ὥστε γιά ὅλα τὰ  $z \in \mathbf{C}$  νά ἰσχύει:

$$z \cdot \zeta^* = z \quad (1')$$

\***Απόδειξη.** Ἐάν εἶναι  $z = \alpha + \beta i$  καί  $\zeta^* = x + yi$ , τότε ἡ (1') γράφεται ἰσοδύναμα

$$(\alpha + \beta i)(x + yi) = \alpha + \beta i \Leftrightarrow (\alpha x - \beta y) + (\alpha y + \beta x)i = \alpha + \beta i \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow \alpha x - \beta y = \alpha$  καί  $\alpha y + \beta x = \beta$ . Ἐάν ἐπιπλέον εἶναι  $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ , τότε ἔχουμε τή μοναδική λύση  $x=1$  καί  $y=0$ , ἐνῶ, ἂν εἶναι  $\alpha^2 + \beta^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$ , τότε τὸ σύστημα εἶναι ταυτοτικό καί συνεπῶς ἔχει καί τή λύση  $x=1, y=0$ .

\*Ἄρα ὁ μιγαδικὸς ἀριθμὸς  $\zeta^* = 1 + 0i$  εἶναι ὁ μοναδικὸς πού ἱκανοποιεῖ τήν (1') γιά κάθε  $z \in \mathbf{C}$ . Ὁ μιγαδικὸς ἀριθμὸς  $1 + 0i$  ὀνομάζεται οὐδέτερο στοιχεῖο γιά τὸν ὀλλαπλασιασμό στό  $\mathbf{C}$  καί γιά εὐκολία τὸν λέμε **μονάδα** καί τὸν συμβολίζουμε με  $1$ .

**Πρόταση 2'.** Γιά κάθε  $z \in \mathbf{C}$  με  $z \neq 0$  ὑπάρχει ἕνα καί μόνο  $z^* \in \mathbf{C}$ , ὥστε νά ἰσχύει:

$$z \cdot z^* = 1 \quad (2')$$

\***Απόδειξη.** Ἐάν εἶναι  $z = \alpha + \beta i \neq 0$  καί  $z^* = x + yi$ , ἡ (2') γράφεται ἰσοδύναμα

$$(\alpha x - \beta y) + (\alpha y + \beta x)i = 1 + 0i \Leftrightarrow \alpha x - \beta y = 1 \quad \text{καί} \quad \beta x + \alpha y = 0$$

καί, ἀφοῦ εἶναι  $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ , τὸ σύστημα θὰ ἔχει τή μοναδική λύση  $x = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}$

καί  $y = \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2}$ . Ἐρα ὁ μιγαδικὸς ἀριθμὸς  $z^* = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} + \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2}i$  εἶναι ὁ μοναδικὸς γιά τὸ μιγαδικὸ ἀριθμὸ  $z = \alpha + \beta i \neq 0$  πού ἱκανοποιεῖ τή (2').

\*Ὁ μιγαδικὸς ἀριθμὸς  $\frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} + \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2}i$ , πού συμβολίζεται  $z^{-1}$  ἢ  $\frac{1}{z}$ , ὀνομάζεται ἀντίστροφος τοῦ  $z$  ἢ καί τὸ συμμετρικὸ στοιχεῖο τοῦ  $z = \alpha + \beta i \neq 0$  γιά τὸν ὀλλαπλασιασμό στό  $\mathbf{C}$ . Εἶναι λοιπόν,

## I 1.4.

$$z^{-1} = (\alpha + \beta i)^{-1} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} + \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2} i, \quad z \neq 0$$

**Πρόταση 3'.** Στο  $\mathbf{C}$  ισχύει η συνεπαγωγή:  $z_1 \cdot z = z_2 \cdot z$  και  $z \neq 0 \Rightarrow z_1 = z_2$  (3')  
(Η πρόταση αυτή είναι ο νόμος της διαγραφής στον πολλαπλασιασμό στο  $\mathbf{C}$  και η απόδειξη αφήνεται για άσκηση).

**Πρόταση 4'.** Η εξίσωση  $z_1 \cdot z = z_2$ ,  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$ ,  $z_1 \neq 0$  (4') έχει μοναδική λύση στο  $\mathbf{C}$  την  $z = z_2 \cdot z_1^{-1}$   
(Η απόδειξη αφήνεται για άσκηση).

Η μοναδική λύση της εξίσωσης (4') ονομάζεται πηλίκο του  $z_2$  διά  $z_1$  και συμβολίζεται  $z_2 : z_1$  ή  $\frac{z_2}{z_1}$ . Δηλαδή είναι

$$\frac{z_2}{z_1} = z_2 \cdot z_1^{-1}, \quad z_1 \neq 0 \quad (5')$$

Η πράξη με την οποία βρίσκουμε το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών, ονομάζεται **διαίρεση**.

- Σ' ένα μιγαδικό αριθμό  $z = \alpha + \beta i$  τό  $\alpha$  ονομάζεται πραγματικό μέρος και τό  $\beta$  ονομάζεται φανταστικό μέρος<sup>(1)</sup>.
- Οί δυνάμεις  $(\alpha + \beta i)^k$ ,  $k \in \mathbf{Z}$  ορίζονται όπως και στο  $\mathbf{R}$  με  $z^1 = z$  για κάθε  $z \in \mathbf{C}$ ,  $z^0 = 1$  όταν  $z \neq 0$ , και  $z^{-k} = \frac{1}{z^k}$  όταν  $k < 0$ . Οί δυνάμεις υπολογίζονται όπως και οί δυνάμεις  $(\alpha + \beta x)^k$  με  $x = i$  και  $i^2 = -1$ .

### 1.4. Άσκήσεις

1. Δείξτε ότι:  $i^0 + i^1 + i^2 + i^3 + i^4 + i^5 + i^6 + i^7 = 0$ .
2. Προσδιορίστε τά  $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ , ώστε οί μιγαδικοί αριθμοί  $(3\alpha + 14\beta) + (2\alpha - \beta)i$  και  $7 - i$  νά είναι ίσοι.
3. Αν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$  και  $(\alpha + \beta) - \gamma i = 5\gamma + (\alpha - \beta)i$  δείξτε ότι θά είναι  $2\alpha - \beta = \gamma$ .
4. Αν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R} - \{0\}$  και  $\frac{\alpha}{2} = \frac{\beta}{3} = \frac{1}{\gamma}$ , δείξτε ότι:  
 $2(\alpha + \beta) + (\beta - \alpha)\gamma i = 5\alpha + i$ .
5. Νά φέρετε στή μορφή  $\alpha + \beta i$  τίς παραστάσεις  
α)  $3i + 2i^3 + i^{202} - 5i^{-147} - 2i^7 + i^{12}$       β)  $\frac{5-2i}{1-2i}$   
γ)  $\frac{3}{2-i\sqrt{3}} - (5+i\sqrt{2})^{-2}$       δ)  $\frac{(4-i)^2 - 2(1+2i)}{(3+i)^2 (2-3i)}$ .
6. Δείξτε ότι ή εξίσωση  $x^4 + 81 = 0$  ικανοποιείται από τούς μιγαδικούς αριθμούς:

1. Τό πραγματικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού  $z = \alpha + \beta i$  συμβολίζεται  $\operatorname{Re} z$  και τό φανταστικό  $\operatorname{Im} z$ . Δηλαδή είναι  $\operatorname{Re} z = \alpha$  και  $\operatorname{Im} z = \beta$ . Ο μιγαδικός αριθμός  $\alpha + \beta i$  με  $\alpha \neq 0$  ονομάζεται καθαρός ή γνήσιος μιγαδικός αριθμός.

$$x_1 = \frac{3\sqrt{2}}{2}(1+i), \quad x_2 = \frac{3\sqrt{2}}{2}(-1+i), \quad x_3 = \frac{3\sqrt{2}}{2}(-1-i) \quad \text{και} \quad x_4 = \frac{3\sqrt{2}}{2}(1-i).$$

7. Δείξτε ότι στο σύνολο  $\mathbf{C}$  α) η πρόσθεση είναι πράξη αντιμεταθετική και προσεταιριστική και β) ο πολλαπλασιασμός είναι πράξη αντιμεταθετική, προσεταιριστική και ακόμη επιμεριστική ως προς την πρόσθεση.

## 1.5. Συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί

### I. Όρισμός

Ο μιγαδικός αριθμός  $a - bi$  ονομάζεται συζυγής του μιγαδικού αριθμού  $z = a + bi$  και συμβολίζεται με  $\bar{z}$ , δηλαδή  $\bar{z} = a - bi$ .

Επειδή είναι  $\overline{\bar{z}} = a + bi = z$ , οι μιγαδικοί αριθμοί  $z$  και  $\bar{z}$  ονομάζονται συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί.

Εύκολα βλέπουμε ότι  $z + \bar{z} = 2a$ , και  $z\bar{z} = a^2 + b^2$ , δηλαδή τό άθροισμα και τό γινόμενο δύο συζυγών μιγαδικών αριθμών είναι πραγματικοί αριθμοί.

### II. Ιδιότητες τών συζυγών μιγαδικών αριθμών

Γιά τούς συζυγείς μιγαδικούς αριθμούς αναφέρουμε μερικές χρήσιμες ιδιότητες.

$$\begin{array}{lll} \alpha) \overline{(-z)} = -\bar{z} & \beta) \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 & \gamma) \overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2 \\ \delta) \overline{z_1 + z_2 + \dots + z_n} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \dots + \bar{z}_n, n \in \mathbf{N} & \epsilon) \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 & \\ \sigma\tau') \overline{z_1 \cdot z_2 \dots z_n} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \dots \bar{z}_n, n \in \mathbf{N} & \zeta) \overline{(z^n)} = (\bar{z})^n, n \in \mathbf{N} & \\ \eta) \overline{(z^{-1})} = (\bar{z})^{-1}, z \neq 0 & \theta) \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, z_2 \neq 0 & \text{και} \quad \text{ι) } \overline{\alpha z} = \alpha \bar{z}, \alpha \in \mathbf{R}. \end{array}$$

#### \*Αποδείξεις.

β) \*Αν είναι  $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$  και  $z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ , τότε θα είναι  $z_1 + z_2 = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2)i$  και συνεπώς  $\overline{z_1 + z_2} = (\alpha_1 + \alpha_2) - (\beta_1 + \beta_2)i = (\alpha_1 - \beta_1 i) + (\alpha_2 - \beta_2 i) = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ .

δ) \*Από τη β) και μέ τήν υπόθεση ότι γιά  $n = k$  ισχύει  $\overline{z_1 + z_2 + \dots + z_k} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \dots + \bar{z}_k$  παίρνουμε:  $\overline{z_1 + z_2 + \dots + z_k + z_{k+1}} = \overline{(z_1 + z_2 + \dots + z_k) + z_{k+1}} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \dots + \bar{z}_k + \bar{z}_{k+1}$ , πού άποδεικνύει ότι ή ιδιότητα ισχύει γιά κάθε  $n \in \mathbf{N}$ .

ε) \*Αν είναι  $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$  και  $z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ , τότε θα είναι

$$z_1 \cdot z_2 = (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2) + (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1)i$$

και συνεπώς

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2) - (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1)i \quad (1)$$

## I 1.6.

Έξάλλου  $\bar{z}_1 \bar{z}_2 = (\alpha_1 - \beta_1 i) \cdot (\alpha_2 - \beta_2 i) = (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2) - (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) i$  (2)  
 Οί (1) και (2) αποδεικνύουν τή ζητούμενη.

Οί αποδείξεις τών υπόλοιπων ιδιοτήτων αφήνονται για άσκηση.

## 1.6. Έφαρμογές

1. Οί μόνοι μή πραγματικοί μιγαδικοί αριθμοί, πού τό άθροισμα και τό γινόμενό τους είναι πραγματικός αριθμός, είναι οί συζυγείς.

Απόδειξη: Άς είναι  $z_1, z_2 \in \mathbf{C} - \mathbf{R}$  μέ τήν ιδιότητα  $(z_1 + z_2) \in \mathbf{R}$  και  $(z_1 \cdot z_2) \in \mathbf{R}$ . Άν είναι  $z_1 = x_1 + y_1 i$  και  $z_2 = x_2 + y_2 i$ , τότε ή ιδιότητα πού έχουν δίνει τό σύστημα

$$\left. \begin{array}{l} y_1 + y_2 = 0 \\ x_1 y_2 + x_2 y_1 = 0 \\ y_1 \cdot y_2 \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} y_2 = -y_1 \\ x_2 = x_1 \\ y_1 \cdot y_2 \neq 0 \end{array} \right\},$$

όποτε ό  $z_2 = x_2 + y_2 i$  γράφεται  $z_2 = x_1 - y_1 i$  και συνεπώς  $z_2 = \bar{z}_1$ .

2. Άν ένας μιγαδικός αριθμός είναι ρίζα μιάς πολυωνμικής εξίσωσης μέ πραγματικούς συντελεστές, τότε και ό συζυγής του είναι επίσης ρίζα αυτής τής εξίσωσης.

Απόδειξη: Έστω ότι έχουμε τήν πολυωνμική εξίσωση

$$f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 = 0, \quad \alpha_n \neq 0$$

μέ πραγματικούς συντελεστές, ή όποία έχει για ρίζα της τό μιγαδικό αριθμό  $z$ , δηλαδή  $f(z) = 0$ . Θα δείξουμε ότι ή εξίσωση αυτή έχει για ρίζα της και τόν  $\bar{z}$ , δηλαδή  $f(\bar{z}) = 0$ .

Έπειδή ό συζυγής του  $0 + 0i$  είναι ό έαυτός του, άρκει νά δείξουμε ότι  $\overline{f(z)} = f(\bar{z})$ .

$$\begin{aligned} \text{Πράγματι: } \overline{f(z)} &= \overline{\alpha_n z^n + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \dots + \alpha_1 z + \alpha_0} \\ &= \overline{\alpha_n z^n} + \overline{\alpha_{n-1} z^{n-1}} + \dots + \overline{\alpha_1 z} + \overline{\alpha_0} && (\text{Ιδιότ. δ) τής 1.5.}) \\ &= \alpha_n \bar{z}^n + \alpha_{n-1} \bar{z}^{n-1} + \dots + \alpha_1 \bar{z} + \alpha_0 && (\text{Ιδιότ. ι) τής 1.5.}) \\ &= \alpha_n (\bar{z})^n + \alpha_{n-1} (\bar{z})^{n-1} + \dots + \alpha_1 \bar{z} + \alpha_0 && (\text{Ιδιότ. ζ) τής 1.5.}) \\ &= f(\bar{z}). \end{aligned}$$

Στή θεωρία τών πολυωνύμων ή πρόταση αυτή αποδεικνύεται και μέ άλλο τρόπο.

3. Νά επιλυθεί στό  $\mathbf{C}$  ή εξίσωση  $2 - 3z + \overline{(-z)} = 0$  (1)

Επίλυση: Η (1) γράφεται Ισοδύναμα  $2 - 3z - \bar{z} = 0$ , και άν είναι  $z = x + yi$ , τότε ή τελευταία γίνεται:

$$2 - 3(x + yi) - (x - yi) = 0 \Leftrightarrow (-4x + 2) + (-2y)i = 0 \Leftrightarrow$$

$$-4x + 2 = 0 \quad \text{και} \quad -2y = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{και} \quad y = 0.$$

Άρα ή εξίσωση (1) έχει τή λύση  $z = \frac{1}{2} + 0i = \frac{1}{2}$ .

Δίνουμε ακόμη μία εφαρμογή πού, άν και δέν αποτελεί εφαρμογή τών ιδιοτήτων τών συζυγών μιγαδικών αριθμών, παρουσιάζει ενδιαφέρον.

4. Σύμφωνα μέ τόν όρισμό «Τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού  $\xi = a + \beta i$  ονομάζουμε κάθε μιγαδικό αριθμό  $z = x + yi$  πού ίκανοποιεί τήν εξίσωση  $z^2 = \xi$ », νά βρείτε τήν τετραγωνική ρίζα του  $\xi = 5 - 12i$ .

Λύση: "Αν ο μιγαδικός αριθμός  $z = x + yi$  είναι ή τετραγωνική ρίζα του  $\xi = 5 - 12i$ , τότε έχουμε:

$$\begin{aligned}(x + yi)^2 &= 5 - 12i \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 - y^2 + 2xyi &= 5 - 12i \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 5 \quad \text{καί} \quad 2xy &= -12\end{aligned}\quad (1)$$

"Αρα θα είναι και  $(x^2 - y^2)^2 = 25$  και  $4x^2y^2 = 144$ .

Προσθέτοντας κατά μέλη τις δυο τελευταίες εξισώσεις έχουμε:

$$(x^2 + y^2)^2 = 169 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 13.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{"Επιλύοντας το σύστημα} \quad x^2 - y^2 = 5 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x^2 + y^2 = 13 \end{array} \right\}$$

παίρνουμε

$$\left. \begin{array}{l} x = \pm 3 \\ y = \pm 2 \end{array} \right\}$$

"Αφοῦ όμως είναι και  $2xy = -12$ , το σύστημα (1) θα έχει τρεις λύσεις

$$x_1 = 3, \quad y_1 = -2 \quad \text{καί} \quad x_2 = -3, \quad y_2 = 2.$$

"Αρα υπάρχουν δύο τετραγωνικές ρίζες

$$z_1 = 3 - 2i \quad \text{καί} \quad z_2 = -3 + 2i \quad \text{του} \quad \xi = 5 - 12i.$$

Γενικά δείξτε ότι κάθε μιγαδικός αριθμός  $a + bi \neq 0 + 0i$  έχει δύο διακεκριμένες τετραγωνικές ρίζες.

## 1.7. Άσκησης

1. Υπολογίστε τους  $x, y \in \mathbf{R}$  ώστε οι μιγαδικοί αριθμοί  $z_1 = -3 + i(2x - y)$  και  $z_2 = x - 5y - 3i$  να είναι συζυγείς.

2. Επιλύστε τις παρακάτω εξισώσεις με άγνωστο το μιγαδικό  $z$

$$\alpha) \bar{z} = -z, \quad \beta) \bar{z} = -4z \quad \text{καί} \quad \gamma) z^2 + \bar{z} = 0.$$

3. "Αν  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$ , τότε:  $z_1 \cdot z_2 = 0 \Leftrightarrow (z_1 = 0 \vee z_2 = 0)$ .

4. "Αν  $z_1, z_2, z \in \mathbf{C}$  με  $z_2 \cdot z \neq 0$ , δείξτε ότι  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot z}{z_2 \cdot z}$ .

5. "Αν  $z^2 = \bar{z}^2$ , τότε θα είναι μόνο  $z \in \mathbf{R}$  ή  $z \in I^{(1)}$

6. Υπολογίστε τους  $x, y \in \mathbf{R}$  ώστε να ισχύει:

$$(i-x)^2 - (i+x)^2 + y + 1 = \frac{1}{i}.$$

7. Υπολογίστε τον  $x \in \mathbf{R}$  ώστε να ισχύει  $1 + 2i\sqrt{2} = 3 \cdot \frac{1+xi}{1-xi}$ .

8. Βρείτε τις τετραγωνικές ρίζες του μιγαδικού  $2 + 2i$ .

9. Υπολογίστε τους  $x, y \in \mathbf{R}$ , ώστε να ισχύει  $\frac{x}{1+2i} + \frac{y}{3+2i} = \frac{5+6i}{8i-1}$ .

10. Βρείτε το άθροισμα των  $n$ -δρων:

$$i + (2+3i) + (4+5i) + (6+7i) + \dots + [2n-2 + (2n-1)i], \quad n \in \mathbf{N}$$

11. Επιλύστε την εξίσωση  $z^2 - (3+i)z + 4 + 3i = 0$ ,  $z \in \mathbf{C}$ .

1. Το σύνολο  $I$  είναι το υποσύνολο του  $\mathbf{C}$  με στοιχεία της μορφής  $(0, \beta)$ ,  $\beta \neq 0$  και ονομάζεται σύνολο των φανταστικών αριθμών.

## 1.8. Μέτρο τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν

## I. Ὅρισμός

Γιά τὸ μιγαδικό ἀριθμό  $z = \alpha + \beta i$  ὁ μὴ ἀρνητικός ἀριθμός  $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$  ὀνομάζεται ἀπόλυτη τιμὴ ἢ μέτρο του καὶ συμβολίζεται μὲ  $|z|$ , δηλαδή

$$|z| = |\alpha + \beta i| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

Ἐπειδὴ εἶναι  $\bar{z}z = \alpha^2 + \beta^2$ , θὰ εἶναι

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}}$$

Εἶναι φανερό ὅτι εἶναι  $|z| \geq 0$  γιὰ κάθε  $z \in \mathbf{C}$ .

Ὅταν εἶναι  $z = \alpha + 0i$ , ἔχουμε  $|z| = \sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$ . Ὅταν εἶναι  $z = \alpha + \beta i$  καὶ  $\beta \neq 0$ , τότε ἰσχύει  $|z|^2 \neq z^2$ , γιὰτί ὁ  $|z|^2$  εἶναι θετικός, ἐνῶ ὁ  $z^2$  εἶναι ἀρνητικός ἢ εἶναι γνήσιος μιγαδικός ἀριθμός. Αὕτῃ εἶναι μία σπουδαία διαφορὰ μεταξύ τῶν στοιχείων τοῦ  $\mathbf{R}$  καὶ τοῦ  $\mathbf{C}$ .

## II. Ἰδιότητες τοῦ μέτρου τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

Ἀναφέρουμε μερικές βασικές ἰδιότητες τοῦ μέτρου τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

\* Ἄν  $z, z_1, z_2, \dots, z_n$  εἶναι μιγαδικοί ἀριθμοί, τότε θὰ εἶναι:

α)  $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$  (τριγωνική ἀνισότητα)

β)  $|z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|$ ,  $n \in \mathbf{N}$

γ)  $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

δ)  $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

ε)  $|z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_n| = |z_1| \cdot |z_2| \cdot \dots \cdot |z_n|$ ,  $n \in \mathbf{N}$

στ)  $|z^n| = |z|^n$ ,  $n \in \mathbf{N}$

ζ)  $|z^{-1}| = |z|^{-1}$ ,  $z \neq 0$

η)  $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ ,  $z_2 \neq 0$ .

\* Ἀποδείξεις:

α) Ἄν  $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$  καὶ  $z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ , ἡ ζητούμενη γίνεται

$$|(\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2)i| \leq |\alpha_1 + \beta_1 i| + |\alpha_2 + \beta_2 i| \Leftrightarrow$$

$\sqrt{(\alpha_1 + \alpha_2)^2 + (\beta_1 + \beta_2)^2} \leq \sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2} + \sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2}$  καὶ, ἀφοῦ τὰ μέλη εἶναι μὴ ἀρνητικοί πραγματικοί, παίρνουμε ἰσοδύναμα

$$(\alpha_1 + \alpha_2)^2 + (\beta_1 + \beta_2)^2 \leq \alpha_1^2 + \beta_1^2 + \alpha_2^2 + \beta_2^2 + 2\sqrt{(\alpha_1^2 + \beta_1^2)(\alpha_2^2 + \beta_2^2)} \Leftrightarrow$$

$$\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2 \leq \sqrt{\alpha_1^2\alpha_2^2 + \alpha_1^2\beta_2^2 + \alpha_2^2\beta_1^2 + \beta_1^2\beta_2^2} \quad (1), \quad \text{ὁπότε}$$

i) Ἄν  $\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2 < 0$ , ἡ (1) ἀληθεύει σάν γνήσια ἀνισότητα.

ii) Ἄν  $0 \leq \alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2$ , τότε ἡ (1) γίνεται ἰσοδύναμα:

$$\alpha_1^2 \alpha_2^2 + \beta_1^2 \beta_2^2 + 2\alpha_1 \alpha_2 \beta_1 \beta_2 \leq \alpha_1^2 \alpha_2^2 + \alpha_1^2 \beta_2^2 + \alpha_2^2 \beta_1^2 + \beta_1^2 \beta_2^2 \Leftrightarrow \\ 0 \leq (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)^2, \text{ ή όποια άλληθεύει πάντα.}$$

Η ζητούμενη θα ισχύει σάν ισότητα, όταν είναι

$$0 \leq \alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 \text{ και } \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 = 0 \quad (2)$$

Αφοῦ  $z_1 \cdot \bar{z}_2 = (\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2) + (\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2)i$ , οι σχέσεις (2) ισοδυναμοῦν μέ τήν:  $(z_1 \cdot \bar{z}_2) \geq 0$ . Ἄρα ισχύει  $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ ,  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$  και γίνεται ισότητα, όταν  $(z_1 \cdot \bar{z}_2) \geq 0$  ἢ ισοδύναμα όταν  $(z_1 \bar{z}_2) \geq 0$ .

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ἡ ἴδια σχέση στους πραγματικούς ἀριθμούς είναι  $|a+b| \leq |a|+|b|$  και ἡ ισότητα ισχύει, όταν  $a \cdot b \geq 0$ .

$$\delta) \text{ Ἐχουμε } |z_1 \cdot z_2|^2 = (z_1 \cdot z_2) \cdot \overline{(z_1 \cdot z_2)} = (z_1 z_2) \cdot (\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2) = \\ = (z_1 \cdot \bar{z}_1) \cdot (z_2 \cdot \bar{z}_2) = |z_1|^2 \cdot |z_2|^2 = (|z_1| \cdot |z_2|)^2 \\ \Leftrightarrow |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|.$$

## 1.9. Ἀσκήσεις


- Δείξτε τίς ὑπόλοιπες ιδιότητες τῆς παραγράφου 1.8.
- Δείξτε ὅτι γιά κάθε  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$  ισχύει:  $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ .
- Βρεῖτε τά μέτρα τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν
  - $\frac{4-5i}{2+i}$
  - $\frac{(\sqrt{2}+i)^3}{i(1-i\sqrt{3})^2}$
  - $\left( \frac{3i(\sqrt{3}+i\sqrt{5}) \cdot (1-i\sqrt{3})}{4-i\sqrt{3}} \right)^4$ 
    - φέρνοντας πρῶτα τούς μιγαδικούς στή μορφή  $a+bi$  και
    - χρησιμοποιώντας τίς ιδιότητες τοῦ μέτρου τῶν μιγαδικῶν.
- Βρεῖτε τό μέτρο τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  $\left( \frac{1+i\sqrt{3}}{2} \right)^n$ ,  $n \in \mathbf{N}$ .
- Βρεῖτε τό μιγαδικό  $z$ , γιά τόν ὅποιο  $|z-1| = |z-2| = |z-i|$ .
- Ἄν  $z = x+yi$ , βρεῖτε τή σχέση μεταξύ τῶν  $x$  και  $y$ , πού ὀρίζεται ἀπό τήν ισότητα  $|z-i| = |z+2|$ .
- Ἐπιλύστε στό σύνολο  $\mathbf{C}$  τήν ἔξισωση  $z^2 + |z| = 0$ .
- Βρεῖτε τούς μιγαδικούς  $z$ , γιά τούς ὁποίους ισχύει:  $|z|^2 - 2iz + 2\alpha(1+i) = 0$ ,  $\alpha \geq 0$  περιορίζοντας κατάλληλα τόν  $\alpha$ .
- Ἄν  $z_1, z_2, z_3, z_4$  είναι μιγαδικοί ἀριθμοί μέ  $z_3 \cdot z_4 \neq 0$  και  $|z_3|^2 + |z_4|^2 \leq 1$ , δείξτε ὅτι  $\left| \frac{z_1}{z_3} \right|^2 + \left| \frac{z_2}{z_4} \right|^2 \geq |z_1 + z_2|^2$ .
- Ἄν οἱ μιγαδικοί  $z_1, z_2$  ἱκανοποιοῦν τίς σχέσεις  $|z_1 + z_2| = |z_1| = |z_2|$ ,  $|z_1| \neq 0$ , δείξτε ὅτι  $|z_1 - z_2| = \sqrt{3}|z_1|$ .

## 2. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

## 2.1. Ἡ ἀπεικόνιση τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν στὰ σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου.

Ἡ ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοίχιση σέ κάθε μιγαδικό ἀριθμό  $z = x + yi$  τοῦ ζεύγους  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  ὀδηγεῖ, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως<sup>(1)</sup>, στή **γεωμετρική του παράσταση** μέ ένα σημεῖο ἑνός ἐπιπέδου. Ἄς πάρουμε ένα ἐπίπεδο (Π) καί ένα ὀρθοκανονικό σύστημα ἀξόνων  $xOy$  σ' αὐτό (Σχ. 1). Εἶναι φανερό ὅτι στό μιγαδικό ἀριθμό  $z$  ἀντιστοιχεῖ σάν **εἰκόνα του** τό σημεῖο  $M(x, y)$  τοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ καί ἀντίστροφα στό σημεῖο  $M(x, y)$  ἀντιστοιχεῖ ὁ μιγαδικός ἀριθμός  $z = (x, y)$ .

Ἡ ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοίχιση μιγαδικῶν ἀριθμῶν καί σημείων τοῦ (Π)



Σχ. 1

μᾶς ἐπιτρέπει νά χρησιμοποιοῦμε συχνά γλώσσα γεωμετρική καί ἀντί γιά τό μιγαδικό ἀριθμό  $z$  νά μιλάμε γιά τό σημεῖο  $M$ . Γι' αὐτό καί οἱ  $x, y$  ὀνομάζονται **καρτεσιανές συντεταγμένες** τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  $x + yi$ . Τό ἐπίπεδο (Π), πού χρησιμοποιεῖται γιά τήν παράσταση αὐτή, λέγεται **μιγαδικό ἐπίπεδο** ἢ **ἐπίπεδο τοῦ Gauss**.

Σύμφωνα μέ τήν παραπάνω παράσταση οἱ πραγματικοί ἀριθμοί  $x$ , πού τοὺς «ταυτίσαμε» μέ τή ζεύγη  $(x, 0)$ , παριστάνονται μέ τά σημεῖα τοῦ ἄξονα τῶν τεταγμένων  $x'Ox$ , ὁ ὁποῖος γι' αὐτό ὀνομάζεται **πραγματικός ἄξονας** τοῦ συστήματος. Οἱ καθαρά φανταστικοί ἀριθμοί  $(0, y)$  ἀντιστοιχοῦν στά σημεῖα τοῦ ἄξονα  $y'Oy$  τῶν τεταγμένων, ὁ ὁποῖος γι' αὐτό ὀνομάζεται **φανταστικός ἄξονας** τοῦ συστήματος.

Στό σχ. 1 παρατηροῦμε ὅτι στόν ἀντίθετο  $-z$  τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  $z$  ἀντιστοιχεῖ τό συμμετρικό  $M''$  τοῦ σημείου  $M$  ὡς πρὸς τήν ἀρχή  $O$  τοῦ συστήματος καί στό συζυγή  $\bar{z}$  τοῦ  $z$  τό συμμετρικό  $M'$  τοῦ σημείου  $M$  ὡς πρὸς τόν πραγματικό ἄξονα  $x'Ox$ .

(1) Ὑποσημείωση τῆς παραγράφου 1.1.


## 2.2. Γεωμετρική εικόνα του άθροισματος και τής διαφορᾶς δύο μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

Ἡ ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοίχιση μιγαδικῶν ἀριθμῶν καί σημείων τοῦ μιγαδικοῦ ἐπιπέδου μᾶς ἐπιτρέπει τήν ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοίχιση τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν καί τῶν διανυσματικῶν ἀκτίνων τῶν σημείων τοῦ μιγαδικοῦ ἐπιπέδου. Ἔτσι π.χ. στό μιγαδικό ἀριθμό  $z = (x,y)$  ἀντιστοιχεῖ τό σημεῖο  $M(x,y)$  καί στό σημεῖο  $M(x,y)$  ἀντιστοιχεῖ ἡ διανυσματική ἀκτίνα  $\vec{OM}$  (Σχ. 1) καί ἄρα στό  $z = (x,y)$  ἀντιστοιχεῖ ἡ  $\vec{OM}$ . Τήν  $\vec{OM}$  τήν ὀνομάζουμε **διανυσματική ἀκτίνα τοῦ μιγαδικοῦ  $z$** .


Εἶναι εὐκόλο νά δοῦμε ὅτι  $|\vec{OM}| = \sqrt{x^2+y^2} = |z|$ , δηλαδή ὅτι τό μέτρο τῆς  $\vec{OM}$  ἰσοῦται μέ τό μέτρο τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  $z$ .

Μέ τή βοήθεια τῶν διανυσματικῶν ἀκτίνων τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν μποροῦμε νά βροῦμε τίς διανυσματικές ἀκτίνες τοῦ ἀθροίσματος καί τῆς διαφορᾶς δύο μιγαδικῶν ἀριθμῶν καί νά ἐρμηνεύσουμε ἔτσι γεωμετρικά τήν πρόσθεση καί τήν ἀφαίρεση στό  $\mathbf{C}$ .

Ἄς πάρουμε τοὺς μιγαδικούς ἀριθμούς  $z_1 = x_1 + y_1i$  καί  $z_2 = x_2 + y_2i$  καί τίς ἀντίστοιχες εἰκόνες τους  $M_1(x_1, y_1)$  καί  $M_2(x_2, y_2)$  στό μιγαδικό ἐπίπεδο (Σχ.2). Οἱ διανυσματικές ἀκτίνες τῶν  $z_1$  καί  $z_2$  εἶναι οἱ  $\vec{OM}_1$  καί  $\vec{OM}_2$  ἀντίστοιχα καί τό ἄθροισμα  $z_1 + z_2$  ἔχει γιά διανυσματική του ἀκτίνα τή διαγώνιο  $\vec{OM}$  τοῦ παραλληλογράμμου πού ὀρίζουν οἱ  $\vec{OM}_1$  καί  $\vec{OM}_2$ .



Σχ. 2




Σχ. 3


Τό διάνυσμα  $\vec{M}_1\vec{M}_2 = \vec{OM}_2 - \vec{OM}_1$ , πού ὀρίζεται ἀπό τήν ἄλλη διαγώνιο τοῦ παραλληλογράμμου αὐτοῦ, εἶναι ἴσο μέ τή διανυσματική ἀκτίνα τῆς διαφορᾶς  $z_2 - z_1$  τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν. Ἡ διαφορά παριστάνεται μέ τή διανυσματική ἀκτίνα  $\vec{OM}'$  (Σχ. 3), πού εἶναι ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ παραλληλογράμμου πού

### I 2.3.

κατασκευάζεται με πλευρά τήν  $\vec{OM}_1$  και διαγώνιο τήν  $\vec{OM}_2$ . Στά σχήματα 2 και 3 υποθέτουμε ότι τό παραλληλόγραμμο τών διανυσματικών άκτιών  $\vec{OM}_1, \vec{OM}_2$  είναι κατασκευάσιμο, δηλαδή τά σημεία  $O, M_1, M_2$  δε βρίσκονται πάνω σέ εύθεια γραμμή. Όταν τά σημεία  $O, M_1, M_2$  βρίσκονται πάνω στήν ίδια εύθεια, τότε έχουμε εύκολα τό άθροισμα και τή διαφορά τών  $z_1$  και  $z_2$ . Αυτό φαίνεται στά σχήματα 4 και 5.



Σχ. 4



Σχ. 5

Έφαρμογή: Μέ τή βοήθεια τής γεωμετρικής παραστάσεως τών μιγαδικών αριθμών δείξτε τήν ιδιότητα γ) τής παραγράφου 1.8.

Από τό τρίγωνο  $OM_1M$  του σχ. 2 παίρνουμε

$$|(OM_1) - (M_1M)| \leq (OM) \leq (OM_1) + (M_1M) \Leftrightarrow |(OM_1) - (OM_2)| \leq (OM) \leq (OM_1) + (OM_2) \Leftrightarrow$$

$$||\vec{OM}_1| - |\vec{OM}_2|| \leq |\vec{OM}| \leq |\vec{OM}_1| + |\vec{OM}_2| \Leftrightarrow$$

$$\cdot ||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

### 2.3. Άσκήσεις

1. Νά παρασταθοῦν στό μιγαδικό επίπεδο οί μιγαδικοί αριθμοί  $2+3i, 2-3i, -2+3i, -2-3i$ .
2. Νά παρασταθοῦν στό επίπεδο Gauss τρεῖς μιγαδικοί  $z_1, z_2, z_3$  καί έπειτα οί μιγαδικοί

$$z_1 + z_2 + z_3 \quad \text{καί} \quad z_1 + z_2 - z_3.$$


3. Δείξτε μέ τή βοήθεια τής γεωμετρικής παραστάσεως τών μιγαδικών αριθμών ότι Ισχύει

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

### 3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

#### 3.1. Ἡ ἐξίσωση τοῦ κύκλου

Ἐὰς εἶναι  $O$  ἡ ἀρχὴ τοῦ ὀρθοκανονικοῦ συστήματος στὸ ἐπίπεδο Gauss καὶ  $M(x,y)$  ἓνα σημεῖο τοῦ ἐπιπέδου, πού ἀπέχει ἀπὸ τὸ  $O$  ἀπόσταση ἴση μὲ  $\alpha$  (Σχ. 6).



Σχ. 6

Ἀπὸ τὸ ὀρθογώνιο τρίγωνο  $OAM$  ἔχουμε  $(OA)^2 + (AM)^2 = (OM)^2$ , δηλαδή

$$x^2 + y^2 = \alpha^2 \quad (1)$$

Ἄν μὲ κέντρο τὸ  $O$  καὶ ἀκτῖνα  $\alpha$  γράψουμε τὸν κύκλο  $(O, \alpha)$ , τότε τὸ τυχόν σημεῖο  $M_1(x_1, y_1)$  αὐτοῦ τοῦ κύκλου ἱκανοποιεῖ τὴν (1) καὶ ἀντίστροφα. Πράγματι  $\alpha$  εἶναι  $(OG)^2 + (GM_1)^2 = (OM_1)^2$ , δηλαδή  $x_1^2 + y_1^2 = \alpha^2$ . β) Ἄν  $N(x_0, y_0)$  εἶναι ἓνα σημεῖο τοῦ ἐπιπέδου μὲ  $x_0^2 + y_0^2 = \alpha^2$ , τότε, ἀφοῦ  $x_0^2 + y_0^2 = (ON)^2$ , θὰ ἔχουμε  $(ON)^2 = \alpha^2$  καὶ ἄρα  $(ON) = \alpha$ , πού σημαίνει ὅτι τὸ σημεῖο  $N$  εἶναι σημεῖο τοῦ κύκλου  $(O, \alpha)$ .

Ἄρα ἡ ἐξίσωση (1) εἶναι ἡ ἐξίσωση τοῦ κύκλου  $(O, \alpha)$ . Ἐπειδὴ τὸ σημεῖο  $M(x, y)$  εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  $z = x + yi$ , δηλαδή ἡ  $\vec{OM}$  εἶναι ἡ διανυσματικὴ τοῦ ἀκτῖνα, ἡ (1) γράφεται ἰσοδύναμα

$$|z|^2 = \alpha^2 \quad \text{ἢ καὶ} \quad |z| = \alpha, \quad \text{ἀφοῦ} \quad \alpha > 0.$$

Ἔτσι ἔχουμε τὸ σπουδαῖο συμπέρασμα ὅτι:

— Στὸ μιγαδικὸ ἐπίπεδο τὸ σύνολο τῶν εἰκόνων τῶν μιγαδικῶν  $z$  πού ἱκανο-

### I. 3.1.

ποιούν τη σχέση  $|z| = \alpha$ ,  $\alpha > 0$ , είναι ο κύκλος με κέντρο την αρχή  $O$  και ακτίνα  $\alpha$ .

Είναι εύκολο τώρα νά δοῦμε ότι για τὸ μιγαδικὸ ἀριθμὸ  $z = x + yi$  ἡ σχέση


$$|z| < \alpha$$

ὀρίζει τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κύκλου  $(0, \alpha)$ , ἐνῶ ἡ σχέση

$$|z| > \alpha$$

ὀρίζει τὸ ἐξωτερικὸ του.

\*Ἄς εἶναι τώρα  $M_0(x_0, y_0)$  ἓνα σταθερὸ σημεῖο τοῦ ἐπιπέδου τοῦ Gauss καὶ  $M(x, y)$  τυχόν σημεῖο του, πού ἀπέχει ἀπὸ τὸ  $M_0$  σταθερὴ ἀπόσταση ἴση μὲ  $\alpha$  (Σχ. 7).



Σχ. 7

Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀπόσταση  $(M_0M)$  δίνεται ἀπὸ τὴν σχέση

$$(M_0M)^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2, \text{ δηλαδή}$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \alpha^2 \quad (2)$$

\*Ἄν μὲ κέντρο τὸ  $M_0$  καὶ ἀκτίνα  $\alpha$  γράψουμε τὸν κύκλο  $(M_0, \alpha)$ , τότε γιὰ τὸ τυχόν σημεῖο του  $M_1(x_1, y_1)$  ἔχουμε:  $(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 = \alpha^2$ , δηλαδή οἱ συντεταγμένες κάθε σημείου τοῦ  $(M_0, \alpha)$  ἱκανοποιοῦν τὴν (2).

\***Ἀντίστροφα:** \*Ἄν  $N(x_2, y_2)$  εἶναι ἓνα σημεῖο τοῦ ἐπιπέδου, γιὰ τὸ ὁποῖο ἰσχύει  $(x_2 - x_0)^2 + (y_2 - y_0)^2 = \alpha^2$ , τότε, ἀφοῦ  $(x_2 - x_0)^2 + (y_2 - y_0)^2 = (M_0N)^2$ , θά ἔχουμε  $(M_0N)^2 = \alpha^2$ , δηλαδή  $(M_0N) = \alpha$ , πού σημαίνει ὅτι τὸ  $N$  εἶναι σημεῖο τοῦ κύκλου  $(M_0, \alpha)$ .

\*Ἡ (2) λοιπὸν εἶναι ἡ ἐξίσωση τοῦ κύκλου  $(M_0, \alpha)$ . \*Ἄν τὰ σημεῖα  $M(x, y)$  καὶ  $M_0(x_0, y_0)$  εἶναι οἱ εἰκόνες τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν  $z = x + yi$  καὶ  $z_0 = x_0 + y_0i$  ἀντίστοιχα, τότε ἡ ἐξίσωση (2) γράφεται:

$$|z - z_0|^2 = \alpha^2 \text{ ἢ } |z - z_0| = \alpha, \text{ ἀφοῦ } \alpha > 0.$$

Εὐκόλα βλέπουμε ὅτι ἡ σχέση  $|z - z_0| < \alpha$  ὀρίζει τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κύκλου  $(M_0, \alpha)$ , ἐνῶ ἡ  $|z - z_0| > \alpha$  ὀρίζει τὸ ἐξωτερικὸ του.

## 3.2. Έφαρμογές

1. Βρείτε τὰ σημεία τοῦ μιγαδικοῦ ἐπιπέδου, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι:
- $|z| = |3-4i|$
- (1).


Λύση: Ἐχουμε  $|z| = |3-4i| \Leftrightarrow |z| = \sqrt{3^2+4^2} \Leftrightarrow |z| = 5$  (2)

Ἡ (2) εἶναι ἡ ἐξίσωση τοῦ κύκλου (0,5) στὸ μιγαδικὸ ἐπίπεδο καὶ ἄρα οἱ μιγαδικοὶ ἀριθμοί, ποὺ ἔχουν εἰκόνες τὰ σημεία αὐτοῦ τοῦ κύκλου, εἶναι λύσεις τῆς (1).


2. Στὸ μιγαδικὸ ἐπίπεδο βρεῖτε τὶς λύσεις τῆς ἐξίσωσης

$$|z + 2 + i| = 2.$$

Ἐπίλυση: Ἐχουμε  $|z + 2 + i| = 2 \Leftrightarrow |z - (-2 - i)| = 2$  (1) καὶ σύμφωνα μὲ τὰ προηγούμενα ἡ (1) ἐπαληθεύεται ἀπὸ τοὺς μιγαδικούς ἀριθμούς  $z$ , ποὺ ἔχουν εἰκόνες στὸ μιγαδικὸ ἐπίπεδο τὰ σημεία τοῦ κύκλου μὲ κέντρο τὴν εἰκόνα τοῦ μιγαδικοῦ  $-2 - i$ , δηλαδή τὸ σημείο  $M(-2, -1)$  καὶ ἀκτίνα  $\alpha = 2$ . (Σχ. 8).



Σχ. 8



Σχ. 9

3. Βρείτε τὰ σημεία τοῦ μιγαδικοῦ ἐπιπέδου, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι:

$$|z + 2| = |z - (-1 + i)|.$$

Λύση: Ἐχουμε  $|z + 2| = |z - (-1 + i)| \Leftrightarrow |z - (-2 + 0i)| = |z - (-1 + i)|$  (1)

Ἄς εἶναι  $A(-2, 0)$  ἡ εἰκόνα τοῦ μιγαδικοῦ  $-2 + 0i$  καὶ  $B(-1, 1)$  τοῦ μιγαδικοῦ  $-1 + i$  (Σχ. 9).

Ἄν  $M$  εἶναι ἡ εἰκόνα ἑνὸς μιγαδικοῦ  $z$ , τότε τὸ  $|z - (-2 + 0i)|$  παριστάνει τὴν ἀπόσταση (AM) καὶ τὸ  $|z - (-1 + i)|$  τὴν ἀπόσταση (BM). Ἐπειδὴ θέλουμε  $|z - (-2 + 0i)| = |z - (-1 + i)|$ , θὰ πρέπει νὰ εἶναι (MA) = (MB). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ εἰκόνες τῶν λύσεων τῆς (1) ἰσαπέχουν ἀπὸ τὰ σταθερὰ σημεία  $A$  καὶ  $B$  καὶ ἄρα ἀνήκουν στὴ μεσοκάθετο τοῦ  $AB$ .

Ἀντίστροφα: Κάθε σημείο  $M(x, y)$ , εἰκόνα τοῦ μιγαδικοῦ  $z = x + yi$ , ποὺ ἰσαπέχει ἀπὸ τὰ  $A$  καὶ  $B$ , θὰ ἰκανοποιεῖ τὴν ἰσότητα  $|z - (-2 + 0i)| = |z - (-1 + i)|$ , δηλ. τὴν (1). Ἄρα τὰ ζητούμενα σημεία ἀποτελοῦν τὴ μεσοκάθετο τοῦ τμήματος  $AB$ , μὲ  $A(-2, 0)$  καὶ  $B(-1, 1)$ .

4. Στὸ μιγαδικὸ ἐπίπεδο βρεῖτε ποῦ ἀνήκουν οἱ εἰκόνες τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν, ποῦ εἶναι λύσεις τῆς ἐξίσωσης


$$2|z - 3 - 2i|^2 + 2|z + 1 - 3i|^2 = 21$$

Λύση: Ἐχουμε  $2|z - 3 - 2i|^2 + 2|z + 1 - 3i|^2 = 21 \Leftrightarrow$


$$|z - (3 + 2i)|^2 + |z - (-1 + 3i)|^2 = \frac{21}{2} \quad (1)$$

### I 3.3.

Στό μιγαδικό επίπεδο παίρνουμε τὰ σημεῖα  $A(3,2)$  καὶ  $B(-1,3)$ , πού εἶναι εἰκόνες τῶν μιγαδικῶν  $3+2i$  καὶ  $-1+3i$  ἀντίστοιχα (Σχ. 10).



Σχ. 10



Σχ. 11

Ἄν  $M$  εἶναι ἡ εἰκόνα μιᾶς λύσεως τῆς (1), τότε ἡ (1) μᾶς λέει ὅτι  $(MA)^2 + (MB)^2 = \frac{21}{2}$ .

Ἄν  $K$  εἶναι τὸ μέσο τοῦ εὐθύγραμμου τμήματος  $AB$ , τότε θὰ εἶναι  $K\left(\frac{3+(-1)}{2}, \frac{3+2}{2}\right) = K\left(1, \frac{5}{2}\right)$  καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτο θεώρημα τῶν διαμέσων στὸ τρίγωνο  $MAB$  προκύπτει ὅτι  $(MK)^2 = \frac{21}{4} - \frac{(AB)^2}{4}$ . Ἀλλὰ  $(AB) = \sqrt{17}$ , ὁπότε  $(MK)^2 = 1$ , δηλαδή  $(MK) = 1$ .

Ἄρα τὸ  $M$  ἀνήκει σὲ κύκλο μὲ κέντρο  $K\left(1, \frac{5}{2}\right)$  καὶ ἀκτίνα  $\alpha = 1$ . Ἔτσι οἱ λύσεις τῆς (1) ἔχουν εἰκόνες τὰ σημεῖα αὐτοῦ τοῦ κύκλου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐξίσωση

$$\left|z - \left(1 + \frac{5}{2}i\right)\right| = 1.$$

5. Στό μιγαδικό επίπεδο βρεῖτε τὸ σύνολο τῶν εἰκόνων τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν  $z$ , πού εἶναι λύσεις τοῦ συστήματος:

$$|z - 2 + i| < \frac{3}{2}, \quad |z - 4 - i| > 2$$

Λύση: Στό σχῆμα 11 δίνουμε τὴ γεωμετρικὴ εἰκόνα τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος. Ἀφήνουμε γιὰ ἀσκηση τὴ δικαιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων.

### 3.3. Ἀσκήσεις

1. Δείξτε ὅτι ἡ ἐξίσωση τοῦ κύκλου  $|z - z_0| = \alpha$  παίρνει τὴ μορφή

$$z \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z \bar{z}_0) + \alpha^2 - |z_0|^2$$

2. Στό μιγαδικό επίπεδο ἐπιλύστε τὴν ἐξίσωση  $|z - 2 + 3i| = 5$ .

3. Βρεῖτε τὰ σημεῖα τοῦ μιγαδικοῦ ἐπιπέδου, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι  $|z - i| = |z + 2|$ .

4. Βρεῖτε τὰ σημεῖα τοῦ μιγαδικοῦ ἐπιπέδου, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι  $|z - 2| < |z|$ .

5. Στό μιγαδικό επίπεδο βρεῖτε τὸ σύνολο τῶν εἰκόνων τῶν μιγαδικῶν, πού ἐπαληθεύουν τὴν  $|z - 1| < |z + 1|$ .


6. \*Αν είναι  $|z-8| = 2|z-2|$ ,  $z \in \mathbf{C}$ , δείξτε ότι θά είναι  $|z| = 4$ .
7. \*Αν  $|z| = 3$ , βρείτε τὰ σημεία τοῦ μιγαδικοῦ ἐπιπέδου, πού είναι εἰκόνες τῶν μιγαδικῶν (α)  $-2z$ , (β)  $1-z$ , (γ)  $3z-1$ .
8. Βρείτε ὄλους τοὺς μιγαδικούς ἀριθμούς, γιὰ τοὺς ὁποίους είναι:  $3 \leq |z+i| \leq 4$ .
9. Βρείτε ὄλους τοὺς μιγαδικούς ἀριθμούς, γιὰ τοὺς ὁποίους είναι:  $|z-1|^2 + |z+1|^2 = 4$ .
10. Βρείτε τοὺς μιγαδικούς  $z$ , οἱ ὁποῖοι ἐπαληθεύουν συγχρόνως τὶς ἐξισώσεις

$$\left| \frac{z-12}{z-8i} \right| = \frac{5}{3} \quad \text{καὶ} \quad \left| \frac{z-4}{z-8} \right| = 1.$$

## 4. ΠΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

### 4.1. Ὅρισμός

\*Ἄς πάρουμε τὸ μιγαδικὸ ἀριθμὸ  $z = \alpha + \beta i \neq 0$  καὶ τὴ διανυσματικὴ του ἀκτίνα  $\vec{OM}$  (Σχ. 12). Εἶναι  $|\vec{OM}| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \rho$ .



Σχ. 12

\*Όλοι οἱ μιγαδικοί, πού οἱ εἰκόνες τους εἶναι σημεία τοῦ κύκλου  $(0, \rho)$ , ἔχουν τὸ ἴδιο μέτρο μέ τὸν  $z$ . Γιὰ νὰ προσδιορίσουμε λοιπὸν τὴ γεωμετρικὴ εἰκόνα τοῦ  $z$ , δέν εἶναι ἀρκετὸ τὸ μέτρο του. \*Ἄν ὅμως ξέρουμε μαζί μέ τὸ μέτρο  $\rho$  καὶ τὴ γωνία  $\theta \in [0, 2\pi)$  πού σχηματίζει ὁ θετικός ἡμίξονος  $Ox$  μέ τὴ διανυσματικὴ ἀκτίνα  $\vec{OM}$  τοῦ  $z$ , τότε ἡ εἰκόνα  $M(\alpha, \beta)$  τοῦ  $z$  καθορίζεται πλήρως ἀπὸ τὸ ζεῦγος  $(\rho, \theta)$ .

Εἶναι φανερό (Σχ. 12) ὅτι τὰ στοιχεῖα τῶν ζευγῶν  $(\alpha, \beta)$  καὶ  $(\rho, \theta)$  συνδέονται μέ τὶς σχέσεις:

## I 4.2.

$$\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$\text{συν}\theta = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \text{ και } \eta\mu\theta = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad (1)$$

Από τις σχέσεις (1) βεβαιωνόμαστε ότι, όταν δοθούν τά  $\alpha$  και  $\beta$ , προσδιορίζονται μονοσήμαντα τά  $\rho$  και  $\theta$  και αντίστροφα.


\*Αρα κάθε μιγαδικός αριθμός  $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$  μπορεί νά όριστεί και μέ τό ζεύγος  $(\rho, \theta)$ .

Τά στοιχεία τοῦ ζεύγους  $(\rho, \theta)$  ονομάζονται **πολικές συντεταγμένες** τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  $z = \alpha + \beta i$ . Εἰδικότερα τό  $\rho$  ονομάζεται (ὅπως ξέρουμε) **μέτρο τοῦ  $z$**  καί τό  $\theta$  **πρωτεύον όρισμα** (Argument) τοῦ  $z$  καί συμβολίζεται  $\text{Arg}z = \theta$  (1).


Τό μιγαδικό ἀριθμό  $z = \alpha + \beta i$ , ἐκτός ἀπό τό ζεύγος  $(\rho, \theta)$  πού βρίσκουμε ἀπό τίς (1), τόν προσδιορίζει καί κάθε ζεύγος  $(\rho, \theta + 2k\pi)$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ . Γι' αὐτό κάθε γωνία ἀπό τίς  $\theta + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$  ονομάζεται ἀπλῶς **όρισμα** τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  $z$  καί συμβολίζεται  $\text{arg}z$ .

## 4.2. Παραδείγματα

- Στό σχ. 13 φαίνεται ὅτι γιά τό μιγαδικό ἀριθμό  $z_1 = 2 + 2i$  εἶναι  $(\rho_1, \theta_1) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$  ἢ γενικότερα  $(2\sqrt{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{4})$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ . Ὁμοια γιά τόν  $z_2 = -1 + i\sqrt{3}$  εἶναι  $(\rho_2, \theta_2) = (2, \frac{2\pi}{3})$  ἢ γενικότερα  $(2, 2k\pi + \frac{2\pi}{3})$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ . Τίς τιμές τῶν  $\rho$  καί  $\theta$  μποροῦσαμε φυσικά νά τίς ὑπολογίσουμε καί ἀπό τούς τύπους (1) τῆς παραγράφου 4.1.



Σχ. 13



Σχ. 14

- Οἱ μιγαδικοί ἀριθμοί  $z_1 = (1, 0)$ ,  $z_2 = (0, 1)$ ,  $z_3 = (-1, 0)$  καί  $z_4 = (0, -1)$  ἔχουν κοινό μέτρο  $\rho = 1$  καί ἀντίστοιχα πρωτεύοντα όρίσματα  $\text{Arg}z_1 = \text{Arg}(1 + 0i) = 0$ ,  $\text{Arg}z_2 = \text{Arg}(0 + i) = \frac{\pi}{2}$ ,  $\text{Arg}z_3 = \pi$  καί  $\text{Arg}z_4 = \frac{3\pi}{2}$  (Σχ. 14).

- Στή βιβλιογραφία μερικές φορές ὡς  $\text{Arg}z$  θεωρεῖται ἡ γωνία  $\theta$  μέ  $\theta \in (-\pi, \pi]$ .

3. Οι πολικές συντεταγμένες του μιγαδικού αριθμού  $z = 1 - i\sqrt{3}$  είναι:

α)  $\rho = \sqrt{1+3} = 2$  και  $\beta) \theta = \frac{5\pi}{3}$ . Η τιμή  $\theta = \frac{5\pi}{3}$  βρίσκεται εύκολα από το σύστημα  $\text{syn}\theta = \frac{1}{2}$ ,  $\eta\mu\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\theta \in [0, 2\pi)$ .

4. "Αν οι πολικές συντεταγμένες του αριθμού  $z = \alpha + \beta i$  είναι  $(2, \frac{4\pi}{3})$ , τότε βάζοντας στους τύπους (1) της παραγράφου 4.1  $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 2$  και  $\theta = \frac{4\pi}{3}$  βρίσκουμε ότι ο μιγαδικός αυτός αριθμός είναι  $z = -1 - i\sqrt{3}$ .

### 4.3. Άσκησης

1. Βρείτε τις πολικές συντεταγμένες  $(\rho, \theta)$  των μιγαδικών αριθμών:

$$\begin{array}{lll} z_1 = 3 + 0i & , & z_2 = 3 + 3i & , & z_3 = (0, 3), \\ z_4 = (-3, 3) & , & z_5 = (-3, 0) & , & z_6 = -3 - 3i \\ z_7 = (0, -3) & , & z_8 = (3, -3). \end{array}$$

2. Γράψτε στη μορφή  $z = \alpha + \beta i$  τους μιγαδικούς αριθμούς

$$z_1 = \left( 3, \frac{\pi}{3} \right), \quad z_2 = (2, \pi), \quad z_3 = \left( \sqrt{3}, \frac{5\pi}{4} \right), \quad z_4 = \left( 1, \frac{3\pi}{2} \right)$$

και απεικονίστε τους γεωμετρικά στο επίπεδο του Gauss.

3. Βρείτε τις πολικές συντεταγμένες των μιγαδικών αριθμών  $z_1, z_2$  και  $\frac{z_1}{z_2}$ , αν είναι

$$z_1 = \left( 3, \frac{\pi}{3} \right) \text{ και } z_2 = \left( 2, \frac{\pi}{3} \right).$$

## 5. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

### 5.1. Όρισμοί και θεωρήματα

Είδαμε προηγουμένως ότι, αν  $(\rho, \theta)$  είναι οι πολικές συντεταγμένες του μιγαδικού  $z = \alpha + \beta i \neq 0$ , τότε θά είναι:

$$\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \text{syn}\theta = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = \frac{\alpha}{\rho} \quad \text{και} \quad \eta\mu\theta = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = \frac{\beta}{\rho} \quad (1)$$

$\mu\epsilon \quad 0 \leq \theta < 2\pi$

Άπό τις σχέσεις αυτές παίρνουμε:

$$\alpha = \rho \text{syn}\theta \quad \text{και} \quad \beta = \rho \eta\mu\theta,$$

### I 5.1.

όποτε ο μιγαδικός  $z = \alpha + \beta i$  παίρνει τή μορφή:

$$z = \rho(\cos\theta + i\eta\mu\theta), \quad \text{μέ} \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad \rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \quad (2)$$

Ἡ μορφή αὐτή λέγεται τριγωνομετρική μορφή τοῦ μιγαδικοῦ  $\alpha + \beta i$ .


Φυσικά ἀντί γιά τό πρωτεῦον ὄρισμα  $\theta$  μπορούμε νά πάρουμε ὅποιοδῆ-ποτε ἄλλο ὄρισμα τῆς μορφῆς  $\theta + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ .

Δηλαδή:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta i &= \rho(\cos\theta + i\eta\mu\theta) = \rho[\cos(\theta + 2k\pi) + i\eta\mu(\theta + 2k\pi)], \quad k \in \mathbf{Z}, \\ \text{ὅπου} \quad \rho &= \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \quad \text{καί} \quad \theta \in [0, 2\pi) \quad \text{μέ} \\ \cos\theta &= \frac{\alpha}{\rho} \quad \text{καί} \quad \eta\mu\theta = \frac{\beta}{\rho} \end{aligned} \quad (3)$$

Ὅπως φαίνεται ἀπό τό σχ. 15, γιά τό μιγαδικό  $z = 1 + i$  εἶναι

$$\begin{aligned} z = 1 + i &= \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i\eta\mu \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \sqrt{2} \left( \cos \left( 2k\pi + \frac{\pi}{4} \right) + i\eta\mu \left( 2k\pi + \frac{\pi}{4} \right) \right), \quad k \in \mathbf{Z}. \end{aligned}$$



Σχ. 15

Ἡ τριγωνομετρική μορφή τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν βοηθεῖ στό νά ἀντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα καί νά δώσουμε γεωμετρική ἐρμηνεία σέ πολλά θεωρητικά συμπεράσματα.

Θά δώσουμε ἀμέσως παρακάτω μερικά χρήσιμα θεωρήματα.

**Θεώρημα 1ο.** Δύο μιγαδικοί ἀριθμοί  $z_1 = \rho_1(\cos\theta_1 + i\eta\mu\theta_1)$  καί  $z_2 = \rho_2(\cos\theta_2 + i\eta\mu\theta_2)$  εἶναι ἴσοι, ὅταν καί μόνο ὅταν

$$\rho_1 = \rho_2, \quad \theta_2 - \theta_1 = 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}$$

Ἀπόδειξη. Ἀφοῦ ἡ  $z_1 = z_2$  συνεπάγεται ὅτι  $\rho_1 \cos\theta_1 = \rho_2 \cos\theta_2$  καί  $\rho_1 \eta\mu\theta_1 = \rho_2 \eta\mu\theta_2$ , τότε θά εἶναι  $\rho_1^2(\cos^2\theta_1 + \eta\mu^2\theta_1) = \rho_2^2(\cos^2\theta_2 + \eta\mu^2\theta_2)$ , ὅποτε  $\rho_1 = \rho_2$ . Ἄρα  $\cos\theta_1 = \cos\theta_2$  καί  $\eta\mu\theta_1 = \eta\mu\theta_2$ , ὅποτε  $\theta_2 = 2k\pi + \theta_1$  ἢ  $\theta_2 - \theta_1 = 2k\pi$ .

**Θεώρημα 2ο.** Τό γινόμενο δύο μιγαδικών αριθμών είναι ένας μιγαδικός αριθμός που έχει μέτρο τό γινόμενο τών μέτρων τους και ὄρισμα τό ἄθροισμα τών ὀρισμάτων τους.

\*Απόδειξη. \*Αν  $z_1 = \rho_1 (\sigma\upsilon\nu\theta_1 + i\eta\mu\theta_1)$  καί  $z_2 = \rho_2 (\sigma\upsilon\nu\theta_2 + i\eta\mu\theta_2)$ , ἔχουμε:  $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 [(\sigma\upsilon\nu\theta_1 \sigma\upsilon\nu\theta_2 - \eta\mu\theta_1 \eta\mu\theta_2) + i (\sigma\upsilon\nu\theta_1 \eta\mu\theta_2 + \eta\mu\theta_1 \sigma\upsilon\nu\theta_2)]$ .

$$* \text{Άρα: } \boxed{z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 (\sigma\upsilon\nu(\theta_1 + \theta_2) + i\eta\mu(\theta_1 + \theta_2))} \quad (4)$$

\*Επαγωγικά δείξτε ὅτι: \*Αν  $z_k = \rho_k (\sigma\upsilon\nu\theta_k + i\eta\mu\theta_k)$ ,  $k = 1, 2, \dots, v$ , τότε :

$$z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_v = \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot \dots \cdot \rho_v [\sigma\upsilon\nu(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_v) + i\eta\mu(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_v)] \quad (5)$$

\*Αν είναι  $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_v = \rho$  καί  $\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_v = \theta$ , τότε  $z_1 = z_2 = \dots = z_v = \rho (\sigma\upsilon\nu\theta + i\eta\mu\theta)$  καί ἡ σχέση (5) γίνεται:

$$\boxed{z^v = [\rho(\sigma\upsilon\nu\theta + i\eta\mu\theta)]^v = \rho^v (\sigma\upsilon\nu(v\theta) + i\eta\mu(v\theta))} \quad (6)$$

\*Η (6) μᾶς εἶναι χρήσιμη παρακάτω καί ἀναφέρεται σάν **Θεώρημα De Moivre**. \*Άμεση συνέπεια τῆς σχέσεως (5) εἶναι καί ἡ γνωστή μας ιδιότητα τοῦ μέτρου τοῦ γινομένου πολλῶν μιγαδικῶν αριθμῶν, δηλαδή

$$\boxed{|z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_v| = |z_1| \cdot |z_2| \cdot \dots \cdot |z_v|} \quad (7)$$

\*Από τή σχέση (5) βλέπουμε ἀκόμη ὅτι:

$$\boxed{2k\pi + \text{Arg}(z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_v) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2 + \dots + \text{Arg } z_v,} \quad (8)^{(1)}$$

ὅπου  $k$  κατάλληλος ἀκέραιος ἀριθμός

**Θεώρημα 3ο.** \*Ο ἀντίστροφος ἑνός μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  $z \neq 0$  ἔχει μέτρο τό ἀντίστροφο τοῦ μέτρου του καί ὄρισμα τό ἀντίθετο τοῦ ὀρισμάτος του.

\*Απόδειξη. \*Αν  $z = \rho (\sigma\upsilon\nu\theta + i\eta\mu\theta)$ ,  $\rho \neq 0$ , εἶναι ἕνας μιγαδικός ἀριθμός, τότε θά

$$\begin{aligned} \text{εἶναι } \frac{1}{z} &= \frac{1}{\rho(\sigma\upsilon\nu\theta + i\eta\mu\theta)} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu\theta - i\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu^2\theta + \eta\mu^2\theta} = \\ &= \frac{1}{\rho} (\sigma\upsilon\nu\theta - i\eta\mu\theta) = \frac{1}{\rho} [\sigma\upsilon\nu(-\theta) + i\eta\mu(-\theta)]. \end{aligned}$$

**Θεώρημα 4ο.** Τό πηλίκο δύο μιγαδικῶν ἀριθμῶν εἶναι ἕνας μιγαδικός ἀριθμός πού ἔχει μέτρο τό λόγο τών μέτρων τους καί ὄρισμα τή διαφορά τών ὀρισμάτων τους. Δηλαδή:

$$\left. \begin{aligned} z_1 &= \rho_1 (\sigma\upsilon\nu\theta_1 + i\eta\mu\theta_1) \\ z_2 &= \rho_2 (\sigma\upsilon\nu\theta_2 + i\eta\mu\theta_2) \neq 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} [\sigma\upsilon\nu(\theta_1 - \theta_2) + i\eta\mu(\theta_1 - \theta_2)]$$

1. Γράφουμε  $2k\pi + \text{Arg}(z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_v)$ , γιατί εἶναι φανερό ὅτι τό ἄθροισμα στό β' μέλος τῆς (8) μπορεῖ νά μήν ἀνήκει στό  $[0, 2\pi)$ .

## I 5.2.

$$\begin{aligned} \text{Πράγματι: } \frac{z_1}{z_2} &= z_1 \cdot z_2^{-1} = [\rho_1(\sigma\upsilon\nu\theta_1 + i\eta\mu\theta_1)] \left[ \frac{1}{\rho_2}(\sigma\upsilon\nu(-\theta_2) + i\eta\mu(-\theta_2)) \right] = \\ &= \frac{\rho_1}{\rho_2} [\sigma\upsilon\nu(\theta_1 - \theta_2) + i\eta\mu(\theta_1 - \theta_2)]. \end{aligned}$$

**Πόρισμα:** 'Ισχύει  $(\sigma\upsilon\nu\theta + i\eta\mu\theta)^{-\nu} = \sigma\upsilon\nu(-\nu\theta) + i\eta\mu(-\nu\theta)$ ,  $\nu \in \mathbf{N}$ .

## 5.2. Παραδείγματα—'Εφαρμογές

1. Γράψτε τó μιγαδικό áριθμό  $z = \sqrt{3} + i$  σέ τριγωνομετρική μορφή.

Λύση: Είναι  $\alpha = \sqrt{3}$ ,  $\beta = 1$  και άρα  $\rho = \sqrt{3+1} = 2$ .

'Επίσης  $\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$  και  $\eta\mu\theta = \frac{1}{2}$  μé  $0 \leq \theta < 2\pi$ ,

άπό τίς όποιές παίρνουμε  $\theta = \frac{\pi}{6}$ .

'Ετσι είναι  $\sqrt{3} + i = 2 \left( \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6} + i \eta\mu \frac{\pi}{6} \right)$ .

2. Τó ίδιο γιά τó  $z = -2 - 2i$ .

Λύση: Είναι  $\alpha = -2$  και  $\beta = -2$  και άρα  $\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 2\sqrt{2}$ ,

$\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  και  $\eta\mu\theta = -\frac{2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ , μé  $0 \leq \theta < 2\pi$ .

'Από τίς τελευταίες παίρνουμε  $\theta = \frac{5\pi}{4}$ , όπότε

$$-2 - 2i = 2\sqrt{2} \left( \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{4} + i \eta\mu \frac{5\pi}{4} \right).$$

3. Γράψτε τó μιγαδικό áριθμό  $z = 4 \left( \sigma\upsilon\nu \frac{11\pi}{6} + i\eta\mu \frac{11\pi}{6} \right)$  στή μορφή  $\alpha + \beta i$ .

Λύση: Είναι  $\rho = 4$  και  $\theta = \frac{11\pi}{6}$ , άρα

$$\begin{aligned} \alpha &= 4\sigma\upsilon\nu \frac{11\pi}{6} = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ και } \beta = 4\eta\mu \frac{11\pi}{6} = 4 \cdot \left( -\frac{1}{2} \right) = -2, \text{ όπότε} \\ z &= 2\sqrt{3} - 2i. \end{aligned}$$

4. Βρείτε τά έξαγόμενα τών πράξεων:

$$\alpha) 6(\sigma\upsilon\nu 20^\circ + i\eta\mu 20^\circ) \cdot \frac{1}{3}(\sigma\upsilon\nu 40^\circ + i\eta\mu 40^\circ) \quad \beta) \frac{6(\sigma\upsilon\nu 20^\circ + i\eta\mu 20^\circ)}{1/3(\sigma\upsilon\nu 40^\circ + i\eta\mu 40^\circ)}$$

Λύση:

$$\begin{aligned} \alpha) 6(\sigma\upsilon\nu 20^\circ + i\eta\mu 20^\circ) \cdot \frac{1}{3}(\sigma\upsilon\nu 40^\circ + i\eta\mu 40^\circ) &= 2(\sigma\upsilon\nu(20^\circ + 40^\circ) + i\eta\mu(20^\circ + 40^\circ)) = \\ &= 2(\sigma\upsilon\nu 60^\circ + i\eta\mu 60^\circ) = 2 \left( \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta) \frac{6(\sigma\upsilon\nu 20^\circ + i\eta\mu 20^\circ)}{1/3(\sigma\upsilon\nu 40^\circ + i\eta\mu 40^\circ)} &= 18(\sigma\upsilon\nu(20^\circ - 40^\circ) + i\eta\mu(20^\circ - 40^\circ)) = 18(\sigma\upsilon\nu(-20^\circ) + i\eta\mu(-20^\circ)) \\ &= 18(\sigma\upsilon\nu 20^\circ - i\eta\mu 20^\circ). \end{aligned}$$

5. Νά υπολογιστεί ή παράσταση  $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^7$ .

Λύση: Γράφουμε τό μιγαδικό άριθμό  $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}$  σέ τριγωνομετρική μορφή .

Είναι  $\rho = \sqrt{\frac{2}{4} + \frac{6}{4}} = \sqrt{2}$  καί, άφοϋ τό σημείο  $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$  άνήκει στό (I) τεταρτημόριο, ή συνθ =  $\frac{1}{2}$  δίνει  $\theta = \frac{\pi}{3}$  (πρωτεϋον όρισμα) \*Άρα:

$\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2} = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{3} + i\eta \frac{\pi}{3} \right)$ . Άπό τό Θεώρημα De Moivre βρίσκουμε:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^7 &= \left[ \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{3} + i\eta \frac{\pi}{3} \right) \right]^7 = (\sqrt{2})^7 \cdot \left( \cos 7 \cdot \frac{\pi}{3} + i\eta 7 \cdot \frac{\pi}{3} \right) = \\ &= 8\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{3} + i\eta \frac{\pi}{3} \right) = \\ &= 8\sqrt{2} \left( \frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 4\sqrt{2} + 4i\sqrt{6}. \end{aligned}$$

6. Νά άπολοποιηθεί τό κλάσμα :  $\frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^7}{(\sqrt{3}-i)^3}$

Λύση: Άπό τό προηγούμενο παράδειγμα έχουμε  $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^7 = 8\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{3} + i\eta \frac{\pi}{3} \right)$ .

Βρίσκουμε τώρα τήν τριγωνομετρική μορφή του  $\sqrt{3}-i$ . Κατά τά γνωστά έχουμε

$$\sqrt{3}-i = 2 \left( \cos \frac{11\pi}{6} + i\eta \frac{11\pi}{6} \right), \text{ όποτε}$$

$$\begin{aligned} (\sqrt{3}-i)^3 &= \left[ 2 \left( \cos \frac{11\pi}{6} + i\eta \frac{11\pi}{6} \right) \right]^3 = 2^3 \cdot \left( \cos 3 \cdot \frac{11\pi}{6} + i\eta 3 \cdot \frac{11\pi}{6} \right) = \\ &= 2^3 \cdot \left( \cos \frac{11\pi}{2} + i\eta \frac{11\pi}{2} \right) = 8 (\cos 270^\circ + i\eta 270^\circ). \text{ *Άρα} \end{aligned}$$

$$\frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^7}{(\sqrt{3}-i)^3} = \frac{8\sqrt{2}(\cos 60^\circ + i\eta 60^\circ)}{8(\cos 270^\circ + i\eta 270^\circ)} = \sqrt{2} (\cos(60^\circ - 270^\circ) + i\eta(60^\circ - 270^\circ))$$

$$= \sqrt{2} (\cos(-210^\circ) + i\eta(-210^\circ)) = \sqrt{2} \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} \right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

7. Γεωμετρική παράσταση του γινομένου  $z_1 \cdot z_2$  καί του πηλίκου  $\frac{z_2}{z_1}$  των μιγαδικών άριθμών  $z_1 = \rho_1 (\cos \theta_1 + i\eta \theta_1)$  καί  $z_2 = \rho_2 (\cos \theta_2 + i\eta \theta_2)$  με  $\rho_1 \rho_2 \neq 0$ .


α) Είναι  $z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\eta(\theta_1 + \theta_2))$ .

Στρέφουμε τή μία άπό τίς διανυσματικές άκτίνες  $\vec{OM}_1, \vec{OM}_2$  (Σχ. 16) των  $z_1$  καί  $z_2$ , έστω τήν  $\vec{OM}_2$ , κατά γωνία ίση μέ τό Arg  $z_1$  καί πάνω στό φορέα τής τελικής άκτίνας παίρνουμε σημείο M, ώστε νά είναι  $|\vec{OM}| = \rho_1 \rho_2$ . Τό σημείο αυτό M είναι φανερό ότι όρίζει τή διανυσματική άκτίνα  $\vec{OM}$  του μιγαδικού  $z_1 \cdot z_2$ .


β) Στρέφουμε τή διανυσματική άκτίνα  $\vec{OM}_2$  του διαιρετέου  $z_2$  (Σχ. 17) κατά γωνία ίση

### I 5.3.

μέ το  $-Argz_1$  και όπως προηγουμένως βρίσκουμε το σημείο M με  $|\vec{OM}| = \frac{\rho_2}{\rho_1}$ . Έπειδή



Σχ. 16



Σχ. 17

είναι  $\frac{z_2}{z_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} (\cos(\theta_2 - \theta_1) + i\sin(\theta_2 - \theta_1))$ , γίνεται φανερό ότι το σημείο M, όπως βρέθηκε, όρίζει τη διανυσματική άκτίνα  $\vec{OM}$  του πηλίκου  $\frac{z_2}{z_1}$ .

8. Νά υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί του τόξου  $3\theta$ , άγνωρίζουμε τούς τριγωνομετρικούς αριθμούς του τόξου  $\theta$ .

Λύση: Από το θεώρημα De Moivre έχουμε  $\cos(n\theta) + i\sin(n\theta) = (\cos\theta + i\sin\theta)^n$ ,  $n \in \mathbf{N}$  (1)  
Για  $n = 3$  ή (1) γίνεται  $\cos 3\theta + i\sin 3\theta = (\cos\theta + i\sin\theta)^3$ , δηλαδή  
 $\cos 3\theta + i\sin 3\theta = \cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - i\sin^3\theta$  και συνεπώς  
 $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta(1 - \cos^2\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$  και  
 $\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta = 3(1 - \sin^2\theta)\sin\theta - \sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ .

### 5.3. Άσκησης

1. Νά γραφούν σε τριγωνομετρική μορφή οι μιγαδικοί αριθμοί:

$$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad 2 + 2\sqrt{3}i, \quad -\sqrt{3} + i,$$

2. Δείξτε ότι το θεώρημα De Moivre

$$(\rho(\cos\theta + i\sin\theta))^n = \rho^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)) \text{ ισχύει και όταν } n \in \{\dots, -3, -2, -1\}$$

3. Νά αποδείξετε ότι :

$$\alpha) (\sqrt{3} + i)^{150} = -2^{150},$$

$$\beta) (1+i)^n + (1-i)^n = 2^{\frac{n+2}{2}} \sin \frac{n\pi}{4}, \quad n \in \mathbf{N}, \quad \gamma) (1+i)^n - (1-i)^n = i 2^{\frac{n+2}{2}} \sin \frac{n\pi}{4}, \quad n \in \mathbf{N}$$

$$\delta) (\cos\theta + i\sin\theta)^n + (\cos\theta + i\sin\theta)^{-n} = 2\cos(n\theta), \quad (\cos\theta + i\sin\theta)^n - (\cos\theta + i\sin\theta)^{-n} = 2i\sin(n\theta).$$

4. Νά εκφράσετε τά  $\cos 5\theta$  και  $\sin 5\theta$  σαν πολυώνυμα τών  $\cos\theta$  και  $\sin\theta$  αντίστοιχα.

5. Αν  $z = \cos\theta + i\sin\theta$ , δείξτε ότι  $2\cos\theta = z + \frac{1}{z}$  και  $2i\sin\theta = z - \frac{1}{z}$ .

## 6. ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

## 6.1. Όρισμός—Θεώρημα

**Όρισμός.** Νιοστή ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού  $\xi = \alpha + \beta i$  είναι κάθε μιγαδικός αριθμός  $z = x + yi$  με την ιδιότητα

$$(x + yi)^v = \alpha + \beta i.$$

Θά δείξουμε, με τό θεώρημα πού ακολουθεί, ότι κάθε μή μηδενικός μιγαδικός αριθμός  $\xi$  έχει  $v$  άκριβώς διαφορετικές μεταξύ τους νιοστές ρίζες.

**Θεώρημα:** \*Αν  $\xi = \rho (\cos \theta + i \eta \mu \theta)$  είναι ένας μιγαδικός αριθμός με  $\rho \neq 0$ , τότε οι μιγαδικοί αριθμοί

$$z_k = \sqrt[v]{\rho} \left[ \cos \frac{\theta + 2k\pi}{v} + i \eta \mu \frac{\theta + 2k\pi}{v} \right], \quad k = 0, 1, 2, \dots, v-1$$

είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και είναι οι μόνοι πού επαληθεύουν την εξίσωση  $z^v = \xi$ .

**Άπόδειξη:** Θά εξετάσουμε άρχικά άν υπάρχει μιγαδικός αριθμός  $z = r(\cos \omega + i \eta \mu \omega)$ , πού νά είναι νιοστή ρίζα του  $\xi = \rho(\cos \theta + i \eta \mu \theta)$ .

Γιά νά συμβαίνει αυτό, πρέπει νά ισχύει

$$\rho(\cos \theta + i \eta \mu \theta) = [r(\cos \omega + i \eta \mu \omega)]^v = r^v (\cos(v\omega) + i \eta \mu(v\omega)) \quad (1), \quad \text{δηλαδή}$$

$$\rho = r^v \quad \text{καί} \quad v\omega = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z} \quad \text{ή} \quad r = \sqrt[v]{\rho} \quad \text{καί} \quad \omega = \frac{\theta + 2k\pi}{v}, \quad k \in \mathbf{Z}$$

$$*\text{Άρα} \quad z = \sqrt[v]{\rho} \left( \cos \frac{\theta + 2k\pi}{v} + i \eta \mu \frac{\theta + 2k\pi}{v} \right), \quad k \in \mathbf{Z} \quad (2).$$

Η (2) φανερώνει την ύπαρξη του  $z$ , δηλ. μιās νιοστής ρίζας του  $\xi$ .

Θά δείξουμε τώρα ότι ή (2) γιά  $k = 0, 1, 2, \dots, v-1$  δίνει  $v$  διαφορετικές τιμές της νιοστής ρίζας του  $\xi$ , με  $\xi \neq 0 + 0i$ , τίς όποίες θά όνομάζουμε νιοστές ρίζες του  $\xi$  και θά τίς συμβολίζουμε:

$$z_k = \sqrt[v]{\rho} \left( \cos \frac{\theta + 2k\pi}{v} + i \eta \mu \frac{\theta + 2k\pi}{v} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, v-1 \quad (3)$$

Στή συνέχεια θά δείξουμε ότι γιά όποιαδήποτε άλλη τιμή του  $k \in \mathbf{Z}$  ό  $z_k$  θά συμπίπτει με μία από τίς τιμές  $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{v-1}$  πού δίνει ό τύπος (3).

Πράγματι: i) \*Αν ήταν  $z_\lambda = z_\mu$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbf{Z}$ ,  $\lambda \neq \mu$  και  $0 \leq \lambda, \mu < v$ , τότε θά έπρεπε νά είναι  $\frac{\theta + 2\lambda\pi}{v} - \frac{\theta + 2\mu\pi}{v} = 2r\pi$ ,  $r \in \mathbf{Z}$ , δηλαδή  $\lambda - \mu = r\nu$ ,  $r \in \mathbf{Z}$ .

Είναι όμως  $0 < |\lambda - \mu| < \nu$  και έπομένως  $0 < |r\nu| < \nu$ , δηλ.  $0 < |r| < 1$ , τό όποιο είναι άτοπο, γιατί δέν υπάρχει  $r \in \mathbf{Z}$  με  $0 < |r| < 1$ .

\*Άρα  $z_\lambda \neq z_\mu$  γιά όλα τά  $\lambda, \mu \in \{0, 1, 2, \dots, v-1\}$ , δηλαδή οι  $v$  τιμές της (3) είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

## I 6.2.

ii) Για  $\kappa \in \mathbf{Z}$  με  $\kappa \notin \{0, 1, 2, \dots, v-1\}$ , δηλαδή για  $\kappa \geq v$  ή  $\kappa < 0$  θα έχουμε:  
 $\kappa = \lambda v + \nu$ ,  $\lambda \in \mathbf{Z}$  και  $\nu \in \{0, 1, 2, \dots, v-1\}$ , οπότε

$$\begin{aligned} z_\kappa &= \sqrt[v]{\rho} \left[ \sigma \nu \frac{\theta + 2\kappa\pi}{v} + i\eta \mu \frac{\theta + 2\kappa\pi}{v} \right] \\ &= \sqrt[v]{\rho} \left[ \sigma \nu \frac{\theta + 2(\lambda v + \nu)\pi}{v} + i\eta \mu \frac{\theta + 2(\lambda v + \nu)\pi}{v} \right] \\ &= \sqrt[v]{\rho} \left[ \sigma \nu \left( 2\lambda\pi + \frac{\theta + 2\nu\pi}{v} \right) + i\eta \mu \left( 2\lambda\pi + \frac{\theta + 2\nu\pi}{v} \right) \right] \\ &= \sqrt[v]{\rho} \left[ \sigma \nu \frac{\theta + 2\nu\pi}{v} + i\eta \mu \frac{\theta + 2\nu\pi}{v} \right] \quad \text{μέ } \nu \in \{0, 1, 2, \dots, v-1\}. \end{aligned}$$

Άρα ό  $z_\kappa$  συμπίπτει με μία από τις τιμές που δίνει ό τύπος (3).

Έτσι δείξαμε ότι ύπάρχουν  $v$  άκριβώς διαφορετικοί μεταξύ τους μιγαδικοί  $z_\kappa$ , όι όποιοι έπαληθεύουν την  $z^v = \xi = \rho (\sigma \nu \theta + i\eta \mu \theta)$ , όταν  $\rho \neq 0$ .

Τέλος, έπειδή όλοι όι  $z_\kappa$ ,  $\kappa = 0, 1, 2, \dots, v-1$  είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, θα έχουν και διαφορετικές εικόνες, όταν άπεικονιστούν στό μιγαδικό έπίπεδο. Αυτό θα φανεύ στό παραδείγματα 1 και 2 που άκολουθούν.

## 6.2. Παραδείγματα—Έφαρμογές

1. Βρείτε τις τρεις κυβικές ρίζες του  $-1 + \sqrt{3}i$ .


Λύση: Φέρνουμε άρχικά τον  $-1 + \sqrt{3}i$  σέ τριγωνομετρική μορφή.

Είναι  $-1 + \sqrt{3}i = 2 (\sigma \nu 120^\circ + i\eta \mu 120^\circ)$  και τότε


$$z_\kappa = \sqrt[3]{2} \left[ \sigma \nu \left( \frac{120^\circ + 360^\circ \kappa}{3} \right) + i\eta \mu \left( \frac{120^\circ + 360^\circ \kappa}{3} \right) \right], \quad \kappa = 0, 1, 2$$

$$z_0 = \sqrt[3]{2} (\sigma \nu 40^\circ + i\eta \mu 40^\circ),$$

$$z_1 = \sqrt[3]{2} (\sigma \nu 160^\circ + i\eta \mu 160^\circ),$$



Σχ. 18



Σχ. 19

$$z_2 = \sqrt[3]{2} (\cos 280^\circ + i \sin 280^\circ)$$

Γεωμετρικά οι κυβικές ρίζες που βρήκαμε απεικονίζονται στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου έγγεγραμμένου σε κύκλο ακτίνας  $\sqrt[3]{2}$  με πρώτη κορυφή τό  $M_0$ , όπου  $(OA, \widehat{OM}_0) = 40^\circ$ . (Σχ. 18).

2. Νά παραστήσετε γεωμετρικά τις νιοστές ρίζες του μιγαδικού αριθμού  $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$ .

Λύση: Οι νιοστές ρίζες του  $z$  δίνονται από τον τύπο

$$z_\kappa = \sqrt[\nu]{\rho} \left[ \cos \frac{\theta + 2\kappa\pi}{\nu} + i \sin \frac{\theta + 2\kappa\pi}{\nu} \right], \quad \kappa = 0, 1, 2, \dots, (\nu-1), \text{ και είναι}$$

$$z_0 = \sqrt[\nu]{\rho} \left( \cos \frac{\theta}{\nu} + i \sin \frac{\theta}{\nu} \right),$$

$$z_1 = \sqrt[\nu]{\rho} \left[ \left( \cos \frac{\theta}{\nu} + \frac{2\pi}{\nu} \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{\nu} + \frac{2\pi}{\nu} \right) \right],$$

$$z_2 = \sqrt[\nu]{\rho} \left[ \left( \cos \frac{\theta}{\nu} + \frac{4\pi}{\nu} \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{\nu} + \frac{4\pi}{\nu} \right) \right],$$

⋮

$$z_{\nu-1} = \sqrt[\nu]{\rho} \left[ \cos \left( \frac{\theta}{\nu} + \frac{2(\nu-1)\pi}{\nu} \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{\nu} + \frac{2(\nu-1)\pi}{\nu} \right) \right]$$

Παρατηρούμε ότι όλες οι νιοστές ρίζες του  $z$  έχουν τό ίδιο μέτρο, δηλαδή  $|z_\kappa| = \sqrt[\nu]{\rho}$  και όρισμα τέτοιο, ώστε από κάποια αρχική τιμή  $\frac{\theta}{\nu}$  νά αύξάνει διαδοχικά κατά  $\frac{2\pi}{\nu}$ . "Όπως είπαμε και προηγούμενα οι μιγαδικοί αυτοί αριθμοί  $z_\kappa$  απεικονίζονται σε σημεία του μιγαδικού επίπεδου, που είναι σημεία του κύκλου  $(O, \sqrt[\nu]{\rho})$ . (Σχ. 19).

3. Νά έπιλυθεί ή εξίσωση  $z^3 = -64i$

Έπίλυση: Έχουμε  $z^3 = -64i = 64(-i) = 64 \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{2} \right) \right]$ ,  
όπότε παίρνουμε:

$$z_\kappa = \sqrt[3]{64} \left[ \cos \frac{-\frac{\pi}{2} + 2\kappa\pi}{3} + i \sin \frac{-\frac{\pi}{2} + 2\kappa\pi}{3} \right], \quad \kappa = 0, 1, 2$$

Γιά  $\kappa = 0$  είναι:  $z_0 = 4 \left( \cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 4 \cdot \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - i \cdot \frac{1}{2} \right)$ ,

για  $\kappa = 1$  είναι:  $z_1 = 4 \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 4(0 + i) = 4i$ ,

για  $\kappa = 2$  είναι:  $z_2 = 4 \left( \cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) = 4 \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} - i \cdot \frac{1}{2} \right)$ .

Παρατήρηση: Κάθε εξίσωση τής μορφής  $z^\nu = \alpha$ , όπου  $\alpha \in \mathbf{C}$ ,  $\alpha \neq 0$  και  $\nu \in \mathbf{N}$  ονομάζεται διώνυμη εξίσωση και έπιλύεται με τή βοήθεια του θεωρήματος τής παραγράφου 6.1. για τόν ύπολογισμό τών ν νιοστών ριζών τών μιγαδικών αριθμών.

4. Νά έπιλυθεί ή εξίσωση:  $z^5 = -\sqrt{3} + i$ .

Έπίλυση: Πρώτα γράφουμε τόν  $-\sqrt{3} + i$  σε τριγωνομετρική μορφή.

### I 6.3.

\*Έτσι έχουμε:  $z^5 = -\sqrt{3} + i = 2$  (συν  $150^\circ + i\eta\mu 150^\circ$ ), οπότε οι ρίζες είναι

$$z_\kappa = \sqrt[5]{2} \left( \text{συν} \frac{150^\circ + 360^\circ \kappa}{5} + i\eta\mu \frac{150^\circ + 360^\circ \kappa}{5} \right), \quad \kappa = 0, 1, 2, 3, 4.$$

$$z_0 = \sqrt[5]{2} (\text{συν} 30^\circ + i\eta\mu 30^\circ) = \sqrt[5]{2} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + i \cdot \frac{1}{2} \right)$$

$$z_1 = \sqrt[5]{2} \left( \text{συν} \frac{150^\circ + 360^\circ}{5} + i\eta\mu \frac{150^\circ + 360^\circ}{5} \right), \quad \text{κ.τ.λ.}$$

5. Νά επιλυθεί ή εξίσωση:  $z^v = 1$  (1) (Νιοστές ρίζες της μονάδας).

\*Επίλυση: \*Έχουμε  $z^v = 1$ . (συν  $0^\circ + i\eta\mu 0^\circ$ ), οπότε οι  $v$  ρίζες είναι

$$z_\kappa = \sqrt[v]{1} \left( \text{συν} \frac{0 + 2\kappa\pi}{v} + i\eta\mu \frac{0 + 2\kappa\pi}{v} \right) = \text{συν} \frac{2\kappa\pi}{v} + i\eta\mu \frac{2\kappa\pi}{v}, \quad \kappa = 0, 1, 2, \dots, v-1$$

Οι  $v$  αυτές ρίζες της (1) λέγονται και νιοστές ρίζες της μονάδας.

Παρατηρούμε ότι  $z_\kappa = \text{συν} \frac{2\kappa\pi}{v} + i\eta\mu \frac{2\kappa\pi}{v} = \left( \text{συν} \frac{2\pi}{v} + i\eta\mu \frac{2\pi}{v} \right)^\kappa$ ,  $\kappa = 0, 1, 2, \dots, v-1$

$$\text{όπότε } z_0 = 1, \quad z_1 = \text{συν} \frac{2\pi}{v} + i\eta\mu \frac{2\pi}{v}, \quad z_2 = \left( \text{συν} \frac{2\pi}{v} + i\eta\mu \frac{2\pi}{v} \right)^2 = z_1^2,$$

$$z_3 = z_1^3, \quad z_4 = z_1^4, \dots, z_{v-1} = z_1^{v-1}.$$

\*Αρα οι νιοστές ρίζες της μονάδας είναι οι:

$$1, z_1, z_1^2, z_1^3, \dots, z_1^{v-1} \quad \text{μέ } z_1 = \text{συν} \frac{2\pi}{v} + i\eta\mu \frac{2\pi}{v}.$$

Γιά  $v=3$ , έχουμε τις κυβικές ρίζες της μονάδας πού είναι:

$$z_0 = 1, \quad z_1 = \text{συν} \frac{2\pi}{3} + i\eta\mu \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_2 = z_1^2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Οι κυβικές ρίζες της μονάδας, αν άπεικονιστούν στον κύκλο (0,1), είναι κορυφές ισόπλευρου τριγώνου.

### 6.3. Άσκησης

1. Νά επιλυθούν στό  $\mathbf{C}$  οι εξισώσεις.

α)  $z^3 = 8$ , β)  $z^3 = 2 + 2i$  γ)  $z^6 + 64 = 0$ , δ)  $z^3 = 1 + i\sqrt{3}$ , ε)  $z^5 + 64i = 0$  και  
στ)  $3x^6 + 24x^3 = 0$

2. Δείξτε ότι τις ρίζες της εξίσωσης  $(1+z)^{2v} + (1-z)^{2v} = 0$  μάς τις δίνει ό τύπος:

$$z = i \epsilon\phi \frac{2\kappa + 1}{4v} \pi, \quad \text{όπου } \kappa = 0, 1, 2, \dots, (2v-1).$$

3. Νά άπεικονιστούν στό μιγαδικό επίπεδο οι ρίζες της εξίσωσης  $z^5 = -\sqrt{3} + i$

4. \*Αν  $z_1, z_2$  είναι οι μιγαδικές κυβικές ρίζες της μονάδας δείξτε ότι:

α)  $z_1^2 = z_2$  και  $z_2^2 = z_1$ ,

β)  $1 + z_1 + z_1^2 = 0$  και  $1 + z_2 + z_2^2 = 0$ ,

γ)  $(1 + 2z_1 + 3z_2) \cdot (1 + 2z_2 + 3z_1) = 3$ ,

δ)  $(1 + z_1 - z_2)^3 = (1 - z_1 + z_2)^3$ .

5. Δείξτε ότι ό  $z = \text{συν}\theta + i\eta\mu\theta \neq -1$  γράφεται και

$$z = \frac{1+ki}{1-ki}, \quad k \in \mathbf{R} \text{ κατάλληλος.}$$

6. Δείξτε ότι, αν  $x, y, z \in \mathbf{R}$  και  $\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ , τότε θά είναι

α)  $(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^5) = 9,$

β)  $x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx = (x+y\omega+z\omega^2)(x+y\omega^2+z\omega),$  και

γ)  $x^3+y^3+z^3-3xyz = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z).$

7. \*Αν είναι  $\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$  δείξτε ότι τότε θά είναι:

α)  $\alpha^3+\beta^3 = (\alpha+\beta)(\alpha\omega+\beta\omega^2)(\alpha\omega^2+\beta\omega)$

β)  $(\alpha+\beta+\gamma)^3 + (\alpha+\beta\omega+\gamma\omega^2)^3 + (\alpha+\beta\omega^2+\gamma\omega)^3 = 3(\alpha^3+\beta^3+\gamma^3+6\alpha\beta\gamma).$

8. Δείξτε ότι κάθε μία από τις παραστάσεις

$$z_1 = \alpha + z\beta + z^2\gamma, \quad z_2 = \alpha + z^2\beta + z\gamma, \quad \text{όπου } z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2},$$

δέ μεταβάλλεται, αν αντί-καταστήσουμε τούς  $\alpha, \beta, \gamma$  μέ τούς  $\alpha+\lambda, \beta+\lambda, \gamma+\lambda, \lambda \in \mathbf{R}$  αντίστοιχα.

9. Δείξτε ότι:

$$(1-z+z^2) \cdot (1-z^2+z^4) \cdot (1-z^4+z^8) \cdots (1-z^{2^{k-1}}+z^{2^k}) = 2^k,$$

όπου  $k$  ἄρτιος φυσικός και  $z$  τυχούσα κυβική μιγαδική ρίζα τῆς μονάδας.

10. \*Αν  $n \in \mathbf{N}$  και  $z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ , δείξτε ότι οί μοναδικές τιμές τῆς παραστάσεως

$$K = z^{2^n} + z^n \text{ είναι } -1 \text{ και } 2.$$

$$|z|^{2^n} + |z|^n = 2$$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \right|^{2^n} + \left| \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \right|^n = 2 \\ & \left( \frac{\sqrt{1+3}}{2} \right)^{2^n} + \left( \frac{\sqrt{1+3}}{2} \right)^n = 2 \\ & \left( \frac{2}{2} \right)^{2^n} + \left( \frac{2}{2} \right)^n = 2 \\ & 1^{2^n} + 1^n = 2 \\ & 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\left( \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \right)^{2^n} + \left( \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \right)^n = 2$$

## 7. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Τό σύνολο
- $C = \{z | z = (\alpha, \beta), \alpha \in \mathbf{R}, \beta \in \mathbf{R}\}$
- με

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \beta_1) &= (\alpha_2, \beta_2) \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \text{ και } \beta_1 = \beta_2 \\ (\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) &= (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2) \\ (\alpha_1, \beta_1) \cdot (\alpha_2, \beta_2) &= (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2, \alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \end{aligned}$$

είναι τό σύνολο τών μιγαδικών αριθμῶν.

2. Οί μιγαδικοί αριθμοῖν μποροῦν νά ἀπεικονιστοῦν στά σημεία ἑνός ἐπιπέδου (μιγαδικό ἐπίπεδο).
3. Στό μιγαδικό ἐπίπεδο ὁ κύκλος κέντρου  $(x_0, y_0)$  καί ἀκτίνας μέτρου  $\alpha$  ἔχει ἐξίσωση

$$|z - z_0| = \alpha, \text{ ὅπου } z_0 = (x_0, y_0) \text{ καί } z = (x, y).$$

4. Ἄλλες συντεταγμένες τοῦ μιγαδικοῦ  $z = (\alpha, \beta) \neq (0, 0)$  εἶναι οἱ πολικές  $(\rho, \theta)$ , ὅπου  $\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ ,  $\theta \in [0, 2\pi)$  μέ  $\cos \theta = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$  καί  $\eta \mu \theta = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$ .
5. Μέ τή βοήθεια τών πολικῶν συντεταγμένων τους οἱ μιγαδικοί αριθμοῖν παίρνουν τήν τριγωνομετρική τους μορφή

$$z = \rho(\cos \theta + i \eta \mu \theta).$$

Γιά τούς μιγαδικούς  $z = \rho(\cos \theta + i \eta \mu \theta)$ ,  $z_1 = \rho_1 (\cos \theta_1 + i \eta \mu \theta_1)$ ,  $z_2 = \rho_2 (\cos \theta_2 + i \eta \mu \theta_2)$  ἰσχύουν:

$$\begin{aligned} z_1 = z_2 &\Leftrightarrow \rho_1 = \rho_2 \text{ καί } \theta_2 - \theta_1 = 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbf{Z} \\ z_1 \cdot z_2 &= \rho_1 \cdot \rho_2 [\cos (\theta_1 + \theta_2) + i \eta \mu (\theta_1 + \theta_2)] \\ z_1 : z_2 &= \frac{\rho_1}{\rho_2} [\cos (\theta_1 - \theta_2) + i \eta \mu (\theta_1 - \theta_2)], \rho_2 \neq 0 \\ \frac{1}{z_2} &= \frac{1}{\rho_2} [\cos (-\theta_2) + i \eta \mu (-\theta_2)], \rho_2 \neq 0 \\ z^v &= \rho^v [\cos (v\theta) + i \eta \mu (v\theta)], v \in \mathbf{N} \end{aligned}$$

6. Κάθε μή μηδενικός μιγαδικός αριθμός  $\xi = \rho(\cos \theta + i \eta \mu \theta)$  ἔχει  $v$  ἀκριβῶς διαφορετικές μεταξύ τους νιοστές ρίζες, τίς:

$$z_\kappa = \sqrt[v]{\rho} \left( \cos \frac{\theta + 2\kappa\pi}{v} + i \eta \mu \frac{\theta + 2\kappa\pi}{v} \right), \kappa = 0, 1, 2, \dots, v-1$$

## 8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. \*Αν  $z \neq -1+0i$  και  $z \neq 1+0i$  δείξτε ότι:
- α) όταν  $|z|=1$ , τότε ο αριθμός  $\frac{z-1}{z+1}$  είναι καθαρός φανταστικός, και
- β) όταν ο αριθμός  $\frac{z-1}{z+1}$  είναι καθαρός φανταστικός, τότε  $|z|=1$ .
2. Για κάθε  $\alpha \in \mathbf{R}$  με  $\alpha \geq 1$  βρείτε τους μιγαδικούς  $z$ , που επαληθεύουν την εξίσωση  $z + \alpha|z+1| + i = 0$ .
3. Για κάθε  $\alpha \geq 0$  βρείτε τους μιγαδικούς που επαληθεύουν την  $2|z| - 4\alpha z + 1 + i\alpha = 0$
4. \*Επιλύστε το σύστημα  $z^3 + \omega^5 = 0$   
 $z^2 \cdot \bar{\omega}^4 = 1$ , αν οι  $z, \omega$  είναι μιγαδικοί.
5. Δείξτε ότι α)  $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ , αν  $\frac{z_1}{z_2} > 0$ ,  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$ , και
- β)  $|z_1 + z_2| = ||z_1| - |z_2||$ , αν  $\frac{z_1}{z_2} < 0$  και  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$
6. Δείξτε ότι α)  $|z_1 - z_2| = ||z_1| - |z_2||$ , αν  $\frac{z_1}{z_2} > 0$ ,  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$ , και
- β)  $|z_1 - z_2| = |z_1| + |z_2|$ , αν  $\frac{z_1}{z_2} < 0$ ,  $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$ .
7. \*Απολλώνιος Κύκλος: \*Αν  $z_1$  και  $z_2$  είναι δεδομένοι μιγαδικοί αριθμοί, βρείτε τό σύνολο τῶν σημείων τοῦ μιγαδικοῦ επιπέδου, που είναι εἰκόνες τῶν μιγαδικῶν  $z$  μέ:  
 $|z - z_1| = \lambda|z - z_2|$  και  $\lambda \neq 1$ .  
Δείξτε ἄκόμη ὅτι τό κέντρο αὐτοῦ τοῦ κύκλου εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ μιγαδικοῦ  
 $z_0 = \frac{z_1 - \lambda^2 z_2}{1 - \lambda^2}$  και ἡ ἄκτινα του εἶναι  $\alpha = \frac{\lambda|z_1 - z_2|}{|1 - \lambda^2|}$ .
8. \*Αν  $|z-10| = 3|z-2|$  δείξτε ότι  $|z-1| = 3$ .
9. \*Υπολογίστε τούς  $x, y \in \mathbf{R}$ , που ἱκανοποιοῦν τήν  $(x+2yi)^2 = xi$
10. \*Αν  $|z|^2 = |z^2-1|$ , δείξτε ὅτι  $\operatorname{Re} z^2 = \frac{1}{2}$ .
11. \*Αν  $z = x+yi$ ,  $x, y \in \mathbf{R}$  και  $z^2 + z + 1 = 0$ , τότε θά εἶναι  
 $|z| = |z+1| = 1$ .
12. Βρείτε τό μέτρο και τό ὄρισμα τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ  
 $z = \sigma \alpha - i\eta \mu \alpha + \sigma \nu \theta + i\eta \mu \theta$ ,  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ .
13. \*Αν  $|z+16| = 4|z+1|$ , δείξτε ὅτι  $|z| = 4$ .
14. \*Αν  $z = x+yi$ ,  $z^{-1} = (\alpha + \beta i)^{-1} + (\alpha + \gamma i)^{-1}$  μέ  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$  και  $\alpha + \beta i$ ,  $\alpha + \gamma i$  ὄχι μηδενικοί, ὑπολογίστε τίς τιμές τῶν παραστάσεων  
i)  $x^2 + y^2$ , ii)  $(x-\alpha)^2 + y^2$  και iii)  $\operatorname{Re} z$  συναρτήσει τῶν  $\alpha, \beta, \gamma$ .
15. \*Αν  $z_1 = (z-\alpha) / (\bar{\alpha}z-1)$ ,  $z \neq 1/\bar{\alpha}$ ,  $0 < |\alpha| < 1$ ,  
δείξτε ὅτι  $|z_1| \geq 1$ , ὅταν, και μόνο ὅταν,  $|z| \geq 1$ .
16. \*Αν  $\zeta^2 = 1+z^2$ ,  $\zeta = \xi + i\eta$ ,  $z = x+yi$  και  $\xi, \eta, x, y \in \mathbf{R}$ , δείξτε ὅτι:

$$i) \frac{\xi+x}{\xi-x} = (\xi+x)^2 + (\eta+y)^2 = \frac{y+\eta}{y-\eta}$$

$$ii) 2\xi^2 = \sqrt{(1+x^2-y^2)^2 + 4x^2y^2} + 1 + x^2 - y^2$$

$$2\eta^2 = \sqrt{(1+x^2-y^2)^2 + 4x^2y^2} - 1 - x^2 + y^2$$

17. Δείξτε ότι  $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$  και έπειτα δείξτε ότι για τυχόντες μιγαδικούς  $z_3$  και  $z_4$  θά ισχύει

$$|z_3 - \sqrt{z_3^2 - z_4^2}| + |z_3 + \sqrt{z_3^2 - z_4^2}| = |z_3 + z_4| + |z_3 - z_4|$$

18. Δείξτε ότι οι εικόνες τών διακεκριμένων μιγαδικών αριθμών  $z_1, z_2, z_3$  στο μιγαδικό επίπεδο βρίσκονται σε εϋθεία γραμμή, όταν και μόνο όταν  $\frac{z_1 - z_3}{z_3 - z_2} = \lambda \in \mathbf{R}$ .

19. \*Αν για τούς μιγαδικούς αριθμούς  $z_1$  και  $z_2$  είναι  $|z_1| < 1$  και  $|z_2| < 1$ , δείξτε ότι  $|z_1 - z_2| < |1 - \bar{z}_1 z_2|$ .

20. \*Αν  $z_1, z_2$  είναι μιγαδικοί αριθμοί και  $\lambda > 0$ , δείξτε ότι

$$|z_1 + z_2|^2 \leq (\lambda + \lambda)|z_1|^2 + \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)|z_2|^2.$$

21. \*Αν οι αριθμοί  $z_1, z_2, \dots, z_n$  ικανοποιούν τήν ανισότητα

$$\left|\frac{z_1 - i}{z_1 + i}\right| + \left|\frac{z_2 - i}{z_2 + i}\right| + \dots + \left|\frac{z_n - i}{z_n + i}\right| < 1,$$

τότε θά ικανοποιούν και τήν

$$\left|\frac{z_1 + z_2 + \dots + z_n - i}{z_1 + z_2 + \dots + z_n + i}\right| < 1.$$

22. Βρείτε τά ακόλουθα άθροίσματα:

$$\Sigma = 1 + x \text{ συν}\theta + x^2 \text{ συν}2\theta + \dots + x^{v-1} \text{ συν}(v-1)\theta \quad \text{και}$$

$$\Sigma' = x \eta \mu \theta + x^2 \eta \mu 2\theta + \dots + x^{v-1} \eta \mu (v-1)\theta,$$

άν  $x \in \mathbf{R}$  και  $0 < \theta < \pi$ .

23. \*Υπολογίστε τά ακόλουθα άθροίσματα.

$$\Sigma = 1 + v \text{ συν}\theta + \frac{v(v-1)}{1 \cdot 2} \text{ συν}2\theta + \frac{v(v-1)(v-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \text{ συν}3\theta + \dots, \quad \text{και}$$

$$\Sigma' = v \eta \mu \theta + \frac{v(v-1)}{1 \cdot 2} \eta \mu 2\theta + \frac{v(v-1)(v-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \eta \mu 3\theta + \dots$$

24. \*Αν  $\omega = \text{συν} \frac{2\pi}{v} + i \eta \mu \frac{2\pi}{v}$ ,  $v \in \mathbf{N}$  και

$A_\kappa = x + y\omega^\kappa + z\omega^{2\kappa} + \dots + \tau\omega^{(v-1)\kappa}$ ,  $\kappa = 0, 1, 2, \dots, v-1$ , μέ  $x, y, z, \dots, \tau$  τυχόντες μιγαδικούς αριθμούς, δείξτε ότι:

$$|A_0|^2 + |A_1|^2 + \dots + |A_{v-1}|^2 = v(|x|^2 + |y|^2 + \dots + |\tau|^2).$$

25. Δείξτε ότι ό μιγαδικός  $z = x + yi$  μπορεί νά γραφτεί μέ τή μορφή

$$|z| \cdot \left[ \frac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2} + i \frac{2\lambda}{1+\lambda^2} \right], \quad \text{όπου } x, y, \lambda \in \mathbf{R}.$$

26. Νά έπιλυθεί ή εξίσωση  $(z^2 - 1)^4 = 16(\text{συν}\alpha + i \eta \mu\alpha) \cdot z^4$ ,  $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ .



ΑΛΓΕΒΡΗΣ ΔΟΜΕΣ

1. Αριθμοί
2. Νηματοειδές Ομάδες
3. Ομάδες
4. Σύνολο
5. Διανυσματικά Εξισώματα
6. Σύνολο Ανακεκλιμένων
7. Σύνολο για τα Σύνολο
8. Σύνολο για τα Σύνολο
9. Σύνολο για τα Σύνολο
10. Σύνολο για τα Σύνολο
11. Σύνολο για τα Σύνολο
12. Σύνολο για τα Σύνολο
13. Σύνολο για τα Σύνολο
14. Σύνολο για τα Σύνολο
15. Σύνολο για τα Σύνολο
16. Σύνολο για τα Σύνολο
17. Σύνολο για τα Σύνολο
18. Σύνολο για τα Σύνολο
19. Σύνολο για τα Σύνολο
20. Σύνολο για τα Σύνολο
21. Σύνολο για τα Σύνολο
22. Σύνολο για τα Σύνολο
23. Σύνολο για τα Σύνολο
24. Σύνολο για τα Σύνολο
25. Σύνολο για τα Σύνολο
26. Σύνολο για τα Σύνολο
27. Σύνολο για τα Σύνολο
28. Σύνολο για τα Σύνολο
29. Σύνολο για τα Σύνολο
30. Σύνολο για τα Σύνολο

## ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Σέ προηγούμενες τάξεις γνωρίσαμε διάφορα σύνολα, όπως τό σύνολο  $\mathbf{N}$  τών φυσικῶν ἀριθμῶν, τό σύνολο  $\mathbf{R}$  τών πραγματικῶν ἀριθμῶν, τό σύνολο  $\mathbf{V}$  τών διανυσμάτων ἑνός ἐπιπέδου κ.ἄ. Στά σύνολα αὐτά εἶχαμε ὀρίσει διάφορες πράξεις, όπως πρόσθεση καί πολλαπλασιασμό ἀριθμῶν, πρόσθεση διανυσμάτων κτλ. Εἶδαμε ἀκόμα ὅτι οἱ διάφορες πράξεις στά σύνολα αὐτά εἶχαν κοινές ιδιότητες, όπως π.χ. ἡ πρόσθεση στό  $\mathbf{R}$  καί ἡ πρόσθεση στό  $\mathbf{V}$  ἦταν ἀντιμεταθετικές, προσεταιριστικές κτλ.

Γεννιέται τώρα τό ἐρώτημα ἄν μπορούμε νά ταξινομήσουμε τά διάφορα σύνολα μέ βάση τίς ιδιότητες τών πράξεων, μέ τίς ὁποῖες εἶναι ἐφοδιασμένα, καί ἄν μιά τέτοια ταξινόμηση θά ἦταν χρήσιμη.

Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ θέματος ἡ γνωστή μας ἀξιοματική μέθοδος ἐφαρμόζεται μέ ἐπιτυχία καί μάλιστα μέ πολλά ὀφέλη (ἐνιαία γλώσσα, ἐπίλυση μαθηματικῶν προβλημάτων, ἐφαρμογές σέ ἄλλες ἐπιστῆμες κτλ.). Ἐτσι σέ ἕνα σύνολο θά ὀρίζουμε πράξεις, θά δεχόμαστε μερικά ἀξιώματα καί θά ἀποδεικνύουμε γενικές ιδιότητες ἀνεξάρτητες ἀπό τή φύση τών στοιχείων τοῦ συνόλου.

Στό κεφάλαιο αὐτό θά γνωρίσουμε μερικές τέτοιες βασικές ταξινομήσεις, προηγουμένως ὁμως θά μελετήσουμε τήν ἔννοια τῆς πράξεως πού, όπως ἀναφέραμε καί παραπάνω, ὁ ρόλος της εἶναι βασικός.

### 1. ΔΙΜΕΛΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

#### 1.1. Ἡ ἔννοια τῆς διμελοῦς πράξεως

Κοινό γνώρισμα τών διάφορων πράξεων πού ἔχουμε μάθει σέ προηγούμενες τάξεις, όπως π.χ. ἡ πρόσθεση καί ὁ πολλαπλασιασμός ἀριθμῶν, ἡ πρόσθεση διανυσμάτων, ὁ ἐσωτερικός πολλαπλασιασμός διανυσμάτων, ὁ πολλαπλασιασμός πραγματικοῦ ἀριθμοῦ μέ διάνυσμα, εἶναι ὅτι «συνθέτουμε» δύο στοιχεῖα, πού ἀνήκουν σέ δύο σύνολα, καί παίρνουμε ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συνθέσεως ἀκριβῶς ἕνα στοιχεῖο ἑνός συνόλου, τό ὁποῖο εἶναι δυνατό νά εἶναι ἴσο μέ κάποιο ἀπό τά δύο προηγούμενα σύνολα.

Σέ πολλές πράξεις τό ἀποτέλεσμα ἐξαρτᾶται ἀπό τή διάταξη τών στοιχείων πού συνθέτουμε, όπως π.χ. στήν ἀφαίρεση πραγματικῶν ἀριθμῶν τά ἀποτελέσματα  $x-y$  καί  $y-x$  εἶναι γενικῶς διαφορετικά. Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν νά

## II 1.1.

θεωρήσουμε ότι τό αποτέλεσμα μιᾶς πράξεως προέρχεται ἀπό ἕνα διατεταγμένο ζευγος. Ἔτσι, γενικά, μιᾶ πράξη εἶναι μιᾶ ἀπεικόνιση<sup>(1)</sup> ἑνός συνόλου διατεταγμένων ζευγῶν σέ ἕνα ἄλλο σύνολο.

Δίνουμε τώρα τόν παρακάτω ὄρισμό.

**Ὅρισμός 1.** Ἄν  $A, B$  καί  $\Gamma$  εἶναι μή κενά σύνολα, τότε κάθε ἀπεικόνιση  $f$  ἑνός μή κενοῦ ὑποσυνόλου  $\Delta$  τοῦ καρτεσιανοῦ γινομένου  $A \times B$  στό  $\Gamma$  ὀνομάζεται **(διμελῆς) πράξη** ἀπό τό  $A \times B$  στό  $\Gamma$ .

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἀκόλουθες εἰδικές περιπτώσεις πράξεων:

(i)  $A = B = \Gamma$  καί  $\Delta = A \times B$ . Τότε ἡ πράξη εἶναι ἀπεικόνιση τῆς μορφῆς

$$f: A \times A \rightarrow A$$

καί ὀνομάζεται **ἐσωτερική πράξη στό  $A$** .

Γιά τό συμβολισμό μιᾶς ἐσωτερικῆς πράξεως θά χρησιμοποιοῦμε, ἀντί γιά τό  $f$ , ἕνα ἀπό τά σύμβολα  $*$ ,  $\circ$ ,  $+$ ,  $\cdot$ . Ἔτσι, χρησιμοποιώντας τό σύμβολο  $*$ , τήν εἰκόνα  $f((\alpha, \beta))$  τοῦ  $(\alpha, \beta) \in A \times A$  θά τή συμβολίζουμε μέ  $\alpha * \beta$  καί θά τήν ὀνομάζουμε **ἀποτέλεσμα** τῆς ἐσωτερικῆς πράξεως μεταξύ τοῦ  $\alpha$  καί  $\beta$ .

Μέ  $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3$  θά συμβολίζουμε τό  $(\alpha_1 * \alpha_2) * \alpha_3$  καί γενικά μέ  $\alpha_1 * \alpha_2 * \dots * \alpha_n$ , τό  $(\alpha_1 * \alpha_2 * \dots * \alpha_{n-1}) * \alpha_n$ .

(ii)  $B = \Gamma$  καί  $\Delta = A \times B$ . Τότε ἡ πράξη εἶναι ἀπεικόνιση τῆς μορφῆς

$$f: A \times B \rightarrow B$$

καί ὀνομάζεται **ἐξωτερική πράξη στό  $B$** .

Γιά τό συμβολισμό μιᾶς ἐξωτερικῆς πράξεως θά χρησιμοποιοῦμε, ἀντί γιά τό  $f$ , τό σύμβολο  $\cdot$  (ἐπί). Ἔτσι ἡ εἰκόνα  $f((\alpha, x))$  τοῦ  $(\alpha, x) \in A \times B$  θά συμβολίζεται μέ  $\alpha \cdot x$  καί θά ὀνομάζεται **ἀποτέλεσμα** τῆς ἐξωτερικῆς πράξεως μεταξύ τοῦ  $\alpha \in A$  καί τοῦ  $x \in B$ . Τά στοιχεῖα τοῦ  $A$  ὀνομάζονται **τελεστής**. Γι' αὐτό ἡ ἀκριβέστερη ὀνομασία τῆς πράξεως αὐτῆς εἶναι «ἐξωτερική πράξη στό  $B$  μέ σύνολο τελεστῶν τό  $A$ ».

### Παραδείγματα:

- Ἡ πρόσθεση, ἡ ἀφαίρεση καί ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι ἐσωτερικές πράξεις στό  $\mathbf{Z}$ , γιατί γιά κάθε διατεταγμένο ζευγος  $(x, y) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$  τά ἀποτελέσματα  $x+y$ ,  $x-y$ ,  $x \cdot y$  αὐτῶν τῶν πράξεων εἶναι ἀκέραιοι (μονοσήμαντα ὀρισμένοι).
- Ἡ ἔνωση  $\cup$  (ἀντ. ἡ τομή  $\cap$ ) στό δυναμοσύνολο  $\mathcal{P}(A)$  ἑνός συνόλου  $A$  εἶναι μιᾶ ἐσωτερική πράξη στό  $\mathcal{P}(A)$ .
- Ἡ πρόσθεση στό σύνολο

$$A = \{n \mid n \in \mathbf{N} \text{ καί } n \text{ ἄρτιος}\}$$

εἶναι μιᾶ ἐσωτερική πράξη στό  $A$ .

1. Μέ τόν ὄρο αὐτό ἐννοοῦμε «μονοσήμαντη ἀπεικόνιση».

4. 'Ο πολλαπλασιασμός πραγματικού αριθμού με διάνυσμα είναι μία έξωτερική πράξη στο σύνολο των διανυσμάτων (του επιπέδου) με σύνολο τελεστών τό  $\mathbf{R}$ .
5. "Εστω  $A = \mathbf{R}$  και  $B = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . Για κάθε  $\lambda \in A$  και  $(x, y) \in B$  ή ισότητα  $\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y)$  όρίζει μία άπεικόνιση

$$\cdot : A \times B \rightarrow B,$$

πού είναι μία έξωτερική πράξη στό  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  με σύνολο τελεστών τό  $\mathbf{R}$ .

'Εκτός από αυτή τήν έξωτερική πράξη στό  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  μπορούμε νά όρίσουμε και μία έσωτερική πράξη στό σύνολο αυτό με τόν άκόλουθο τρόπο:

Γιά κάθε  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in B (= \mathbf{R} \times \mathbf{R})$  ή ισότητα

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

όρίζει μία άπεικόνιση

$$+ : B \times B \rightarrow B,$$

πού είναι μία έσωτερική πράξη στό  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  (παραβ. με (2) τής 1.2, Κεφ. 1).

6. 'Ο έσωτερικός πολλαπλασιασμός  $\cdot$  στό σύνολο  $V$  των διανυσμάτων του επιπέδου είναι μία πράξη τής μορφής

$$\cdot : V \times V \rightarrow \mathbf{R},$$

γιατί τό έσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι, ως γνωστό, ένας πραγματικός αριθμός.

Είναι γνωστό ότι τό άθροισμα δύο άρνητικών πραγματικών αριθμών είναι πάλι ένας άρνητικός πραγματικός αριθμός. Γι' αυτό τό λόγο θά λέμε ότι τό σύνολο των άρνητικών πραγματικών αριθμών είναι κλειστό ως προς τήν πράξη τής προσθέσεως στό  $\mathbf{R}$ .

"Ετσι έχουμε τόν άκόλουθο όρισμό.

**\*Ορισμός 2.** "Αν  $*$  είναι μία έσωτερική πράξη σε ένα σύνολο  $\Sigma$  και  $A$  ένα μη κενό ύποσύνολο του  $\Sigma$ , τότε θά λέμε ότι τό  $A$  είναι κλειστό ως προς τήν πράξη  $*$ , όταν και μόνο όταν για κάθε  $(\alpha, \beta) \in A \times A$  τό άποτέλεσμα  $\alpha * \beta$  είναι στοιχείο του  $A$ .

"Ετσι τό σύνολο των άρνητικών πραγματικών αριθμών δέν είναι κλειστό ως προς τήν πράξη τής άφαιρέσεως στό  $\mathbf{R}$ , αφού ή διαφορά δύο άρνητικών αριθμών δέν είναι πάντοτε άρνητικός, όπως π.χ.  $(-3) - (-8) = +5$

**Σημείωση.** Στα επόμενα θά ασχοληθούμε μόνο με έσωτερικές και έξωτερικές πράξεις. "Επειδή μόνο στην τελευταία παράγραφο αυτού του κεφαλαίου θά χρησιμοποιήσουμε τήν έννοια τής έξωτερικής πράξεως, τίς έσωτερικές πράξεις θά τίς λέμε άπλώς πράξεις, όταν δέν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως.

## 1.2. Έσωτερικές πράξεις σε σύνολα με στοιχεία κλάσεις ισодυναμίας

'Από προηγούμενες τάξεις είναι γνωστό ότι κάθε σχέση μέσα σε ένα σύνολο  $A (\neq \emptyset)$ , πού είναι ανακλαστική, συμμετρική και μεταβατική, ονομάζεται σχέ-

## II 1.2.

**ση ισοδυναμίας** στό  $A$  και συμβολίζεται συνήθως μέ τό σύμβολο  $\sim$  (ή  $\equiv$ ), πού διαβάζεται «ισοδύναμο».

Δηλαδή γιά μιά σχέση ισοδυναμίας στό  $A$  ισχύουν:

- (i)  $\alpha \sim \alpha$ , γιά όλα τά  $\alpha \in A$  (άνακλαστική ιδιότητα),
- (ii)  $\alpha \sim \beta \Rightarrow \beta \sim \alpha$  (συμμετρική ιδιότητα),
- (iii)  $\alpha \sim \beta$  και  $\beta \sim \gamma \Rightarrow \alpha \sim \gamma$  (μεταβατική ιδιότητα).

Έξάλλου είναι γνωστό ότι, άν  $\alpha \in A$ , τό σύνολο όλων τών στοιχείων  $x$  του  $A$  μέ τήν ιδιότητα  $x \sim \alpha$  ονομάζεται **κλάση ισοδυναμίας** του  $\alpha$  και θά συμβολίζεται μέ  $\hat{\alpha}$ , δηλαδή

$$\hat{\alpha} = \{x \mid x \in A \text{ μέ } x \sim \alpha\}$$

Κάθε  $x \in \hat{\alpha}$  θά ονομάζεται **άντιπρόσωπος** τής κλάσεως ισοδυναμίας  $\hat{\alpha}$ .

Είναι εύκολο νά δειχτεί ότι γιά τίς κλάσεις ισοδυναμίας ισχύει

$$\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \hat{\alpha} = \hat{\beta}$$

και ότι, άν δύο κλάσεις δέν είναι ίσες, τότε είναι ξένα σύνολα.

\*Ας συμβολίσουμε τώρα μέ  $K$  τό σύνολο όλων τών κλασμάτων  $\frac{\alpha}{\beta}$  μέ  $\alpha, \beta \in \mathbf{Z}$  και  $\beta \neq 0$ , δηλαδή

$$K = \left\{ \frac{\alpha}{\beta} \mid \alpha, \beta \in \mathbf{Z} \text{ και } \beta \neq 0 \right\}$$

Τότε ή σχέση, πού ορίζεται μέ τόν ακόλουθο τρόπο

$$\frac{\alpha}{\beta} \equiv \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \alpha\delta = \beta\gamma,$$

είναι μιά σχέση ισοδυναμίας στό  $K$  και είναι γνωστό ότι ή κλάση ισοδυναμίας ενός στοιχείου του  $K$  ονομάζεται ρητός αριθμός. Έτσι τά στοιχεία του συνόλου  $\mathbf{Q}$  τών ρητών αριθμών είναι κλάσεις ισοδυναμίας.

Δίνουμε τώρα άκόμα ένα παράδειγμα συνόλου μέ στοιχεία κλάσεις ισοδυναμίας, πού θά τό χρησιμοποιήσουμε συχνά σ' αυτό τό κεφάλαιο.

**Παράδειγμα 1.** Άν  $x, y \in \mathbf{Z}$  και  $v \in \mathbf{N}$ , τότε μέ τόν ακόλουθο τρόπο

$$x \equiv y \pmod{v} \Leftrightarrow x - y = \text{άκέραιο πολλαπλάσιο του } v,$$

ορίζεται μιά σχέση « $\equiv \pmod{v}$ » μέσα στό  $\mathbf{Z}$ . Τό  $x \equiv y \pmod{v}$  διαβάζεται « $x$  ισοδύναμο (ή ισοϋπόλοιπο!) μέ τό  $y$  modulo  $v$ ». Έτσι  $6 \equiv -2 \pmod{4}$ , άφού  $6 - (-2) = 8 = 2 \cdot 4$  και  $3 \equiv 42 \pmod{13}$ , άφού  $3 - 42 = -39 = (-3) \cdot 13$ .

Ή σχέση « $\equiv \pmod{v}$ » είναι σχέση ισοδυναμίας στό  $\mathbf{Z}$ . Πράγματι, είναι

1. Γιατί, άν  $x \equiv y \pmod{v}$ , τότε οι διαιρέσεις τών  $x, y$  μέ τό  $v$  δίνουν τό ίδιο υπόλοιπο και αντίστροφα (Κεφ. III 1.3, προτ. 2).

- (i) άνακλαστική, γιατί για κάθε  $x \in \mathbf{Z}$  είναι  $x \equiv x \pmod{v}$ , αφού  $x-x=0=0 \cdot v$ ,  
 (ii) συμμετρική, γιατί, αν  $x \equiv y \pmod{v}$ , τότε υπάρχει  $k \in \mathbf{Z}$  με  $x-y=k \cdot v$ ,  
 όπότε  $y-x=(-k)v$ , πού σημαίνει ότι  $y \equiv x \pmod{v}$ , αφού  $-k \in \mathbf{Z}$ ,  
 (iii) μεταβατική, γιατί, αν  $x \equiv y \pmod{v}$  και  $y \equiv z \pmod{v}$ , τότε υπάρχουν  
 άκέραιοι  $k_1$  και  $k_2$  με  $x-y=k_1 \cdot v$  και  $y-z=k_2 \cdot v$ , όπότε  

$$x-z=(x-y)+(y-z)=k_1 \cdot v+k_2 \cdot v=(k_1+k_2)v$$
 και έπομένως  $x \equiv z \pmod{v}$ , αφού  $(k_1+k_2) \in \mathbf{Z}$ .

Οί κλάσεις Ισοδυναμίας τών στοιχείων του  $\mathbf{Z}$  ως προς τήν παραπάνω σχέση ονομάζονται **κλάσεις ύπολοίπου modulo  $v$** . Έτσι ή κλάση ύπολοίπου modulo  $v$  του  $a \in \mathbf{Z}$  περιέχει όλους τούς άκέραιοι  $x$ , για τούς όποιους ή διαφορά  $x-a$  είναι άκέραιο πολλαπλάσιο του  $v$ , δηλαδή

$$\hat{\alpha} = \{x + k \cdot v \mid k \in \mathbf{Z}\}.$$

‘Η σχέση Ισοδυναμίας «  $\equiv \pmod{3}$  » όρίζει τίσ άκόλουθες κλάσεις ύπολοίπου modulo 3 στό  $\mathbf{Z}$ :

$$\hat{0} = \{3k \mid k \in \mathbf{Z}\},$$

$$\hat{1} = \{3k + 1 \mid k \in \mathbf{Z}\},$$

$$\hat{2} = \{3k + 2 \mid k \in \mathbf{Z}\},$$

γιατί τά δυνατά ύπόλοιπα τής διαιρέσεως ενός άκέραιου μέ τό 3 είναι 0,1,2.

Τό σύνολο τών κλάσεων ύπολοίπου modulo  $v$  θά τό συμβολίζουμε μέ  $\mathbf{Z}_v$ .

Έτσι  $\mathbf{Z}_3 = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}\}$ .

Σέ προηγούμενες τάξεις γνωρίσαμε έσωτερικές πράξεις στό  $\mathbf{Q}$ , πού στήν πραγματικότητα ήταν πράξεις μεταξύ κλάσεων Ισοδυναμίας. Άς δοϋμε πώς μάθαμε τήν πρόσθεση στό  $\mathbf{Q}$ . Τά κλάσματα  $x = \frac{1}{2}$  και  $y = \frac{1}{3}$  δημιουργοϋν,

όπως είπαμε προηγούμενως, τούς ρητούς  $\hat{x}$  και  $\hat{y}$ . Άν μέ τή γνωστή πρόσθεση στό σύνολο  $K$  τών κλασμάτων προσθέσουμε δύο αντιπροσώπους τών  $\hat{x}$  και  $\hat{y}$ , π.χ. τούς  $\frac{1}{2}$  και  $\frac{1}{3}$ , βρίσκουμε άθροισμα  $z = \frac{5}{6}$ . Δύο άλλοι αντιπρόσωποι τών ρητών  $\hat{x}$  και  $\hat{y}$ , π.χ. οί  $\frac{2}{4}$  και  $\frac{3}{9}$ , δίνουν άθροισμα  $\frac{30}{36}$ , τό όποίο άνήκει στήν κλάση  $\hat{z}$ , αφού  $\frac{5}{6} \equiv \frac{30}{36}$ . Τό ίδιο συμβαίνει και μέ όποιοσδήποτε αντιπροσώπους τών ρητών  $\hat{x}$  και  $\hat{y}$ .

Άς αντιμετωπίσουμε τώρα τό θέμα αυτό γενικά. Έστω  $A$  ένα σύνολο, στό όποίο έχουν όριστεί μία έσωτερική πράξη  $*$  και μία σχέση Ισοδυναμίας  $\sim$ . Άν  $\hat{A}$  είναι τό σύνολο τών κλάσεων Ισοδυναμίας τών στοιχείων του  $A$ , τότε

## II 1.2.

υπάρχουν διάφοροι τρόποι, για να όριστούν έσωτερικές πράξεις στο  $\widehat{A}$ . Έπειδή κάθε στοιχείο του  $\widehat{A}$  άποτελείται από στοιχεία του  $A$ , γεννιέται τό έρώτημα αν είναι δυνατό να όριστεί έσωτερική πράξη στο  $\widehat{A}$  με τή βοήθεια τής πράξεως  $*$  στο  $A$ . Για τό σκοπό αυτό κάνουμε τούς έξης συλλογισμούς. "Αν  $\widehat{\alpha}, \widehat{\beta} \in \widehat{A}$  και πάρουμε  $x \in \widehat{\alpha}$  και  $y \in \widehat{\beta}$ , τότε τό άποτέλεσμα  $x * y$  ανήκει σε μία κλάση ίσοδυναμίας, έστω τή  $\widehat{\gamma}$ . Τό θέμα τώρα είναι αν δύο άλλοι αντιπρόσωποι  $x_1, y_1$  τών κλάσεων  $\widehat{\alpha}$  και  $\widehat{\beta}$  αντίστοιχως δίνουν άποτέλεσμα  $x_1 * y_1$ , τό όποιο να ανήκει στην κλάση  $\widehat{\gamma}$ . Είναι φανερό ότι για να μπορεί να όριστεί μία πράξη στο  $\widehat{A}$  με τή βοήθεια τής πράξεως  $*$ , πού να είναι ανεξάρτητη από τήν έκλογή τών αντιπροσώπων τών κλάσεων  $\widehat{\alpha}$  και  $\widehat{\beta}$ , πρέπει τά άποτελέσματα  $x * y$  και  $x_1 * y_1$  να ανήκουν πάντα στην ίδια κλάση ίσοδυναμίας.

"Ετσι δίνουμε τόν ακόλουθο όρισμό.

**Όρισμός.** Μιά σχέση ίσοδυναμίας  $\sim$  στο  $A$  ονομάζεται **συμβιβαστή** με τήν έσωτερική πράξη  $*$  στο  $A$ , αν και μόνο αν ισχύει ή συνεπαγωγή

$$x \sim x_1 \text{ και } y \sim y_1 \Rightarrow (x * y) \sim (x_1 * y_1)$$

Στήν περίπτωση αυτή μπορούμε να όρίσουμε μία έσωτερική πράξη στο  $\widehat{A}$ , πού θα τή συμβολίζουμε επίσης με  $*$ , με τόν ακόλουθο τρόπο:

$$\widehat{\alpha} * \widehat{\beta} = \widehat{\alpha * \beta}$$

Τό έπόμενο θεώρημα είναι χρήσιμο, για να έλέγχουμε αν μία σχέση ίσοδυναμίας είναι συμβιβαστή με μία πράξη.

**Θέωρημα.** Μιά σχέση ίσοδυναμίας  $\sim$  σε ένα σύνολο  $A$  είναι συμβιβαστή με μία έσωτερική πράξη  $*$  στο  $A$ , αν για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in A$  ισχύει

$$\alpha \sim \beta \Rightarrow (\alpha * \gamma) \sim (\beta * \gamma) \text{ και } (\gamma * \alpha) \sim (\gamma * \beta) \quad (1)$$

**Άπόδειξη.** Υποθέτουμε ότι ή συνθήκη (1) ισχύει. "Αν  $\alpha \sim \alpha'$  και  $\beta \sim \beta'$ , τότε λόγω τής (1) έχουμε  $(\alpha * \beta) \sim (\alpha' * \beta)$  και  $(\alpha' * \beta) \sim (\alpha' * \beta')$  και, άφοϋ ή  $\sim$  είναι μεταβατική σχέση, έχουμε

$$(\alpha * \beta) \sim (\alpha' * \beta'),$$

δηλαδή ή  $\sim$  είναι συμβιβαστή με τήν  $*$ .

**Παραδείγματα:**

2. Η σχέση ίσοδυναμίας  $\equiv (\text{mod } 3)$  στο  $\mathbf{Z}$  είναι συμβιβαστή με τήν πρόσθεση στο  $\mathbf{Z}$ .

"Ετσι μπορούμε να όρίσουμε στο  $\mathbf{Z}_3$  πρόσθεση με τόν ακόλουθο τρόπο :

"Αν  $(\widehat{x}, \widehat{y}) \in \mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_3$ , τότε σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει προηγουμένως έχουμε

$$\widehat{x} + \widehat{y} = \widehat{x + y}.$$

Τά άποτελέσματα τής πράξεως  $+$  στο  $\mathbf{Z}_3$  δίνονται στον πίνακα τού σχήματος 1.

+	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$
$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$
$\widehat{1}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{0}$
$\widehat{2}$	$\widehat{2}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$

Σχ. 1

.	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$
$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$
$\widehat{1}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$
$\widehat{2}$	$\widehat{0}$	$\widehat{2}$	$\widehat{1}$

Σχ. 2

Τό πρώτο μέλος  $\widehat{x}$  του διατεταγμένου ζεύγους  $(\widehat{x}, \widehat{y})$  αναγράφεται στην πρώτη στήλη του πίνακα, ενώ τό δεύτερο  $\widehat{y}$  στην πρώτη σειρά του πίνακα και τό αποτέλεσμα  $\widehat{x} + \widehat{y}$  στη διασταύρωση της γραμμής, πού περιέχει τό  $\widehat{x}$ , και της στήλης, πού περιέχει τό  $\widehat{y}$ .  
Π.χ.  $\widehat{2} + \widehat{1} = \widehat{0}$

3. 'Η σχέση Ισοδυναμίας « $\equiv \pmod{3}$ » στό  $\mathbf{Z}$  είναι συμβιβαστή μέ τόν πολλαπλασιασμό στό  $\mathbf{Z}$ .

Μπορούμε λοιπόν νά όρίσουμε στό  $\mathbf{Z}_3$  πολλαπλασιασμό μέ τόν ακόλουθο τρόπο :

'Αν  $(\widehat{x}, \widehat{y}) \in \mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_3$ , τότε κατά τά γνωστά έχουμε

$$\widehat{x} \cdot \widehat{y} = \widehat{x \cdot y}$$

Τά αποτελέσματα της πράξεως  $\cdot$  στό  $\mathbf{Z}_3$  δίνονται στόν πίνακα του σχήματος 2.

'Ετσι π.χ.  $\widehat{2} \cdot \widehat{2} = \widehat{1}$ .

4. 'Η σχέση « $\equiv \pmod{7}$ » στό σύνολο  $\mathbf{N}$  είναι μία σχέση Ισοδυναμίας. 'Αν όρίσουμε στό  $\mathbf{N}$  τήν πράξη  $*$  μέ τόν ακόλουθο τρόπο

$$\alpha * \beta = \text{ΕΚΠ}(\alpha, \beta),$$

τότε ή σχέση « $\equiv \pmod{7}$ » δέν είναι συμβιβαστή μέ τήν πράξη  $*$ , γιατί

$$\begin{aligned} 2 &\equiv 9 \pmod{7}, & 4 &\equiv 11 \pmod{7}, \\ 2 * 4 &= 4, & 9 * 11 &= 99, \end{aligned}$$

ένώ τό 4 δέν είναι Ισοδύναμο μέ τό 99 modulo 7.

### 1.3. 'Ιδιότητες των έσωτερικών πράξεων

Είναι γνωστό ότι ή πράξη της προσθέσεως στό  $\mathbf{N}$  είναι αντιμεταθετική και προσεταιριστική. Μέ τόν παρακάτω όρισμό γενικεύουμε τίς δύο αυτές ιδιότητες για μία όποιαδήποτε πράξη.

'Ορισμός 1. Μιά πράξη ο σε ένα σύνολο  $\Sigma$  ονομάζεται

- (i) **αντιμεταθετική**, αν και μόνο αν για κάθε  $\alpha, \beta \in \Sigma$  ισχύει

$$\alpha \circ \beta = \beta \circ \alpha$$

- (ii) **προσεταιριστική**, αν και μόνο αν για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in \Sigma$  ισχύει

$$(\alpha \circ \beta) \circ \gamma = \alpha \circ (\beta \circ \gamma)$$

## II 1.3.

### Παραδείγματα:

1. 'Η γνωστή πράξη τής προσθέσεως στο σύνολο  $\mathbf{Q}$  τών ρητῶν ἀριθμῶν εἶναι ἀντιμεταθετική, γιατί γιὰ κάθε  $x, y \in \mathbf{Q}$  ἰσχύει

$$x + y = y + x,$$

καί προσεταιριστική, γιατί γιὰ κάθε  $x, y, z \in \mathbf{Q}$  ἰσχύει

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

2. 'Η πράξη τής ἀφαιρέσεως στο σύνολο  $\mathbf{R}$  δέν εἶναι ἀντιμεταθετική, γιατί ὑπάρχουν  $x, y \in \mathbf{R}$  τέτοια, ὥστε

$$x - y \neq y - x \quad (\text{π.χ. } 8 - 3 \neq 3 - 8),$$

οὔτε εἶναι προσεταιριστική, γιατί ὑπάρχουν  $x, y, z \in \mathbf{R}$  τέτοια, ὥστε

$$(x - y) - z \neq x - (y - z) \quad [\text{π.χ. } (5 - 3) - 1 \neq 5 - (3 - 1)].$$

3. 'Ο πολλαπλασιασμός καί ἡ πρόσθεση σφό  $\mathbf{R}$  εἶναι πράξεις ἀντιμεταθετικές καί προσεταιριστικές, ἐνῶ ἡ πράξη  $*$  στο  $\mathbf{R}$ , πού ὀρίζεται μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο

$$\alpha * \beta = |\alpha - \beta| \quad (\alpha, \beta \in \mathbf{R}),$$

εἶναι ἀντιμεταθετική ἀλλά ὄχι προσεταιριστική. (Νά γίνει ἀπόδειξη ἀπό τούς μαθητές).

'Η γνωστή ἐπιμεριστική ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ὡς πρὸς τήν πρόσθεση στο  $\mathbf{R}$  γενικεύεται μέ τόν παρακάτω ὀρισμό.

**Ὅρισμός 2.** 'Αν  $*$ , ο εἶναι δύο πράξεις σέ ἓνα σύνολο  $\Sigma$ , τότε λέμε ὅτι ἡ **πράξη  $*$**  εἶναι

- (i) **ἀπό ἀριστερά ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν ο**, ἂν καί μόνο ἂν γιὰ κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in \Sigma$  ἰσχύει

$$\alpha * (\beta \circ \gamma) = (\alpha * \beta) \circ (\alpha * \gamma)$$

- (ii) **ἀπό δεξιά ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν ο**, ἂν καί μόνο ἂν γιὰ κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in \Sigma$  ἰσχύει

$$(\beta \circ \gamma) * \alpha = (\beta * \alpha) \circ (\gamma * \alpha)$$

- (iii) **ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν ο**, ἂν καί μόνο ἂν εἶναι συγχρόνως ἀπό ἀριστερά καί ἀπό δεξιά ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν ο, δηλαδή γιὰ κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in \Sigma$  ἰσχύει

$$\alpha * (\beta \circ \gamma) = (\alpha * \beta) \circ (\alpha * \gamma) \quad \text{καί} \quad (\beta \circ \gamma) * \alpha = (\beta * \alpha) \circ (\gamma * \alpha)$$

Εἶναι φανερό ὅτι, ὅταν ἡ πρώτη πράξη  $*$  στόν προηγούμενο ὀρισμό εἶναι ἀντιμεταθετική, οἱ τρεῖς ἔννοιες ἐπιμεριστικότητας τῆς  $*$  ὡς πρὸς τήν ο εἶναι ἰσοδύναμες.

### Παραδείγματα:

4. 'Ο πολλαπλασιασμός εἶναι πράξη ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν πρόσθεση στο  $\mathbf{N}$ , γιατί

(i) ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι ἀντιμεταθετική πράξη στο  $\mathbf{N}$  καί

(ii) γιὰ κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{N}$  ἰσχύει

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

Ἡ πρόσθεση στό  $\mathbf{N}$  ὁμως δέν εἶναι πράξη ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τόν πολλαπλασιασμό, γιατί ὑπάρχουν  $x, y, z \in \mathbf{N}$  τέτοια, ὥστε

$$x + (y \cdot z) \neq (x+y) \cdot (x+z) \quad [\text{π.χ. } 3 + (2 \cdot 1) \neq (3+2) \cdot (3+1)]$$

5. Ἡ τομή  $\cap$  εἶναι πράξη ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν ἔνωση  $\cup$  στό δυναμοσύνολο  $\mathcal{P}(X)$  ἑνός συνόλου  $X$ , γιατί

(i) ἡ τομή εἶναι ἀντιμεταθετική πράξη στό  $\mathcal{P}(X)$  καί

(ii) γιά κάθε  $A, B, \Gamma \in \mathcal{P}(X)$  ἰσχύει

$$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma).$$

Ἐπίσης ἡ ἔνωση  $\cup$  εἶναι πράξη ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν τομή  $\cap$  στό  $\mathcal{P}(X)$ .

6. Στό σύνολο  $\mathbf{R}$  θεωροῦμε τή γνωστή πράξη τῆς προσθέσεως  $+$  καί τήν πράξη  $\circ$ , πού ὀρίζεται ἀπό τήν ἰσότητα

$$x \circ y = x^3 \cdot y \quad (x, y \in \mathbf{R}).$$

Τότε

(i) γιά κάθε  $x, y, z \in \mathbf{R}$  ἰσχύει

$$x \circ (y+z) = x^3 \cdot (y+z) = x^3 \cdot y + x^3 \cdot z = (x \circ y) + (x \circ z),$$

δηλαδή ἡ  $\circ$  εἶναι ἀπό ἀριστερά ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν  $+$ ,

(ii) ὑπάρχουν  $x, y, z \in \mathbf{R}$ , γιά τὰ ὁποῖα ἰσχύει

$$(y+z) \circ x = (y+z)^3 \cdot x \neq y^3 \cdot x + z^3 \cdot x = (y \circ x) + (z \circ x),$$

δηλαδή ἡ  $\circ$  δέν εἶναι ἀπό δεξιά ἐπιμεριστική ὡς πρὸς τήν  $+$ .

#### 1.4. Οὐδέτερο στοιχεῖο ὡς πρὸς ἐσωτερική πράξη

Γνωρίζουμε ὅτι στό σύνολο  $\mathbf{R}$  ὁ ἀριθμός 0 ἔχει τήν ιδιότητα:

$$\forall x \in \mathbf{R} : \quad x+0 = 0+x = x$$

καί γι' αὐτό ὀνομάζεται οὐδέτερο στοιχεῖο ὡς πρὸς τήν πράξη  $+$ .

Γενικεύοντας τήν ιδιότητα αὐτή ἔχουμε τόν ἀκόλουθο ὀρισμό.

**Ὄρισμός.** Ἐστω  $*$  μία πράξη σέ ἕνα σύνολο  $\Sigma$ . Τότε ἕνα στοιχεῖο  $e$  τοῦ  $\Sigma$  ὀνομάζεται **οὐδέτερο στοιχεῖο** ὡς πρὸς τήν πράξη  $*$ , ὅταν καί μόνο ὅταν γιά κάθε  $\alpha \in \Sigma$  ἰσχύει

$$\alpha * e = e * \alpha = \alpha$$

**Παρατήρηση.** Ἄν στόν προηγούμενο ὀρισμό ἡ πράξη  $*$  εἶναι ἀντιμεταθετική, εἶναι φανερό ὅτι ἕνα στοιχεῖο  $e$  τοῦ  $\Sigma$  εἶναι οὐδέτερο στοιχεῖο ὡς πρὸς τήν πράξη  $*$ , ὅταν καί μόνο ὅταν γιά κάθε  $\alpha \in \Sigma$  ἰσχύει  $\alpha * e = \alpha$ .

**Θεώρημα.** Ἐστω  $*$  μία πράξη σέ ἕνα σύνολο  $\Sigma$ . Τότε, ἂν ὑπάρχει οὐδέτερο στοιχεῖο στό  $\Sigma$  ὡς πρὸς τήν πράξη  $*$ , αὐτό εἶναι μοναδικό.

**Ἀπόδειξη.** Ἄν  $e_1, e_2 \in \Sigma$  εἶναι οὐδέτερα στοιχεῖα ὡς πρὸς τήν πράξη  $*$ , τότε θεωρώντας τό  $e_1$  οὐδέτερο στοιχεῖο, λόγω τοῦ ὀρισμοῦ, ἔχουμε

$$e_1 * e_2 = e_2,$$

## II. 1.5.

ένω θεωρώντας τό  $e_2$  ούδέτερο στοιχείο, πάλι λόγω του ὀρισμοῦ, ἔχουμε

$$e_1 * e_2 = e_1,$$

ὁπότε, λόγω τῆς μεταβατικῆς ιδιότητος τῆς ἰσότητος στό  $\Sigma$ , παίρουμε  $e_1 = e_2$ .

Στήν περίπτωση πού ὑπάρχει ούδέτερο στοιχείο ὡς πρὸς μιά πράξη, θά ἐπιτρέπεται, λόγω του προηγούμενου θεωρήματος, νά λέμε ὅτι αὐτό εἶναι τό ούδέτερο στοιχείο ὡς πρὸς τήν πράξη αὐτή. Τό ούδέτερο στοιχείο (ἂν ὑπάρχει) ὡς πρὸς μιά πράξη, πού ὀνομάζεται «πρόσθεση», θά συμβολίζεται συνήθως μέ 0, ἐνώ ὡς πρὸς μιά πράξη, πού ὀνομάζεται «πολλαπλασιασμός», θά συμβολίζεται μέ 1 ἢ I.

**Παρατήρηση.** Ἡ μοναδικότητα του ούδέτερου στοιχείου ὡς πρὸς τήν πρόσθεση (ἀντ. τόν πολλαπλασιασμό) στό  $\mathbf{C}$ , πού εἶδαμε στό Κεφ. I (Προτ. 1 καί 1' τῆς 1.3), εἶναι ἀμεση συνέπεια του προηγούμενου θεωρήματος.

### Παραδείγματα:

1. Τό ούδέτερο στοιχείο ὡς πρὸς τήν πρόσθεση στό  $\mathbf{C}$  εἶναι τό  $0 = 0 + 0i$ , ἐνώ τό ούδέτερο στοιχείο ὡς πρὸς τόν πολλαπλασιασμό εἶναι τό  $1 = 1 + 0i$  (Κεφ. I, Προτ. 1 καί 1' τῆς 1.3.)
2. Τό  $\phi$  εἶναι τό ούδέτερο στοιχείο του  $\mathcal{P}(A)$  ὡς πρὸς τήν (ἀντιμεταθετική) πράξη τῆς ἐνώσεως  $\cup$ , ἀφοῦ γιά κάθε  $X \in \mathcal{P}(A)$  ἰσχύει  $X \cup \phi = X$ , καί τό  $A$  εἶναι τό ούδέτερο στοιχείο ὡς πρὸς τήν (ἀντιμεταθετική) πράξη τῆς τομῆς  $\cap$ , γιατί γιά κάθε  $X \in \mathcal{P}(A)$  ἰσχύει  $X \cap A = X$ .
3. Ἡ ἰσότητα

$$x \circ y = x \quad (x, y \in \mathbf{R})$$

ὀρίζει μιά πράξη ο στό  $\mathbf{R}$ , ὡς πρὸς τήν ὁποία δέν ὑπάρχει ούδέτερο στοιχείο, γιατί, ἂν ὑπῆρχε ούδέτερο στοιχείο  $e \in \mathbf{R}$ , τότε γιά  $x, y \in \mathbf{R}$  μέ  $x \neq y$  θά ἰσχυε  $e \circ x = x$  καί  $e \circ y = y$ , ὁπότε λόγω του ὀρισμοῦ τῆς πράξεως θά εἶχαμε  $e = x$  καί  $e = y$  καί ἐπομένως  $x = y$ , πού εἶναι ἄτοπο.

## 1.5. Συμμετρικά στοιχεῖα ὡς πρὸς ἐσωτερική πράξη

Γνωρίζουμε ὅτι γιά ὁποιοδήποτε πραγματικό ἀριθμό  $x$  ὑπάρχει ἓνας πραγματικός ἀριθμός, ὁ  $-x$ , τέτοιος, ὥστε

$$x + (-x) = (-x) + x = 0.$$

Γενικεύοντας αὐτό γιά μιά ὁποιαδήποτε πράξη ἔχουμε τόν ἀκόλουθο ὀρισμό.

**Ὅρισμός.** Ἐστω  $*$  μιά πράξη σέ ἓνα σύνολο  $\Sigma$ , ὡς πρὸς τήν ὁποία ὑπάρχει ούδέτερο στοιχείο  $e \in \Sigma$ . Τότε δύο στοιχεῖα  $\alpha$  καί  $\alpha'$  του  $\Sigma$  ὀνομάζονται **συμμετρικά** ὡς πρὸς τήν πράξη  $*$ , ὅταν καί μόνο ὅταν ἰσχύει

$$\alpha * \alpha' = \alpha' * \alpha = e$$

Στήν περίπτωση αὐτή λέμε ὅτι τό  $\alpha$  εἶναι συμμετρικό του  $\alpha'$  ὡς πρὸς τήν πράξη  $*$  καί ἀντίστροφα τό  $\alpha'$  συμμετρικό του  $\alpha$  ὡς πρὸς τήν  $*$ .

**Παρατήρηση.** Είναι φανερό ότι, αν στον προηγούμενο όρισμό ή πράξη \* είναι αντιμεταθετική, δύο στοιχεία α και α' του Σ είναι συμμετρικά ως προς την πράξη \*, όταν και μόνο όταν ισχύει α \* α' = e.

**Παραδείγματα:**

1. Κάθε πραγματικός αριθμός  $x \neq 0$  έχει συμμετρικό στοιχείο ως προς την (αντιμεταθετική) πράξη του πολλαπλασιασμού στο **R** τον αριθμό  $x^{-1}$  (πού ως γνωστό ονομάζεται αντίστροφος του  $x$ ), γιατί  $x \cdot x^{-1} = 1$ , όπου τό 1 είναι τό ουδέτερο στοιχείο ως προς τόν πολλαπλασιασμό στό **R**.
2. Οί αντίθετοι μιγαδικοί αριθμοί  $\alpha + \beta i$  και  $-\alpha - \beta i$  είναι συμμετρικά στοιχεία ως προς την (αντιμεταθετική) πράξη τής προσθέσεως στό **C**, γιατί  $(\alpha + \beta i) + (-\alpha - \beta i) = 0$  (Κεφ. 1, Πρωτ. 2 τής 1.3). Έξάλλου κάθε μιγαδικός  $\alpha + \beta i \neq 0$  έχει συμμετρικό στοιχείο ως προς τόν πολλαπλασιασμό στό **C** τόν αντίστροφό του:

$$\frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} + \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2} i,$$

όπως είδαμε στό Κεφ. 1 (Πρωτ. 2' τής 1.3).

3. Στο σύνολο  $A = \{e, x, y\}$  ορίζουμε την πράξη ο, τής οποίας ό πίνακας αποτελεσμάτων δίνεται στό σχήμα 3. Εύκολα διαπιστώνεται ότι τό e είναι τό ουδέτερο στοιχείο τής πράξεως ο. Τό στοιχείο x του A έχει δύο συμμετρικά στοιχεία ως προς την πράξη ο, τόν έαυτό του και τό y, γιατί

ο	e	x	y
e	e	x	y
x	x	e	e
y	y	e	x

$$x \circ x = e \quad \text{και} \quad x \circ y = y \circ x = e.$$

Σχ. 3

**1.6. Άπλοποιήσιμο στοιχείο ως προς έσωτερική πράξη**

Όλοι γνωρίζουμε τούς δύο νόμους τής διαγραφής στό σύνολο **N**:

$$\alpha + \beta = \alpha + \gamma \Rightarrow \beta = \gamma,$$

$$\alpha\beta = \alpha\gamma \Rightarrow \beta = \gamma.$$

Οί ιδιότητες αυτές γενικεύονται μέ τόν ακόλουθο όρισμό.

**Όρισμός.** Έστω \* μία πράξη σέ ένα σύνολο Σ. Τότε ένα στοιχείο α του Σ ονομάζεται **άπλοποιήσιμο** ως προς την πράξη \*, αν και μόνο αν γιά κάθε  $\beta, \gamma \in \Sigma$  ισχύουν

$$\alpha * \beta = \alpha * \gamma \Rightarrow \beta = \gamma \quad \text{και} \quad \beta * \alpha = \gamma * \alpha \Rightarrow \beta = \gamma$$

**Παραδείγματα:**

1. Κάθε πραγματικός αριθμός είναι άπλοποιήσιμο στοιχείο ως προς την πράξη τής προσθέσεως στό **R**. Επίσης κάθε μιγαδικός αριθμός είναι άπλοποιήσιμο στοιχείο ως προς την πράξη τής προσθέσεως στό **C** (Κεφ. 1, Πρωτ. 3 τής 1.3).
2. Κάθε πραγματικός αριθμός  $\neq 0$  είναι άπλοποιήσιμο στοιχείο ως προς την πράξη του πολλαπλασιασμού στό **R**, γιατί, αν  $x \neq 0$ , τότε γιά κάθε  $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$  ισχύουν

$$x \cdot \alpha = x \cdot \beta \Rightarrow \alpha = \beta \quad \text{και} \quad \alpha \cdot x = \beta \cdot x \Rightarrow \alpha = \beta.$$

Έπίσης κάθε μιγαδικός αριθμός  $\neq 0$  είναι άπλοποιήσιμο στοιχείο ως προς την πράξη

## II 1.8.

τοῦ πολλαπλασιασμοῦ στό  $\mathbf{C}$  (Κεφ. I, Πρωτ. 3' τῆς 1.3). Τό 0 (ἀντ. τό  $0 = 0 + 0i$ ) δέν εἶναι ἀπλοποιήσιμο στοιχείο ὡς πρὸς τὴν πράξη τοῦ πολλαπλασιασμοῦ στό  $\mathbf{R}$  (ἀντ.  $\mathbf{C}$ ), γιὰτί π.χ. ἰσχύουν  $0 \cdot 3 = 0 \cdot 4$  καὶ  $3 \neq 4$ .

### 1.7. Ἡ ἔννοια τῆς ἀλγεβρικῆς δομῆς

Ὅπως εἶδαμε στὰ προηγούμενα, σέ ἓνα σύνολο  $A \neq \emptyset$  μποροῦν νά ὀριστοῦν διάφορες πράξεις. Τότε τό σύνολο  $A$  μαζί μέ τίς πράξεις αὐτές θά λέμε ὅτι ἔχει μιὰ **ἀλγεβρική δομή**, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τίς ιδιότητες αὐτῶν τῶν πράξεων. Στὴν περίπτωση πού σέ ἓνα σύνολο  $A$  ἔχουν ὀριστεῖ μόνο ἐσωτερικὲς πράξεις,  $o, *, \dots, \oplus$ , θά γράφουμε  $(A, o, *, \dots, \oplus)$ , γιὰ νά ἐκφράσουμε τὴν ἀλγεβρική δομή (ἢ ἀπλά δομή). Ἔτσι οἱ συμβολισμοί

$$(\mathbf{N}, +), (\mathbf{N}, \cdot), (\mathbf{Z}, +), (\mathbf{R}, +), (\mathbf{Z}, +, \cdot), (\mathbf{Q}, +, \cdot)$$

ἐκφράζουν δομές. Οἱ δομές  $(\mathbf{N}, +)$ ,  $(\mathbf{N}, \cdot)$ , παρόλο πού ἀναφέρονται στό ἴδιο σύνολο  $\mathbf{N}$ , εἶναι διαφορετικὲς, γιὰτί δέ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τίς ἴδιες ιδιότητες. Π.χ. στὴ δομή  $(\mathbf{N}, +)$  δέν ὑπάρχει οὐδέτερο στοιχείο ὡς πρὸς τὴν πράξη  $+$ , ἐνῶ στὴ δομή  $(\mathbf{N}, \cdot)$  ὑπάρχει καὶ εἶναι τό 1.

Μερικά παραδείγματα ἀλγεβρικῶν δομῶν θά γνωρίσουμε στὶς ἐπόμενες παραγράφους.

### 1.8. Ἀσκήσεις

1. Νά ἐξετάσετε ἂν τό σύνολο

(i)  $\{1, -1\}$  εἶναι κλειστό ὡς πρὸς τὴν πράξη τοῦ πολλαπλασιασμοῦ στό  $\mathbf{Z}$ ,

(ii) τῶν θετικῶν ἀκεραίων εἶναι κλειστό ὡς πρὸς τίς πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως στό  $\mathbf{Z}$ ,

(iii)  $\{k + ki \mid k \in \mathbf{R}\}$  εἶναι κλειστό ὡς πρὸς τὴν πράξη τῆς προσθέσεως στό  $\mathbf{C}$ ,

(iv)  $\{1, -1, i, -i\}$  εἶναι κλειστό ὡς πρὸς τὴν πράξη τοῦ πολλαπλασιασμοῦ στό  $\mathbf{C}$

2. Ἄν  $\Sigma = \{A, B, \Gamma, \Delta\}$ , ὅπου

$$A = \emptyset, \quad B = \{\alpha, \beta\}, \quad \Gamma = \{\alpha, \gamma\} \quad \text{καὶ} \quad \Delta = \{\alpha, \beta, \gamma\},$$

δείξτε ὅτι ἡ ἔνωση  $\cup$  εἶναι ἐσωτερικὴ πράξη στό  $\Sigma$ . Εἶναι ἡ τομὴ  $\cap$  ἐσωτερικὴ πράξη στό  $\Sigma$ ;

3. Δείξτε ὅτι ἡ σχέση ἰσοδυναμίας « $\equiv (\text{mod } n)$ » εἶναι συμβιβαστὴ μέ τὴν πρόσθεση καὶ τὸν πολλαπλασιασμό στό  $\mathbf{Z}$ .

4. Κατασκευάστε τοὺς πίνακες ἀποτελεσμάτων γιὰ τὴν πρόσθεση καὶ τὸν πολλαπλασιασμό στό  $\mathbf{Z}_4$ . Οἱ πράξεις αὐτές εἶναι ἀντιμεταθετικὲς ἢ προσεταιριστικὲς; Εἶναι ὁ πολλαπλασιασμός πράξη ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν πρόσθεση; Ὑπάρχουν οὐδέτερα στοιχεία ὡς πρὸς τίς πράξεις αὐτές; Ποιά στοιχεία τοῦ  $\mathbf{Z}_4$  ἔχουν συμμετρικά στοιχεία ὡς πρὸς τίς πράξεις αὐτές;

5. Βρεῖτε γιὰ ποιὲς τιμές τῶν  $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$  εἶναι προσεταιριστικὴ ἡ πράξη  $*$  στό  $\mathbf{R}$ , πού ὀρίζεται μέ τὸν ἀκόλουθο τρόπο

$$x * y = ax + by.$$

6. Νά δείξετε ότι η ισότητα

$$\alpha * \beta = \beta$$

ορίζει μία πράξη  $*$  στο  $\mathbf{N}$ , ως προς την οποία δεν υπάρχει ουδέτερο στοιχείο στο  $\mathbf{N}$ . Είναι προσεταιριστική αυτή η πράξη;

7. 'Η ισότητα

$$\alpha * \beta = \alpha\beta + \alpha + \beta$$

ορίζει μία πράξη  $*$  στο  $\mathbf{R}$ . Είναι η πράξη αυτή αντιμεταθετική ή προσεταιριστική; Ποιά στοιχεία του  $\mathbf{R}$  έχουν συμμετρικό στοιχείο ως προς την πράξη αυτή;

8. 'Η ισότητα

$$x \circ y = x + y + x^2 y^2$$

ορίζει μία πράξη  $\circ$  στο  $\mathbf{R}$ . Νά δείξετε ότι κάθε  $x \in \mathbf{R} - \{0\}$  με  $x < \frac{1}{3\sqrt{4}}$  έχει δύο συμμετρικά στοιχεία ως προς την πράξη αυτή, ενώ κάθε  $x \in \mathbf{R}$  με  $x > \frac{1}{3\sqrt{4}}$  δεν έχει συμμετρικό στοιχείο. Τά  $0, \frac{1}{3\sqrt{4}}$  έχουν συμμετρικά στοιχεία και ποιά;

9. Στο σύνολο  $\mathbf{C}$  ορίζουμε μία πράξη  $*$  με τον ακόλουθο τρόπο

$$z_1 * z_2 = z_1 + z_2 - z_1 z_2.$$

- (i) Νά δείξετε ότι η πράξη αυτή είναι αντιμεταθετική και προσεταιριστική.  
 (ii) 'Υπάρχει ουδέτερο στοιχείο ως προς την πράξη αυτή;  
 (iii) Ποιά στοιχεία του  $\mathbf{C}$  έχουν συμμετρικό στοιχείο ως προς την πράξη αυτή;
10. 'Εστω  $*$  μία έσωτερική πράξη σε ένα σύνολο  $E$ , ως προς την οποία υπάρχει ουδέτερο στοιχείο  $e \in E$ . 'Αν για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in E$  ισχύει

$$(\alpha * \beta) * (\gamma * \delta) = (\alpha * \gamma) * (\beta * \delta),$$

νά δείξετε ότι η πράξη αυτή είναι αντιμεταθετική και προσεταιριστική.

## 2. ΗΜΙΟΜΑΔΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ

Οι δομές με μία έσωτερική πράξη χωρίζονται, ανάλογα με τις ιδιότητες πού έχει η πράξη αυτή, σε διάφορες κατηγορίες. 'Από τις κατηγορίες αυτές θα εξετάσουμε στην παράγραφο αυτή τις *ημιομάδες* και τις *ομάδες*.

### 2.1. 'Ημιομάδες

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι δομές εκείνες, στις οποίες η πράξη είναι προσεταιριστική. Παράδειγμα τέτοιας δομής είναι τό  $(\mathbf{N}, +)$ , όπου η πρόσθεση είναι, ως γνωστό, προσεταιριστική πράξη.

'Ετσι έχουμε τον ακόλουθο όρισμό.

## II 2.2.

**Όρισμός.** Μία δομή  $(G, \circ)$  ονομάζεται **ήμιομάδα**, αν και μόνο αν η πράξη  $\circ$  είναι προσεταιριστική, δηλαδή για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in G$  ισχύει

$$(\alpha \circ \beta) \circ \gamma = \alpha \circ (\beta \circ \gamma)$$

Αν επιπλέον η πράξη  $\circ$  είναι αντιμεταθετική, τότε η δομή  $(G, \circ)$  ονομάζεται **αντιμεταθετική ήμιομάδα**.

Σύμφωνα με τον παραπάνω όρισμό οι δομές  $(\mathbf{N}, +)$  και  $(\mathbf{N}, \cdot)$  είναι αντιμεταθετικές ήμιομάδες.

Στά προηγούμενα είδαμε ότι ένα στοιχείο είναι δυνατό να έχει περισσότερα από ένα συμμετρικά στοιχεία ως προς μία πράξη (Παραδ. 3 τής 1.5). Στις ήμιομάδες όμως αυτό είναι αδύνατο, όπως δηλώνει το ακόλουθο θεώρημα.

**Θεώρημα.** Έστω  $(G, \circ)$  μία ήμιομάδα. Αν υπάρχει ουδέτερο στοιχείο  $e$  ως προς την πράξη  $\circ$ , τότε κάθε  $x \in G$  έχει τό πολύ ένα συμμετρικό στοιχείο ως προς την πράξη αυτή.

**Απόδειξη.** Ας υποθέσουμε ότι τα στοιχεία  $x'$  και  $x''$  του  $G$  είναι συμμετρικά του  $x \in G$  ως προς την πράξη  $\circ$ . Τότε λόγω του όρισμού του συμμετρικού στοιχείου έχουμε

$$x \circ x' = e \quad \text{και} \quad x'' \circ x = e,$$

οπότε από την προσεταιριστική ιδιότητα της πράξεως  $\circ$  παίρνουμε

$$x'' = x'' \circ e = x'' \circ (x \circ x') = (x'' \circ x) \circ x' = e \circ x' = x',$$

δηλαδή  $x' = x''$ .

## 2.2. Όμάδες

Η δομή  $(\mathbf{Z}, +)$  είναι μία (αντιμεταθετική) ήμιομάδα που έχει και άλλες ιδιότητες, τις οποίες δεν έχει η (αντιμεταθετική) ήμιομάδα  $(\mathbf{N}, +)$ . Οι πρόσθετες αυτές ιδιότητες είναι οι ακόλουθες:

(i) υπάρχει ουδέτερο στοιχείο ως προς την πρόσθεση:

$$\forall \alpha \in \mathbf{Z} : \quad \alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$$

(ii) κάθε στοιχείο  $\alpha$  του  $\mathbf{Z}$  έχει αντίθετο στοιχείο τό  $-\alpha$ :

$$\alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = 0.$$

Θεωρώντας αυτή την αλγεβρική δομή του  $\mathbf{Z}$  σε ένα οποιοδήποτε σύνολο έχουμε τον ακόλουθο όρισμό.

**Όρισμός.** Μία δομή  $(G, \circ)$  ονομάζεται **ομάδα**, αν και μόνο αν ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:

(O<sub>1</sub>) Η δομή  $(G, \circ)$  είναι ήμιομάδα.

(O<sub>2</sub>) Υπάρχει  $e \in G$  τέτοιο, ώστε για κάθε  $\alpha \in G$  να ισχύει

$$\alpha \circ e = e \circ \alpha = \alpha \quad (\text{Ύπαρξη οὐδέτερου στοιχείου}).$$

(O<sub>3</sub>) Γιά κάθε  $\alpha \in G$  ὑπάρχει  $\alpha' \in G$  τέτοιο, ὥστε

$$\alpha \circ \alpha' = \alpha' \circ \alpha = e \quad (\text{Ύπαρξη συμμετρικοῦ στοιχείου}).$$

Ἡ ὁμάδα  $(G, \circ)$  θά ὀνομάζεται **ἀβελιανή** ἢ **ἀντιμεταθετική**, ἂν καί μόνο ἂν ἡ πράξη  $\circ$  εἶναι **ἀντιμεταθετική**.

**Σημείωση.** Ἄν σέ μιά ὁμάδα ἡ πράξη ὀνομάζεται «πρόσθεση», θά λέμε ὅτι εἶναι μιά **προσθετική ὁμάδα**, ἐνῶ, ἂν ἡ πράξη ὀνομάζεται «πολλαπλασιασμός», θά λέμε ὅτι εἶναι μιά **πολλαπλασιαστική ὁμάδα**.

**Παραδείγματα:**

- Ἡ δομή  $(\mathbf{Z}, \cdot)$ , σέ ἀντίθεση πρὸς τή δομή  $(\mathbf{Z}, +)$ , δέν εἶναι ὁμάδα, γιατί π.χ. τό 3 δέν ἔχει συμμετρικό στοιχείο στό  $\mathbf{Z}$  ὡς πρὸς τόν πολλαπλασιασμό, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἀκέραιος  $\alpha$  μέ  $\alpha \cdot 3 = 1$ .
- Τό σύνολο  $A = \{2^k \mid k \in \mathbf{Z}\}$  εἶναι κλειστό ὡς πρὸς τόν πολλαπλασιασμό στό  $\mathbf{Q}$  καί ἡ δομή  $(A, \cdot)$  εἶναι μιά πολλαπλασιαστική ἀβελιανή ὁμάδα, γιατί γιά κάθε  $k, \lambda, \mu \in \mathbf{Z}$  ἰσχύουν
  - $2^k \cdot (2^\lambda \cdot 2^\mu) = (2^k \cdot 2^\lambda) \cdot 2^\mu$  (προσεταιριστική ἰδιότητα),
  - $2^k \cdot 2^0 = 2^0 \cdot 2^k = 2^k$  (Ύπαρξη οὐδέτερου στοιχείου),
  - $2^k \cdot 2^{-k} = 2^{-k} \cdot 2^k = 2^0$  (Ύπαρξη συμμετρικοῦ στοιχείου),
  - $2^k \cdot 2^\lambda = 2^\lambda \cdot 2^k$  (ἀντιμεταθετική ἰδιότητα).
- Ἡ συμμετρική διαφορά  $\dagger$  εἶναι μιά πράξη στό δυναμοσύνολο  $\mathcal{P}(X)$  ἑνός συνόλου  $X$ , πού ὀρίζεται ὡς ἑξῆς:

$$A \dagger B = (A-B) \cup (B-A) \quad (A, B \in \mathcal{P}(X))$$

Ἡ δομή  $(\mathcal{P}(X), \dagger)$  εἶναι μιά ἀβελιανή ὁμάδα, γιατί γιά κάθε  $A, B, \Gamma \in \mathcal{P}(X)$  ἰσχύουν

- $(A \dagger B) \dagger \Gamma = A \dagger (B \dagger \Gamma)$  (προσεταιριστική ἰδιότητα),
- $A \dagger \emptyset = \emptyset \dagger A = A$  (Ύπαρξη οὐδέτερου στοιχείου),
- $A \dagger A = \emptyset$  (Ύπαρξη συμμετρικοῦ στοιχείου),
- $A \dagger B = B \dagger A$  (ἀντιμεταθετική ἰδιότητα).

### 2.3. Βασικές ἰδιότητες σέ μιά ὁμάδα

Σέ μιά ὁμάδα  $(G, \circ)$  ἰσχύουν οἱ ἀκόλουθες ἰδιότητες.

**Ἰδιότητα 1.** Τό οὐδέτερο στοιχείο  $e \in G$  εἶναι μοναδικό.

Αὐτό εἶναι συνέπεια τῆς ἰδιότητας (O<sub>2</sub>) καί τοῦ θεωρήματος τῆς 1.4.

**Ἰδιότητα 2.** Κάθε  $\alpha \in G$  ἔχει μοναδικό συμμετρικό στοιχείο ὡς πρὸς τήν πράξη  $\circ$ . Αὐτό εἶναι συνέπεια τῶν ἰδιοτήτων (O<sub>1</sub>), (O<sub>3</sub>) καί τοῦ θεωρήματος τῆς 2.1.

**Σημείωση.** Σέ μιά προσθετική ὁμάδα τό συμμετρικό τοῦ  $\alpha$  θά συμβολίζεται μέ  $-\alpha$  καί θά ὀνομάζεται **ἀντίθετο** τοῦ  $\alpha$ , ἐνῶ σέ μιά πολλαπλασιαστική ὁμάδα αὐτό θά συμβολίζεται μέ  $\alpha^{-1}$  καί θά ὀνομάζεται **ἀντίστροφο** τοῦ  $\alpha$ .

**Ἰδιότητα 3.** Κάθε στοιχείο  $\alpha$  τοῦ  $G$  εἶναι ἀπλοποιήσιμο, δηλαδή γιά κάθε  $\beta, \gamma \in G$  ἰσχύουν

## II 2.4.

$$\alpha \circ \beta = \alpha \circ \gamma \Rightarrow \beta = \gamma \quad \text{καί} \quad \beta \circ \alpha = \gamma \circ \alpha \Rightarrow \beta = \gamma.$$

**Απόδειξη.** Έστω  $\alpha \circ \beta = \alpha \circ \gamma$ . Θά δείξουμε ότι  $\beta = \gamma$ . Από τις ιδιότητες της ομάδας και την υπόθεση παίρνουμε

$$\begin{aligned} \beta &= e \circ \beta = (\alpha' \circ \alpha) \circ \beta = \alpha' \circ (\alpha \circ \beta) = \alpha' \circ (\alpha \circ \gamma) = \\ &= (\alpha' \circ \alpha) \circ \gamma = e \circ \gamma = \gamma. \end{aligned}$$

Έστω  $\beta \circ \alpha = \gamma \circ \alpha$ . Θά δείξουμε ότι  $\beta = \gamma$ . Όμοια παίρνουμε

$$\begin{aligned} \beta &= \beta \circ e = \beta \circ (\alpha \circ \alpha') = (\beta \circ \alpha) \circ \alpha' = (\gamma \circ \alpha) \circ \alpha' = \\ &= \gamma \circ (\alpha \circ \alpha') = \gamma \circ e = \gamma. \end{aligned}$$

**Ιδιότητα 4.** Αν  $\alpha, \beta \in G$ , τότε κάθε μία από τις εξισώσεις  $\alpha \circ x = \beta$ ,  $x \circ \alpha = \beta$  έχει μοναδική λύση στο  $G$ .

**Απόδειξη.** Έστω  $\alpha' \in G$  τó συμμετρικό του  $\alpha$ . Τότε

$$\begin{aligned} \alpha \circ x = \beta &\Leftrightarrow \alpha' \circ (\alpha \circ x) = \alpha' \circ \beta \Leftrightarrow (\alpha' \circ \alpha) \circ x = \alpha' \circ \beta \\ &\Leftrightarrow e \circ x = \alpha' \circ \beta \Leftrightarrow x = \alpha' \circ \beta. \end{aligned}$$

Άρα η μοναδική λύση της εξίσωσης  $\alpha \circ x = \beta$  είναι τό στοιχείο  $\alpha' \circ \beta$ . Όμοια βρίσκουμε ότι η μοναδική λύση της εξίσωσης  $x \circ \alpha = \beta$  είναι τό στοιχείο  $\beta \circ \alpha'$ .

**Παρατήρηση.** Σέ άβελιανές ομάδες οί δύο εξισώσεις στην ιδιότητα 4 είναι ισοδύναμες. Ειδικότερα σέ προσθετικές άβελιανές ομάδες ή μοναδική λύση των παραπάνω εξισώσεων θά συμβολίζεται μέ  $\beta - \alpha$ , δηλαδή  $\beta - \alpha = \beta + (-\alpha)$ .

## 2.4. Άσκήσεις

1. Ποιές από τις δομές  $(A, \circ)$ ,  $(A, *)$ ,  $(A, \cdot)$  και  $(A, \oplus)$  μέ  $A = \{\alpha, \beta\}$  και μέ πράξεις, πού οί πίνακές τους δίνονται στό σχήμα 4,

ο	α	β
α	α	β
β	β	α

*	α	β
α	α	β
β	α	β

.	α	β
α	α	α
β	α	α

⊕	α	β
α	α	β
β	β	β

Σχ. 4

είναι ήμιομάδες και ποιές ομάδες;

2. (i) Αν  $(A, +)$  είναι μία προσθετική ομάδα, νά δείξετε ότι για κάθε  $\alpha, \beta \in A$   
 $\alpha + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -\alpha$ .  
 (ii) Αν  $(B, \cdot)$  είναι μία πολλαπλασιαστική ομάδα, νά δείξετε ότι για κάθε  $\alpha, \beta \in B$   
 $\alpha \cdot \beta = 1 \Rightarrow \beta = \alpha^{-1}$ .
3. Δείξτε ότι ή δομή  $(\mathbf{Z}_6, +)$  είναι άβελιανή ομάδα. Επιλύστε στό  $\mathbf{Z}_6$  τήν εξίσωση  $\hat{4} + x = \hat{2}$ .
4. Σέ μία πολλαπλασιαστική ομάδα  $(G, \cdot)$  δείξτε ότι για κάθε  $\alpha, \beta \in G$  και  $\mu, \nu \in \mathbf{N}$  ισχύουν  
 (i)  $(\alpha^{-1})^{-1} = \alpha$ ,  
 (ii)  $(\alpha \cdot \beta)^{-1} = \beta^{-1} \cdot \alpha^{-1}$ .

(iii)  $\alpha^u \cdot \alpha^v = \alpha^{u+v}$ ,

(iv)  $(\alpha^u)^v = \alpha^{uv}$

όπου οι δυνάμεις ορίζονται κατά τό γνωστό τρόπο:  $\alpha^1 = \alpha$ ,  $\alpha^2 = \alpha \cdot \alpha$  καί γενικά  $\alpha^{v+1} = \alpha^v \cdot \alpha$  ( $v \in \mathbf{N}$ ).

5. Άν είναι

$$\Sigma = \{ \lambda + \lambda i \mid \lambda \in \mathbf{R} \}$$

καί + ή πρόσθεση στό **C**, νά δείξετε ότι ή δομή ( $\Sigma$ , +) είναι ομάδα.

6. Σέ μία προσθετική ομάδα ( $G$ , +) για κάθε  $\alpha, \beta \in G$  ισχύουν

(i)  $-(-\alpha) = \alpha$

(ii)  $-(\alpha+\beta) = (-\beta) + (-\alpha)$ .

7. Στό σύνολο

$$E = \{ (\alpha, \beta) \mid \alpha \in \mathbf{R} - \{0\} \text{ καί } \beta \in \mathbf{R} \}$$

ή σχέση

$$(\alpha, \beta) * (\gamma, \delta) = (\alpha\gamma, \beta\gamma + \delta)$$

ορίζει μία πράξη \*. Νά δείξετε ότι ή δομή ( $E$ , \*) είναι ομάδα.

8. Άν ( $G$ , \*) είναι μία άβελιανή ομάδα, νά έπιλυθεί στό  $G$  τό σύστημα

$$\begin{cases} x * \alpha = y * y \\ x * \beta = y * \alpha' \end{cases}$$

όπου  $\alpha'$  τό συμμετρικό τοῦ  $\alpha$ .

### 3. ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

#### 3.1. Ἡ έννοια τοῦ δακτυλίου

Στήν προηγούμενη παράγραφο είδαμε άλγεβρικές δομές μέ μία μόνο έσωτερική πράξη. Ἐδῶ θά γνωρίσουμε άλγεβρικές δομές μέ δύο έσωτερικές πράξεις. Ἡ μία πράξη θά συμβολίζεται μέ + καί θά ονομάζεται πρόσθεση, ένῶ ή άλλη πράξη θά συμβολίζεται μέ  $\cdot$  καί θά ονομάζεται πολλαπλασιασμός, χωρίς αυτό νά σημαίνει ότι οι πράξεις αυτές ταυτίζονται πάντοτε μέ τίς γνωστές μας πράξεις τῆς προσθέσεως καί τοῦ πολλαπλασιασμοῦ στό **R**.

Προτοῦ δώσουμε τόν όρισμό τοῦ δακτυλίου, ἄς μελετήσουμε τή δομή ( $\mathbf{Z}$ , +,  $\cdot$ ). Ἰσχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:

1. Ἡ δομή ( $\mathbf{Z}$ , +) είναι άντιμεταθετική ομάδα, γιατί για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{Z}$  ισχύουν:

(i)  $(\alpha+\beta)+\gamma = \alpha+(\beta+\gamma)$ ,

(ii)  $\alpha+\beta = \beta+\alpha$ ,

(iii)  $\alpha+0 = \alpha$ ,

(iv)  $\alpha + (-\alpha) = 0$ .

## II 3.1.

2. 'Η δομή  $(\mathbf{Z}, \cdot)$  είναι ήμιομάδα, γιατί για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{Z}$  ισχύει:

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$$

3. 'Ο πολλαπλασιασμός  $\cdot$  είναι πράξη επιμεριστική ως προς την πρόσθεση  $+$ , γιατί για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{Z}$  ισχύουν:

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma \quad \text{καί} \quad (\beta + \gamma) \cdot \alpha = \beta \cdot \alpha + \gamma \cdot \alpha.$$

'Από τό προηγούμενο παράδειγμα οδηγούμαστε στον όρισμό μιᾶς γενικῆς δομῆς, πού θά ὀνομάζεται *δακτύλιος*.

**Όρισμός.** Μία δομή  $(A, +, \cdot)$  ὀνομάζεται **δακτύλιος**, ἂν καί μόνο ἂν ἰσχύουν οἱ ἀκόλουθες ἰδιότητες:

$(\Delta_1)$  'Η δομή  $(A, +)$  εἶναι ἀντιμεταθετική ὁμάδα.

$(\Delta_2)$  'Η δομή  $(A, \cdot)$  εἶναι ήμιομάδα.

$(\Delta_3)$  'Η πράξη  $\cdot$  εἶναι επιμεριστική ως προς τήν πράξη  $+$ .

'Ετσι για ἕνα δακτύλιο  $(A, +, \cdot)$  ἰσχύουν οἱ ἀκόλουθες ἰδιότητες:

- |    |  |   |              |
|----|--|---|--------------|
| 1. | $\forall \alpha, \beta, \gamma \in A: (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$   | } | $(\Delta_1)$ |
| 2. | 'Υπάρχει στό $A$ οὐδέτερο στοιχείο (συμβ. $0$ ) ὡς πρὸς τήν πρόσθεση   |   |              |
| 3. | Κάθε στοιχείο $\alpha$ τοῦ $A$ ἔχει <b>ἀντίθετο</b> στοιχείο (συμβ. $-\alpha$ )  |   |              |
| 4. | $\forall \alpha, \beta \in A: \quad \alpha + \beta = \beta + \alpha$   |   |              |
| 5. | $\forall \alpha, \beta, \gamma \in A: \quad (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$   |   | $(\Delta_2)$ |
| 6. | $\forall \alpha, \beta, \gamma \in A: \quad \alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$ καί $(\beta + \gamma) \cdot \alpha = \beta \cdot \alpha + \gamma \cdot \alpha$ |   | $(\Delta_3)$ |

'Ιδιαίτερα, ἕνας δακτύλιος  $(A, +, \cdot)$  θά ὀνομάζεται

(i) **ἀντιμεταθετικός**, ἂν καί μόνο ἂν ἡ ήμιομάδα  $(A, \cdot)$  εἶναι ἀντιμεταθετική, δηλαδή για κάθε  $\alpha, \beta \in A$ :

$$\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha,$$

(ii) **δακτύλιος μέ μοναδιαῖο στοιχείο**, ἂν καί μόνο ἂν ὑπάρχει οὐδέτερο στοιχείο ὡς πρὸς τήν πράξη  $\cdot$  (πού, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει, συμβολίζεται μέ  $1$ ), δηλαδή για κάθε  $\alpha \in A$ :

$$\alpha \cdot 1 = 1 \cdot \alpha = \alpha.$$

**Παράδειγματα:**

1. 'Η δομή  $(A, +, \cdot)$ , ὅπου  $A = \{\alpha + \beta\sqrt{2} \mid \alpha, \beta \in \mathbf{Q}\}$  καί πράξεις  $+$  καί  $\cdot$  οἱ γνωστές μας πράξεις στό  $\mathbf{R}$ , εἶναι ἀντιμεταθετικός δακτύλιος μέ μοναδιαῖο στοιχείο.

Πράγματι, για κάθε  $\alpha, \alpha', \alpha'', \beta, \beta', \beta'' \in \mathbf{Q}$  ισχύουν:

$$(i) [(\alpha + \beta\sqrt{2}) + (\alpha' + \beta'\sqrt{2})] + (\alpha'' + \beta''\sqrt{2}) = (\alpha + \beta\sqrt{2}) + [(\alpha' + \beta'\sqrt{2}) + (\alpha'' + \beta''\sqrt{2})], \text{ γιατί κάθε ἕνα ἀπό τά μέλη της ἰσοῦται μέ } [(\alpha + \alpha' + \alpha'') + (\beta + \beta' + \beta'')\sqrt{2}],$$

$$(ii) (\alpha + \beta\sqrt{2}) + (\alpha' + \beta'\sqrt{2}) = (\alpha' + \beta'\sqrt{2}) + (\alpha + \beta\sqrt{2}), \text{ γιατί κάθε μέλος της ἰσοῦται μέ } [(\alpha + \alpha') + (\beta + \beta')\sqrt{2}],$$

- (iii)  $(\alpha + \beta\sqrt{2}) + (0 + 0\sqrt{2}) = \alpha + \beta\sqrt{2}$ ,
- (iv)  $(\alpha + \beta\sqrt{2}) + (-\alpha - \beta\sqrt{2}) = 0 + 0\sqrt{2} = 0$ ,
- (v)  $[(\alpha + \beta\sqrt{2}) \cdot (\alpha' + \beta'\sqrt{2})] \cdot (\alpha'' + \beta''\sqrt{2}) = (\alpha + \beta\sqrt{2}) \cdot [(\alpha' + \beta'\sqrt{2}) \cdot (\alpha'' + \beta''\sqrt{2})]$ ,
- (vi)  $(\alpha + \beta\sqrt{2}) \cdot (\alpha' + \beta'\sqrt{2}) = (\alpha' + \beta'\sqrt{2}) \cdot (\alpha + \beta\sqrt{2})$ ,
- (vii)  $(\alpha + \beta\sqrt{2}) \cdot [(\alpha' + \beta'\sqrt{2}) + (\alpha'' + \beta''\sqrt{2})] =$   
 $= (\alpha + \beta\sqrt{2}) \cdot (\alpha' + \beta'\sqrt{2}) + (\alpha + \beta\sqrt{2}) \cdot (\alpha'' + \beta''\sqrt{2})$  και
- (viii)  $(\alpha + \beta\sqrt{2}) \cdot (1 + 0\sqrt{2}) = \alpha + \beta\sqrt{2}$

2. Η δομή  $(Z_5, +, \cdot)$  είναι ένας αντιμεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο. Ένας εύκολος τρόπος, για να εξετάσουμε αν ισχύει ο όρισμός του δακτυλίου για τη δομή  $(Z_5, +, \cdot)$ , είναι η κατασκευή των γνωστών πινάκων για τις πράξεις  $+$  και  $\cdot$  στο  $Z_5$  (Σχ. 5).

Πράξεις στο $Z_5$											
Πρόσθεση						Πολλαπλασιασμός					
$+$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\cdot$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$
$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{0}$
$\hat{1}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$
$\hat{2}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{0}$	$\hat{2}$	$\hat{4}$	$\hat{1}$	$\hat{3}$
$\hat{3}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{0}$	$\hat{3}$	$\hat{1}$	$\hat{4}$	$\hat{2}$
$\hat{4}$	$\hat{4}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{0}$	$\hat{4}$	$\hat{3}$	$\hat{2}$	$\hat{1}$

Σχ. 5

\* Αν  $\hat{\alpha}$ ,  $\hat{\beta}$  και  $\hat{\gamma}$  είναι κλάσεις υπολοίπων modulo 5, επαληθεύστε τις ιδιότητες

- (i)  $(\hat{\alpha} + \hat{\beta}) + \hat{\gamma} = \hat{\alpha} + (\hat{\beta} + \hat{\gamma})$ ,
- (ii)  $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = \hat{\beta} + \hat{\alpha}$
- (iii)  $\hat{\alpha} + \hat{0} = \hat{\alpha}$
- (iv) Για κάθε  $\hat{x} \in Z_5$  υπάρχει  $\hat{y} \in Z_5$  με την ιδιότητα  $\hat{x} + \hat{y} = \hat{0}$   
 (π.χ.  $\hat{1} + \hat{4} = \hat{0}$ ),
- (v)  $(\hat{\alpha} \cdot \hat{\beta}) \cdot \hat{\gamma} = \hat{\alpha} \cdot (\hat{\beta} \cdot \hat{\gamma})$ ,
- (vi)  $\hat{\alpha} \cdot \hat{\beta} = \hat{\beta} \cdot \hat{\alpha}$
- (vii)  $\hat{\alpha} \cdot (\hat{\beta} + \hat{\gamma}) = \hat{\alpha} \cdot \hat{\beta} + \hat{\alpha} \cdot \hat{\gamma}$ ,
- (viii)  $\hat{\alpha} \cdot \hat{1} = \hat{\alpha}$ .

3. Κάθε μονοσύνολο  $A = \{\alpha\}$  μαζί με τις ακόλουθες πράξεις  $\alpha + \alpha = \alpha$  και  $\alpha \cdot \alpha = \alpha$  είναι ένας αντιμεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο, που ονομάζεται μηδενικός δακτύλιος.

## II 3.2.

Παρατηρήστε ότι τα δύο ουδέτερα στοιχεία ως προς τις πράξεις  $+$  και  $\cdot$ , δηλ. τα  $0$  και  $1$ , ταυτίζονται με τό  $\alpha$ . Έτσι μπορούμε να γράψουμε  $A = \{0\}$ , πού δικαιολογεί την παραπάνω ονομασία.

### 3.2. Βασικές ιδιότητες σέ ένα δακτύλιο

Οί βασικές ιδιότητες σέ ένα δακτύλιο είναι ανάλογες μέ τίς ιδιότητες εκείνες στό  $\mathbf{Z}$ , πού δέν αναφέρονται στό αντίστροφο ενός στοιχείου και τήν αντιμεταθετική ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Ἐδῶ θά αναφέρουμε μόνο δύο ιδιότητες τῶν δακτυλίων.

**Ἰδιότητα 1.** Ἐάν  $(A, +, \cdot)$  εἶναι ἕνας δακτύλιος, τότε γιά κάθε  $\alpha \in A$  ἰσχύει

$$\alpha \cdot 0 = 0 \cdot \alpha = 0$$

**Ἀπόδειξη.** Ἐάν  $\beta \in A$ , τότε

$$\beta + 0 = \beta,$$

ὁπότε

$$\alpha \cdot (\beta + 0) = \alpha \cdot \beta.$$

Ἐάν ἐφαρμόσουμε τήν ἐπιμεριστική ιδιότητα, ἔχουμε

$$\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot 0 = \alpha \cdot \beta,$$

δηλαδή τό  $\alpha \cdot 0$  εἶναι τό ουδέτερο στοιχείο ὡς πρὸς τήν πρόσθεση καί ἐπομένως

$$\alpha \cdot 0 = 0.$$

Μέ ἀνάλογο τρόπο ἀποδεικνύεται ὅτι  $0 \cdot \alpha = 0$ .

**Πόρισμα.** Ἐάν σέ ένα δακτύλιο μέ μοναδιαῖο στοιχείο τά δύο ουδέτερα στοιχεία ταυτίζονται, δηλαδή  $0 \equiv 1$ , τότε ὁ δακτύλιος εἶναι ἕνας μηδενικός δακτύλιος.

**Ἰδιότητα 2.** Ἐάν  $(A, +, \cdot)$  εἶναι ἕνας δακτύλιος, τότε γιά κάθε  $\alpha, \beta \in A$  ἰσχύει

$$\alpha \cdot (-\beta) = -(\alpha \cdot \beta)$$

**Ἀπόδειξη.** Γιά ὁποιοδήποτε  $\beta \in A$  ἔχουμε τήν ἰσότητα

$$(-\beta) + \beta = 0.$$

Ἐάν τώρα πολλαπλασιάσουμε ἀπό ἀριστερά καί τά δύο μέλη τῆς μέ  $\alpha \in A$  καί ἐφαρμόσουμε τήν ἐπιμεριστική ιδιότητα, παίρουμε

$$\alpha \cdot (-\beta) + \alpha \cdot \beta = \alpha \cdot 0.$$

Τό δεύτερο μέλος ὅμως εἶναι τό  $0$ . Ἐπομένως

$$\alpha \cdot (-\beta) + \alpha \cdot \beta = 0,$$

πού σημαίνει ὅτι τό  $\alpha \cdot (-\beta)$  εἶναι τό ἀντίθετο τοῦ  $\alpha \cdot \beta$ , δηλαδή

$$\alpha \cdot (-\beta) = -(\alpha \cdot \beta).$$

### 3.3. 'Η έννοια τῆς ἀκέραιας περιοχῆς

'Η δομή  $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$  είναι ένας ἀντιμεταθετικός δακτύλιος μέ μοναδιαῖο στοιχεῖο. Γιά ν' ἀποδείξουμε αὐτό, κατασκευάζουμε τούς πίνακες τοῦ σχήματος 6. (Τά οὐδέτερα στοιχεῖα ὡς πρός τίς δύο πράξεις εἶναι τά  $\widehat{0}$  καί  $\widehat{1}$ ).

Πράξεις στό $\mathbb{Z}_4$									
Πρόσθεση					Πολλαπλασιασμός				
+	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$	$\cdot$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$
$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$
$\widehat{1}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$
$\widehat{2}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{0}$	$\widehat{2}$	$\widehat{0}$	$\widehat{2}$
$\widehat{3}$	$\widehat{3}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$	$\widehat{0}$	$\widehat{3}$	$\widehat{2}$	$\widehat{1}$

Σχ. 6

Στό δακτύλιο αὐτό παρατηροῦμε ὅτι

$$\widehat{2} \cdot \widehat{2} = \widehat{0}.$$

\*Άρα, ἄν σέ ἕνα δακτύλιο  $(A, +, \cdot)$  ἰσχύει

$$\alpha \cdot \beta = 0,$$

αὐτό δέ σημαίνει ὅτι θά εἶναι  $\alpha = 0$  εἴτε  $\beta = 0$ .

\*Ἐτσι, μέ τήν παρατήρηση αὐτή ὀδηγούμαστε στή θεώρηση μιᾶς νέας ἀλγεβρικής δομῆς, πού τήν ὀνομάζουμε *ἀκέραια περιοχὴ*.

**\*Ορισμός.** \*Ἄν  $(A, +, \cdot)$  εἶναι ἕνας μὴ μηδενικός ἀντιμεταθετικός δακτύλιος μέ μοναδιαῖο στοιχεῖο τέτοιος, ὥστε

$$\alpha \cdot \beta = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \text{ εἴτε } \beta = 0^{(1)} \quad (\alpha, \beta \in A),$$

τότε ἡ δομὴ  $(A, +, \cdot)$  ὀνομάζεται *ἀκέραια περιοχὴ*.

**Παραδείγματα:**

1. 'Η δομὴ  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  εἶναι μιὰ ἀκέραια περιοχὴ, γιατί εἶναι ἕνας μὴ μηδενικός ἀντιμεταθετικός δακτύλιος μέ μοναδιαῖο στοιχεῖο καί μάλιστα ἄν  $\alpha \cdot \beta = 0$ , τότε  $\alpha = 0$  εἴτε  $\beta = 0$ .
2. 'Η δομὴ  $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$  εἶναι μιὰ ἀκέραια περιοχὴ. Στό παράδειγμα 2 τῆς 3.1 εἶδαμε ὅτι ἡ δομὴ αὐτὴ εἶναι ἀντιμεταθετικός δακτύλιος μέ μοναδιαῖο στοιχεῖο. Ἄπό τόν πίνακα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ σχήματος 5 διαπιστώστε ὅτι

$$\widehat{\alpha} \cdot \widehat{\beta} = \widehat{0} \Leftrightarrow \widehat{\alpha} = \widehat{0} \text{ εἴτε } \widehat{\beta} = \widehat{0}$$

1. Λόγω τῆς ἰδιότητας 1 τῆς 3.2, ἡ ἀντίστροφη συνεπαγωγὴ ἰσχύει πάντα σέ ἕνα δακτύλιο.

## II 3.4.

### 3.4. Άσκησης

1. Δείξτε ότι η δομή  $(A, +, \cdot)$ , όπου  $A = \{1,2\}$  και  $+, \cdot$  οι πράξεις που ορίζονται στους πίνακες του σχήματος 7,

+	1	2
1	1	2
2	2	1

·	1	2
1	1	1
2	1	2

Σχ. 7

είναι αντιμεταθετικός δακτύλιος. Έχει μοναδιαίο στοιχείο;

2. Ποιές από τις παρακάτω δομές

(i)  $(A, +, \cdot)$ , όπου  $A = \{2n | n \in \mathbb{Z}\}$ ,

(ii)  $(A, +, \cdot)$ , όπου  $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$  και πράξεις που ορίζονται στους πίνακες του σχήματος 8,

+	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$
$\alpha$	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$
$\beta$	$\beta$	$\alpha$	$\delta$	$\gamma$
$\gamma$	$\gamma$	$\delta$	$\alpha$	$\beta$
$\delta$	$\delta$	$\gamma$	$\beta$	$\alpha$

·	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$
$\alpha$	$\alpha$	$\alpha$	$\alpha$	$\alpha$
$\beta$	$\alpha$	$\beta$	$\alpha$	$\beta$
$\gamma$	$\alpha$	$\gamma$	$\alpha$	$\delta$
$\delta$	$\alpha$	$\delta$	$\alpha$	$\delta$

Σχ. 8

(iii)  $(\mathcal{P}(A), \ddagger, \cap)$ ,

(iv)  $(\mathcal{P}(A), \ddagger, \cup)$

είναι δακτύλιοι; Στη συνέχεια να βρείτε τους αντιμεταθετικούς δακτυλίους.

3. Δείξτε ότι η δομή  $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ , όπου οι πράξεις  $\oplus$  και  $\odot$  ορίζονται ως εξής:

$$\alpha \oplus \beta = \alpha + \beta + 1 \quad \text{και} \quad \alpha \odot \beta = \alpha + \beta + \alpha\beta,$$

είναι αντιμεταθετικός δακτύλιος. Έχει μοναδιαίο στοιχείο ο δακτύλιος αυτός;

4. Η δομή  $(A, +, \cdot)$ , όπου  $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$  και πράξεις  $+, \cdot$  που ορίζονται στους πίνακες του σχήματος 9,

+	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$
$\alpha$	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$
$\beta$	$\beta$	$\alpha$	$\delta$	$\gamma$
$\gamma$	$\gamma$	$\delta$	$\alpha$	$\beta$
$\delta$	$\delta$	$\gamma$	$\beta$	$\alpha$

·	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$
$\alpha$	$\alpha$	$\alpha$	$\alpha$	$\alpha$
$\beta$	$\alpha$	$\beta$		
$\gamma$	$\alpha$			$\alpha$
$\delta$	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	

Σχ. 9

είναι ένας δακτύλιος. Να συμπληρώσετε τον πίνακα του πολλαπλασιασμού. Είναι αυτός ο δακτύλιος αντιμεταθετικός; Έχει μοναδιαίο στοιχείο;

5. \*Αν  $(A, +, \cdot)$  είναι ένας δακτύλιος, δείξτε ότι για κάθε  $\alpha, \beta \in A$  ισχύει  
 $(-\alpha)(-\beta) = \alpha\beta$ .

6. Ποιές από τις παρακάτω δομές

- (i)  $(B, +, \cdot)$  με  $B = \{2v \mid v \in \mathbf{Z}\}$ ,  
 (ii)  $(E, +, \cdot)$  με  $E = \{\mu + v\sqrt{5} \mid \mu, v \in \mathbf{Z}\}$ ,  
 (iii)  $(H, +, \cdot)$  με  $H = \{p + q\sqrt{5} \mid p, q \in \mathbf{Q}\}$ .  
 είναι άκέραιες περιοχές;

## 4. ΣΩΜΑΤΑ

### 4.1. \*Η έννοια του σώματος

\*Ας εξετάσουμε τη δομή  $(\mathbf{Q}, +, \cdot)$ . \*Η δομή αυτή είναι ένας αντιμεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο, άφου

- α) οί πράξεις  $+$  και  $\cdot$  είναι αντιμεταθετικές και προσεταιριστικές,  
 β) ή πράξη  $\cdot$  είναι έπιμεριστική ως προς την πράξη  $+$ ,  
 γ) τά 0 και 1 είναι ουδέτερα στοιχεία ως προς τις πράξεις  $+$ , και  $\cdot$  αντίστοίχως και  
 δ) κάθε στοιχείο του  $\mathbf{Q}$  έχει αντίθετο στοιχείο.

Είναι γνωστό όμως ότι κάθε στοιχείο  $\alpha$  του  $\mathbf{Q}^* = \mathbf{Q} - \{0\}$  έχει αντίστροφο στοιχείο τό  $\alpha^{-1}$ , δηλαδή

$$\alpha \cdot \alpha^{-1} = 1,$$

Ιδιότητα πού δέν άπαιτείται στον όρισμό του δακτυλίου. Για τό λόγο αυτό ή δομή  $(\mathbf{Q}, +, \cdot)$  ονομάζεται *σώμα*. \*Έτσι έχουμε τον άκόλουθο όρισμό.

\***Όρισμός.** Μιά δομή  $(A, +, \cdot)$  ονομάζεται *σώμα*, αν και μόνο αν ισχύουν οι άκόλουθες ιδιότητες:

( $\Sigma_1$ ) \*Η δομή  $(A, +, \cdot)$  είναι ένας μή μηδενικός αντιμεταθετικός δακτύλιος.

( $\Sigma_2$ ) \*Η δομή  $(A^*, \cdot)$  είναι μία ομάδα, όπου  $A^* = A - \{0\}$ .

\*Έτσι σέ ένα σώμα  $(A, +, \cdot)$  για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in A$  ισχύουν οι άκόλουθες ιδιότητες:

## II 4.2.

1. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$	}	$(\Sigma_1)$
2. $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$		
3. $\alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = 0$		
4. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$		
5. $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$	}	$(\Sigma_2)$
6. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$		
7. $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$		
8. $\alpha \cdot 1 = \alpha$		
9. $\alpha \cdot \alpha^{-1} = 1$ , γιὰ $\alpha \neq 0$		

**Σημείωση.** Τό ότι ή ιδιότητα 8 ισχύει καί γιὰ  $\alpha = 0$ , είναι συνέπεια τῆς ιδιότητας 1 τῆς 3.2.

**Παραδείγματα:**

1. Ἡ δομή  $(\mathbf{R}, +, \cdot)$  είναι σῶμα, γιατί στό  $\mathbf{R}$  ισχύουν, ὅπως γνωρίζουμε, οἱ παραπάνω ιδιότητες 1.-9. Ὁμοίως ή δομή  $(\mathbf{C}, +, \cdot)$  είναι σῶμα.
2. Τό σύνολο  $A = \{1, 1\}$  μαζί μέ τίς πράξεις  $+$  καί  $\cdot$ , πού ὀρίζονται στούς πίνακες τοῦ σχήματος 10, είναι ἐπίσης ἕνα παράδειγμα σώματος.

+	0	1
0	0	1
1	1	0

	0	1
0	0	0
1	0	1

Σχ. 10

### 4.2. Βασικές ιδιότητες σέ ἕνα σῶμα

Εἶναι γνωστό ὅτι στό σῶμα  $(\mathbf{R}, +, \cdot)$  τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ισχύει  $\alpha \cdot \beta = 0 \Rightarrow \alpha = 0$  εἴτε  $\beta = 0$ .

Αὐτή είναι μιὰ ιδιότητα, πού τήν ἔχουν ὅλα τά σώματα.

**Ἰδιότητα 1.** Ἐάν  $(A, +, \cdot)$  είναι σῶμα, τότε γιὰ  $\alpha, \beta \in A$  ισχύει ή συνεπαγωγή

$$\alpha \cdot \beta = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \text{ εἴτε } \beta = 0$$

**Ἀπόδειξη.** Ἐάν  $\alpha = 0$ , τότε λόγω τῆς ιδιότητας 1 τῆς 3.2 ή συνεπαγωγή ισχύει.

Ἐστω  $\alpha \cdot \beta = 0$  καί  $\alpha \neq 0$ . Τότε υπάρχει τό ἀντίστροφο  $\alpha^{-1}$  τοῦ  $\alpha \neq 0$ , ὅποτε πολλαπλασιάζοντας καί τά δύο μέλη τῆς ἰσότητος  $\alpha \cdot \beta = 0$  μέ  $\alpha^{-1}$  παίρνουμε

$$\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot \beta) = \alpha^{-1} \cdot 0.$$

Λόγω τής ιδιότητας 1 τής 3.2 το δεύτερο μέλος είναι το στοιχείο 0. Έτσι έχουμε

$$(\alpha^{-1} \cdot \alpha) \cdot \beta = 0$$

καί επομένως

$$1 \cdot \beta = 0,$$

δηλαδή  $\beta = 0$ .

**Πόρισμα.** Κάθε σῶμα είναι άκέραια περιοχή.

Είναι γνωστό άκόμα ότι στο σῶμα τῶν πραγματικῶν άριθμῶν ή εξίσωση

$$ax = \beta$$

μέ  $\alpha \neq 0$  έχει μοναδική λύση στο  $\mathbf{R}$ . Αυτό άποτελεί γενική ιδιότητα τῶν σωμάτων.

**Ίδιότητα 2.** "Αν  $(A, +, \cdot)$  είναι σῶμα καί  $\alpha, \beta \in A$  μέ  $\alpha \neq 0$ , τότε ή εξίσωση

$$\alpha \cdot x = \beta$$

έχει μοναδική λύση στο  $A$ .

Ή άπόδειξη είναι ίδια μέ εκείνη τής ιδιότητας 4 τής 2·3. Ή μοναδική λύση τής εξισώσεως αυτής είναι το στοιχείο  $\alpha^{-1} \cdot \beta (= \beta \cdot \alpha^{-1})$ , πού το συμβολίζουμε μέ  $\frac{\beta}{\alpha}$ , δηλαδή  $\frac{\beta}{\alpha} = \beta \cdot \alpha^{-1}$ .

### 4.3. Άσκήσεις

1. Βρείτε ποιές άπό τίς παρακάτω δομές είναι σώματα:

(i)  $(\mathbf{Z}_4, +, \cdot)$ ,

(ii)  $(\mathbf{Z}_6, +, \cdot)$ ,

(iii)  $(\mathbf{Z}_7, +, \cdot)$ ,

(iv)  $(A, +, \cdot)$ , όπου  $A = \{x + y\sqrt{5} \mid x, y \in \mathbf{Q}\}$  καί  $+, \cdot$  οι γνωστές πράξεις στο  $\mathbf{R}$ .

2. "Εστω  $A = \{\alpha = (x, y) \mid x, y \in \mathbf{Q}\}$ .

(i) "Αν  $\alpha + \alpha' = (x+x', y+y')$  καί  $\alpha \cdot \alpha' = (xx' + 2yy', xy' + x'y)$ , είναι σῶμα ή δομή  $(A, +, \cdot)$ ;

(ii) "Αν  $\alpha + \alpha' = (x+x', y+y')$  καί  $\alpha \cdot \alpha' = (xx' - yy', xy' + x'y)$ , είναι σῶμα ή δομή  $(A, +, \cdot)$ ;

3. "Εστω  $(A, +, \cdot)$  ένα σῶμα. Δείξτε ότι

(i) αν  $\alpha, \beta \in A^*$ , τότε  $(\alpha \cdot \beta)^{-1} = \alpha^{-1} \cdot \beta^{-1}$ ,

(ii) αν  $\alpha, \gamma \in A$  καί  $\beta, \delta \in A^*$ , τότε

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \delta + \beta \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta}.$$

4. Νά έπιλυθεί το σύστημα

$$\widehat{2} \cdot x + \widehat{3} \cdot y = \widehat{2}$$

$$\widehat{1} \cdot x + \widehat{2} \cdot y = \widehat{4}$$

στο σῶμα  $(\mathbf{Z}_6, +, \cdot)$ .

## II 5.1.

### 5. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

#### 5.1. Ἡ ἔννοια τοῦ διανυσματικοῦ χώρου

Ἄς συμβολίσουμε μέ  $\Delta$  τό σύνολο τῶν διανυσμάτων ἑνός ἐπιπέδου. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ πρόσθεση στό  $\Delta$  ἔχει τίς ἀκόλουθες ιδιότητες:

1. Γιά τρία ὁποιαδήποτε διανύσματα  $\vec{x}$ ,  $\vec{y}$  καί  $\vec{z}$  τοῦ  $\Delta$  ἰσχύει

$$(\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}).$$

2. Γιά κάθε διάνυσμα  $\vec{x}$  τοῦ  $\Delta$  ἰσχύει

$$\vec{x} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{x} = \vec{x}.$$

3. Γιά κάθε διάνυσμα  $\vec{x}$  τοῦ  $\Delta$  ἰσχύει

$$\vec{x} + (-\vec{x}) = (-\vec{x}) + \vec{x} = \vec{0}.$$

4. Γιά δύο ὁποιαδήποτε διανύσματα  $\vec{x}$  καί  $\vec{y}$  τοῦ  $\Delta$  ἰσχύει

$$\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}.$$

Λόγω τῶν παραπάνω ιδιοτήτων ἡ δομή  $(\Delta, +)$  εἶναι μιά ἀντιμεταθετική ομάδα.

Ἐξάλλου ὁ πολλαπλασιασμός πραγματικῶν ἀριθμῶν μέ διανύσματα τοῦ  $\Delta$  ἔχει, ὡς γνωστό, τίς ἀκόλουθες ιδιότητες:

- α. Γιά δύο ὁποιαδήποτε διανύσματα  $\vec{x}$  καί  $\vec{y}$  τοῦ  $\Delta$  καί γιά κάθε πραγματικό ἀριθμό  $\lambda$  ἰσχύει

$$\lambda \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = \lambda \cdot \vec{x} + \lambda \cdot \vec{y}$$

- β. Γιά κάθε  $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$  καί γιά κάθε διάνυσμα  $\vec{x}$  τοῦ  $\Delta$  ἰσχύουν

$$(\lambda + \mu) \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x} + \mu \cdot \vec{x},$$

$$\lambda \cdot (\mu \cdot \vec{x}) = (\lambda \cdot \mu) \cdot \vec{x}$$

- γ. Γιά κάθε διάνυσμα  $\vec{x}$  τοῦ  $\Delta$  ἰσχύει

$$1 \cdot \vec{x} = \vec{x},$$

ὅπου 1 εἶναι τό μοναδιαῖο στοιχεῖο τοῦ σώματος τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

Ἀπό τίς παραπάνω ιδιότητες ὀδηγοῦμαστε στή θεώρηση μιᾶς νέας ἀλγεβρικής δομῆς, πού ὀνομάζεται *διανυσματικός* ἢ *γραμμικός χώρος*. Ἔτσι ἔχουμε τόν παρακάτω ὄρισμό.

**Όρισμός.** Ένα μη κενό σύνολο  $V$  θά ονομάζεται **διανυσματικός ή γραμμικός χώρος πάνω στο σώμα  $K$** (<sup>1</sup>), αν και μόνο αν ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:

(Γ<sub>1</sub>) Στο  $V$  είναι ορισμένη μία έσωτερική πράξη  $+$  τέτοια, ώστε η δομή  $(V, +)$  νά είναι αντιμεταθετική ομάδα.

(Γ<sub>2</sub>) Στο  $V$  είναι ορισμένη μία έξωτερική πράξη  $\cdot$  με σύνολο τελεστών τό  $K$  τέτοια, ώστε για κάθε  $x, y \in V$  και  $\alpha, \beta \in K$  νά ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:

(i)  $\alpha \cdot (x+y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$  (πρώτη έπιμεριστική ιδιότητα),

(ii)  $(\alpha+\beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$  (δεύτερη έπιμεριστική ιδιότητα),

(iii)  $(\alpha \cdot \beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$  (προσεταιριστική ιδιότητα),

(iv)  $1 \cdot x = x$ ,

όπου 1 είναι τό μοναδιαίο στοιχείο του σώματος  $K$ .

Ή πρόσθεση στό  $V$  θά ονομάζεται **διανυσματική πρόσθεση** και ή έξωτερική πράξη  $\cdot$  στό  $V$  (μέ σύνολο τελεστών τό  $K$ ) **βαθμωτός πολλαπλασιασμός** στό  $V$ .

Ειδικότερα, ένας διανυσματικός χώρος πάνω στό σώμα  $\mathbf{R}$  θά ονομάζεται **πραγματικός διανυσματικός (ή γραμμικός) χώρος**.

**Παρατήρηση.** Στόν παραπάνω έρισμό βλέπουμε ότι τό ίδιο σύμβολο  $+$  χρησιμοποιείται τόσο για τήν πρόσθεση στό  $K$ , όπως π.χ. στό πρώτο μέλος τής (ii), όσο και για τή διανυσματική πρόσθεση, όπως π.χ. στό δεύτερο μέλος τής (ii). Γι' αυτό δέν πρέπει νά γίνεται σύγχυση ανάμεσα στις δύο αυτές πράξεις. Άνάλογη παρατήρηση ισχύει για τό σύμβολο  $\cdot$ .

**Σημείωση.** Τό ούδέτερο στοιχείο ως προς τή διανυσματική πρόσθεση θά συμβολίζεται μέ  $\mathbf{0}$  (μηδενικό στοιχείο του διανυσματικού χώρου), ενώ τό ούδέτερο στοιχείο ως προς τήν πρόσθεση στό  $K$  μέ  $0$ .

**Παραδείγματα:**

1. Στο παράδειγμα 5 τής 1.1 έχουν έριστεί οι ακόλουθες πράξεις στό σύνολο  $V = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ :

(i) μία έσωτερική πράξη  $+$ :

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

και

(ii) μία έξωτερική πράξη  $\cdot$  μέ σύνολο τελεστών τό  $\mathbf{R}$  ως έξής:

$$\lambda \cdot (x, y) = (\lambda \cdot x, \lambda \cdot y) \quad (\lambda \in \mathbf{R})$$

Μέ τίς παραπάνω πράξεις τό σύνολο  $V$  είναι ένας πραγματικός διανυσματικός χώρος. Πράγματι,

α) ή δομή  $(V, +)$  είναι αντιμεταθετική ομάδα μέ ούδέτερο στοιχείο ως προς τήν πράξη  $+$  τό  $(0, 0)$  και αντίθετο στοιχείο του  $(x, y)$  τό  $(-x, -y)$ ,

β) για δύο οποιαδήποτε στοιχεία  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  του  $V$  και  $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$  ισχύουν

$$(i) \alpha \cdot [(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = \alpha \cdot (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot x_2, \alpha \cdot y_1 + \alpha \cdot y_2) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot y_1) + (\alpha \cdot x_2, \alpha \cdot y_2) = \alpha \cdot (x_1, y_1) + \alpha \cdot (x_2, y_2),$$

1. Για λόγους συντομίας θά γράφουμε «σώμα  $K$ » αντί «σώμα  $(K, +, \cdot)$ »

## II 5.2.

- (ii)  $(\alpha + \beta) \cdot (x_1, y_1) = (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot y_1 + \beta \cdot y_1) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot y_1) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot y_1) = \alpha \cdot (x_1, y_1) + \beta \cdot (x_1, y_1)$ ,  
 (iii)  $(\alpha \cdot \beta) \cdot (x_1, y_1) = (\alpha \cdot \beta \cdot x_1, \alpha \cdot \beta \cdot y_1) = \alpha \cdot (\beta \cdot x_1, \beta \cdot y_1) = \alpha \cdot [\beta \cdot (x_1, y_1)]$ ,  
 (iv)  $1 \cdot (x_1, y_1) = (1 \cdot x_1, 1 \cdot y_1) = (x_1, y_1)$ .

Γενικά, τό σύνολο

$$\mathbf{R}^v = \{(x_1, x_2, \dots, x_v) \mid x_1, x_2, \dots, x_v \in \mathbf{R}\}$$

μέ ισότητα

$$(x_1, x_2, \dots, x_v) = (y_1, y_2, \dots, y_v) \Leftrightarrow x_k = y_k \text{ για κάθε } k \in \{1, 2, \dots, v\}$$

καί μέ

α) έσωτερική πράξη +:

$$(x_1, x_2, \dots, x_v) + (y_1, y_2, \dots, y_v) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_v + y_v),$$

β) έξωτερική πράξη (μέ σύνολο τελεστών τό  $\mathbf{R}$ ):

$$\lambda \cdot (x_1, x_2, \dots, x_v) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_v) \quad (\lambda \in \mathbf{R})$$

είναι ένας πραγματικός διανυσματικός χώρος μέ μηδενικό στοιχείο τό  $(0, 0, \dots, 0)$  καί αντίθετο του  $(x_1, x_2, \dots, x_v)$  τό  $(-x_1, -x_2, \dots, -x_v)$ .

2. Τό σύνολο  $V$  όλων τών τριωνύμων

$$ax^2 + bx + \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R})$$

μέ ισότητα

$$ax^2 + bx + \gamma \equiv a'x^2 + b'x + \gamma' \Leftrightarrow \alpha = \alpha' \text{ καί } \beta = \beta' \text{ καί } \gamma = \gamma'$$

καί μέ

α) έσωτερική πράξη +:

$$(ax^2 + bx + \gamma) + (a'x^2 + b'x + \gamma') \equiv (\alpha + \alpha')x^2 + (\beta + \beta')x + (\gamma + \gamma')$$

β) έξωτερική πράξη (μέ σύνολο τελεστών τό  $\mathbf{R}$ ):

$$\lambda \cdot (ax^2 + bx + \gamma) \equiv (\lambda\alpha)x^2 + (\lambda\beta)x + (\lambda\gamma)$$

είναι ένας πραγματικός γραμμικός χώρος μέ μηδενικό στοιχείο τό  $0x^2 + 0x + 0$  καί αντίθετο του  $ax^2 + bx + \gamma$  τό  $(-a)x^2 + (-b)x + (-\gamma)$ .

3. Τό σύνολο  $\mathbf{C}$  τών μιγαδικών αριθμών μέ τή γνωστή πρόσθεση καί τήν έξωτερική πράξη, πού όρίζεται από τήν ισότητα

$$\lambda \cdot (\alpha + \beta i) = (\lambda\alpha) + (\lambda\beta)i \quad (\lambda \in \mathbf{R}),$$

είναι ένας πραγματικός γραμμικός χώρος, γιατί ή δομή  $(\mathbf{C}, +)$  είναι αντιμεταθετική όμάδα καί εύκολα μπορεί νά αποδειχτεί ότι ίκανοποιούνται οι ιδιότητες (i) – (iv) του όρισμού.

## 5.2. Βασικές ιδιότητες σέ ένα διανυσματικό χώρο

Έστω  $V$  ένας διανυσματικός χώρος πάνω στό σώμα  $K$ . Μέ τή βοήθεια του όρισμού του διανυσματικού χώρου μπορούμε νά αποδείξουμε τίς παρακάτω ιδιότητες.

**Ίδιότητα 1.** Για κάθε  $\alpha \in K$  ισχύει

$$\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

**Απόδειξη.** Γιά ένα στοιχείο  $x$  του  $V$  ισχύει

$$x + \mathbf{0} = x,$$

όπότε

$$\alpha \cdot (x + \mathbf{0}) = \alpha \cdot x$$

ή λόγω της πρώτης επιμεριστικής ιδιότητας

$$\alpha \cdot x + \alpha \cdot \mathbf{0} = \alpha \cdot x,$$

πού σημαίνει ότι τό  $\alpha \cdot \mathbf{0}$  είναι τό μηδενικό στοιχείο  $\mathbf{0}$  του διανυσματικού χώρου, δηλαδή

$$\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

**Ιδιότητα 2.** Γιά κάθε  $x \in V$  ισχύει

$$\mathbf{0} \cdot x = \mathbf{0}$$

**Απόδειξη.** Γιά ένα στοιχείο  $\alpha$  του  $K$  ισχύει

$$\alpha + \mathbf{0} = \alpha,$$

όπότε

$$(\alpha + \mathbf{0}) \cdot x = \alpha \cdot x$$

ή λόγω της δεύτερης επιμεριστικής ιδιότητας

$$\alpha \cdot x + \mathbf{0} \cdot x = \alpha \cdot x,$$

πού σημαίνει ότι τό  $\mathbf{0} \cdot x$  είναι τό μηδενικό στοιχείο  $\mathbf{0}$  του διανυσματικού χώρου, δηλαδή

$$\mathbf{0} \cdot x = \mathbf{0}.$$

**Ιδιότητα 3.** Γιά  $\alpha \in K$  και  $x \in V$  ισχύει ή συνεπαγωγή

$$\alpha \cdot x = \mathbf{0} \Rightarrow \alpha = \mathbf{0} \text{ ή } x = \mathbf{0}$$

**Απόδειξη.** Αν  $\alpha = \mathbf{0}$ , ή συνεπαγωγή προφανώς ισχύει. Έστω  $\alpha \cdot x = \mathbf{0}$  και  $\alpha \neq \mathbf{0}$ . Τότε, έπειδή τό  $K$  είναι σώμα, υπάρχει τό αντίστροφο  $\alpha^{-1}$  του  $\alpha \neq \mathbf{0}$ . Έτσι έχουμε

$$x = 1 \cdot x = (\alpha^{-1} \cdot \alpha) \cdot x = \alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot x) = \alpha^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

**Πόρισμα.** Γιά  $\alpha \in K$  και  $x \in V$  ισχύει ή συνεπαγωγή

$$\alpha \neq \mathbf{0} \text{ και } x \neq \mathbf{0} \Rightarrow \alpha \cdot x \neq \mathbf{0}$$

**Ιδιότητα 4.** Γιά κάθε  $\alpha \in K$  και  $x \in V$  ισχύει

$$(-\alpha) \cdot x = -(\alpha \cdot x)$$

**Απόδειξη.** Γιά κάθε  $\alpha \in K$  ισχύει

$$\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0},$$

### Π 5.3.

όποτε πολλαπλασιάζοντας και τά δύο μέλη με ένα στοιχείο  $x$  του  $V$  έχουμε

$$(\alpha + (-\alpha)) \cdot x = 0 \cdot x$$

ή

$$\alpha \cdot x + (-\alpha) \cdot x = 0,$$

πού σημαίνει ότι τό  $(-\alpha) \cdot x$  είναι τό αντίθετο του  $\alpha \cdot x$  ως προς τή διανυσματική πρόσθεση, δηλαδή

$$(-\alpha) \cdot x = -(\alpha \cdot x).$$

**Πόρισμα.** Γιά κάθε  $x \in V$  ισχύει

$$\boxed{(-1)x = -x}.$$

Παρατηρήστε ότι τής παραπάνω ιδιότητες τής γνωρίσαμε και στό διανυσματικό λογισμό.

### 5.3. Ἡ έννοια του διανυσματικού (γραμμικού) υπόχωρου

Στό παράδειγμα 1 τής 5.1 είδαμε ότι τό  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  με κατάλληλες πράξεις είναι ένας πραγματικός διανυσματικός χώρος. Ἐς πάρουμε τώρα τό ακόλουθο ὑποσύνολο του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ :

$$A = \{(\alpha, 0) \mid \alpha \in \mathbf{R}\}.$$

Παρατηρούμε ότι

α) ἡ διανυσματική πρόσθεση δύο στοιχείων του  $A$  δίνει ἀποτέλεσμα ένα στοιχείο του  $A$ : πράγματι,

$$(\alpha, 0) + (\beta, 0) = (\alpha + \beta, 0 + 0) = (\alpha + \beta, 0) \in A,$$

β) ὁ πολλαπλασιασμός ενός πραγματικού ἀριθμοῦ με ένα στοιχείο του  $A$  δίνει ἀποτέλεσμα πάλι στοιχείο του  $A$ : πράγματι,

$$\lambda \cdot (\alpha, 0) = (\lambda \cdot \alpha, \lambda \cdot 0) = (\lambda \cdot \alpha, 0) \in A.$$

Γι' αὐτές τής δύο ιδιότητες λέμε ότι τό  $A$  είναι ένας διανυσματικός υπόχωρος του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ .

Ἐν ταυτίσουμε τό  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  με ένα καρτεσιανό ἐπίπεδο, τότε τό παραπάνω σύνολο  $A$  ταυτίζεται με τόν ἄξονα τῶν τετμημένων του καρτεσιανοῦ ἐπιπέδου (Σχ. 11).

Δίνουμε τώρα τόν ακόλουθο ὄρισμό.

Σχ. 11



**Ὅρισμός.** Ἐνα μὴ κενό ὑποσύνολο  $A$  ενός διανυσματικοῦ χώρου  $V$  πάνω στό σώμα  $K$  ὀνομάζεται **διανυσματικός (ἢ γραμμικός) υπόχωρος** του  $V$ , ἂν καί μόνο ἂν γιά κάθε  $x, y \in A$  καί  $\alpha \in K$  ισχύουν

$$x + y \in A \quad \text{καί} \quad \alpha \cdot x \in A.$$

**Παρατήρηση.** Σύμφωνα με τον παραπάνω όρισμό ένας διανυσματικός υπόχωρος  $A$  του  $V$  περιέχει πάντα το μηδενικό στοιχείο  $0$  του  $V$ , γιατί το  $A$  μαζί με ένα στοιχείο του  $x$  θα περιέχει και το  $0 \cdot x = 0$ .

**Σημείωση.** Με τη βοήθεια του προηγούμενου όρισμού αποδεικνύεται εύκολα ότι κάθε διανυσματικός υπόχωρος του  $V$  είναι γραμμικός χώρος πάνω στο  $K$ .


**Παραδείγματα:**

1. Το σύνολο  $B = \{(\alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbf{R}\}$  είναι ένας γραμμικός υπόχωρος του διανυσματικού χώρου  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  (Σχ. 12).

2. "Αν  $V$  είναι ένας διανυσματικός χώρος πάνω στο σώμα  $K$ , τότε το σύνολο

$$\Gamma = \{0\}$$

είναι διανυσματικός υπόχωρος του  $V$ , αφού  $0+0=0 \in \Gamma$  και  $\alpha \cdot 0=0 \in \Gamma$  για όλα τα στοιχεία  $\alpha$  του  $K$ .



Σχ. 12

### 5.4. Γραμμική ανεξαρτησία - Γραμμική εξάρτηση

"Αν  $V$  είναι ένας γραμμικός χώρος πάνω στο σώμα  $K$ , τότε κάθε παράσταση

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n$$

μέ  $\lambda_i \in K$  και  $x_i \in V$  ( $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ) είναι ένα στοιχείο του  $V$ , που ονομάζεται **γραμμικός συνδυασμός** των  $x_1, x_2, \dots, x_n$  και τὰ  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  λέγονται **συντελεστές** του.

"Ας πάρουμε τώρα τὰ στοιχεία  $(1, 0)$  και  $(0, 1)$  του γνωστού μας πραγματικού διανυσματικού χώρου  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . Θα εξετάσουμε σέ ποιά περίπτωση ένας γραμμικός συνδυασμός αυτών των στοιχείων είναι ίσος με τό μηδενικό στοιχείο  $(0, 0)$  του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . "Αν  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbf{R}$ , έχουμε

$$\begin{aligned} \lambda_1(1, 0) + \lambda_2(0, 1) = (0, 0) &\Leftrightarrow (\lambda_1, 0) + (0, \lambda_2) = (0, 0) \Leftrightarrow (\lambda_1, \lambda_2) = (0, 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \text{ και } \lambda_2 = 0. \end{aligned}$$

"Αρα ένας γραμμικός συνδυασμός των  $(1, 0)$  και  $(0, 1)$  είναι ίσος με τό  $(0, 0)$  μόνο στήν περίπτωση:  $\lambda_1 = 0$  και  $\lambda_2 = 0$ . Για τό λόγο αυτό τὰ  $(1, 0)$  και  $(0, 1)$  λέμε ότι είναι **γραμμικώς ανεξάρτητα** στοιχεία του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . "Έτσι έχουμε τόν ακόλουθο όρισμό.

**Όρισμός.** "Έστω  $V$  ένας διανυσματικός χώρος πάνω στο σώμα  $K$ . Τότε τὰ στοιχεία  $x_1, x_2, \dots, x_n$  του  $V$  ονομάζονται **γραμμικώς ανεξάρτητα**, αν και μόνο αν

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

"Αν τὰ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  δέν είναι γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία του  $V$ , τότε αυτά ονομάζονται **γραμμικώς εξαρτημένα**.

## II 5.5.

\*Έτσι, αν τὰ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  είναι γραμμικῶς ἐξαρτημένα στοιχεῖα τοῦ  $V$ , τότε μπορεῖ ἕνας γραμμικός συνδυασμός τους  $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n$  νὰ εἶναι ἴσος μὲ  $\mathbf{0}$  χωρὶς ὅλοι οἱ συντελεστές  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  νὰ εἶναι ἴσοι μὲ  $0$ . \*Ἄς ὑποθέσουμε χάρη εὐκολίας ὅτι  $\lambda_1 \neq 0$ . Τότε ἀπὸ τὴν ἰσότητα  $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = \mathbf{0}$  ἔπεται ὅτι

$$x_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} x_2 - \frac{\lambda_3}{\lambda_1} x_3 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_1} x_n.$$

Ἐπομένως ἔχουμε ἀποδείξει τὴν ἀκόλουθη ιδιότητα.

**Ἰδιότητα.** \*Ἄν τὰ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  εἶναι γραμμικῶς ἐξαρτημένα στοιχεῖα ἑνὸς διανυσματικοῦ χώρου, τότε ἕνα τουλάχιστον ἀπὸ αὐτὰ ἐκφράζεται σάν γραμμικός συνδυασμός τῶν ὑπόλοιπων στοιχείων.

**Παρατήρηση.** \*Ἄν κάποιος ἀπὸ τὰ στοιχεῖα  $x_1, x_2, \dots, x_n$  εἶναι τὸ  $\mathbf{0}$ , π.χ.  $x_1 = \mathbf{0}$ , τότε τὰ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  εἶναι γραμμικῶς ἐξαρτημένα, γιατί γιὰ  $\lambda_1 \neq 0$  ἰσχύει

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = \mathbf{0}.$$

**Παραδείγματα:**

1. Τὰ στοιχεῖα  $(1,1)$  καὶ  $(-1,-1)$  τοῦ  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  εἶναι γραμμικῶς ἐξαρτημένα, γιατί ὁ γραμμικός συνδυασμός τους

$$3 \cdot (1,1) + 3 \cdot (-1,-1)$$

εἶναι ἴσος μὲ τὸ μηδενικό στοιχείο  $(0,0)$  τοῦ  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  καὶ οἱ συντελεστές του εἶναι  $\neq 0$

2. Στὸν πραγματικό γραμμικό χώρο  $V$  ὄλων τῶν τριωνύμων

$$ax^2 + bx + \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R})$$

(πού εἶδαμε στὸ παράδειγμα 2 τῆς 5.1) τὰ  $1x^2 + 0x + 0 \equiv x^2$ ,  $0x^2 + 1x + 0 \equiv x$  καὶ  $0x^2 + 0x + 1 \equiv 1$  εἶναι γραμμικῶς ἀνεξάρτητα στοιχεῖα, γιατί

$$\lambda_1 (x^2) + \lambda_2 (x) + \lambda_3 (1) \equiv 0x^2 + 0x + 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 x^2 + \lambda_2 x + \lambda_3 \equiv 0x^2 + 0x + 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \text{ καὶ } \lambda_2 = 0 \text{ καὶ } \lambda_3 = 0.$$

## 5.5. Βάση καὶ διάσταση ἑνὸς διανυσματικοῦ χώρου

Στὴν 5.4. εἶδαμε ὅτι τὰ  $e_1 = (1,0)$  καὶ  $e_2 = (0,1)$  εἶναι δύο γραμμικῶς ἀνεξάρτητα στοιχεῖα τοῦ  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . \*Ἄς πάρουμε τώρα ἕνα στοιχείο  $(\alpha, \beta)$  τοῦ  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . Τὸ στοιχείο αὐτὸ μπορεῖ νὰ γραφεῖ σάν γραμμικός συνδυασμός τῶν  $e_1$  καὶ  $e_2$  μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο:

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) &= (\alpha + 0, 0 + \beta) = (\alpha, 0) + (0, \beta) = \alpha \cdot (1, 0) + \beta \cdot (0, 1) = \\ &= \alpha \cdot e_1 + \beta \cdot e_2. \end{aligned}$$

\*Ἐτσι βλέπουμε ὅτι κάθε στοιχείο τοῦ  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  μπορεῖ νὰ γραφεῖ σάν γραμμικός συνδυασμός τῶν γραμμικῶς ἀνεξάρτητων στοιχείων  $e_1, e_2$ . Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὰ  $e_1, e_2$  λέμε ὅτι ἀποτελοῦν μιὰ *βάση* τοῦ  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . Δίνουμε τώρα τὸν ἀκόλουθο ὄρισμό.

**Όρισμός.** \*Αν  $V$  είναι ένας διανυσματικός χώρος πάνω στο σώμα  $K$ , τότε η νιάδα  $(b_1, b_2, \dots, b_n)$  από στοιχεία του  $V$  ονομάζεται **βάση του  $V$** , αν και μόνο αν

- (i) τὰ  $b_1, b_2, \dots, b_n$  είναι γραμμικῶς ἀνεξάρτητα στοιχεία,
- (ii) κάθε στοιχείο  $x$  του  $V$  γράφεται σάν γραμμικός συνδυασμός τῶν  $b_1, b_2, \dots, b_n$ , δηλαδή

$$x = \lambda_1 \cdot b_1 + \lambda_2 \cdot b_2 + \dots + \lambda_n \cdot b_n \quad (1)$$

**Παρατήρηση.** Σύμφωνα με τόν ὄρισμό αὐτό, τὰ στοιχεία  $b_1, b_2, \dots, b_n$  είναι ἀρκετά γιά νά «κατασκευάσουν» ὅλα τὰ στοιχεία του  $V$  καί γι' αὐτό ἡ ἔννοια τῆς βάσεως ἑνός διανυσματικοῦ χώρου είναι πολύ σημαντική.

Ἡ γραμμική ἀνεξαρτησία τῶν στοιχείων τῆς βάσεως ἐξασφαλίζει ὅτι ἡ γραφή ἑνός στοιχείου  $x$  του  $V$  μέ τή μορφή (1) είναι μοναδική. Πράγματι, ἄν

$$x = \lambda'_1 b_1 + \lambda'_2 b_2 + \dots + \lambda'_n b_n,$$

τότε λόγω τῆς (1) ἔχουμε

$$\lambda'_1 \cdot b_1 + \lambda'_2 \cdot b_2 + \dots + \lambda'_n \cdot b_n = \lambda_1 \cdot b_1 + \lambda_2 \cdot b_2 + \dots + \lambda_n \cdot b_n$$

$$\lambda'_1 \cdot b_1 + (-\lambda_1) \cdot b_1 + \lambda'_2 \cdot b_2 + (-\lambda_2) \cdot b_2 + \dots + \lambda'_n \cdot b_n + (-\lambda_n) \cdot b_n = 0$$

$$[\lambda'_1 - \lambda_1] \cdot b_1 + [\lambda'_2 - \lambda_2] \cdot b_2 + \dots + [\lambda'_n - \lambda_n] \cdot b_n = 0$$

$$\lambda'_1 - \lambda_1 = \lambda'_2 - \lambda_2 = \dots = \lambda'_n - \lambda_n = 0$$

$$\lambda'_i = \lambda_i \quad , \quad \text{γιά κάθε } i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Οἱ συντελεστές στό δεύτερο μέλος τῆς (1) ονομάζονται συντεταγμένες του  $x$  ὡς πρὸς τή βάση  $(b_1, b_2, \dots, b_n)$  καί γράφονται σάν νιάδα

$$(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

**Παραδείγματα:**

1. Τὰ στοιχεία  $b_1 = (1, 2)$  καί  $b_2 = (-1, 1)$  σχηματίζουν μιὰ βάση  $(b_1, b_2)$  του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . Πράγματι

α) τὰ  $b_1, b_2$  είναι γραμμικῶς ἀνεξάρτητα στοιχεία, γιατί

$$\begin{aligned} \lambda_1 \cdot b_1 + \lambda_2 \cdot b_2 = (0, 0) &\Leftrightarrow \lambda_1 \cdot (1, 2) + \lambda_2 \cdot (-1, 1) = (0, 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\lambda_1, 2\lambda_1) + (-\lambda_2, \lambda_2) = (0, 0) \Leftrightarrow (\lambda_1 - \lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2) = (0, 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \quad \text{καί} \quad 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \quad \text{καί} \quad \lambda_2 = 0, \end{aligned}$$

β) κάθε στοιχείο  $(\alpha, \beta)$  του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  μπορεί νά γραφτεῖ σάν γραμμικός συνδυασμός τῶν  $b_1, b_2$ , γιατί

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) = \lambda_1 \cdot (1, 2) + \lambda_2 \cdot (-1, 1) &\Leftrightarrow (\alpha, \beta) = (\lambda_1 - \lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda_1 - \lambda_2 = \alpha \quad \text{καί} \quad 2\lambda_1 + \lambda_2 = \beta \Leftrightarrow \lambda_1 = \frac{\alpha + \beta}{3} \quad \text{καί} \quad \lambda_2 = \frac{-2\alpha + \beta}{3}. \end{aligned}$$

\*Έτσι οἱ συντεταγμένες του  $(\alpha, \beta)$  ὡς πρὸς τή βάση αὐτή είναι

## II 5.6.

$$\left( \frac{\alpha+\beta}{3}, \frac{-2\alpha+\beta}{3} \right).$$

2. Όπως είδαμε στην αρχή, τα  $e_1 = (1,0)$  και  $e_2 = (0,1)$  σχηματίζουν μία βάση  $(e_1, e_2)$  του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ , ως προς την οποία οι συντεταγμένες ενός στοιχείου  $(\alpha, \beta)$  του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  είναι  $(\alpha, \beta)$ . Για τó λόγο αυτό ή βάση αυτή ονομάζεται **κανονική βάση** του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ .
3. Στο παράδειγμα 2 τής 5.4 είδαμε ότι τα  $x^2, x, 1$  είναι γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία του πραγματικού γραμμικού χώρου

$$V = \{ \alpha x^2 + \beta x + \gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R} \}$$

Έξάλλου κάθε στοιχείο  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  του  $V$  γράφεται σάν γραμμικός συνδυασμός των  $x^2, x, 1$  με συντελεστές  $\alpha, \beta, \gamma$  και επομένως τα  $x^2, x, 1$  σχηματίζουν μία βάση  $(x^2, x, 1)$  του  $V$ , ως προς την οποία οι συντεταγμένες του  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  είναι  $(\alpha, \beta, \gamma)$ .

Από τά παραπάνω παραδείγματα 1 και 2 διαπιστώνουμε ότι τά  $(b_1, b_2)$  και  $(e_1, e_2)$  είναι δύο βάσεις του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . Αποδεικνύεται ότι κάθε άλλη βάση του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  αποτελείται από δύο στοιχεία και γι' αυτό τó λόγο λέμε ότι ή **διάσταση** του γραμμικού χώρου  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  είναι δύο. Γενικά ó γραμμικός χώρος  $\mathbf{R}^n$  έχει διάσταση  $n$  και ή κανονική βάση του αποτελείται από τά διανύσματα

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, 0, 0, \dots, 0, 1).$$

Αποδεικνύεται γενικά ότι, αν ένας διανυσματικός χώρος έχει μία βάση από  $\mu$  στοιχεία, τότε κάθε άλλη βάση του θά έχει  $\mu$  ακριβώς στοιχεία και τόν αριθμό  $\mu$  θά τόν ονομάζουμε **διάσταση**<sup>(1)</sup> αυτού του διανυσματικού χώρου.

Αν  $x_1, x_2, \dots, x_\mu$  είναι γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία ενός διανυσματικού χώρου  $V$  πάνω στό σῶμα  $K$ , τότε τó σύνολο

$$\{ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_\mu x_\mu \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\mu \in K \}$$

όλων τών γραμμικῶν συνδυασμῶν τών  $x_1, x_2, \dots, x_\mu$  είναι προφανῶς ένας γραμμικός ὑπόχωρος  $A$  τοῦ  $V$ . Ὁ  $A$  ονομάζεται **ὑπόχωρος πού γεννιέται από τά  $x_1, x_2, \dots, x_\mu$** . Σύμφωνα με τόν ὄρισμό τής βάσεως τά  $x_1, x_2, \dots, x_\mu$  αποτελοῦν μία βάση τοῦ  $A$  και επομένως ὁ  $A$  είναι ένας διανυσματικός χώρος μέ διάσταση  $\mu$ .

## 5.6. Ἀσκήσεις

1. Νά δείξετε ότι τó σύνολο

$$\mathbf{R}^3 = \{ (x_1, x_2, x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbf{R} \}$$

(μέ ισότητα και πράξεις ὅπως ὀρίστηκαν στό παράδειγμα 1 τής 5.1) είναι ένας πραγματικός διανυσματικός χώρος.

2. Αν  $V$  είναι ένας διανυσματικός χώρος πάνω στό σῶμα  $K$ , νά δείξετε ότι γιά κάθε  $\alpha \in K$  και  $x \in V$  ισχύει

$$\alpha \cdot (-x) = -(\alpha \cdot x)$$

1. Υπάρχουν διανυσματικοί χώροι μέ μή πεπερασμένη διάσταση. Οι έννοιες πού έχουμε αναφέρει στις 5.4 και 5.5 γενικεύονται και γιά τέτοιους χώρους. Η παρουσίαση ὁμων αὐτῶν τῶν ἐνοιῶν ξεφεύγει ἀπό τó σκοπό αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.

3. Νά δείξετε ότι τό σύνολο

$$A = \{(\lambda, 2\lambda) \mid \lambda \in \mathbf{R}\}$$

είναι ένας γραμμικός υπόχωρος του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . Τί διάσταση έχει;

4. Νά δείξετε ότι τό σύνολο

$$A = \{(x,y) \mid (x,y) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R} \text{ μέ } 2x+3y=0\}$$

είναι ένας γραμμικός υπόχωρος του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ . Τί διάσταση έχει;

5. Νά εξετάσετε αν τά  $(2,1)$ ,  $(1,2)$  είναι γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία του  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ .
6. Νά εξετάσετε αν τά  $b_1 = (1,0,1)$ ,  $b_2 = (0,1,1)$ ,  $b_3 = (1,1,1)$  αποτελούν μία βάση του διανυσματικού χώρου της άσκησης 1.
7. Νά δείξετε ότι τά  $z_1 = 1+0i$  και  $z_2 = 0+1i$  αποτελούν μία βάση του διανυσματικού χώρου του παραδείγματος 3 της 5.1. Τί διάσταση έχει ό χώρος αυτός;
8. Έστω  $V$  ένας διανυσματικός χώρος πάνω στό σώμα  $K$ . Αν  $A, B$  είναι δύο διανυσματικοί υπόχωροι του  $V$ , νά δείξετε ότι ή τομή  $A \cap B$  δέν είναι τό κενό σύνολο και μάλιστα είναι διανυσματικός υπόχωρος του  $V$ .

## 6. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Η δομή  $(G, \circ)$  ονομάζεται ήμιομάδα, αν και μόνο αν η πράξη  $\circ$  είναι προσεταιριστική.
2. Η δομή  $(G, \circ)$  ονομάζεται ομάδα, αν και μόνο αν ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:
  - $(O_1)$  Η δομή  $(G, \circ)$  είναι ήμιομάδα.
  - $(O_2)$  Υπάρχει ουδέτερο στοιχείο ως προς την πράξη  $\circ$ .
  - $(O_3)$  Κάθε στοιχείο του  $G$  έχει συμμετρικό στοιχείο ως προς την πράξη  $\circ$ .
3. Η δομή  $(A, +, \cdot)$  ονομάζεται δακτύλιος, αν και μόνο αν ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:
  - $(\Delta_1)$  Η δομή  $(A, +)$  είναι αντιμεταθετική ομάδα.
  - $(\Delta_2)$  Η δομή  $(A, \cdot)$  είναι ήμιομάδα.
  - $(\Delta_3)$  Η πράξη  $\cdot$  είναι επιμεριστική ως προς την πράξη  $+$ .
4. Η δομή  $(A, +, \cdot)$  ονομάζεται σώμα, αν και μόνο αν ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:
  - $(\Sigma_1)$  Η δομή  $(A, +, \cdot)$  είναι ένας μη μηδενικός αντιμεταθετικός δακτύλιος.
  - $(\Sigma_2)$  Η δομή  $(A^*, \cdot)$  είναι ομάδα, όπου  $A^* = A - \{0\}$ .
5. Ένα μη κενό σύνολο  $V$  ονομάζεται διανυσματικός ή γραμμικός χώρος πάνω στο σώμα  $K$ , αν και μόνο αν ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:
  - $(\Gamma_1)$  Στο  $V$  είναι ορισμένη μία έσωτερική πράξη  $+$  τέτοια, ώστε η δομή  $(V, +)$  να είναι αντιμεταθετική ομάδα.
  - $(\Gamma_2)$  Στο  $V$  είναι ορισμένη μία έξωτερική πράξη  $\cdot$  με σύνολο τελεστών τό  $K$  τέτοια, ώστε για κάθε  $x, y \in V$  και  $\alpha, \beta \in K$  να ισχύουν:
    - (i)  $\alpha \cdot (x+y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$ ,
    - (ii)  $(\alpha+\beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$ ,
    - (iii)  $(\alpha \cdot \beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$ ,
    - (iv)  $1 \cdot x = x$ .

7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. \*Αν  $x = (\alpha, \alpha')$  και  $y = (\beta, \beta')$  είναι δύο στοιχεία του συνόλου  $A \cong \mathbf{Z} \times \mathbf{Q}$ , τότε ορίζουμε δύο εσωτερικές πράξεις \* και ο στο  $A$  με τον ακόλουθο τρόπο

$$x * y = (\alpha + \beta, \alpha' \beta') \quad , \quad x \circ y = (\alpha \beta, \alpha' + \beta').$$

Δείξτε ότι

- (i) οι πράξεις αυτές είναι αντιμεταθετικές, προσεταιριστικές και υπάρχει γι' αυτές ουδέτερο στοιχείο στο  $A$ ,
- (ii) τά στοιχεία του  $A$  τής μορφής  $(1, \alpha')$  και  $(-1, \alpha')$  έχουν συμμετρικά στοιχεία ως προς τήν πράξη  $\circ$ ,
- (iii) τά στοιχεία του  $A$  τής μορφής  $(\alpha, \alpha')$  με  $\alpha' \neq 0$  έχουν συμμετρικά στοιχεία ως προς τήν πράξη \*.

2. \*Εστω  $(E, *)$  μιά ημιομάδα, γιά τήν όποια υπάρχει ουδέτερο στοιχείο  $e \in E$ . \*Αν γιά τά στοιχεία  $\alpha, \alpha', \alpha''$  του  $E$  ισχύουν  $\alpha' * \alpha = e$  και  $\alpha'' * \alpha' = e$ , δείξτε ότι  $\alpha = \alpha''$ . Τί συμπεραίνετε γιά τά στοιχεία  $\alpha$  και  $\alpha'$ ;

3. \*Εστω  $(G, \cdot)$  μιά ομάδα. \*Αν γιά κάθε  $\alpha, \beta \in G$  ισχύει

$$(\alpha \cdot \beta)^2 = \alpha^2 \cdot \beta^2,$$

δείξτε ότι ή ομάδα αυτή είναι άβελιανή και γιά κάθε  $n \in \mathbf{N}$  ισχύει  $(\alpha \cdot \beta)^n = \alpha^n \cdot \beta^n$ .

4. Στο σύνολο  $\mathbf{R}$  ορίζουμε τίσ πράξεις  $\circ$  και \* με τόν ακόλουθο τρόπο:

$$\alpha \circ \beta = \alpha + \beta - 1 \quad , \quad \alpha * \beta = \alpha \beta - \alpha - \beta + 2.$$

Δείξτε ότι ή δομή  $(\mathbf{R}, \circ, *)$  είναι σῶμα.

5. Στο  $\mathbf{R}$  ή σχέση

$$x * y = \alpha x + \beta y + \gamma \quad (\alpha, \beta \in \mathbf{R} - \{0\})$$

ορίζει μιά πράξη \*. Νά προσδιορίσετε τά  $\alpha, \beta$ , ὥστε ή πράξη αυτή νά είναι προσεταιριστική. Νά υπολογίσετε τό  $\gamma$  συναρτήσει ενός πραγματικού αριθμού  $e$ , ὥστε ή δομή  $(\mathbf{R}, *)$  νά είναι ομάδα με ουδέτερο στοιχείο τό  $e$  ὡς προς τήν πράξη \*.

6. \*Αν  $n$  είναι σταθερός φυσικός αριθμός, νά δείξετε ότι τό σύνολο

$$A_n = \{z \in \mathbf{C} \mid z^n = 1\}$$

είναι κλειστό ὡς προς τήν πράξη του πολλαπλασιασμοῦ στο  $\mathbf{C}$  και στή συνέχεια ότι ή δομή  $(A_n, \cdot)$  είναι αντιμεταθετική ομάδα.

7. \*Εστω  $(A, \circ)$  μιά ημιομάδα με τίσ ακόλουθες ιδιότητες:

- (i) υπάρχει  $e \in A$  με  $e \circ \alpha = \alpha$  γιά κάθε  $\alpha \in A$ ,
- (ii) γιά κάθε  $\alpha \in A$  υπάρχει  $\alpha' \in A$  με  $\alpha' \circ \alpha = e$ .

Δείξτε ότι ή δομή  $(A, \circ)$  είναι ομάδα.

8. \*Εστω  $(G, \cdot)$  μιά πολλαπλασιαστική άβελιανή ομάδα. \*Αν  $k$  είναι ένα σταθερό στοιχείο του  $G$ , τότε ορίζουμε στο  $G$  τήν πράξη \* με τόν ακόλουθο τρόπο:

$$\alpha * \beta = \alpha \cdot \beta \cdot k.$$

Δείξτε ότι ή δομή  $(G, *)$  είναι άβελιανή ομάδα.

9. \*Εστω  $(A, \cdot)$  μιά πολλαπλασιαστική άβελιανή ομάδα, όπου

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}.$$

- (i) \*Αν  $x$  είναι ένα στοιχείο του  $A$ , δείξτε ότι τό  $A$  περιέχει άκριβῶς τά στοιχεία

$$x \cdot \alpha_1, \quad x \cdot \alpha_2, \quad \dots, \quad x \cdot \alpha_n.$$

## II 7.

(ii) Για κάθε  $x \in A$  ισχύει

$$x^y = 1.$$

- Δείξτε ότι τά  $b_1 = (3, 1, 5)$ ,  $b_2 = (3, 6, 2)$ ,  $b_3 = (-1, 0, 1)$  αποτελούν μία βάση του  $\mathbb{R}^3$ . Ποιές είναι οι συντεταγμένες των  $x = (1, 0, 2)$  και  $y = (2, 0, 5)$  ως προς τη βάση αυτή;
- Σέ ποιά περίπτωση τά  $\alpha + \beta$  και  $\gamma + \delta$  αποτελούν μία βάση του διανυσματικού χώρου του παραδείγματος 3 τής 5.1 ;
- \*Αν τά  $x, y, z$  είναι γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία ενός διανυσματικού χώρου  $V$  πάνω στο σώμα  $K$ , δείξτε ότι και τά  $x + y$ ,  $x - y$ ,  $x - 2y + z$  είναι γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία του  $V$ .
- Γράψτε τό στοιχείο  $(\alpha, \beta, \gamma)$  του πραγματικού διανυσματικού χώρου  $\mathbb{R}^3$  σάν γραμμικό συνδυασμό των  $(1, 1, 1)$ ,  $(1, 1, 0)$  και  $(1, 0, 0)$ .
- Δίνεται τό σύστημα

$$\left. \begin{aligned} x + 4y + 2z &= 0 \\ 2x + y + 5z &= 0 \end{aligned} \right\} (\Sigma)$$

Νά δείξετε ότι τό σύνολο των λύσεων του  $(\Sigma)$  είναι ένας γραμμικός υπόχωρος  $V$  του πραγματικού διανυσματικού χώρου  $\mathbb{R}^3$ . Βρείτε μία βάση του  $V$ .

- \*Εστω  $(A, +, \cdot)$  ένα σώμα. \*Αν  $\alpha, \gamma \in A$  και  $\beta, \delta \in A^*$ , δείξτε τήν Ισοδυναμία

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \alpha\delta = \beta\gamma.$$

- Δείξτε ότι ή δομή  $(M, +, \cdot)$  μέ  $M = \{(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \mid \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Q}\}$  και  
 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) + (\epsilon, \zeta, \eta, \theta) = (\alpha + \epsilon, \beta + \zeta, \gamma + \eta, \delta + \theta)$   
 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \cdot (\epsilon, \zeta, \eta, \theta) = (\alpha\epsilon + \beta\eta, \alpha\zeta + \beta\theta, \gamma\epsilon + \delta\eta, \gamma\zeta + \delta\theta)$   
 είναι δακτύλιος. Ποιά στοιχεία του  $M$  έχουν αντίστροφα στοιχεία;

- Δείξτε ότι

(i) ή δομή  $(\mathbb{Z}_{15}, +, \cdot)$  είναι δακτύλιος,

(ii) τά υποσύνολα  $A = \{\widehat{0}, \widehat{5}, \widehat{10}\}$  και  $B = \{\widehat{0}, \widehat{3}, \widehat{6}, \widehat{9}, \widehat{12}\}$  είναι κλειστά ως προς τίς πράξεις  $+$  και  $\cdot$  στό  $\mathbb{Z}_{15}$ .

- Οι δομές  $(A, +, \cdot)$  και  $(B, +, \cdot)$  είναι άκέραιες περιοχές;

\*Αν  $(G, +)$  είναι ομάδα και  $A$  ένα μή κενό υποσύνολο του  $G$  μέ τήν Ιδιότητα

$$x, y \in A \Rightarrow x - y \in A,$$

δείξτε ότι ή δομή  $(A, +)$  είναι ομάδα.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

- 1, Διαιρετότητα στο σύνολο  $\mathbb{Z}$
2. Άκεραιες λύσεις τής εξίσωσης  $ax+by=c$  ( $a, b, c \in \mathbb{Z}$ )
3. Σύντομη άνακεφαλαίωση
4. Άσκήσεις για επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΣΕ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το παρόν πρόγραμμα σπουδών αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των μαθημάτων που θα διδάσκονται στα πλαίσια του προγράμματος. Η επιλογή των μαθημάτων και η δομή του προγράμματος είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των εμπειρογνομωμάτων των εκπαιδευτικών και των ερευνητών. Η επιλογή των μαθημάτων και η δομή του προγράμματος είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των εμπειρογνομωμάτων των εκπαιδευτικών και των ερευνητών.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ἡ θεωρία τῶν ἀριθμῶν εἶναι ἓνας κλάδος τῶν Μαθηματικῶν, πού ἡ ἱστορία του ἀρχίζει τήν ἐποχή πού τά μυστικά τῶν ἀριθμῶν ἀπασχόλησαν γιά πρώτη φορά τούς ἀνθρώπους.

Γνωστότερος ἀπό τούς ἀρχαίους πού ἀσχολήθηκαν μέ τούς ἀριθμούς εἶναι ὁ Πυθαγόρας (500 π.Χ.). Κατά τούς χρόνους τοῦ Εὐκλείδη (300 π.Χ.) ἡ μελέτη τῶν ἀριθμῶν ἐγινε περισσότερο συστηματική καί ἡ βασική θεωρία τῶν ἀριθμῶν ἀναφέρεται στό ἕνατο βιβλίο τῶν «Στοιχείων» του. Ἀργότερα ὁ Ἐρατοσθένης (230 π.Χ.) ἔδωσε μέθοδο εὐρέσεως πρώτων ἀριθμῶν (κόσκινο τοῦ Ἐρατοσθένη).

Ὁ Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρινός (350 μ.Χ.) στό ἔργο του «Ἀριθμητικά», πού ἀπό τούς 13 τόμους σώζονται μόνο οἱ ἕξι, ἀσχολήθηκε μέ προβλήματα ἐξιώσεων.

Ἡ σύγχρονη θεωρία τῶν ἀριθμῶν ἀρχίζει μέ τίς ἐργασίες τοῦ P. Fermat (1601-1665 μ.Χ.), πού μέ τό φωτεινό μυαλό του πρόσφερε πολλά στή μαθηματική ἐπιστήμη καί ἰδιαίτερα στόν κλάδο τῆς θεωρίας ἀριθμῶν.

Οἱ μεγαλύτεροι μαθηματικοί τῶν τελευταίων αἰώνων ἐκτός τῶν ἄλλων ἀσχολήθηκαν καί μέ τή θεωρία ἀριθμῶν, ὅπως π.χ. ὁ L. Euler (1707-1783), ὁ K. Gauss (1777-1855) κ.ἄ.

### 1. ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ $\mathbf{Z}$ .

Στήν παράγραφο αὐτή θά μελετήσουμε τήν ἔννοια τῆς διαιρετότητας στό σύνολο τῶν ἀκεραίων:

$$\mathbf{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Συχνά θά χρησιμοποιοῦμε καί τά παρακάτω ὑποσύνολα τοῦ  $\mathbf{Z}$ :

τό σύνολο τῶν μὴ μηδενικῶν ἀκεραίων:  $\mathbf{Z}^* = \mathbf{Z} - \{0\}$

τό σύνολο τῶν μὴ ἀρνητικῶν ἀκεραίων:  $\mathbf{Z}_+ = \{x | x \in \mathbf{Z} \text{ μέ } x \geq 0\}$

τό σύνολο τῶν θετικῶν ἀκεραίων:  $\mathbf{Z}_+^* = \{x | x \in \mathbf{Z} \text{ μέ } x > 0\}$

Ἐπιπλέον θά χρησιμοποιήσουμε τό ἀκόλουθο ἀξίωμα.

**Ἀξίωμα.** Κάθε μὴ κενό ὑποσύνολο  $A$  τοῦ συνόλου τῶν θετικῶν ἀκεραίων ἔχει ἐλάχιστο στοιχεῖο, δηλαδή ὑπάρχει στό  $A$  μοναδικό στοιχεῖο, πού εἶναι μικρότερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα στοιχεῖα τοῦ  $A$ .

### III. 1.1.

#### 1.1. Ἡ ἔννοια τῆς διαιρετότητας στὸ $\mathbf{Z}$ .

Ἡ ἐξίσωση  $-3x = 11$  δὲν ἔχει ρίζα στὸ  $\mathbf{Z}$ , γιατί δὲν ὑπάρχει ἀκέραιος πού, ἂν πολλαπλασιασθεῖ μέ τό  $-3$ , νά δίνει γινόμενο 11. Ἡ ἐξίσωση ὁμως  $-3x = 12$  ἔχει ρίζα στὸ σύνολο  $\mathbf{Z}$  τόν ἀκέραιο  $-4$ , γιατί  $-3(-4) = 12$ . Στήν περίπτωση αὐτή λέμε ὅτι ὁ 12 διαιρεῖται μέ τό  $-3$  ἢ ὅτι ὁ  $-3$  διαιρεῖ τό 12.

Δίνουμε τώρα τόν παρακάτω ὄρισμό.

**Ὅρισμός.** \*Ἄν  $\alpha, \beta \in \mathbf{Z}$ , τότε θά λέμε ὅτι ὁ  $\alpha$  διαιρεῖται μέ τό  $\beta$  ἢ ὅτι ὁ  $\beta$  διαιρεῖ τόν  $\alpha$  καί θά γράφουμε  $\beta | \alpha$ , ὅταν καί μόνο ὅταν ὑπάρχει ἀκέραιος  $\gamma$  τέτοιος, ὥστε νά ἰσχύει

$$\alpha = \beta\gamma.$$

Στήν περίπτωση αὐτή θά λέμε ἐπίσης ὅτι

- (i) ὁ  $\alpha$  εἶναι **πολλαπλάσιο** τοῦ  $\beta$  καί
- (ii) ὁ  $\beta$  εἶναι **διαιρέτης** ἢ **παράγοντας** τοῦ  $\alpha$ .

**Παραδείγματα:**

1. Ἐπίσης ἰσότητα  $-35 = 7 \cdot (-5)$  ἔπεται ὅτι  
 $7 | -35$  καί  $-5 | -35$ .

2. Τό σύνολο τῶν πολλαπλασίων τοῦ 5 εἶναι  
 $(5 \cdot \gamma \mid \gamma \in \mathbf{Z})$ ,

δηλαδή

$$\{\dots, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, \dots\}$$

**Παρατηρήσεις**

1. Ἐπειδή γιά κάθε  $\beta \in \mathbf{Z}$  ἰσχύει  $0 = \beta \cdot 0$ , ἔπεται ὅτι:  
κάθε ἀκέραιος διαιρεῖ τό μηδέν.

2. \*Ἄν  $0 | \alpha$ , τότε ὑπάρχει  $\gamma \in \mathbf{Z}$  μέ τήν ιδιότητα  $\alpha = 0 \cdot \gamma$ , δηλαδή  $\alpha = 0$ .  
\*Ἄρα:

τό μηδέν εἶναι διαιρέτης μόνο τοῦ ἑαυτοῦ του.

3. Ἐπίσης ἰσότητες

$$\alpha = (+1) \cdot \alpha \quad \text{καί} \quad \alpha = (-1) \cdot (-\alpha)$$

ἔπεται ὅτι:

κάθε ἀκέραιος  $\alpha$  διαιρεῖται πάντα μέ τοὺς  $\pm 1$  καί  $\pm \alpha$ .

4. \*Ἄν γιά τρεῖς ἀκέραιους  $\alpha, \beta$  καί  $\gamma$  ἰσχύει  $\alpha = \beta\gamma$ , τότε προφανῶς ἰσχύουν καί οἱ σχέσεις

$$-\alpha = \beta(-\gamma), \quad \alpha = (-\beta)(-\gamma) \quad \text{καί} \quad -\alpha = (-\beta)\gamma.$$

\*Ἄρα:

$$\text{ἂν } \beta | \alpha, \text{ τότε } \beta | -\alpha, \quad -\beta | \alpha \quad \text{καί} \quad -\beta | -\alpha.$$

5. Ἐπειδή, λόγω τῆς προηγούμενης παρατηρήσεως, ἰσχύει

$$\beta|\alpha \Leftrightarrow -\beta|\alpha,$$

τό σύνολο τῶν διαιρετῶν τοῦ  $\alpha$  καθορίζεται πλήρως, ὅταν εἶναι γνωστό τό σύνολο τῶν θετικῶν διαιρετῶν του, πού θά τό συμβολίζουμε μέ  $\Delta(\alpha)$ .

6. Ἀπό τήν παρατήρηση 4 συμπεραίνουμε ἐπίσης ὅτι

$$\beta|\alpha \Leftrightarrow \beta|-\alpha,$$

δηλαδή δύο ἀντίθετοι ἀκέραιοι  $\alpha$  καί  $-\alpha$  ἔχουν τοῦς ἴδιους διαιρέτες καί ἐπομένως

$$\Delta(\alpha) = \Delta(-\alpha) = \Delta(|\alpha|).$$

\*Ἔτσι

$$\Delta(-8) = \Delta(8) = \{1, 2, 4, 8\}, \quad \Delta(-9) = \Delta(9) = \{1, 3, 9\} \quad \text{καί}$$

$$\Delta(0) = \{x \mid x \in \mathbf{Z} \text{ μέ } x > 0\} = \mathbf{Z}^{\#}.$$

Στή συνέχεια θά ἀποδείξουμε δύο χρήσιμες προτάσεις.

**Πρόταση 1.** Ἐάν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{Z}$ , τότε ἰσχύουν οἱ ἀκόλουθες ιδιότητες:

(i) Ἐάν  $\alpha|\beta$ , τότε γιά κάθε  $k \in \mathbf{Z}$  ἰσχύει  $\alpha|k\beta$ .

(ii) Ἐάν  $\alpha|\beta$  καί  $\beta|\gamma$ , τότε  $\alpha|\gamma$ .

(iii) Ἐάν  $\alpha|\beta$  καί  $\alpha|\gamma$ , τότε  $\alpha|\beta + \gamma$ .

(iv) Ἐάν  $\alpha|\beta$  καί  $\beta \neq 0$ , τότε  $|\alpha| \leq |\beta|$ .

\*Ἀπόδειξη.

(i) Ἐάν  $\alpha|\beta$ , τότε ὑπάρχει ἀκέραιος  $\lambda$  τέτοιος, ὥστε  $\beta = \alpha \cdot \lambda$  καί ἐπομένως  $k\beta = \alpha(k\lambda)$ , πού σημαίνει ὅτι  $\alpha|k\beta$ .

(ii) Ἐάν  $\alpha|\beta$  καί  $\beta|\gamma$ , τότε ὑπάρχουν ἀκέραιοι  $\mu, \nu$  τέτοιοι, ὥστε

$$\beta = \alpha \cdot \mu \quad \text{καί} \quad \gamma = \beta \cdot \nu,$$

ὁπότε

$$\gamma = \beta \cdot \nu = (\alpha \cdot \mu) \cdot \nu = \alpha(\mu \cdot \nu),$$

δηλαδή  $\alpha|\gamma$ .

(iii) Ἐάν  $\alpha|\beta$  καί  $\alpha|\gamma$ , τότε ὑπάρχουν ἀκέραιοι  $\lambda, \mu$  τέτοιοι, ὥστε

$$\beta = \alpha\lambda \quad \text{καί} \quad \gamma = \alpha\mu,$$

ὁπότε

$$\beta + \gamma = \alpha(\lambda + \mu),$$

πού σημαίνει ὅτι  $\alpha|\beta + \gamma$ .

(iv) Ἐάν  $\alpha|\beta$ , τότε ὑπάρχει ἀκέραιος  $\lambda$  τέτοιος, ὥστε  $\beta = \alpha \cdot \lambda$ . Ἐξάλλου, ἀφοῦ  $\beta \neq 0$ , θά εἶναι  $\lambda \neq 0$  καί ἐπομένως

$$|\lambda| \geq 1.$$

Πολλαπλασιάζοντας καί τά δύο μέλη αὐτῆς τῆς ἀνισότητος μέ  $|\alpha|$  παίρουμε

$$|\alpha\lambda| \geq |\alpha|$$

καί ἄρα  $|\beta| \geq |\alpha|$ .

### ΠΙ. 1.2.

Λόγω τῆς ιδιότητος (iv) τῆς προτάσεως κάθε θετικός διαιρέτης  $x$  τοῦ  $\beta \in \mathbf{Z}^*$  ικανοποιεῖ τὴ σχέση  $1 \leq x \leq |\beta|$ , δηλαδή

$$\boxed{x \in \Delta(\beta) \Rightarrow 1 \leq x \leq |\beta|} \quad (1)$$

Ἀπὸ τὴν (1) καὶ τὴν παρατήρηση 4 ἔχουμε τὸ ἀκόλουθο πόρισμα.

**Πόρισμα 1.** Οἱ μοναδικοὶ διαιρέτες τοῦ 1 εἶναι οἱ  $\pm 1$ .

Ἐξάλλου λόγω τῆς προτάσεως 1 καὶ τῆς παρατηρήσεως 3 ἔχουμε τὸ ἀκόλουθο πόρισμα.

**Πόρισμα 2.** Ἡ σχέση "I" μέσα στό σύνολο τῶν θετικῶν ἀκεραίων εἶναι σχέση μερικῆς διατάξεως (δηλαδή ἀνακλαστική, μεταβατική καὶ ἀντισυμμετρική). Τέλος ἀπὸ τὴν (1) ἔχουμε τὸ ἀκόλουθο πόρισμα.

**Πόρισμα 3.** Τὸ σύνολο τῶν θετικῶν διαιρετῶν ἐνός ἀκεραίου  $\beta \in \mathbf{Z}^*$  εἶναι πεπερασμένο.

**Πρόταση 2.** Ἄν  $\alpha \in \mathbf{Z}$ ,  $\beta \in \mathbf{Z}^*$  καὶ  $\beta | \alpha$ , τότε ὑπάρχει μοναδικὸς ἀκέραιος  $\gamma$  μέ τὴν ιδιότητα  $\alpha = \beta \cdot \gamma$ .

**Ἀπόδειξη.** Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ὑπάρχουν  $\gamma, \gamma_1 \in \mathbf{Z}$  τέτοιοι, ὥστε  
 $\alpha = \beta\gamma$  καὶ  $\alpha = \beta\gamma_1$ .

Τότε λόγω τῆς μεταβατικῆς ιδιότητὸς τῆς ισότητος παίρουμε

$$\beta\gamma = \beta\gamma_1$$

καὶ ἐπομένως  $\gamma = \gamma_1$ , ἀφοῦ  $\beta \neq 0$ .

Ἄν  $\beta \in \mathbf{Z}^*$  καὶ  $\beta | \alpha$ , τότε ἡ πράξη, μέ τὴν ὁποία βρίσκεται ὁ μοναδικὸς (λόγω τῆς προτ. 2) ἀκέραιος  $\gamma$  μέ τὴν ιδιότητα  $\alpha = \beta\gamma$ , εἶναι ἡ γνωστὴ μας τέλεια διαίρεση καὶ ὁ ἀκέραιος  $\gamma$  εἶναι τὸ ἀκέραιο πηλίκο αὐτῆς τῆς διαιρέσεως.

## 1.2. Πρῶτοι καὶ σύνθετοι ἀριθμοί.

Μιά ἀπὸ τίς πιό βασικὲς ἔννοιες στὴ θεωρία ἀριθμῶν εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ *πρώτου ἀριθμοῦ*. Γιά νά κατανοήσουμε τὴν ἔννοια αὐτή, ἄς πάρουμε τὸ σύνολο

$$A = \mathbf{Z} - \{-1, +1\}.$$

Κάθε στοιχεῖο  $\alpha$  τοῦ συνόλου  $A$  ἔχει, λόγω τῆς παρατηρήσεως 3 τῆς 1.1, τουλάχιστον δύο θετικούς διαιρέτες, τοὺς 1 καὶ  $|\alpha|$ . Π.χ.

$$\Delta(3) = \{1, 3\}, \quad \Delta(-4) = \{1, 2, 4\}, \quad \Delta(-5) = \{1, 5\}$$

$$\Delta(6) = \{1, 2, 3, 6\}, \quad \Delta(7) = \{1, 7\}.$$

Παρατηροῦμε ὅτι κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς 3, -5, 7 ἔχει σύνολο θετικῶν διαιρετῶν μέ δύο ἀκριβῶς στοιχεῖα. Τέτοιοι ἀριθμοί, ὅπως οἱ 3, -5 καὶ 7, ὀνομάζονται *πρῶτοι ἀριθμοί*. Ἔτσι ἔχουμε τὸν ἀκόλουθο ὄρισμό.

**Ὅρισμός.** Ἐνας ἀκέραιος  $p \neq 0$  ὀνομάζεται *πρῶτος ἀριθμός*, ὅταν καὶ μόνο ὅταν  $p \neq \pm 1$  καὶ οἱ μοναδικοὶ θετικοὶ διαιρέτες του εἶναι οἱ ἀριθμοί  $|p|$  καὶ 1, δηλαδή  $\Delta(p) = \{1, |p|\}$ .

Κάθε άκέραιος  $\alpha \in \mathbf{Z} - \{-1, +1\}$ , πού δέν είναι πρῶτος άριθμός, ονομάζεται σύνθετος άριθμός.

\*Έτσι κάθε στοιχείο του συνόλου  $A = \mathbf{Z} - \{-1, +1\}$  είναι ή πρῶτος άριθμός ή σύνθετος. Οί άριθμοί  $-1$  και  $+1$  (πού δέν ανήκουν στό  $A$ ) είναι οί μόνοι άκέραιοι, πού τό σύνολο τῶν θετικῶν διαιρετῶν τους είναι μονομελές. (Πόρισμα 1 τῆς 1.1). Μέ βάση τόν προηγούμενο όρισμό οί άριθμοί  $-1$  και  $+1$  οὔτε πρῶτοι άριθμοί είναι οὔτε σύνθετοι.

### Παρατηρήσεις

1. \*Αν  $p$  είναι πρῶτος άριθμός, τότε, άφοῦ  $\Delta(p) = \Delta(-p)$ , θά είναι και ὁ  $-p$  πρῶτος άριθμός.
2. \*Αν  $p_1, p_2$  είναι **θετικοί** πρῶτοι άριθμοί και  $p_1 | p_2$ , τότε, άφοῦ  $\Delta(p_2) = \{1, p_2\}$ , θά είναι  $p_1 = p_2$ .

### Παραδείγματα.

1. \*Ο άκέραιος 2 είναι πρῶτος άριθμός, γιατί  $\Delta(2) = \{1, 2\}$ .
2. \*Ο άκέραιος  $-9$  είναι σύνθετος άριθμός, γιατί  $\Delta(-9) = \{1, 3, 9\}$ .
3. \*Ο άκέραιος 5 είναι πρῶτος άριθμός, γιατί  $\Delta(5) = \{1, 5\}$ .

### 1.3. \*Η έννοια τῆς άλγοριθμικῆς διαιρέσεως.

\*Ας υποθέσουμε ὅτι ἔχουμε τους άκέραιους 32 και 5. Τό 5 δέν είναι διαιρέτης του 32, άφοῦ δέν υπάρχει άκέραιος  $\alpha$  μέ τήν ιδιότητα  $32 = 5 \cdot \alpha$ . \*Ο άκέραιος ὁμως 32 μπορεί νά αναλυθεῖ κατά πολλούς τρόπους σέ άθροισμα ενός πολλαπλασίου του 5 και ενός **θετικοῦ** άκεραίου, ὅπως δείχνουν οί παρακάτω Ισότητες<sup>(1)</sup>:

$$\begin{array}{ll} 32 = 5 \cdot 6 + 2 & 32 = 5 \cdot 2 + 22 \\ 32 = 5 \cdot 5 + 7 & 32 = 5 \cdot 1 + 27 \\ 32 = 5 \cdot 4 + 12 & 32 = 5 \cdot 0 + 32 \\ 32 = 5 \cdot 3 + 17 & 32 = 5 \cdot (-1) + 37 \\ & \dots \dots \dots \end{array}$$

Γράφουμε τώρα τίς προηγούμενες Ισότητες μέ τόν άκόλουθο τρόπο:

$$\begin{array}{ll} 32 - 5 \cdot 6 = 2 & 32 - 5 \cdot 2 = 22 \\ 32 - 5 \cdot 5 = 7 & 32 - 5 \cdot 1 = 27 \\ 32 - 5 \cdot 4 = 12 & 32 - 5 \cdot 0 = 32 \\ 32 - 5 \cdot 3 = 17 & 32 - 5(-1) = 37 \\ & \dots \dots \dots \end{array}$$

Τά δεύτερα μέλη στίς προηγούμενες Ισότητες σχηματίζουν ένα σύνολο από μή άρνητικούς άκεραίους, και ὁ **ελάχιστος** από αὐτούς είναι ὁ άκέραιος 2, πού είναι και ὁ **μοναδικός** πού περιέχεται μεταξύ του 0 και του 5.

Θά άποδείξουμε τώρα ὅτι ή ὕπαρξη και ή μοναδικότητα ενός τέτοιου άριθμοῦ, ὅπως του 2 στό προηγούμενο παράδειγμα, ισχύει γενικά.

1. Σημειώστε ὅτι  $32 \equiv 2 \pmod{5}$ ,  $32 \equiv 7 \pmod{5}$ ,  $32 \equiv 12 \pmod{5}$  κ.τ.λ.

### III. 1.3.

**Θεώρημα.** \*Αν  $\alpha \in \mathbf{Z}$  και  $\beta \in \mathbf{Z}^*$ , τότε υπάρχουν μοναδικοί άκεραίοι  $\pi$  και  $u$  τέτοιοι, ώστε

$$\alpha = \beta\pi + u \quad \text{και} \quad 0 \leq u < |\beta|$$

\*Απόδειξη. Διακρίνουμε τīs ακόλουθες περιπτώσεις:

**I.**  $\alpha \in \mathbf{Z}_+$  και  $\beta > 0$ . \*Ας θεωρήσουμε τó σύνολο  $A$  όλων τών άκεραίων τής μορφής  $\alpha - \beta x$ , όπου  $x$  είναι ένας άκεραίος τέτοιος, ώστε νά ισχύει  $\alpha - \beta x \geq 0$ , δηλαδή

$$A = \{\alpha - \beta x \mid x \in \mathbf{Z} \text{ και } \alpha - \beta x \geq 0\}.$$

Τό σύνολο αυτό δέν είναι τó κενό. Πράγματι, αφού είναι  $\beta \geq 1$ , πολλαπλασιάζοντας και τά δύο μέλη της μέ  $\alpha \in \mathbf{Z}_+$ , βρίσκουμε  $\alpha\beta \geq \alpha$  και έπομένως  $\alpha + \alpha\beta \geq \alpha + \alpha \geq 0$ , δηλαδή  $\alpha + \alpha\beta \geq 0$ . \*Έτσι, αν πάρουμε  $x = -\alpha$ , συμπεραίνουμε ότι ó μή άρνητικός άκεραίος  $\alpha + \alpha\beta$  ανήκει στό σύνολο  $A$ . Σύμφωνα μέ τó άξίωμα τής παραγράφου 1 τó σύνολο  $A$  έχει έλάχιστο στοιχείο, έστω  $u$ . \*Αφού  $u \in A$ , θά υπάρξει άκεραίος  $\pi$  τέτοιος, ώστε νά ισχύει  $\alpha - \beta\pi = u$ . \*Έπομένως

$$\alpha = \beta\pi + u \quad \text{και} \quad 0 \leq u.$$

Θά άποδείξουμε τώρα ότι  $u < \beta$ . \*Ας υποθέσουμε ότι  $u \geq \beta$ . Τότε είναι  $u - \beta \geq 0$  και, έπειδή ισχύει

$$u - \beta = (\alpha - \beta\pi) - \beta = \alpha - (\pi + 1)\beta,$$

συμπεραίνουμε ότι τó  $u - \beta$  ανήκει, στό  $A$ . Αυτό όμως είναι άτοπο, γιατί τó  $u - \beta$  είναι μικρότερο άπό τó  $u$ , ενώ συγχρόνως τó  $u$  είναι τó έλάχιστο στοιχείο του  $A$ . \*Έπομένως  $u < \beta$  και έτσι έχουμε άποδείξει ότι υπάρχουν άκεραίοι  $\pi$  και  $u$  τέτοιοι, ώστε

$$\alpha = \beta\pi + u \quad \text{και} \quad 0 \leq u < \beta \quad (1)$$

Μένει ν' άποδείξουμε ότι οί άκεραίοι  $\pi$  και  $u$  είναι μοναδικοί. \*Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν άκεραίοι  $\pi'$  και  $u'$  τέτοιοι, ώστε  $\alpha = \beta\pi' + u'$  και  $0 \leq u' < \beta$ . Χωρίς νά βλάψουμε τή γενικότητα μπορούμε νά υποθέσουμε ότι  $\pi' \leq \pi$ . \*Έπειδή είναι  $\alpha = \beta\pi + u$ , έχουμε  $\beta\pi + u = \beta\pi' + u'$  ή

$$\beta(\pi - \pi') = u' - u. \quad (2)$$

Προσθέτοντας τώρα κατά μέλη τīs σχέσεις  $0 \leq u$  και  $u' < \beta$  βρίσκουμε  $u' < \beta + u$  ή  $u' - u < \beta$ , όπότε ή (1) γράφεται

$$\beta(\pi - \pi') < \beta$$

ή, αφού  $\beta > 0$ ,

$$\pi - \pi' < 1.$$

\*Έτσι για τόν άκεραίο  $\pi - \pi'$  ισχύουν οί σχέσεις

$$0 \leq \pi - \pi' \quad \text{και} \quad \pi - \pi' < 1$$

και έπομένως  $\pi - \pi' = 0$ , δηλαδή  $\pi = \pi'$ . Τώρα ή (2) δίνει  $u' = u$ . \*Άρα τó θεώρημα ισχύει στην περίπτωση αυτή.

II.  $\alpha < 0$  και  $\beta > 0$ . 'Η απόδειξη στην περίπτωση αυτή γίνεται, όπως στην περίπτωση I, αρκεί νά διαπιστωθεί ότι τό  $\alpha - \beta\alpha$  είναι στοιχείο του συνόλου  $A$ .

III.  $\alpha \in \mathbf{Z}$  και  $\beta < 0$ . Στην περίπτωση αυτή θέτουμε στίς σχέσεις (1) όπου  $\beta$  τό  $|\beta|$ , όποτε παίρνουμε

$$\begin{array}{ll} \alpha = |\beta|\pi + \nu & \text{καί} \quad 0 \leq \nu < |\beta| \\ \eta & \alpha = \beta(-\pi) + \nu \quad \text{καί} \quad 0 \leq \nu < |\beta| \\ \eta & \alpha = \beta\pi' + \nu \quad \text{καί} \quad 0 \leq \nu < |\beta|, \end{array}$$

όπου  $\pi' = -\pi$ .

Σύμφωνα μέ τό προηγούμενο θεώρημα σέ κάθε διατεταγμένο ζεύγος  $(\alpha, \beta)$  του  $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}^*$  αντιστοιχεί μοναδικό διατεταγμένο ζεύγος  $(\pi, \nu)$  του  $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}_+$  τέτοιο, ώστε νά ισχύουν οί σχέσεις  $\alpha = \beta\pi + \nu$  και  $0 \leq \nu < |\beta|$ .

Δηλαδή έχουμε μία πράξη του  $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}^*$  στό  $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}_+$ . 'Η πράξη αυτή ονομάζεται **άλγοριθμική διαίρεση**. Οί αριθμοί  $\alpha$ ,  $\beta (\neq 0)$ ,  $\pi$  και  $\nu$  ονομάζονται αντίστοιχως **διαιρέτος**, **διαιρέτης**, **πηλίκιο** και **υπόλοιπο τής (άλγοριθμικής) διαιρέσεως του  $\alpha$  μέ τό  $\beta$** . 'Η σχέση  $\alpha = \beta\pi + \nu$  (όπου  $0 \leq \nu < |\beta|$ ) ονομάζεται **ισότητα τής (άλγοριθμικής) διαιρέσεως του  $\alpha$  μέ τό  $\beta$** .

**Παρατήρηση.** Είναι φανερό ότι, αν στην ισότητα τής αλγοριθμικής διαιρέσεως του  $\alpha$  μέ τό  $\beta$  είναι  $\nu = 0$ , τότε ό  $\beta$  είναι παράγοντας του  $\alpha$ .

**Παραδείγματα.**

1. 'Η αλγοριθμική διαίρεση του  $-35$  μέ τό 6 δίνει πηλίκιο  $\pi = -6$  και υπόλοιπο  $\nu = 1$ :  
$$-35 = 6(-6) + 1$$
2. 'Η σχέση  $-14 = 4(-5) + 5$  δέν είναι ισότητα τής διαιρέσεως του  $-14$  μέ τό 4 ούτε τής διαιρέσεως του  $-14$  μέ τό  $-5$ , γιατί είναι  $5 > 4$  και  $5 \geq |-5|$ .
3. "Αν  $\alpha \in \mathbf{Z}$ , τότε τά δυνατά υπόλοιπα τής διαιρέσεως του  $\alpha$  μέ τό 5 είναι 0, 1, 2, 3 ή 4, γιατί τό υπόλοιπο  $\nu$  αυτής τής διαιρέσεως ικανοποιεί τή σχέση  $0 \leq \nu < 5$ .

'Η αλγοριθμική διαίρεση ενός άκεραίου μέ τό 2 είναι δυνατό νά δώσει υπόλοιπο 0 ή 1. Είναι γνωστό ότι στην πρώτη περίπτωση ό άκέραιος ονομάζεται **άρτιος**, ενώ στή δεύτερη **περιττός**. "Ετσι ένας άρτιος άκέραιος έχει τή μορφή  $2k$ , ενώ ένας περιττός τή μορφή  $2k + 1$ , όπου  $k \in \mathbf{Z}$ .

Οί άκέραιοι  $-8, 4, -6, 10$  είναι άρτιοι, ενώ οί 5,  $-7, 9, -15$  περιττοί.

'Η αλγοριθμική διαίρεση του 32 μέ τό 12 δίνει υπόλοιπο 8. Παρατηρούμε ότι ό άκέραιος 2, πού είναι κοινός διαιρέτης τών 32 και 12, είναι διαιρέτης και του υπόλοιπου 8 και επιπλέον ό άκέραιος 4, πού είναι κοινός διαιρέτης του 12 και του υπόλοιπου 8, είναι διαιρέτης και του διαιρέτου 32. Οί ιδιότητες αυτές ισχύουν γενικά, όπως δείχνει ή παρακάτω πρόταση.

**Πρόταση 1.** "Αν  $\nu$  είναι τό υπόλοιπο τής αλγοριθμικής διαιρέσεως του  $\alpha$  μέ τό  $\beta$  και  $\delta \in \mathbf{Z}$ , τότε ισχύουν

- (i)  $\delta | \alpha$  και  $\delta | \beta \Rightarrow \delta | \nu$ ,
- (ii)  $\delta | \beta$  και  $\delta | \nu \Rightarrow \delta | \alpha$

### III. 1.4.

**Ἀπόδειξη.** (i) Ἀπό τήν ἰσότητα τῆς ἀλγοριθμικῆς διαιρέσεως τοῦ  $\alpha$  μέ τό  $\beta$  παίρουμε

$$\alpha - \beta\pi = \upsilon \quad (1)$$

Ἀφοῦ  $\delta|\alpha$  καί  $\delta|\beta$ , λόγω τῆς προτάσεως 1 τῆς 1.1 ὁ  $\delta$  εἶναι διαιρέτης τοῦ πρώτου μέλους τῆς (1) καί ἐπομένως  $\delta|\upsilon$ .

(ii) Ἀποδεικνύεται ὁμοία.

**Παρατήρηση.** Στό παράδειγμα πού ἀναφέραμε πρῖν ἀπό τήν πρόταση 1 ὁ ἀκέραιος 8 εἶναι κοινός διαιρέτης τοῦ 32 καί τοῦ ὑπόλοιπου 8, ἀλλά δέν εἶναι διαιρέτης τοῦ 12. Ἐπίσῃ πρόταση 1 δέν ἰσχύει ἡ συνεπαγωγή:

$$\delta|\alpha \text{ καί } \delta|\upsilon \rightarrow \delta|\beta.$$

**Πρόταση 2.** Ἐστω  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$  καί  $\gamma \in \mathbb{Z}^*$ . Τότε οἱ διαιρέσεις τῶν  $\alpha$  καί  $\beta$  μέ τό  $\gamma$  δίνουν τό ἴδιο ὑπόλοιπο, ὅταν καί μόνο ὅταν ἡ διαφορά  $\alpha - \beta$  εἶναι πολλαπλάσιο τοῦ  $\gamma$ .

**Ἀπόδειξη.** Ἄν οἱ διαιρέσεις τῶν  $\alpha$  καί  $\beta$  μέ τό  $\gamma$  δίνουν τό ἴδιο ὑπόλοιπο, τότε ἔχουμε

$$\alpha = \gamma\pi_1 + \upsilon \quad \text{καί} \quad \beta = \gamma\pi_2 + \upsilon \quad (\delta\text{που } 0 \leq \upsilon < |\gamma|),$$

ὁπότε μέ ἀφαίρεση κατά μέλη παίρουμε

$$\alpha - \beta = \gamma(\pi_1 - \pi_2),$$

πού σημαίνει ὅτι τό  $\alpha - \beta$  εἶναι πολλαπλάσιο τοῦ  $\gamma$ , ἀφοῦ  $\pi_1 - \pi_2 \in \mathbb{Z}$ .

Ἀντίστροφα, ἂν εἶναι  $\alpha - \beta = \gamma \cdot \lambda$ , τότε ἔχοντας ὑπόψη τήν ἰσότητα τῆς διαιρέσεως τοῦ  $\beta$  μέ τό  $\gamma$ , δηλαδή τήν

$$\beta = \gamma\pi + \upsilon \quad (\delta\text{που } 0 \leq \upsilon < |\gamma|),$$

βρίσκουμε

$$\alpha - (\gamma\pi + \upsilon) = \gamma \cdot \lambda$$

ἤ

$$\alpha = \gamma(\lambda + \pi) + \upsilon.$$

Ἐπειδή εἶναι  $0 \leq \upsilon < |\gamma|$ , ἡ τελευταία σχέση εἶναι ἡ ἰσότητα τῆς διαιρέσεως τοῦ  $\alpha$  μέ τό  $\gamma$  καί ἐπομένως τό ὑπόλοιπό της εἶναι  $\upsilon$ .

#### 1.4. Ἀσκήσεις.

- Ἄν  $\alpha \equiv \beta \pmod{2}$ , δείξτε ὅτι ὁ ἀκέραιος  $\alpha + \beta$  εἶναι πολλαπλάσιο τοῦ 2.
- Ἄν  $v = 4k + 1$ , ὅπου  $k \in \mathbb{Z}$ , δείξτε ὅτι  $4 | v^3 + 2v + 1$ .
- Ἄν  $\alpha_1 \equiv \alpha_2 \pmod{v}$  καί  $\beta_1 \equiv \beta_2 \pmod{v}$ , δείξτε ὅτι  $\alpha_1 + \beta_1 \equiv \alpha_2 + \beta_2 \pmod{v}$  καί  $\alpha_1\beta_1 \equiv \alpha_2\beta_2 \pmod{v}$ .
- Δείξτε ὅτι τό γινόμενο δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων εἶναι ἄρτιος ἀριθμός καί ἔπειτα ὅτι τό τετράγωνο ἑνός περιττοῦ ἀριθμοῦ εἶναι τῆς μορφῆς  $8k + 1$ , ὅπου  $k \in \mathbb{Z}$ .
- Ἄν  $\alpha, \beta, x$  εἶναι ἀκέραιοι τέτοιοι, ὥστε  $\alpha \equiv \beta \pmod{2}$  καί  $x = \alpha^2 + \beta^2$ , δείξτε ὅτι τό  $\frac{x}{2}$  εἶναι ἄθροισμα τετραγώνων δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν.

6. Δείξτε ότι για κάθε  $\lambda \in \mathbb{Z}$  ο άκεραίος  $\lambda(\lambda^2+2)$  είναι πολλαπλάσιο του 3.
7. \*Αν δύο άκεραίοι δέν είναι πολλαπλάσια του 3, δείξτε ότι τό άθροισμα ή ή διαφορά τους διαιρείται μέ τό 3.
8. \*Αν ένας άκεραίος δέν είναι πολλαπλάσιο του 3, δείξτε ότι τό τετράγωνό του είναι τής μορφής  $3\lambda+1$ , όπου  $\lambda \in \mathbb{Z}$ .
9. \*Αν  $k \in \mathbb{Z}$ , δείξτε ότι  $6 \mid k(k+1)(2k+1)$ .
10. \*Αν ένας άκεραίος  $\alpha$  δέν είναι πολλαπλάσιο του 5, δείξτε ότι ή διαίρεση του  $\alpha^2$  μέ τό 5 δίνει υπόλοιπο 1 ή 4. Στή συνέχεια δείξτε ότι, αν οι άκεραίοι  $x$  καί  $y$  δέν είναι πολλαπλάσια του 5, τότε  $5 \mid x^4 - y^4$ .
11. \*Η διαίρεση ενός άκεραίου  $\alpha$  μέ τό 65 δίνει πηλίκο έναν άρτιό αριθμό  $\lambda$  καί υπόλοιπο  $\lambda^2$ . Προσδιορίστε τούς άκεραίους  $\alpha$ .
12. \*Αν  $n$  είναι φυσικός αριθμός, δείξτε ότι  $9 \mid 2^{4^{n+1}} - 2^{2^n} - 1$ .
13. Δείξτε ότι για κάθε φυσικό αριθμό  $n$  ισχύουν
 

α) $5 \mid 3^{3^{n+2}} + 2^{n+4}$	β) $7 \mid 3^{2^{n+1}} + 2^{n+2}$
γ) $11 \mid 3^{2^{n+2}} + 2^{6^{n+1}}$	δ) $17 \mid 3 \cdot 5^{2^{n-1}} + 2^{3^{n-2}}$
14. \*Αν  $\alpha, \beta, \rho \in \mathbb{Z}$  καί οι άκεραίοι  $\alpha^2 - \beta$  καί  $\beta^2 - \alpha$  είναι πολλαπλάσια του  $\rho$ , δείξτε ότι οι διαιρέσεις των  $\alpha\beta^2 + \alpha^2\beta$  καί  $\alpha^2 + \beta^2$  μέ τό  $\rho$  δίνουν τό ίδιο υπόλοιπο.
15. Βρείτε τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του  $9^{30} + 17^{10}$  μέ τό 8.
16. \*Αν  $r, \lambda$  είναι άκεραίοι μέ  $4r+1 = 3\lambda$ , βρείτε τό γενικό τύπο του  $r$ .

### 1.5. Μέγιστος κοινός διαιρέτης άκεραίων. — Άλγόριθμος του Εύκλειδη.

\*Αν  $\alpha$  καί  $\beta$  είναι δύο άκεραίοι, τότε τό σύνολο  $\Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta)$  περιέχει όλους τούς κοινούς θετικούς διαιρέτες των  $\alpha$  καί  $\beta$ , ένας από τούς όποιους είναι καί ο άκεραίος 1. Στήν περίπτωση πού ένας τουλάχιστον από τούς  $\alpha$  καί  $\beta$  είναι  $\neq 0$ , τό σύνολο  $\Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta)$  είναι πεπερασμένο (Πορ. 3 τής 1.1.) καί επομένως έχει μέγιστο στοιχείο. Τό μέγιστο αυτό στοιχείο του  $\Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta)$  ονομάζεται ο **μέγιστος κοινός διαιρέτης (ΜΚΔ)** των  $\alpha$  καί  $\beta$  καί συμβολίζεται μέ  $(\alpha, \beta)$ .

\*Έτσι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης δύο άκεραίων  $\alpha$  καί  $\beta$  (πού ένας τουλάχιστον είναι  $\neq 0$ ) είναι ο μοναδικός θετικός άκεραίος  $\delta$ , πού ίκανοποιεί τίς ιδιότητες:

- (i)  $\delta \mid \alpha$  καί  $\delta \mid \beta$ ,
- (ii)  $\gamma \mid \alpha$  καί  $\gamma \mid \beta \Rightarrow \gamma \leq \delta$ .

\*Έπειδή τό σύνολο

$$\Delta(0) \cap \Delta(0) = \mathbb{Z}^*$$

δέν έχει μέγιστο στοιχείο, μέγιστος κοινός διαιρέτης των  $\alpha = 0$  καί  $\beta = 0$  δέν όρίζεται. \*Έτσι, όταν στά έπόμενα αναφερόμαστε στό μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο άκεραίων, θά υποθέτουμε ότι ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι  $\neq 0$ .

#### Παραδείγματα.

1. \*Έπειδή  $\Delta(-8) = \{1, 2, 4, 8\}$  καί  $\Delta(20) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ , έχουμε  $\Delta(-8) \cap \Delta(20) = \{1, 2, 4\}$  καί επομένως  $(-8, 20) = 4$ .

### III. 1.5.

2. \*Επειδή ο μόνος κοινός θετικός διαιρέτης των 4 και 9 είναι η μονάδα, έχουμε  $(4,9) = 1$ .

#### Παρατηρήσεις

1. \*Επειδή  $\Delta(\alpha) = \Delta(|\alpha|)$  και  $\Delta(\beta) = \Delta(|\beta|)$  (Παρατ. 6 τής 1.1), έχουμε  
$$\Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta) = \Delta(|\alpha|) \cap \Delta(|\beta|)$$

και επομένως

$$(\alpha, \beta) = (|\alpha|, |\beta|)$$

2. \*Αν  $\alpha \in \mathbb{Z}^*$ , τότε ο  $|\alpha|$  είναι ο μέγιστος διαιρέτης του  $\alpha$  (Προτ. 1 (iv) τής 1.1).

\*Επειδή επιπλέον ισχύει  $\Delta(\alpha) \cap \Delta(0) = \Delta(\alpha)$ , έχουμε

$$(\alpha, 0) = |\alpha|$$

3. \*Αν  $\beta \in \mathbb{Z}^*$  και  $\beta | \alpha$ , τότε, αφού ο μέγιστος διαιρέτης του  $\beta$  είναι ο άκεραίος  $|\beta|$  και  $|\beta| \in \Delta(\alpha)$ , έχουμε  $(\alpha, \beta) = |\beta|$ .

\*Εστω

$$\alpha = \beta\pi + \nu \quad (\delta\text{που } 0 \leq \nu < |\beta|)$$

ή ισότητα τής αλγοριθμικής διαιρέσεως του  $\alpha$  με τό  $\beta (\neq 0)$ .

\*Έχουμε μάθει (Προτ. 1 τής 1.3) ότι κάθε κοινός διαιρέτης των  $\alpha$  και  $\beta$  είναι διαιρέτης του  $\nu$  και κάθε κοινός διαιρέτης των  $\beta$  και  $\nu$  είναι διαιρέτης του  $\alpha$ . \*Επομένως τά σύνολα  $\Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta)$  και  $\Delta(\beta) \cap \Delta(\nu)$  ταυτίζονται, πού σημαίνει ότι  $(\alpha, \beta) = (\beta, \nu)$ . \*Έτσι έχουμε τήν ακόλουθη πρόταση.

**Πρόταση 1.** \*Αν  $\nu$  είναι τό υπόλοιπο τής αλγοριθμικής διαιρέσεως του  $\alpha$  με τό  $\beta (\neq 0)$ , τότε

$$(\alpha, \beta) = (\beta, \nu).$$

Μέ τή βοήθεια τής προηγούμενης προτάσεως θά εξηγήσουμε μία μέθοδο, μέ τήν όποία θά μπορούμε νά υπολογίζουμε τό μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο θετικών άκεραίων. \*Η μέθοδος αυτή όνομάζεται **άλγόριθμος του Εδκλειδή**.

\*Ας δοϋμε πρώτα τή μέθοδο αυτή μέ ένα παράδειγμα.

**Παράδειγμα 3.** Θέλουμε νά υπολογίσουμε τό ΜΚΔ των 306 και 108. Γράφουμε τήν Ισότητα τής αλγοριθμικής διαιρέσεως του 306 με τό 108:

$$306 = 108 \cdot 2 + 90,$$

έπειτα τήν Ισότητα τής διαιρέσεως του 108 με τό 90:

$$108 = 90 \cdot 1 + 18$$

και τέλος τήν Ισότητα τής διαιρέσεως του 90 με τό 18:

$$90 = 18 \cdot 5 + 0.$$

Λόγω τής προηγούμενης προτάσεως έχουμε

$$(306, 108) = (108, 90) = (90, 18) = (18, 0) = 18.$$

\*Ας εξετάσουμε τώρα τή μέθοδο αυτή γενικά. \*Ας υποθέσουμε ότι έχουν δοθεί δύο μή μηδενικοί άκεραίοι  $\alpha$  και  $\beta$  και θέλουμε νά βρούμε τό  $(\alpha, \beta)$ . \*Επειδή  $(\alpha, \beta) = (|\alpha|, |\beta|)$  (Παρατ. 1) μπορούμε νά υποθέσουμε ότι οι  $\alpha, \beta$  είναι θετικοί άκεραίοι.

Γιά τή διαίρεση τοῦ  $\alpha$  μέ τό  $\beta$  ἔχουμε:

$$\alpha = \beta\pi + \nu \quad \text{καί} \quad 0 \leq \nu < \beta.$$

\*Αν εἶναι  $\nu = 0$ , τότε  $\beta | \alpha$ , καί ἐπομένως  $(\alpha, \beta) = \beta$  (Παρατ. 3).

\*Αν εἶναι  $\nu \neq 0$ , τότε γιά τή διαίρεση τοῦ  $\beta$  μέ τό  $\nu$  ἔχουμε:

$$\beta = \nu\pi_1 + \nu_1 \quad \text{καί} \quad 0 \leq \nu_1 < \nu.$$

\*Αν εἶναι  $\nu_1 \neq 0$ , τότε γιά τή διαίρεση τοῦ  $\nu$  μέ τό  $\nu_1$  ὁμοια ἔχουμε:

$$\nu = \nu_1\pi_2 + \nu_2 \quad \text{καί} \quad 0 \leq \nu_2 < \nu_1$$

καί συνεχίζουμε αὐτή τή διαδικασία μέχρι νά βροῦμε ὑπόλοιπο μηδέν· τοῦτο συμβαίνει, γιατί γιά τούς μή ἀρνητικούς ἀκεραίους  $\nu, \nu_1, \nu_2, \dots$  ἰσχύει

$$\beta > \nu > \nu_1 > \nu_2 > \dots$$

καί τό πλήθος τους εἶναι τό πολύ  $\beta$ . \*Ἐστω  $\nu_{v+1} = 0$ . Τότε ἔχουμε τίς ἀκόλουθες ἰσότητες

$$\alpha = \beta\pi + \nu \quad (I_0)$$

$$\beta = \nu\pi_1 + \nu_1 \quad (I_1)$$

$$\nu = \nu_1\pi_2 + \nu_2 \quad (I_2)$$

$$\dots \dots \dots \quad (\dots)$$

$$\nu_{v-2} = \nu_{v-1}\pi_v + \nu_v \quad (I_v)$$

$$\nu_{v-1} = \nu_v\pi_{v+1} + 0 \quad (I_{v+1})$$

Τό τελευταῖο μή μηδενικό ὑπόλοιπο  $\nu_v$  εἶναι ὁ ΜΚΔ τῶν  $\alpha$  καί  $\beta$ , γιατί σύμφωνα μέ τήν πρόταση 1 ἔχουμε

$$(\alpha, \beta) = (\beta, \nu) = (\nu, \nu_1) = \dots = (\nu_{v-2}, \nu_{v-1}) = (\nu_{v-1}, \nu_v) = (\nu_v, 0) = \nu_v$$

\*Αν χρησιμοποιήσει κανεῖς τίς ἰσότητες  $(I_0) - (I_{v+1})$  τοῦ παραπάνω ἀλγόριθμου τοῦ Εὐκλείδη, μπορεῖ νά ἀποδείξει τήν ἀκόλουθη πρόταση.

**Πρόταση 2.** \*Αν δύο ἀκέραιοι διαιρεθοῦν μέ ἕνα θετικό κοινό διαιρέτη τους  $\gamma$ , τότε ὁ μέγιστος κοινός διαιρέτης τους διαισοεῖται μέ τό  $\gamma$ .

**Πόρισμα.** \*Αν  $(\alpha, \beta) = \delta$ , τότε

$$\left( \frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta} \right) = 1.$$

\*Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν ἐκεῖνοι οἱ ἀκέραιοι  $\alpha$  καί  $\beta$ , γιά τούς ὁποίους ἰσχύει  $(\alpha, \beta) = 1$ . Στήν περίπτωση αὐτή ὁ μόνος θετικός κοινός διαιρέτης τῶν  $\alpha$  καί  $\beta$  εἶναι ἡ μονάδα. Δύο ἀκέραιοι, πού ἔχουν μέγιστο κοινό διαιρέτη τή μονάδα, ὀνομάζονται **πρῶτοι μεταξύ τους** ἢ **σχετικῶς πρῶτοι ἀριθμοί**. Π.χ. οἱ ἀκέραιοι 6 καί 5 εἶναι σχετικῶς πρῶτοι ἀριθμοί, γιατί  $(6, 5) = 1$ .

Τό προηγούμενο πόρισμα μπορεῖ τώρα νά διατυπωθεῖ μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο:

**\*Αν δύο ἀκέραιοι ἀριθμοί διαιρεθοῦν μέ τό μέγιστο κοινό διαιρέτη τους, γίνονται σχετικῶς πρῶτοι ἀριθμοί.**

### III. 1.5.

Θά δοῦμε τώρα ὅτι ὁ ΜΚΔ  $\delta$  δύο ἀκεραίων  $\alpha$  καὶ  $\beta$  μπορεῖ νά γραφτεῖ σάν γραμμικός συνδυασμός τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , δηλαδή

$$\delta = \alpha\alpha' + \beta\beta' \quad (1),$$

ὅπου  $\alpha', \beta' \in \mathbf{Z}$ .

\*Ὡς δοῦμε πρῶτα ἓνα παράδειγμα προσδιορισμοῦ ἑνός ζεύγους ἀκεραίων  $\alpha'$  καὶ  $\beta'$ , ὥστε νά ἰκανοποιεῖται ἡ σχέση (1).

**Παράδειγμα 4.** Στό παράδειγμα 3 βρήκαμε ὅτι  $(306, 108) = 18$ . Ὁ ἀλγόριθμος τοῦ Εὐκλείδη ἔδωσε ἐκεῖ τίς ἀκόλουθες ἰσότητες:

$$306 = 108 \cdot 2 + 90, \quad 108 = 90 \cdot 1 + 18, \quad 90 = 18 \cdot 5$$

Ἡ πρώτη ἀπό αὐτές δίνει  $90 = 306 - 108 \cdot 2$ , ὁπότε ἀπό τή δευτέρα βρίσκουμε

$$18 = 108 - 90 \cdot 1 = 108 - (306 - 108 \cdot 2) \cdot 1 = 306 \cdot (-1) + 108 \cdot 3,$$

δηλαδή  $18 = 306(-1) + 108 \cdot 3$ . \*Ἄρα  $\alpha' = -1$  καὶ  $\beta' = 3$ .

\*Ἄν ἐργαστεῖ κανεῖς ὅπως στό προηγούμενο παράδειγμα, μπορεῖ, χρησιμοποιώντας τίς ἰσότητες (I<sub>0</sub>)–(I<sub>v</sub>) τοῦ ἀλγόριθμου τοῦ Εὐκλείδη, νά ἀποδείξει τήν προηγούμενη σχέση (1) γενικά.

Στή συνέχεια ὁμως θά ἀποδείξουμε, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ἀλγόριθμο τοῦ Εὐκλείδη, τήν παρακάτω πρόταση.

**Πρόταση 3.** \*Ἄν  $\delta = (\alpha, \beta)$ , τότε ὑπάρχουν ἀκέραιοι  $\alpha'$  καὶ  $\beta'$  τέτοιοι, ὥστε νά ἰσχύει:

$$\delta = \alpha\alpha' + \beta\beta'$$

καί ὁ  $\delta$  εἶναι ὁ μικρότερος θετικός ἀκέραιος, πού μπορεῖ νά γραφτεῖ σάν γραμμικός συνδυασμός τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ .

\***Ἀπόδειξη.** Θεωροῦμε τό σύνολο  $A$  ὄλων τῶν θετικῶν ἀκεραίων τῆς μορφῆς  $\alpha x + \beta y$  μέ  $x, y \in \mathbf{Z}$ , δηλαδή

$$A = \{\alpha x + \beta y \mid x, y \in \mathbf{Z} \text{ καί } \alpha x + \beta y > 0\}$$

\*Ἄν πάρουμε  $x = \alpha$  καὶ  $y = \beta$ , τότε ἔχουμε  $\alpha x + \beta y = \alpha^2 + \beta^2 > 0$  (ἀφοῦ ἓνας ἀπό τοὺς  $\alpha, \beta$  εἶναι  $\neq 0$ ). \*Ἐτσι τό σύνολο  $A$  εἶναι  $\neq \emptyset$ , ὁπότε σύμφωνα μέ τό ἀξίωμα τῆς παραγράφου 1 ἔχει ἐλάχιστο στοιχεῖο, ἔστω  $\delta'$ . Ἀφοῦ  $\delta' \in A$ , θά ὑπάρχουν ἀκέραιοι  $\alpha'$  καὶ  $\beta'$  τέτοιοι, ὥστε

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' = \delta' \quad (1)$$

Θά ἀποδείξουμε ὅτι ὁ θετικός ἀκέραιος  $\delta'$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $\alpha$ . Σύμφωνα μέ τό θεώρημα τῆς 1.3 ὑπάρχουν ἀκέραιοι  $\pi$  καὶ  $\nu$  τέτοιοι, ὥστε

$$\alpha = \delta'\pi + \nu \quad \text{καί} \quad 0 \leq \nu < \delta'.$$

Τότε ἔχουμε

$$\nu = \alpha - \delta'\pi = \alpha - \pi(\alpha\alpha' + \beta\beta') = \alpha(1 - \pi\alpha') + \beta(-\pi\beta'),$$

δηλαδή

$$\nu = \alpha(1 - \pi\alpha') + \beta(-\pi\beta').$$

"Αν είναι  $u > 0$ , τότε από την τελευταία ισότητα συμπεραίνουμε ότι  $u \in A$ . Άλλά αυτό είναι άτοπο, αφού ισχύει  $u < \delta'$  και τό  $\delta'$  είναι τό ελάχιστο στοιχείο του  $A$ . Έπομένως είναι  $u = 0$  και άρα  $\alpha = \delta'$ , πού σημαίνει ότι  $\delta' | \alpha$ . Μέ όμοιο τρόπο μπορούμε νά άποδείξουμε ότι  $\delta' | \beta$ . Άρα ό  $\delta'$  είναι κοινός διαιρέτης τών  $\alpha$  και  $\beta$ . Αν τώρα  $\gamma$  είναι ένας κοινός διαιρέτης τών  $\alpha$  και  $\beta$ , τότε από την ισότητα (1) και την πρόταση 1 τής 1.1 συμπεραίνουμε ότι ό  $\gamma$  είναι διαιρέτης του  $\delta'$  και έπομένως  $\gamma \leq \delta'$ . Άρα  $\delta' = \delta = (\alpha, \beta)$ .

Στήν άπόδειξη τής προηγούμενης προτάσεως είδαμε ότι κάθε κοινός διαιρέτης τών  $\alpha$  και  $\beta$  είναι επίσης διαιρέτης του  $\delta' = \delta$  και έπομένως.

$$\Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta) \subseteq \Delta(\delta).$$

Άντίστροφα, αν  $x \in \Delta(\delta)$ , τότε  $x | \delta$  και, αφού  $\delta | \alpha$  και  $\delta | \beta$ , λόγω τής μεταβατικής ιδιότητας έχουμε  $x | \alpha$  και  $x | \beta$ , όποτε  $x \in \Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta)$  και άρα  $\Delta(\delta) \subseteq \Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta)$ . Έτσι έχουμε την άκόλουθη πρόταση.

**Πρόταση 4.** "Αν  $\delta = (\alpha, \beta)$ , τότε

$$\Delta(\delta) = \Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta).$$

**Σημείωση.** Άξίζει νά τονίσουμε ότι ή πρόταση 3 δέ δηλώνει ότι οι άκεραίοι  $\alpha'$  και  $\beta'$  είναι μοναδικοί. Στο παράδειγμα 1 είδαμε ότι  $(-8, 20) = 4$ . Η πρόταση 3 έξασφαλίζει ότι υπάρχουν άκεραίοι  $\alpha'$  και  $\beta'$  τέτοιοι, ώστε

$$-8\alpha' + 20\beta' = 4.$$

Είναι εύκολο νά διαπιστώσουμε ότι ή έξίσωση αυτή έπαληθεύεται για  $\alpha' = 2$  και  $\beta' = 1$  ή για  $\alpha' = -3$  και  $\beta' = -1$ . Στήν παράγραφο 2 θά μάθουμε ότι υπάρχουν και άλλα ζεύγη άκεραίων αριθμών, πού έπαληθεύουν την παραπάνω έξίσωση.

Η έννοια του μέγιστου κοινού διαιρέτη γενικεύεται και για περισσότερους από δύο άκεραίους. Έδω θά ενδιαφερούμε μόνο για τό μέγιστο κοινό διαιρέτη τριών άκεραίων. "Αν  $\alpha, \beta, \gamma$  είναι τρεις άκεραίοι, πού ένας τουλάχιστον είναι  $\neq 0$ , τότε τό μέγιστο στοιχείο του (πεπερασμένου) συνόλου  $\Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta) \cap \Delta(\gamma)$  τών κοινών θετικών διαιρέτων τους ονομάζεται ό **μέγιστος κοινός διαιρέτης τών  $\alpha, \beta$  και  $\gamma$**  και συμβολίζεται μέ  $(\alpha, \beta, \gamma)$ . Στήν περίπτωση πού είναι  $(\alpha, \beta, \gamma) = 1$ , οι άκεραίοι  $\alpha, \beta$  και  $\gamma$  θά ονομάζονται επίσης *πρώτοι μεταξύ τους ή σχετικώς πρώτοι αριθμοί*.

"Αν υποθέσουμε ότι ένας από τούς  $\beta, \gamma$  είναι  $\neq 0$  και ονομάσουμε  $\delta$  τό ΜΚΔ τους, δηλαδή  $\delta = (\beta, \gamma)$ , τότε λόγω τής προτάσεως 4 έχουμε

$$\Delta(\alpha) \cap \Delta(\beta) \cap \Delta(\gamma) = \Delta(\alpha) \cap [\Delta(\beta) \cap \Delta(\gamma)] = \Delta(\alpha) \cap \Delta(\delta)$$

και έπομένως

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha, \delta)$$

"Άρα

$$\boxed{(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha, (\beta, \gamma))} \quad (2)$$

"Έτσι έχουμε

### III. 1.6.

$$\begin{aligned}(12, 4, -8) &= (12, (4, -8)) = (12, 4) = 4, \\ (-3, 5, 9) &= (-3, (5, 9)) = (-3, 1) = 1, \\ (-8, 0, 0) &= (0, (-8, 0)) = (0, (-8, 0)) = (0, 8) = 8\end{aligned}$$

Με τή βοήθεια της (2) και της προτάσεως 2 μπορεί να αποδείξει κανείς ότι

$$(\alpha, \beta, \gamma) = \delta \rightarrow \left( \frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta}, \frac{\gamma}{\delta} \right) = 1$$

#### 1.6. Προτάσεις με πρώτους και σχετικῶς πρώτους ἀριθμούς.

Ὁ πρῶτος ἀριθμός 3 δὲ διαιρεῖ τὸ 10. Παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ εἶναι σχετικῶς πρῶτοι, δηλαδὴ  $(3, 10) = 1$ . Ἡ ἰδιότητα αὐτὴ ἰσχύει γενικὰ, ὅπως φαίνεται στὴν παρακάτω πρόταση.

**Πρόταση 1.** Ἐάν  $p$  εἶναι πρῶτος ἀριθμὸς καὶ  $\alpha \in \mathbb{Z}^*$ , τότε ὁ  $p$  δὲ διαιρεῖ τὸν  $\alpha$ , ὅταν καὶ μόνο ὅταν  $(\alpha, p) = 1$ .

**Ἀπόδειξη.** Ἐάν ὁ  $p$  δὲ διαιρεῖ τὸν  $\alpha$ , τότε καὶ ὁ  $|\alpha|$  δὲν διαιρεῖ τὸν  $\alpha$  καὶ ἀφοῦ  $\Delta(p) = \{1, |p|\}$ , ὁ μόνος κοινὸς θετικὸς διαιρέτης τῶν  $\alpha$  καὶ  $p$  εἶναι τὸ 1. Ἄρα  $(\alpha, p) = 1$ . Ἀντιστρόφως, ἂν  $(\alpha, p) = 1$ , τότε ὁ  $p$  δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι διαιρέτης τοῦ  $\alpha$ , γιατί στὴν ἀντίθετη περίπτωση θὰ ἔπρεπε νὰ διαιρεῖ τὸ μέγιστο κοινὸ διαιρέτη τους 1, πού εἶναι ἀτοπο, ἀφοῦ  $p \neq \pm 1$ .

Θὰ ἀποδείξουμε τώρα μιὰ πολὺ χρήσιμη πρόταση, πού σχετίζεται μὲ σχετικῶς πρῶτους ἀριθμούς.

**Πρόταση 2.** Ἐάν  $\alpha, \beta, \kappa \in \mathbb{Z}^*$  μὲ  $(\alpha, \beta) = 1$  καὶ  $\alpha | \beta \kappa$ , τότε  $\alpha | \kappa$ .

**Ἀπόδειξη.** Ἐφοῦ  $(\alpha, \beta) = 1$ , ὑπάρχουν ἀκέραιοι  $\alpha'$  καὶ  $\beta'$  τέτοιοι, ὥστε νὰ ἰσχύει ἡ ἰσότητα

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' = 1,$$

ὅποτε πολλαπλασιάζοντας καὶ τὰ δύο μέλη τῆς μὲ  $\kappa \neq 0$  βρίσκουμε

$$\alpha\kappa\alpha' + \beta\kappa\beta' = \kappa. \quad (1)$$

Ἐφοῦ ὁ  $\alpha$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $\beta\kappa$ , θὰ διαιρεῖ καὶ τοὺς δύο ὄρους τοῦ πρῶτου μέλους τῆς (1) καὶ ἐπομένως  $\alpha | \kappa$ .

**Παράδειγμα.** Ἐάν  $x, y \in \mathbb{Z}$  μὲ  $3x = 8y$ , τότε σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση 2 ἔχουμε  $3 | y$  καὶ  $8 | x$ , ἀφοῦ  $(3, 8) = 1$ .

Μποροῦμε τώρα νὰ ἀποδείξουμε τὴν ἀκόλουθη πρόταση.

**Πρόταση 3.** Ἐάν  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^*$  καὶ ὁ πρῶτος ἀριθμὸς  $p$  διαιρεῖ τὸ γινόμενο  $\alpha \cdot \beta$ , τότε ὁ  $p$  διαιρεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς  $\alpha, \beta$ .

**Ἀπόδειξη.** Ἐς ὑποθέσουμε ὅτι ὁ  $p$  δὲ διαιρεῖ τὸν  $\alpha$ . Τότε σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση 1 ἔχουμε  $(\alpha, p) = 1$  καὶ ἐπομένως λόγω τῆς προτάσεως 2 ὁ  $p$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $\beta$ .

Μέ τή μέθοδο τής τελείας έπαγωγής μπορεί νά άποδειχτεί τό άκόλουθο πόρισμα.

**Πόρισμα.** \*Αν  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{Z}^*$  καί ό πρώτος άριθμός  $p$  διαιρεί τό γινόμενο  $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \dots \alpha_n$ , τότε διαιρεί έναν άπό τούς  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ .

**Παρατήρηση.** \*Η πρόταση 3 δέν άληθεύει κατ' άνάγκη, όταν ό  $p$  δέν είναι πρώτος άριθμός. Π.χ. ό 8 διαιρεί τό γινόμενο 4.6, άλλά κανέναν άπό τούς 4 καί 6 δέ διαιρεί.

### 1.7. Έλάχιστο κοινό πολλαπλάσιο άκεραίων.

\*Ας συμβολίσουμε μέ  $\Pi(\alpha)$  τό σύνολο τών θετικών πολλαπλασίων ένός άκεραίου  $\alpha$ . Τότε  $\Pi(0) = \emptyset$  καί

$$\Pi(\alpha) = \Pi(-\alpha) = \Pi(|\alpha|),$$

γιατί δύο αντίθετοι άριθμοί έχουν τά ίδια πολλαπλάσια.

\*Αν δοθούν δύο άκεραίοι  $\alpha$  καί  $\beta$  μέ  $\alpha \cdot \beta \neq 0$ , τότε τό σύνολο  $\Pi(\alpha) \cap \Pi(\beta)$  τών κοινών θετικών πολλαπλασίων τών  $\alpha$  καί  $\beta$  δέν είναι τό κενό, γιατί περιέχει τό στοιχείο  $|\alpha| \cdot |\beta|$ . \*Επομένως τό σύνολο  $\Pi(\alpha) \cap \Pi(\beta)$  έχει έλάχιστο στοιχείο, τό όποιο ονομάζεται τό **έλάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ΕΚΠ)** τών  $\alpha$  καί  $\beta$  καί συμβολίζεται μέ  $[\alpha, \beta]$ .

\*Ετσι τό έλάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δύο άκεραίων  $\alpha$  καί  $\beta$  μέ  $\alpha \cdot \beta \neq 0$  είναι ό μοναδικός θετικός άκέραιος  $\epsilon$ , πού ίκανοποιεί τίς ιδιότητες:

(i)  $\alpha | \epsilon$  καί  $\beta | \epsilon$ ,

(ii) άν  $\alpha | \gamma$ ,  $\beta | \gamma$  καί  $\gamma \in \mathbb{Z}^*$ , τότε  $\epsilon \leq \gamma$ .

#### Παραδείγματα.

1. \*Επειδή

$$\Pi(3) = \{3, 6, 9, \underline{12}, \dots, 3\lambda, \dots\} \text{ καί}$$

$$\Pi(4) = \{4, 8, \underline{12}, \dots, 4\lambda, \dots\},$$

έχουμε  $[3, 4] = 12$

2. \*Όμοια βρίσκουμε ότι

$$[4, -10] = 20, \quad [5, 10] = 10 \quad \text{καί} \quad [-3, 4] = 12$$

#### Παρατηρήσεις

1. \*Επειδή ισχύει  $\Pi(\alpha) \cap \Pi(\beta) = \Pi(|\alpha|) \cap \Pi(|\beta|)$ , έχουμε

$$[\alpha, \beta] = [|\alpha|, |\beta|] \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^*).$$

2. \*Αν  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^*$  καί  $\beta | \alpha$ , τότε, άφού τό έλάχιστο θετικό πολλαπλάσιο του  $\alpha$  είναι τό  $|\alpha|$  καί επιπλέον  $|\alpha| \in \Pi(\beta)$ , έχουμε  $[\alpha, \beta] = |\alpha|$ .

Θά εξετάσουμε τώρα αναλυτικά τή μορφή, πού έχουν τά κοινά θετικά πολλαπλάσια δύο άκεραίων  $\alpha$  καί  $\beta$  μέ  $\alpha \cdot \beta \neq 0$ . Για τό σκοπό αυτό ός πάρουμε ένα κοινό θετικό πολλαπλάσιο  $\mu$  τών  $\alpha$  καί  $\beta$ . \*Αφού  $|\alpha| | \mu$ , ύπάρχει θετικός άκέραιος  $\lambda$  μέ τήν ιδιότητα

### III. 1.7.

$$\mu = |\alpha| \cdot \lambda \quad (1)$$

Εξάλλου, επειδή  $|\beta| \mid \mu$ , ο αριθμός

$$\frac{\mu}{|\beta|} = \frac{|\alpha| \lambda}{|\beta|} \quad (2)$$

είναι ένας θετικός άκεραίος. Αν θέσουμε τώρα  $(\alpha, \beta) = (|\alpha|, |\beta|) = \delta$ , τότε υπάρχουν θετικοί άκεραίοι  $\alpha_1$  και  $\beta_1$  τέτοιοι, ώστε  $|\alpha| = \alpha_1 \delta$ ,  $|\beta| = \beta_1 \delta$  και  $(\alpha_1, \beta_1) = 1$ . Τότε λόγω της (2) έχουμε

$$\frac{\mu}{|\beta|} = \frac{\alpha_1 \lambda}{\beta_1}$$

Επειδή ο  $\frac{\mu}{|\beta|}$  είναι άκεραίος, από την τελευταία ισότητα συμπεραίνουμε ότι ο  $\beta_1$  είναι διαιρέτης του  $\alpha_1 \lambda$  και, αφού  $(\alpha_1, \beta_1) = 1$ , ο  $\beta_1$  είναι διαιρέτης του  $\lambda$  (προτ. 2 της 1.6). Επομένως υπάρχει θετικός άκεραίος  $\kappa$  τέτοιος, ώστε

$$\lambda = \beta_1 \cdot \kappa = \frac{|\beta|}{\delta} \kappa$$

Έτσι λόγω της (1) το κοινό θετικό πολλαπλάσιο  $\mu$  των  $\alpha$  και  $\beta$  έχει τη μορφή

$$\mu = \frac{|\alpha| |\beta|}{\delta} \kappa, \quad (3)$$

όπου  $\kappa$  θετικός άκεραίος. Αντιστρόφως, κάθε άκεραίος της μορφής  $\frac{|\alpha| |\beta|}{\delta} \kappa$  με  $\kappa$  θετικό άκεραίο είναι φανερό ότι είναι ένα κοινό θετικό πολλαπλάσιο των  $\alpha$  και  $\beta$ . Άρα.

$$\Pi(\alpha) \cap \Pi(\beta) = \left\{ \frac{|\alpha| |\beta|}{\delta} \kappa \mid \kappa \text{ θετικός άκεραίος} \right\}.$$

Τό ελάχιστο στοιχείο αυτού του συνόλου προκύπτει για  $\kappa = 1$  και είναι τό

$$\varepsilon = \frac{|\alpha| |\beta|}{\delta}$$

Από την (3) συμπεραίνουμε τώρα ότι ένα κοινό πολλαπλάσιο  $\mu$  των  $\alpha$  και  $\beta$  έχει τη μορφή:

$$\mu = \varepsilon \cdot \kappa \quad (\text{όπου } \kappa \text{ θετικός άκεραίος}),$$

Έτσι έχουμε αποδείξει τις ακόλουθες δύο προτάσεις.

**Πρόταση 1.** Αν  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^*$  και  $[\alpha, \beta] = \varepsilon$ , τότε

$$\Pi(\varepsilon) = \Pi(\alpha) \cap \Pi(\beta),$$

δηλαδή τό σύνολο τών κοινών θετικών πολλαπλασίων τών  $\alpha$  και  $\beta$  ταυτίζεται μέ τό σύνολο τών θετικών πολλαπλασίων του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου τους.

**Πρόταση 2.** Τό ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ε δύο άκεραίων α και β με  $\alpha\beta \neq 0$  δίνεται από τον τύπο

$$[\alpha, \beta] = \frac{|\alpha| |\beta|}{(\alpha, \beta)}$$

**Πόρισμα** 'Ισχύει:  $(\alpha, \beta) = 1 \Rightarrow [\alpha, \beta] = |\alpha| |\beta|$ .

Λόγω τής προτάσεως 2 έχουμε:

$$[12, 8] = \frac{12 \cdot 8}{(12, 8)} = \frac{12 \cdot 8}{4} = 24,$$

$$[-36, 14] = \frac{|-36| \cdot 14}{(-36, 14)} = \frac{36 \cdot 14}{2} = 252.$$

Ἡ έννοια τοῦ ελάχιστου κοινοῦ πολλαπλασίου γενικεύεται καί γιά περισσότερους ἀπό δύο άκεραίους. Ἐδῶ θά ένδιαφεροῦμε μόνο γιά τό ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο τριῶν άκεραίων. \*Αν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$  με  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \neq 0$ , τότε τό ελάχιστο στοιχείο τοῦ συνόλου  $\Pi(\alpha) \cap \Pi(\beta) \cap \Pi(\gamma)$  (πού είναι  $\neq \emptyset$ , άφού περιέχει τό  $|\alpha| |\beta| |\gamma|$ ) τῶν κοινῶν θετικῶν πολλαπλασίων τους ονομάζεται τό **ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο** ἄ, β καί γ καί συμβολίζεται με  $[\alpha, \beta, \gamma]$ .

\*Αν  $\epsilon = (\alpha, \beta)$ , τότε λόγω τής προτάσεως 1 ἔχουμε

$$\Pi(\alpha) \cap \Pi(\beta) \cap \Pi(\gamma) = (\Pi(\alpha) \cap \Pi(\beta)) \cap \Pi(\gamma) = \Pi(\epsilon) \cap \Pi(\gamma)$$

καί έπομένως

$$[\alpha, \beta, \gamma] = [\epsilon, \gamma].$$

\*Αρα

$$[\alpha, \beta, \gamma] = [[\alpha, \beta], \gamma] \quad (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \neq 0).$$

\*Έτσι ἔχουμε

$$[3, 4, 5] = [[3, 4], 5] = [12, 5] = 60.$$

### 1.8. Ἀνάλυση θετικῶν<sup>(1)</sup> άκεραίων σε γινόμενο θετικῶν πρώτων παραγόντων.

Ἡ ανάλυση ενός θετικοῦ άκεραίου σε γινόμενο θετικῶν πρώτων παραγόντων στηρίζεται στήν άκόλουθη πρόταση.

**Πρόταση 1.** Κάθε θετικός άκέραιος  $\neq 1$  ἔχει διαιρέτη ένα πρώτο άριθμό.

**Ἀπόδειξη.** Ἐστω  $\alpha \in \mathbb{Z}^*$  με  $\alpha > 1$ . Τότε τό σύνολο Α τῶν θετικῶν διαιρετῶν τοῦ α, πού είναι  $\neq 1$ , δέν είναι τό κενό, γιατί  $\alpha \in A$ . Ἐπομένως τό Α θά ἔχει ελάχιστο στοιχείο, ἔστω ρ. Ἀς υποθέσουμε ὅτι ὁ ρ είναι σύνθετος άριθμός. Τότε ὁ ρ θά ἔχει διαιρέτη ένα θετικό άκέραιο β, διαφορετικό ἀπό 1 καί ρ. Ἀφού

1. Μιά ανάλυση άρνητικοῦ άκεραίου σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ανάγεται στήν ανάλυση τοῦ αντίθετου του σε γινόμενο θετικῶν πρώτων παραγόντων.

### III. 1.8.

$\beta | \rho$  και  $\rho | \alpha$ , έχουμε  $\beta | \alpha$  και επομένως  $\beta \in A$ . Αυτό όμως είναι άτοπο, γιατί είναι  $\beta < \rho$  και τότε  $\rho$  είναι το ελάχιστο στοιχείο του  $A$ . Άρα ο  $\rho$  είναι πρώτος αριθμός.

**Παρατήρηση.** Από την απόδειξη της προηγούμενης προτάσεως είναι φανερό ότι ο μικρότερος από τους θετικούς διαιρέτες του  $\alpha$ , που είναι μεγαλύτεροι από τη μονάδα, είναι πρώτος αριθμός.

Γενικά, ένας θετικός άκεραιος ( $\neq 1$ ) μπορεί να γραφτεί σαν γινόμενο θετικών παραγόντων κατά διάφορους τρόπους. Π.χ.

$$60 = 10 \cdot 6 = 12 \cdot 5.$$

Συχνά κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς μπορεί να γραφτεί σαν γινόμενο θετικών παραγόντων και αυτό μπορεί να συνεχιστεί, ώσπου όλοι οι παράγοντες να είναι πρώτοι αριθμοί. Έτσι

$$60 = 10 \cdot 6 = (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 3) = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3$$

$$60 = 12 \cdot 5 = (6 \cdot 2) \cdot 5 = (3 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 5 = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5.$$

Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις οι (θετικοί) πρώτοι παράγοντες του 60 είναι ίδιοι. Η ιδιότητα αυτή ισχύει γενικά και εκφράζεται με ένα πολύ σπουδαίο θεώρημα, που ονομάζεται *θεμελιώδες θεώρημα της Αριθμητικής*.

**Θεώρημα.** Κάθε σύνθετος θετικός αριθμός αναλύεται σε γινόμενο θετικών πρώτων αριθμών κατά μοναδικό τρόπο.

**Απόδειξη.** Έστω  $\alpha$  ένας θετικός σύνθετος αριθμός. Αν  $p_1$  είναι ο μικρότερος θετικός πρώτος διαιρέτης του (Πρόταση 1), τότε έχουμε

$$\alpha = p_1 \cdot \alpha_1, \quad \alpha_1 < \alpha$$

Αν ο  $\alpha_1$  είναι πρώτος αριθμός, τότε ο  $\alpha$  έχει αναλυθεί σε γινόμενο θετικών πρώτων αριθμών. Αν ο  $\alpha_1$  είναι σύνθετος και ονομάσουμε  $p_2$  το μικρότερο θετικό πρώτο διαιρέτη του, τότε έχουμε

$$\alpha_1 = p_2 \cdot \alpha_2, \quad \alpha_2 < \alpha_1.$$

Αν ο  $\alpha_2$  είναι πρώτος, τότε ο  $\alpha$  έχει αναλυθεί σε γινόμενο θετικών πρώτων αριθμών:  $\alpha = p_1 \cdot p_2 \cdot \alpha_2$ . Αν ο  $\alpha_2$  είναι σύνθετος, επαναλαμβάνουμε την ίδια εργασία, μέχρι να φθάσουμε σε κάποιον πρώτο αριθμό  $p_v$ , οπότε  $\alpha_{v-1} = p_v$ .

Πολλαπλασιάζοντας όλες αυτές τις ισότητες και απλοποιώντας παίρνουμε την παρακάτω ανάλυση του  $\alpha$  σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

$$\alpha = p_1 p_2 \cdots p_v.$$

(ii) Άς υποθέσουμε ότι υπάρχει μία δεύτερη ανάλυση του ίδιου άκεραίου  $\alpha$ , σε γινόμενο θετικών πρώτων παραγόντων:  $\alpha = q_1 \cdot q_2 \cdots q_m$ .

Τότε έχουμε

$$p_1 p_2 \cdots p_v = q_1 \cdot q_2 \cdots q_m \quad (1)$$

Τό πρώτο μέλος της (1) διαιρείται με τό  $q_1$ , οπότε σύμφωνα με τό πόρισμα της 1·6 τουλάχιστον ένας από τους παράγοντες του πρώτου μέλους της (1)

πρέπει να διαιρείται με τό  $q_1$ . \*Εστω  $q_1|p_1$ . Τότε σύμφωνα με την παρατήρηση 2 τής 1.2 είναι  $q_1 = p_1$ . \*Αν διαιρέσουμε και τὰ δύο μέλη τής (1) με  $q_1$ , παίρνουμε τήν ισότητα

$$p_2 p_3 \dots p_v = q_2 q_3 \dots q_\mu \quad (2)$$

\*Αν έργαστοῦμε ὁμοια καί στήν (2), βρίσκουμε  $p_3 \cdot p_4 \dots p_v = q_3 \cdot q_4 \dots q_\mu$  κτλ, ὥσπου τελικά νά βροῦμε ὅτι ὅλοι οἱ παράγοντες τοῦ ἑνὸς μέλους, π.χ. τοῦ πρώτου, ἔχουν ἀπλοποιηθεῖ, ὁπότε θά εἶναι  $v < \mu$ . \*Αλλά τότε πρέπει καί οἱ παράγοντες τοῦ δεύτερου μέλους νά ἔχουν ἀπλοποιηθεῖ, γιατί ἄλλιῶς θά εἶχαμε τήν ισότητα

$$1 = q_{v+1} q_{v+2} \dots q_\mu,$$

πού γιά θετικούς πρώτους ἀριθμούς δέν μπορεῖ νά ἰσχύει.

\*Αρα ἡ δεύτερη ἀνάλυση σέ γινόμενο πρώτων παραγόντων ταυτίζεται με τήν πρώτη.

\*Άμεσες συνέπειες τοῦ παραπάνω θεωρήματος εἶναι τὰ ἀκόλουθα πορίσματα.

**Πόρισμα 1.** Κάθε θετικός ἀκέραιος  $v \neq 1$  γράφεται κατὰ μοναδικό τρόπο ὡς ἐξῆς:

$$v = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k},$$

ὅπου  $p_1, p_2, \dots, p_k$  εἶναι θετικοί πρώτοι ἀριθμοί διαφορετικοί μεταξύ τους καί  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  εἶναι φυσικοί ἀριθμοί.

**Παραδείγματα:**

1. \*Ἡ ἀνάλυση τοῦ 720 σέ γινόμενο θετικῶν πρώτων παραγόντων εἶναι:

$$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$$

2. \*Ἡ ἀνάλυση τοῦ 2400 εἶναι

$$2400 = 2^5 \cdot 3 \cdot 5^2.$$

**Πόρισμα 2.** Κάθε διαιρέτης τοῦ ἀκεραίου

$$v = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$

εἶναι τής μορφῆς

$$p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k}, \quad \text{ὅπου } 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

καί ἀντιστρόφως.

Μποροῦμε τώρα νά χρησιμοποιήσουμε τὰ προηγούμενα, γιά νά πάρουμε μιά δεύτερη μέθοδο εὑρέσεως τοῦ Μ.Κ.Δ. (θετικῶν ἀκεραίων).

**Πρόταση 2.** \*Αν  $\alpha$  καί  $\beta$  εἶναι θετικοί ἀκέραιοι  $\neq 1$  τέτοιοι, ὥστε

$$\alpha = p_1^{\nu_1} \cdot p_2^{\nu_2} \dots p_\lambda^{\nu_\lambda}$$

$$\beta = p_1^{\mu_1} p_2^{\mu_2} \dots p_\lambda^{\mu_\lambda},$$

ὅπου  $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_\lambda$  καί  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_\lambda$  μή ἀρνητικοί ἀκέραιοι, τότε

$$(\alpha, \beta) = p_1^{\kappa_1} p_2^{\kappa_2} \dots p_\lambda^{\kappa_\lambda},$$

### III. 1.9.

όπου  $\kappa_i = \min(v_i, \mu_i)$  για κάθε  $i \in \{1, 2, \dots, \lambda\}$

**Ἀποδείξη.** Θά αποδείξουμε ότι ἡ παράσταση  $p_1^{\kappa_1} p_2^{\kappa_2} \dots p_\lambda^{\kappa_\lambda} = A$  ἱκανοποιεῖ τὶς ιδιότητες τοῦ Μ.Κ.Δ.

(1) Ἐπειδὴ  $\kappa_i \leq v_i$  για κάθε  $i \in \{1, 2, \dots, \lambda\}$ , ἔπεται ὅτι τὸ  $A$  διαιρεῖ τὸ  $\alpha$ .

Ἐπειδὴ  $\kappa_i \leq \mu_i$  για κάθε  $i \in \{1, 2, \dots, \lambda\}$ , τὸ  $A$  διαιρεῖ καὶ τὸ  $\beta$ .

(2) Ἄν  $\gamma$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $\alpha$ , πρέπει σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα 2 νὰ γράφεται ὡς ἀκολούθως

$$\gamma = p_1^{\rho_1} p_2^{\rho_2} \dots p_\lambda^{\rho_\lambda},$$

όπου  $0 \leq \rho_i \leq v_i$  για κάθε  $i \in \{1, 2, \dots, \lambda\}$ . Ἄν τὸ  $\gamma$  εἶναι καὶ διαιρέτης τοῦ  $\beta$ , ἐπίσης ἔχουμε  $0 \leq \rho_i \leq \mu_i$  για κάθε  $i \in \{1, 2, \dots, \lambda\}$ .

Ἄρα  $0 \leq \rho_i \leq \min(v_i, \mu_i) = \kappa_i$  καὶ ἐπομένως τὸ  $\gamma$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $A$ .

Ἄρα  $(\alpha, \beta) = A$ .

**Παράδειγμα.** Ὁ ΜΚΔ τῶν ἀκεραίων

$$72 = 2^3 \cdot 3^2$$

$$270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$$

εἶναι:  $(72, 270) = 2 \cdot 3^2$ . Ἐπειδὴ  $[72, 270] = \frac{72 \cdot 270}{(72, 270)}$ , ἔχουμε

$$[72, 270] = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$$

### 1.9. Ἀσκήσεις

- Βρεῖτε τὸ ΜΚΔ τῶν 27 καὶ 20 καὶ ἔπειτα προσδιορίστε ἀκεραίους  $x$  καὶ  $y$  τέτοιους, ὥστε  $(27, 20) = 27x + 20y$ .
- Οἱ διαιρέσεις τῶν 253 καὶ 525 μὲ ἓνα θετικὸ ἀκέραιο  $\alpha$  δίνουν ὑπόλοιπο 15. Ποιές εἶναι οἱ δυνατές τιμές τοῦ  $\alpha$ ;
- Μὲ ποῖο θετικὸ ἀκέραιο πρέπει νὰ διαιρεθοῦν οἱ 1268 καὶ 1802 γιὰ νὰ πάρουμε ἀντίστοιχα ὑπόλοιπα 8 καὶ 17;
- Κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀλγόριθμου τοῦ Εὐκλείδη γιὰ τὸν ὑπολογισμό τοῦ ΜΚΔ δύο θετικῶν ἀκεραίων  $\alpha$  καὶ  $\beta$  βρισκόμε διαδοχικὰ πηλικά 1, 2, 1, 20 καὶ 4. Βρεῖτε τοὺς  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , ἂν εἶναι γνωστὸ ὅτι  $(\alpha, \beta) = 4$ .
- Ποιοὶ θετικοὶ ἀκεραῖοι  $\alpha, \beta$  ἔχουν ἀθροισμα 233 καὶ ΜΚΔ 24;
- Βρεῖτε τὸ ΜΚΔ καὶ τὸ ΕΚΠ τῶν 90, 96, 140.
- Ἄν  $(\alpha, \beta, \gamma) = \delta$ , δεῖξτε ὅτι ὑπάρχουν ἀκεραῖοι  $x, y, z$  τέτοιοι, ὥστε  $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$ . Προσδιορίστε ἀκεραίους  $x, y$  καὶ  $z$ , ὥστε  $(32, 48, 72) = 32x + 48y + 72z$ .
- Βρεῖτε ὅλους τοὺς διαιρέτες τοῦ 120.
- Ποιοὶ θετικοὶ ἀκεραῖοι ἐπαληθεύουν τὴν ἐξίσωση  $x^2 - y^2 = 36$ ;
- Δείξτε ὅτι
  - $(\alpha, \beta) = (5\alpha + 4\beta, \alpha + \beta)$
  - $(\alpha, \beta) = (3\alpha + 4\beta, 2\alpha + 3\beta)$
  - $(\alpha, \beta) = (\alpha + \beta\gamma, \beta)$
  - $(\alpha, \beta, \gamma) = ((\alpha, \beta), (\beta, \gamma))$
- Ἄν  $(\alpha, \beta) = \delta$  καὶ  $\delta = \alpha x + \beta y$ , δεῖξτε ὅτι  $(x, y) = 1$ .
- Ἄν  $\kappa \in \mathbb{Z}^*$ , δεῖξτε ὅτι

- (i)  $\kappa(\alpha, \beta) = (\kappa\alpha, \kappa\beta)$ ,  
 (ii)  $\kappa[\alpha, \beta] = [\kappa\alpha, \kappa\beta]$ .
13. \*Αν  $\alpha \mid \gamma$ ,  $\beta \mid \gamma$  και  $(\alpha, \beta) = 1$ , δείξτε ότι  $\alpha\beta \mid \gamma$ .
14. Σέ καθεμία από τίς παρακάτω περιπτώσεις υπολογίστε τούς θετικούς άκεραίους  $\alpha$  και  $\beta$ :  
 (i)  $\alpha\beta = 2400$  και  $(\alpha, \beta) = 10$ ,  
 (ii)  $\alpha + \beta = 36$  και  $[\alpha, \beta] = 3850$ ,  
 (iii)  $(\alpha, \beta) = 26$  και  $[\alpha, \beta] = 4784$ .
15. \*Αν δύο άκεραίοι είναι πρώτοι μεταξύ τους, δείξτε ότι κάθε διαιρέτης του ενός είναι πρώτος μέ τόν άλλο.  
 Στή συνέχεια δείξτε τή συνεπαγωγή  
 $(\alpha, \kappa) = 1 \Rightarrow (\alpha, \beta) = (\alpha, \kappa\beta)$ .
16. \*Αν ένας άκεραίος είναι πρώτος μέ ένα γινόμενο άκεραίων, τότε είναι πρώτος μέ κάθε παράγοντα του γινομένου και άντιστρόφως.  
 \*Εφαρμογές: Δείξτε  
 (i)  $(\alpha, \beta) = 1 \Leftrightarrow (\alpha, \beta^v) = 1 \quad (v \in \mathbb{N})$   
 (ii)  $(\alpha, \beta) = 1 \Leftrightarrow (\alpha^u, \beta^v) = 1 \quad (u, v \in \mathbb{N})$ .
17. \*Αν  $(\alpha, \beta) = 1$ , δείξτε  
 (i)  $(\alpha + \beta, \alpha) = 1 = (\alpha + \beta, \beta)$ ,  
 (ii)  $(\alpha - \beta, \alpha) = 1 = (\alpha - \beta, \beta)$ ,  
 (iii)  $(\alpha + \beta, \alpha\beta) = 1 = (\alpha - \beta, \alpha\beta)$ .
18. \*Αν  $\alpha, \beta, \gamma$  είναι περιττοί άκεραίοι, δείξτε ότι  
 $(\alpha, \beta, \gamma) = \left( \frac{\alpha + \beta}{2}, \frac{\alpha + \gamma}{2}, \frac{\beta + \gamma}{2} \right)$ .

## 2. ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ $\alpha x + \beta y = \gamma$ ( $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ )

### 2.1. Εισαγωγή

Στήν παράγραφο αυτή θά ασχοληθούμε μέ τό πρόβλημα<sup>(1)</sup> ύπάρξεως και εύρεσεως άκεραίων λύσεων τής γραμμικής εξίσώσεως


$$\alpha x + \beta y = \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}) \quad (1)$$

\***Άκεραία λύση** τής εξίσώσεως (1) είναι κάθε ζεύγος  $(x_0, y_0)$  από άκεραίους άριθμούς πού τήν έπαληθεύει.

\*Ας δοϋμε ποιά είναι ή γεωμετρική έρμηνεία του πρόβληματος αυτού. Είναι γνωστό ότι ή εξίσωση (1) παριστάνει μία εϋθεία πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο (Σχ. 1), πού φυσικά οι συντεταγμένες  $(x, y)$  κάθε σημείου της έπαληθεύουν τήν εξίσωση (1). Τό πρόβλημα τώρα είναι: ύπάρχουν σημεία Σ πάνω στην εϋθεία αυτή μέ άκεραίες συντεταγμένες και, αν ύπάρχουν, ποιά είναι αυτά; \*Όπως θά

1. Μέ τό πρόβλημα αυτό πρώτος ασχολήθηκε ο Έλληνας μαθηματικός Διόφαντος ο Άλεξανδρινός στο έργο του «Άριθμητικά» (360 μ.Χ.).

### III. 2.2.



Σχ. 1

δοῦμε παρακάτω ἡ ἔξισωση  $2x-4y=5$  δὲν ἔχει ἀκέραιες λύσεις, πού σημαίνει ὅτι ἡ εὐθεῖα μὲ ἔξισωση  $2x-4y=5$  δὲν ἔχει σημεία μὲ ἀκέραιες συντεταγμένες, ἐνῶ ἡ ἔξισωση  $2x-5y=3$  ἔχει ἀπειρες ἀκέραιες λύσεις, πού σημαίνει ὅτι ἡ εὐθεῖα μὲ ἔξισωση  $2x-5y=3$  ἔχει ἀπειρα σημεία μὲ ἀκέραιες συντεταγμένες.

Στά ἐπόμενα θά ἐφαρμόσουμε τὰ συμπεράσματα τῆς παραγράφου 1, γιὰ νά μελετήσουμε γενικά τό πρόβλημα αὐτό.

#### 2.2. \*Υπαρξη καὶ εὕρεση ἀκέραιων λύσεων τῆς $ax+by=\gamma$ ( $a, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ )

Εἶναι φανερό ὅτι, ἂν οἱ συντελεστές  $a, \beta, \gamma$  τῆς ἔξισώσεως

$$ax + by = \gamma \quad (a, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}) \quad (1)$$

ἔχουν μέγιστο κοινὸ διαιρέτῃ  $\delta$ , τότε τό σύνολο τῶν ἀκέραιων λύσεῶν τῆς ταυτίζεταί μὲ τό σύνολο τῶν ἀκέραιων λύσεων τῆς ἔξισώσεως

$$\frac{a}{\delta} x + \frac{\beta}{\delta} y = \frac{\gamma}{\delta},$$

πού οἱ συντελεστές τῆς εἶναι σχετικῶς πρῶτοι ἀριθμοί. \*Ἐτσι στά ἐπόμενα μποροῦμε νά ὑποθέτουμε ὅτι οἱ συντελεστές  $a, \beta, \gamma$  τῆς (1) εἶναι **σχετικῶς πρῶτοι ἀριθμοί**, δηλαδή  $(a, \beta, \gamma) = 1$ .

\*Ἡ ἐπόμενη πρόταση ἐξηγεῖ γιατί ἡ ἔξισωση  $2x-4y=5$ , πού ἀναφέραμε στήν εἰσαγωγή, δὲν ἔχει ἀκέραιες λύσεις.

**Πρόταση 1.** \*Ἄν  $(a, \beta) = 1$  καὶ  $(a, \beta) = \lambda > 1$ , τότε ἡ ἔξισωση (1) δὲν ἔχει ἀκέραιες λύσεις.

**\*Απόδειξη:** \*Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ (1) ἔχει μιὰ ἀκέραια λύση  $(x_0, y_0)$ . Τότε

$$ax_0 + \beta y_0 = \gamma.$$

\*Ἀφοῦ  $\lambda | a$  καὶ  $\lambda | \beta$ , ὁ  $\lambda$  εἶναι διαιρέτης τῶν ἀκεραίων  $ax_0$  καὶ  $\beta y_0$  τοῦ πρώτου μέλους τῆς παραπάνω ἰσότητος καὶ ἄρα ὁ  $\lambda$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $\gamma$ . \*Ἀφοῦ ὁ  $\lambda$  εἶναι κοινὸς διαιρέτης τῶν  $a, \beta, \gamma$  καὶ  $(a, \beta, \gamma) = 1$ , πρέπει  $\lambda | 1$ , δηλαδή  $\lambda = 1$  πού εἶναι ἄτοπο γιατί ἀπὸ τὴν ὑπόθεση εἶναι  $\lambda > 1$ . \*Ἄρα ἡ (1) δὲν ἔχει ἀκέραιες λύσεις.

Λόγω αυτής της προτάσεως μένει να εξεταστεί η εξίσωση (1) στην περίπτωση που οι συντελεστές  $\alpha, \beta$  είναι σχετικώς πρώτοι αριθμοί, δηλαδή  $(\alpha, \beta) = 1$ , οπότε και  $(\alpha, \beta, \gamma) = 1$ .

**Πρόταση 2.** \*Αν  $(\alpha, \beta) = 1$ , τότε η εξίσωση (1) έχει μία τουλάχιστον άκεραία λύση.

**\*Απόδειξη.** \*Αν είναι  $\gamma = 0$ , τότε η εξίσωση (1) γράφεται

$$\alpha x + \beta y = 0$$

καί είναι φανερό ότι μία άκεραία λύση της είναι η  $(x_0, y_0) = (0, 0)$ .

\*Εστω  $\gamma \neq 0$ . \*Αφοῦ  $(\alpha, \beta) = 1$ , υπάρχουν άκεραίοι  $\alpha'$  και  $\beta'$  τέτοιοι, ώστε

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' = 1,$$

οπότε πολλαπλασιάζοντας και τά δύο μέλη της με  $\gamma \neq 0$  βρίσκουμε

$$\alpha(\alpha'\gamma) + \beta(\beta'\gamma) = \gamma,$$

πού σημαίνει ότι μία άκεραία λύση της (1) είναι η  $(x_1, y_1) = (\alpha'\gamma, \beta'\gamma)$ .

**Παρατήρηση.** \*Από τις δύο προηγούμενες προτάσεις συμπεραίνουμε την ακόλουθη Ισοδυναμία.

$(\text{Η (1) έχει μία τουλάχιστον άκεραία λύση}) \text{ και } (\alpha, \beta, \gamma) = 1 \Leftrightarrow (\alpha, \beta) = 1$
---

Θα αποδείξουμε τώρα την ακόλουθη πρόταση.

**Πρόταση 3.** \*Αν η εξίσωση (1) έχει μία άκεραία λύση  $(x_0, y_0)$ , τότε τό σύνολο τῶν άκεραιων λύσεων της είναι

$$A = \{(x, y) | (x, y) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}, x = x_0 + \beta k, y = y_0 - \alpha k \text{ και } k \in \mathbf{Z}\},$$

δηλαδή έχει άπειρες σέ πληθος άκεραιες λύσεις της μορφής

$(x, y) = (x_0 + \beta k, y_0 - \alpha k), \text{ όπου } k \in \mathbf{Z}$
--

**\*Απόδειξη.** \*Αφοῦ η (1) έχει μία άκεραία λύση  $(x_0, y_0)$  και μπορούμε να υποθέσουμε ότι  $(\alpha, \beta, \gamma) = 1$ , σύμφωνα με την παραπάνω παρατήρηση θα έχουμε  $(\alpha, \beta) = 1$ . \*Ας υποθέσουμε ότι  $(x_1, y_1)$  είναι μία άκεραία λύση της (1). Τότε αφαιρώντας κατά μέλη τις ισότητες  $\alpha x_1 + \beta y_1 = \gamma$  και  $\alpha x_0 + \beta y_0 = \gamma$  παίρνουμε

$$\alpha(x_1 - x_0) = -\beta(y_1 - y_0) \tag{*}$$

\*Επειδή  $(\alpha, \beta) = 1$ , από τη σχέση (\*) λόγω της προτάσεως 2 της 1.6 έπεται ότι  $\beta | x_1 - x_0$ , οπότε υπάρχει άκεραίος  $k$  με την ιδιότητα  $x_1 - x_0 = \beta k$  ή  $x_1 = x_0 + \beta k$ . Τότε από την (\*) βρίσκουμε διαδοχικά

$$\alpha \beta k = -\beta(y_1 - y_0) \quad \text{ή} \quad -\alpha k = y_1 - y_0 \quad \text{ή} \quad y_1 = y_0 - \alpha k$$

\*Αρα  $(x_1, y_1) \in A$ . \*Αντιστρόφως κάθε στοιχείο του συνόλου  $A$  είναι μία άκεραία λύση της (1). Πράγματι, τό  $(x_0 + \beta k, y_0 - \alpha k)$  επαληθεύει την (1), γιατί

### III. 2.3.

$$\alpha(x_0 + \beta k) + \beta(y_0 - \alpha k) = \alpha x_0 + \alpha \beta k + \beta y_0 - \alpha \beta k = \alpha x_0 + \beta y_0 = \gamma.$$

Άρα, αν  $(x_0, y_0)$  είναι μία άκεραία λύση της (1), τότε όλες οι άκεραιες λύσεις της  $(x, y)$  υπολογίζονται από τους τύπους:

$$x = x_0 + \beta k \quad \text{καί} \quad y = y_0 - \alpha k, \quad \text{όπου } k \in \mathbb{Z} \quad (T)$$

**Σημείωση.** Πολλές φορές στην πράξη θέλουμε να βρούμε μη άρνητικές άκεραιες λύσεις της (1) [μέ  $(\alpha, \beta) = 1$ ], δηλαδή άκεραιες λύσεις  $(x, y)$  με  $x \geq 0$  και  $y \geq 0$ . Αυτές βρίσκονται από τους τύπους (T), αν στον άκεραίο  $k$  δώσουμε τιμές, που να συναληθεύουν οι άνισώσεις ως προς  $k$ :

$$x_0 + \beta k \geq 0 \quad \text{καί} \quad y_0 - \alpha k \geq 0.$$

### 2.3. Μέθοδοι εύρεσεως μιᾶς άκεραίας λύσεως τῆς $\alpha x + \beta y = \gamma$ με $(\alpha, \beta) = 1$ .

Γιά να χρησιμοποιήσουμε τους τύπους (T), είναι αρκετό να γνωρίζουμε μία άκεραία λύση  $(x_0, y_0)$  τῆς εξίσωσης

$$\alpha x + \beta y = \gamma \quad \text{μέ} \quad (\alpha, \beta) = 1 \quad (1)$$

Μία λύση τῆς (1) μπορούμε να βρούμε με μία από τις παρακάτω μεθόδους.

**Μέθοδος 1η.** Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην (1) είναι  $\alpha > 0$ , γιατί άλλιώς αλλάζουμε τά πρόσημα στην εξίσωση. Λύνοντας τήν (1) ως προς  $x$  βρίσκουμε

$$x = \frac{\gamma - \beta y}{\alpha} \quad (*)$$

Αν δώσουμε στο  $y$  τῆς τιμές  $0, 1, 2, \dots, \alpha - 1$ , που είναι  $\alpha$  σε πλήθος, βρίσκουμε τῆς ακόλουθες λύσεις τῆς (\*) στο σύνολο  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}$ :

$$\left( \frac{\gamma}{\alpha}, 0 \right), \left( \frac{\gamma - \beta}{\alpha}, 1 \right), \left( \frac{\gamma - 2\beta}{\alpha}, 2 \right), \dots, \left( \frac{\gamma - \beta(\alpha - 1)}{\alpha}, \alpha - 1 \right)$$

Θά δοῦμε ότι μία μόνο από αυτές τῆς λύσεις είναι άκεραία λύση τῆς (1). Ἐπειδή, λόγω τοῦ θεωρήματος τῆς 1.3, οἱ δυνατές τιμές τῶν παραπάνω υπολοίπων είναι οἱ  $0, 1, 2, \dots, \alpha - 1$ , αν τά υπόλοιπα αυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους, τότε, αφού είναι  $\alpha$  σε πλήθος, κάποιο από αυτά, ἄς πούμε τό  $u_p$ , θά είναι ἴσο μέ μηδέν, ὅποτε ὁ ρητός  $\frac{\alpha - \rho\beta}{\alpha}$  θά είναι άκεραίος. Ἐπειδή, ἄς υποθέσουμε ότι  $u_k = u_\lambda$ . Τά υπόλοιπα αυτά ἀντιστοιχοῦν σε ἐκείνες τῆς διαιρέσεις, που στο  $y$  ἔχουμε δώσει ἀντίστοιχες τιμές  $k$  καί  $\lambda$ , καί ἔστω  $0 \leq k < \lambda < \alpha$ . Τότε ἀφαιρώντας κατά μέλη τῆς ἰσότητες

$$\gamma - \beta k = \alpha p_k + u_k, \quad \gamma - \beta \lambda = \alpha p_\lambda + u_\lambda$$

βρίσκουμε

$$\beta(\lambda - \kappa) = \alpha (\pi_{\kappa} - \pi_{\lambda}),$$

όπότε, αφού  $(\alpha, \beta) = 1$ , λόγω της προτάσεως 2 της 1.6 ό α είναι διαιρέτης του  $\lambda - \kappa$ . Άλλά αυτό είναι άτοπο, γιατί ό θετικός άκέραιος  $\lambda - \kappa$  είναι μικρότερος άπό τόν α. Έτσι μπορούμε νά ύπολογίζουμε μιά άκέραια λύση της (1)

Γιά τή μέθοδο αυτή άπαιτούνται τό πολύ α σέ πλήθος δοκιμές, όσες τιμές δηλαδή δίνουμε στό γ. Γιά τό λόγο αυτό προτιμούμε νά λύνουμε τήν έξίσωση (1) ώς πρός έκείνον τόν άγνωστο, πού έχει κατ' άπόλυτο τιμή μικρότερο συντελεστή.

Στήν περίπτωση πού οί συντελεστές της έξισώσεως (1) είναι μεγάλοι άριθμοί ή παραπάνω μέθοδος είναι κουραστική, γι' αυτό χρησιμοποιούμε τήν έπόμενη μέθοδο.

**Μέθοδος 2η.** Η μέθοδος αυτή στηρίζεται σέ όσα άναφέραμε στήν άπόδειξη της προτάσεως 2 της 2.2. Έπειδή  $(|\alpha|, |\beta|) = (\alpha, \beta) = 1$ , μπορούμε νά ύποθέσουμε, ότι οί  $\alpha, \beta$  είναι θετικοί άκέραιοι, όπότε μέ τόν άλγόριθμο του Εύκλειδη μπορούμε νά προσδιορίσουμε, όπως είδαμε στό παράδειγμα 4 της 1.5, δύο άκεραίους  $\alpha'$  καί  $\beta'$  τέτοιους, ώστε

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' = 1.$$

Τώρα πολλαπλασιάζοντας καί τά δύο μέλη μέ  $\gamma \neq 0$  (γιατί, άν  $\gamma = 0$ , μιά άκέραια λύση της (1) ύπολογίζεται άμέσως) βρίσκουμε

$$\alpha(\alpha'\gamma) + \beta(\beta'\gamma) = \gamma$$

καί άρα τό  $(x_0, y_0) = (\alpha'\gamma, \beta'\gamma)$  είναι μιά άκέραια λύση της (1).

#### Παραδείγματα:

1. Νά βρεθούν οί μή άρνητικές άκέραιες λύσεις της έξισώσεως

$$3x + 4y = 37.$$

**Έπίλυση.** Έδώ έχουμε  $(\alpha, \beta) = (3, 4) = 1$  καί άρα ή έξίσωση έχει άκέραιες λύσεις. Θά εφαρμόσουμε τήν πρώτη μέθοδο. Λύνοντας ώς πρός x έχουμε  $x = \frac{37-4y}{3}$ . Τώρα σ' αυτή θέτουμε διαδοχικά  $y = 0, 1, 2$ , μέχρι νά βρούμε άκέραια τιμή του x. Γιά  $y = 0$  βρίσκουμε  $x = \frac{37}{3}$ . Γιά  $y = 1$  βρίσκουμε  $x = \frac{37-4}{3} = 11 \in \mathbb{Z}$ . Άρα μιά άκέραια λύση της δεδομένης έξισώσεως είναι ή  $(x_0, y_0) = (11, 1)$  καί έπομένως οί άκέραιες λύσεις της βρίσκονται άπό τούς τύπους (T) καί είναι τά ζεύγη  $(x, y)$  μέ

$$\begin{aligned} x &= 11 + 4\kappa & \text{καί} & \quad \kappa \in \mathbb{Z} \\ y &= 1 - 3\kappa \end{aligned}$$

Οί μή άρνητικές άκέραιες λύσεις της θά βρεθούν, άν στους παραπάνω τύπους δώσουμε στόν άκέραιο  $\kappa$  τιμές, πού νά συναληθεύουν τίς άνισώσεις

$$11 + 4\kappa \geq 0 \quad \text{καί} \quad 1 - 3\kappa \geq 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \kappa \geq -\frac{11}{4} \quad \text{καί} \quad \kappa \leq \frac{1}{3} \quad \Leftrightarrow -2,75 \leq \kappa \leq \frac{1}{3}$$


Άρα  $\kappa = -2, -1, 0$ . Οί μή άρνητικές άκέραιες λύσεις είναι οί  $(3, 7), (7, 4), (11, 1)$  (βλ. πίνακα

### III. 2.3.

του Σχ. 2).

$\kappa$	$x$	$y$
-2	3	7
-1	7	4
0	11	1

Σχ. 2



Σχ. 3

"Όπως βλέπουμε, οι μη άρνητικές άκέραιες λύσεις της εξίσωσης  $3x + 4y = 37$  είναι τρεις, δηλ. πεπερασμένες σε πλήθος. "Ας δοϋμε πώς εξηγείται αυτό γεωμετρικά. "Η εξίσωση αυτή παριστάνει πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο μία ευθεία με κλίση<sup>(1)</sup> άρνητική (Σχ. 3). "Επειδή μόνο ένα εϋθύγραμμο τμήμα της ευθείας αυτής βρίσκεται στο τεταρτημόριο I, είναι φυσικό νά έχει η εξίσωση πεπερασμένες σε πλήθος μη άρνητικές άκέραιες λύσεις.

"Ας επιλύσουμε τώρα τήν ίδια εξίσωση με τή δεύτερη μέθοδο. "Αφοϋ  $(3,4) = 1$ , υπάρχουν άκέραιοι  $\alpha'$  και  $\beta'$  με

$$3\alpha' + 4\beta' = 1.$$

Χωρίς τόν άλγόριθμο του Εϋκλείδη βρίσκουμε ότι οι τιμές  $\alpha' = -1$  και  $\beta' = 1$  επαληθεύουν τήν Ισότητα αυτή, δηλαδή

$$3(-1) + 4 \cdot 1 = 1$$

Πολλαπλασιάζοντας και τά δύο μέλη με 37 βρίσκουμε

$$3(-37) + 4 \cdot 37 = 37,$$

πού σημαίνει ότι ή  $(x_1, y_1) = (-37, 37)$  είναι μία άκέραια λύση της εξίσωσης. "Αρα οι άκέραιες λύσεις της δίνονται από τούς τύπους

$$\begin{aligned} x &= -37 + 4\lambda & \lambda \in \mathbb{Z}, \\ y &= 37 - 3\lambda \end{aligned}$$

πού διαφέρουν από τούς προηγούμενους, αλλά για κατάλληλες τιμές τών  $\kappa$  και  $\lambda$  βρίσκουμε τίς ίδιες λύσεις. Οι μη άρνητικές άκέραιες λύσεις φαίνονται στον πίνακα του σχήματος 4, πού, όπως βλέπουμε, είναι ίδιες με αυτές πού βρήκαμε και προηγούμενως.

$\frac{37}{4} \leq \lambda \leq \frac{37}{3}$		
$\lambda$	$x$	$y$
10	3	7
11	7	4
12	11	1

Σχ. 4

2. Νά βρεθοϋν οι μη άρνητικές άκέραιες λύσεις της εξίσωσης

$$34x - 71y = 3.$$

1. Κλίση της ευθείας με εξίσωση  $y = \lambda x + \mu$  ονομάζεται ο αριθμός  $\lambda$  και εκφράζει τήν έφαπτομένη της θετικής γωνίας από τό θετικό ημίάξονα τών  $x$  μέχρι τήν ευθεία. Στο παράδειγμά μας είναι  $\epsilon\phi\omega = -3/4$ .

**\*Επίλυση:** Θά χρησιμοποιήσουμε τή δεύτερη μέθοδο. Έδω έχουμε  $\alpha = 34$  καί  $\beta = -71$ . Έπειδή  $(34, -71) = (34, 71)$ , θά βρούμε τό μέγιστο κοινό διαιρέτη τῶν 34, 71. Ὁ ἀλγόριθμος τοῦ Εὐκλείδη δίνει τίς ἰσότητες

$$71 = 34 \cdot 2 + 3,$$

$$34 = 3 \cdot 11 + 1,$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0.$$

Ἄρα  $(34, -71) = (34, 71) = 1$  καί συνεπῶς ἡ δεδομένη ἐξίσωση ἔχει ἀκέραιες λύσεις. Ἄπό τίς προηγούμενες ἰσότητες ἡ δεύτερη λόγω τῆς πρώτης γράφεται:

$$1 = 34 - 3 \cdot 11 = 34 - (71 - 34 \cdot 2)11 = 34 \cdot 23 + 71(-11)$$

$$\text{ἢ} \quad 34(23 \cdot 3) - 71(11 \cdot 3) = 3 \quad \text{ἢ} \quad 34 \cdot (69) - 71(33) = 3,$$

πού σημαίνει ὅτι μία ἀκέραια λύση τῆς δεδομένης ἐξισώσεως εἶναι ἡ  $(x_0, y_0) = (69, 33)$ .

Ἄρα οἱ ἀκέραιες λύσεις τῆς δίνονται ἀπό τούς τύπους

$$\begin{aligned} x &= 69 - 71k \\ y &= 33 - 34k \end{aligned} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Γιά νά βρούμε τίς μὴ ἀρνητικές ἀκέραιες λύσεις, συναρθεύουμε τίς ἀνισώσεις

$$69 - 71k \geq 0 \quad \text{καί} \quad 33 - 34k \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k \leq \frac{69}{71} \quad \text{καί} \quad k \leq \frac{33}{34} \Leftrightarrow k \leq \frac{33}{34} \quad \left( \text{ἀφοῦ} \quad \frac{33}{34} < \frac{69}{71} \right)$$

Ἄρα μέ τίς δυνατές ἀκέραιες τιμές τοῦ  $k$ : 0, -1, -2, ... καί τούς παραπάνω τύπους βρίσκουμε τίς μὴ ἀρνητικές ἀκέραιες λύσεις τῆς ἐξισώσεως. (Δώστε γεωμετρική ἐρμηνεία γιατί ἡ ἐξίσωση ἔχει ἄπειρες τέτοιες λύσεις).

## 2.4. Ἀσκήσεις

- Νά βρεθοῦν οἱ ἀκέραιες λύσεις τῆς ἐξισώσεως  $2x - 5y = 3$ .
- Νά βρεθοῦν οἱ μὴ ἀρνητικές ἀκέραιες λύσεις τῶν ἐξισώσεων
  - $455x + 519y = 2$
  - $119x + 29y = 2$ .
- Θέλουμε νά μετατρέψουμε ἕνα χαρτονόμισμα τῶν 100 δρχ σέ κέρματα τῶν 2 καί 5 δρχ. Μέ πόσους τρόπους μπορούμε νά τό πετύχουμε αὐτό;
- Βρεῖτε τίς θετικές ἀκέραιες λύσεις τῶν ἐξισώσεων:
  - $3x + 4y = 34$  ,
  - $9x + 5y = 100$  ,
  - $34x + 71y = 772$ ,
  - $41x + 73y = 561$ .
- Ἐνας μαθητής θέλει νά ἀγοράσει τετράδια τῶν 9 δρχ. τό ἕνα καί μολύβια τῶν 7 δρχ. τό ἕνα. Ἄν ἔοδέψει ἀκριβῶς 100 δρχ., βρεῖτε πόσα τετράδια καί πόσα μολύβια μπορεῖ νά ἀγοράσει.
- Ἐνας χρυσοχόος θέλει νά κατασκευάσει δύο εἶδη κοσμημάτων. Ἄν γιά τήν κατασκευή ἑνός κοσμήματος ἀπό κάθε εἶδος ἀπαιτοῦνται ἀντίστοιχα 5 γραμ. καί 8 γραμ. χρυσοῦ, βρεῖτε πόσα κοσμήματα ἀπό κάθε εἶδος μπορεῖ νά κατασκευάσει χρησιμοποιώντας ἀκριβῶς 134 γραμ. χρυσοῦ.  
Ἄν ἀπό ἕνα κόσμημα τοῦ α' εἶδους κερδίζει 600 δρχ. καί ἀπό ἕνα τοῦ β' εἶδους 750 δρχ., βρεῖτε σέ ποιά περίπτωση θά ἔχει μέγιστο κέρδος.
- Βρεῖτε δύο θετικούς ἀκεραίους πού ἔχουν ἀθροισμα 37, ἂν εἶναι γνωστό ὅτι ἡ διαίρεση τοῦ πρώτου μέ τό 5 δίνει ὑπόλοιπο 2 καί ἡ διαίρεση τοῦ δευτέρου μέ τό 7 δίνει ὑπόλοιπο 4.

### III. 3.

#### 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Για δύο άκεραίους  $\alpha, \beta$  με  $\beta \neq 0$  υπάρχουν μοναδικοί άκεραίοι  $\pi$  και  $\upsilon$  τέτοιοι, ώστε

$$\alpha = \beta\pi + \upsilon \quad \text{καί} \quad 0 \leq \upsilon < |\beta|$$

2. Ο αλγόριθμος του Εύκλειδη είναι χρήσιμος για τον υπολογισμό του ΜΚΔ άκεραίων.

3. Αν  $\delta = (\alpha, \beta)$ , τότε υπάρχουν δύο άκεραίοι  $\alpha'$  και  $\beta'$  τέτοιοι, ώστε

$$\delta = \alpha\alpha' + \beta\beta' \quad (1)$$

Ο αλγόριθμος του Εύκλειδη είναι χρήσιμος για τον υπολογισμό άκεραίων  $\alpha'$  και  $\beta'$ , που νά επαληθεύουν την (1).

4. Αν  $\alpha, \beta, \kappa \in \mathbb{Z}^*$  με  $(\alpha, \beta) = 1$  και  $\alpha|\beta\kappa$ , τότε  $\alpha|\kappa$ .

5. Αν  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^*$ , τότε  $[\alpha, \beta] \cdot (\alpha, \beta) = |\alpha| \cdot |\beta|$ .

6. Για την εύρεση του Μ.Κ.Δ δύο θετικών άκεραίων  $\alpha$  και  $\beta$ , που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο (θετικών) πρώτων παραγόντων, σχηματίζουμε το γινόμενο που περιέχει τους κοινούς πρώτους παράγοντες των  $\alpha$  και  $\beta$  τον καθένα με το μικρότερο εκθέτη. Για την εύρεση του Ε.Κ.Π τους, σχηματίζουμε το γινόμενο που περιέχει τους κοινούς και μη κοινούς πρώτους παράγοντες των  $\alpha$  και  $\beta$  τον καθένα με το μεγαλύτερο εκθέτη.

7. Αν  $(\alpha, \beta) = 1$ , τότε η εξίσωση  $\alpha x + \beta y = \gamma$  ( $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ ) έχει άπειρες άκεραιες λύσεις  $(x, y)$ , που δίνονται από τους τύπους

$$x = x_0 + \beta\kappa,$$

$$y = y_0 - \alpha\kappa,$$

όπου  $(x_0, y_0)$  είναι μία άκεραία λύση αυτής της εξίσωσης και  $\kappa \in \mathbb{Z}$ .

## 4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- Δείξτε ότι για κάθε  $n \in \mathbb{Z}$  ο  $n^2 + 3n + 5$  δεν διαιρείται με το 121.
- Δείξτε ότι ο  $11^{10} - 1$  διαιρείται με 100.
- Δείξτε ότι το άθροισμα των τετραγώνων πέντε διαδοχικών άκεραίων δεν είναι ίσο με το τετράγωνο άκεραίου.
- Δείξτε ότι το τετράγωνο κάθε πρώτου αριθμού μεγαλύτερου από το 3, αν διαιρεθεί με 12, δίνει υπόλοιπο 1.
- Δείξτε ότι, αν  $p$  και  $8p-1$  είναι θετικοί πρώτοι αριθμοί, τότε ο  $8p+1$  είναι σύνθετος.
- Δείξτε ότι οι  $2^n-1$  και  $2^n+1$  δεν μπορεί να είναι και οι δύο πρώτοι αριθμοί για καμία τιμή του φυσικού  $n > 2$ .
- Δείξτε ότι για κάθε  $m, n \in \mathbb{Z}$  η παράσταση  

$$m^5 + 3m^4n - 5m^3n^2 - 15m^2n^3 + 4mn^4 + 12n^5$$
 δεν παίρνει την τιμή 33.
- Δείξτε ότι  

$$7 \mid 2222^{5555} + 5555^{2222}$$
- Δείξτε ότι, αν όλοι οι συντελεστές της εξίσωσης  

$$ax^2 + bx + c = 0$$
 είναι περιττοί άκεραίοι αριθμοί, τότε οι ρίζες της εξίσωσης δεν είναι ρητές.
- Νά βρείτε τους φυσικούς αριθμούς  $x, y$  και  $z$ , αν  

$$\frac{x}{7} + \frac{y}{11} + \frac{z}{13} = 0,946053 \ 946053 \dots$$
- \*Αν η διαίρεση του 802 με έναν άκεραίο  $\alpha$  δίνει πηλίκο 14, βρείτε τις δυνατές τιμές του  $\alpha$  και των υπολοίπων.
- \*Αν  $\alpha, \beta, \nu, \rho \in \mathbb{Z}$  και  $\nu - \rho \mid \alpha + \beta$ , δείξτε ότι  

$$\nu - \rho \mid (\alpha + \beta)(\nu + \rho).$$
- Νά δείξτε ότι για κάθε  $n \in \mathbb{Z}$  τό κλάσμα  

$$\frac{15n^2 + 8n + 6}{30n^2 + 21n + 13}$$
 είναι ανάγωγο.
- \*Αν  $A = 222 \dots 2$  με  $n$  τό πλήθος ψηφία και  $B = 888 \dots 8$  με  $m$  τό πλήθος ψηφία, δείξτε ότι  

$$(A, B) = \frac{2}{9} (10^{\xi} - 1)$$
 όπου  $\xi = (\nu, \mu)$ .
- Τό άθροισμα των αντιστρόφων τριών φυσικών αριθμών είναι ίσο με ένα. Ποιοί είναι οι αριθμοί;
- Δείξτε ότι για κάθε  $k \in \mathbb{Z}$  οι αριθμοί  $3k+1, 14k+5$  είναι πρώτοι μεταξύ τους. \*Αν  $k \neq 29l + 10$  και  $l \in \mathbb{Z}$ , δείξτε ότι  

$$(3k-1, 14k+5) = 1.$$
- Γιά ποιές τιμές του φυσικού αριθμού  $n$  οι αριθμοί  $5^n+1$  και 39 είναι πρώτοι μεταξύ τους;

### III 4.

18. "Αν  $\beta \mid \alpha(\alpha-1)$ , όπου  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ , δείξτε ότι

$$(2\alpha-1, \beta) = 1.$$

19. "Αν  $\alpha, \beta, A, B$  είναι άκερατοι και θέσουμε

$$\delta = (\alpha, \beta), \quad \Delta = (A, B), \quad \mu = [\alpha, \beta] \quad \text{καί} \quad M = [A, B],$$

δείξτε ότι

$$(\alpha A, \alpha B, \beta A, \beta B) = \delta \cdot \Delta \quad \text{καί} \quad [\alpha A, \alpha B, \beta A, \beta B] = \mu \cdot M.$$

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

### Π Ο Λ Υ Ω Ν Υ Μ Α

1. Τό σύνολο  $C_{[x]}$  τών πολυωνύμων
2. Διαιρετότητα πολυωνύμων
3. Άριθμητική τιμή τών πολυωνύμων
4. Θεωρήματα σχετικά μέ τίς ρίζες τών πολυωνύμων
5. Έξιώσεις 3ου καί 4ου βαθμοῦ
6. Διερεύνηση έξιώσεων καί άνισώσεων
7. Σύντομη άνακεφαλαίωση
8. Άσκήσεις για έπανάληψη



## 1. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ $C_{[x]}$ ΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

### 1.1. Όρισμός του $C_{[x]}$ .

Σέ προηγούμενες τάξεις έχουμε μιλήσει για πολυώνυμα με πραγματικούς συντελεστές και έχουμε μάθει να κάνουμε πράξεις με αυτά. Έδω θα συμπληρώσουμε τίς γνώσεις μας αυτές άναφερόμενοι και σε πολυώνυμα με μιγαδικούς συντελεστές. Έτσι,

κάθε παράσταση τής μορφής

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 x^0 \quad (1)$$

μέ  $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$  και  $n \in \mathbb{N}_0$ ,

θά τήν όνομάζουμε και πάλι **πολυώνυμο του  $x$**  και θά τό συμβολίζουμε μέ  $f(x)$ ,  $g(x)$ ,  $\varphi(x)$ , κ.ά.

Τό πολυώνυμο (1) τό γράφουμε άπλούστερα

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad (2)$$

θέτοντας όπου  $x^1$  τό  $x$  και όπου  $a_0 x^0$  τό  $a_0$ . Τά  $a_0, a_1, \dots, a_n$  όνομάζονται **συντελεστές του πολυωνύμου** και τά  $a_k x^k$ ,  $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$  **όροι του πολυωνύμου**.

Ειδικότερα οί όροι  $a_k x^k$  μέ  $a_k = 0$  όνομάζονται **μηδενικοί όροι του πολυωνύμου** και ό  $a_0$  **σταθερός όρος του πολυωνύμου**.

Άν όλοι οί όροι ενός πολυωνύμου είναι μηδενικοί, τότε τό πολυώνυμο αυτό όνομάζεται **μηδενικό πολυώνυμο**.

Ό «έκθέτης» του  $x$  σε ένα μή μηδενικό όρο ενός πολυωνύμου όνομάζεται **βαθμός** αυτού του όρου. Για ένα μή μηδενικό πολυώνυμο ό μεγαλύτερος από τούς έκθέτες των μή μηδενικών όρων του όνομάζεται **βαθμός του πολυωνύμου**. Π.χ. άν  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ , μέ  $a_n \neq 0$ , τότε λέμε ότι τό  $f(x)$  είναι νιοστού βαθμού και γράφουμε **βαθμ.  $f(x) = n$** . Ό όρος  $a_n x^n$  όνομάζεται τότε και **μεγιστοβάθμιος όρος του  $f(x)$** .

Στή γραφή ενός πολυωνύμου δεχόμαστε τίς εξής άπλοποιήσεις:

- Παραλείπουμε τή μονάδα, όταν είναι συντελεστής κάποιου όρου, έκτός άν είναι ό σταθερός όρος.
- Παραλείπουμε τό «+», όταν ακολουθεί όρος μέ συντελεστή τής μορφής  $-a$
- Παραλείπουμε τούς μηδενικούς όρους ή και προσαρτούμε, όταν είναι άναγκαίο, όσουσδήποτε από αυτούς. Φυσικά σε ένα μηδενικό πολυώνυμο δέν

## IV 1.2.

παραλείπουμε όλους τούς όρους του (γράφουμε τουλάχιστον έναν). \*Έτσι δύο πολυώνυμα μπορούν να γραφούν πάντοτε με τό ίδιο πλήθος όρων. Αυτό γίνεται συχνά στά επόμενα χωρίς να τονίζεται ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τίς παραδοχές πού κάναμε, τά πολυώνυμα  $f(x) = \frac{4}{3}x^2 + (-5)x + i\sqrt{2}$  και  $g(x) = (2+i)x^3 + 1x^2 + 0x + 1$  γράφονται άπλούστερα  $f(x) = \frac{4}{3}x^2 - 5x + i\sqrt{2}$  και  $g(x) = (2+i)x^3 + x^2 + 1$ .

Τονίζουμε ότι τό πολυώνυμο  $f(x) = \alpha_0$  όνομάζεται **σταθερό πολυώνυμο** και όταν  $\alpha_0 \neq 0$ , είναι μηδενικού βαθμού, ένώ όταν  $\alpha_0 = 0$ , είναι μηδενικό πολυώνυμο και **δέν έχει βαθμό**<sup>(1)</sup>.

\*Όταν στά επόμενα λέμε ότι *από πολυώνυμο  $f(x)$  είναι τό πολύ νιστοῦ βαθμοῦ* θά έννοοῦμε ότι τό  $f(x)$  είναι μηδενικό πολυώνυμο ή βαθμ.  $f(x) \leq v$ .

\*Αν  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  και  $g(x) = \beta_n x^n + \beta_{n-1} x^{n-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0$ , τότε θά λέμε ότι τά πολυώνυμα αυτά είναι ίσα και θά γράφουμε  $f(x) = g(x)$ , όταν και μόνο όταν είδαι  $a_j = \beta_j$  για όλα τά  $j \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ .

Είναι φανερό ότι ή ισότητα τῶν πολυωνύμων, όπως όρίστηκε, έχει τίς γνωστές μας ιδιότητες τῆς ισότητας και άκόμα ότι **δύο ίσα πολυώνυμα δέν είναι δύο πολυώνυμα, αλλά ένα και τό αυτό πολυώνυμο.**

\*Από τόν όρισμό τῆς ισότητας τῶν πολυωνύμων συμπεραίνουμε ότι **ύπάρχει μοναδικό μηδενικό πολυώνυμο.** Τό μοναδικό αυτό μηδενικό πολυώνυμο θά τό συμβολίζουμε  $0(x)$  ή  $0$ .

Τό σύνολο τῶν πολυωνύμων με μιγαδικούς συντελεστές θά τό συμβολίζουμε με  $C_{[x]}$ .

Στά επόμενα θά αναφερόμαστε γενικά σε πολυώνυμα τοῦ  $C_{[x]}$ , και όταν είναι άπαραίτητο νά έχουμε πολυώνυμα με μόνο πραγματικούς συντελεστές ή μόνο ρητούς, θά τό τονίζουμε ιδιαίτερα και τά σύνολά τους θά τά συμβολίζουμε αντίστοίχως με  $R_{[x]}$  και  $Q_{[x]}$ .

## 1.2. Έφαρμογές.

1. Νά προσδιοριστοῦν οί πραγματικοί αριθμοί  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , ώστε τό πολυώνυμο

$$f(x) = (\alpha - 1)x^3 + (2\beta - \alpha + 1)x^2 + (\alpha + \beta - \gamma)x + 2\alpha - \gamma + \beta + \delta$$

νά είναι τό μηδενικό πολυώνυμο.

Λύση: Σύμφωνα με τόν όρισμό τοῦ μηδενικοῦ πολυωνύμου έχουμε τό σύστημα

$$\alpha - 1 = 0, \quad 2\beta - \alpha + 1 = 0, \quad \alpha + \beta - \gamma = 0, \quad 2\alpha - \gamma + \beta + \delta = 0,$$

τό όποιο επίλυμένο δίνει:

$$\alpha = 1, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 1, \quad \delta = -1.$$

1. Μερικές φορές στή βιβλιογραφία σε ένα μηδενικό πολυώνυμο άποδίδεται ό βαθμός  $-\infty$ .

2. Νά προσδιοριστούν οι πραγματικοί αριθμοί  $\alpha, \beta, \gamma$ , ώστε τα πολυώνυμα

$$f(x) = (\alpha - \beta)x^2 + \gamma x - 2\alpha + \beta - 1 \quad \text{καί} \quad g(x) = (\alpha + \beta + 3)x^2 + (2 - \gamma)x + 3\alpha - 2$$

νά είναι ίσα.

Λύση: Σύμφωνα με τον όρισμό της ισότητας των πολυωνύμων έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha - \beta = \alpha + \beta + 3 \\ \gamma = 2 - \gamma \\ -2\alpha + \beta - 1 = 3\alpha - 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} -2\beta = 3 \\ 2\gamma = 2 \\ -5\alpha + \beta = -1 \end{array} \right\}$$

Από το τελευταίο σύστημα παίρνουμε  $\beta = -\frac{3}{2}$ ,  $\gamma = 1$ ,  $\alpha = -\frac{1}{10}$ .

### 1.3. Πρόσθεση στό $C_{[x]}$ .

Αν  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$  και  $g(x) = \beta_n x^n + \beta_{n-1} x^{n-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0$  είναι δύο πολυώνυμα του  $C_{[x]}$ , τότε ορίζεται μονοσήμαντα τό πολυώνυμο

$$f(x) + g(x) = \gamma_n x^n + \gamma_{n-1} x^{n-1} + \dots + \gamma_1 x + \gamma_0$$

μέ συντελεστές  $\gamma_j = \alpha_j + \beta_j$  για όλα τά  $j \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ , πού ονομάζεται **άθροισμα** των  $f(x)$  και  $g(x)$  και συμβολίζεται με  $f(x) + g(x)$ . Η πράξη, μέ τήν όποία στό ζεύγος  $(f(x), g(x))$  αντίστοιχίζεται τό πολυώνυμο  $f(x) + g(x)$ , ονομάζεται **πρόσθεση στό  $C_{[x]}$** . Η πρόσθεση αυτή, όπως είναι φανερό, έχει όλες τίς ιδιότητες τής προσθέσεως στό  $C$  και γι' αυτό

ή δομή  $(C_{[x]}, +)$  είναι αντιμεταθετική ομάδα,

μέ οδδέτερο στοιχείο τό μηδενικό πολυώνυμο και αντίθετο του  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$  τό  $-f(x) = -\alpha_n x^n - \alpha_{n-1} x^{n-1} - \dots - \alpha_1 x - \alpha_0$ .

Έτσι, αν  $f(x)$  και  $g(x)$  είναι γνωστά πολυώνυμα, ή εξίσωση  $f(x) + Y = g(x)$  έχει μοναδική λύση τήν  $Y = g(x) - f(x)$ , πού ονομάζεται διαφορά του πολυωνύμου  $f(x)$  από τό  $g(x)$  και συμβολίζεται μέ  $g(x) - f(x)$ , δηλαδή

$$g(x) - f(x) = g(x) + (-f(x)).$$

### 1.4. Πολλαπλασιασμός πολυωνύμου επί αριθμό $\lambda \in C$ .

Αν  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$  είναι ένα πολυώνυμο του  $C_{[x]}$ , τότε ορίζουμε στό  $C_{[x]}$  μία εξωτερική πράξη πολλαπλασιασμού μέ τελεστές  $\lambda$  από τό σωμα  $C$ , αντίστοιχίζοντας στό ζεύγος  $(\lambda, f(x))$ , τό πολυώνυμο:

$$\lambda f(x) \stackrel{\text{ορισ.}}{=} (\lambda \alpha_n) x^n + (\lambda \alpha_{n-1}) x^{n-1} + \dots + (\lambda \alpha_1) x_1 + (\lambda \alpha_0).$$

Ο πολλαπλασιασμός αυτός, όπως όρίστηκε, είναι εύκολο νά δειχθεί ότι έχει τίς γνωστές ιδιότητες

$$\alpha) \lambda \cdot (f(x) + g(x)) = \lambda \cdot f(x) + \lambda \cdot g(x)$$

$$\beta) (\lambda + \kappa) \cdot f(x) = \lambda \cdot f(x) + \kappa \cdot f(x)$$

$$\gamma) (\lambda \kappa) \cdot f(x) = \lambda \cdot (\kappa \cdot f(x))$$

$$\delta) 1 \cdot f(x) = f(x)$$

για όλα τά  $\lambda, \kappa \in C$ .

## IV 1.5.

Έτσι τό  $C[x]$  έφοδιασμένο με τήν έσωτερική πράξη τής προσθέσεως και τήν έξωτερική πράξη του πολλαπλασιασμού με τελεστές από τό  $C$  είναι ένας δια-νυσματικός χώρος πάνω στό σώμα  $C$ .

Μετά τή διαπίστωση αυτή τό πολυώνυμο  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$  είναι γραμμικός συνδυασμός τών πολυωνύμων  $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}, x^n$  με συντελεστές από τό  $C$ , όπότε τό  $f(x)$  γράφεται  $f(x) = \alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1 \cdot x + \alpha_2 \cdot x^2 + \dots + \alpha_{n-1} \cdot x^{n-1} + \alpha_n \cdot x^n$  και μπορεί νά θεωρηθεί σάν άθροισμα τών όρων του.

### 1.5. Πολλαπλασιασμός στό $C_{[x]}$ .

Αν  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$  και

$$g(x) = \beta_\mu x^\mu + \beta_{\mu-1} x^{\mu-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0$$

είναι δύο πολυώνυμα του  $C_{[x]}$ , τότε ονομάζεται γινόμενο του  $f(x)$  επί τό  $g(x)$  και συμβολίζεται με  $f(x) \cdot g(x)$  τό πολυώνυμο:

$$\varphi(x) = \gamma_{v+\mu} x^{v+\mu} + \dots + \gamma_\kappa x^\kappa + \dots + \gamma_1 x + \gamma_0$$

μέ  $\gamma_\kappa = \alpha_\kappa \beta_0 + \alpha_{\kappa-1} \beta_1 + \alpha_{\kappa-2} \beta_2 + \dots + \alpha_2 \beta_{\kappa-2} + \alpha_1 \beta_{\kappa-1} + \alpha_0 \beta_\kappa, \kappa \in \{0, 1, 2, \dots, v+\mu\}$  (1)

Είναι φανερό ότι τό  $f(x) \cdot g(x)$  είναι ένα πολυώνυμο του  $C_{[x]}$  μοναδικό, όταν δίνονται τά  $f(x)$  και  $g(x)$ , αφού οι συντελεστές του όρίζονται με τή βοήθεια τής προσθέσεως και του πολλαπλασιασμού στό  $C$  τών συντελεστών τών  $f(x)$  και  $g(x)$ .

Η πράξη, με τήν όποία σέ ένα ζεύγος πολυωνύμων του  $C_{[x]}$  αντίστοιχίζεται τό γινόμενό τους, ονομάζεται πολλαπλασιασμός στό  $C_{[x]}$ .

Τά πολυώνυμα  $f(x)$  και  $g(x)$  ονομάζονται και παράγοντες του γινομένου  $f(x) \cdot g(x)$ . Αν  $f(x) = 0$ , τότε  $0 \cdot g(x) = 0$ . Από τήν ισότητα αυτή βλέπουμε ότι τό 0 έχει για παράγοντα κάθε πολυώνυμο του  $C_{[x]}$ . Επίσης αν  $f(x) = 1$ , τότε  $1 \cdot g(x) = g(x)$ , δηλ. κάθε πολυώνυμο είναι παράγοντας του έαυτου του.

Παρατήρηση: Αν  $f(x) \in C_{[x]}$  και  $\lambda$  είναι ένα σταθερό πολυώνυμο του  $C_{[x]}$ , τότε τό γινόμενο  $\lambda \cdot f(x)$  ταυτίζεται με τό γινόμενο του έξωτερικού πολλαπλασιασμού του  $f(x)$  επί τό  $\lambda \in C$

Από τόν όρισμό του γινομένου  $f(x) \cdot g(x)$  γίνεται φανερό ότι

ό βαθμός του γινομένου δύο μή μηδενικών πολυωνύμων είναι ίσος με τό άθροισμα τών βαθμών τών δύο πολυωνύμων.

Από τήν (1) φαίνεται ότι ή πράξη του πολλαπλασιασμού είναι πράξη αντιμεταθετική και πράξη έπιμεριστική ως προς τήν πρόσθεση στό  $C[x]$ .

Έπειδή  $1 \cdot g(x) = g(x)$  και ό πολλαπλασιασμός είναι πράξη αντιμεταθετική, θα ισχύει  $1 \cdot g(x) = g(x) \cdot 1 = g(x)$ , δηλ. ό πολλαπλασιασμός στό  $C_{[x]}$  έχει οδότερο στοιχείο τό σταθερό πολυώνυμο  $f(x) = 1$ . Αποδεικνύεται ακόμα ότι ό πολλαπλασιασμός στό  $C_{[x]}$  είναι πράξη προσεταιριστική. Δηλαδή

ή δομή  $(C_{[x]}, +, \cdot)$  είναι αντιμεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο.

\*Αν αναζητήσουμε **τό αντίστροφο στοιχείο** για κάθε μη μηδενικό πολυώνυμο, θα δούμε ότι αυτό **δεν υπάρχει παρά μόνο** για τὰ σταθερά πολυώνυμα.

Πράγματι· α) αν για ένα πολυώνυμο  $f(x) \in C_{[x]}$  με βαθμό  $v \neq 0$  υπήρχε τό αντίστροφό του  $f^{-1}(x)$ , τότε θα ήταν  $f(x) \cdot f^{-1}(x) = 1$ . \*Αν έπομένως ό βαθμός του  $f^{-1}(x)$  είναι με  $\mathbf{N}_0$ , τότε ό βαθμός του  $f(x) \cdot f^{-1}(x)$  θα είναι  $v + \mu > 0$ , πράγμα άτοπο, άφοϋ τό β' μέλος τής  $f(x)f^{-1}(x) = 1$  είναι τό πολυώνυμο 1 πού έχει βαθμό μηδέν.

β) \*Αν είναι  $f(x) = \alpha_0 \neq 0$ , τότε τό σταθερό πολυώνυμο  $\frac{1}{\alpha_0}$  είναι τό αντίστροφο του  $f(x)$ , άφοϋ  $\alpha_0 \cdot \frac{1}{\alpha_0} = 1$ .

\*Έτσι βλέπουμε ότι ή **δομή**  $(C_{[x]}, +, \cdot)$  **δέν είναι σῶμα**. Για τή δομή ὁμος αυτή ισχύει ή συνεπαγωγή  $f(x) \cdot g(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$  είτε  $g(x) = 0$ , δηλαδή ή **δομή**  $(C_{[x]}, +, \cdot)$  **είναι άκέραια περιοχή**.

Πράγματι· αν ήταν  $f(x) \neq 0$  καί  $g(x) \neq 0$  με μεγιστοβάθμιους όρους αντίστοιχα  $\alpha_\nu x^\nu$  καί  $\beta_\mu x^\mu$ , τότε τό γινόμενο  $f(x) \cdot g(x)$  θα είχε τόν όρο  $\alpha_\nu \beta_\mu x^{\nu+\mu}$  με  $\alpha_\nu \beta_\mu \neq 0$ , τό όποιο σημαίνει ότι τό γινόμενο δέ θα ήταν τό μηδενικό πολυώνυμο.

Θά δείξουμε τώρα ότι **κάθε μη μηδενικό πολυώνυμο είναι άπλοποιήσιμο στοιχείο ως προς τήν πράξη του πολλαπλασιασμού στό  $C_{[x]}$**  (νόμος διαγραφής), πού είναι ιδιότητα κάθε άκέραιας περιοχής. Δηλαδή θα δείξουμε ότι:

$$\left. \begin{array}{l} f(x) \cdot \varphi(x) = g(x) \cdot \varphi(x) \\ \varphi(x) \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) = g(x)$$

$$\text{Πράγματι: } \left. \begin{array}{l} f(x) \cdot \varphi(x) = g(x) \cdot \varphi(x) \\ \varphi(x) \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} (f(x) - g(x)) \cdot \varphi(x) = 0 \\ \varphi(x) \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x) - g(x) = 0 \Rightarrow f(x) = g(x).$$

**Δυνάμεις** με έκθέτη  $v \in \mathbf{N}_0$  ενός πολυωνύμου  $f(x) \in C_{[x]}$  **όρίζονται** με τόν ακόλουθο τρόπο:

$$\alpha) [f(x)]^2 = f(x) \cdot f(x) \text{ καί } [f(x)]^{k+1} = [f(x)]^k \cdot f(x) \text{ με } k \in \mathbf{N} \text{ καί } k > 1$$

(\*Έπαγωγικά).

$$\beta) [f(x)]^1 = f(x) \text{ καί}$$

$$\gamma) [f(x)]^0 = 1, \text{ όταν } f(x) \neq 0$$

Μετά τόν όρισμό τών δυνάμεων, αν

$$\begin{aligned} f(x) &= \alpha_\nu x^\nu + \alpha_{\nu-1} x^{\nu-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 \neq 0 \text{ καί} \\ \varphi(x) &= \beta_\mu x^\mu + \beta_{\mu-1} x^{\mu-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0 \neq 0 \end{aligned}$$

είναι δύο πολυώνυμα, τότε τό  $f(\varphi(x))$  είναι τό πολυώνυμο

$$\alpha_\nu (\varphi(x))^\nu + \alpha_{\nu-1} (\varphi(x))^{\nu-1} + \dots + \alpha_1 (\varphi(x)) + \alpha_0.$$

## IV 1.7.

Τό πολυώνυμο αυτό, μετά τήν εκτέλεση τῶν πράξεων, γίνεται ἕνα πολυώνυμο τοῦ  $x$  μέ βαθμὸ ἴσο μέ τό γινόμενο τῶν βαθμῶν τῶν  $f(x)$  καί  $\varphi(x)$ . Ἄν τό  $\varphi(x)$  εἶναι τό σταθερό πολυώνυμο, π.χ.  $\varphi(x) = \alpha$ , τότε τό  $f(\alpha)$  θά εἶναι ἐπίσης σταθερό πολυώνυμο.

### 1.6. Παραδείγματα.

1. Νά προσδιοριστοῦν τά  $\alpha, \beta, \gamma$  ὥστε νά ἰσχύει ἡ ἰσότητα

$$f(x) \cdot \varphi(x) = g(x) - \sigma(x), \text{ μέ } f(x) = x^2 - 2x + 3, \quad \varphi(x) = x - 1 \\ g(x) = (\alpha + 1)x^3 + (\beta - 2)x^2 + (\gamma^2 - 20)x + 2 \text{ καί } \sigma(x) = 5x + 5$$

Λύση: Ἐκτελώντας τίς πράξεις παίρνομε:

$$f(x) \cdot \varphi(x) = (x^2 - 2x + 3) \cdot (x - 1) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3 \text{ καί} \\ g(x) - \sigma(x) = (\alpha + 1)x^3 + (\beta - 2)x^2 + (\gamma^2 - 25)x - 3.$$

Ζητοῦνται τά  $\alpha, \beta, \gamma$ , ὥστε νά ἰσχύει ἡ ἰσότητα

$$x^3 - 3x^2 + 5x - 3 = (\alpha + 1)x^3 + (\beta - 2)x^2 + (\gamma^2 - 25)x - 3.$$

Γιά νά συμβαίνει αὐτό, ἀρκεῖ νά συναληθεύουν οἱ ἐξισώσεις

$$\alpha + 1 = 1, \quad \beta - 2 = -3, \quad \gamma^2 - 25 = 5 \text{ καί } -3 = -3,$$

ἀπό τίς ὁποῖες εὐκόλα παίρνομε  $\alpha = 0$ ,  $\beta = -1$  καί  $\gamma = \pm \sqrt{30}$ .

2. Ἄν  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ ,  $\varphi(x) = x - 1$  καί  $g(x) = (\alpha - \beta)x^2 - (2\alpha - \beta)x - \alpha + \beta - \gamma$  νά προσδιοριστοῦν τά  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ , ὥστε νά ἰσχύει ἡ ἰσότητα  $g(x) = f(\varphi(x))$ .

Λύση: Εἶναι  $f(\varphi(x)) = 2(x-1)^2 - 3(x-1) + 1$   
 $= 2(x^2 - 2x + 1) - 3(x-1) + 1 = 2x^2 - 4x + 2 - 3x + 3 + 1 = 2x^2 - 7x + 6$

καί ζητεῖται νά εἶναι:  $(\alpha - \beta)x^2 - (2\alpha - \beta)x - \alpha + \beta - \gamma = 2x^2 - 7x + 6$

Γιά νά ἰσχύει ἡ τελευταία σχέση, ἀρκεῖ νά ἔχει λύση τό σύστημα:

$$\alpha - \beta = 2, \quad -2\alpha + \beta = -7, \quad -\alpha + \beta - \gamma = 6$$

Ἐπιλύοντας τό σύστημα αὐτό παίρνομε  $\alpha = 5$ ,  $\beta = 3$ ,  $\gamma = -8$ .

### 1.7. Ἀσκήσεις

- Ἄν ἡ διαφορά δύο πολυωνύμων εἶναι τό μηδενικό πολυώνυμο, δεῖξτε ὅτι τά πολυώνυμα αὐτά εἶναι ἴσα.
- Ἄν  $\nu$  καί  $\mu$  εἶναι ἀντίστοιχα οἱ βαθμοὶ δύο πολυωνύμων  $f(x)$  καί  $g(x)$ , μέ  $\nu \geq \mu$ , δεῖξτε ὅτι ὁ βαθμὸς τοῦ πολυωνύμου  $f(x) + g(x)$  εἶναι τό πολύ ἴσος μέ  $\nu$ .
- Νά προσδιοριστοῦν τά  $\alpha$  καί  $\beta$ , ὥστε νά ἰσχύει ἡ ἰσότητα  
$$4x^3 + 20x^2 + 33x = (2x + 5)(2x + 3) \cdot (\alpha x + \beta) + 2x - 15$$
- Ἄν  $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 7x + 6$  καί  $g(x) = \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0$ , βρεῖτε τίς τιμές τῶν  $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , ὥστε ἡ διαφορά  $f(x) - g(x)$  νά εἶναι πολυώνυμο:  
i) 3ου βαθμοῦ, ii) τό πολύ 2ου βαθμοῦ, iii) 1ου βαθμοῦ  
iv) μηδενικοῦ βαθμοῦ καί  $\nu$ ) τό μηδενικό.
- Νά προσδιοριστοῦν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , ὥστε τό πολυώνυμο  $f(x) = x^4 + \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + 9$  νά εἶναι τό τετράγωνο τοῦ πολυωνύμου  $g(x) = x^2 + x + \delta$ .
- Δεῖξτε ὅτι οἱ συνθηκῆς  $\beta = \frac{\alpha^2}{4} + \frac{2\gamma}{\alpha}$  καί  $\delta = \frac{\gamma^2}{\alpha^2}$  εἶναι ἀναγκαῖες καί ἰκανές, ὥστε τό

πολυώνυμο  $f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d$ ,  $a \in \mathbb{R} - \{0\}$  και  $b, c, d \in \mathbb{R}$  να είναι το τετράγωνο ενός πολυωνύμου  $g(x)$  με πραγματικούς συντελεστές.

- Δίνεται το πολυώνυμο  $f(x)=9x^4-30x^3+37x^2-14x-1$ . Βρείτε δύο πολυώνυμα  $g(x)$  και  $\pi(x)$ , 2ου και 1ου βαθμού αντίστοιχως, ώστε να είναι  $f(x) = (g(x))^2 + \pi(x)$ .
- Δίνεται το πολυώνυμο  $f(x)=4x^4-8x^3+ax+\beta$ . Βρείτε πολυώνυμο  $g(x)$ , ώστε η διαφορά  $f(x)-(g(x))^2$  να είναι πολυώνυμο τό πολύ 1ου βαθμού. Ήπειτα να προσδιορίσετε τα  $a$  και  $\beta$ , ώστε το  $f(x)$  να είναι τέλειο τετράγωνο πολυωνύμου.
- \*Αν είναι  $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3=3\alpha\beta\gamma$  και  $\alpha+\beta+\gamma \neq 0$ , όπου  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ , δείξτε ότι το πολυώνυμο  $f(x)=\kappa(\alpha-\beta)x^2+\lambda(\beta-\gamma)x+\mu(\gamma-\alpha)$ , με  $\kappa, \lambda, \mu \in \mathbb{C}$  είναι το μηδενικό πολυώνυμο.
- Βρείτε όλα τα τριώνυμα  $f(x)=ax^2+bx+c$ , με  $a \neq 0$ , τα όποια ικανοποιούν την ισότητα  $f(x+1)=f(-x)$ .

## 2. ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

Στήν παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε την έννοια τής διαιρετότητας στο  $\mathbb{C}_{[x]}$  και θα δούμε προτάσεις ανάλογες με εκείνες που είδαμε στο κεφάλαιο των άκεραιων αριθμών.

### 2.1. Ή έννοια τής διαιρετότητας στο $\mathbb{C}_{[x]}$ .

\*Αν  $f(x)$  και  $g(x)$  είναι δύο πολυώνυμα του  $\mathbb{C}_{[x]}$  και υπάρχει πολυώνυμο  $\pi(x)$ , ώστε να ισχύει

$$f(x) = g(x) \pi(x), \quad (1)$$

τότε λέμε ότι το  $g(x)$  είναι παράγοντας του πολυωνύμου  $f(x)$ . Φυσικά τότε και τό  $\pi(x)$  είναι παράγοντας του  $f(x)$ .

\*Αν έχουμε ακόμα ότι  $g(x) \neq 0$ , τότε θα λέμε ότι:

τό  $g(x)$  διαιρεί τό πολυώνυμο  $f(x)$  ή είναι διαιρέτης του  $f(x)$  (συμβολικά  $g(x)|f(x)$ ) ή τό  $f(x)$  διαιρείται μέ τό  $g(x)$  ή ότι είναι πολλαπλάσιο του  $g(x)$ .

Στήν περίπτωση αυτή, όπως γνωρίζουμε, τό  $\pi(x)$  ονομάζεται και ηλίκο τής τέλειας διαιρέσεως του  $f(x)$  μέ τό  $g(x)$  και είναι μοναδικό.

Τό τελευταίο αποδεικνύεται όπως ή πρόταση 2 τής 1.1 του Κεφ. III και τότε γράφουμε και  $\pi(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ .

**Παρατηρήσεις:**

1. \*Αν  $f(x) \cdot g(x) \neq 0$  και βαθμ.  $f(x) <$  βαθμ.  $g(x)$ , τότε είναι φανερό ότι δέν υπάρχει πολυώνυμο  $\pi(x)$  που να ικανοποιεί την (1).

2. \*Αν  $f(x) \cdot g(x) \neq 0$  και υπάρχει  $\pi(x)$  που ικανοποιεί την (1), τότε είναι: βαθμ.  $\pi(x) =$  βαθμ.  $f(x) -$  βαθμ.  $g(x)$

## IV 2.2.

3. "Αν τὰ  $f(x)$  καί  $g(x)$  ἔχουν πραγματικούς συντελεστές, τότε καί τό  $\pi(x)$  θά ἔχει πραγματικούς συντελεστές. Εἶναι ὁμως δυνατό ἓνα πολυώνυμο  $f(x)$  μέ πραγματικούς συντελεστές νά ἔχει διαιρέτες πολυώνυμα μέ μιγαδικούς συντελεστές. Αὐτό φαίνεται ἀμέσως ἀπό τήν ἰσότητα

$$x^2 + 1 = (x+i) \cdot (x-i).$$

## 2.2. Ἰδιότητες τῆς διαιρετότητας τῶν πολυωνύμων τοῦ $\mathbf{C}_{[x]}$ .

Ἐδῶ θά δοῦμε, χωρίς νά κάνουμε ὅλες τίς ἀποδείξεις, μερικές ἰδιότητες τῆς διαιρετότητας τῶν πολυωνύμων τοῦ  $\mathbf{C}_{[x]}$ . Πολλές ἀπό αὐτές εἶναι ὅμοιες μέ τίς ἰδιότητες τῆς διαιρετότητας τῶν ἀκέραιων ἀριθμῶν πού εἶδαμε στήν παράγραφο 1.1 τοῦ Κεφ. III.

1. Ἡ σχέση τῆς διαιρετότητας δύο πολυωνύμων εἶναι μεταβατική, δηλαδή  $\delta\tilde{v}n \ g(x) \mid f(x)$  καί  $f(x) \mid \varphi(x)$ , τότε  $g(x) \mid \varphi(x)$ .

2. "Αν  $g(x)$  εἶναι διαιρέτης τῶν πολυωνύμων  $f(x)$  καί  $\varphi(x)$ , τότε θά εἶναι ἐπίσης διαιρέτης τοῦ πολυωνύμου  $f(x) + \varphi(x)$ .

3. "Αν  $g(x)$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $f(x)$ , τότε τό  $g(x)$  εἶναι διαιρέτης καί τοῦ γινομένου τοῦ  $f(x)$  μέ κάθε πολυώνυμο  $\varphi(x)$ .

"Από τίς 2 καί 3 ἔχουμε τήν ἀκόλουθη ἰδιότητα.

4. "Αν τό πολυώνυμο  $g(x)$  εἶναι διαιρέτης καθενός ἀπό τά πολυώνυμα  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ , τότε τό  $g(x)$  εἶναι ἐπίσης διαιρέτης τοῦ πολυωνύμου

$$f_1(x) \cdot \varphi_1(x) + f_2(x) \cdot \varphi_2(x) + \dots + f_k(x) \cdot \varphi_k(x),$$

ὅπου  $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_k(x)$  εἶναι τυχόντα πολυώνυμα.

5. Κάθε πολυώνυμο  $f(x)$  διαιρεῖται μέ κάθε πολυώνυμο μηδενικοῦ βαθμοῦ.

"Απόδειξη: "Αν  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$  καί  $g(x) = \kappa \neq 0$  (δηλ. μηδενικοῦ βαθμοῦ πολυώνυμο), τότε θά εἶναι

$$f(x) = \kappa \cdot \left( \frac{\alpha_n}{\kappa} x^n + \frac{\alpha_{n-1}}{\kappa} x^{n-1} + \dots + \frac{\alpha_1}{\kappa} x + \frac{\alpha_0}{\kappa} \right)$$

6. "Αν τό  $g(x)$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $f(x)$ , τότε τό  $\kappa \cdot g(x)$  (μέ  $\kappa$  τυχόντα μή μηδενικό ἀριθμό) εἶναι ἐπίσης διαιρέτης τοῦ  $f(x)$ .

"Απόδειξη: "Αφοῦ  $f(x) = g(x) \pi(x)$ , τότε

$$f(x) = \kappa \cdot \frac{1}{\kappa} \cdot g(x) \pi(x) \Leftrightarrow f(x) = (\kappa g(x)) \cdot (\kappa^{-1} \pi(x)).$$

7. Τά μοναδικά πολυώνυμα, τά ὁποῖα εἶναι διαιρέτες τοῦ  $f(x) \neq 0$  καί ἔχουν τόν ἴδιο βαθμό μέ αὐτό, εἶναι τά  $\kappa \cdot f(x)$ , μέ  $\kappa \neq 0$ .

"Απόδειξη: α) Εἶναι  $f(x) = \kappa \cdot \kappa^{-1} f(x) \Leftrightarrow f(x) = (\kappa f(x)) \cdot \kappa^{-1}$ , δηλαδή τό  $\kappa f(x)$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $f(x)$ . β) "Αν  $g(x)$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $f(x)$  καί  $g(x)$  ἔχει τόν ἴδιο βαθμό μέ τό  $f(x)$ , τότε τό πηλίκο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μέ τό  $g(x)$  πρέπει νά εἶναι μηδενικοῦ βαθμοῦ πολυώνυμο, δηλαδή  $f(x) = g(x) \cdot \lambda$ ,  $\lambda \neq 0$ . "Από τήν τελευταία σχέση ἔχουμε  $g(x) = \lambda^{-1} f(x) = \kappa f(x)$ , ( $\kappa = \lambda^{-1} \neq 0$ ).

8. "Αν τό  $g(x)$  είναι διαιρέτης του  $f(x)$  και τό  $f(x)$  είναι διαιρέτης του  $g(x)$ , τότε θά είναι  $g(x) = kf(x)$ ,  $k \neq 0$ , και θά λέμε ότι τά πολυώνυμα  $f(x)$  και  $g(x)$  διαφέρουν κατά πολλαπλασιαστική σταθερά.

**Σημείωση:** 'Από όλα τά πολυώνυμα  $kf(x)$ ,  $k \neq 0$  πού διαιρούν τό  $f(x)$ , παίρνουμε πολλές φορές ώς «άντιπρόσωπο» έκείνο πού έχει συντελεστή του μεγιστοβάθμιου όρου τή μονάδα. Π.χ. αν  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$ ,  $\alpha_n \neq 0$ , τότε μπορούμε νά πάρουμε ώς αντιπρόσωπο όλων τών  $kf(x)$ ,  $k \neq 0$ , τό πολυώνυμο

$$g(x) = \frac{1}{\alpha_n} f(x) = x^n + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} x^{n-1} + \dots + \frac{\alpha_1}{\alpha_n} x + \frac{\alpha_0}{\alpha_n}.$$

'Επειδή ή σχέση τής διαιρετότητας δύο πολυωνύμων δέ μεταβάλλεται αν τό ένα από αυτά (ή και τά δύο) αντικατασταθεί από κάποιο άλλο, πού διαφέρει από αυτό κατά πολλαπλασιαστική σταθερά, στά έπόμενα, όταν γράφουμε  $\delta(x) \mid f(x)$  θά έννοούμε και όλους τούς άλλους διαιρέτες του  $f(x)$  τής μορφής  $k \cdot \delta(x)$  μέ  $k \neq 0$ .

'Ετσι, μέ τά  $1 \mid f(x)$  και  $f(x) \mid f(x)$  μέ  $f(x) \neq 0$  έννοούμε και  $k \mid f(x)$ ,  $k \neq 0$  και  $kf(x) \mid f(x)$ ,  $k \neq 0$ .

Τά  $k$  και  $k \cdot f(x)$  μέ  $k \neq 0$  ονομάζονται προφανείς διαιρέτες του  $f(x)$ . Κάθε άλλος διαιρέτης του  $f(x)$  ονομάζεται γνήσιος διαιρέτης του  $f(x)$ .

"Αν ένα μή σταθερό πολυώνυμο  $f(x)$  έχει μόνο προφανείς διαιρέτες, τότε ονομάζεται πρώτο ή ανάγωγο πολυώνυμο.

Τό νά είναι ένα πολυώνυμο  $f(x)$  ανάγωγο ή όχι εξαρτάται από τό σύνολο στό όποίο τό εξετάζουμε. Π.χ. τό πολυώνυμο  $x^2 + 1$  είναι ανάγωγο στό σύνολο  $R_{[x]}$ , αλλά δέν είναι ανάγωγο στό  $C_{[x]}$ , γιατί τά  $(x \pm i) \in C_{[x]}$  είναι γνήσιοι διαιρέτες του. 'Επίσης τό  $x^2 - 2$  είναι ανάγωγο στό σύνολο  $Q_{[x]}$ , αλλά δέν είναι ανάγωγο στό  $R_{[x]}$ , γιατί τά  $(x \pm \sqrt{2}) \in R_{[x]}$  είναι γνήσιοι διαιρέτες του.

### 2.3. 'Η άλγοριθμική διαίρεση.

Σέ μικρότερη τάξη μάθαμε νά έκτελούμε διαιρέσεις μεταξύ πολυωνύμων μέ πραγματικούς συντελεστές. Οί διαιρέσεις αυτές μπορούν νά έκτελεστούν και μέ πολυώνυμα του  $C_{[x]}$  μέ τόν ίδιο άκριβώς τρόπο. 'Εδω θά άποδείξουμε τό άκόλουθο θεώρημα, πού είναι γνωστό ώς θεώρημα τής άλγοριθμικής ή Ευκλείδειας διαιρέσεως.

**Θεώρημα:** "Αν  $f(x)$  και  $g(x)$  είναι δύο πολυώνυμα του  $C_{[x]}$  μέ  $g(x) \neq 0$ , τότε ύπάρχει ένα μοναδικό ζεύγος πολωνύμων  $\pi(x)$  και  $\nu(x)$  του  $C_{[x]}$ , μέ  $\nu(x) = 0$  ή  $\text{βαθμ.}\nu(x) < \text{βαθμ.}\ g(x)$ , τέτοιο ώστε

$$f(x) = g(x) \pi(x) + \nu(x) \quad (1)$$

**'Απόδειξη:** Θά άποδείξουμε πρώτα ότι ύπάρχουν δύο πολωνύμα  $\pi(x)$  και  $\nu(x)$  πού ίκανοποιούν τό θεώρημα.

"Αν  $f(x) = 0$ , τότε τά πολυώνυμα  $\pi(x) = 0$  και  $\nu(x) = 0$ , ίκανοποιούν τό θεώρημα.

"Ας ύποθέσουμε τώρα ότι:

### IV 2.3.

$$f(x) = \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0, \alpha_v \neq 0 \text{ και}$$

$$g(x) = \beta_\mu x^\mu + \beta_{\mu-1} x^{\mu-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0, \beta_\mu \neq 0.$$

Τότε:

"Αν  $v < \mu$ , τότε τὰ πολυώνυμα  $\pi(x) = 0$  και  $u(x) = f(x)$ , ίκανοποιούν τὸ θεώρημα.

"Αν  $v \geq \mu$ , τότε θέτοντας

$$f(x) - \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} x^{v-\mu} \cdot g(x) = u_1(x) \quad (B1)$$

παίρνουμε ἓνα πολυώνυμο  $u_1(x)$  μέ τήν ιδιότητα  $u_1(x) = 0$  ἢ βαθμ.  $u_1(x) = v_1 < v$ .

"Αν τώρα εἶναι  $u_1(x) = 0$  ἢ  $v_1 < \mu$ , τότε τὰ πολυώνυμα

$$\pi_1(x) = \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} x^{v-\mu} \text{ και } u_1(x)$$

ίκανοποιούν τὸ θεώρημα. "Αν ὁμως εἶναι  $v_1 \geq \mu$  και  $\kappa_1$  εἶναι ὁ συντελεστής τοῦ μεγιστοβάθμιου ὄρου τοῦ  $u_1(x)$ , τότε θέτοντας

$$u_1(x) - \frac{\kappa_1}{\beta_\mu} x^{v_1-\mu} \cdot g(x) = u_2(x) \quad (B2)$$

παίρνουμε ἓνα πολυώνυμο  $u_2(x)$  μέ τήν ιδιότητα  $u_2(x) = 0$  ἢ βαθμ.  $u_2(x) = v_2 < v_1$ .

"Αν λοιπόν εἶναι  $u_2(x) = 0$  ἢ  $v_2 < \mu$ , τότε τὰ πολυώνυμα

$$\pi_2(x) = \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} x^{v-\mu} + \frac{\kappa_1}{\beta_\mu} x^{v_1-\mu} \text{ και } u_2(x)$$

ίκανοποιούν τὸ θεώρημα, ἐνῶ ἂν εἶναι  $v_2 \geq \mu$  και  $\kappa_2$  εἶναι ὁ συντελεστής τοῦ μεγιστοβάθμιου ὄρου τοῦ  $u_2(x)$ , τότε θέτουμε

$$u_2(x) - \frac{\kappa_2}{\beta_\mu} x^{v_2-\mu} \cdot g(x) = u_3(x) \quad (B3)$$

και συνεχίζουμε τήν ἴδια διαδικασία.

"Επειδή οἱ βαθμοὶ  $v_1, v_2, v_3, \dots$  τῶν πολυωνύμων  $u_1(x), u_2(x), u_3(x), \dots$  ἐλαττώνονται διαρκῶς (ἐκτός ἂν συμβεῖ  $u_p(x) = 0$ , ὁπότε τελειώνει ἐκεῖ ἡ διαδικασία), δηλαδή ἐπειδή εἶναι  $v > v_1 > v_2 > v_3 > \dots$ , θά φτάσουμε μετὰ ἀπὸ πεπερασμένο πλῆθος βημάτων  $(B_1, B_2, \dots, B_\lambda)$ , σέ ἓνα πολυώνυμο  $u_\lambda(x)$ , πού ὀρίζεται ἀπὸ τήν ἰσότητα

$$u_{\lambda-1}(x) - \frac{\kappa_{\lambda-1}}{\beta_\mu} x^{v_{\lambda-1}-\mu} \cdot g(x) = u_\lambda(x) \quad (B\lambda)$$

γιά τὸ ὁποῖο θά εἶναι  $u_\lambda(x) = 0$  ἢ βαθμ.  $u_\lambda(x) < \mu$ . Προσθέτοντας τότε τίς ἰσότητες (B1), (B2), ..., (Bλ) κατὰ μέλη παίρνουμε τήν ἰσότητα

$$f(x) - \left[ \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} x^{v-\mu} + \frac{\kappa_1}{\beta_\mu} x^{v_1-\mu} + \dots + \frac{\kappa_{\lambda-1}}{\beta_\mu} x^{v_{\lambda-1}-\mu} \right] g(x) = u_\lambda(x),$$

$$\text{δηλαδή τήν } f(x) = \left[ \frac{\alpha_\nu}{\beta_\mu} x^{\nu-\mu} + \frac{\kappa_1}{\beta_\mu} x^{\nu_1-\mu} + \dots + \frac{\kappa_{\lambda-1}}{\beta_\mu} x^{\nu_{\lambda-1}-\mu} \right] \cdot g(x) + u_\lambda(x)$$

πού φανερώνει ὅτι τὰ πολυώνυμα

$$\pi(x) = \frac{\alpha_\nu}{\beta_\mu} x^{\nu-\mu} + \frac{\kappa_1}{\beta_\mu} x^{\nu_1-\mu} + \dots + \frac{\kappa_{\lambda-1}}{\beta_\mu} x^{\nu_{\lambda-1}-\mu} \quad \text{καί} \quad u(x) = u_\lambda(x)$$

ίκανοποιοῦν τό θεώρημα.

Θά δείξουμε ὅτι τὰ πολυώνυμα  $\pi(x)$  καί  $u(x)$  εἶναι μοναδικά.

Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἐκτός ἀπό τὰ  $\pi(x)$  καί  $u(x)$ , ὑπάρχουν καί τὰ πολυώνυμα  $\pi'(x)$  καί  $u'(x)$  πού ἰκανοποιοῦν τό θεώρημα, δηλαδή ὅτι εἶναι:

$$f(x) = g(x) \cdot \pi'(x) + u'(x) \quad (1')$$

μέ  $u'(x) = 0$  ἢ βαθμ  $u'(x) < \text{βαθμ } g(x)$ . Τότε θά ἔχουμε:

$$\begin{aligned} g(x) \cdot \pi(x) + u(x) &= g(x) \pi'(x) + u'(x) && \text{ἢ} \\ g(x) [\pi(x) - \pi'(x)] &= u'(x) - u(x) && (2) \end{aligned}$$

Ἡ (2) ἰσχύει μόνο στήν περίπτωση πού εἶναι  $\pi(x) - \pi'(x) = 0$ , ὅποτε θά εἶναι καί  $u'(x) - u(x) = 0$ . Γιατί, ἂν εἶναι  $\pi(x) - \pi'(x) \neq 0$ , τότε θά εἶναι

$$\text{βαθμ } g(x) [\pi(x) - \pi'(x)] = \text{βαθμ } (u'(x) - u(x)) \geq \text{βαθμ } g(x)$$

ἐνῶ εἶναι συγχρόνως

$$\text{βαθμ } (u(x) - u'(x)) < \text{βαθμ } g(x)$$

πράγμα ἄτοπο.

Ἄρα ἀποδείχτηκε ὅτι

$$\pi'(x) = \pi(x) \quad \text{καί} \quad u'(x) = u(x)$$

δηλαδή ὅτι τὰ  $\pi(x)$  καί  $u(x)$  εἶναι μοναδικά.

Ἡ πορεία μέ τήν ὁποία ἀποδείχτηκε τό θεώρημα, μᾶς δείχνει καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο βρίσκουμε τὰ πολυώνυμα  $\pi(x)$  καί  $u(x)$ . Ἡ εὑρεση τῶν  $\pi(x)$  καί  $u(x)$  ὀνομάζεται **ἀλγοριθμική ἢ Εὐκλείδεια διαίρεση τοῦ  $f(x)$  μέ τό  $g(x)$** . Τά πολυώνυμα  $f(x)$ ,  $g(x)$ ,  $\pi(x)$  καί  $u(x)$  ὀνομάζονται ἀντίστοιχα **διαιρέτος, διαιρέτης, πηλίκο καί ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μέ τό  $g(x)$** . Ἡ ἰσότητα (1) μέ τίς προϋποθέσεις τοῦ θεωρήματος ὀνομάζεται **ἰσότητα τῆς ἀλγοριθμικῆς διαιρέσεως**.

**Παρατηρήσεις:**

1. Ἀπό τήν ἀπόδειξη τοῦ θεωρήματος, συμπεραίνουμε ὅτι οἱ συντελεστές τῶν πολυωνύμων  $\pi(x)$  καί  $u(x)$  εἶναι πραγματικοί, ὅταν τὰ πολυώνυμα  $f(x)$  καί  $g(x)$  ἀνήκουν στό  $\mathbf{R}[x]$ .
2. Εἶναι φανερό ὅτι, ὅταν εἶναι  $\text{βαθμ } f(x) \geq \text{βαθμ } g(x)$ , τότε ἰσχύει:
 
$$\text{βαθμ } \pi(x) = \text{βαθμ } f(x) - \text{βαθμ } g(x)$$
3. Ἄν εἶναι  $u(x) = 0$ , τότε ἔχουμε τήν **τέλεια διαίρεση** πού ἀναφέραμε προηγουμένως.

## 2.4. Μέγιστος κοινός διαιρέτης πολυωνύμων του $C_{[x]}$ .

Ἐπειδὴ  $x^2 - 5x + 6 = (x-2) \cdot (x-3)$  καὶ  $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ , τὸ πολυώνυμο  $x-2$  διαιρεῖ καὶ τὰ δύο πολυώνυμα  $x^2 - 5x + 6$  καὶ  $x^2 - 4$ . Γενικά, ἂν ἕνα πολυώνυμο  $g(x)$  διαιρεῖ δύο ἢ περισσότερα πολυώνυμα, τότε ὀνομάζεται κοινός διαιρέτης τῶν πολυωνύμων αὐτῶν. Εἶναι φανερό ὅτι στοὺς κοινούς διαιρέτες δύο ἢ περισσότερων πολυωνύμων περιλαμβάνονται καὶ ὅλα τὰ πολυώνυμα μηδενικοῦ βαθμοῦ, δηλ. ὅλοι οἱ μιγαδικοί ἀριθμοὶ ἐκτός ἀπὸ τὸ μηδέν. Ἄν τὰ πολυώνυμα  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  δὲν ἔχουν ἄλλους κοινούς διαιρέτες, ἐκτός ἀπὸ τὰ πολυώνυμα μηδενικοῦ βαθμοῦ, τότε θὰ ὀνομάζονται **πρῶτα μεταξύ τους**.

Εἶναι φανερό ἐπίσης ὅτι κοινὸι διαιρέτες τοῦ μηδενικοῦ πολυωνύμου καὶ ἑνὸς πολυωνύμου  $f(x)$  εἶναι ὅλοι οἱ διαιρέτες τοῦ  $f(x)$  καὶ, σύμφωνα μὲ τὴν παρατήρηση 1 τῆς 2.1., κανένας διαιρέτης ἑνὸς μὴ μηδενικοῦ πολυωνύμου δὲν ἔχει βαθμὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ βαθμὸ αὐτοῦ τοῦ πολυωνύμου.

Θὰ δείξουμε τώρα, μὲ τὴν πρόταση τοῦ ἀκολουθεῖ, ὅτι ἂν δοθοῦν δύο ἢ περισσότερα πολυώνυμα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τουλάχιστον τὸ ἕνα δὲν εἶναι τὸ μηδενικὸ πολυώνυμο, μποροῦμε πάντοτε νὰ προσδιορίσουμε ἕνα πολυώνυμο πού τὸ σύνολο τῶν διαιρετῶν του ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολο τῶν κοινῶν διαιρετῶν τῶν πολυωνύμων, πού ἔχουν δοθεῖ.

Ἡ πρόταση ἀναφέρεται σὲ δύο μὴ μηδενικά πολυώνυμα, γιατί ἂν τὸ ἕνα εἶναι τὸ μηδενικὸ, τότε, σύμφωνα μὲ ὅσα εἶπαμε παραπάνω, τὸ ἄλλο πολυώνυμο εἶναι τὸ ζητούμενο.

**Πρόταση:** Ἄν  $f(x)$  καὶ  $g(x)$  εἶναι δύο μὴ μηδενικά πολυώνυμα τοῦ  $C_{[x]}$ , μὲ βαθμ.  $f(x) \geq$  βαθμ.  $g(x)$  καὶ  $\delta(x)$  εἶναι ἕνας κοινός διαιρέτης τους, τότε τὸ  $\delta(x)$  θὰ εἶναι κοινός διαιρέτης καὶ τῶν πολυωνύμων  $g(x)$  καὶ  $u(x)$ , ὅπου  $u(x)$  εἶναι τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μὲ τὸ  $g(x)$ , καὶ ἀντίστροφα.

**Ἀπόδειξη.** Ἄν  $\pi(x)$  καὶ  $v(x)$  εἶναι τὸ πηλίκο καὶ τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μὲ τὸ  $g(x)$ , τότε θὰ ἔχουμε

$$f(x) = g(x)\pi(x) + u(x) \quad \text{ἢ} \quad f(x) - g(x)\pi(x) = u(x)$$

Ἄλλὰ τὸ  $\delta(x)$  εἶναι διαιρέτης τοῦ πρώτου μέλους τῆς τελευταίας ἰσότητας, ὁπότε θὰ εἶναι καὶ διαιρέτης τοῦ  $u(x)$ . Ἄρα τὸ  $\delta(x)$  εἶναι κοινός διαιρέτης τῶν πολυωνύμων  $g(x)$  καὶ  $u(x)$ .

**Ἀντίστροφα:** Ἄν εἶναι  $\delta(x) \mid g(x)$  καὶ  $\delta(x) \mid u(x)$ , τότε θὰ εἶναι καὶ

$$\delta(x) \mid [g(x)\pi(x) + u(x)] = f(x),$$

δηλαδή τὸ  $\delta(x)$  θὰ εἶναι κοινός διαιρέτης τῶν  $f(x)$  καὶ  $g(x)$ .

Ἄρα οἱ κοινὸι διαιρέτες τῶν  $f(x)$  καὶ  $g(x)$  ταυτίζονται μὲ τοὺς κοινούς διαιρέτες τῶν  $g(x)$  καὶ  $u(x)$ .

Ἄν λοιπὸν εἶναι  $u(x) = 0$ , τότε οἱ κοινὸι διαιρέτες τῶν  $f(x)$  καὶ  $g(x)$  θὰ

είναι οί διαιρέτες του  $g(x)$ . "Αν όμως είναι  $u(x) \neq 0$ , τότε οί κοινοί διαιρέτες τών  $f(x)$  και  $g(x)$  θά είναι οί κοινοί διαιρέτες τών  $u(x)$  και  $u_1(x)$ , όπου  $u_1(x)$  τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του  $g(x)$  μέ τό  $u(x)$ . "Αν τώρα είναι  $u_1(x) = 0$ , τότε οί κοινοί διαιρέτες τών  $f(x)$  και  $g(x)$  θά είναι οί διαιρέτες του  $u(x)$ , ενώ αν είναι  $u_1(x) \neq 0$ , συνεχίζουμε τήν ίδια διαδικασία. "Η διαδικασία αυτή, έπειδή είναι βαθμ  $u(x) >$  βαθμ  $u_1(x) > \dots$ , θά σταματήσει, όταν κάποιο υπόλοιπο, έστω τό  $u_\lambda(x)$ , είναι τό μηδενικό πολυώνυμο. Τότε οί κοινοί διαιρέτες τών  $f(x)$  και  $g(x)$  θά είναι οί διαιρέτες του  $u_{\lambda-1}(x)$ .

Μπορούμε τώρα γιά πολυώνυμα  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$ , πού κανένα δέν είναι τό μηδενικό πολυώνυμο, νά προσδιορίσουμε ένα πολυώνυμο  $\delta(x)$ , πού οί διαιρέτες του νά είναι οί κοινοί διαιρέτες τών  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$ . Γι' αυτό άρκει νά εφαρμόσουμε τήν παραπάνω διαδικασία γιά τά  $f_1(x)$  και  $f_2(x)$ , μετά γιά τά  $\delta_1(x)$  και  $f_3(x)$ , μετά γιά τά  $\delta_2(x)$  και  $f_4(x)$  κ.ο.κ., όπου τό  $\delta_1(x)$  έχει διαιρέτες τούς κοινούς διαιρέτες τών  $f_1(x)$  και  $f_2(x)$ , τό  $\delta_2(x)$  τούς κοινούς διαιρέτες τών  $\delta_1(x)$  και  $f_3(x)$  κ.τ.λ. ("Αν μερικά από τά  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$  ήταν ίσα μέ τό μηδενικό πολυώνυμο, τότε αυτά δέ μετέχουν στή διαδικασία και γι' αυτό πήραμε μή μηδενικά).

**Τό πολυώνυμο  $\delta(x)$** , πού προσδιορίζουμε μέ τήν παραπάνω διαδικασία, **μαζί μέ τά διαφέροντα από αυτό κατά πολλαπλασιαστική σταθερά**, όπως είναι φανερό, έχει τό μεγαλύτερο βαθμό από όλους τούς κοινούς διαιρέτες τών  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$  και συγχρόνως διαιρείται μέ κάθε άλλον κοινό τους διαιρέτη, γι' αυτό και ονομάζεται **μέγιστος κοινός διαιρέτης** τών  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$ .

Τό πολυώνυμο πού είναι «αντιπρόσωπο» τών πολυωνύμων  $k\delta(x)$ ,  $k \neq 0$  είναι έπομένως **μοναδικό** και λέμε ότι είναι **ό μέγιστος κοινός διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.)** τών πολυωνύμων  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$  και τόν συμβολίζουμε μέ  $\langle f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x) \rangle$ .

"Επειδή, όταν βρούμε ένα Μ.Κ.Δ. τών  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$ , έχουμε συγχρόνως προσδιορίσει και τόν αντιπρόσωπό τους πού είναι ό Μ.Κ.Δ. τους, μέ τό σύμβολο  $\langle f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x) \rangle$  θά συμβολίζουμε τόν Μ.Κ.Δ. τους, αλλά και κάθε άλλο πολυώνυμο πού διαφέρει από αυτόν κατά πολλαπλασιαστική σταθερά. "Ετσι αν τά  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$  είναι πρώτα μεταξύ τους, θά έχουν Μ.Κ.Δ. κάθε μή μηδενικό σταθερό πολυώνυμο και γράφουμε  $\langle f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x) \rangle = k \neq 0$ , αλλά μπορούμε νά γράφουμε και  $\langle f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x) \rangle = 1$ .

"Η διαδικασία πού αναπτύξαμε προηγουμένως, μέ τή βοήθεια τής προτάσεως πού άποδείξαμε, οδηγεί στόν προσδιορισμό του Μ.Κ.Δ. δύο μή μηδενικών πολυωνύμων και ονομάζεται **Ευκλείδειος άλγόριθμος**, έπειδή είναι ίδια μέ τόν Ευκλείδειο άλγόριθμο προσδιορισμού του Μ.Κ.Δ. δύο άκέραιων αριθμών.

Γιά τά πολυώνυμα  $2x^2-2$  και  $8x-8$ , μέ τόν Ευκλείδειο άλγόριθμο έχουμε

$$\langle 2x^2-2, 8x-8 \rangle = \langle 8x-8, 0 \rangle = 8x-8$$

Τό πολυώνυμο  $8x-8$  είναι λοιπόν Μ.Κ.Δ. τών πολυωνύμων  $2x^2-2$  και  $8x-8$ , όπως Μ.Κ.Δ. τους είναι και τό πολυώνυμο  $\frac{1}{4} (8x-8) = 2x-2 = 2(x-1)$  πού

## IV 2.5.

παιρναμε σέ προηγούμενες τάξεις, αλλά και κάθε πολυώνυμο  $\kappa \cdot (8x-8)$ ,  $\kappa \neq 0$ .  
"Όμως ό Μ.Κ.Δ. τους είναι τό πολυώνυμο  $\frac{1}{8}(8x-8) = x-1$ , που έχει συντελεστή του μεγιστοβάθμιου όρου του τή μονάδα και είναι ό «άντιπρόσωπος» των  $\kappa(8x-8)$ ,  $\kappa \neq 0$ .

### 2.5. Έφαρμογές.

1. "Αν  $\varphi(x) \neq 0$  και  $g(x)|f(x)$ , τότε θά είναι  $g(x) \cdot \varphi(x) | f(x) \cdot \varphi(x)$  και αντίστροφα.

'Απόδειξη: Είναι  $g(x) | f(x)$ , δηλ.  $f(x) = g(x) \pi(x)$ . 'Αλλά  $\varphi(x) \neq 0$ , άρα

$$f(x) = g(x) \pi(x) \Leftrightarrow f(x) \cdot \varphi(x) = g(x) \pi(x) \cdot \varphi(x)$$

Οι ισότητες αυτές αποδεικνύουν τό ζητούμενο.

2. "Αν  $\delta(x)$  είναι Μ.Κ.Δ. των πολυώνύμων  $f(x)$  και  $g(x)$ , τότε υπάρχουν δύο πολυώνυμα  $A(x)$  και  $B(x)$ , ώστε νά ισχύει:

$$\delta(x) = A(x)f(x) + B(x)g(x) \quad (1)$$

'Απόδειξη: 'Αφοϋ  $\delta(x)$  είναι Μ.Κ.Δ. των  $f(x)$  και  $g(x)$ , τότε θά είναι  $f(x) \neq 0$  είτε  $g(x) \neq 0$ .

'Ας είναι  $f(x) \neq 0$ . Τότε:

- i) "Αν  $g(x) = 0$ , θά είναι  $\langle f(x), g(x) \rangle = f(x)$  και άρα θά υπάρχει  $\kappa \in \mathbf{C}$ , ώστε νά είναι  $\delta(x) = \kappa \cdot f(x)$ . "Αρα τό πολυώνυμο  $A(x) = \kappa$  μαζί μέ όποιοδήποτε  $B(x) \in \mathbf{C}_{[x]}$  θά ικανοποιούν τήν (1).

- ii) "Αν  $g(x) \neq 0$ , τότε δέ βλάπτεται ή γενικότητα, αν υποθέσουμε άκόμα ότι βαθμ.  $f(x) \geq$  βαθμ.  $g(x)$ . Θά είναι συνεπώς

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \langle g(x), v_1(x) \rangle$$

όπου  $v_1(x)$  τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του  $f(x)$  μέ τό  $g(x)$ .

"Αν τώρα είναι  $v_1(x) = 0$ , τότε τό ζεύγος πολυώνύμων  $A(x) = 0$  και  $B(x) = \kappa$ , όπου  $\kappa \in \mathbf{C}$  μέ  $\kappa g(x) = \delta(x)$  ικανοποιεί τήν (1), άφοϋ τό  $g(x)$  θά είναι επίσης Μ.Κ.Δ. των πολυώνύμων  $f(x)$  και  $g(x)$ . "Αν όμως είναι  $v_1(x) \neq 0$ , τότε τό  $v_1(x)$  μπορεί νά είναι διαιρέτης του  $g(x)$  όποτε θά είναι και Μ.Κ.Δ. των  $f(x)$  και  $g(x)$  ή μπορεί και νά μήν είναι διαιρέτης του. Στην περίπτωση που  $v_1(x) | g(x)$ , επειδή είναι

$$v_1(x) = f(x) - \pi_1(x)g(x) \quad \text{και}$$

υπάρχει κατάλληλο  $\kappa \in \mathbf{C}$ , ώστε νά είναι  $\delta(x) = \kappa \cdot v_1(x)$ , τά πολυώνυμα

$$A(x) = \kappa \quad \text{και} \quad B(x) = -\kappa \cdot \pi_1(x) \quad \text{θά ικανοποιούν τήν (1).}$$

Στήν περίπτωση που τό  $v_1(x)$  δέν είναι διαιρέτης του  $g(x)$ , επειδή

$$\begin{aligned} \langle g(x), v_1(x) \rangle &= \langle v_1(x), u_2(x) \rangle \quad \text{θά έχουμε} \\ u_2(x) &= g(x) - v_1(x) \cdot \pi_2(x) \Leftrightarrow u_2(x) = g(x) - [f(x) - g(x)\pi_1(x)]\pi_2(x) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow u_2(x) = (-\pi_2(x))f(x) + [1 + \pi_1(x)\pi_2(x)]g(x). \end{aligned}$$

"Ετσι αν  $u_2(x) = \langle f(x), g(x) \rangle$ , τότε θά υπάρχει  $\kappa \in \mathbf{C}$  μέ  $\delta(x) = \kappa \cdot u_2(x)$ , όποτε τά πολυώνυμα  $A(x) = \kappa(-\pi_2(x))$  και  $B(x) = \kappa[1 + \pi_1(x)\pi_2(x)]$  θά ικανοποιούν τήν (1), άλλοιως θά συνεχίσουμε τή διαδικασία ως τό κατάλληλο  $u_j(x)$ , ώστε νά είναι  $u_j(x) = \langle f(x), g(x) \rangle$  και θά προσδιορίσουμε τότε τό  $A(x)$  και  $B(x)$ .

3. "Αν ένα πολυώνυμο  $f(x)$  είναι πρώτο πρὸς τά πολυώνυμα  $\varphi(x)$  και  $\psi(x)$ , τότε θά είναι πρώτο και πρὸς τό γινόμενό τους.

'Απόδειξη: 'Αφοϋ  $\langle f(x), \varphi(x) \rangle = 1$ , σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη εφαρμογή, θά υπάρχουν πολυώνυμα  $A(x)$  και  $B(x)$  τέτοια, ώστε:

$$f(x) \cdot A(x) + \varphi(x)B(x) = 1 \Leftrightarrow f(x) \cdot [A(x) \cdot \varphi(x)] + [\varphi(x) \cdot \psi(x)]B(x) = \psi(x).$$

"Αν τὰ πολυώνυμα  $f(x)$  και  $\varphi(x) \cdot \psi(x)$  είχαν και κοινό διαιρέτη  $\delta \chi$  μηδενικού βαθμού, τότε αυτός θα ήταν και διαιρέτης του  $\psi(x)$ , τό όποιο είναι άτοπο, γιατί  $\langle f(x), \psi(x) \rangle = 1$ . "Αρα τό  $f(x)$  είναι πρώτο πρὸς τό  $\varphi(x) \cdot \psi(x)$ .

4. "Αν τό  $\varphi(x)$  διαιρεί τό γινόμενο τῶν  $f(x)$  και  $g(x)$  και είναι πρώτο πρὸς τό  $f(x)$ , τότε θά διαιρεί τό  $g(x)$ .

"Απόδειξη: "Αν  $g(x) = 0$ , τότε τό  $\varphi(x)$  είναι διαιρέτης του  $g(x)$ . "Εστω τώρα  $g(x) \neq 0$ , τότε όπως και προηγουμένως έχουμε

$$f(x) \cdot A(x) + \varphi(x) \cdot B(x) = 1 \Leftrightarrow [f(x)g(x)] \cdot A(x) + \varphi(x) \cdot [B(x) \cdot g(x)] = g(x).$$

Τό άριστερό μέλος διαιρείται μέ τό  $\varphi(x)$ , άρα  $\varphi(x) \mid g(x)$ .

5. "Αν δύο πολυώνυμα  $\varphi(x)$  και  $\psi(x)$  είναι πρώτα μεταξύ τους και καθένα τους διαιρεί ένα τρίτο πολυώνυμο  $f(x)$ , τότε και τό γινόμενό τους θά διαιρεί τό πολυώνυμο  $f(x)$ .

"Απόδειξη: Είναι  $f(x) = \varphi(x)\pi(x)$  και έπειδή  $\psi(x) \mid f(x)$ , συμπεραίνουμε ότι  $\psi(x) \mid \varphi(x) \cdot \pi(x)$ , που σημαίνει ότι  $\psi(x) \mid \pi(x)$ , άφοϋ  $\psi(x)$  πρώτο πρὸς τό  $\varphi(x)$ . "Ετσι  $\pi(x) = \psi(x) \cdot \pi_1(x)$ , όποτε  $f(x) = [\varphi(x) \cdot \psi(x)]\pi_1(x)$ , που άποδεικνύει τήν πρόταση.

## 2.6. Άσκήσεις

- "Αν  $g_1(x) \mid f_1(x)$  και  $g_2(x) \mid f_2(x)$ , δείξτε ότι  $g_1(x) \cdot g_2(x) \mid f_1(x) \cdot f_2(x)$ .
- "Αν τό  $g(x)$  διαιρεί ένα από τὰ πολυώνυμα  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ , δείξτε ότι θά διαιρεί και τό γινόμενό τους.
- "Αν τό  $g(x)$  διαιρεί τό  $f(x)$ , τότε θά διαιρεί και τό  $[f(x)]^n, n \in \mathbb{N}$ .
- "Αν τό  $g(x)$  διαιρεί τό  $f_1(x) + f_2(x)$  και ένα από τὰ  $f_1(x), f_2(x)$ , δείξτε ότι θά διαιρεί και τό άλλο.
- Βρείτε τό Μ.Κ.Δ. τῶν πολυωνύμων  $f(x) = 2x^4 + 3x^3 + x^2 - 3x - 3$  και  $g(x) = x^3 - 1$ .
- Νά έκτελεστεί ή διάρεση του πολυωνύμου  $f(x) = x^4 + 3x^3 - 7x^2 + kx + \lambda$  μέ τό  $g(x) = x^2 - 3x + 5$  και έπιπτα νά όριστούν οι πραγματικοί άριθμοί  $k$  και  $\lambda$ , ώστε ή διάρεση αυτή νά είναι τέλεια.
- Νά έκτελεστεί ή διάρεση του  $f(x) = x^4 + 1$  μέ τό  $g(x) = x^2 - \sqrt{2}x + k$  και στή συνέχεια νά προσδιοριστεί ή πραγματική τιμή του  $k$ , ώστε ή διάρεση νά είναι τέλεια.
- Νά όριστεί ό πραγματικός άριθμός  $\lambda \neq 0$ , ώστε τό πολυώνυμο  $f(x) = x^3 - 5x^2 + \frac{6}{\lambda}$  νά διαιρείται μέ τό πολυώνυμο  $\lambda x - 1$ .
- Δείξτε ότι τό πολυώνυμο

$$f(x) = x^{n\alpha} - x^{n\alpha-1} + x^{n\alpha-2} + \dots + x^{n\alpha-1} + 1$$

διαιρείται μέ τό πολυώνυμο

$$\varphi(x) = x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1,$$

όπου  $n, \alpha_{n-1}, \alpha_{n-2}, \dots, \alpha_1$  είναι φυσικοί άριθμοί.

10. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο

$$f(x) = (x^{\rho-1} + \alpha x^{\rho-2} + \dots + \alpha^{\rho-1})x^{(\rho+1)\nu+1} + \alpha^{(\rho+1)\nu+\rho}$$

διαιρείται μέ τό πολυώνυμο

$$g(x) = x^{\rho} + \alpha x^{\rho-1} + \dots + \alpha^{\rho-1}x + \alpha^{\rho},$$

όπου  $\alpha$  είναι άκέραιος άριθμός και  $\rho, \nu$  φυσικοί άριθμοί.

## 2.7. Προτάσεις για τὰ υπόλοιπα τῶν διαιρέσεων τῶν πολυ- νόμων τοῦ $C_{[x]}$ .

Δίνουμε ἐδῶ δύο χρήσιμες προτάσεις, ποῦ ἀναφέρονται στὰ υπόλοιπα τῶν διαιρέσεων πολυωνύμων τοῦ  $C_{[x]}$ .

**Πρόταση 1.** Ἐὰν  $f_1(x), f_2(x)$  καὶ  $\delta(x)$  εἶναι πολυώνυμα τοῦ  $C_{[x]}$  μὲ  $\delta(x) \neq 0$ , τότε οἱ διαιρέσεις τῶν  $f_1(x)$  καὶ  $f_2(x)$  μὲ τὸ  $\delta(x)$  δίνουν τὸ ἴδιο ὑπόλοιπο, ὅταν καὶ μόνο ὅταν ἡ διαφορὰ  $f_1(x) - f_2(x)$  εἶναι πολλαπλάσιο τοῦ  $\delta(x)$ .

Ἡ ἀπόδειξη τῆς προτάσεως αὐτῆς εἶναι ὁμοία μὲ τὴν ἀπόδειξη τῆς προτάσεως 2 τῆς 1.3 τοῦ Κεφ. III.

**Πρόταση 2.** Ἐὰν ὁ διαιρετέος  $f(x)$  καὶ ὁ διαιρέτης  $\varphi(x)$  μιᾶς διαιρέσεως πολλαπλασιαστοῦν μὲ τὸ ἴδιο μὴ μηδενικό πολυώνυμο  $g(x)$ , τότε τὸ πηλίκο τῆς διαιρέσεως παραμένει τὸ ἴδιο, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο πολλαπλασιάζεται μὲ τὸ  $g(x)$ .

**Ἀπόδειξη:** Ἐχομε  $f(x) = \varphi(x) \cdot \pi(x) + \upsilon(x)$ , μὲ  $\upsilon(x) = 0$  ἢ βαθμ  $\upsilon(x) < \text{βαθμ } \varphi(x)$ , ὁπότε  $f(x) \cdot g(x) = [\varphi(x) \pi(x)]g(x) + \upsilon(x) \cdot g(x) \Leftrightarrow f(x) \cdot g(x) = [\varphi(x) \cdot g(x)] \cdot \pi(x) + \upsilon(x) \cdot g(x)$ , ὅπου  $\upsilon(x) \cdot g(x) = 0$ , ἂν  $\upsilon(x) = 0$  ἢ βαθμ  $[\upsilon(x) \cdot g(x)] = \text{βαθμ } \upsilon(x) + \text{βαθμ } g(x) < \text{βαθμ } \varphi(x) + \text{βαθμ } g(x)$ , δηλ.  $\text{βαθμ } [\upsilon(x) \cdot g(x)] < \text{βαθμ } [\varphi(x) \cdot g(x)]$ .

Ἄρα ἡ πρόταση ἀποδείχτηκε.

## 2.8. Ἐφαρμογές.

1. Ἐὰν  $\upsilon_1(x), \upsilon_2(x), \dots, \upsilon_n(x)$  εἶναι τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων τῶν  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  μὲ τὸ  $\delta(x)$ , ( $\delta(x) \neq 0$ ), ἀντιστοίχως, τότε τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων τῶν  $[f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)]$  καὶ  $[\upsilon_1(x) + \upsilon_2(x) + \dots + \upsilon_n(x)]$  μὲ τὸ  $\delta(x)$  εἶναι ἴσα.

**Λύση:** Ἐὰν  $\pi_1(x), \pi_2(x), \dots, \pi_n(x)$  εἶναι τὰ ἀντίστοιχα πηλίκα τῶν διαιρέσεων τῶν  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  μὲ τὸ  $\delta(x)$ , τότε ἔχομε:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \delta(x) \pi_1(x) + \upsilon_1(x) \\ f_2(x) &= \delta(x) \pi_2(x) + \upsilon_2(x) \\ &\vdots \\ f_n(x) &= \delta(x) \pi_n(x) + \upsilon_n(x). \end{aligned}$$

Προσθέτοντας κατὰ μέλη τῖς ἰσότητες αὐτές παίρνομε:

$f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) = \delta(x)[\pi_1(x) + \pi_2(x) + \dots + \pi_n(x)] + [\upsilon_1(x) + \upsilon_2(x) + \dots + \upsilon_n(x)]$   
 $\Leftrightarrow [f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)] - [\upsilon_1(x) + \upsilon_2(x) + \dots + \upsilon_n(x)] = \delta(x)[\pi_1(x) + \pi_2(x) + \dots + \pi_n(x)]$   
 ποῦ σημαίνει ὅτι τὸ  $\delta(x)$  εἶναι διαιρέτης τοῦ πρώτου μέλους. Αὐτὸ, σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση 1, ἀποδεικνύει τὸ ζητούμενο.

2. Ἡ διαίρεση ἐνὸς πολυωνύμου  $f(x)$  μὲ τὸ πολυώνυμο  $x^2 + x + 1$  δίνει ὑπόλοιπο  $2x + 1$ , ἐνῶ μὲ τὸ  $x^2 + 1$  δίνει ὑπόλοιπο  $x + 2$ . Νὰ βρεθῆ τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μὲ τὸ γινόμενο  $(x^2 + x + 1) \cdot (x^2 + 1)$ .

**Λύση:** Ἐὰν  $\pi(x)$  καὶ  $\upsilon(x)$  εἶναι τὸ πηλίκο καὶ τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μὲ τὸ  $[(x^2 + x + 1) \cdot (x^2 + 1)]$ , τότε ἔχομε

$$f(x) = (x^2 + x + 1) \cdot (x^2 + 1)\pi(x) + \upsilon(x) \quad (1) \quad \text{ἢ} \quad f(x) - \upsilon(x) = (x^2 + x + 1) \cdot (x^2 + 1)\pi(x),$$

δηλαδή τὰ πολυώνυμα  $x^2 + x + 1$  καὶ  $x^2 + 1$  εἶναι διαιρέτες τοῦ πολυωνύμου  $[f(x) - \upsilon(x)]$ . Αὐτὸ πάλι σημαίνει (πρόταση 1) ὅτι οἱ διαιρέσεις τῶν  $f(x)$  καὶ  $\upsilon(x)$  μὲ τὸ  $x^2 + x + 1$  δίνουν τὸ ἴδιο ὑπόλοιπο. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τῖς διαιρέσεις τῶν  $f(x)$  καὶ  $\upsilon(x)$  μὲ τὸ  $x^2 + 1$ .

\*Έτσι όμως η διαίρεση του  $u(x)$  με τό  $x^2+x+1$  δίνει υπόλοιπο  $2x+1$  και η διαίρεση του  $v(x)$  με τό  $x^2+1$  δίνει υπόλοιπο  $x+2$ .

\*Από την (1) όμως έχουμε ότι τό  $v(x)$  είναι τό πολύ 3ου βαθμού, δηλ.

$$v(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$$

όπότε θά ισχύουν οι σχέσεις:

$$\begin{aligned} \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta &= (x^2 + x + 1)\pi_1(x) + 2x + 1 \\ \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta &= (x^2 + 1)\pi_2(x) + x + 2 \end{aligned}$$

όπου  $\pi_1(x) = \alpha x + \kappa$  και  $\pi_2(x) = \alpha x + \lambda$ .

\*Από τίς σχέσεις αυτές παίρνουμε τό σύστημα

$$\alpha + \kappa = \beta, \quad \alpha + \kappa + 2 = \gamma, \quad \kappa + 1 = \delta, \quad \beta = \lambda, \quad \alpha + 1 = \gamma, \quad \lambda + 2 = \delta,$$

πού η επίλυσή του δίνει  $\alpha = -1, \beta = -2$  και  $\gamma = 0$ . Έπομένως  $v(x) = -x^3 - 2x^2$ .

## 2.9. Άσκήσεις.

1. \*Αν  $u_1(x)$  και  $u_2(x)$  είναι τά υπόλοιπα τών διαιρέσεων τών πολυωνύμων  $f_1(x)$  και  $f_2(x)$  μέ τό  $g(x)$  αντίστοιχώς, δείξτε ότι οι διαιρέσεις τών πολυωνύμων  $f_1(x)$ ,  $u_2(x)$  και  $f_2(x)$ ,  $u_1(x)$ , μέ τό  $g(x)$  έχουν ίσα υπόλοιπα.
2. \*Αν οι διαιρέσεις του πολυωνύμου  $f(x)$  μέ τά  $x-\alpha$  και  $x-\beta$ ,  $\alpha \neq \beta$ , δίνουν τό ίδιο υπόλοιπο  $v$ , δείξτε ότι και η διαίρεση του  $f(x)$  μέ τό πολυώνυμο  $(x-\alpha)(x-\beta)$  δίνει επίσης τό ίδιο υπόλοιπο  $v$ .

## 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

### 3.1. Άριθμητική τιμή και ρίζα πολυωνύμου.

Κάθε συνάρτηση  $f: A \rightarrow A$  μέ τύπο

$$f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad (1)$$

όπου  $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$  και  $A$  ένα από τά  $\mathbf{R}, \mathbf{C}$ , ονομάζεται πολυωνυμική συνάρτηση του  $x$ .

Ο αριθμός

$$f(\rho) = \alpha_n \rho^n + \alpha_{n-1} \rho^{n-1} + \dots + \alpha_1 \rho + \alpha_0 \quad (2)$$

πού είναι η εικόνα του αριθμού  $\rho$  μέσω της  $f$ , είναι η **αριθμητική τιμή της πολυωνυμικής συναρτήσεως για  $x = \rho$** .

Στά επόμενα θά λέμε επίσης ότι **ο αριθμός  $f(\rho)$  είναι η αριθμητική τιμή του πολυωνύμου  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 \in C_{[x]}$  για  $x = \rho$** .

**Σημείωση:** Μπορούμε νά δούμε άμέσως τή βασική διαφορά πού υπάρχει στό ρόλο του  $x$  στό  $f(x) \in C_{[x]}$  και στήν πολυωνυμική συνάρτηση μέ τύπο  $f(x)$ . Στήν πρώτη περίπτωση τό  $x$  είναι τό πολυώνυμο του  $C_{[x]}$  μέ  $\alpha_1 = 1$  και  $\alpha_0 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ , ενώ στή δεύτερη είναι η μεταβλητή της συναρτήσεως πού άπεικονίζεται στόν αριθμό  $f(x)$ .

\*Ένα σπουδαίο πρόβλημα στίς πολυωνυμικές συναρτήσεις είναι νά βρούμε τίς τιμές της μεταβλητής  $x$ , οι οποίες άπεικονίζονται στόν αριθμό μηδέν. Δηλαδή άν

$$f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$$

είναι ό τύπος μιάς πολυωνυμικής συναρτήσεως, νά βρούμε τίς τιμές  $x \in \mathbf{C}$  για τίς οποίες είναι

### IV 3.2.

$$f(x) = \alpha_n x^n - \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 \quad 0 \quad (3)$$

‘Η (3) ονομάζεται **πολυωνυμική εξίσωση**.

Κάθε αριθμός  $\rho$  που επαληθεύει την (3) ονομάζεται **ρίζα της πολυωνυμικής εξίσωσης**. Θα ονομάζουμε **ρίζα του πολυωνύμου  $f(x)$**  κάθε ρίζα της εξίσωσης  $f(x) = 0$ . ‘Η εύρεση όλων των ριζών ενός πολυωνύμου  $f(x)$ , ανάγεται στην επίλυση της πολυωνυμικής εξίσωσης  $f(x) = 0$  και θά μās άπασχολήσει στα επόμενα. ‘Ο βαθμός του πολυωνύμου  $f(x) \neq 0$  ονομάζεται και βαθμός της πολυωνυμικής εξίσωσης  $f(x) = 0$ .

### 3.2. Σχήμα Horner (Χόρνερ).

‘Ο σύντομος ύπολογισμός της αριθμητικής τιμής ενός πολυωνύμου  $f(x)$ , δηλ. της τιμής της συναρτήσεως  $f$  για  $x = \rho$ , παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί τά πολυώνυμα αξιοποιούνται για τίς διάφορες μαθηματικές ανάγκες. ‘Επίσης ή επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων γίνεται πολλές φορές, όπως θά δοῦμε παρακάτω, με τόν ύπολογισμό αριθμητικών τιμών πολυωνύμων.

‘Εδῶ θά δοῦμε μία σύντομη μέθοδο νά ύπολογίζουμε τίς αριθμητικές τιμές πολυωνύμων.

‘Εστω ότι ἔχουμε νά βροῦμε τήν τιμή της συναρτήσεως  $f$  με τύπο

$$f(x) = \alpha_5 x^5 + \alpha_4 x^4 + \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0 \quad \text{για } x = \rho.$$

‘Η τιμή αυτή θά είναι  $f(\rho) = \alpha_5 \rho^5 + \alpha_4 \rho^4 + \alpha_3 \rho^3 + \alpha_2 \rho^2 + \alpha_1 \rho + \alpha_0$ , ή όποια μπορεί νά γραφεί

$$f(\rho) = [(((\alpha_5 \rho + \alpha_4) \cdot \rho + \alpha_3) \rho + \alpha_2) \rho + \alpha_1] \rho + \alpha_0 \quad (1)$$

Δηλαδή για τόν ύπολογισμό του  $f(\rho)$  μπορούμε νά ακολουθήσουμε τήν ακόλουθη σειρά ύπολογισμών, που ύποδεικνύει ή (1).

1. Πολλαπλασιάζουμε τόν  $\alpha_5$  με τόν  $\rho$   $\alpha_5 \cdot \rho$
2. Στο γινόμενο προσθέτουμε τόν  $\alpha_4$   $\alpha_5 \cdot \rho + \alpha_4$
3. Πολλαπλασιάζουμε τό άθροισμα αυτό με τόν  $\rho$   $(\alpha_5 \cdot \rho + \alpha_4) \cdot \rho$
4. Στο γινόμενο αυτό προσθέτουμε τόν  $\alpha_3$   $(\alpha_5 \cdot \rho + \alpha_4) \cdot \rho + \alpha_3$
5. Πολλαπλασιάζουμε τό άποτέλεσμα με τόν  $\rho$   $((\alpha_5 \cdot \rho + \alpha_4) \cdot \rho + \alpha_3) \cdot \rho$  κ.τ.λ.

‘Η διαδικασία αυτή των ύπολογισμών φαίνεται καλύτερα στό παρακάτω σχήμα, που είναι γνωστό σαν σχήμα Horner.

Συντελεστές του $f(x)$	$\alpha_5$	$\alpha_4$	$\alpha_3$	$\alpha_2$	$\alpha_1$	$\alpha_0$
$\rho$	↓	$\alpha_5 \cdot \rho$	$(\alpha_5 \cdot \rho + \alpha_4) \rho$	.		
	$\frac{\alpha_5}{\gamma_4}$	$\frac{\alpha_5 \rho + \alpha_4}{\gamma_3}$	$\frac{(\alpha_5 \cdot \rho + \alpha_4) \rho + \alpha_3}{\gamma_2}$	...		$f(\rho) = [(((\alpha_5 \rho + \alpha_4) \rho + \alpha_3) \rho + \alpha_2) \rho + \alpha_1] \rho + \alpha_0$

Πρίν δώσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα, θά δοῦμε ακόμα ότι τό σχήμα Horner χρησιμεύει στην εύρεση του πηλίκου και του ύπολοίπου της διαιρέσεως του  $f(x)$  με τό  $x - \rho$ .

\*Αν έχουμε νά διαιρέσουμε τό προηγούμενο πολυώνυμο  $f(x)$  μέ τό δινώνυμο  $x-\rho$  (όπου  $\rho$  ό προηγούμενος αριθμός), τότε τό υπόλοιπο  $u(x)$  θά είναι ένα σταθερό πολυώνυμο  $u(x) = u \in \mathbf{C}_{[x]}$ , όποτε.

$$f(x) = (x-\rho) \pi(x) + u \quad (2)$$

Γιά  $x=\rho$  ή (2) δίνει  $f(\rho)=u \in \mathbf{C}$ , δηλαδή τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του  $f(x)$  μέ τό  $x-\rho$  είναι τό σταθερό πολυώνυμο πού αντιστοιχεί στην αριθμητική τιμή του πολυωνύμου  $f(x)$  για  $x=\rho$  και μ' αυτόν τον τρόπο τό βρήκαμε και σέ προηγούμενες τάξεις. \*Αν λοιπόν είναι  $f(\rho)=0$ , τότε  $(x-\rho)|f(x)$ , δηλαδή  $f(x)=(x-\rho)\pi(x)$  και αντιστρόφως. Αυτό σημαίνει ότι, αν  $\rho$  είναι μία ρίζα ενός πολυωνύμου  $f(x)$ , τότε τό  $x-\rho$  είναι ένας παράγοντας του  $f(x)$  και αντιστρόφως.

Σημειώνουμε έδω ότι ένα πολυώνυμο  $f(x)$ , πού έχει ρίζα τό  $\rho$ , είναι δυνατό νά διαιρείται, εκτός από τό  $x-\rho$ , και από μία δύναμη  $k$  του  $x-\rho$ . Γενικά είναι δυνατό ένα πολυώνυμο  $f(x)$  νά διαιρείται μέ τό  $(x-\rho)^k$  και νά μή διαιρείται μέ τό  $(x-\rho)^{k+1}$ . Δηλαδή είναι δυνατό νά είναι

$$f(x) = (x-\rho)^k \cdot \pi(x)$$

και τό  $\pi(x)$  νά μή διαιρείται μέ τό  $(x-\rho)$  (δηλ. τό  $\pi(x)$  νά μήν έχει ρίζα τό  $\rho$ ). Σ' αυτή τήν περίπτωση λέμε ότι τό  $\rho$  είναι πολλαπλή ρίζα του  $f(x)$  μέ βαθμό πολλαπλότητας  $k$  ή ότι τό  $\rho$  είναι ρίζα του  $f(x)$  μέ πολλαπλότητα  $k$ .

\*Όταν είναι  $k=1$ , τότε τό  $\rho$  λέγεται και *άπλή ρίζα* του  $f(x)$ .

Τό πηλίκο  $\pi(x)$  τής προηγούμενης διαιρέσεως είναι ένα πολυώνυμο 4ου βαθμού τής μορφής  $\gamma_4 x^4 + \gamma_3 x^3 + \gamma_2 x^2 + \gamma_1 x + \gamma_0$  και βρίσκεται, αν εκτελέσουμε τή διαίρεση κατά τά γνωστά:

$$\begin{array}{r|l} \alpha_5 x^5 + \alpha_4 x^4 + \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0 & x-\rho \\ \hline -\alpha_5 x^5 + \alpha_5 \rho x^4 & \\ \hline (\alpha_5 \rho + \alpha_4) x^4 + \alpha_3 x^3 & \\ -(\alpha_5 \rho + \alpha_4) x^4 + (\alpha_5 \rho + \alpha_4) \rho x^3 & \\ \hline [(\alpha_5 \rho + \alpha_4) \rho + \alpha_3] x^3 + \alpha_2 x^2 & \\ \dots & \dots \end{array} \quad \begin{array}{l} x-\rho \\ \hline \alpha_5 x^4 + \underbrace{(\alpha_5 \rho + \alpha_4)}_{\gamma^4} x^3 + [(\alpha_5 \rho + \alpha_4) \rho + \alpha_3] x^2 + \dots \\ \hline \gamma^4 \quad \quad \quad \gamma^3 \quad \quad \quad \gamma_2 \end{array}$$

Διαπιστώνουμε άμέσως ότι οί συντελεστές του πηλίκου είναι οί αριθμοί τής τρίτης σειράς του σχήματος Horner, εκτός του τελευταίου αριθμού πού είναι τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως, όπως είπαμε.

Στήν πράξη εργαζόμαστε ως εξής:

\*Εστω ότι θέλουμε νά βρούμε τό πηλίκο,  $\pi(x)$ , και τό υπόλοιπο,  $u(x)$ , τής διαιρέσεως του  $f(x) = -2x^5 + 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$  μέ τό  $g(x) = x + 3 = x - (-3)$ .

Οί συντελεστές του  $f(x)$  (διαιρετέου) γράφονται σέ μία σειρά (φροντίζοντας νά γράψουμε και τό συντελεστή του  $x^3$  πού είναι τό μηδέν), στή δεύτερη σειρά και άριστερά γράφουμε τον αριθμό  $\rho = -3$  και στήν τρίτη σειρά σχηματίζουμε τους συντελεστές του πηλίκου, όπως είπαμε προηγουμένως, καθώς και τό υπόλοιπο. \*Έτσι έχουμε τό ακόλουθο σχήμα Horner.

### IV 3.3.

Συντελεστές του f(x)	-2	3	0	-2	5	-1	
$\rho = -3$	$\downarrow$	$(-2) \cdot (-3)$	$\downarrow$	$-27$	$81$	$-237$	$696$
	$\underbrace{-2}_{\gamma_4}$	$\underbrace{9}_{\gamma_3}$	$\underbrace{-27}_{\gamma_2}$	$\underbrace{79}_{\gamma_1}$	$\underbrace{-232}_{\gamma_0}$	$\underbrace{695}_{u(x)=v}$	

Τό πηλίκο είναι  $\pi(x) = \gamma_4 x^4 + \gamma_3 x^3 + \gamma_2 x^2 + \gamma_1 x + \gamma_0$ , δηλ.

$$\pi(x) = -2x^4 + 9x^3 - 27x^2 + 79x - 232 \text{ και τό υπόλοιπο } u(x) = 695,$$

πού φυσικά είναι και ή αριθμητική τιμή του f(x) για  $x = -3$ .

### 3.3. Έφαρμογές.

1. Δίνεται ή πολυωνμική συνάρτηση  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  τέτοια, ώστε για κάθε  $z \in \mathbb{R}$  νά ισχύει  $f(z) = az + \beta$  μέ  $a, \beta$  πραγματικούς αριθμούς και  $\beta \neq 0$ . Δείξτε ότι για κάθε ζεύγος πραγματικών αριθμών  $x, y$  ισχύει:  $f(x+y) \neq f(x) + f(y)$ .

Απόδειξη: Από τόν τύπο τής συναρτήσεως έχουμε:

$$f(x) = ax + \beta, \quad f(y) = ay + \beta \text{ και } f(x+y) = a(x+y) + \beta,$$

όπότε

$$f(x) + f(y) = a(x+y) + 2\beta. \text{ Άλλά επειδή } \beta \neq 0, \text{ θά είναι}$$

$$a(x+y) + \beta \neq a(x+y) + 2\beta, \text{ δηλ. } f(x+y) \neq f(x) + f(y).$$

2. Δίνεται μία πολυωνμική συνάρτηση  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  τέτοια, ώστε για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  και κάθε φυσικό αριθμό  $\rho$  νά ισχύει:

$$f(\rho x) = f(x)$$

Δείξτε ότι για κάθε  $v \in \mathbb{N}$  ισχύει:  $f(\rho^v) = f(1)$  (1)

Απόδειξη: Έπειδή ισχύει  $f(\rho x) = f(x)$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  και  $\rho \in \mathbb{N}$ , αν πάρουμε  $x=1$ , τότε για κάθε  $\rho \in \mathbb{N}$  ισχύει  $f(\rho \cdot 1) = f(1)$ , δηλαδή  $f(\rho) = f(1)$ .

Θά αποδείξουμε τό ζητούμενο μέ τή μέθοδο τής μαθηματικής έπαγωγής.

Πράγματι: για  $v=1$  έχουμε:  $f(\rho^1) = f(\rho) = f(1)$ , δηλ. ισχύει ή (1).

Έστω ότι ή (1) ισχύει και για  $v=k$ , δηλ. ότι  $f(\rho^k) = f(1)$ .

Θά δείξουμε τότε ότι ισχύει και για  $v=k+1$ , δηλ. ότι  $f(\rho^{k+1}) = f(1)$ .

Πράγματι: έχουμε  $f(\rho^{k+1}) = f(\rho \cdot \rho^k) = f(\rho^k) = f(1)$ . Έπομένως ισχύει  $f(\rho^v) = f(1)$  για κάθε  $v \in \mathbb{N}$ , δηλαδή αποδείχτηκε τό ζητούμενο.

3. Νά αποδειχθεί ότι τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως ενός πολυωνύμου f(x) μέ τό  $x^2 - \rho^2$ ,  $\rho \neq 0$ , είναι

$$u(x) = \frac{f(\rho) - f(-\rho)}{2\rho} x + \frac{f(\rho) + f(-\rho)}{2}.$$

Απόδειξη: Έπειδή ό διαιρέτης  $x^2 - \rho^2$  είναι δευτέρου βαθμού, τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως θά είναι τό πολύ 1ου βαθμού, δηλ. θά είναι  $u(x) = kx + \lambda$ .

Έτσι θά έχουμε:

$$f(x) = (x^2 - \rho^2) \pi(x) + kx + \lambda, \quad (1)$$

όπου  $\pi(x)$  είναι τό πηλίκο τής διαιρέσεως.

Από τήν (1) για  $x = \rho$  και  $x = -\rho$  παίρνουμε αντίστοιχως:

$$f(\rho) = k\rho + \lambda \text{ και } f(-\rho) = -k\rho + \lambda.$$

Επιλύοντας τό σύστημα τών δύο αυτών εξισώσεων ως προς  $k$  και  $\lambda$  βρίσκουμε

$$k = \frac{f(\rho) - f(-\rho)}{2\rho} \text{ και } \lambda = \frac{f(\rho) + f(-\rho)}{2}, \text{ όπότε τό υπόλοιπο είναι}$$

$$u(x) = \frac{f(\rho) - f(-\rho)}{2\rho} \cdot x + \frac{f(\rho) + f(-\rho)}{2}.$$

4. Πολυώνυμο  $f(x)$  διαιρούμενο με τό  $x+1$  δίνει υπόλοιπο 2 και διαιρούμενο με τό  $x-2$  δίνει υπόλοιπο  $-1$ . Νά βρεθεί τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του  $f(x)$  με τό  $g(x)=(x+1)(x-2)$ .

Λύση: Από τήν υπόθεση έχουμε:  $f(-1)=2$  και  $f(2)=-1$ .

Τό πολυώνυμο  $f(x)$  όταν διαιρείται με τό  $g(x)$ , τό όποιο είναι δευτέρου βαθμού, δίνει πηλίκο  $\pi(x)$  και υπόλοιπο τό πολύ πρώτου βαθμού. Έστω ότι είναι  $u(x) = kx + \lambda$ . Τότε θά ισχύει:

$$f(x) = (x+1) \cdot (x-2) \cdot \pi(x) + (kx + \lambda). \quad (1)$$

Από τήν (1) παίρνουμε:  $f(-1) = -k + \lambda$  και  $f(2) = 2k + \lambda$ , δηλαδή

$$-k + \lambda = 2 \quad \text{και} \quad 2k + \lambda = -1$$

Επιλύοντας τό σύστημα τών δύο αυτών εξισώσεων βρίσκουμε  $k = -1$  και  $\lambda = 1$ , όποτε τό υπόλοιπο είναι:  $u(x) = -x + 1$ .

5. Βρείτε τό πηλίκο και τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του  $f(x) = ix^3 - (2+i)x^2 + 4x - 3 - i$  με τό  $g(x) = x - (1-i)$ .

Λύση: Χρησιμοποιώντας τό σχήμα Horner βρίσκουμε:

Συντελεστές του $f(x)$	$i$	$-(2+i)$	$4$	$-3-i$
$\rho = 1-i$		$1+i$	$-1+i$	$4-2i$
	$i$	$-1$	$3+i$	$1-3i$

$$\pi(x) = ix^2 - x + 3 + i \quad \text{και} \quad u(x) = 1 - 3i.$$

### 3.4. Ασκήσεις.

1. Με τό σχήμα Horner νά υπολογίσετε τίς ζητούμενες τιμές τών πολυωνυμικών συναρτήσεων με τούς παρακάτω τύπους.

$$\alpha) f(x) = -2x^4 + 3x^2 + 2x + 1,$$

$$f(-2) = ; \quad f(5) = ;$$

$$\beta) \varphi(x) = x^3 - \sqrt{2}x^2 - 1,$$

$$\varphi(-\sqrt{2}) = ;$$

$$\gamma) g(x) = x^3 - ix^2 + 1$$

$$g(1-i) = ;$$

2. \*Αν  $f(x) = 3x^2 - \lambda x + 2$ , βρείτε τό  $\lambda$ , ώστε  $f(-1) = -3 - \lambda$

3. \*Αν  $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + kx + \lambda$ , βρείτε τά  $k$  και  $\lambda$ , ώστε  $f(-2) = -25$  και  $f(2) = -18$ .

4. Νά προσδιορίσετε τά  $\alpha$  και  $\beta$ , ώστε τό πολυώνυμο  $f(x) = \alpha x^3 - \beta x^2 - 5x + 4$  διαιρούμενο με  $x+2$  και  $x-1$  νά δίνει αντίστοιχως υπόλοιπα 6 και 2.

- 5: Βρείτε τό πηλίκο και τό υπόλοιπο τών διαιρέσεων:

$$\alpha) \text{ του } 5x^3 - x^2 + 2x \text{ με τό } x-3, \quad \beta) \text{ του } x^5 + 32 \text{ με τό } x+2,$$

$$\gamma) \text{ του } x^3 - 3ix^2 + 4x + 1 - 2i \text{ με τό } x+2, \quad \delta) \text{ του } x^4 + (1+i)x^3 + ix^2 + (-9+7i)x - 1 + 3i \text{ με}$$

$$\text{τό } x-2+i \text{ και } \epsilon) \text{ του } 4x^4 + 5x^3 - 12x - 40 \text{ με τό } x + \frac{1}{2}.$$

6. \*Αν ένα πολυώνυμο  $f(x)$  διαιρούμενο με  $x-\alpha$  και  $x-\beta$  δίνει αντίστοιχως πηλίκα  $\pi_1(x)$  και  $\pi_2(x)$ , δείξτε ότι  $\pi_1(\beta) = \pi_2(\alpha)$ , όταν  $\alpha \neq \beta$ .

7. Ένα πολυώνυμο  $f(x)$  διαιρούμενο με τό  $x+1$  δίνει υπόλοιπο 2, με τό  $x-2$  δίνει υπόλοιπο 11 και με τό  $x+3$  δίνει υπόλοιπο 6. Βρείτε τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του  $f(x)$  με τό  $(x+1) \cdot (x-2) \cdot (x+3)$ .

8. Δείξτε ότι: i) αν  $\alpha \neq \beta$ , τότε τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του πολυωνύμου

$f(x)$ , βαθμ.  $f(x) \geq 2$ , με τό  $\varphi(x) = (x-\alpha) \cdot (x-\beta)$  είναι:

$$u(x) = \frac{f(\alpha) - f(\beta)}{\alpha - \beta} \cdot x + \frac{\beta f(\alpha) - \alpha f(\beta)}{\beta - \alpha}.$$

#### IV 4.1.

ii) \*Αν  $\alpha = \beta$ , τότε  $v(x) = x\pi(\alpha) \cdot f(\alpha) - \alpha\pi(\alpha)$

9. Δίνεται μία πολυωνυμική συνάρτηση:  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  τέτοια, ώστε για κάθε  $x \in \mathbf{R}$  νά ισχύει:

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right). \text{ Δείξτε ότι για κάθε } x \in \mathbf{R} \text{ και κάθε } n \in \mathbf{N} \text{ ισχύει } f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

10. Βρείτε ένα πολυώνυμο τρίτου βαθμού  $f(x)$  τέτοιο, ώστε:  $f(0) = 0$  και  $f(x) - f(x-1) = x^2$ .  
Στή συνέχεια υπολογίστε τό άθροισμα  $\sigma_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ ,  $n \in \mathbf{N}$ .

11. \*Αν  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, δείξτε ότι τό

$$P(x) = \frac{x^n}{\alpha_1 \alpha_2} + \frac{x^{n-1}}{\alpha_2 \alpha_3} + \dots + \frac{x^2}{\alpha_{n-1} \alpha_n} - \frac{n-1}{\alpha_1 \alpha_n}$$

διαιρείται μέ τό  $x-1$ . Στή συνέχεια βρείτε τό πηλίκο τής διαιρέσεως του  $P(x)$  μέ τό  $x-1$ .

### 4. ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

\*Εδῶ θά δοῦμε μερικά θεωρήματα σχετικά μέ τίς ρίζες τῶν πολυωνύμων, τό ὅποια εἶναι πολύ χρήσιμα γιά τήν ἐπίλυση πολυωνυμικῶν ἐξισώσεων. Τά θεωρήματα αὐτά θά τά ξεχωρίσουμε σέ δύο ὁμάδες. Σέ γενικά καί σέ ἐιδικά. Τά πρῶτα ἀναφέρονται σέ ὅλα τά πολυώνυμα τοῦ  $\mathbf{C}_{[x]}$ , ἐνῶ τά δεύτερα σέ πολυώνυμα τοῦ  $\mathbf{R}_{[x]}$  καί τοῦ  $\mathbf{Q}_{[x]}$ .

#### 4.1. Γενικά Θεωρήματα.

Τό βασικό θεῶρημα, σχετικά μέ τίς ρίζες τῶν πολυωνύμων, τό ὅποιο ἀποδεικνύεται στήν Ἀνώτερη Ἀλγεβρα εἶναι τό ἀκόλουθο:

**Θεῶρημα 1. (Θεῶρημα D'Alembert ἢ Θεμελιῶδες Θεῶρημα τής Ἀλγεβρας).**

Κάθε πολυώνυμο  $f(x) \in \mathbf{C}_{[x]}$ , βαθμοῦ  $n \geq 1$ , ἔχει μία τουλάχιστον μιγαδική ρίζα.

Τό θεῶρημα αὐτό μᾶς ἐξασφαλίζει τήν ὑπαρξη ρίζας γιά κάθε πολυώνυμο βαθμοῦ  $n \geq 1$ , ἀλλά δέ μᾶς λείπει τίποτε γιά τό πλῆθος τῶν ριζῶν τοῦ πολυωνύμου. \*Ἐτσι γιά τήν ἐξίσωση:

$$\alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 = 0 \quad (1)$$

τό μόνο πού ξέρουμε εἶναι ὅτι ἔχει μία τουλάχιστο ρίζα.

Θά ἀποδείξουμε τώρα τό ἀκόλουθο θεῶρημα, πού μᾶς ἐξασφαλίζει τό πλῆθος τῶν ριζῶν τής (1).

**Θεῶρημα 2. Κάθε πολυώνυμο  $f(x) \in \mathbf{C}_{[x]}$ , βαθμοῦ  $n \geq 1$ , ἔχει  $n$  ἀκριβῶς ρίζες, ὅπου κάθε ρίζα μετρίεται τόσες φορές ὅσος εἶναι ὁ βαθμός πολλαπλότητάς της.**

\*Ἀπόδειξη: \*Ἐστω  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$ ,  $\alpha_n \neq 0$  μέ  $n \geq 1$ . Κατά τό θεῶρημα D'Alembert ὑπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα  $\rho_1 \in \mathbf{C}$  τοῦ  $f(x)$ , δηλαδή  $f(\rho_1) = 0$ , ὅποτε ἰσχύει

$$f(x) = (x - \rho_1) f_{n-1}(x) \quad (2)$$

όπου  $f_{v-1}(x)$  είναι τό πηλίκο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μέ τό  $x-\rho_1$  καί βαθμ.  $f_{v-1}(x) = v-1$ . Κατά τό  $\Theta$ . D'Alembert καί πάλι, τό πολυώνυμο  $f_{v-1}(x)$ , μέ  $v-1 \geq 1$ , ἔχει τουλάχιστον μία ρίζα, ἔστω τόν  $\rho_2 \in \mathbf{C}$ . Τότε ἔχουμε:

$$f_{v-1}(x) = (x-\rho_2)f_{v-2}(x) \quad (3)$$

ὁπότε ἡ (2) γίνεται:

$$f(x) = (x-\rho_1)(x-\rho_2)f_{v-2}(x) \quad (4)$$

μέ βαθμ  $f_{v-2}(x) = v-2$ .

Ἀπό τήν (4) βλέπουμε ὅτι  $f(\rho_2)=0$ , δηλ. ὁ ἀριθμός  $\rho_2$  εἶναι καί ρίζα τοῦ  $f(x)$ . Συνεχίζοντας κατά τόν ἴδιο τρόπο, κάθε νέο πηλίκο θά ἔχει βαθμὸ κατά μονάδα μικρότερο ἀπὸ τό προηγούμενὸ του καί κάθε φορά θά ἴπάρχει γι' αὐτό μία ρίζα, πού θά εἶναι καί ρίζα τοῦ πολυωνύμου  $f(x)$ .

Ἔτσι ὁμως θά φθάσουμε νά ἔχουμε:

$$f(x) = (x-\rho_1)(x-\rho_2)\dots(x-\rho_{v-1}) \cdot f_1(x) \quad (5)$$

ὅπου  $f_1(x)$  πολυώνυμο 1ου βαθμοῦ, ἔστω  $f_1(x) = \beta_1 x + \beta_0$ ,  $\beta_1 \neq 0$ . Ἐπειδὴ  $f_1(x) = \beta_1 \left( x + \frac{\beta_0}{\beta_1} \right)$ , ὁ ἀριθμός  $\rho_v = -\frac{\beta_0}{\beta_1}$  θά εἶναι ρίζα τοῦ  $f_1(x)$ , δηλ. μία ἀκόμη ρίζα τοῦ  $f(x)$ , ὁπότε ἡ (5) γίνεται:

$$f(x) = \beta_1(x-\rho_1)(x-\rho_2)\dots(x-\rho_{v-1})(x-\rho_v) \quad (6)$$

Ἄν κάνουμε τίς πράξεις στό  $\beta'$  μέλος τῆς (6), τότε εἶναι φανερό ὅτι ὁ μεγιστοβάθμιος ὅρος θά εἶναι ὁ  $\beta_1 x^v$ , ὁπότε  $\beta_1 = \alpha_v$ , καί ἄρα ἡ (6) γράφεται:

$$f(x) = \alpha_v(x-\rho_1)(x-\rho_2)(x-\rho_3)\dots(x-\rho_v) \quad (7)$$

Θά δείξουμε τώρα ὅτι ἡ μορφή (7) τοῦ  $f(x)$  εἶναι μοναδική, ὅταν δέ μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ διάταξη τῶν παραγόντων  $(x-\rho_1), (x-\rho_2), \dots, (x-\rho_v)$ . Ἄς ὑποθέσουμε κατ' ἀρχὴν ὅτι μέ τήν ἴδια διαδικασία βρήκαμε ὅτι εἶναι καί

$$f(x) = \alpha_v(x-\rho'_1)(x-\rho'_2)\dots(x-\rho'_v) \quad (8)$$

Ἄπὸ τίς (7) καί (8) ἔχουμε τότε

$$(x-\rho_1)(x-\rho_2)\dots(x-\rho_v) = (x-\rho'_1)(x-\rho'_2)\dots(x-\rho'_v) \quad (9)$$

Ἄν ἔστω καί μία ἀπὸ τίς ρίζες  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_v$  τοῦ  $f(x)$ , π.χ. ἡ  $\rho_k$ , δέν εἶναι ἴση μέ κάποια ἀπὸ τίς  $\rho'_1, \rho'_2, \dots, \rho'_v$ , τότε βάζοντας στήν (9) τήν τιμὴ  $x = \rho_k$  ὀδηγούμαστε σέ ἄτοπο, ἀφοῦ τό πρῶτο μέλος τῆς μηδενίζεται καί τό δεύτερο εἶναι διαφορετικό ἀπὸ τό μηδέν. Ἔτσι βλέπουμε ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλη τιμὴ, ἐκτός ἀπὸ τίς  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_v$ , πού νά εἶναι ρίζα τοῦ πολυωνύμου  $f(x)$ . Αὐτό ὁμως δέν μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι ἡ μορφή (7) τοῦ πολυωνύμου  $f(x)$  εἶναι μοναδική, γιατί εἶναι δυνατό μία ρίζα  $\rho_i$ , ἀπὸ τίς  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_v$ , νά ἐπαναλαμβάνεται  $\kappa$  φορές στή μορφή (7) καί  $\lambda$  φορές στή μορφή (5) μέ  $\kappa \neq \lambda$ . Θά δείξουμε ὅτι καί αὐτό εἶναι ἄτοπο. Πράγματι: ἂν ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι  $\kappa \neq \lambda$ , τότε, ἐπειδὴ κάθε μὴ μηδενικό πολυώνυμο εἶναι ἀπλοποιήσιμο στοιχεῖο ὡς πρὸς τόν πολλαπλασιασμό



**Πράγματι** από τό προηγούμενο θεώρημα έχουμε

$$f(x) = \alpha_v(x-\rho_1)(x-\rho_2)\dots(x-\rho_v), \text{ δηλαδή}$$

$$\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \alpha_{v-2} x^{v-2} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 = \alpha_v(x-\rho_1)(x-\rho_2)\dots(x-\rho_v)$$

Διαιρώντας και τά δύο μέλη τής τελευταίας μέ τό  $\alpha_v \neq 0$  παίρνουμε

$$x^v + \frac{\alpha_{v-1}}{\alpha_v} x^{v-1} + \frac{\alpha_{v-2}}{\alpha_v} x^{v-2} + \dots + \frac{\alpha_1}{\alpha_v} x + \frac{\alpha_0}{\alpha_v} =$$

$$x^v - \underbrace{(\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_v)}_{S_1} x^{v-1} + \underbrace{(\rho_1 \rho_2 + \rho_1 \rho_3 + \dots + \rho_{v-1} \rho_v)}_{S_2} x^{v-2} - \dots + (-1)^v \underbrace{\rho_1 \rho_2 \dots \rho_v}_{S_v}$$

Από τόν όρισμό τής Ισότητας τών πολυωνύμων βρίσκουμε πλέον τίς ζητούμενες σχέσεις. Οί σχέσεις αυτές, οί όποιες συνδέουν τίς ρίζες και τούς συντελεστές του πολυωνύμου  $f(x)$  ονομάζονται **τύποι του Vieta**.

Δίνουμε τώρα και μία πρόταση σχετική μέ τίς ρίζες τών πολυωνύμων.

**Πρόταση.** "Αν τά πολυώνυμα  $x-\rho_1, x-\rho_2, \dots, x-\rho_k$  διαιρούν ένα πολυώνυμο  $f(x)$  και οί  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_k$  είναι όλοι διαφορετικοί μεταξύ τους, τότε τό πολυώνυμο  $(x-\rho_1)(x-\rho_2)\dots(x-\rho_k)$  είναι παράγοντας του  $f(x)$ .

**Απόδειξη:** α) "Αν τό πολυώνυμο  $f(x)$  είναι τό πολύ  $k-1$  βαθμού, τότε αφού οί αριθμοί  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_k$  είναι ρίζες του, σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση 2 θά είναι τό μηδενικό πολυώνυμο, δηλ.  $f(x) = 0$  και φυσικά θά διαιρείται μέ τό πολυώνυμο  $(x-\rho_1)(x-\rho_2)\dots(x-\rho_k)$ .

β) "Αν είναι βαθμ  $f(x) = v \geq k$ , τότε, σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση 1, αυτό θά γράφεται

$$f(x) = \alpha_v(x-\rho_1)(x-\rho_2)\dots(x-\rho_k)(x-\sigma_1)(x-\sigma_2)\dots(x-\sigma_{v-k}),$$

όπου  $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{v-k}$  είναι οί υπόλοιπες ρίζες του. Η τελευταία σχέση άποδεικνύει τό ζητούμενο.

## 4.2. Παραδείγματα—Έφαρμογές

1. "Αν ένα πολυώνυμο  $f(x)$  έχει τήν ιδιότητα  $f(x) = f(1-x)$ , δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $g(x) = f(x) - f(0)$  διαιρείται μέ τό πολυώνυμο  $x(x-1)$ .

**Απόδειξη:**

Γιά νά διαιρείται τό πολυώνυμο  $g(x)$  μέ τό  $x(x-1)$ , άρκει νά διαιρείται χωριστά μέ τό  $x$  και τό  $x-1$ , δηλαδή πρέπει νά είναι  $g(0) = 0$  και  $g(1) = 0$ . Οί Ισότητες αυτές Ισχύουν, γιατί είναι  $f(x) = f(1-x)$ .

2. "Αν ένα πολυώνυμο  $f(x)$  έχει τήν ιδιότητα  $f(x) = f(x-1)$ , τότε τό πολυώνυμο αυτό είναι ένα σταθερό πολυώνυμο.

**Απόδειξη:**

Θά δείξουμε μέ τή μαθηματική έπαγωγή ότι για όλα τά  $n \in \mathbb{N}$  Ισχύει  $f(n) = f(0)$ .

Πράγματι: για  $n=1$ , από τήν υπόθεση έχουμε  $f(1) = f(0)$ . "Αν δεχθούμε τώρα ότι  $f(k) = f(0)$ ,

#### IV 4.2.

$k \in \mathbb{N}$ , έπειδή έχουμε και  $f(k+1)=f(k)$  έξ ύποθέσεως, θά είναι και  $f(k+1)=f(0)$ . Δηλαδή τό πολυώνυμο  $f(x)$  παίρνει τήν ίδια τιμή  $f(0)$  γιά όλους τούς φυσικούς αριθμούς. Άρα θά είναι:

$$f(x) - f(0) = 0 \quad \eta \quad f(x) = f(0) = \text{σταθερό.}$$

3. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο

$$f(x) = \frac{x(x-\alpha)(x-\beta)}{\gamma(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)} + \frac{x(x-\beta)(x-\gamma)}{\alpha(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)} + \frac{x(x-\gamma)(x-\alpha)}{\beta(\beta-\alpha)(\beta-\gamma)},$$

στό όποιο είναι  $\alpha\beta\gamma(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha) \neq 0$ , μπορεί νά πάρει τή μορφή

$$f(x) = \lambda(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) + 1.$$

Προσδιορίστε κατόπιν τήν τιμή του  $\lambda$ .

Άπόδειξη:

Έπειδή είναι  $f(\alpha)=f(\beta)=f(\gamma)=1$  ή  $f(\alpha)-1=f(\beta)-1=f(\gamma)-1=0$ , τό πολυώνυμο  $f(x)-1$  θά έχει ρίζες τά  $\alpha, \beta, \gamma$  και συνεπώς τό πολυώνυμο  $(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$  θά είναι διαιρέτης του  $f(x)-1$ . Άρα θά είναι

$$f(x)-1 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)\pi(x) \quad (1)$$

Άλλά τά πολυώνυμα  $f(x)-1$  και  $(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$  είναι 3ου βαθμού και συνεπώς τό ηλίκο  $\pi(x)$  θά είναι σταθερό πολυώνυμο. Άν  $\pi(x)=\lambda$ , τότε ή (1) γράφεται

$$f(x) = \lambda(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) + 1 \quad (2)$$

και άποδεικνύει τό ζητούμενο.

Έπειδή από τήν άρχική μορφή του  $f(x)$  βρίσκουμε  $f(0)=0$ , ένω από τή (2) είναι  $f(0) = -\alpha\beta\gamma + 1$ , τελικά θά είναι

$$\lambda = \frac{1}{\alpha\beta\gamma}$$

4. Έξετάστε άν τό 3 είναι πολλαπλή ρίζα του  $f(x) = 2x^3 - 11x^2 + 12x + 9$ .

Λύση: Θά εξετάσουμε άν τό  $x-3$  είναι παράγοντας του  $f(x)$ . Άρκεί νά δείξουμε ότι  $f(3)=0$ .

Άλλά αυτό ισχύει. Έτσι έχουμε  $f(x) = (x-3)\pi(x)$ . Μέ τό σχήμα Horner βρίσκουμε

$$\pi(x) = 2x^2 - 5x - 3, \quad \text{όπότε} \quad f(x) = (x-3)(2x^2 - 5x - 3).$$

Παρατηρούμε τώρα ότι  $\pi(3)=0$ , δηλ. τό  $x-3$  είναι διαιρέτης του  $\pi(x)$ , όπότε  $\pi(x) = (x-3)(2x+1)$  και άρα  $f(x) = (x-3) \cdot (x-3) \cdot (2x+1) = (x-3)^2 \cdot (2x+1)$ .

Ή τελευταία σχέση μας λέει ότι τό 3 είναι διπλή ρίζα του  $f(x)$ .

Στό παράδειγμα αυτό δίνεται και ένας τρόπος νά ελέγχουμε άν ένας αριθμός  $p$  είναι πολλαπλή ρίζα ενός πολυωνύμου. Γενικά άποδεικνύεται ότι:

Ένα πολυώνυμο  $f(x)$ , βαθμού  $\nu \geq k$ ,  $k \in \mathbb{N}$  έχει τόν αριθμό  $p$  ρίζα πολλαπλότητας  $k$ , άν  $f(p)=0$ ,  $f'(p)=0$ ,  $f''(p)=0, \dots, f^{(k-1)}(p)=0$ , όπου τά  $\pi_1(x)$ ,  $\pi_2(x), \dots, \pi_{k-1}(x)$  είναι άντιστοίχως τά ηλίκα των διαιρέσεων του  $f(x)$  μέ τό  $x-p$ , του  $\pi_1(x)$  μέ τό  $x-p$ , του  $\pi_2(x)$  μέ τό  $x-p$  κ.ο.κ. και συγχρόνως  $\pi_k(p) \neq 0$ , όπου  $\pi_k(x)$  είναι τό ηλίκο της διαιρέσεως του  $\pi_{k-1}(x)$  μέ τό  $x-p$ .

Ένας όμως πιό πρακτικός τρόπος γιά νά ελέγχουμε τήν πολλαπλότητα μιās ρίζας ενός πολυωνύμου φαίνεται στό ακόλουθο παράδειγμα.

5. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $f(x) = 2x^4 - 5x^3 + 3x^2 + x - 1$  έχει τόν αριθμό 1 ρίζα μέ πολλαπλότητα 3.

Λύση: Άν κάνουμε τό μετασχηματισμό

$$x-1=y \quad \eta \quad x=y+1,$$

τότε τό  $f(x)$  γίνεται  $f(y+1) = 2(y+1)^4 - 5(y+1)^3 + 3(y+1)^2 + (y+1) - 1$  ή

$$g(y) = f(y+1) = 2y^4 + y^3 = y^3(2y+1).$$

Δηλαδή τό  $g(y)$  έχει παράγοντα τό  $y^3$  και δέν έχει παράγοντα δύναμη του  $y$  μεγαλύτερη από 3, δηλ. τό  $f(x)$  έχει παράγοντα τό  $(x-1)^3$ , αλλά όχι δύναμη του  $x-1$  μεγαλύτερη από 3.

6. Βρείτε το άθροισμα των τετραγώνων και των κύβων των ριζών του πολυωνύμου

$$f(x) = 2x^3 - 6x^2 + x - 10$$

Λύση: Αν  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  είναι οι ρίζες του  $f(x)$ , τότε από τους τύπους Vieta έχουμε

$$\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 = \frac{6}{2} = 3, \quad \rho_1\rho_2 + \rho_2\rho_3 + \rho_3\rho_1 = \frac{1}{2}, \quad \rho_1\rho_2\rho_3 = \frac{10}{2} = 5$$

Γνωρίζουμε όμως ότι:  $\rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2 = (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)^2 - 2(\rho_1\rho_2 + \rho_2\rho_3 + \rho_3\rho_1)$ ,

οπότε  $\rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2 = 3^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} = 8$  και

$$(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)^3 = \rho_1^3 + \rho_2^3 + \rho_3^3 + 3\rho_1^2(\rho_2 + \rho_3) + 3\rho_2^2(\rho_3 + \rho_1) + 3\rho_3^2(\rho_1 + \rho_2) + 6\rho_1\rho_2\rho_3 \quad \eta$$

$$(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)^3 = \rho_1^3 + \rho_2^3 + \rho_3^3 + 3\rho_1^2(3 - \rho_1) + 3\rho_2^2(3 - \rho_2) + 3\rho_3^2(3 - \rho_3) + 6\rho_1\rho_2\rho_3.$$

Από την τελευταία σχέση βρίσκουμε

$$\rho_1^3 + \rho_2^3 + \rho_3^3 = \frac{75}{2}$$

7. Νά κατασκευαστεί πολυώνυμο  $g(x)$ , του οποίου οι ρίζες νά είναι τὰ αντίστροφα των ριζών του πολυωνύμου

$$f(x) = a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_v \cdot a_0 \neq 0.$$

Λύση: Αν  $x_1, x_2, \dots, x_v$  είναι οι ρίζες του  $f(x)$ , τότε οι ρίζες του  $g(x)$  θέλουμε νά είναι οι

$$\rho_1 = \frac{1}{x_1}, \quad \rho_2 = \frac{1}{x_2}, \quad \dots, \quad \rho_v = \frac{1}{x_v}$$

Σύμφωνα μέ τους τύπους Vieta έχουμε:

$$S_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_v = -\frac{\alpha_{v-1}}{\alpha_v}$$

$$S_2 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_{v-1} x_v = \frac{\alpha_{v-2}}{\alpha_v}$$

⋮

$$S_v = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_v = (-1)^v \frac{\alpha_0}{\alpha_v}$$

Τό πολυώνυμο  $g(x)$  θά είναι τό

$$g(x) = x^v - S_1' x^{v-1} + S_2' x^{v-2} + \dots + (-1)^v S_v'$$

όπου

$$\begin{aligned} S_1' &= \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_v = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_v} = \\ &= \frac{x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_v + x_1 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_v + \dots + x_1 x_2 \cdot \dots \cdot x_{v-1}}{x_1 x_2 \cdot \dots \cdot x_v} = \frac{(-1)^{v-1} \frac{\alpha_1}{\alpha_v}}{(-1)^v \frac{\alpha_0}{\alpha_v}} = -\frac{\alpha_1}{\alpha_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2' &= \rho_1 \rho_2 + \rho_1 \rho_3 + \dots + \rho_{v-1} \rho_v = \frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{x_1 x_3} + \dots + \frac{1}{x_{v-1} x_v} = \\ &= \frac{x_3 x_4 \cdot \dots \cdot x_v + \dots + x_1 x_2 \cdot \dots \cdot x_{v-2}}{x_1 x_2 \cdot \dots \cdot x_v} = \frac{(-1)^{v-2} \frac{\alpha_2}{\alpha_v}}{(-1)^v \frac{\alpha_0}{\alpha_v}} = \frac{\alpha_2}{\alpha_0} \end{aligned}$$

⋮

$$S_v' = \rho_1 \rho_2 \cdot \dots \cdot \rho_v = \frac{1}{x_1 x_2 \cdot \dots \cdot x_v} = \frac{1}{(-1)^v \frac{\alpha_0}{\alpha_v}} = (-1)^v \frac{\alpha_v}{\alpha_0}$$

#### IV 4.3.

\*Έτσι έχουμε  $g(x) = x^v + \frac{\alpha_1}{\alpha_0} x^{v-1} + \frac{\alpha_2}{\alpha_0} x^{v-2} + \dots + \frac{\alpha_v}{\alpha_0}$  ή

$$g(x) = \frac{1}{\alpha_0} (\alpha_0 x^v + \alpha_1 x^{v-1} + \alpha_2 x^{v-2} + \dots + \alpha_v).$$

8. \*Αν τὰ πολυώνυμα  $f(x)$ ,  $g(x)$  είναι πρώτα μεταξύ τους, τότε καί τὰ πολυώνυμα  $(f(x))^k$  καί  $(g(x))^l$ , όπου  $k, l \in \mathbb{N}$ , είναι πρώτα μεταξύ τους.

\*Απόδειξη: \*Ας υποθέσουμε ότι τὸ μὴ σταθερὸ πολυώνυμο  $\sigma(x)$  είναι κοινὸς διαιρέτης τῶν  $(f(x))^k$  καί  $(g(x))^l$ . Τότε  $(f(x))^k = \sigma(x) \pi_1(x)$  καί  $(g(x))^l = \sigma(x) \pi_2(x)$ .

\*Αν τώρα  $\rho$  εἶναι ρίζα τοῦ  $\sigma(x)$ , ὁπότε  $\sigma(\rho) = 0$ , θὰ εἶναι καί  $(f(\rho))^k = (g(\rho))^l = 0$ , δηλ.  $f(\rho) = g(\rho) = 0$ , πού σημαίνει ὅτι τὰ  $f(x)$ ,  $g(x)$  θὰ ἔχουν κοινὸ διαιρέτη τὸ μὴ σταθερὸ πολυώνυμο  $x - \rho$ . Αὐτὸ ὁμῶς εἶναι ἄτοπο, γιὰ τὸ τὰ  $f(x)$  καί  $g(x)$  εἶναι πρώτα μεταξύ τους.

### 4.3. Ἀσκήσεις

- \*Αν ἓνα πολυώνυμο  $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ , παίρνει τήν ἀριθμητικὴ τιμὴ  $\lambda$  γιὰ ἀπειρες μιγαδικές τιμές τοῦ  $x$ , τότε δείξτε ὅτι τὸ πολυώνυμο αὐτὸ εἶναι τὸ σταθερὸ πολυώνυμο  $\lambda \in \mathbb{C}[x]$ .
- Δείξτε ὅτι τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως τοῦ πολυωνύμου  $f(x)$  μὲ τὸ  $x^2 - 2px + p^2$  εἶναι τὸ  $\pi(\rho)x + f(\rho) - \rho\pi(\rho)$ , ὅπου  $\pi(x)$  εἶναι τὸ πηλίκο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $[f(x) - f(\rho)]$  μὲ τὸ  $(x - \rho)$ .
- \*Αν τὰ πολυώνυμα  $f(x)$  καί  $g(x)$  ἔχουν τὸν ἀριθμὸ  $\rho$  ρίζα μὲ πολλαπλότητα  $k$  καί  $l$  ἀντιστοίχως, τότε ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν  $f(x)$  καί  $g(x)$  ἔχει ἐπίσης ρίζα τὸν ἀριθμὸ  $\rho$  μὲ πολλαπλότητα  $v = \min(k, l)$ .

4. Δείξτε ὅτι τὸ πολυώνυμο  $f(x) = \frac{(x-\alpha)(x-\beta)}{(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)} + \frac{(x-\beta)(x-\gamma)}{(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)} + \frac{(x-\gamma)(x-\alpha)}{(\beta-\gamma)(\beta-\alpha)}$   
μὲ  $(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha) \neq 0$  εἶναι τὸ σταθερὸ πολυώνυμο  $f(x) = 1$ .

5. Δείξτε ὅτι τὸ πολυώνυμο  $x^2 - 4x + 4$  εἶναι παράγοντας τοῦ πολυωνύμου

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4.$$

- Νὰ ἐξετάσετε ἂν τὸ πολυώνυμο  $f(x) = x^5 - 11x^4 + 43x^3 - 74x^2 + 52x - 8$  ἔχει τὸν 2 ρίζα μὲ πολλαπλότητα 3.
- Δίνεται ἡ ἐξίσωση  $(\lambda + 1)x^3 - (\lambda^2 + 5\lambda - 5)x^2 + (\lambda^2 + 5\lambda - 5)x - (\lambda + 1) = 0$  μὲ  $\lambda \neq -1$   
α) Δείξτε ὅτι γιὰ κάθε τιμὴ τοῦ  $\lambda$  ( $\lambda \neq -1$ ) ἡ ἐξίσωση ἔχει ρίζες πού ἀποτελοῦν γεωμετρικὴ πρόοδο. β) \*Αν  $\rho_2$  εἶναι ἡ ρίζα τῆς πού δέν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ  $\lambda$ , νὰ προσδιορίσετε τὸ  $\lambda$ , ὥστε οἱ ρίζες  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  νὰ ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴ πρόοδο.  
γ) Δείξτε ὅτι γιὰ ὅλες τὶς τιμές  $\lambda$  πού βρήκατε στὴν προηγουμένη περίπτωση ἡ ἐξίσωση ἔχει τρεῖς ρίζες ἴσες.
- Νὰ κατασκευάσετε ἐξίσωση τρίτου βαθμοῦ μὲ ρίζες τοὺς ἀριθμοὺς 1, -2, 3.
- Βρεῖτε ἐξίσωση πού ἔχει ρίζες τὰ τετράγωνα τῶν ριζῶν τῆς  $x^2 + \alpha_1 x^2 + \alpha_2 x + \alpha_3 = 0$ .
- Δίνονται τὰ πολυώνυμα  $f(x) = x^3 + \alpha x - \beta$  καί  $g(x) = \beta x^3 - \alpha x - 1$ , μὲ  $\alpha > 0, \beta > 0$ . \*Αν  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  εἶναι οἱ ρίζες τοῦ  $f(x)$  καί τὰ  $f(x)$  καί  $g(x)$  ἔχουν μιά κοινὴ πραγματικὴ ρίζα, τότε δείξτε ὅτι i)  $\rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2 = -2\alpha$  καί ii)  $|\rho_1| + |\rho_2| + |\rho_3| > 2$
- \*Αν  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, n \in \mathbb{N}$  μὲ  $n > 1$ , εἶναι  $n$  διακεκριμένοι ἀριθμοὶ καί θέσουμε  
 $P_1(x) = (x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$   
 $P_2(x) = (x - \alpha_1) (x - \alpha_3) \dots (x - \alpha_n)$   
 $\dots$   
 $P_k(x) = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{k-1}) (x - \alpha_{k+1}) \dots (x - \alpha_n), \quad k = 2, 3, \dots, n-1$   
 $P_n(x) = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{n-1})$

τότε επιλύστε τήν εξίσωση

$$\alpha_1 \cdot \frac{P_1(x)}{P_1(\alpha_1)} + \alpha_2 \cdot \frac{P_2(x)}{P_2(\alpha_2)} + \dots + \alpha_n \cdot \frac{P_n(x)}{P_n(\alpha_n)} = \beta, \text{ με } \beta \text{ σταθερό άριθμό.}$$

12. Δίνεται το πολυώνυμο

$$P(x) = \alpha\beta(\alpha-\gamma)x^3 + (\alpha^3 - \alpha^2\gamma + 2\alpha\beta^2 - \beta^2\gamma + \alpha\beta\gamma)x^2 + (2\alpha^2\beta + \beta^2\gamma + \alpha^2\gamma + \beta^3 - \alpha\beta\gamma)x + \alpha\beta(\beta+\gamma)$$

όπου  $\alpha, \beta, \gamma \neq 0$ ,  $\alpha \neq \gamma$  και  $\alpha \neq \beta$ .

Δείξτε ότι το  $P(x)$  διαιρείται από το  $Q(x) = \alpha\beta x^2 + (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha\beta$  και στη συνέχεια δείξτε ότι ο άριθμός  $P(x_0)$  διαιρείται με τό  $(\alpha + \beta)^3$ , όπου  $x_0 = (\alpha + \beta + 1)^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

13. "Αν γιά ένα πολυώνυμο  $f(x) \in \mathbb{C}[x]$  ισχύει  $f(x) = f(x+1)$  γιά κάθε  $x \in \mathbb{C}$ , δείξτε ότι είναι ένα σταθερό πολυώνυμο.

#### 4.4. Ειδικά θεωρήματα.

**Θεώρημα 1.** "Αν ένα μή μηδενικό πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές έχει ρίζα τό μιγαδικό άριθμό  $z = \alpha + \beta i$ , ( $\beta \neq 0$ ), τότε έχει ρίζα και τόν συζυγή του,  $\bar{z} = \alpha - \beta i$ .

"Απόδειξη:

"Αν τό  $f(x)$  είναι πρώτου βαθμού, τότε τό  $f(x)$  δέν έχει μιγαδική ρίζα, άφοϋ έχει πραγματικούς συντελεστές. "Αρα τό  $f(x)$  είναι τουλάχιστον β' βαθμού. Γιά νά δείξουμε ότι και ό μιγαδικός άριθμός  $\bar{z} = \alpha - \beta i$  είναι ρίζα του  $f(x)$ , άρκεί νά δείξουμε ότι ή διαίρεση του  $f(x)$  με τό πολυώνυμο  $g(x) = (x-z)(x-\bar{z}) = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2$  είναι τέλεια. "Αλλά τό  $g(x)$  είναι δευτέρου βαθμού και άρα τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του  $f(x)$  με τό  $g(x)$  θά είναι τό πολύ πρώτου βαθμού. "Αν λοιπόν είναι  $u(x) = kx + \lambda$  τό υπόλοιπο και  $\pi(x)$  τό πηλίκο αύτης τής διαίρέσεως, τότε ισχύει:

$$f(x) = g(x) \cdot \pi(x) + kx + \lambda \quad (1)$$

Είναι όμως  $f(\alpha + \beta i) = g(\alpha + \beta i) = 0$  και έπομένως γιά τήν τιμή  $\alpha + \beta i$  του  $x$  ή ισότητα (1) δίνει

$$(k + \alpha\beta i) + \lambda = 0 \text{ ή } (k + \lambda) + k\beta i = 0, \text{ ή } k + \lambda = 0 \text{ και } k\beta = 0,$$

άφοϋ  $k, \lambda \in \mathbb{R}$  σύμφωνα με τήν παρατήρηση 1 τής 2.4.

"Επειδή είναι  $\beta \neq 0$  θά έχουμε  $k = 0$ , όποτε και  $\lambda = 0$ , δηλαδή ή (1) γίνεται

$$f(x) = g(x) \cdot \pi(x) \quad (2)$$

πού άποδεικνύει τό ζητούμενο.

**Πορίσματα.**

1. "Αν ένα πολυώνυμο του  $\mathbb{R}[x]$ , έχει ρίζα τό μιγαδικό άριθμό  $z = \alpha + \beta i$ ,  $\beta \neq 0$  με πολλαπλότητα  $k$ , τότε και ό  $\bar{z} = \alpha - \beta i$  θά είναι ρίζα του με τήν ίδια πολλαπλότητα.
2. Τό πλήθος των μιγαδικών ριζών ενός πολυωνύμου με πραγματικούς συντελεστές είναι άρτιο.
3. Κάθε πολυώνυμο περιτοϋ βαθμού με πραγματικούς συντελεστές έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα.

#### IV 4.5.

**Θεώρημα 2.** "Αν ένα μή μηδενικό πολυώνυμο με ρητούς συντελεστές έχει ρίζα τον άρρητο  $a + \sqrt{\beta}$ ,  $a, \beta \in \mathbb{Q}, \beta > 0, \sqrt{\beta} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ , τότε θα έχει ρίζα και τον  $a - \sqrt{\beta}$ .

Τό θεώρημα αυτό αποδεικνύεται όπως τό προηγούμενο και συνάγονται ανάλογα πορίσματα μέ έκείνα του θεωρήματος 1.

**Θεώρημα 3.** "Αν ένα πολυώνυμο  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ,  $a_n \cdot a_0 \neq 0$ , μέ άκέραιους συντελεστές, έχει γιά ρίζα του τό ρητό  $\frac{\kappa}{\lambda} \neq 0$ ,  $(\kappa, \lambda) = 1$ , τότε ό  $\kappa$  θά είναι διαιρέτης του σταθερού όρου  $a_0$  του  $f(x)$  και ό  $\lambda$  του συντελεστή  $a_n$  του μεγιστοβάθμιου όρου του.

**Απόδειξη:** Από τήν υπόθεση έχουμε:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\kappa}{\lambda}\right) = 0 &\Leftrightarrow a_n \left(\frac{\kappa}{\lambda}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{\kappa}{\lambda}\right)^{n-1} + \dots + a_1 \left(\frac{\kappa}{\lambda}\right) + a_0 = 0 \\ &\Leftrightarrow a_n \kappa^n + a_{n-1} \kappa^{n-1} \lambda + \dots + a_1 \kappa \lambda^{n-1} + a_0 \lambda^n = 0 \\ &\Leftrightarrow a_n \kappa^n = -\lambda (a_{n-1} \kappa^{n-1} + \dots + a_1 \kappa \lambda^{n-2} + a_0 \lambda^{n-1}) \quad (1) \\ &\Leftrightarrow a_0 \lambda^n = -\kappa (a_n \kappa^{n-1} + a_{n-1} \kappa^{n-2} \lambda + \dots + a_1 \lambda^{n-1}) \quad (2) \end{aligned}$$

Επειδή οι παρενθέσεις στά δεύτερα μέλη τών (1) και (2) είναι άκέραιοι άριθμοί, ό  $\lambda$  και  $\kappa$  θά είναι άντιστοιχώς διαιρέτες τών  $a_n \kappa^n$  και  $a_0 \lambda^n$ . Είναι όμως  $(\kappa, \lambda) = 1$ , όπότε θά είναι  $(\kappa^n, \lambda) = 1$  και  $(\kappa, \lambda^n) = 1$ <sup>(1)</sup>. Αφού λοιπόν είναι  $\lambda \mid a_n \kappa^n$  και  $(\kappa^n, \lambda) = 1$ , θά είναι και  $\lambda \mid a_n$ . Όμοια και  $\kappa \mid a_0$ .

**Πόρισμα.** "Αν τό πολυώνυμο  $f(x) = x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ,  $a_0 \neq 0$  μέ άκέραιους συντελεστές, έχει ρητές ρίζες, τότε αυτές θά είναι άκέραιοι άριθμοί και διαιρέτες του  $a_0$ .

### 4 5. Παραδείγματα—Εφαρμογές.

1. Βρείτε ένα πολυώνυμο τετάρτου βαθμού μέ ρητούς συντελεστές, τό όποιο νά έχει δύο ρίζες του τούς άριθμούς  $i$  και  $1 - \sqrt{3}$ .

**Λύση:** Αφού τό ζητούμενο πολυώνυμο έχει ρητούς συντελεστές, θά ισχύουν γιά τίς μιγαδικές και γιά τίς άρρητες ρίζες του τά θεωρήματα 1. και 2. και συνεπώς οι άριθμοί  $-i$  και  $1 + \sqrt{3}$  θά είναι δύο άκόμα ρίζες του. Άρα τό  $f(x)$  θά είναι τής μορφής

$$f(x) = \kappa(x-i)(x+i)[(x-1) + \sqrt{3}][[(x-1) - \sqrt{3}], \kappa \in \mathbb{Q}, \kappa \neq 0$$

$$\text{ή } f(x) = \kappa(x^2+1)(x^2-2x-2). \text{ Ένα από τά ζητούμενα πολυώνυμα είναι π.χ. τό } \\ (x^2+1)(x^2-2x-2) = x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x - 2$$

2. Επιλύστε τήν εξίσωση  $x^3 - 4x^2 + 9x - 10 = 0$ , άν είναι γνωστό ότι ό μιγαδικός άριθμός  $1 + 2i$  είναι ρίζα της.

**Επίλυση:** Αφού τό πολυώνυμο του πρώτου μέλους τής εξισώσεως έχει πραγματικούς συντελεστές, τότε ή εξίσωση θά έχει ρίζα και τόν άριθμό  $1 - 2i$ , όπότε τό πολυώνυμο αυτό θά διαίρεται μέ τό πολυώνυμο  $[x - (1 + 2i)][x - (1 - 2i)] = x^2 - 2x + 5$ . Τό πηλίκο τής διαιρέσεως τους βρίσκουμε ότι είναι τό  $x - 2$  και άρα ή τρίτη ρίζα τής εξισώσεως είναι τό 2.

1. Βλέπε άσκηση 16 τής 1.9. του Κεφαλαίου III.

3. 'Επιλύστε τήν εξίσωση  $x^4+x^3-7x^2-x+6=0$ 

'Επίλυση: 'Επειδή οι συντελεστές του πρώτου μέλους είναι άκεραίοι και ο συντελεστής του  $x^4$  τό 1, αν υπάρχουν ρητές ρίζες, αυτές θα είναι άκεραίες και συγχρόνως διαιρέτες του σταθερού όρου +6. Εύκολα βρίσκουμε ότι οι ρίζες είναι οι άριθμοί -3, -1, 1, 2. (Χρησιμοποίησε π.χ. διαδοχικά τό σχήμα Horner).

4. 'Επιλύστε τήν εξίσωση  $2x^3+3x^2+8x+12=0$ .

'Επίλυση: 'Αν υπάρχουν ρητές ρίζες, αυτές θα είναι άνάγωγα κλάσματα μέ άριθμητή διαιρέτη του 12 και παρονομαστή διαιρέτη του 2. Βρίσκουμε έτσι ότι ό άριθμός  $-\frac{3}{2}$  είναι μία ρίζα και ή εξίσωση γίνεται:

$$\left(x + \frac{3}{2}\right) (2x^2+8)=0 \Leftrightarrow (2x+3) (x^2+4)=0 \Leftrightarrow (2x+3) (x+2i) (x-2i)=0.$$

'Αρα οι ρίζες είναι  $x_1=-\frac{3}{2}$ ,  $x_2=-2i$  και  $x_3=2i$ .

5. 'Αν οι συντελεστές του πολυώνυμου  $f_2(x) \in C_{[x]}$ , είναι οι συζυγείς των αντίστοιχων συντελεστών του πολυώνυμου  $f_1(x) \in C_{[x]}$  και ό βαθμός των  $f_1(x)$  και  $f_2(x)$  είναι  $v$ , δείξτε ότι οι ρίζες του ενός είναι οι συζυγείς των ριζών του άλλου.

'Απόδειξη: Τά πολυώνυμα  $f_1(x)$  και  $f_2(x)$  μπορούν νά πάρουν τή μορφή  $f_1(x)=\varphi_1(x)+i\varphi_2(x)$  και  $f_2(x)=\varphi_1(x)-i\varphi_2(x)$ , όπου τά πολυώνυμα  $\varphi_1(x)$  και  $\varphi_2(x)$  έχουν πραγματικούς συντελεστές. 'Αν λοιπόν ό μιγαδικός άριθμός  $k+i$  είναι μία ρίζα του  $f_1(x)$ , τότε θα είναι  $f_1(k+i)=0$  ή  $\varphi_1(k+i)+i\varphi_2(k+i)=0$  ή μετά τίς πράξεις  $(A+Bi)+i(\Gamma+\Delta i)=0$  ή τέλος  $(A-\Delta)+i(B+\Gamma)=0$ . (1)

Στήν έφαρμογή 2 τής 1.6. του Κεφαλαίου Ι, δείξαμε ότι  $\overline{\varphi(z)}=\varphi(\bar{z})$  και έπομένως ή άριθμητική τιμή του  $f_2(x)$  για  $x=k-i$  είναι:

$f_2(k-i)=\varphi_1(k-i)-i\varphi_2(k-i)=(A-Bi)-i(\Gamma-\Delta i)=(A-\Delta)-(B+\Gamma)i$ , όποτε λόγω τής (1) έχουμε  $f_2(k-i)=0$ . Τό  $f_2(x)$  έχει έπομένως ρίζες τίς συζυγείς των ριζών του  $f_1(x)$ .

## 4.6. 'Ασκήσεις

## 1. 'Επιλύστε τίς παρακάτω εξισώσεις

α)  $4x^4-4x^3-25x^2+x+6=0$

β)  $x^3+x^2-x-10=0$

γ)  $x^3-4x^2+x+6=0$

δ)  $2x^3-9x^2+7x+6=0$

ε)  $3x^3+x^2-6x+8=0$

στ)  $2x^3-11x^2+14x^2-2x^2+12x+9=0$

2. Προσδιορίστε τούς άκέραιους  $k$ , ώστε ή εξίσωση

$$x^3-x^2+kx+4=0$$

νά έχει μία τουλάχιστον ρητή ρίζα.

## 3. Δείξτε ότι ή εξίσωση

$$x^v-1=0, \quad v \in \mathbf{N}$$

έχει άκριβώς δύο ρητές ρίζες, αν  $v$  άρτιος, και άκριβώς μία ρητή ρίζα, αν  $v$  περιττός.

4. 'Εστω ότι ό άκέραιος  $\lambda$  είναι πρώτος άριθμός και διαιρέτης των  $k_1, k_2, k_3 \in \mathbf{Z}$ . Δείξτε ότι ό  $\lambda$  είναι διαιρέτης κάθε άκέραιας ρίζας τής εξισώσεως

$$x^3+k_1x^2+k_2x+k_3=0$$

Μέ τή βοήθεια αυτού του συμπεράσματος επιλύστε τήν εξίσωση

$$x^3-4x^2-4x+16=0$$

#### IV 4.6.

5. \*Αν μία ρίζα της εξίσωσης

$$x^3 - 8x^2 + kx + \lambda = 0$$

είναι ο μιγαδικός αριθμός  $3-i$ , προσδιορίστε τους πραγματικούς αριθμούς  $k$  και  $\lambda$  και τις άλλες ρίζες της.

6. Δείξτε ότι ο μιγαδικός αριθμός  $1+i$  είναι ρίζα της εξίσωσης

$$x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 2 = 0$$

και στη συνέχεια βρείτε τις άλλες ρίζες της.

7. \*Αν  $f(x)$  είναι πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές και συντελεστή του μεγιστοβάθμιου όρου τό 1, τότε προσδιορίστε τό  $f(x)$  στις ακόλουθες περιπτώσεις

α) Τό  $f(x)$  έχει τρεις ρίζες από τις οποίες οι δύο είναι τό 1 και τό  $2i$ .  
β) Τό  $f(x)$  έχει τέσσερις ρίζες από τις οποίες οι δύο είναι τό  $i$  και τό  $1+i$

8. Νά γίνει γινόμενο πρώτων παραγόντων καθένα από τά παρακάτω πολυώνυμα του  $\mathbf{C}[x]$

α)  $f(x) = x^4 - x^3 - x - 1$ , αν ένας παράγοντάς του είναι τά  $x-i$ .

β)  $g(x) = x^4 + 4x^3 + 10x^2 + 12x + 21$  αν ο ένας παράγοντας είναι τό  $(x+2-\sqrt{3}i)$ .

9. Νά γίνει γινόμενο πρώτων παραγόντων τό πολυώνυμο  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 7x + 6$  του  $\mathbf{C}[x]$ .

10. \*Αν  $\rho_1, \rho_2$  είναι οι ρίζες του  $\varphi(x) = x^2 + ax + \beta$ ,  $\beta \neq 0$  και ρίζες του πολυωνύμου  $f(x) = x^{2v} + \dots + \alpha^v x^v + \beta^v$ , όπου  $v$  ακέραιος φυσικός αριθμός, δείξτε ότι οι αριθμοί  $\frac{\rho_1}{\rho_2}, \frac{\rho_2}{\rho_1}$  είναι ρίζες του πολυωνύμου  $P(x) = x^v + 1 + (1+x)^v$ .

11. \*Αν υποθέσουμε ότι  $f(x) = (f_1(x))^2 + (f_2(x))^2$ , όπου  $f_1(x), f_2(x)$  πολυώνυμο νιοστού βαθμού με πραγματικούς συντελεστές, δείξτε ότι τό  $f(x)$  μπορεί νά γραφεί ως γινόμενο  $v$  δευτεροβάθμιων πολυωνύμων με πραγματικούς συντελεστές.

12. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $f(x) = x^v \eta\mu\alpha - x\eta\mu(v\alpha) + \eta\mu(v-1)\alpha$ , όπου  $\alpha \in \mathbf{R}$  και  $v \in \mathbf{N}$  με  $v \geq 2$ , διαιρείται με τό πολυώνυμο  $\varphi(x) = x^2 - 2x\sigma\upsilon\alpha + 1$ .

13. \*Αν τό πολυώνυμο  $f(x) = \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$  έχει ρίζα τόν αριθμό  $\rho$  και είναι  $f(\alpha_0) = 0$ , δείξτε ότι ο  $\rho$  είναι και ρίζα του πολυωνύμου  $g(x) = f(f(x))$ .

14. \*Ας είναι  $f(x) = x^2 + ax + \beta$ . Καλοῦμε  $g(x)$  τό πολυώνυμο πού προκύπτει αν στο  $f(x)$  θέσουμε όπου  $x$  τό  $f(x)$ . Δείξτε ότι αν  $\rho_1, \rho_2$  είναι οι ρίζες του πολυωνύμου  $f(x) - x$ , τότε αυτές είναι και ρίζες του  $g(x) - x$ .

15. Νά εξετάσετε αν τό πολυώνυμο  $f(x) = 27x^3 + 26x^2 + 9x - 2$  έχει ρίζες της μορφής  $\sqrt{\rho}$ , όπου  $\rho$  θετικός ρητός και  $\sqrt{\rho} \in \mathbf{R} - \mathbf{Q}$ .

16. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $f(x) = x^3 - x - 1$  έχει μία άρρητη ρίζα  $\rho_1$  και δύο συζυγείς μιγαδικές. Δείξτε ακόμα ότι  $1 < \rho_1 < \sqrt{2}$ .

17. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $f(x) = x^v + 2\lambda x + 2$ , με  $v \in \mathbf{N}$ ,  $v \geq 2$  και  $\lambda$  άκέραιο αριθμό, δέν έχει ρητές ρίζες.

18. \*Αν ένα πολυώνυμο νιοστού βαθμού, με  $v > 4$  και άκέραιους συντελεστές, λαμβάνει τήν τιμή 7 γιά τέσσερις διαφορετικές μεταξύ τους άκέραιες τιμές του  $x$ , δείξτε ότι γιά καμιά άκέραια τιμή του  $x$  τό πολυώνυμο δέ λαμβάνει τήν τιμή 14.

## 5. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3ου ΚΑΙ 4ου ΒΑΘΜΟΥ

## 5.1. Εισαγωγή.

Μέ την επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων έχουμε ασχοληθεί από την πρώτη τάξη του γυμνασίου. Έτσι όλοι γνωρίζουμε να επιλύουμε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εξισώσεις και ακόμα ειδικές μορφές εξισώσεων με βαθμό μεγαλύτερο από το δεύτερο, όπως είναι οι διτετράγωνες, οι αντίστροφες, οι δίνυμες, οι τριώνυμες κ.ά. Μέ τη βοήθεια ξάλλου τών θεωρημάτων που αναφέρονται στις ρίζες τών πολυωνύμων, μπορούμε επίσης να επιλύουμε όρισμένες εξισώσεις. **Αποδεικνύεται** στά μαθηματικά ότι ή επίλυση μιās εξισώσεως γενικής μορφής με βαθμό μεγαλύτερο από τόν τέταρτο δέν είναι πάντοτε δυνατή. Έτσι οί μόνες εξισώσεις που επιλύονται πάντοτε είναι οί εξισώσεις μέχρι και τέταρτου βαθμού.

Θά δοῦμε άμέσως από ένα τρόπο επίλυσεως εξισώσεων 3ου και 4ου βαθμού με συντελεστές από τό **C**. Στά παραδείγματα, για εύκολία στό λογισμό, θά περιοριστούμε σε εξισώσεις με πραγματικούς συντελεστές.

5.2. Επίλυση τής εξισώσεως  $x^3 + 3\alpha x^2 + 3\beta x + \gamma = 0$  (1)

Ή εξίσωση (1) είναι γενική μορφή τριτοβάθμιας εξισώσεως, άφοῦ κάθε εξίσωση τής μορφής

$$\alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0 = 0$$

παίρνει τή μορφή (1), όταν διαιρέσουμε τούς όρους της με  $\alpha_3$  και θέσουμε

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_3} = 3\alpha, \quad \frac{\alpha_1}{\alpha_3} = 3\beta, \quad \frac{\alpha_0}{\alpha_3} = \gamma$$

Κάνοντας τό μετασχηματισμό

$$x = y - \alpha \quad (M_1)$$

ή (1) παίρνει τή μορφή

$$y^3 + 3py + q = 0 \quad (2)$$

όπου είναι  $p = \beta - \alpha^2$  και  $q = 2\alpha^3 - 3\alpha\beta + \gamma$ .

Κάνοντας τώρα τό μετασχηματισμό

$$y = z - \frac{p}{z} \quad (M_2)$$

ή (2) παίρνει τή μορφή

$$z^3 + qz^3 - p^3 = 0 \quad (3)$$

που είναι δευτεροβάθμια εξίσωση με άγνωστο τό  $z^3$ .

Αν  $\rho_1, \rho_2$  είναι οί ρίζες τής δευτεροβάθμιας ως προς  $z^3$  εξισώσεως (3), τότε επιλύοντας μία από τίς δίνυμες εξισώσεις

$$z^3 = \rho_1, \quad z^3 = \rho_2 \quad (4)$$

βρίσκουμε τρεις τιμές  $z_1, z_2, z_3$  για τό  $z$ .

Θέτοντας τίς τιμές αυτές στό μετασχηματισμό ( $M_2$ ), βρίσκουμε αντίστοιχες τιμές  $y_1, y_2, y_3$  για τό  $y$ , από τίς όποιες με τή βοήθεια του ( $M_1$ ) βρίσκουμε τίς ρίζες  $x_1, x_2, x_3$  τής άρχικής.

**Παρατήρηση:** Όποια εξίσωση από τίς (4) και άν επιλύσουμε, θά βρούμε τελικά τίς ίδιες τιμές για τίς ρίζες  $x_1, x_2, x_3$  τής (1).

Παράδειγμα:

Νά επιλυθεί η εξίσωση  $7x^3 - 12x^2 - 8 = 0$ .

Έπιλυση: Φέρνουμε την εξίσωση στη μορφή (1), δηλαδή γράφουμε την ισοδύναμη της

$$x^3 + 3 \cdot \left(-\frac{4}{7}\right) x^2 + 3 \cdot 0x + \left(-\frac{8}{7}\right) = 0$$

Είναι λοιπόν  $\alpha = -\frac{4}{7}$ ,  $\beta = 0$ ,  $\gamma = -\frac{8}{7}$  και άρα

$$p = -\frac{4^2}{7^2} \quad \text{και} \quad q = -\frac{2^3 \cdot 5 \cdot 13}{7^3}$$

Η (3) γίνεται  $z^3 - \frac{2^3 \cdot 5 \cdot 13}{7^3} z^3 + \frac{4^3}{7^3} = 0$

και έχει λύσεις

$$z^3 = \left(\frac{2}{7}\right)^3 \quad \text{είτε} \quad z^3 = \left(\frac{8}{7}\right)^3$$

Από την  $z^3 = \left(\frac{2}{7}\right)^3$  παίρνουμε

$$z_1 = \frac{2}{7}, \quad z_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{7} \quad \text{και} \quad z_3 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{7}$$

και με τη βοήθεια του  $(M_2)$  βρίσκουμε

$$y_1 = \frac{10}{7}, \quad y_2 = \frac{-5-3i\sqrt{3}}{7} \quad \text{και} \quad y_3 = \frac{-5+3i\sqrt{3}}{7}$$

όποτε με τη βοήθεια του  $(M_1)$  βρίσκουμε τις ρίζες της αρχικής που είναι:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{-1-3i\sqrt{3}}{7}, \quad x_3 = \frac{-1+3i\sqrt{3}}{7}.$$

Σημείωση: Αν επιλύσουμε την εξίσωση:

$$z^3 = \left(\frac{8}{7}\right)^3$$

παίρνουμε  $z_1 = \frac{8}{7}$ ,  $z_2 = \frac{4(-1+i\sqrt{3})}{7}$  και  $z_3 = \frac{4(-1-i\sqrt{3})}{7}$ .

Βρίσκουμε λοιπόν τώρα

$$y_1 = \frac{10}{7}, \quad y_2 = \frac{-5+3i\sqrt{3}}{7} \quad \text{και} \quad y_3 = \frac{-5-3i\sqrt{3}}{7}$$

όποτε και πάλι είναι

$$x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{-1-3i\sqrt{3}}{7} \quad \text{και} \quad x_3 = \frac{-1+3i\sqrt{3}}{7}$$

Η εξίσωση μπορούσε να επιλυθεί και με τη βοήθεια του θεωρήματος 3 της 4.4.

### 5.3. Έπιλυση της εξισώσεως $x^4 + 4ax^3 + 6bx^2 + 4cx + \delta = 0$ (1)

Η εξίσωση (1) είναι γενική μορφή τεταρτοβάθμιας εξισώσεως, όπως εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε.

Αν συμβολίσουμε με  $\varphi(x)$  το πρώτο μέλος της (1), τότε μπορούμε να το γράψουμε σαν διαφορά τετραγώνων των πολυωνύμων

$$\begin{cases} A(x) = x^2 + 2\alpha x + \beta + 2\lambda \\ B(x) = 2\mu x + \nu \end{cases} \quad (M_1)$$

όπου τὰ  $\lambda, \mu, \nu$  είναι κατάλληλοι μιγαδικοί αριθμοί που πρέπει νὰ τούς προσδιορίσουμε.  
Πράγματι γράφοντας

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= [A(x)]^2 - [B(x)]^2 \quad \eta \\ [B(x)]^2 &= [A(x)]^2 - \varphi(x) \end{aligned}$$

μετά τὶς πράξεις βρίσκουμε τὴν ἰσότητα

$$(2\mu x + \nu)^2 = 4(\lambda + \alpha^2 - \beta)x^2 + 4(\alpha\beta + 2\alpha\lambda - \gamma)x + (\beta + 2\lambda)^2 - \delta \quad (2)$$

Γιὰ νὰ μπορεῖ λοιπὸν τὸ δεύτερο μέλος τῆς (2), ποὺ εἶναι δευτεροβάθμιο τριώνυμο τοῦ  $x$ , νὰ γίνῃ τέλειο τετράγωνο, ἀρκεῖ νὰ προσδιορίσουμε τὸ  $\lambda$ , ὥστε νὰ μηδενίζεται ἡ διακρινουσά του  $\Delta$ . Μετά τὶς πράξεις διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἐξίσωση  $\Delta = 0$  εἶναι ἰσοδύναμη μὲ τὴν ἐξίσωση

$$4\lambda^3 - (\delta - 4\alpha\gamma + 3\beta^2)\lambda + \beta\delta + 2\alpha\beta\gamma - \beta^3 - \gamma^2 - \alpha^2\delta = 0 \quad (3)$$

ποὺ εἶναι τριτοβάθμια ὡς πρὸς  $\lambda$  καὶ ἐπιλύεται ὅπως ἡ (2) τῆς 5.2.

Μὲ τὴ βοήθεια μιᾶς ἀπὸ τὶς τρεῖς τιμὲς τοῦ  $\lambda$ , ποὺ δίνει ἡ (3), ὑπολογίζουμε τὸ  $[B(x)]^2$  ἀπὸ τὴν (2) καὶ στὴ συνέχεια ἡ (1) λόγω τῆς  $\varphi(x) = [A(x)]^2 - [B(x)]^2$  ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἐξίσωση

$$[A(x) + B(x)][A(x) - B(x)] = 0 \quad (4)$$

ποὺ ἐπιλύεται ἀπλά, γιατί ἀνάγεται σὲ δύο δευτεροβάθμιες ἐξισώσεις.

#### Παρατηρήσεις

1. Ὅποια τιμὴ τοῦ  $\lambda$ , ποὺ δίνει ἡ (3), καὶ ἂν βάλουμε στὴ (2) θὰ βροῦμε ἀντίστοιχα πολυώνυμα  $A(x)$  καὶ  $B(x)$  ἀπὸ τὸν  $(M_1)$  ποὺ δίνουν τὶς λύσεις τῆς (1).
2. Ὁ σταθερὸς ὅρος τῆς (3) εἶναι τὸ ἀνάπτυγμα τῆς ὀριζουσας τρίτης τάξεως

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \delta \end{vmatrix}$$

#### Παράδειγμα:

Νὰ ἐπιλυθεῖ ἡ ἐξίσωση  $\varphi(x) = x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 12x + 27 = 0$

#### Ἐπίλυση:

Εἶναι  $\alpha=1, \beta=2, \gamma=3, \delta=27$ .

Ὁ σταθερὸς ὅρος τῆς (3) εἶναι  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 27 \end{vmatrix} = 54 + 6 + 6 - 8 - 9 - 27 = 22$

καὶ ὁ συντελεστής τοῦ πρωτοβάθμιου ὅρου τῆς εἶναι

$$-(27 - 4 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 2^2) = -27.$$

Ἔχουμε λοιπὸν τὴν ἐξίσωση

$$4\lambda^3 - 27\lambda + 22 = 0$$

ἢ τὴν ἰσοδύναμή της

$$\lambda^3 + 3\left(-\frac{9}{4}\right)\lambda + \frac{11}{2} = 0$$

ποὺ εἶναι ἡ (2) τῆς 5.2. μὲ  $p = -\frac{9}{4}$  καὶ  $q = \frac{11}{2}$  καὶ ἔχει ρίζες

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \frac{-2 + \sqrt{15}}{2} \quad \text{καὶ} \quad \lambda_3 = \frac{-2 - \sqrt{15}}{2}$$

Γιὰ  $\lambda=2$  παίρνουμε ἀπὸ τὸν  $(M_1)$

#### IV 6.1.

$$A(x) = x^2 + 2x + 6,$$

οπότε από την  $[B(x)]^2 = [A(x)]^2 - \varphi(x)$  ή από την (2) βρίσκουμε

$$[B(x)]^2 = (2x+3)^2$$

Οι εξισώσεις  $A(x)+B(x)=0$ ,

$A(x)-B(x)=0$  που δίνει ή (4)

γίνονται  $(x^2+2x+6)+(2x+3)=0$ ,  $(x^2+2x+6)-(2x+3)=0$  και έχουμε από αυτές τις ρίζες της αρχικής που είναι οι

$$x_1 = -2+i\sqrt{5}, \quad x_2 = -2-i\sqrt{5}, \quad x_3 = i\sqrt{3} \quad \text{και} \quad x_4 = -i\sqrt{3}.$$

#### 5.4. Άσκησης.

1. 'Επιλύστε τις εξισώσεις

α)  $2x^3 - 9x^2 + 12x - 4 = 0$

β)  $x^3 + 3x^2 - 3x - 14 = 0$

γ)  $x^3 - 3x^2 + 12x + 16 = 0$

δ)  $x^3 - 9x - 12 = 0$

2. 'Επιλύστε τις εξισώσεις

α)  $x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 10x - 5 = 0$

β)  $x^4 + 32x - 60 = 0$

### 6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ

#### 6.1. Είσαγωγή.

Οι εξισώσεις και ανισώσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε εδώ, θα έχουν πραγματικούς συντελεστές.

Διερεύνηση μιās εξίσωσης, με άγνωστο  $x \in \mathbf{C}$ , κάνουμε

- α) όταν αναζητούμε τό είδος και τό πρόσημο τών ριζών της για τις διάφορες πραγματικές τιμές τών συντελεστών της, ή  
β) όταν αναζητούμε τις τιμές τών συντελεστών για τις οποίες οι ρίζες τής εξίσωσης ικανοποιούν όρισμένες συνθήκες.

Διερεύνηση μιās ανίσωσης, με άγνωστο  $x \in \mathbf{R}$ , κάνουμε

- α) όταν αναζητούμε τις πραγματικές τιμές του  $x$  που ικανοποιούν την ανίσωση για τις διάφορες πραγματικές τιμές τών συντελεστών της, ή  
β) όταν αναζητούμε τις τιμές τών συντελεστών της για τις οποίες ή ανίσωση ικανοποιείται για δεδομένες τιμές του  $x \in \mathbf{R}$ .

Δίνουμε άμέσως μερικά ενδιαφέροντα παραδείγματα διερευνήσεων, που φυσικά δέν εξαντλούν τό θέμα, αλλά μάς κατατοπίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό πάνω στά συνήθη προβλήματα διερευνήσεων.

## 6.2. Διερεύνηση εξισώσεων και άνισώσεων.

1. Νά διερευνηθεί για τις τιμές  $\lambda \in \mathbb{R}$  ή εξίσωση με άγνωστο  $x$ :

$$(\lambda-3)x^2 - 2(3\lambda-4)x + 7\lambda - 6 = 0 \quad (1)$$

Διερεύνηση:

α) Για  $\lambda-3=0$  ή  $\lambda=3$  ή (1) γίνεται  $-10x+15=0$ , δηλαδή πρωτοβάθμια, και έχει τή λύση  $x = \frac{3}{2}$ .

β) Για  $\lambda-3 \neq 0$  ή  $\lambda \neq 3$ , ή (1) είναι δευτεροβάθμια. Θα εξετάσουμε λοιπόν τὰ πρόσημα τῶν  $\Delta$ ,  $P$ ,  $S$ , ὅπου  $\Delta$  ἡ διακρίνουσα,  $P$  τὸ γινόμενο τῶν ριζῶν καὶ  $S$  τὸ ἄθροισμά τους. Ἔχουμε:

i)  $\Delta = 4(2\lambda^2 + 3\lambda - 2)$ . Εἶναι  $\Delta = 0$  γιὰ  $\lambda_1 = -2$  καὶ  $\lambda_2 = \frac{1}{2}$

$\Delta > 0$  ἢ  $2\lambda^2 + 3\lambda - 2 > 0$  γιὰ  $\lambda < -2$  εἴτε  $\lambda > \frac{1}{2}$

καὶ  $\Delta < 0$  γιὰ  $-2 < \lambda < \frac{1}{2}$ .

ii)  $P = \frac{7\lambda - 6}{\lambda - 3}$ . Εἶναι  $P = 0$  γιὰ  $\lambda = \frac{6}{7}$ ,

$P > 0$  ἢ  $(7\lambda - 6)(\lambda - 3) > 0$  γιὰ  $\lambda < \frac{6}{7}$  εἴτε  $\lambda > 3$

καὶ  $P < 0$  γιὰ  $\frac{6}{7} < \lambda < 3$

iii)  $S = \frac{2(3\lambda - 4)}{\lambda - 3}$ . Εἶναι  $S = 0$  γιὰ  $\lambda = \frac{4}{3}$ ,

$S > 0$  ἢ  $2(3\lambda - 4)(\lambda - 3) > 0$  γιὰ  $\lambda < \frac{4}{3}$  εἴτε  $\lambda > 3$

καὶ  $S < 0$  γιὰ  $\frac{4}{3} < \lambda < 3$

Σ' ἓναν κοινὸ πῖνακα βάζουμε τὰ παραπάνω μερικὰ συμπεράσματα καὶ βγάζουμε ἀπὸ τὸ συνδυασμὸ τους τὰ γενικὰ συμπεράσματα γιὰ τὴν (1).

IV 6.2.

$\lambda$	$\Delta$	P	S	$(\lambda-3)x^2-2(3\lambda-4)x+7\lambda-6=0$
$-\infty$	+	+	+	$0 < \rho_1 < \rho_2$
-2	0	+	+	$\rho_1 = \rho_2 = 2$
	-	+	+	$\rho_1, \rho_2 \in \mathbb{C}-\mathbb{R}, \rho_1 = \bar{\rho}_2$
$\frac{1}{2}$	0	+	+	$\rho_1 = \rho_2 = 1$
	+	+	+	$0 < \rho_1 < \rho_2$
$\frac{6}{7}$	0	-	+	$\rho_1 = 0, \rho_2 = \frac{1}{3}$
	+	-	+	$\rho_1 < 0 < \rho_2, \rho_2 >  \rho_1 $
$\frac{4}{3}$	0	-	-	$\rho_1 = -\sqrt{2} = -\rho_2$
	+	-	-	$\rho_1 < 0 < \rho_2,  \rho_1  > \rho_2$
3	//	//	//	πρωτοβάθμια $x = \frac{3}{2}$
$+\infty$	+	+	+	$0 < \rho_1 < \rho_2$

2. Νά διερευνηθεί για τις τιμές  $\lambda \in \mathbb{R}$  με άγνωστο  $x \in \mathbb{R}$  ή άνισηση

$$(\lambda+1)x^2 - 2(\lambda-1)x + 2(\lambda-1) > 0 \quad (1)$$

**Διερεύνηση.** Θά αναζητήσουμε τό πρόσημο τοῦ  $\alpha = \lambda + 1$  καί τῆς διακρίνουσας  $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$  γιά τίς διάφορες τιμές  $\lambda \in \mathbb{R}$  καί θά σχηματίσουμε πίνακα γιά νά διερευνήσουμε τήν (1).

\*Έχουμε:

α)  $\alpha = \lambda + 1 = 0$  γιά  $\lambda = -1$ ,  $\alpha > 0$  γιά  $\lambda > -1$  καί  $\alpha < 0$  γιά  $\lambda < -1$

β)  $\Delta = -4\lambda^2 - 8\lambda + 12$  καί εἶναι  $\Delta = 0$  γιά  $\lambda_1 = -3$  καί  $\lambda_2 = 1$ ,

$\Delta > 0$  ἢ  $-\lambda^2 - 2\lambda + 3 > 0$  ἢ  $\lambda^2 + 2\lambda - 3 < 0$  γιά  $-3 < \lambda < 1$  καί

$\Delta < 0$  γιά  $\lambda < -3$  εἴτε  $\lambda > 1$

$\lambda$	$\alpha$	$\Delta$	Λύσεις τῆς $(\lambda+1)x^2 - 2(\lambda-1)x + 2(\lambda-1) > 0$
$-\infty$	-	-	'Αδύνατη
-3	0	0	'Αδύνατη
	-	+	Λύσεις: $x \in \mathbb{R}$ μέ $\rho_1 < x < \rho_2$
-1	0	0	Πρωτοβάθμια. Λύσεις: $x \in \mathbb{R}$ μέ $x > 1$
	+	+	Λύσεις: $x \in \mathbb{R}$ μέ $x < \rho_1 < \rho_2$ εἴτε $\rho_1 < \rho_2 < x$
1	0	0	Λύσεις: ὅλα τά $x \in \mathbb{R}$ μέ $x \neq 0$
	+	-	Λύσεις: ὅλα τά $x \in \mathbb{R}$
$+\infty$	+	+	

3. Νά διερευνηθεί για τες τιμές  $\lambda \in \mathbb{R}$  με άγνωστο  $x$  ή εξίσωση

$$(4\lambda - 1)x^4 + 2(2\lambda - 3)x^2 - (4\lambda + 9) = 0 \quad (1)$$

Διερεύνηση: 'Από τή διερεύνηση τής εξίσώσεως

$$(4\lambda - 1)y^2 + 2(2\lambda - 3)y - (4\lambda + 9) = 0 \quad (2)$$

πού ονομάζεται επίλυουσα τής (1) και προκύπτει άπ' αυτήν, όταν θέσουμε  $x^2 = y$ , θά βγάλουμε τά συμπεράσματά μας για τήν (1).

Γιά  $4\lambda - 1 = 0$  ή  $\lambda = \frac{1}{4}$  ή (2) γίνεται πρωτοβάθμια με λύση  $y = -2$ .

Γιά  $4\lambda - 1 \neq 0$  ή  $\lambda \neq \frac{1}{4}$  έχουμε:

α)  $\Delta = 80\lambda^2 + 80\lambda$  και είναι  $\Delta = 0$  για  $\lambda_1 = 0$  και  $\lambda_2 = -1$ ,  
 $\Delta > 0$  για  $\lambda < -1$  είτε  $\lambda > 0$  και  $\Delta < 0$  για  $-1 < \lambda < 0$ .

β)  $P = \frac{-(4\lambda + 9)}{4\lambda - 1}$  και είναι  $P = 0$  ή  $4\lambda + 9 = 0$  για  $\lambda = -\frac{9}{4}$ ,

$P > 0$  ή  $-(4\lambda + 9)(4\lambda - 1) > 0$  ή  $(4\lambda + 9)(4\lambda - 1) < 0$  για  $-\frac{9}{4} < \lambda < \frac{1}{4}$

$P < 0$  για  $\lambda < -\frac{9}{4}$  είτε  $\lambda > \frac{1}{4}$

γ)  $S = \frac{-2(2\lambda - 3)}{4\lambda - 1}$  και είναι  $S = 0$  για  $\lambda = \frac{3}{2}$ ,

$S > 0$  ή  $-2(2\lambda - 3)(4\lambda - 1) > 0$  ή  $2(2\lambda - 3)(4\lambda - 1) < 0$  για  $\frac{1}{4} < \lambda < \frac{3}{2}$

$S < 0$  για  $\lambda < \frac{1}{4}$  είτε  $\lambda > \frac{3}{2}$ .

$\lambda$	$\Delta$	P	S	Συμπεράσματα για τήν επίλυουσα	Συμπεράσματα για τες ρίζες τής $(4\lambda - 1)x^4 + 2(2\lambda - 3)x^2 - (4\lambda + 9) = 0$
$-\infty$					
	+	-	-	$y_1 < 0 < y_2,  y_1  > y_2$	$\rho_1 = -\sqrt{y_2}, \rho_2 = \sqrt{y_2}, \rho_3 = -i\sqrt{-y_1}, \rho_4 = i\sqrt{-y_1}$
$\frac{9}{4}$		0		$\rightarrow y_1 = -\frac{9}{4}, y_2 = 0$	$\rho_1 = \rho_2 = 0, \rho_3 = -\frac{3i}{2}, \rho_4 = \frac{3i}{2}$
	+	+	-	$y_1 < y_2 < 0$	$\rho_1 = -i\sqrt{-y_1}, \rho_2 = i\sqrt{-y_1}, \rho_3 = -i\sqrt{-y_2}, \rho_4 = i\sqrt{-y_2}$
-1		0		$\rightarrow y_1 = y_2 = -1$	$\rho_1 = \rho_3 = -i, \rho_2 = \rho_4 = i$
	-	+	-	$y_1, y_2 \in \mathbb{C} - \mathbb{R}, y_1 = \bar{y}_2$	$\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4 \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$
0		0		$\rightarrow y_1 = y_2 = -3$	$\rho_1 = \rho_3 = -i\sqrt{3}, \rho_2 = \rho_4 = i\sqrt{3}$
	+	+	-	$y_1 < y_2 < 0$	$\rho_1 = -i\sqrt{-y_1}, \rho_2 = i\sqrt{-y_1}, \rho_3 = -i\sqrt{-y_2}, \rho_4 = i\sqrt{-y_2}$
$\frac{1}{4}$		//	//	$\rightarrow$ Πρωτοβ. $y = -2$	$\rho_1 = -i\sqrt{2}, \rho_2 = i\sqrt{2}$
	+	-	+	$y_1 < 0 < y_2, y_2 >  y_1 $	$\rho_1 = -i\sqrt{-y_1}, \rho_2 = i\sqrt{-y_1}, \rho_3 = -\sqrt{y_2}, \rho_4 = \sqrt{y_2}$
$\frac{3}{2}$		0		$\rightarrow y_1 = -\sqrt{3}, y_2 = \sqrt{3}$	$\rho_1 = -i\sqrt{3}, \rho_2 = i\sqrt{3}, \rho_3 = -\sqrt{3}, \rho_4 = \sqrt{3}$
	+	-	-	$y_1 < 0 < y_2,  y_1  > y_2$	$\rho_1 = -i\sqrt{-y_1}, \rho_2 = i\sqrt{-y_1}, \rho_3 = -\sqrt{y_2}, \rho_4 = \sqrt{y_2}$
$+\infty$					

#### IV 6.2.

4. Βρείτε τις τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  για τις οποίες η εξίσωση

$$(2\lambda+1)x^2 - 4x + 2\lambda = 0$$

έχει δύο ρίζες πραγματικές άνισες και μικρότερες από τον 3.

Λύση:

Για να έχει η εξίσωσή μας δύο πραγματικές και άνισες ρίζες, αρκεί να είναι

$$2\lambda+1 \neq 0 \quad \text{καί} \quad \Delta' = \frac{1}{4}(\beta^2 - 4\alpha\gamma) = \left(\frac{\beta}{2}\right)^2 - \alpha\gamma > 0, \text{ δηλαδή}$$

$$\lambda \neq -\frac{1}{2} \quad \text{καί} \quad 4 - 2\lambda(2\lambda+1) > 0 \quad \text{ή}$$

$$\lambda \neq -\frac{1}{2} \quad \text{καί} \quad 2\lambda^2 + \lambda - 2 < 0 \quad \text{ή}$$

$$\lambda \neq -\frac{1}{2} \quad \text{καί} \quad \frac{-1-\sqrt{17}}{4} < \lambda < \frac{-1+\sqrt{17}}{4} \quad (1)$$

Για να βρίσκεται ο 3 έξω από το διάστημα τῶν ριζῶν, αρκεί, με τούς περιορισμούς (1), ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ τριωνύμου  $f(x) = (2\lambda+1)x^2 - 4x + 2\lambda$ , γιὰ  $x=3$ , νὰ εἶναι ὁμόσημη τοῦ  $\alpha=2\lambda+1$ , δηλ. ἀρκεῖ  $(2\lambda+1)f(3) > 0$  ἢ  $(2\lambda+1)(20\lambda-3) > 0$  ἢ

$$\lambda < -\frac{1}{2} \quad \text{εἴτε} \quad \lambda > \frac{3}{20} \quad (2)$$

Ἐπειδὴ θέλομε ἀκόμα νὰ εἶναι καὶ

$$\left. \begin{array}{l} \rho_1 < 3 \\ \rho_2 < 3 \end{array} \right\}, \text{ ἀρκεῖ με τούς περιορισμούς (1) καὶ (2)}$$


να εἶναι ἀκόμα  $\frac{\rho_1 + \rho_2}{2} < 3$  ἢ  $-\frac{\beta}{2\alpha} < 3$  ἢ  $3 + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$ , δηλαδή

$$3 - \frac{2}{2\lambda+1} > 0 \quad \text{ἢ} \quad \frac{3(2\lambda+1)-2}{2\lambda+1} > 0$$

$$\text{ἢ} \quad (6\lambda+1)(2\lambda+1) > 0 \quad \text{ἢ}$$

$$\lambda < -\frac{1}{2} \quad \text{εἴτε} \quad \lambda > -\frac{1}{6} \quad (3)$$

Με τὴ βοήθεια τῆς εὐθείας τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν βρίσκουμε εὐκολὰ ποῖες τιμές τοῦ  $\lambda \in \mathbb{R}$  ἱκανοποιοῦν τῖς (1), (2), (3).



Άρα η εξίσωση θα έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες και μικρότερες από τον 3 για

$$\lambda \in \left( \frac{-1-\sqrt{17}}{4}, -\frac{1}{2} \right) \cup \left( \frac{3}{20}, \frac{-1+\sqrt{17}}{4} \right)$$

5. Για την προηγούμενη εξίσωση προσδιορίστε τους  $\lambda \in \mathbb{R}$ , για να βρίσκεται ή μία ρίζα της στο διάστημα  $(-1,3)$ .

Λύση:

Οι αριθμητικές τιμές του  $f(x)$  για  $x=-1$  και για  $x=3$  θα είναι ή μία όμοσημη του  $\alpha$  και ή άλλη έτερόσημη, όποτε αρκεί να είναι

$$f(-1)f(3) < 0. \quad (1)$$

Η συνθήκη αυτή εξασφαλίζει συγχρόνως και την ύπαρξη πραγματικών και άνισων ριζών, όταν είναι  $\alpha \neq 0$  δηλ.  $\lambda \neq -\frac{1}{2}$ .

Η (1) ισοδυναμεί με την άνίσωση

$$(4\lambda+5)(20\lambda-3) < 0$$

πού άληθεύει για  $-\frac{5}{4} < \lambda < \frac{3}{20}$

και άρα ή εξίσωση για τίς τιμές

$\lambda \in \left( -\frac{5}{4}, -\frac{1}{2} \right) \cup \left( -\frac{1}{2}, \frac{3}{20} \right)$  θα έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, από τίς όποίες ή μία θα άνήκει στο διάστημα  $(-1,3)$ .

6. Βρείτε τους  $\lambda \in \mathbb{R}$ , ώστε ή άνίσωση

$$\lambda x^2 - 2(\lambda+1)x + \lambda < 0$$

να άληθεύει για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

Λύση:

Έπειδή τό τριώνυμο  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  διατηρεί τό ίδιο πρόσημο για όλα τά  $x \in \mathbb{R}$ , μόνο όταν είναι  $\Delta < 0$ , άρκει να είναι

$$\alpha = \lambda < 0 \quad \text{και} \quad \Delta' = \frac{1}{4} [2(\lambda+1)]^2 - 4\lambda \cdot \lambda < 0 \quad \text{ή}$$

$$\lambda < 0 \quad \text{και} \quad (\lambda+1)^2 - \lambda^2 < 0 \quad \text{ή}$$

#### IV 6.3.

$$\lambda < 0 \quad \text{καί} \quad 2\lambda + 1 < 0 \quad \eta$$

$$\lambda < -\frac{1}{2}$$

"Αρα για  $\lambda < -\frac{1}{2}$  η δεδομένη ανίσωση αληθεύει για όλα τα  $x \in \mathbb{R}$ .

### 6.3. Έφαρμογές σε τριγωνομετρικές εξισώσεις.

1. Νά επιλυθεί και νά διερευνηθεί η εξίσωση

$$a\eta\mu^2 x + b\eta\mu x + \gamma = 0, \quad a, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \quad \text{καί} \quad a \neq 0 \quad (1)$$

**Επίλυση:** "Αν θέσουμε  $\eta\mu x = t$  ή (1) γίνεται αλγεβρική εξίσωση ως προς  $t$ :

$$f(t) = at^2 + \beta t + \gamma = 0, \quad a \neq 0 \quad (2)$$

"Αν  $t_1, t_2$  είναι οι ρίζες της (2), τότε η (1) έχει για γενική λύση όλες τις λύσεις των βασικών εξισώσεων

$$\eta\mu x = t_1, \quad \eta\mu x = t_2 \quad (3)$$

Για νά έχει η (1) λύση, πρέπει νά έχει λύση μία τουλάχιστον από τις (3). Δηλαδή πρέπει οι αριθμοί  $t_1, t_2$  νά είναι πραγματικοί και ένας τουλάχιστον νά βρίσκεται στο διάστημα  $[-1, 1]$ . "Ετσι έχουμε την ακόλουθη διερεύνηση.

**Διερεύνηση.** α) "Η εξίσωση  $f(t) = at^2 + \beta t + \gamma = 0$  έχει **μιά μόνο δεκτή ρίζα**, όταν:

i) Μιά μόνο από τις ρίζες της  $t_1, t_2$  (έστω  $t_1 < t_2$ ) ανήκει στο διάστημα  $(-1, 1)$ , δηλαδή είναι  $t_1 < -1 < t_2 < 1$  ή  $-1 < t_1 < 1 < t_2$ .

"Η ικανή και αναγκαία συνθήκη γι' αυτό είναι:

$af(-1) \cdot af(1) < 0$  ή  $a^2 f(-1) \cdot f(1) < 0$  ή  $f(-1) \cdot f(1) < 0$ , δηλ.  $(a + \beta + \gamma)(a - \beta + \gamma) < 0$

ii) "Η μιά ρίζα είναι 1 και η άλλη έξω από τό διάστημα  $[-1, 1]$ . Αυτό ισχύει όταν και μόνο όταν

$$f(1) = 0 \quad \text{καί} \quad \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1, \quad \text{δηλ.} \quad a + \beta + \gamma = 0 \quad \text{καί} \quad \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1$$

γιατί, από  $t_1 \cdot t_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$ , αν η μιά ρίζα είναι ο αριθμός 1 ή άλλη είναι ο  $\frac{\gamma}{\alpha}$ .

iii) "Η μιά ρίζα είναι τό  $-1$  και η άλλη έξω από τό διάστημα  $[-1, 1]$ .

Αυτό ισχύει, όταν και μόνον όταν:

$$f(-1) = 0 \quad \text{καί} \quad \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1, \quad \text{δηλ.} \quad a - \beta + \gamma = 0 \quad \text{καί} \quad \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1$$

β) "Η εξίσωση  $f(t) = at^2 + \beta t + \gamma = 0$  έχει δύο δεκτές ρίζες,  $-1 \leq t_1 < t_2 \leq 1$ , όταν

και μόνον όταν  $\Delta > 0$ ,  $af(-1) \geq 0$ ,  $af(1) \geq 0$  και  $-1 < -\frac{\beta}{2a} < 1$ , δηλαδή

$$\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0, \alpha(\alpha - \beta + \gamma) \geq 0, \alpha(\alpha + \beta + \gamma) \geq 0, \text{ και } \left| -\frac{\beta}{2\alpha} \right| < 1$$

Ἡ τελευταία συνθήκη προκύπτει ἀπὸ τὸ ὅτι  $-1 \leq t_1 < t_2 \leq 1$  ἢ  $-1 \leq t_1 < \frac{t_1 + t_2}{2} < t_2 \leq 1$  καὶ  $t_1 + t_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$ .

γ) Ἡ ἐξίσωση  $f(t) = \alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0$  ἔχει μιά διπλή ρίζα δεκτὴ, ὅταν καὶ μόνο ὅταν  $\Delta = 0$  καὶ  $-1 \leq t_1 = t_2 = \frac{t_1 + t_2}{2} \leq 1$ , δηλαδή  $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$  καὶ  $\left| -\frac{\beta}{2\alpha} \right| \leq 1$ .

δ) Ἡ ἐξίσωση  $f(t) = \alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0$  δὲν ἔχει καμιά ρίζα δεκτὴ ὅταν καὶ μόνο ὅταν

i)  $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$ , δηλ. ἡ ἐξίσωση ἔχει ρίζες μιγαδικές.

ii) ἔχει δύο ρίζες μικρότερες ἀπὸ τὸ  $-1$ , ὁπότε θὰ ἰσχύουν

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0, af(-1) > 0 \text{ καὶ } t_1 \leq \frac{t_1 + t_2}{2} \leq t_2 < -1, \text{ δηλαδή}$$

$$\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0, \alpha(\alpha - \beta + \gamma) > 0 \text{ καὶ } -\frac{\beta}{2\alpha} < -1.$$

iii) ἔχει δύο ρίζες μεγαλύτερες ἀπὸ τὸ  $+1$ , ὁπότε θὰ ἰσχύουν

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0, af(1) > 0 \text{ καὶ } 1 < t_1 \leq \frac{t_1 + t_2}{2} \leq t_2, \text{ δηλαδή}$$

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0, \alpha(\alpha + \beta + \gamma) > 0 \text{ καὶ } -\frac{\beta}{2\alpha} > 1.$$

iv) ἔχει δύο ρίζες πραγματικές ἀπὸ τίς ὁποῖες ἡ μία εἶναι μικρότερη ἀπὸ τὸ  $-1$  καὶ ἡ ἄλλη μεγαλύτερη ἀπὸ τὸ  $+1$ , ὁπότε θὰ ἰσχύουν:

$$af(-1) < 0 \text{ καὶ } af(1) < 0, \text{ δηλαδή } \alpha(\alpha - \beta + \gamma) < 0 \text{ καὶ } \alpha(\alpha + \beta + \gamma) < 0$$

2. Νά ἐπιλυθεῖ καὶ νά διερευνηθεῖ ἡ ἐξίσωση (γραμμικὴ τριγωνομετρικὴ)

$$a\eta\mu x + \beta\sigma\upsilon\nu x = \gamma, \quad a, \beta, \gamma \neq 0 \quad (1)$$

Ἐπίλυση. 1ος τρόπος. Ἡ (1) γράφεται:

$$\eta\mu x + \frac{\beta}{\alpha}\sigma\upsilon\nu x = \frac{\gamma}{\alpha}, \text{ καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει πάντοτε τόσο } \theta \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$$

τέτοιο, ὥστε εφθ  $= \frac{\beta}{\alpha}$  ἔχουμε:

$$\eta\mu x + \epsilon\phi\theta \cdot \sigma\upsilon\nu x = \frac{\gamma}{\alpha} \quad \text{ἢ} \quad \eta\mu x + \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} \cdot \sigma\upsilon\nu x = \frac{\gamma}{\alpha} \quad \text{ἢ} \quad \eta\mu x \sigma\upsilon\nu\theta + \eta\mu\theta \sigma\upsilon\nu x =$$

$$\frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\theta \quad \text{ἢ}$$

$$\eta\mu(x + \theta) = \frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\theta \quad (2)$$

### IV 6.3.

‘Η (2) είναι βασική τριγωνομετρική εξίσωση και έχει λύση, όταν και μόνο όταν

$$\left| \frac{\gamma}{\alpha} \sin \theta \right| \leq 1 \Leftrightarrow \frac{\gamma^2}{\alpha^2} \sin^2 \theta \leq 1 \Leftrightarrow \frac{\gamma^2}{\alpha^2} \leq \frac{1}{\sin^2 \theta} \Leftrightarrow \frac{\gamma^2}{\alpha^2} \leq 1 + \varepsilon \varphi^2 \theta \Leftrightarrow \frac{\gamma^2}{\alpha^2} \leq 1 + \frac{\beta^2}{\alpha^2} \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2 \quad (3)$$

Δηλαδή, αν ισχύει  $\alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2$ , τότε υπάρχει τόξο  $\omega \in [0, 2\pi)$  τέτοιο, ώστε

$$\eta \mu \omega = \frac{\gamma}{\alpha} \sin \theta \quad (4)$$

‘Οπότε η (2) γίνεται:

$$\eta \mu (x + \theta) = \eta \mu \omega$$

‘Από τήν τελευταία παίρνουμε τις λύσεις

$$\begin{cases} x + \theta = 2k\pi + \omega, & k \in \mathbf{Z} \\ x + \theta = (2k+1)\pi - \omega, & k \in \mathbf{Z} \end{cases} \quad \eta \quad \begin{cases} x = 2k\pi + \omega - \theta, & k \in \mathbf{Z} \\ x = (2k+1)\pi - \omega - \theta, & k \in \mathbf{Z} \end{cases}$$

Με αυτό τον τρόπο επιλύουμε συνήθως τις γραμμικές τριγωνομετρικές εξισώσεις (1), όταν το τόξο  $\theta$ , για το οποίο είναι  $\varepsilon \varphi \theta = \frac{\beta}{\alpha}$ , είναι γνωστό τόξο.

‘Όταν αυτό δέ συμβαίνει χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τρόπο.

**2ος τρόπος:** Γνωρίζουμε ότι  $\eta \mu x = \frac{2\varepsilon \varphi \frac{x}{2}}{1 + \varepsilon \varphi^2 \frac{x}{2}}$  και  $\sin x = \frac{1 - \varepsilon \varphi^2 \frac{x}{2}}{1 + \varepsilon \varphi^2 \frac{x}{2}}$

$$\text{μέ } \frac{x}{2} \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, \text{ δηλ. } x \neq 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z},$$

όπότε η (1) γράφεται:

$$\alpha \cdot \frac{2\varepsilon \varphi \frac{x}{2}}{1 + \varepsilon \varphi^2 \frac{x}{2}} + \beta \cdot \frac{1 - \varepsilon \varphi^2 \frac{x}{2}}{1 + \varepsilon \varphi^2 \frac{x}{2}} = \gamma \quad \text{και μετά τις πράξεις:}$$

$$(\beta + \gamma)\varepsilon \varphi^2 \frac{x}{2} - 2\alpha\varepsilon \varphi \frac{x}{2} + (\gamma - \beta) = 0, \text{ με } x \neq 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z} \quad (2')$$

Τονίζουμε εδώ ότι η (1) δέν είναι ισοδύναμη με τή (2') γιατί η (2'), δέν έχει λύσεις τής μορφής  $x = 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}$ , ενῶ δέν αποκλείεται αυτές νά είναι λύσεις τής (1).

‘Η (2') επιλύεται τώρα εύκολα

- i) ‘Αν  $\beta + \gamma = 0$ , δηλ.  $\gamma = -\beta$  η (2') γίνεται  $\varepsilon \varphi \frac{x}{2} = -\frac{\beta}{\alpha}$ , η οποία είναι βασική τριγωνομετρική εξίσωση.
- ii) ‘Αν  $\beta + \gamma \neq 0$ , τότε η (2') έχει λύση, όταν και μόνον όταν  $\Delta \geq 0$ , δηλ.

$$\Delta = 4\alpha^2 - 4(\beta + \gamma) \cdot (\gamma - \beta) \geq 0, \text{ δηλ. } \alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2,$$

όπότε εφ  $\frac{x}{2} = \frac{2\alpha \pm \sqrt{\Delta}}{2(\beta + \gamma)}$ , από όπου υπολογίζουμε τὰ τόξα  $x$ .

Στήν (1) εξετάζουμε αν έχει και ρίζες τῆς μορφῆς  $x = 2k\pi + \pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$

### 3. Νά ἐπιλυθεῖ ἡ ἐξίσωση (συμμετρική ὡς πρὸς $\eta\mu x$ καὶ $\sigma\upsilon\nu x$ )

$$\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu^2 x \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x \sigma\upsilon\nu^2 x = 1 \quad (1)$$

Ἐπίλυση: Ἡ ἐξίσωση (1) εἶναι συμμετρική ὡς πρὸς  $\eta\mu x$  καὶ  $\sigma\upsilon\nu x$ , δηλ. δέ μεταβάλλεται αν θέσουμε ὅπου  $\eta\mu x$  τὸ  $\sigma\upsilon\nu x$  καὶ ὅπου  $\sigma\upsilon\nu x$  τὸ  $\eta\mu x$ . Τῆς συμμετρικῆς ἐξισώσεως μποροῦμε πάντοτε νά τῆς ἐκφράσουμε με ὄρους τὰ  $\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x$  καὶ  $\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$ . Ἔτσι ἡ ἐξίσωση (1) γράφεται

$$(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) - \eta\mu x \sigma\upsilon\nu x (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) = 1, \text{ δηλ. } (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) (1 - \eta\mu x \sigma\upsilon\nu x) = 1 \quad (2)$$

Θέτουμε τώρα

$$\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x = t, \text{ ὅπότε } \eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x + 2\eta\mu x \sigma\upsilon\nu x = t^2, \text{ δηλ. } \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = \frac{t^2 - 1}{2}. \quad (3)$$

Ὁ μετασχηματισμὸς  $\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x = t$  γράφεται:

$$\sqrt{2} \sigma\upsilon\nu \left( x - \frac{\pi}{4} \right) = t \quad \text{ἢ} \quad \sigma\upsilon\nu \left( x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{t}{\sqrt{2}},$$

Γιὰ νά ἔχει νόημα ἡ τελευταία ἰσότητα πρέπει:

$$\left| \frac{t}{\sqrt{2}} \right| \leq 1, \text{ δηλ. } -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2} \quad (4)$$

Ἐπομένως ἡ ἐξίσωση (2) γράφεται:

$$t \left( 1 - \frac{t^2 - 1}{2} \right) = 1 \quad \text{ἢ} \quad t \left( \frac{2 - t^2 + 1}{2} \right) = 1, \text{ δηλαδή} \\ t^3 - 3t + 2 = 0, \text{ μὲ } -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2} \quad (5)$$

Ἡ (5) εἶναι 3ου βαθμοῦ ὡς πρὸς  $t$  καὶ ἐπιλύεται με ἕναν ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τρόπους. Ἀπὸ τοὺς διαιρέτες τοῦ σταθεροῦ ὄρου βλέπουμε ἀμέσως ὅτι τὸ  $+1$  εἶναι ρίζα τῆς.

Ἔτσι ἡ (5) γίνεται:

$$(t-1)(t^2+t-2)=0, \text{ μὲ } -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2} \quad (6)$$

Ἡ (6) ἔχει ρίζες  $t=1$  (διπλή) καὶ  $t=-2$ , ἡ ὁποία ἀπορρίπτεται, γιατί δέν ἱκανοποιεῖ τὸν περιορισμὸ.

Ἐπομένως ἔχουμε:

$$\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x = 1 \Leftrightarrow \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu \left( x - \frac{\pi}{4} \right) = 1 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \left( x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \left( x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \left( x - \frac{\pi}{4} \right) = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{4} = 2k\pi \pm \frac{\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

#### IV. 6.4

Ή από τήν τελευταία παίρνουμε τίς λύσεις:

$$\begin{cases} x=2k\pi + \frac{\pi}{2}, & k \in \mathbb{Z} \\ \eta \\ x=2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

#### 6.4. Άσκήσεις.

- Νά όρίστωι ό πραγματικός αριθμός  $\lambda$ , ώστε οι ρίζες τής εξίσωσης  
 $(\lambda-2)x^2 + (2\lambda+1)x + \lambda = 0$   
 νά είναι: α) πραγματικές και άνισες β) πραγματικές και ίσες  
 γ) άντίστροφες, δ) μιγαδικές και ε) ή άπόλυτη τιμή τής διαφοράς τους μικρότερη άπό τό 2.
- Βρείτε τίς πραγματικές και τίς μιγαδικές ρίζες τής εξίσωσης  
 $x^2 + 8x + |x| + 20 = 0$
- Νά διερευνηθεί για όλες τίς πραγματικές τιμές του  $\lambda$  ή εξίσωση:  
 $(\lambda^2 + 3\lambda + 4)x^2 + 2(\lambda-1)x + 9\lambda - 9 = 0$
- Στήν εξίσωση  $x^4 - 5\lambda x^2 + \lambda - 2$ , νά όρίστωι ό  $\lambda$ , ώστε νά έχει τέσσερις ρίζες πραγματικές.
- Νά έπιλυθει και νά διερευνηθεί ή άνίσωση  
 $(\lambda-3)x^2 - 4x - 2\lambda < 0$ .
- Νά έπιλυθει και νά διερευνηθεί ή εξίσωση  
 $(\lambda-1)x^4 + 3\lambda x^2 + x^2 - 3\lambda x + (\lambda-1) = 0$
- Νά έπιλυθει και νά διερευνηθεί ή άνίσωση:  $\frac{\lambda(x+1)}{x-1} > 1$
- Νά έπιλυθοούν οι εξισώσεις α)  $\sin^2 x - \frac{3}{2} \sin x + \frac{1}{2} = 0$ ,  
 β)  $(1 + \sqrt{3})\eta\mu x + (1 - \sqrt{3})\sigma\upsilon\nu x = 1 + \sqrt{3}$ , γ)  $\eta\mu x + \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu x = \sqrt{2}$   
 δ)  $\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu\sigma\upsilon\nu x = 1$ .
- Νά έπιλυθοούν και νά διερευνηθοούν οι εξισώσεις:  
 α)  $\eta\mu 2x = \lambda\eta\mu 3x$  και β)  $\eta\mu x + (\lambda-1)\sigma\upsilon\nu x = 1 - 2\lambda$ ,  $\lambda \in \mathbb{Z}$
- Νά έπιλυθει και νά διερευνηθεί ή εξίσωση  
 $\lambda(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = 1$ .
- Νά βρεθεί ή ίκανή και άναγκαία συνθήκη, για νά έχει ή εξίσωση  
 $\mu\sigma\upsilon\nu x - (2\mu+1)\eta\mu x = \mu$   
 δύο ρίζες  $x_1, x_2$ , μέ  $x_1 - x_2 \neq 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , τέτοιες, ώστε  
 α)  $|x_1 - x_2| = \frac{\pi}{2}$   
 και β)  $x_1 + x_2 = \frac{3\pi}{2}$

## 7. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Κάθε παράσταση τῆς μορφῆς

$$\alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0,$$

μέ  $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbf{C}$  καὶ  $n \in \mathbf{N}_0$  ὀνομάζεται **πολυώνυμο τοῦ  $x$**  καὶ συμβολίζεται μέ  $f(x), g(x), \kappa.\acute{\alpha}.$

2. Στό σύνολο  $\mathbf{C}_{[x]}$  τῶν πολυωνύμων ὀρίζουμε δυό πράξεις, τήν πρόσθεση «+» καὶ τόν πολλαπλασιασμό «·». Ἡ δομή  $(\mathbf{C}_{[x]}, +, \cdot)$  εἶναι ἀντιμεταθετικός δακτύλιος μέ μοναδιαῖο στοιχεῖο.

3. Ἄν  $f(x)$  καὶ  $g(x)$  εἶναι πολυώνυμα τοῦ  $\mathbf{C}_{[x]}$  μέ  $g(x) \neq 0$ , τότε ὑπάρχει μοναδικό ζευγος πολυωνύμων  $\pi(x)$  καὶ  $\upsilon(x)$  τοῦ  $\mathbf{C}_{[x]}$ , μέ  $\upsilon(x) = 0$  ἢ βαθμ.  $\upsilon(x) < \text{βαθμ. } g(x)$  τέτοιο, ὥστε

$$f(x) = g(x)\pi(x) + \upsilon(x) \quad (1)$$

4. Ἄν στήν (1) εἶναι  $\upsilon(x) = 0$ , τότε τό  $g(x)$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $f(x)$ .

5. Κάθε συνάρτηση

$$f : A \rightarrow A$$

μέ τύπο

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

ὅπου  $a_0, a_1, \dots, a_n \in A$  καὶ  $A$  ἕνα ἀπό τά  $\mathbf{R}, \mathbf{C}$ , ὀνομάζεται **πολυωνυμική συνάρτηση τοῦ  $x$** .

Ὁ ἀριθμός

$$f(\rho) = a_n \rho^n + a_{n-1} \rho^{n-1} + \dots + a_1 \rho + a_0,$$

πού εἶναι εἰκόνα τοῦ  $\rho$  μέσω τῆς  $f$ , ὀνομάζεται **ἀριθμητική τιμή τῆς πολυωνυμικῆς συναρτήσεως  $f$  γιά  $x = \rho$**  ἢ καὶ **ἀριθμητική τιμή τοῦ πολυωνύμου**

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \text{ γιά } x = \rho.$$

Ἄν  $f(\rho) = 0$ , τότε λέμε ὅτι ὁ  $\rho$  εἶναι **ρίζα τοῦ πολυωνύμου  $f(x)$** .

Ἡ εὔρεση ὄλων τῶν ἀριθμῶν  $\rho$  γιά τούς ὁποίους εἶναι

$$f(\rho) = a_n \rho^n + a_{n-1} \rho^{n-1} + \dots + a_1 \rho + a_0 = 0$$

ὀνομάζεται **ἐπίλυση τῆς πολυωνυμικῆς ἐξισώσεως**

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0.$$

6. Κάθε πολυώνυμο  $f(x) \in \mathbf{C}_{[x]}$ , βαθμοῦ  $n \in \mathbf{N}_0$ , ἔχει  $n$  ἀκριβῶς ρίζες, ὅταν κάθε ρίζα μετρίεται τόσες φορές ὅσος εἶναι ὁ βαθμός πολλαπλότητάς της.
7. Οἱ πολυωνυμικές ἐξισώσεις μέχρι καὶ 4ου βαθμοῦ ἐπιλύονται πάντοτε. Ἐξισώσεις ἀνωτέρου τοῦ 4ου βαθμοῦ ἐπιλύονται μόνο σέ εἰδικές περιπτώσεις.
8. Στίς παραμετρικές ἐξισώσεις ἢ ἀνισώσεις κάνουμε πάντοτε διερεύνηση.

## 8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $f(x)=(\sin\varphi+\chi\eta\mu\varphi)^{\nu}-\sin(\nu\varphi)-\chi\eta\mu(\nu\varphi)$ , όπου  $\nu\in\mathbb{N}$ , είναι διαιρετό μέ τό πολυώνυμο  $g(x)=x^2+1$ .
2. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $f(x)=x^{\nu}\eta\mu\varphi-\rho^{\nu-1}\chi\eta\mu(\nu\varphi)+\rho^{\nu}\eta\mu(\nu-1)\varphi$ , όπου  $\nu\in\mathbb{N}$ , είναι διαιρετό μέ τό πολυώνυμο  $g(x)=x^2-2\rho\chi\sin\varphi+\rho^2$ .
3. Βρείτε τά  $\alpha$  καί  $\beta$ , ώστε τό πολυώνυμο

$$f(x)=\alpha x^{\nu+1}+\beta x^{\nu}+1 \text{ νά διαιρείται μέ τό } (x-1)^2.$$

4. "Αν τό πολυώνυμο  $f(x)=\alpha_{\nu}x^{\nu}+\alpha_{\nu-1}x^{\nu-1}+\alpha_{\nu-2}x^{\nu-2}+\dots+\alpha_1x+\alpha_0$  διαιρείται μέ τό  $(x-1)^2$ , δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $g(x)=\nu\alpha_{\nu}x^{\nu-1}+(\nu-1)\alpha_{\nu-1}x^{\nu-2}+\dots+\alpha_1$  διαιρείται μέ τό  $x-1$ .
5. "Ενα πολυώνυμο  $P(x)$  διαιρούμενο μέ  $x-\alpha$  έχει πηλίκο  $x^2-3x+4$  καί διαιρούμενο μέ  $x-\beta$  έχει πηλίκο  $x^2-4x+2$ . Νά βρείτε τό  $P(x)$  καί τά  $\alpha$  καί  $\beta$ , άν γνωρίζετε ότι ό σταθερός όρος του  $P(x)$  είναι ίσος μέ 1.
6. Δίνονται τά πολυώνυμα  $f_1(x)$  καί  $f_2(x)$  καί τά πηλίκα  $\pi_1(x)$  καί  $\pi_2(x)$  τών διαιρέσεων του  $f_1(x)$  μέ τό  $(x-\alpha)$  καί του  $f_2(x)$  μέ τό  $(x-\beta)$ . Δείξτε ότι τό υπόλοιπο  $u(x)$  τής διαιρέσεως του πολυωνύμου  $f_1(x)\cdot f_2(x)$  μέ τό  $(x-\alpha)\cdot(x-\beta)$  μέ  $\alpha\neq\beta$  δίνεται από τον τύπο  $u(x)=f_2(\beta)\pi_1(\beta)(x-\alpha)+f_1(\alpha)\pi_2(\alpha)(x-\beta)+f_1(\alpha)\cdot f_2(\beta)$

7. Βρείτε γιά ποιές τιμές τών  $\mu$  καί  $\nu$  τό πολυώνυμο  $x^4+1$  διαιρείται μέ τό  $x^2+\mu x+\nu$ .

8. "Αν  $\alpha+\beta+\gamma=0$  καί  $\alpha^m+\beta^m+\gamma^m=S_m$ , δείξτε ότι  $2S_4=S_2^2$ ,  $6S_5=5S_2S_3$ ,  $6S_7=7S_3S_4$ ,  $10S_7=7S_2S_5$ ,  $25S_5S_3=215S_5^2$   
 $50S_7^2=49S_4S_5^2$ ,  $S_{\nu+3}=\alpha\beta\gamma S_{\nu}+\frac{1}{2}S_2S_{\nu+1}$ .

9. "Αν τό πολυώνυμο  $f(x)=x^{\nu}+\alpha_{\nu-1}x^{\nu-1}+\alpha_{\nu-2}x^{\nu-2}+\dots+\alpha_1x+\alpha_0$  έχει ρίζες πραγματικές, δείξτε ότι  $(\alpha_{\nu-1}^2-2\alpha_{\nu-2})\cdot\nu\geq\alpha_{\nu-1}^2$
10. Βρείτε τή σχέση μεταξύ τών συντελεστών του πολυωνύμου  $f(x)=\alpha x^3+\beta x^2+\gamma x+\delta$  ώστε οι ρίζες του  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  νά ικανοποιούν τή συνθήκη  $\rho_1+\rho_2=2\rho_3$ .
11. Βρείτε τήν αναγκαία καί ικανή συνθήκη μεταξύ τών συντελεστών του πολυωνύμου  $f(x)=x^3-\alpha x^2+\beta x-\gamma$ , μέ  $\alpha\neq 0$ , ώστε μία ρίζα του νά είναι μέση ανάλογος τών δύο άλλων.
12. "Αν δύο από τίς ρίζες του πολυωνύμου  $f(x)=x^3+\alpha x^2+\beta x$  είναι αντίθετες, δείξτε ότι ένας τουλάχιστο τών συντελεστών  $\alpha, \beta$  είναι μηδέν καί αντίστροφα.
13. "Αν τό πολυώνυμο  $f(x)=x^3+\alpha x^2+\beta x+\gamma$  έχει πραγματικούς συντελεστές, μέ  $\gamma\neq 0$  καί οι ρίζες του  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  ικανοποιούν τίς ισότητες  $|\rho_1|=2|\rho_2|=3|\rho_3|$ , δείξτε ότι:  $|\alpha\beta|\leq 11|\gamma|$ .
14. Νά αποδειχτούν οι ισότητες

$$\alpha) x^{2\nu}-1=(x^2-1)\prod_{\kappa=1}^{\nu-1}\left(x^2-2x\sin\frac{\kappa\pi}{\nu}+1\right),$$

$$\beta) x^{2\nu+1}-1=(x-1)\prod_{\kappa=1}^{\nu}\left(x^2-2x\sin\frac{2\kappa\pi}{2\nu+1}+1\right),$$

όπου  $\kappa\in\mathbb{Z}$  καί  $\nu\in\mathbb{N}$  καί στή συνέχεια νά δείξετε ότι

$$\eta_{\mu}\frac{\pi}{2\nu}\eta_{\mu}\frac{2\pi}{2\nu}\dots\eta_{\mu}\frac{(\nu-1)\pi}{2\nu}=\frac{\sqrt{\nu}}{2^{\nu-1}}$$

15. Καθορίστε τόν  $n \in \mathbb{N}$  γιά τόν όποιο τό πολυώνυμο  
 $f(x) = x^{2n-2} + x^{2n-4} + \dots + x^4 + x^2 + 1$  είναι διαιρετό μέ τό πολυώνυμο  
 $g(x) = x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x^2 + x + 1$ .
16. Βρείτε τό είδος τῶν ριζῶν τοῦ πολυωνύμου  
 $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ , ἄν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  καί  $\frac{\alpha^2 - |\beta|}{|\alpha\beta|} \cdot \sqrt{2\beta} < 1$ .
17. Δείξτε ὅτι τό πολυώνυμο  $f(x) = (1-x^n)(1+x) - 2nx^n(1-x) - n^2x^n(1-x)^2$   
 είναι διαιρετό μέ τό  $(1-x^3)$ .
18. "Αν  $\rho$  είναι ρίζα τοῦ πολυωνύμου  $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$  μέ  $|\alpha| \geq |\beta| \geq |\gamma|$ , δείξτε ὅτι  
 $|\rho| < 1 + |\alpha|$ .
19. "Αν  $\rho$  είναι ρίζα τοῦ πολυωνύμου  $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_0$ , μέ  $|\rho| \geq 1$ ,  
 δείξτε ὅτι:  $|\alpha_n| \leq |\alpha_{n-1}| + |\alpha_{n-2}| + \dots + |\alpha_1| + |\alpha_0|$ .
20. "Αν  $\rho$  είναι ρίζα τοῦ  $f(x) = x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$ , δείξτε ὅτι:  
 $|\rho| < 1 + |\alpha_{n-1}| + \dots + |\alpha_1| + |\alpha_0|$ .
21. Νά ὀρίσῃτε ὁ πραγματικός ἀριθμός  $\alpha$ , ὥστε ἡ ἐξίσωση  $(\alpha-1)x^4 - (\alpha+1)x^2 + \alpha - 2 = 0$  νά  
 ἔχει α) τέσσερις ρίζες πραγματικές, β) δύο πραγματικές καί δύο μιγαδικές καί γ) τέσσερις  
 ρίζες μιγαδικές.
22. Δίνεται τό πολυώνυμο  
 $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$ ,  $\alpha_n \neq 0$  καί  $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{Z}$ .  
 "Αν τό πολυώνυμο αὐτό παίρνει τήν τιμή 3 γιά τέσσερις διαφορετικές ἀκέραιες τιμές,  
 τότε δείξτε ὅτι δέν ὑπάρχει ἀκέραιος  $\kappa$  τέτοιος, ὥστε  $f(\kappa) = 5$ .
23. Νά ἐπιλυθεῖ ἡ ἐξίσωση  
 $x^3 - x^2 + 9\alpha x - \alpha = 0$ ,  
 ἄν γνωρίζουμε ὅτι ἔχει ρίζες θετικές, καί ἔπειτα νά προσδιορισθεῖ ἡ τιμή τῆς παραμέτρου  $\alpha$ .

172  
173  
174

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

### ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

1. Τριγωνομετρικά συστήματα
2. Τριγωνομετρικές ανισώσεις
3. Σύντομη άνακεφαλαίωση
4. Άσκήσεις για επανάληψη

Σε όλα τα παραδείγματα να χρησιμοποιούμε την τριγωνομετρική εξίσωση σε διμερή-μή, όπως το σύστημα άσχετα στην έκθεση έως αυτού άλγεβρικού συστήματος.

Κ. ΒΑΛΛΑΙΩ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

1. Τριτοετής συστήματα
2. Τριτοετή ανάγκες
3. Σύντομη αναφορά
4. Αναφορές για επανόρθωση

## 1. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

### 1.1. Εισαγωγή.

Ένα σύστημα εξισώσεων, πού όλοι οι άγνωστοι είναι τόξα (ή γωνίες) και μία τουλάχιστον από τις εξισώσεις είναι τριγωνομετρική, ονομάζεται **τριγωνομετρικό σύστημα**.

Έπίλυση ενός τριγωνομετρικού συστήματος είναι ή εύρεση όλων τών τόξων πού τό έπαληθεύουν. Η επίλυση και ή διερεύνηση ενός τριγωνομετρικού συστήματος ανάγεται στην επίλυση και διερεύνηση μις τριγωνομετρικής εξίσωσης.

Στά τριγωνομετρικά συστήματα, όπως και στά άλγεβρικά συστήματα εξισώσεων, δέν υπάρχει πάντοτε μία γενική μέθοδος γιά τήν επίλυσή τους. Μπορούμε όμως νά ξεχωρίσουμε μερικές κατηγορίες τριγωνομετρικών συστημάτων, τά όποια επιλύονται μέ έναν όρισμένο τρόπο. Τονίζουμε έδω ότι γιά τήν επίλυση ενός τριγωνομετρικού συστήματος επιδιώκουμε πάντοτε νά βρούμε ένα ίσοδύναμό του άλγεβρικό γιά τόν προσδιορισμό τών άγνωστων τόξων.

### 1.2. Τριγωνομετρικά συστήματα μέ δύο εξισώσεις και δύο άγνωστα τόξα.

I. Η μία εξίσωση του συστήματος είναι άλγεβρική και ή άλλη τριγωνομετρική.

Στήν κατηγορία αυτή ανήκουν και τά ακόλουθα συστήματα, πού μπορούμε νά τά επιλύσουμε εύκολα.

$$\left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \eta \mu x \pm \eta \mu y = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \sigma \nu \eta x \pm \sigma \nu \eta y = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \epsilon \phi x \pm \epsilon \phi y = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \sigma \phi x \pm \sigma \phi y = \beta \end{array} \right\},$$

$$\left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \eta \mu x \cdot \eta \mu y = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \sigma \nu \eta x \cdot \sigma \nu \eta y = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \sigma \nu \eta x \cdot \eta \mu y = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \epsilon \phi x \cdot \epsilon \phi y = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \epsilon \phi x \cdot \sigma \phi y = \beta \end{array} \right\},$$

$$\left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \frac{\eta \mu x}{\eta \mu y} = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \frac{\sigma \nu \eta x}{\sigma \nu \eta y} = \beta \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x \pm y = \alpha \\ \frac{\epsilon \phi x}{\epsilon \phi y} = \beta \end{array} \right\}$$

Έδω προσπαθούμε νά μετασχηματίσουμε τήν τριγωνομετρική εξίσωση σε άλγεβρική, όποτε τό σύστημα ανάγεται στην επίλυση ενός άπλου άλγεβρικού συστήματος.

V 1.2.

Μέ παραδείγματα θα δούμε πώς εργαζόμαστε στην πράξη.

Παράδειγμα 1. Νά επιλυθεί το σύστημα

$$\left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ \eta\mu x + \eta\mu y &= \frac{3}{2} \end{aligned} \right\}$$

Έπιλυση: Το σύστημα Ισοδύναμα γράφεται:

$$\left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ 2\eta\mu \frac{x+y}{2} \operatorname{συν} \frac{x-y}{2} &= \frac{3}{2} \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ 2\eta\mu \frac{\pi}{3} \operatorname{συν} \frac{x-y}{2} &= \frac{3}{2} \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{συν} \frac{x-y}{2} &= \frac{3}{2} \end{aligned} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ \operatorname{συν} \frac{x-y}{2} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ \operatorname{συν} \frac{x-y}{2} &= \operatorname{συν} \frac{\pi}{6} \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ \frac{x-y}{2} &= 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \end{aligned} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ x-y &= 4k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{aligned} \right\}$$

Έπομένως έχουμε να επιλύσουμε τὰ ακόλουθα απλά άλγεβρικά συστήματα.

$$\left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ x-y &= 4k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{aligned} \right\} (\Sigma_1), \quad \left. \begin{aligned} x+y &= \frac{2\pi}{3} \\ x-y &= 4k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{aligned} \right\} (\Sigma_2)$$

Το σύστημα  $(\Sigma_1)$  έχει τὶς λύσεις:

$$x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad y = -2k\pi + \frac{\pi}{6}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

ἐνῶ τὸ σύστημα  $(\Sigma_2)$  έχει τὶς λύσεις:

$$x = 2k\pi + \frac{\pi}{6}, \quad y = -2k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (2)$$

Οἱ (1) καὶ (2) εἶναι οἱ λύσεις τοῦ ἀρχικοῦ συστήματος.

Παράδειγμα 2. Νά επιλυθεί το σύστημα

$$\left. \begin{aligned} x-y &= \frac{\pi}{3} \\ \operatorname{συν} x \operatorname{συν} y &= \frac{3}{4} \end{aligned} \right\}$$

Έπιλυση: Το σύστημα Ισοδύναμα γράφεται:

$$\left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{3} \\ 2\sigma\upsilon\upsilon\chi\sigma\upsilon\upsilon\upsilon = \frac{3}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{3} \\ \sigma\upsilon\upsilon(x+y) + \sigma\upsilon\upsilon(x-y) = \frac{3}{2} \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{3} \\ \sigma\upsilon\upsilon(x+y) + \sigma\upsilon\upsilon \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{3} \\ \sigma\upsilon\upsilon(x+y) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{3} \\ \sigma\upsilon\upsilon(x+y) = 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{3} \\ x+y = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x = k\pi + \frac{\pi}{6} \\ y = k\pi - \frac{\pi}{6} \end{array} \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

πού είναι οι λύσεις τοῦ τριγωνομετρικοῦ συστήματος.

**Παράδειγμα 3.** Νά ἐπιλυθεῖ τό σύστημα

$$\left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{6} \\ \frac{\epsilon\phi\chi}{\epsilon\phi\psi} = 3 \end{array} \right\} \left( \begin{array}{l} x, y \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \\ y \neq \rho\pi, \quad \rho \in \mathbb{Z} \end{array} \right)$$

**Ἐπίλυση:** Τό σύστημα ἰσοδύναμα γράφεται:

$$\left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{6} \\ \frac{\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi}{\epsilon\phi\chi - \epsilon\phi\psi} = \frac{3+1}{3-1} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{6} \\ \frac{\eta\mu(x+y)}{\frac{\sigma\upsilon\upsilon\chi \cdot \sigma\upsilon\upsilon\psi}{\eta\mu(x-y)}} = \frac{4}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{6} \\ \frac{\eta\mu(x+y)}{\eta\mu(x-y)} = 2 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{6} \\ \eta\mu(x+y) = 2\eta\mu(x-y) \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{6} \\ \eta\mu(x+y) = 2\eta\mu \frac{\pi}{6} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{6} \\ \eta\mu(x+y) = 1 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y = \frac{\pi}{6} \\ x+y = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x = k\pi + \frac{\pi}{3} \\ y = k\pi + \frac{\pi}{6} \end{array} \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

**Παράδειγμα 4.** Νά ἐπιλυθεῖ καί νά διερευνηθεῖ τό σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} x+y = \alpha \\ \frac{\eta\mu x}{\eta\mu y} = \beta, \quad \psi \neq \mu\pi, \quad \mu \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} (\Sigma)$$

## V 1.2.

### Έπιλυση:

Στό σύστημα αυτό έχουμε και τις παραμέτρους  $\alpha, \beta$  και θά πρέπει να εξετάσουμε, για τις διάφορες τιμές τους, πότε το σύστημα έχει λύση, πότε είναι άοριστο και πότε είναι αδύνατο.

1. \*Αν  $\beta=1$ , το σύστημα Ισοδύναμα γράφεται:

$$\left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ \eta\mu x=\eta\mu y \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ x=2k\pi+y \text{ είτε } x=(2\lambda+1)\pi-y, (k, \lambda \in \mathbb{Z}), \end{array} \right\}$$

όπότε έχουμε να επιλύσουμε τὰ δυό απλά ἀλγεβρικά συστήματα:

$$\left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ x=2k\pi+y, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} (\Sigma_1) \quad \left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ x=(2\lambda+1)\pi-y, \lambda \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

2. \*Αν  $\beta \neq 1$ , τότε το σύστημα  $(\Sigma)$  γίνεται:

$$\left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ \frac{\eta\mu x + \eta\mu y}{\eta\mu x - \eta\mu y} = \frac{\beta+1}{\beta-1} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ \frac{2\eta\mu \frac{x+y}{2} \operatorname{cosec} \frac{x-y}{2}}{2\eta\mu \frac{x-y}{2} \cdot \operatorname{cosec} \frac{x+y}{2}} = \frac{\beta+1}{\beta-1} \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ \operatorname{ef} \frac{x+y}{2} \operatorname{cosec} \frac{x-y}{2} = \frac{\beta+1}{\beta-1} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ \operatorname{ef} \frac{\alpha}{2} \operatorname{cosec} \frac{x-y}{2} = \frac{\beta+1}{\beta-1} \end{array} \right\} (\Sigma_3), \quad \text{όπότε}$$

i) αν  $\operatorname{ef} \frac{\alpha}{2} \neq 0$ , δηλ.  $\alpha \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , το σύστημα  $(\Sigma_3)$  Ισοδύναμα γράφεται:

$$\left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ \operatorname{cosec} \frac{x-y}{2} = \frac{\beta+1}{\beta-1} \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} \end{array} \right\}. \quad \text{Υπάρχει πάντοτε τόξο } \theta \text{ με } 0 < \theta < \pi \text{ και } \operatorname{cosec} \theta = \frac{\beta+1}{\beta-1} \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2}$$

\*Έτσι το τελευταίο σύστημα γράφεται:

$$\left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ \operatorname{cosec} \frac{x-y}{2} = \operatorname{cosec} \theta \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ \frac{x-y}{2} = k\pi + \theta, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ x-y=2k\pi+2\theta, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}$$

Το τελευταίο σύστημα επιλύεται εύκολα.

ii) \*Αν  $\operatorname{ef} \frac{\alpha}{2} = 0$ , δηλ.  $\alpha = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , τότε το σύστημα  $(\Sigma_3)$  είναι αδύνατο, όταν  $\beta \neq -1$ , και άοριστο όταν  $\beta = -1$ . Στην τελευταία περίπτωση οποιαδήποτε τόξα  $x, y$  με  $x-y = \theta$  και  $\theta \neq 2r\pi, r \in \mathbb{Z}$  επαληθεύουν τή δεύτερη εξίσωση του  $(\Sigma_3)$ , όπότε έχουμε να επιλύσουμε το σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} x+y=\alpha \\ x-y=\theta \end{array} \right\}$$

**Παράδειγμα 5.** Νά επιλυθεί και νά διερευνηθεί τό σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} x-y=\alpha \\ \epsilon\phi x+\epsilon\phi y=\beta, \quad x,y \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} (\Sigma)$$

**\*Επίλυση:** Τό σύστημα  $(\Sigma)$  γίνεται

$$\left. \begin{array}{l} x-y=\alpha \\ \frac{\eta\mu(x+y)}{\sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu y} = \beta \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y=\alpha \\ \eta\mu(x+y)=\beta\sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu y \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y=\alpha \\ 2\eta\mu(x+y)=\beta[\sigma\upsilon\nu(x-y)+\sigma\upsilon\nu(x+y)] \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x-y=\alpha \\ 2\eta\mu(x+y)-\beta\sigma\upsilon\nu(x+y)=\beta\sigma\upsilon\nu\alpha \end{array} \right\}$$

Ἡ δεύτερη ἔξισωση τοῦ τελευταίου συστήματος εἶναι γραμμική καί ἐπομένως ἐπίλυεται κατά τά γνωστά.

Τό σύστημα  $(\Sigma)$  ἔχει λύση, ὅταν καί μόνο ὅταν ἡ ἔξισωση αὐτή ἔχει λύση, δηλαδή ὅταν  $4+\beta^2 \geq \beta^2 \sigma\upsilon\nu^2\alpha \Leftrightarrow 4+\beta^2(1-\sigma\upsilon\nu^2\alpha) \geq 0 \Leftrightarrow 4+\beta^2\eta\mu^2\alpha \geq 0$ .

Ἡ συνθήκη  $4+\beta^2\eta\mu^2\alpha \geq 0$  ἀληθεύει πάντοτε καί ἐπομένως τό σύστημα  $(\Sigma)$  ἔχει πάντοτε λύση.

## II. Ὅλες οἱ ἔξισώσεις τοῦ συστήματος εἶναι τριγωνομετρικές

Θά δοῦμε ἐδῶ μέ παραδείγματα συστήματα αὐτῆς τῆς κατηγορίας πού ἀνάγονται ἀμέσως σέ ἀλγεβρικά συστήματα (παραδ. 1) καθώς καί συστήματα συμμετρικά ὡς πρός τά τόξα (παραδ. 2), ὅπως π.χ. εἶναι τά ἀκόλουθα:

$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu x + \eta\mu y = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu y = \beta \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \eta\mu x \cdot \eta\mu y = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu y = \beta \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \epsilon\phi x + \epsilon\phi y = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu y = \beta \end{array} \right\}$$

τά ὁποῖα ἐπίσης ἀνάγονται τελικά σέ ἀλγεβρικά.

**Παράδειγμα 1.** Νά επιλυθεί τό σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu x - \eta\mu y = \frac{1}{2} \\ \eta\mu^2 x + \eta\mu^2 y = \frac{5}{4} \end{array} \right\} (\Sigma)$$

**\*Επίλυση:** Ἄν θέσουμε  $\eta\mu x = \omega$ ,  $\eta\mu y = \varphi$  τό σύστημα  $(\Sigma)$  γράφεται:

$$\left. \begin{array}{l} \omega - \varphi = \frac{1}{2} \\ \omega^2 + \varphi^2 = \frac{5}{4} \end{array} \right\}$$

τό ὁποῖο εἶναι ἀλγεβρικό.

\*Επιλύοντας τό σύστημα αὐτό βρίσκουμε τίς λύσεις

$$\left( \omega=1, \varphi=\frac{1}{2} \right), \left( \omega=-\frac{1}{2}, \varphi=-1 \right)$$

Έτσι έχουμε να επιλύσουμε τα ακόλουθα τριγωνομετρικά συστήματα:

$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu x=1 \\ \eta\mu y=\frac{1}{2} \end{array} \right\} (\Sigma_1), \quad \left. \begin{array}{l} \eta\mu x=-\frac{1}{2} \\ \eta\mu y=-1 \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

Τό σύστημα  $(\Sigma_1)$  έχει τις λύσεις:

$$\left. \begin{array}{l} x=2k\pi + \frac{\pi}{2} \\ y=2\lambda\pi + \frac{\pi}{6} \end{array} \right\}, \quad k, \lambda \in \mathbb{Z}, \quad \left. \begin{array}{l} x=2k\pi + \frac{\pi}{2} \\ y=(2\lambda+1)\pi - \frac{\pi}{6} \end{array} \right\}, \quad k, \lambda \in \mathbb{Z}$$

Τό σύστημα  $(\Sigma_2)$  έχει τις λύσεις:

$$\left. \begin{array}{l} x=2k\pi + \frac{7\pi}{6} \\ y=2\lambda\pi + \frac{3\pi}{2}, \quad k, \lambda \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} x=(2k+1)\pi - \frac{7\pi}{6} \\ y=2\lambda\pi + \frac{3\pi}{2}, \quad k, \lambda \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}$$

**Παράδειγμα 2.** Νά επιλυθεί τό σύστημα 
$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu x + \eta\mu y = 1 \\ \sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu y = \frac{3}{4} \end{array} \right\} (\Sigma)$$

**Έπιλυση:** Τό σύστημα αυτό είναι συμμετρικό ως προς τά τόξα  $x$  και  $y$ . Αυτό γράφεται ισοδύναμα:

$$\left. \begin{array}{l} 2\eta\mu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} = 1 \\ \sigma\upsilon\nu(x-y) + \sigma\upsilon\nu(x+y) = \frac{3}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \eta\mu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} = \frac{1}{2} \\ 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{x-y}{2} - 1 + 1 - 2\eta\mu^2 \frac{x+y}{2} = \frac{3}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \eta\mu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} = \frac{1}{2} \\ \sigma\upsilon\nu^2 \frac{x-y}{2} - \eta\mu^2 \frac{x+y}{2} = \frac{3}{4} \end{array} \right\}$$

Αν θέσουμε  $\eta\mu \frac{x+y}{2} = \omega$  και  $\sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} = \varphi$ , παίρνουμε τό άλγεβρικό σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} \omega\varphi = \frac{1}{2} \\ \varphi^2 - \omega^2 = \frac{3}{4} \end{array} \right\}$$

Τό τελευταίο σύστημα έχει τής λύσεις:

$$\left( \omega = \frac{1}{2}, \varphi = 1 \right), \quad \left( \omega = -\frac{1}{2}, \varphi = -1 \right).$$

\*Έτσι έχουμε να επιλύσουμε τά ακόλουθα τριγωνομετρικά συστήματα:

$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu \frac{x+y}{2} = \frac{1}{2} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} = 1 \end{array} \right\} (\Sigma_1), \quad \left. \begin{array}{l} \eta\mu \frac{x+y}{2} = -\frac{1}{2} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} = -1 \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

Τό σύστημα  $(\Sigma_1)$  Ισοδύναμα γίνεται:

$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu \frac{x+y}{2} = \eta\mu \frac{\pi}{6} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} = \sigma\upsilon\nu 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{x+y}{2} = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \text{ είτε } \frac{x+y}{2} = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{6} \\ \frac{x-y}{2} = 2\lambda\pi \end{array} \right\}, \quad k, \lambda \in \mathbb{Z}$$

\*Έχουμε έτσι τά δύο άλγεβρικά συστήματα

$$\left. \begin{array}{l} x+y = 4k\pi + \frac{\pi}{3} \\ x-y = 4\lambda\pi \end{array} \right\}, \quad k, \lambda \in \mathbb{Z} \quad \left. \begin{array}{l} x+y = 2(2k+1)\pi - \frac{\pi}{3} \\ x-y = 4\lambda\pi \end{array} \right\}, \quad k, \lambda \in \mathbb{Z}$$

τά όποια επιλύονται εύκολα.

\*Από τό σύστημα  $(\Sigma_2)$  παίρνουμε δύο άκόμα άλγεβρικά συστήματα, τά όποια επιλύονται κατά τά γνωστά.

### 1.3. Τριγωνομετρικά συστήματα μέ τρεις εξισώσεις και τρία άγνωστα τόξα.

Γενική μέθοδος γιά τήν επίλυση και τέτοιων συστημάτων δέν υπάρχει. Θά δώσουμε έδω ένα παράδειγμα, πού παρουσιάζει ενδιαφέρον γιά τήν επίλυση και τή διερεύνησή του.

**Παράδειγμα.** Νά επιλυθεί και διερευνηθεί τό σύστημα

$$\left. \begin{array}{l} x+y+z = \pi \\ \frac{\eta\mu x}{\alpha} = \frac{\eta\mu y}{\beta} = \frac{\eta\mu z}{\gamma}, \quad \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \neq 0 \end{array} \right\} (\Sigma)$$

\*Επίλυση: Τό σύστημα  $(\Sigma)$  γράφεται:

$$\left. \begin{array}{l} x+y+z = \pi \\ \Leftrightarrow \frac{\eta\mu x}{\alpha} = \frac{\eta\mu y}{\beta} = \frac{\eta\mu z}{\gamma} = \lambda, \quad \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \neq 0 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \{x+y+z = \pi, \eta\mu x = \lambda\alpha, \eta\mu y = \lambda\beta, \eta\mu z = \lambda\gamma, \alpha\beta\gamma \neq 0\} (\Sigma_1)$$

i) \*Αν  $\lambda = 0$ , τότε τό σύστημα  $(\Sigma_1)$  γίνεται:

V 1.3.

$$\left. \begin{array}{l} x+y+z=\pi \\ x=k_1\pi, y=k_2\pi, z=k_3\pi, k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} k_1\pi+k_2\pi+k_3\pi=\pi \\ x=k_1\pi, y=k_2\pi, z=k_3\pi, k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} k_1+k_2+k_3=1 \\ x=k_1\pi, y=k_2\pi, z=k_3\pi, k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}$$

ii) \*Αν  $\lambda \neq 0$ , τότε από την εξίσωση  $x+y+z=\pi$  παίρνουμε  $x=\pi-(y+z)$ , ή οποία δίνει  $\eta\mu x = \eta\mu[\pi-(y+z)] = \eta\mu(x+y)$  και το σύστημα  $(\Sigma_1)$  γίνεται

$$\left. \begin{array}{l} x+y+z=\pi \\ \eta\mu(y+z)=\lambda\alpha \\ \eta\mu(x+z)=\lambda\beta \\ \eta\mu(x+y)=\lambda\gamma \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x+y+z=\pi \\ \eta\mu\gamma\sin z + \eta\mu z\sin y = \lambda\alpha \\ \eta\mu\chi\sin z + \eta\mu z\sin x = \lambda\beta \\ \eta\mu\chi\sin y + \eta\mu y\sin x = \lambda\gamma \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x+y+z=\pi \\ \lambda\beta\sin z + \lambda\gamma\sin y = \lambda\alpha \\ \lambda\alpha\sin z + \lambda\gamma\sin x = \lambda\beta \\ \lambda\alpha\sin y + \lambda\beta\sin x = \lambda\gamma \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x+y+z=\pi \\ \beta\sin z + \gamma\sin y = \alpha \\ \alpha\sin z + \gamma\sin x = \beta \\ \alpha\sin y + \beta\sin x = \gamma \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

\*Αν πολλαπλασιάσουμε τις τρεις τελευταίες εξισώσεις του  $(\Sigma_2)$  αντίστοιχα με  $\alpha, \beta, \gamma$  και προσθέσουμε τα εξαγόμενα κατά μέλη παίρνουμε:

$$\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 = 2\alpha\beta\sin z, \text{ δηλ. } \sin z = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2\alpha\beta} \quad (1)$$

$$\text{*Όμοια παίρνουμε: } \sin x = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \quad (2)$$

$$\sin y = \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha\gamma} \quad (3)$$

\*Έτσι έχουμε το σύστημα

$$\left. \begin{array}{l} x+y+z = \pi \\ \sin x = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \\ \sin y = \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha\gamma} \\ \sin z = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2\alpha\beta} \end{array} \right\} (\Sigma_3)$$

Το σύστημα  $(\Sigma_3)$  έχει λύση, όταν  $\left| \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \right| \leq 1$  και  $\left| \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha\gamma} \right| \leq 1$

$$\text{και } \left| \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2\alpha\beta} \right| \leq 1$$

Τότε υπάρχουν ελάχιστα θετικά τόξα  $\theta_1, \theta_2, \theta_3$  για τὰ ὅποια εἶναι:

$$\text{συν}\theta_1 = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma}, \quad \text{συν}\theta_2 = \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha\gamma} \quad \text{καί} \quad \text{συν}\theta_3 = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2\alpha\beta}, \quad \text{ὅποτε οἱ}$$

τιμές τῶν  $x, y, z$  εἶναι:

$$x = 2k_1 \pi \pm \theta_1, \quad y = 2k_2 \pi \pm \theta_2, \quad z = 2k_3 \pi \pm \theta_3.$$

Ἀπό τῖς τιμές αὐτές λύσεις τοῦ ἀρχικοῦ συστήματος εἶναι οἱ τριάδες  $(x, y, z)$  γιὰ τῖς ὁποῖες ἰκανοποιεῖται ἡ  $x + y + z = \pi$ .

Γιὰ νὰ πετύχουμε τέτοιες λύσεις, ἐκλέγουμε δύο ἀπὸ τοὺς ἀκέραιους  $k_1, k_2, k_3$  αὐθαίρετα, ὅποτε ὀρίζουμε τὸν τρίτο ἔτσι, ὥστε νὰ ἰκανοποιεῖται ἡ  $x + y + z = \pi$ .

#### 1.4. Τριγωνομετρικὴ ἀπαλοιφή.

Ὅταν ἓνα παραμετρικὸ τριγωνομετρικὸ σύστημα ἔχει περισσότερες ἐξισώσεις ἀπὸ τοὺς ἀγνώστους (ἀπὸ τὰ ἀγνωστα τόξα), τότε βρῖσκουμε μίαν (ἢ περισσότερες) σχέση μετὰ τῶν συντελεστῶν τῶν ἀγνώστων καὶ τῶν σταθερῶν ὀρων τῶν ἐξισώσεων, γιὰ νὰ συναληθεύουν ὅλες οἱ ἐξισώσεις τοῦ συστήματος. Ἡ σχέση αὐτή, ὅπως καὶ στὴν ἄλγεβρα, ὀνομάζεται **ἀπαλείφουσα**.

Δηλαδή ἡ ἀπαλείφουσα εἶναι ἡ **ἀναγκαία** συνθήκη, γιὰ νὰ ἔχει τὸ σύστημα λύση. Ἡ ἐργασία, μὲ τὴν ὁποία βρῖσκουμε τὴν ἀπαλείφουσα, ὀνομάζεται **ἀπαλοιφή**.

Δίνουμε ἐδῶ δύο παραδείγματα τριγωνομετρικῆς ἀπαλοιφῆς.

**Παράδειγμα 1.** Νὰ βρεθῆ ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος:

$$\left. \begin{aligned} \text{συν}x + \text{συν}2x &= \alpha \\ \eta\mu x + \eta\mu 2x &= \beta \end{aligned} \right\} (\Sigma)$$

**Λύση:** Ἐδῶ ἔχουμε ἓνα σύστημα δύο τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων μὲ ἓνα ἀγνωστο τόξο  $x$ . Ἐπομένως θὰ βροῦμε τὴν ἀπαλείφουσα, δηλ. τὴν ἀναγκαία συνθήκη, ὥστε νὰ ἔχουν κοινὴ λύση οἱ ἐξισώσεις αὐτές.

Ἄν  $x_0$  εἶναι μίαν λύση τοῦ συστήματος  $(\Sigma)$ , τότε ἔχουμε διαδοχικά:

$$\left. \begin{aligned} \text{συν}x_0 + \text{συν}2x_0 &= \alpha \\ \eta\mu x_0 + \eta\mu 2x_0 &= \beta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} 2\text{συν}\frac{3x_0}{2}\text{συν}\frac{x_0}{2} &= \alpha \\ 2\eta\mu\frac{3x_0}{2}\text{συν}\frac{x_0}{2} &= \beta \end{aligned} \right\} (\Sigma_1) \Rightarrow \left. \begin{aligned} 4\text{συν}^2\frac{3x_0}{2}\text{συν}^2\frac{x_0}{2} &= \alpha^2 \\ 4\eta\mu^2\frac{3x_0}{2}\text{συν}^2\frac{x_0}{2} &= \beta^2 \end{aligned} \right\} (\Sigma_2)$$

Προσθέτοντας κατὰ μέλη τῖς δύο αὐτές ἐξισώσεις παίρνουμε:

$$4\text{συν}^2\frac{x_0}{2} = \alpha^2 + \beta^2 \quad (1).$$

Ἡ πρώτη ἀπὸ τῖς ἐξισώσεις τοῦ  $(\Sigma_1)$  γράφεται

$$2\left(4\text{συν}^3\frac{x_0}{2} - 3\text{συν}\frac{x_0}{2}\right) \cdot \text{συν}\frac{x_0}{2} = \alpha \Rightarrow 8\text{συν}^4\frac{x_0}{2} - 6\text{συν}^2\frac{x_0}{2} = \alpha \quad (2)$$

## V 1.5.

Από (1) και (2) έχουμε:  $8 \cdot \left(\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4}\right)^2 - 6 \cdot \frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} = \alpha \Rightarrow$

$$(\alpha^2 + \beta^2)^2 - 3(\alpha^2 + \beta^2) = 2\alpha, \text{ ή } (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^2 + \beta^2 - 3) = 2\alpha.$$

Η τελευταία σχέση είναι η ζητούμενη άπαλείφουσα του (Σ).

**Παράδειγμα 2. Νά βρεθεί η άπαλείφουσα του συστήματος:**

$$\left. \begin{aligned} \sigma\omega(1 + \eta\mu\omega) &= 4\alpha \\ \sigma\omega(1 - \eta\mu\omega) &= 4\beta \end{aligned} \right\} (\Sigma)$$

Αν  $\omega_0$  είναι μιά λύση του συστήματος (Σ), τότε θα έχουμε:

$$\left. \begin{aligned} \sigma\omega_0(1 + \eta\mu\omega_0) &= 4\alpha \\ \sigma\omega_0(1 - \eta\mu\omega_0) &= 4\beta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \sigma\omega_0 + \sigma\eta\nu\omega_0 &= 4\alpha \\ \sigma\omega_0 - \sigma\eta\nu\omega_0 &= 4\beta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \sigma\omega_0 &= 2\alpha + 2\beta \\ \sigma\eta\nu\omega_0 &= 2\alpha - 2\beta \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\sigma\eta\nu\omega_0}{\eta\mu\omega_0} &= 2\alpha + 2\beta \\ \sigma\eta\nu\omega_0 &= 2\alpha - 2\beta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \eta\mu\omega_0 &= \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \\ \sigma\eta\nu\omega_0 &= 2\alpha - 2\beta \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\eta\mu^2\omega_0 + \sigma\eta\nu^2\omega_0 = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}\right)^2 + (2\alpha - 2\beta)^2 \Rightarrow \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}\right)^2 + 4(\alpha - \beta)^2 = 1 \text{ ή } \alpha\beta = (\alpha^2 - \beta^2)^2.$$

Η σχέση  $\alpha\beta = (\alpha^2 - \beta^2)^2$  είναι η ζητούμενη άπαλείφουσα.

## 1.5. Άσκησης.

1. Νά επιλυθούν τὰ τριγωνομετρικά συστήματα:

$$\begin{aligned} \alpha) \quad x + y &= \frac{\pi}{2} & \beta) \quad x + y &= \frac{2\pi}{3} & \gamma) \quad x + y &= \frac{2\pi}{3} \\ \eta\mu x - \eta\mu y &= \frac{\sqrt{3} + 1}{2} & \sigma\eta\nu x - \sigma\eta\nu y &= -\frac{\sqrt{3}}{2} & \eta\mu x \eta\mu y &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta) \quad x - y &= \frac{2\pi}{3} & \epsilon) \quad x + y &= \frac{\pi}{2} & \sigma\tau) \quad x + y &= \frac{\pi}{4} & \zeta) \quad x + y &= \frac{\pi}{4} \\ \sigma\eta\nu x \cdot \sigma\eta\nu y &= -\frac{1}{2} & \frac{\sigma\eta\nu x}{\sigma\eta\nu y} &= -\sqrt{3} & \epsilon\phi x + \epsilon\phi y &= 1 & \eta\mu^2 x + \eta\mu^2 y &= \frac{3 + \sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

2. Βρείτε τις τιμές των τόξων  $x, y$  που επαληθεύουν τό σύστημα:  $x - y = \frac{\pi}{6}$   
 $4\eta\mu \sigma\eta\nu y = 3$   
 $\pi < x < 3\pi, \pi < y < 3\pi$

3. Νά επιλυθούν τὰ συστήματα:

$$\begin{aligned} \alpha) \quad 2\eta\mu x + 3\sigma\eta\nu y &= -2 & \beta) \quad x + 2y &= \frac{\pi}{2} & \gamma) \quad \eta\mu x + \eta\mu y &= \frac{3}{2} \\ \delta) \quad 6\eta\mu x - \sigma\eta\nu y &= 4 & \epsilon) \quad \eta\mu x + \eta\mu 3y &= \frac{3}{2} & \zeta) \quad \sigma\eta\nu x + \sigma\eta\nu y &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

4. Νά επιλυθεί καί διερευνηθεί τό σύστημα:

$$\begin{aligned} \epsilon\phi x + \sigma\phi y &= \alpha \\ \sigma\phi x + \epsilon\phi y &= \beta \end{aligned}$$

5. Βρείτε την απαλείφουσα τῶν συστημάτων:

$$\alpha) \begin{cases} \alpha_1 \eta \mu x + \beta_1 \sigma \nu \nu x = \gamma_1, \\ \alpha_2 \eta \mu x + \beta_2 \sigma \nu \nu x = \gamma_2 \end{cases}, \text{ με } \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \neq 0,$$

$$\beta) \begin{cases} \mu^3 \eta \mu x + \nu^3 \sigma \nu \nu x = \lambda^3 \eta \mu x \sigma \nu \nu x, \\ \mu^3 \sigma \nu \nu x - \nu^3 \eta \mu x = \lambda^3 \sigma \nu \nu 2x \end{cases}$$

$$\gamma) \begin{cases} x + y = \alpha \\ \epsilon \phi x + \epsilon \phi y = \epsilon \phi \beta \\ \sigma \phi x + \sigma \phi y = \sigma \phi \gamma \end{cases}$$

## 2. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

**2.1. Όρισμοί.** Τριγωνομετρική ανίσωση ως προς ένα τόξο  $x$  ονομάζεται κάθε ανίσωση, που περιέχει τριγωνομετρικούς αριθμούς του τόξου  $x$ . Έτσι π.χ. οι ανισώσεις:

$$\eta \mu x < -\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} \cdot \eta \mu^2 x + \sigma \nu \nu x > 0, \quad \epsilon \phi x - 1 > 0, \quad \eta \mu x - 1 < 0,$$

είναι τριγωνομετρικές ανισώσεις.

Μιά τριγωνομετρική ανίσωση μπορεί να έχει ορισμένες λύσεις ή μπορεί να επαληθεύεται για κάθε τιμή του τόξου που περιέχει (μόνιμη ανίσωση) ή μπορεί να μην υπάρχουν τόξα  $x$  που να την επαληθεύουν (άδύνατη ανίσωση).

Κάθε τόξο  $\theta$ , που επαληθεύει μία τριγωνομετρική ανίσωση, λέγεται **μερική λύση** τῆς ανίσωσης αὐτῆς.

Π.χ. στήν τελευταία από τις παραπάνω ανισώσεις τό τόξο  $\theta = \frac{\pi}{6}$  είναι μία μερική λύση της. Τό σύνολο τῶν μερικῶν λύσεων μιᾶς τριγωνομετρικῆς ανίσωσης ονομάζεται **γενική λύση** της. Ἡ εὕρεση τῆς γενικῆς λύσεως μιᾶς τριγωνομετρικῆς ανίσωσης ονομάζεται **ἐπίλυση τῆς ανίσωσης**.

Τό σύνολο τῶν μερικῶν λύσεων τῆς ανίσωσης στό διάστημα  $[0, 2\pi)$  ονομάζεται **εἰδική λύση** τῆς ανίσωσης.

Κατά τήν ἐπίλυση μιᾶς τριγωνομετρικῆς ανίσωσης πρέπει νά λαβαίνουμε ὑπόψη μας τοὺς γνωστοὺς περιορισμοὺς τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν τόξων, ὅπως π.χ.  $|\eta \mu x| \leq 1, |\sigma \nu \nu x| \leq 1$ .

## 2.2. Βασικές τριγωνομετρικές ανισώσεις.

Γιὰ νά ἐπιλύσουμε μιᾶς τριγωνομετρικῆς ανίσωσης, προσπαθοῦμε μέ κατάλληλους μετασχηματισμοὺς νά τή φέρουμε σέ μιᾶς ἀπὸ τίς παρακάτω μορφές:

- (i)  $\eta \mu x > \alpha$  ἢ  $\eta \mu x < \alpha$
- (ii)  $\sigma \nu \nu x > \alpha$  ἢ  $\sigma \nu \nu x < \alpha$
- (iii)  $\epsilon \phi x > \alpha$  ἢ  $\epsilon \phi x < \alpha$
- (iv)  $\sigma \phi x > \alpha$  ἢ  $\sigma \phi x < \alpha$ ,

ὅπου  $\alpha$  γνωστός πραγματικός ἀριθμός.

## V 2.2.

Τις τριγωνομετρικές αυτές ανισώσεις τις ονομάζουμε **βασικέξή θεμελιώδεις**.  
Θά δώσουμε ἐδῶ μερικά παραδείγματα ἐπιλύσεως τριγωνομετρικῶν ἀνισώσεων.

**Παράδειγμα 1. Νά ἐπιλυθεῖ ἡ ἀνίσωση  $\eta\mu x > \alpha$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ .**

Γιά νά ἐπιλύσουμε αὐτή τήν ἀνίσωση, διακρίνουμε τίς ἐξῆς περιπτώσεις:

- i) \*Αν  $\alpha < -1$ , ἡ ἀνίσωση ἐπαληθεύεται ἀπό κάθε τόξο  $x$  (μόνιμη ἀνίσωση).  
ii) \*Αν  $\alpha = -1$ , ἡ ἀνίσωση ἐπαληθεύεται ἀπό κάθε τόξο  $x$ , ἐκτός ἀπό τά τόξα

$$x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

iii) \*Αν  $\alpha \geq 1$ , ἡ ἀνίσωση εἶναι ἀδύνατη.

iv) Τέλος, ἂν εἶναι:  $-1 < \alpha < 1$ , τότε ἔχουμε δύο περιπτώσεις.

α) \*Αν  $-1 < \alpha < 0$ , λύνουμε πρώτα τήν ἀνίσωση γραφικά πάνω στόν τριγωνομετρικό κύκλο. Αὐτό γίνεται μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο.

Παίρουμε πάνω στόν ἄξονα τῶν ἡμιτόνων  $BB'$  σημεῖο  $\Delta$  τέτοιο, ὥστε  $\overline{O\Delta} = \alpha$ . Ἀπό τό  $\Delta$  φέρνουμε παράλληλη πρὸς τόν ἄξονα  $AA'$  τῶν συνημιτόνων καί παίρουμε τά σημεῖα τομῆς τῆς  $M, M'$  μέ τόν τριγωνομετρικό κύκλο. Εἶναι φανερό ὅτι κάθε τόξο τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου πού ἔχει πέρασ ἕνα σημεῖο τῶν τόξων  $\widehat{ABM}$  ἢ  $\widehat{M'A}$  (ἐκτός τῶν  $M$  καί  $M'$ ) ἱκανοποιεῖ τήν ἀνίσωση (σχ. 1).

\*Αν τώρα τά μέτρα τῶν τόξων τοῦ  $[0, 2\pi)$ , πού ἐπαληθεύουν τήν ἐξίσωση  $\eta\mu x = \alpha$ , εἶναι  $\theta_1$  καί  $\theta_2$ , ( $\theta_1 < \theta_2$ ), δηλ.  $(\widehat{ABM}) = \theta_1$  καί  $(\widehat{ABM'}) = \theta_2$ , τότε, ἡ εἰδική λύση τῆς ἀνισώσεως  $\eta\mu x > \alpha$ ,  $-1 < \alpha < 0$ , εἶναι ὄλα τά τόξα  $x$  μέ:

$$0 \leq x < \theta_1 \quad \text{εἴτε} \quad \theta_2 < x < 2\pi$$

\*Ἡ γενική λύση τῆς ἀνισώσεως αὐτῆς εἶναι τώρα ὄλα τά τόξα  $x$  μέ:



$$2k\pi \leq x < 2k\pi + \theta_1 \quad \text{εἴτε} \quad 2k\pi + \theta_2 < x < 2k\pi + 2\pi \quad \eta$$

$$2k\pi \leq x < 2k\pi + \theta_1 \quad \text{εἴτε} \quad 2k\pi + \theta_2 < x < 2(k+1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

β) \*Αν  $0 \leq \alpha < 1$ , τότε σκεφτόμενοι ὅπως παραπάνω καί χρησιμοποιώντας τό σχ. 2 βλέπουμε ὅτι τήν  $\eta\mu x > \alpha$  τήν ἐπαληθεύουν ὄλα τά τόξα πού τά πέρατά τους εἶναι ἐσωτερικά σημεῖα τοῦ τόξου  $M\widehat{B}M'$  μέ  $(\widehat{AM}) = \theta$  καί  $(\widehat{ABM'}) = \pi - \theta$ . \*Ἐτσι ἡ εἰδική λύση τῆς ἀνισώσεως εἶναι ὄλα τά τόξα  $x$  μέ  $\theta < x < \pi - \theta$  καί ἡ γενική λύση τῆς εἶναι:

$$2k\pi + \theta < x < 2k\pi + (\pi - \theta) \quad \eta$$

$$2k\pi + \theta < x < (2k+1)\pi - \theta, \quad k \in \mathbb{Z}$$



Παρόμοια επιλύουμε όλες τις βασικές τριγωνομετρικές ανισώσεις. Για εμπέδωση ας δούμε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα.

**Παράδειγμα 2.** Νά επιλυθεί η ανίσωση:  $\eta\mu x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$


**Επίλυση:** Τά τόξα  $x$  με  $0 \leq x < 2\pi$  που έχουν  $\eta\mu x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  είναι  $x_1 = \frac{\pi}{4}$  και  $x_2 = \frac{3\pi}{4}$  δηλ. τά πέρατά τους είναι τά ση-  
μεία  $M$  και  $M'$ . Είναι φανερό τώρα ότι όλα  
τά τόξα που τά πέρατά τους είναι σημεία  
των τόξων  $\widehat{AM}$  και  $\widehat{M'B'A}$  επαληθεύουν τή  
δοθείσα ανίσωση (σχ. 3).

Έτσι έχουμε τήν ειδική λύση:

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{είτε} \quad \frac{3\pi}{4} \leq x < 2\pi,$$

άπό τήν όποία εύκολα παίρνουμε τή γενική  
λύση

$$2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \frac{\pi}{4} \quad \text{είτε} \quad 2k\pi + \frac{3\pi}{4} \leq x < 2k\pi + 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



Σχ. 3

**Παράδειγμα 3.** Νά επιλυθεί η ανίσωση  $\sigma\upsilon\eta x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ .


**Επίλυση:** Τά τόξα  $x$  με  $0 \leq x < 2\pi$  που επαληθεύουν τήν εξίσωση  $\sigma\upsilon\eta x =$   
 $= \frac{\sqrt{2}}{2}$  είναι  $x_1 = \frac{\pi}{4}$  και  $x_2 = \frac{7\pi}{4}$ , δηλαδή τά  
πέρατά τους είναι τά σημεία  $M$  και  $M'$  του  
τριγ. κύκλου.

Βλέπουμε τώρα ότι όλα τά τόξα  $x$ , που  
επαληθεύουν τή δοθείσα ανίσωση, πρέπει να  
λήγουν σε σημεία των τόξων  $\widehat{AM}$  και  $\widehat{M'A}$ ,  
έκτός άπό τά  $M, M'$ . Έτσι ή ειδική λύση τής  
άνισώσεως είναι τά τόξα  $x$  με

$$0 \leq x < \frac{\pi}{4} \quad \text{είτε} \quad \frac{7\pi}{4} < x < 2\pi,$$

και ή γενική λύση της είναι τά τόξα  $x$  με

$$2k\pi \leq x < 2k\pi + \frac{\pi}{4} \quad \text{είτε} \quad 2k\pi + \frac{7\pi}{4} < x < 2k\pi + 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



Σχ. 4

### V 2.3.

**Παράδειγμα 4.** Νά επιλυθεί ή άνίσωση:  $\epsilon\phi x < \sqrt{3}$

\***Επίλυση:** Τά τόξα  $x$ , πού έπαληθεύουν τήν  $\epsilon\phi x = \sqrt{3}$  μέ  $0 \leq x < 2\pi$ , είναι, τά  $x_1 = \frac{\pi}{3}$  και  $x_2 = \frac{4\pi}{3}$ .


Είναι φανερό ότι τά τόξα  $x$ , πού έπαληθεύουν τή δοθείσα άνίσωση λήγουν σέ σημεία τών τόξων  $\widehat{AM}$ ,  $\widehat{BA'M'}$  και  $\widehat{B'A}$ , έκτός άπό τά  $M, B, M', B'$ . \*Έτσι ή ειδική λύση είναι τά τόξα  $x$  μέ

$$0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ή } \frac{\pi}{2} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ή } \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$$

και ή γενική λύση της είναι τά τόξα  $x$  μέ

$$2k\pi \leq x < 2k\pi + \frac{\pi}{3}, 2k\pi + \frac{\pi}{2} < x < 2k\pi + \frac{4\pi}{3},$$

$$2k\pi + \frac{3\pi}{2} < x < 2k\pi + 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$



Σχ. 5

### 2.3. Γενικές τριγωνομετρικές άνισώσεις

**Παράδειγμα 1.** Νά επιλυθεί ή άνίσωση:  $2\sigma\upsilon\eta^2 x - 3\sigma\upsilon\eta x + 1 < 0$

\***Επίλυση:** \*Η δοθείσα άνίσωση γράφεται:  $(\sigma\upsilon\eta x - 1) \cdot (2\sigma\upsilon\eta x - 1) < 0$ .

Παίρνοντας τόν τριγωνομετρικό κύκλο και μελετώντας τά πρόσημα τών παραγόντων  $\sigma\upsilon\eta x - 1$  και  $2\sigma\upsilon\eta x - 1$  στό διάστημα  $[0, 2\pi)$ , σχηματίζουμε τόν ακόλουθο πίνακα γιά τό γινόμενο  $P = (\sigma\upsilon\eta x - 1)(2\sigma\upsilon\eta x - 1)$ .

$x$	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3}$	$2\pi$
$\sigma\upsilon\eta x - 1$	-	-	-	-
$2\sigma\upsilon\eta x - 1$	+	-	+	+
$P$	-	+	-	-

\*Έτσι βλέπουμε ότι ή δοθείσα άνίσωση έχει ειδική λύση τά τόξα  $x$  πού έπαληθεύουν μία άπό τίς άνισώσεις

$$0 < x < \frac{\pi}{3} \text{ ή } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi.$$

\*Άρα ή γενική λύση της είναι τά τόξα  $x$  μέ  $2k\pi < x < 2k\pi + \frac{\pi}{3}$  ή

$$2k\pi + \frac{5\pi}{3} < x < (2k+1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Παράδειγμα 2.** Νά επιλυθεί ή άνίσωση:  $\text{συν}3x < \frac{\sqrt{3}}{2}$  μέ  $0 \leq x < 2\pi$

**Έπίλυση:** Θέτουμε  $3x=y$ , όπότε έχουμε νά επιλύσουμε τήν άνίσωση

$$\text{συν}y < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ή τελευταία άνίσωση έχει τήν ειδική λύση  $\frac{\pi}{6} < y < \frac{11\pi}{6}$ , όπότε ή γενική λύση της είναι:

$$2k\pi + \frac{\pi}{6} < y < 2k\pi + \frac{11\pi}{6}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Έτσι ή γενική λύση τής άρχικής δίνεται από τήν

$$2k\pi + \frac{\pi}{6} < 3x < 2k\pi + \frac{11\pi}{6}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

καί είναι 
$$\frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{18} < x < \frac{2k\pi}{3} + \frac{11\pi}{18}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

Έπειδή όμως  $k=3\lambda + \nu$ ,  $\lambda \in \mathbb{Z}$  καί  $\nu \in \{0,1,2\}$  ή (1) γράφεται:

$$2\lambda\pi + \frac{2\nu\pi}{3} + \frac{\pi}{18} < x < 2\lambda\pi + \frac{2\nu\pi}{3} + \frac{11\pi}{18} \quad (2)$$

Άπό τή (2) για  $\nu=0$  παίρνουμε:  $2\lambda\pi + \frac{\pi}{18} < x < 2\lambda\pi + \frac{11\pi}{18} \quad (3)$

για  $\nu=1$  παίρνουμε:  $2\lambda\pi + \frac{13\pi}{18} < x < 2\lambda\pi + \frac{23\pi}{18} \quad (4)$

καί για  $\nu=2$  παίρνουμε:  $2\lambda\pi + \frac{25\pi}{18} < x < 2\lambda\pi + \frac{35\pi}{18} \quad (5)$

Άπό τς (3), (4) καί (5) βλέπουμε ότι οι ζητούμενες λύσεις στό  $[0,2\pi)$  είναι τά τόξα  $x$  μέ:

$$\frac{\pi}{18} < x < \frac{11\pi}{18}, \quad \frac{13\pi}{18} < x < \frac{23\pi}{18}, \quad \frac{25\pi}{18} < x < \frac{35\pi}{18}.$$

## 2.4. Άσκήσεις.

1. Νά επιλυθούν οι άνισώσεις

$$\alpha) \eta\mu x < -\frac{1}{2}, \quad \beta) \text{συν}x < \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \gamma) \sigma\phi x > \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{καί} \quad \delta) \epsilon\phi x > \frac{\sqrt{3}}{3}$$

2. Νά επιλυθεί ή άνίσωση

$$2\eta\mu^2x - 3\eta\mu x + 1 > 0$$

3. Νά επιλυθεί ή άνίσωση

$$(\sqrt{3}-2\eta\mu x) (2\text{συν}x-1) \cdot (2\epsilon\phi x-2) \cdot (\eta\mu^2x + \eta\mu x + 1) > 0$$

4. Νά επιλυθούν οι άνισώσεις

$$\alpha) \epsilon\phi 3x > \sqrt{3}, \quad \beta) \eta\mu 5x > \frac{\sqrt{3}}{2}$$

5. Νά επιλυθεί ή άνίσωση 
$$\frac{(3\eta\mu x-1)(6\eta\mu^2x-5\eta\mu x+1)}{\eta\mu x + \text{συν}x} > 0$$

## 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Τά τριγωνομετρικά συστήματα τά διακρίνουμε κυρίως σέ δύο κατηγορίες:
  - α) Σέ τριγωνομετρικά συστήματα, στά όποια ή μία τουλάχιστον εξίσωση είναι άλγεβρική ώς πρός τά άγνωστα τόξα.
  - β) Σέ τριγωνομετρικά συστήματα, στά όποια όλες οι εξισώσεις είναι τριγωνομετρικές.
2. Δέν υπάρχουν γενικές μέθοδοι επίλυσεως τριγωνομετρικών συστημάτων.
3. Στά παραμετρικά τριγωνομετρικά συστήματα μέ  $\mu$  εξισώσεις και  $\nu$  άγνωστους,  $\mu > \nu$ , κάνουμε **τριγωνομετρική άπαλοιφή**. Βρίσκουμε δηλαδή τήν άναγκαία συνθήκη (άπαλείφουσα του συστήματος), για να έχει τό σύστημα λύση.
4. Σέ μία τριγωνομετρική άνίσωση διακρίνουμε
  - α) **μερική λύση**, πού είναι ένα τόξο πού τήν έπαληθεύει,
  - β) **ειδική λύση**, πού είναι τό σύνολο των μερικών λύσεων στό  $[0, 2\pi)$
  - γ) **γενική λύση**, πού είναι όλα τά τόξα πού τήν έπαληθεύουν.
5. 'Η επίλυση κάθε τριγωνομετρικής άνίσωσης άνάγεται τελικά στήν επίλυση μις ή περισσότερων από τίς θεμελιώδεις τριγωνομετρικές άνισώσεις.

## 4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Νά επιλυθούν και διερευνηθούν τά συστήματα
- α)  $\epsilon\phi x + \epsilon\phi y = \alpha$   
 $\eta\mu x \cdot \eta\mu y = \beta$
- β)  $\eta\mu x + \eta\mu y = 2\lambda\eta\mu\alpha$   
 $\sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu y = 2\lambda\sigma\upsilon\nu\alpha$
2. Νά επιλυθούν τά συστήματα:
- α)  $\eta\mu^2 x + \eta\mu^2 y = 1 + \eta\mu z$   
 $\eta\mu^2 y + \eta\mu^2 z = 1 + \eta\mu x$   
 $\eta\mu^2 z + \eta\mu^2 x = 1 + \eta\mu y$
- β)  $\epsilon\phi x + \epsilon\phi y = 1$   
 $\sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\upsilon\nu y = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- γ)  $x + y + \omega = \pi$   
 $\frac{\epsilon\phi x}{1} = \frac{\epsilon\phi y}{2} = \frac{\epsilon\phi \omega}{3}$
3. Βρείτε τήν άπαλείφουσα στά παρακάτω συστήματα:
- α)  $\alpha\sigma\upsilon\nu x + \beta\eta\mu x = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$   
 $\frac{\sigma\upsilon\nu^2 x}{\mu} + \frac{\eta\mu^2 x}{\nu} = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}$
- β)  $\lambda\sigma\upsilon\nu 2x = \sigma\upsilon\nu(x + \theta)$   
 $\lambda\eta\mu 2x = 2\eta\mu(x + \theta)$
- γ)  $\sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu 2x = \frac{\alpha}{\beta}$ ,  $\beta \cdot \delta \neq 0$   
 $\eta\mu x + \eta\mu 2x = \frac{\gamma}{\delta}$
- δ)  $\frac{\alpha}{\eta\mu x} + \frac{\beta}{\sigma\upsilon\nu x} = 1$   
 $\alpha\sigma\upsilon\nu x - \beta\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu 2x$ ,  $\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x \neq 0$
4. Νά επιλυθούν οί άνισώσεις
- α)  $\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x + \sqrt{2}(1 - \sqrt{2})\eta\mu 2x > 1$ ,  
 β)  $2\sigma\upsilon\nu \frac{x}{3} - \eta\mu \frac{x}{2} - 2 > 0$ .
- γ)  $(2\sigma\upsilon\nu x - 1) \cdot (x - 2) > 0$ ,  $0 < x < 2\pi$ .
5. Νά επιλυθεί ή άνίσωση
- $$\log_5(\eta\mu x) > \log_{125}(3\eta\mu x - 2)$$

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Ύποδειξεις για τη λύση τῶν ασκήσεων-Απαντήσεις

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

(Ύπ. = Ύπόδειξη Ἀπ. = Ἀπάντηση)

- 1.4. 1.** Ύπ.  $i^0=1, i^1=i, i^2=-1$  κ.τ.λ. **2.** Ύπ. Ἀρκεί  $3\alpha+14\beta=7$  καὶ  $2\alpha-\beta=-1$ . Ἀπ.  $\alpha=-\frac{7}{31}$   
 $\beta=+\frac{17}{31}$ . **3.** Ύπ. Πρέπει  $\alpha+\beta=5\gamma$  καὶ  $-\gamma=\alpha-\beta$ . **4.** Ύπ. Ἀρκεί νὰ δειχθεῖ ὅτι  $2(\alpha+\beta)=$   
 $=5\alpha$  καὶ  $(\beta-\alpha)\gamma=1$ . **5.** Ἀπ.  $\alpha=-2i, \beta) \frac{9}{5} + \frac{8}{5}i, \gamma) \frac{4213}{5103} + \frac{2187\sqrt{3}+70\sqrt{2}}{5103}i$  καὶ  
 $\delta) \frac{586}{1300} - \frac{252}{1300}i$ . **6.** Ύπ.  $\left(3\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 = \frac{81}{4}$  καὶ  $(1+i)^4 = (-1+i)^4 = \dots = -4$ . **7.** Ύπ.  
Νὰ πάρετε  $z_1=\alpha_1+\beta_1i, z_2=\alpha_2+\beta_2i$  καὶ  $z_3=\alpha_3+\beta_3i$ .
- 1.7. 1.** Ύπ. Πρέπει  $z_1=\bar{z}_2$ . Ἀπ.  $x=2, y=1$ . **2.** Ἀπ.  $\alpha) z=0+yi, y \in \mathbb{R}, \beta) z=0$  καὶ  $\gamma)$   
 $z \in \left[0, -1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right]$ . **3.** Ύπ. Ἐὰν  $z_1=x_1+y_1i$  καὶ  $z_2=x_2+y_2i$ , τό-  
τε δείξτε ὅτι  $x_1=y_1=0 \vee x_2=y_2=0$ . **4.** Ύπ. Θέστε  $\frac{z_1}{z_2} = z_3 \in \mathbb{C}$ , δηλ.  $z_1 = z_2 z_3$  κτλ.  
**5.** Ύπ. Ἐὰν  $z = x + yi$ , τότε ἡ δοθεῖσα δίνει  $xy=0$ . **6.** Ἀπ.  $x = \frac{1}{4}$  καὶ  $y = -1$ . **7.**  
Ἀπ.  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . **8.** Ἀπ.  $\pm[\sqrt{\sqrt{2}+1} + \sqrt{\sqrt{2}-1}.i]$ . **9.** Ἀπ.  $x=1, y=2$ . **10.** Ύπ. Ἡ  
δοθεῖσα γίνεται:  $[2+4+6+\dots+2(n-1)] + [1+3+5+\dots+(2n-1)]i$ . **11.** Ἀπ.  $z_1=2-i$   
καὶ  $z_2=1+2i$ .
- 1.9. 1.** Ύπ. Χρησιμοποιήστε ἓνα ἀπὸ τοὺς ὑποδειχθέντες τρόπους ἢ τὴ μαθηματικὴ ἐπαγωγή.  
**2.** Ύπ. Νὰ θέσετε στὴν ιδιότητα  $(\gamma)$  ὅπου  $z_2$  τὸ  $-z_2$ . **3.** Ἀπ.  $\alpha) \sqrt{\frac{41}{5}} \frac{3\sqrt{3}}{4}, \gamma)$   
 $\frac{3^4 \cdot 2^{10}}{19^2}$ . **4.** Ἀπ. **1. 5.** Ἀπ.  $z = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$ . **6.** Ἀπ.  $4x+2y+3=0$ . **7.** Ύπ. Νὰ πάρετε  
 $z=x+yi$  καὶ νὰ ἐκτελέσετε πράξεις. Ἀπ.  $z_1=0+0i, z_2=0+i, z_3=0-i$ . **8.** Ύπ. Νὰ θέσετε  
 $z=x+yi, x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$  καὶ νὰ ἐπιλύσετε σύστημα ὡς πρὸς  $x$  καὶ  $y$ . Ἀπ.  $z_{1,2} = \alpha + (-1 \pm$   
 $\pm \sqrt{1-\alpha^2-2\alpha})i$  μὲ  $0 \leq \alpha \leq -1 + \sqrt{2}$ . **9.** Ύπ. Νὰ λάβετε ὑπόψη ὅτι  $|z_1+z_2|^2 \leq (|z_1|+$   
 $+|z_2|)^2$  καὶ  $|z_1|^2 \leq 1-|z_3|^2$  κ.τ.λ. **10.** Ύπ. Ἡ  $|z_1+z_2|=|z_1|=|z_2|$  γίνεται  $\left|1 + \frac{z_2}{z_1}\right| = 1 =$   
 $= \left|\frac{z_2}{z_1}\right|$ . Θέστε  $\frac{z_2}{z_1} = x+yi$  καὶ ὑπολογίστε τὰ  $x, y$ .
- 2.3. 1.** Ύπ. Ἀπεικονίστε τὰ ζεύγη  $(2,3), (2,-3)$  κ.τ.λ. **2.** Ύπ. Βρεῖτε τίς εἰκόνες τῶν  $(z_1+z_2)+$   
 $+z_3$  καὶ  $(z_1+z_2)-z_3$ . **3.** Ύπ. Ἐργαστεῖτε ὅπως στὴν ἐφαρμογὴ τῆς παραγράφου 2.2.
- 3.3. 1.** Ύπ.  $|z-z_0|^2 = \alpha^2 \Leftrightarrow (z-z_0) \cdot (\overline{z-z_0}) = \alpha^2$  κ.τ.λ. **2.** Ἀπ. Εἶναι τὰ σημεῖα τοῦ κύκλου κέν-  
τρου  $(2,-3)$  καὶ ἀκτίνας 5. **3.** Ύπ. Ἐργαστεῖτε ὅπως στὴν ἐφαρμογὴ 3. **4.** Ύπ. Βρεῖτε  
 $z$ , τέτοια ὥστε  $|z-2|=|z|$  καὶ ἔπειτα τὰ  $z$  μὲ  $|z-2| < |z|$ . **5.** Ύπ. Βρεῖτε τὰ  $z$  μὲ  $|z-1|=|z+1|$  καὶ  
ἔπειτα τὰ  $z$  μὲ  $|z-1| < |z+1|$ . **6.** Ύπ.  $|z-8|^2 = 4|z-2|^2 \Leftrightarrow (z-8)(\overline{z-8}) = 4(z-2)(\overline{z-2})$  κ.τ.λ.

7. 'Υπ. Παρατηρήστε ότι οι διανυσματικές άκτινες τών  $z$ , για τά όποια  $|z|=3$ , πολλαπλασιάζονται επί  $-2$  κ.τ.λ. 8. 'Υπ. Βρείτε τά  $z$ :  $|z+i|=3$  και  $|z+i|=4$  κ.τ.λ. 9. 'Υπ. 'Εργαστείτε όπως στην εφαρμογή 4. 10. 'Υπ. 'Επιλύστε τό σύστημα  $9 \cdot |z-12|^2 = 25 \cdot |z-8i|^2$ ,  $|z-4|^2 = |z-8|^2$  κ.τ.λ. 'Απ.  $z_1=6+17i$ ,  $z_2=6+8i$ .

- 4.3. 1. 'Απ.  $(3,0)$ ,  $(3\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ,  $(3, \frac{\pi}{2})$ ,  $(3\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$ ,  $(3,\pi)$ ,  $(3\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4})$ ,  $(3, \frac{3\pi}{2})$ ,  $(3\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4})$ . 2. 'Απ.  $\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$ ,  $-2+0i$ ,  $-\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$ ,  $0-i$ . 3. 'Απ.

'Αν  $z_1=\alpha+\beta i$ , τότε  $\alpha=\rho \cos\theta$  και  $\beta=\rho\eta\mu\theta$ , όπότε  $z_1=\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$ . 'Ομοια βρίσκουμε  $z_2=1+\sqrt{3}i$ . 'Υπολογίστε τά  $z_1 \cdot z_2$ ,  $\frac{z_1}{z_2}$  και έπειτα βρείτε τά μέτρα και τά όρίσματά τους. 'Απ.  $(6, \frac{2\pi}{3})$ ,  $(\frac{3}{2}, 0)$ .

- 5.3. 1. 'Απ.  $\cos\frac{5\pi}{3} + i\eta\mu\frac{5\pi}{3}$ ,  $4(\cos\frac{\pi}{3} + i\eta\mu\frac{\pi}{3})$ ,  $2(\cos\frac{5\pi}{6} + i\eta\mu\frac{5\pi}{6})$ .

2. 'Υπ. Παρατηρήστε ότι  $(\cos\theta + i\eta\mu\theta)^{-\kappa} = \frac{1}{(\cos\theta + i\eta\mu\theta)^\kappa} = (\cos\theta - i\eta\mu\theta)^\kappa =$

$\cos(-\kappa\theta) + i\eta\mu(-\kappa\theta)$ . 3. 'Υπ.  $\sqrt{3} + i = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\eta\mu\frac{\pi}{6})$ ,  $1+i =$

$\sqrt{2}[\cos\frac{\pi}{4} + i\eta\mu\frac{\pi}{4}]$ ,  $1-i = \sqrt{2}[\cos(-\frac{\pi}{4}) + i\eta\mu(-\frac{\pi}{4})]$  κτλ.

4. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τό Θ. De Moivre  $\cos(n\theta) + i\eta\mu(n\theta) = (\cos\theta + i\eta\mu\theta)^n$  για  $n=5$ .

5. 'Υπ. Σχηματίστε τό  $\frac{1}{z}$  και έπειτα τά  $z + \frac{1}{z}$ ,  $z - \frac{1}{z}$ .

- 6.3. 1.  $(\alpha)z^3=8 \Leftrightarrow z^3=8$   $(\cos 0 + i\eta\mu 0) \Rightarrow z_\kappa = \sqrt[3]{2}(\cos\frac{2\kappa\pi}{3} + i\eta\mu\frac{2\kappa\pi}{3})$ ,  $\kappa=0,1,2$ .

Παρόμοια επιλύονται και οι υπόλοιπες. 2. 'Υπ.  $(\frac{1+z}{1-z})^{2v} = -1$ , δηλ.  $\frac{1+z}{1-z} =$

$\cos\frac{2\kappa\pi+2\pi}{2v} + i\eta\mu\frac{2\kappa\pi+2\pi}{2v}$ ,  $\kappa=0,1,2,\dots,2v-1$  3. 'Υπ.  $z^6 = -\sqrt{3} + i = 2(\cos\frac{5\pi}{6} + i\eta\mu\frac{5\pi}{6})$  κ.τ.λ. 4. (β) Παρατηρήστε ότι  $z^3_1 - 1 = 0 \Leftrightarrow (z_1 - 1)(z^2_1 + z_1 + 1) = 0$  κ.τ.λ.,

(δ)  $z^2_1 + z_1 + 1 = 0 \Leftrightarrow 1 + z_1 = -z^2_1$  κ.τ.λ. 5. 'Υπ.  $\kappa = \varepsilon\phi\frac{\theta}{2}$ ,  $\frac{\theta}{2} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . 6. 'Υπ.

(α) 'Εκτελέστε πράξεις και λάβετε υπόψη σας ότι  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ ,  $\omega^3 = 1$  κ.τ.λ. (β) 'Εργαστείτε παρόμοια. (γ) Χρησιμοποιήστε τή (β). 7. 'Υπ. 'Εκτελέστε πράξεις και λάβετε υπόψη σας ότι  $1 + \omega + \omega^2 = 0$  κ.τ.λ. 8. 'Υπ. Τά  $z$  είναι οι μιγαδικές κυβικές ρίζες τής μονάδας, δηλ.  $z^3 = 1$ ,  $1 + z + z^2 = 0$  κ.τ.λ. 9. 'Υπ. 'Αν  $\kappa=2v$ ,  $v \in \mathbf{N}$ , τότε δείξτε ότι  $2^{2^v} = \text{πολ.}$   $3 + 1$ ,  $v \in \mathbf{N}$ , ότι  $1 - \theta^{2^{2^v-2}} + \theta^{2^{2^v-1}} = -2\theta$  και  $1 - \theta^{2^{2^v-1}} + \theta^{2^{2^v}} = -2\theta^3$  κ.τ.λ. 10. 'Υπ. Τά  $z$  είναι οι μιγαδικές κυβικές ρίζες τής μονάδας και  $v=3\lambda + \mu$ ,  $\mu=0,1,2$ .

8. 1. 'Υπ. Νά θέσετε  $z=x+yi$  και νά φέρετε τόν  $\frac{z-1}{z+1}$  στή μορφή  $\alpha+\beta i$ . 2. 'Υπ. Νά θέσετε  $z=x+yi$  και νά επιλύσετε σύστημα ώς πρός  $x$  και  $y$ . 'Απ. Για  $\alpha=1$  είναι  $z=-1-i$ .

Γιά  $\alpha = \sqrt{2}$  είναι  $z = -2 - i$ . Γιά  $1 < \alpha < \sqrt{2}$  είναι  $z = \frac{-\alpha^2 - \alpha\sqrt{2-\alpha^2}}{\alpha^2 - 1} - i \vee z = \frac{-\alpha^2 + \alpha\sqrt{2-\alpha^2}}{\alpha^2 - 1} - i$ . Γιά  $\alpha > \sqrt{2}$  δέν έχει λύσεις. 3. 'Υπ. 'Εργασθείτε όπως στην προηγούμενη άσκηση. 4. 'Υπ.  $z^3 = -\omega^5$  και  $z^2 = \frac{1}{\omega^4}$ . Παίρνουμε  $\omega^{10} \cdot \bar{\omega}^{12} = 1$ , άπό όπου  $|\omega| = 1$  και  $\bar{\omega}^2 = 1$  κ.τ.λ. 5. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες του μέτρου. 6. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες του μέτρου. 7. 'Υπ. Είναι  $|z - z_1|^2 = \lambda^2 |z - z_2|^2 \Leftrightarrow (z - z_1)(\bar{z} - \bar{z}_1) = \lambda^2 (\bar{z} - \bar{z}_2)(z - z_2)$ . Στή συνέχεια συμβουλευθείτε τά παραδείγματα και τήν άσκηση 1 τής 3.3. 8. 'Υπ. 'Εργασθείτε όπως στην άσκηση 6 τής 3.3. 9. 'Απ.  $(0, 0)$ ,  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ ,  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ . 10. 'Υπ. Θέστε  $z = x + yi$  και έκτελέστε πράξεις. 11. 'Υπ. "Αν  $z^2 + z + 1 = 0$ , τότε  $(\alpha^2 + \alpha - \beta^2 + 1) + \beta(1 + 2\alpha)i = 0$  κ.τ.λ. 12. 'Υπ. Είναι  $z = 2 \operatorname{syn} \frac{\theta + \alpha}{2} \left[ \operatorname{syn} \frac{\theta - \alpha}{2} + i \eta \mu \frac{\theta - \alpha}{2} \right]$  και  $|z| = \left| 2 \operatorname{syn} \frac{\theta + \alpha}{2} \right|$ . 13. 'Υπ. 'Εργασθείτε όπως στην άσκηση 6 τής 3.3. 14. 'Απ.  $x^2 + y^2 = \frac{(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^2 + \gamma^2)}{4\alpha^2 + (\beta + \gamma)^2}$ ,  $(x - \alpha)^2 + y^2 = \frac{(\alpha^2 + \beta\gamma)^2}{4\alpha^2 + (\beta + \gamma)^2}$ ,  $\operatorname{Re} z = \frac{x(2\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)}{4\alpha^2 + (\beta + \gamma)^2}$ . 15. 'Υπ. Σχηματίστε  $|\zeta|^2 - 1 = \zeta\bar{\zeta} - 1$  και λάβετε υπόψη ότι  $|\alpha| < 1$  κ.τ.λ. 16. 'Υπ.  $\zeta^2 = 1 + z^2$ , τότε  $\zeta^2 - z^2 = 1$ , δηλ.  $(\zeta - z)(\zeta + z) = 1$ , έτσι  $\zeta - z = \frac{1}{\zeta + z}$  κ.τ.λ. 17. 'Υπ.  $|z_1 - z_2|^2 = (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2)$  κ.τ.λ. 18. 'Υπ. Δείξτε ότι  $\frac{y_1 - y_3}{x_1 - x_3} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$ , όπου  $z_1 = x_1 + iy_1$ , κ.τ.λ. 19. 'Υπ.  $|z_1 - z_2|^2 = (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2)$  και  $|1 - \bar{z}_1 z_2|^2 = (1 - \bar{z}_1 z_2)(1 - z_1 \bar{z}_2)$  κ.τ.λ. 20. 'Υπ. Θέστε  $z_1 = x_1 + y_1 i$ ,  $z_2 = x_2 + y_2 i$ , και έκτελέστε πράξεις. 21. 'Υπ. "Αν  $z_v = x_v + y_v i$ , τότε  $\left| \frac{z_{v-1}}{z_v + i} \right| < 1 \Rightarrow \sqrt{x_v^2 + (y_v - 1)^2} < \sqrt{x_v^2 + (y_v + 1)^2}$  κ.τ.λ. 22. 'Υπ. Θέστε  $z = \operatorname{syn} \theta + i \eta \mu \theta$ , σχηματίστε τό μιγαδικό  $\Sigma + i\Sigma'$  κ.τ.λ. 23. 'Υπ. Σχηματίστε τό μιγαδικό  $\Sigma + i\Sigma'$ . 24. 'Υπ. Είναι  $|A_n|^2 + |A_{n-1}|^2 + \dots + |A_{v-1}|^2 = A_n \bar{A}_n + A_{n-1} \bar{A}_{n-1} + \dots + A_{v-1} \bar{A}_{v-1}$ . 25. 'Υπ. Θέστε  $\lambda = e^{i\theta}$  μέ  $\theta = \operatorname{Arg} z$ . 26. 'Υπ. 'Η δοθείσα γράφεται  $\left( \frac{z^2 - 1}{2z} \right)^4 = \operatorname{syn} \alpha + i \eta \mu \alpha$  κ.τ.λ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

1.8. 1. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τόν όρισμό 2 τής 1.1. 2. 'Απλή. 'Απ. 'Οχι. 3. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τό θεώρημα τής 1.2. 4. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τόν όρισμό:  $\hat{\alpha} * \hat{\beta} = \widehat{\alpha\beta}$ . 5. 'Απ.  $(0, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(1, 1)$ . 6. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τήν είς άτοπο άπαγωγή. 7. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τούς αντίστοιχους όρισμούς. 8. 'Υπ. Θεωρήστε τήν έξίσωση  $x^2 x'^2 + x' + x = 0$ . 9. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τούς αντίστοιχους όρισμούς 'Απ. (ii) Ναι τό 0 (iii) Κάθε  $z \neq 1$  έχει συμμετρικό στοιχείο. 10. 'Υπ. Στή δοθείσα σχέση ή άντικαταστήσετε μερικά άπό τά  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  μέ κατάλληλα στοιχεία.

2.4. 1. 'Υπ. 'Εφαρμόστε σε κάθε περίπτωση τόν αντίστοιχο όρισμό. 2. 'Απλή. 3. 'Απλή. 'Απ.  $x = 4$ . 4. 'Υπ. (i) Θεωρήστε τήν ισότητα  $\alpha^{-1} \cdot (\alpha^{-1})^{-1} = e$  και εφαρμόστε τήν ιδιότητα 2 τής 2.3. (ii) 'Εφαρμόστε τόν όρισμό τής 1.5. (iii) και (iv) Λάβετε υπόψη ότι ή πράξη είναι προσεταιριστική. 5. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τόν όρισμό τής 2.2. 6. 'Απλή. 7. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τόν όρισμό τής 2.2. 8. 'Απ.  $x = \alpha * \beta * \beta$ ,  $y = \beta$ .

- 3.4.** 1. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 3.1. 'Απ. 'Εχει μοναδιαίο στοιχείο. 2. 'Απ. (i) Είναι αντιμεταθετικός δακτύλιος. (ii) και (iv) Δέν είναι δακτύλιοι (iii) Είναι αντιμεταθετικοί δακτύλιοι. 3. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 3.1. 'Απ. 'Εχει μοναδιαίο στοιχείο. 4. 'Υπ. Παρατηρήστε ότι  $\gamma \cdot \beta = (\beta + \delta) \cdot \beta$  κ.τ.λ. 5. 'Υπ. Λάβετε την παράσταση  $(-\alpha) [\beta + (-\beta)]$ . 6. 'Υπ. 'Εφαρμόστε σε κάθε περίπτωση τον όρισμό της 3.3.
- 4.3.** 1. 'Απ. (i) Όχι, (ii) Ναι, (iii) Ναι, (iv) Ναι. 2. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 4.1. 3. 'Απλή. 4. 'Απ.  $x=2, y=1$ .
- 5.6.** 1. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 5.1. 2. 'Υπ. Πάρτε την παράσταση  $\alpha \cdot [x + (-x)]$ . 3. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 5.3. 'Απ. 'Εχει διάσταση 1. 4. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 5.3. 'Απ. 'Εχει διάσταση 1. 5. 'Απ. Είναι γραμμικώς ανεξάρτητα. 6. 'Απ. Ναι. 7. 'Απ. 'Εχει διάσταση 2. 8. 'Υπ. Πάρτε  $x, y \in A \cap B$  και δείξτε ότι  $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in A \cap B$ .
- 7.** 1. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τούς αντίστοιχους όρισμούς 'Απ. (ii) 'Εχουν αντίστοιχα συμμετρικά στοιχεία τά  $(1, -\alpha')$  και  $(-1, -\alpha')$ . (iii) Τό συμμετρικό στοιχείο είναι  $(-\alpha, \frac{1}{\alpha'})$ . 2. 'Υπ. Λάβετε υπόψη και την Ισότητα  $\alpha'' = \alpha' * e$ . 3. 'Υπ. α) 'Η Ισότητα  $(\alpha \cdot \beta)^2 = \alpha^2 \cdot \beta^2$  γράφεται  $(\alpha \cdot \beta) \cdot (\alpha \cdot \beta) = (\alpha \cdot \alpha) \cdot (\beta \cdot \beta)$ . β) Χρησιμοποίηστε τη μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής. 4. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 4.1. 5. 'Απ.  $\alpha = \beta = 1, \gamma = -e$ . 6. 'Απ. 'Αν  $x, y \in A$ , τότε  $x^v = 1, y^v = 1$ , όποτε  $(xy)^v = 1$  και  $y^{-v} = 1$  κτλ. 7. 'Υπ. Δείξτε άρχικά ότι  $\alpha \circ \alpha' = e$  και έπειτα ότι τό  $e$  είναι τό ουδέτερο στοιχείο ως προς την πράξη  $\circ$ . 8. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 2.2. 9. 'Υπ. i) 'Υποθέστε ότι  $x \cdot \alpha_n = x \cdot \alpha_m$  μέ  $\lambda \neq \mu$  και καταλήξτε σε άτοπο. ii) Θεωρήστε την  $x\alpha_1 \cdot x\alpha_2 \dots x\alpha_n = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ . 10. 'Απ.  $x = \frac{1}{43} (18, -3, 2), y = \frac{1}{43} (42, -7, 19)$ . 11. 'Απ.  $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ . 12. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 5.4. 13. 'Απ.  $\gamma(1,1,1) + (\beta - \gamma)(1,1,0) + (\alpha - \beta)(1,0,0)$ . 14. 'Υπ. Βρείτε τίς λύσεις του  $(\Sigma)$  και εφαρμόστε τον όρισμό της 5.3. 'Απ. Μιά βάση του  $V$  αποτελείται μόνο από ένα διάνυσμα, π.χ. τό  $(18, -1, -7)$ . 15. 'Υπ. Λάβετε υπόψη ότι τά  $\beta$  και  $\delta$  έχουν αντίστροφα στοιχεία. 16. 'Υπ. 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 3.1. 'Απ.  $\frac{1}{\alpha\delta - \beta\gamma} (\delta, -\beta, -\gamma, \alpha)$  μέ  $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ . 17. 'Υπ. (i) 'Εφαρμόστε τον όρισμό της 3.1. (ii) 'Εφαρμόστε τον όρισμό 2 της 1.1. 'Απ. Καί οι δύο δομές είναι άκέραιες περιοχές. 18. 'Υπ. Παρατηρήστε ότι  $x - x \in A$  και εφαρμόστε τον όρισμό της 2.2.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

- 1.4. 1. 'Υπ. Στό άθροισμα  $\alpha + \beta$  προσθέστε και αφαιρέστε τό  $\beta$ .
2. 'Υπ. Δείξτε ότι τό  $v^3 + 2v + 1$  έχει παράγοντα τό 4.
3. 'Υπ. Δείξτε ότι οι διαφορές  $(\alpha_1 + \beta_1) - (\alpha_2 + \beta_2)$  και  $\alpha_1\beta_1 - \alpha_2\beta_2$  είναι πολλαπλάσια του  $v$ .
4. 'Υπ. α) Λάβετε υπόψη σας ότι ένας άκέραιος είναι άρτιος ή περιττός. β) 'Αναπτύξτε τό τετράγωνο ενός περιττού  $2\lambda + 1$  και χρησιμοποιήστε τό α).
5. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τις ταυτότητες που δίνουν τά άναπτύγματα των  $(\alpha + \beta)^2$  και  $(\alpha - \beta)^2$  και λάβετε υπόψη σας ότι οι  $\alpha + \beta$  και  $\alpha - \beta$  είναι άρτιοι.
6. 'Υπ. Νά διακρίνετε τις περιπτώσεις  $\lambda = 3k$ ,  $\lambda = 3k + 1$ ,  $\lambda = 3k + 2$ .
7. 'Υπ. Νά συνδύασετε τις περιπτώσεις  $x = 3k + 1$ ,  $x = 3k + 2$  με τις  $y = 3\lambda + 1$ ,  $y = 3\lambda + 2$  και νά άποδείξετε τό ζητούμενο.
8. 'Υπ. Νά διακρίνετε τις περιπτώσεις  $x = 3k + 1$ ,  $x = 3k + 2$ .
9. 'Υπ. Νά διακρίνετε τις περιπτώσεις  $k = 6\lambda$ ,  $k = 6\lambda + 1, \dots$ ,  $k = 6\lambda + 5$ .
10. 'Υπ. α) Νά διακρίνετε τις περιπτώσεις  $\alpha = 5k + 1, \dots$ ,  $\alpha = 5k + 4$ . β) Νά παραγοντοποιήσετε κατάλληλα τό  $x^4 - y^4$  και νά χρησιμοποιήσετε τό α).
11. 'Υπ. Βρείτε τις δυνατές τιμές του ύπολοίπου  $\lambda^3$  και προσδιορίστε τό  $\lambda$ . 'Απ.  $\alpha = 0$  ή  $\alpha = 138$  ή  $\alpha = 324$ .
12. 'Υπ. Παρατηρήστε ότι  $2^{4v+1} - 2^{2v} - 1 = 2^{4v} - 2^{2v} + 2^{4v} - 1$  και έπειτα παραγοντοποιήστε τό δεύτερο μέλος. Τό ζητούμενο θά προκύψει άν θυμηθείτε πώς παραγοντοποιούνται τά  $a^2 - 1$  και  $a^{2k+1} + 1$  ( $k \in \mathbb{N}$ ).
13. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τή μέθοδο τής μαθηματικής έπαγωγής.
14. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τήν πρόταση 2 τής 1.3.
15. 'Υπ. Δείξτε ότι  $9^{30} \equiv 1 \pmod{8}$  και  $17^{10} \equiv 1 \pmod{8}$  και χρησιμοποιήστε τήν άσκηση 3. 'Απ. 2.
16. 'Υπ. Παρατηρήστε ότι τό  $\frac{3}{4}\lambda - \frac{1}{4}$  πρέπει νά είναι άκέραιος. 'Απ.  $\rho = 3k + 2$ , ΚΕΖ.
- 1.9. 1. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τόν άλγόριθμο-του Εύκλειδη. 'Απ.  $(27, 20) = 1$ ,  $1 = 27 \cdot 3 + 20 \cdot (-4)$ .
2. 'Υπ. Νά γράψετε τις δύο ισότητες τής διαιρέσεως και νά συμπεράνετε ότι  $a \mid (238, 510)$  και  $a > 15$ . 'Απ.  $\alpha = 17$  ή  $\alpha = 34$ .
3. 'Υπ. Έργαστείτε όπως στην άσκηση 2. 'Απ. 21, 35, 105.
4. 'Υπ. Γράψτε τις ισότητες των διαδοχικών διαιρέσεων. 'Απ.  $\alpha = 1344$ ,  $\beta = 1004$ .
5. 'Υπ. 'Αν  $\alpha, \beta$  είναι οι ζητούμενοι άκέραιοι, τότε  $\alpha = 24\alpha'$ ,  $\beta = 24\beta'$ ,  $(\alpha', \beta') = 1$  και  $\alpha' + \beta' = 12$ . 'Απ. 24, 264 ή 120, 168.
6. 'Απ. 2, 10080.
7. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τή σχέση (2) και τήν πρόταση 3 τής 1.5. Μπορείτε νά προσδιορίσετε μιά τριάδα  $(x, y, z)$ , άν γράψετε  $(32, 48, 72) = (32, (48, 72))$  και χρησιμοποιήσετε τόν άλγόριθμο του Εύκλειδη. 'Απ.  $(32, 48, 72) = 8 = 32 \cdot 1 + 48 \cdot 1 + 72 \cdot (-1)$ .

8. 'Υπ. Αναλύστε τό 120 σέ γινόμενο (θετικῶν) πρώτων παραγόντων. 'Απ. 1, 2, 2.3, 2.5, 2.3.5, 2<sup>2</sup>, 2<sup>2</sup>.3, 2<sup>2</sup>.5, 2<sup>2</sup>.3.5, 2<sup>3</sup>, 2<sup>3</sup>.3, 2<sup>3</sup>.5, 2<sup>3</sup>.5, 2<sup>3</sup>.3.5, 3.5, 3.5 (16 διαιρέτες).
9. 'Υπ. Παραγοντοποιήστε τό πρώτο μέλος τῆς ἐξισώσεως, βρεῖτε τό Δ (36) καί παρατηρήστε ὅτι  $x+y \equiv x-y \pmod{2}$ . 'Απ.  $x=10, y=8$ .
10. 'Υπ. (i) Νά θέσετε  $(\alpha, \beta) = \delta$  καί  $(5\alpha+4\beta, \alpha+\beta) = \delta'$  καί νά δείξετε μέ τή βοήθεια τῆς πρότάσεως 4 τῆς 1.5 ὅτι  $\delta | \delta'$  καί  $\delta' | \delta$ . Στῆς (ii) (iii) καί (iv) νά ἐργαστῆτε μέ ὁμοιο τρόπο.
11. 'Υπ. Πάρτε ἕνα κοινό διαιρέτη  $\lambda$  τῶν  $x$  καί  $y$  καί δείξετε ὅτι  $\lambda = \pm 1$ .
12. 'Υπ. (i) Νά θέσετε  $(\alpha, \beta) = \delta, (\kappa\alpha, \kappa\beta) = \delta'$  καί νά δείξετε ὅτι  $\delta | \kappa\delta$  καί  $\kappa\delta | \delta'$ . (ii) Χρησιμοποῖστε τήν πρόταση 2 τῆς 1.7 καί τήν (i).
13. 'Υπ. Πολλαπλασιάστε καί τά δύο μέλη τῆς  $\alpha\alpha'+\beta\beta'=1$  μέ  $\gamma$  καί δείξετε ὅτι τό πρώτο μέλος τῆς διαιρεῖται μέ τό  $\alpha \cdot \beta$ .
14. 'Υπ. Νά θέστε  $(\alpha, \beta) = \delta, [\alpha, \beta] = \mu$ , ὁπότε  $\alpha = \alpha_1\delta, \beta = \beta_1\delta, (\alpha_1, \beta_1) = 1$  καί  $\alpha\beta = \mu \cdot \delta$ . 'Απ. (i)  $\alpha=10, \beta=240$  ἢ  $\alpha=30, \beta=80$  ἢ  $\alpha=80, \beta=30$  ἢ  $\alpha=240, \beta=10$ . (ii)  $\alpha=154, \beta=350$  ἢ  $\alpha=350, \beta=154$  ἢ  $\alpha=110, \beta=3850$  ἢ  $\alpha=3850, \beta=110$ . (iii)  $\alpha=208, \beta=598$  ἢ  $\alpha=598, \beta=208$  ἢ  $\alpha=26, \beta=4784$  ἢ  $\alpha=4784, \beta=26$ .
15. 'Υπ. α) 'Αποδείξετε τό ζητούμενο μέ τήν εἰς ἄποιο ἀπαγωγῆς. β) Νά θέσετε  $(\alpha, \beta) = \delta$  καί  $(\alpha, \kappa\beta) = \delta'$  καί νά δείξετε ὅτι  $\delta | \delta'$  καί  $\delta' | \delta$  χρησιμοποιώντας τό πρώτο μέρος τῆς ἀσκήσεως καί τήν πρόταση 2 τῆς 1.6.
16. 'Υπ. Λάβετε ὑπόψη σας ὅτι κάθε παράγοντας ἑνός γινομένου ἀκεραίων εἶναι διαιρέτης τοῦ γινομένου καί χρησιμοποιήστε τό πρώτο μέρος τῆς ἀσκήσεως 15. 'Αποδείξετε τό ἀντίστροφο χρησιμοποιώντας τή συνεπαγωγή τῆς ἀσκήσεως 15. 'Η ἐφαρμογή (i) εἶναι ἄμεση συνέπεια τοῦ πρώτου μέρους τῆς ἀσκήσεως, ἐνῶ ἡ (ii) ἀποδεικνύεται μέ τή βοήθεια τῆς (i).
17. 'Υπ. Γιά τίς (i) καί (ii) δείξετε ὅτι  $(\alpha \pm \beta, \alpha) = (\alpha, \beta), (\alpha \pm \beta, \beta) = (\alpha, \beta)$ . Γιά τήν ἀπόδειξη τῆς (iii) χρησιμοποιήστε τίς (i) καί (ii) καί τήν ἀσκηση 16.
18. 'Υπ. Νά θέσετε  $(\alpha, \beta, \gamma) = \delta, \left(\frac{\alpha+\beta}{2}, \frac{\alpha+\gamma}{2}, \frac{\beta+\gamma}{2}\right) = \delta'$  καί νά δείξετε ὅτι  $\delta | \delta'$  καί  $\delta' | \delta$ .

2.4. 1. 'Απ  $x=4-5\kappa, y=1-2\kappa, \kappa \in \mathbb{Z}$ .

2. 'Υπ. 'Εργαστείτε ὅπως στό παράδειγμα 2 τῆς 2.3 'Απ. Οἱ (i) καί (ii) ἔχουν μόνο ἀρνητικές ἀκέριαι λύσεις.
3. 'Υπ. Βρεῖτε τίς μὴ ἀρνητικές ἀκέριαι λύσεις τῆς  $2x+5y=100$ . 'Απ. Μέ 11 τρόπους.
4. 'Απ. (i) (10,1), (6,4), (2,7), (ii) (5,11), (10,2). (iii) (6,8) (iv) (3,6).
5. 'Απ. 4 μολ. καί 8 τετρ. ἢ 13 μολ. καί 1 τετρ.
6. 'Απ. α) (6,13), (14,8), (22,3) β) Μέγιστο κέρδος θά ἔχει, ἂν κατασκευάσει 22 κοσμήματα α' εἴδους καί 3 κοσμήματα β' εἴδους (μέγιστο κέρδος = 15.450 δρχ.).
7. 'Υπ. 'Από τίς  $x+y=37, x=5\pi+2, y=7\pi'+4$ , προκύπτει  $5\pi+7\pi'=31$ . 'Απ.  $x=12, y=25$ .

4. 1. 'Υπ. Θεωρήστε τήν ἰσότητα  $(v+7)(v-4)+33=v^2+3v+5$  καί δείξετε ὅτι  $v+7 \equiv v-4 \pmod{11}$ .

2. 'Απλή.
3. 'Υπ. 'Ονομάστε  $v-2, v-1, v, v+1, v+2$  τοὺς διαδοχικούς ἀκεραίους καί δείξετε ὅτι ὁ  $v^2+2$  δὲ διαιρεῖται μέ τό 5.
4. 'Υπ. Νά διακρίνετε τίς περιπτώσεις  $\rho=6\kappa+1, \dots, \rho=6\kappa+5$ .
5. 'Υπ. Δείξτε ὅτι  $\rho \geq 3$  καί συνεχίστε κατάλληλα.
6. 'Υπ. Δείξτε ὅτι πάντα ὁ ἕνας ἀπό αὐτοὺς διαιρεῖται μέ τό 3.
7. 'Υπ. Παραγοντοποιήστε τήν παράσταση.
8. 'Υπ. Προσθέστε καί ἀφαιρέστε τό  $4^{5555}+4^{2222}$ .

9. 'Υπ. Δείξτε ότι  $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 8\kappa + 5$ ,  $\kappa \in \mathbb{Z}$ , και στη συνέχεια ότι τό  $8\kappa + 5$  δέν είναι τέλειο τετράγωνο.

10. 'Απ.  $x=3$ ,  $y=4$  και  $z=2$ .

11. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε τό θεώρημα τής 1.3.

12. 'Υπ. Θεωρήστε τή διαφορά  $(\alpha + \beta)(\nu + \rho) - 2(\nu\alpha + \rho\beta)$ .

13. 'Υπ. Γράψτε τό κλάσμα στη μορφή

$$\frac{(5\nu+1)(3\nu+1)+5}{2(15\nu^2+8\nu+6)+5\nu+1}$$

14. 'Υπ. Παρατηρήστε ότι  $A = \frac{2}{9}(10^\nu - 1)$  και  $B = \frac{8}{9}(10^\mu - 1)$ .

15. 'Υπ. Δείξτε ότι ένας τουλάχιστον είναι μικρότερος από 4. 'Απ. 2,4,4 ή 2,3,6 ή 3,3,3.

16. 'Υπ. α) Δείξτε ότι ένας γραμμικός συνδυασμός των  $3\kappa + 1$  και  $14\kappa + 5$  είναι ίσος μέ μονάδα. β) Λάβετε ύπόψη τής Ισότητες  $14\kappa + 5 = 5(3\kappa - 1) - (\kappa - 10)$  και  $3\kappa - 1 = 3(\kappa - 10) + 29$ .

17. 'Υπ. Νά διακρίνετε τής περιπτώσεις  $\nu = 4\kappa$ ,  $\nu = 4\kappa + 1$ ,  $\nu = 4\kappa + 2$ ,  $\nu = 4\kappa + 3^{\kappa}$  και παρατηρήστε ότι  $5^{4\kappa} = (26 - 1)^{2\kappa} = (24 + 1)^{2\kappa}$ . 'Απ.  $\nu = 4\kappa$ .

18. 'Υπ. Νά θέσετε  $(2\alpha - 1, \beta) = \delta$  και νά δείξετε ότι  $\delta | 1$ .

19. 'Υπ. Είναι  $(\alpha A, \alpha B, \beta A, \beta B) = ((\alpha A, \alpha B), (\beta A, \beta B))$  και  $[\alpha A, \alpha B, \beta A, \beta B] = [[\alpha A, \alpha B], [\beta A, \beta B]]$ .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

1.7. 1. 'Υπ. 'Υποθέστε ότι  $f(x) = \alpha_n x^n + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$  και  $g(x) = \beta_m x^m + \dots + \beta_0$  είναι τά δύο πολυώνυμα και σχηματίστε τή διαφορά τους.

2. 'Υπ. Νά διακρίνετε τής περιπτώσεις  $\nu > \mu$  και  $\nu = \mu$ .

3. 'Απ.  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 1$ .

4. 'Απ. i)  $\alpha_3 \neq 3$ , ii)  $\alpha_3 = 3$ , iii)  $\alpha_3 = 3$ ,  $\alpha_2 = -2$  και  $\alpha_1 \neq 7$ , iv)  $\alpha_3 = 3$ ,  $\alpha_2 = -2$ ,  $\alpha_1 = 7$  και  $\alpha_0 \neq -6$  και v)  $\alpha_3 = 3$ ,  $\alpha_2 = -2$ ,  $\alpha_1 = 7$  και  $\alpha_0 = -6$ .

5. 'Απ.  $\alpha = 2$ ,  $\beta = 7$ ,  $\gamma = 6$ ,  $\delta = 3$  ή  $\alpha = 2$ ,  $\beta = -5$ ,  $\gamma = -6$ ,  $\delta = -3$ .

6. 'Υπ. Τό  $g(x)$  θά είναι:  $g(x) = x^2 + \mu x + \nu$ ,  $\mu, \nu \in \mathbb{R}$ , όποτε από τήν Ισότητα  $f(x) = (g(x))^2$  άποδεικνύουμε τό ζητούμενο.

7. 'Υπ. Νά πάρετε  $g(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ,  $\alpha \neq 0$  και  $\pi(x) = \delta x + \epsilon$  μέ  $\delta \neq 0$ . 'Απ.  $g(x) = 3x^2 - 5x + 2$  και  $\pi(x) = 6x - 5$  ή  $g(x) = -3x^2 + 5x - 2$  και  $\pi(x) = 6x - 5$ .

8. 'Υπ. Τό  $g(x)$  θά είναι τό πολύ 2ου βαθμού, δηλ.  $g(x) = kx^2 + \lambda x + \mu$ . Σχηματίστε τό πολυώνυμο  $f(x) - (g(x))^2$ . 'Απ.  $g(x) = 2x^2 - 2x - 1$  ή  $g(x) = -2x^2 + 2x + 1$ .

9. 'Υπ. Νά λάβετε ύπόψη σας τήν ταυτότητα  $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \gamma)[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2]$ .

10. 'Απ.  $f(x) = \alpha x^2 - \alpha x + \gamma$ , μέ  $\alpha, \gamma \in \mathbb{C}$ .

2.6. 1. 'Υπ. Είναι  $f_1(x) = g_1(x)\pi_1(x)$  και  $f_2(x) = g_2(x)\pi_2(x)$

2. 'Υπ. 'Υποθέστε ότι  $g(x) | f_k(x)$ , δηλ.  $f_k(x) = g(x) \cdot \pi(x)$ .

3. 'Υπ. 'Εργασθείτε όπως στήν προηγούμενη άσκηση.

4. 'Υπ. 'Υποθέστε ότι  $g(x) | f_1(x)$ , όποτε  $f_1(x) + f_2(x) = g(x)\pi(x)$  και  $f_1(x) = g(x)\pi_1(x)$ .

5. 'Απ.  $x - 1$ .

6. 'Απ.  $\kappa = 12$  και  $\lambda = 30$ .

7. 'Απ.  $\kappa=1$ .

8. 'Απ.  $\lambda = \frac{1}{2}$  ή  $\lambda = \frac{1}{3}$ .

9. 'Υπ. Σχηματίστε τη διαφορά  $f(x)-\varphi(x)$  και δείξτε ότι  $\varphi(x) \mid f(x)-\varphi(x)$ .

10. 'Υπ. Στο  $f(x)$  να προσθέσετε και να αφαιρέσετε τον όρο  $\alpha^{\rho\chi(\rho+1)^{\nu}}$ , ώστε να μπορέσετε να τό κάμετε γινόμενο παραγόντων του  $g(x)$  επί κάποιο πολυώνυμο  $\pi(x)$ .

2.9. 1. 'Υπ. 'Αρκεί  $g(x) \mid [f_1(x)u_2(x)-f_2(x)u_1(x)]$

2. 'Υπ. Είναι  $(x-\alpha) \mid [f(x)-u]$  και  $(x-\beta) \mid [f(x)-u]$ .

3.4. 1. 'Απ.  $\alpha) f(-2)=-23, f(5)=-1164, \beta) \varphi(-\sqrt{2})=-1-4\sqrt{2}, \gamma) g(1-i)=-3-2i$ .

2. 'Απ.  $\lambda=4$ .

3. 'Απ.  $\kappa = \frac{13}{4}$  και  $\lambda = -\frac{83}{2}$ .

4. 'Υπ. πρέπει  $f(-2)=6$  και  $f(1)=2$ . 'Απ.  $\alpha = \frac{5}{3}$  και  $\beta = -\frac{4}{3}$ .

5. 'Απ.  $\alpha) \pi(x) = 5x^2 + 14x + 44$  και  $v=132$

$\beta) \pi(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16$  και  $v=0$

$\gamma) \pi(x) = x^2 - (2+3i)x + 8+6i$  και  $v=-15-14i$

$\delta) \pi(x) = x^3 + 3x^2 + (6-2i)x + 1-3i$  και  $v=-2-4i$

$\epsilon) \pi(x) = 4x^3 + 3x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{45}{4}$  και  $v = -\frac{275}{8}$

6. 'Υπ. 'Εχουμε  $f(x) = (x-\alpha) \cdot \pi_1(x) + f(\alpha)$ , ή όποια για  $x=\beta$  δίνει  $f(\beta) = (\beta-\alpha)\pi_1(\beta) + f(\alpha)$  κ.τ.λ.

7. 'Υπ. Τό υπόλοιπο είναι τό πολύ 2ου βαθμού, δηλ. τής μορφής  $v(x) = \kappa x^2 + \lambda x + \mu$ . 'Ετσι έχουμε  $f(x) = [(x+1)(x-2)(x+3)]\pi(x) + \kappa x^2 + \lambda x + \mu$ , αλλά  $f(-1) = 2$  κ.τ.λ. 'Απ.  $v(x) = x^2 + 2x + 3$ .

8. 'Υπ. i) 'Εχουμε  $f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)\pi(x) + \kappa x + \lambda$ , όποτε  $f(\alpha) = \kappa\alpha + \lambda$  κ.τ.λ.

ii) 'Εχουμε  $f(x) = (x-\alpha)\pi(x) + f(\alpha)$  και  $\pi(x) = (x-\alpha)\pi_1(x) + \pi(\alpha)$ .

9. 'Υπ. Δείξτε τό ζητούμενο μέ τή μέθοδο τής μαθηματικής επαγωγής.

10. 'Υπ. Νά πάρετε τό πολυώνυμο  $f(x) = \kappa x^3 + \lambda x^2 + \mu x + \nu$  και νά υπολογίσετε τά  $\kappa, \lambda, \mu, \nu$ , ώστε νά ισχύουν οι υπόθέσεις. 'Απ.  $\kappa = \frac{1}{3}, \lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{6}$ .

11. 'Υπ. 'Αρκεί νά δείξετε ότι  $P(1) = 0$ . Νά σχηματίσετε τό  $P(1)$  και νά πάρετε τό  $S_v = \frac{1}{\alpha_1\alpha_2} + \frac{1}{\alpha_2\alpha_3} + \dots + \frac{1}{\alpha_{v-1}\alpha_v}$ . Σχηματίστε τό γινόμενο  $\omega S_v$  ( $\omega$  διαφορά τής άριθμ. προόδου) και δείξτε ότι  $S_v = \frac{v-1}{\alpha_1\alpha_v}$ .

4.3. 1. 'Υπ. Δείξτε ότι τό πολυώνυμο  $F(x) = f(x) - \lambda$  είναι τό μηδενικό πολυώνυμο.

2. 'Υπ. Νά λάβετε υπόψη ότι  $x^2 - 2\rho x + \rho^2 = (x-\rho)^2$ .

3. 'Υπ. Νά λάβετε υπόψη σας ότι  $f(x) = (x-\rho)^{\kappa}\pi_1(x)$ , μέ  $\pi_1(\rho) \neq 0, g(x) = (x-\rho)^{\lambda}\pi_2(x)$ , μέ  $\pi_2(\rho) \neq 0$  καθώς και τόν όρισμό του Μ.Κ.Δ.

4. 'Υπ. Σχηματίστε τό πολυώνυμο  $F(x) = f(x) - 1$  και δείξτε ότι είναι τό μηδενικό πολυώνυμο.

5. 'Υπ. Χρησιμοποιώντας διαδοχικά τό σχήμα Horner δείξτε ότι ό άριθμός 2 είναι ρίζα μέ βαθμό πολλαπλότητας 2.

6. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε διαδοχικά τό σχήμα Horner.

7. 'Υπ. 'Η εξίσωση γράφεται:  $(\lambda+1)(x^2-1) - (\lambda^2+5\lambda-5)x(x-1) = 0$ . Έτσι βλέπουμε ότι μία ρίζα της είναι το 1.
8. 'Απ.  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$ .
9. 'Υπ. 'Αν  $x_1, x_2, x_3$  είναι οι ρίζες τῆς ζητούμενης εξίσωσης και  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  οι ρίζες τῆς δοθείσας τότε  $x_1 = \rho_1^2, x_2 = \rho_2^2, x_3 = \rho_3^2$ , ὁπότε  $x_1 + x_2 + x_3 = \rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2$  κ.τ.λ.  
'Απ.  $x^3 - (\alpha_1^2 - 2\alpha_2)x^2 + (\alpha_2^2 - 2\alpha_1\alpha_3)x - \alpha_3^2 = 0$ .
10. 'Υπ. i) Χρησιμοποιήστε τούς τύπους Vieta. ii) 'Αφοῦ  $\rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2 = -2\alpha < 0$ , ἔχουμε ὅτι οἱ  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  δέν είναι ὅλες πραγματικές, ὁπότε, ἂν  $\rho_1$  είναι ἡ κοινή πραγματική ρίζα, τότε  $\rho_2, \rho_3 \in \mathbf{C}$  μέ  $|\rho_2| = |\rho_3|$ .
11. 'Υπ. 'Αν  $P(x)$  είναι τό  $\alpha'$  μέλος τῆς εξίσωσης τότε  $P(\alpha_1) = \alpha_1, P(\alpha_2) = \alpha_2, \dots, P(\alpha_n) = \alpha_n$ . Σχηματίστε τό πολυώνυμο  $F(x) = P(x) - x$ . 'Απ.  $x = \beta$ .
12. 'Υπ. Δείξτε πρώτα ὅτι οἱ ρίζες τοῦ  $Q(x)$  είναι καί ρίζες τοῦ  $P(x)$ . 'Υπολογίστε ἔπειτα καί τήν τρίτη ρίζα τοῦ  $P(x)$  καί γράψτε τό  $P(x)$  μέ μορφή γινομένου.
13. 'Υπ. Σχηματίστε τό πολυώνυμο  $F(x) = f(x) - f(0)$  καί δείξτε ὅτι εἶναι τό μηδενικό πολυώνυμο.

4.6. 1. 'Απ. α)  $-2, 3, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ , β)  $2, \frac{-3 \pm i\sqrt{11}}{2}$ , γ)  $-1, 2, 3$

δ)  $2, 3, -\frac{1}{2}$ , ε)  $-2, \frac{5 \pm i\sqrt{23}}{6}$ , στ)  $3$  (διπλῆ),  $-\frac{1}{2}, i, -i$ .

2. 'Υπ. Πιθανές ρητές ρίζες είναι οἱ διαιρέτες τοῦ 4. 'Απ.  $\kappa = 2, -4, -13, -19$ .
3. 'Υπ. Πιθανές ρητές ρίζες είναι οἱ ἀριθμοί  $+1$  καί  $-1$ .
4. 'Υπ. 'Αν  $\rho$  εἶναι ἀκέραια ρίζα, τότε  $\rho^3 + k_1\rho^2 + k_2\rho + k_3 = 0$  ἢ  $k_1\rho^2 + k_2\rho + k_3 = -\rho^3$ .
5. 'Απ.  $\rho_1 = 3 - i, \rho_2 = 3 + i, \rho_3 = 2, k = 22$  καί  $\lambda = -20$ .
6. 'Απ.  $1 + i, 1 - i, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ .
7. 'Απ. α)  $f(x) = x^3 - x^2 + 4x - 4$ , β)  $f(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2$
8. 'Απ. α)  $f(x) = (x-i)(x+i)\left(x - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)\left(x - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)$   
β)  $f(x) = (x + 2 - \sqrt{3}i)(x + 2 + \sqrt{3}i)(x + i\sqrt{3})(x - i\sqrt{3})$
9. 'Απ.  $f(x) = (x-2)(x-3)(2x+1)$ .
10. 'Υπ. Νά λάβετε ὑπόψη ὅτι  $\rho_1^{2^v} + \alpha^v \rho_1^v + \beta^v = 0, \rho_2^{2^v} + \alpha^v \rho_2^v + \beta^v = 0, \rho_1 + \rho_2 = -\alpha$  καί  $\rho_1 \rho_2 = \beta$ .
11. 'Υπ. Τό  $f(x) = (f_1(x) + if_2(x)) \cdot (f_1(x) - if_2(x))$  κ.τ.λ.
12. 'Υπ. Δείξτε ὅτι οἱ ρίζες τοῦ  $\varphi(x)$  είναι καί ρίζες τοῦ  $f(x)$ .
13. 'Υπ. 'Από τά  $f(\rho) = 0, f(\alpha_0) = 0$  καί  $f(0) = \alpha_0$ , ὑπολογίστε τό  $g(\rho)$ .
14. 'Υπ. Σχηματίστε τά  $g(x), f(x) - x$  καί  $g(x) - x$  καί δείξτε ὅτι  $g(\rho_1) - \rho_1 = 0$  κ.τ.λ.
15. 'Υπ. Δείξτε ὅτι δέν ὑπάρχει  $\rho$ , μέ  $\rho \in \mathbf{Q}^+$  καί  $\sqrt{\rho} \in \mathbf{R} - \mathbf{Q}$ :  $f(\sqrt{\rho}) = 0$ .
16. 'Υπ. Χρησιμοποιώντας τούς τύπους Vieta, δείξτε ὅτι τό γινόμενο  $(\rho_1 - \rho_2)^2 \cdot (\rho_2 - \rho_3)^2 \cdot (\rho_3 - \rho_1)^2 < 0$ , ὁπότε τά  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  δέν μπορεῖ νά νάιναι πραγματικοί ἀριθμοί. Στή συνέχεια δείξτε ὅτι τό  $1 - \rho_1 < 0$  καί  $\sqrt{2} - \rho_1 > 0$ .
17. 'Υπ. Δείξτε ὅτι τό  $f(x)$  δέν ἔχει ρίζες τίς πιθανές ρητές ρίζες  $\pm 1, \pm 2$ , γιά  $\lambda \in \mathbf{Z}$ .
18. 'Υπ. Σχηματίστε τό πολυώνυμο  $Q(x) = P(x) - 7$  καί δείξτε ὅτι μηδενίζεται γιά τέσσερις διαφορετικούς μεταξύ τους ἀκέραιους ἀριθμούς. 'Αν γιά  $x = \tau$  ισχύει  $P(\tau) = 14$ , δείξτε ὅτι δέν ισχύει ἡ σχέση  $P(\tau) - 7 = 7$ .

5.4. 1. α)  $x_1 = \frac{1}{2}$ ,  $x_2 = 2$ ,  $x_3 = 2$

β)  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = \frac{-5-i\sqrt{3}}{2}$ ,  $x_3 = \frac{-5+i\sqrt{3}}{2}$

γ)  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = 2(1-i\sqrt{3})$ ,  $x_3 = 2(1+i\sqrt{3})$

δ)  $x_1 = \sqrt[3]{3}$ ,  $x_2 = \frac{\sqrt[3]{3}}{2} [(-1-\sqrt{3}) - (\sqrt[3]{3^6} - \sqrt{3})i]$ ,  $x_3 = \bar{x}_2$

2. α)  $x_1 = 1 - \sqrt{2}$ ,  $x_2 = 1 + \sqrt{2}$ ,  $x_3 = -i\sqrt{5}$ ,  $x_4 = i\sqrt{5}$

β)  $x_1 = -1 - \sqrt{7}$ ,  $x_2 = -1 + \sqrt{7}$ ,  $x_3 = 1 - 3i$ ,  $x_4 = 1 + 3i$

6.4. 1. 'Απ. α)  $\lambda > -\frac{1}{12}$ , β)  $\lambda = -\frac{1}{12}$ , γ) άδύνατο, δ)  $\lambda < -\frac{1}{12}$

ε)  $|12\lambda + 1| < 4(\lambda - 2)^2$

2. 'Υπ. Νά εξετάσετε τις περιπτώσεις  $x \in \mathbb{R}$  και  $x \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$ . Στή δεύτερη περίπτωση νά θέσετε  $x = \alpha + \beta i$

3. 'Υπ. Νά καθορίσετε τά πρόσημα τῶν  $\Delta, P, S$  γιά τίς διάφορες πραγματικές τιμές τοῦ  $\lambda$  καί νά κάνετε πίνακα.

4. 'Υπ. Πρέπει ἡ ἐπιλόουσα τῆς δοθείσας νά ἔχει δύο ρίζες θετικές. 'Απ.  $\lambda > 2$ .

5. 'Υπ. Νά καθορίσετε τά πρόσημα τῶν  $\Delta$  καί  $\alpha = \lambda - 1$  γιά τίς διάφορες πραγματικές τιμές τοῦ  $\lambda$  καί νά κάμετε πίνακα.

6. 'Υπ. Νά ἐπιλυθεῖ ὅπως οἱ ἀντίστροφες 4ου βαθμοῦ (δηλ. νά διαιρέσετε μέ τό  $x^2$  καί νά θέσετε  $x + \frac{1}{x} = y$ ).

7. 'Υπ. 'Η δοθεῖσα εἶναι ἰσοδύναμη μέ τήν  $(\lambda - 1)x^2 + 2x - (\lambda + 1) > 0$ , ὁπότε ἐργαζόμενα στήν ὁμοίωση 5.

8. 'Απ. α)  $x = 2k\pi$ ,  $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , β)  $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ ,  $x = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , γ)  $x = 2k\pi - \frac{\pi}{12}$ ,  $x = 2k\pi + \frac{5\pi}{12}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , δ)  $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ ,  $x = 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

9. 'Υπ. α) 'Η δοθεῖσα εἶναι ἰσοδύναμη μέ τήν  $\eta\mu\chi(4\lambda\sigma\upsilon\eta^2 x - 2\sigma\upsilon\eta x - \lambda) = 0$ . β) Εἶναι γραμμική ἔξισωση.

10. 'Υπ. Θέτουμε  $\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\eta x = t$ , ὁπότε  $\eta\mu\chi \cdot \sigma\upsilon\eta x = \frac{t^2 - 1}{2}$ , ὁπότε ἔχουμε τήν ἰσοδύναμη ἔξισωση  $t^2 - 2\lambda t + 1 = 0$ .

11. 'Υπ. Νά θέσετε  $\epsilon\phi\omega = \frac{2\mu + 1}{\mu}$ , ὁπότε ἔχετε τήν ἰσοδύναμη ἔξισωση  $\sigma\upsilon\eta(\chi + \omega) = \sigma\upsilon\eta\omega$ .

'Αν  $x_1, x_2$  εἶναι δύο ρίζες τῆς τελευταίας, τότε ἀπό  $|x_1 - x_2| = \frac{\pi}{2}$  νά ὑπολογίσετε τήν  $\epsilon\phi\omega$ .

8. 1. 'Υπ. Δείξτε ὅτι οἱ ρίζες τοῦ  $g(x)$  εἶναι καί ρίζες τοῦ  $f(x)$ .

2. 'Υπ. 'Εργασθεῖτε ὅπως καί στήν προηγούμενη.

3. 'Υπ. Χρησιμοποιήστε διαδοχικά τό σχ. Horner γιά νά βρεῖτε τό ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μέ τό  $x-1$  καί στή συνέχεια τό ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $\pi(x)$  (πηλίκο τῆς προηγούμενης διαιρέσεως) μέ τό  $x-1$ .

4. 'Υπ. Δείξτε ὅτι  $g(1) = 0$ , ἀφοῦ γνωρίζετε ὅτι  $f(1) = 0$  καί  $\pi(1) = 0$  (ὅπου  $\pi(x)$  τό πηλίκο τῆς διαιρέσεως τοῦ  $f(x)$  μέ τό  $x-1$ ).

5. 'Υπ. Νά λάβετε υπόψη ότι  $(x-\alpha)(x^2-3x+4)+u_1=(x-\beta)(x^2-4x+2)+u_2$ .
6. 'Υπ. Νά υπολογίσετε τὰ κ και λ από τήν  $f_1(x) \cdot f_2(x)=(x-\alpha)(x-\beta)\pi(x)+\kappa x+\lambda$
7. 'Υπ. 'Υποθέστε ότι  $x^4+1=(x^2+\mu x+\nu)(x^2+\mu_1 x+\nu_1)$  και προσδιορίστε τὰ  $\mu, \nu, \mu_1, \nu_1$ .

8. 'Υπ. 'Υποθέστε ότι οι  $\alpha, \beta, \gamma$  είναι ρίζες τῆς εξισώσεως  $x^3+\kappa x+\lambda=0$ , δηλ.

$$\alpha^3+\kappa\beta+\lambda=0, \beta^3+\kappa\gamma+\lambda=0 \text{ και } \gamma^3+\kappa\alpha+\lambda=0.$$

9. 'Υπ. 'Η άποδεικτέα γράφεται  $[(\rho_1+\rho_2+\dots+\rho_n)^2-2(\rho_1\rho_2+\rho_1\rho_3+\dots+\rho_{n-1}\rho_n)] \cdot v \geq (\rho_1+\rho_2+\dots+\rho_n)^2$ .
10. 'Υπ. Νά λάβετε υπόψη τούς τύπους Vieta και τή σχέση πού δίνεται και από αυτές νά απαλείψετε τὰ  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$ . 'Απ.  $2\beta^3+27\alpha^2\delta=9\alpha\beta\gamma$ .
11. 'Αν  $\rho_1$  είναι ή μέση ανάλογος τῶν  $\rho_2, \rho_3$ , θά έχουμε  $\rho_1^2=\rho_2 \cdot \rho_3$ . 'Εχουμε άκόμα και τρεῖς σχέσεις μεταξύ τῶν  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  από τούς τύπους Vieta, όποτε βρίσκουμε τήν απαλείφουσα τῶν τεσσάρων αὐτῶν σχέσεων.

12. 'Υπ. Νά λάβετε υπόψη τούς τύπους Vieta και νά υποθέστε άκόμα ότι  $\rho_2=-\rho_3 \neq 0$  ή  $\rho_2=-\rho_3=0$ .

13. 'Υπ. 'Αν  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  είναι οι ρίζες τοῦ  $f(x)$ , τότε από τούς τύπους Vieta έχουμε  $|\alpha|=|\rho_1+\rho_2+\rho_3| \leq |\rho_1|+|\rho_2|+|\rho_3|, |\beta| \leq |\rho_1| \cdot |\rho_2|+|\rho_2| \cdot |\rho_3|+|\rho_3| \cdot |\rho_1|$  κ.τ.λ.

14. 'Υπ. Οι μόνες ρητές ρίζες τῆς εξισώσεως  $x^{2n}-1=0$  είναι οι  $\pm 1$ . 'Όλες οι ρίζες τῆς δίνονται από τόν τύπο  $x_k=\cos \frac{2k\pi}{2n} + i\eta \mu \frac{2k\pi}{2n}, k=0,1,2,\dots,2n-1$  και άνά δύο είναι συζυγείς μιγαδικές, όποτε  $x^{2n}-1=(x^2-1) \cdot \prod_{k=1}^{n-1} (x-x_k) \cdot (x-\bar{x}_k)$

15. 'Υπ. Νά λάβετε υπόψη ότι  $1+x^2+x^4+\dots+x^{2v-2}=\frac{x^{2v}-1}{x^2-1}$  κ.τ.λ.

16. 'Υπ. 'Αφοῦ  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  ή μία ρίζα είναι πραγματική. 'Από τή δοθείσα σχέση  $\frac{\alpha^2-|\beta|}{|\alpha\beta|} \cdot \sqrt{2\beta} < 1$  προκύπτει  $\alpha^2 < 2\beta$  και από τήν τελευταία  $\rho_1^2+\rho_2^2+\rho_3^2 < 0$ .

17. 'Υπ. Σχηματίστε τή διαφορά  $f_v(x)-f_{v-1}(x)$  και δείξτε ότι είναι διαιρετή μέ τό  $(1-x)^n$ . Αυτό συμβαίνει για  $v=1, v=2, \dots, v=n$ .

18. 'Υπ. i) 'Αν  $|\rho| \leq 1$  ή άποδεικτέα είναι φανερή. ii) 'Αν  $|\rho| \geq 1$ , τότε από τήν  $f(\rho)=\rho^3+\alpha\rho^2+\beta\rho+\gamma=0$  παίρνουμε  $|\rho^3| \leq |\alpha\rho^2|+|\beta\rho|+|\gamma|$

19. 'Υπ. 'Από τήν  $f(\rho)=0$  παίρνουμε  $\alpha\rho^v+\alpha_{v-1}\rho^{v-1}+\dots+\alpha_1\rho+\alpha_0=0$  ή  $\alpha_{v-1}\rho^{v-1}+\alpha_{v-2}\rho^{v-2}+\dots+\alpha_1\rho+\alpha_0=-\alpha\rho^v$  κ.τ.λ.

20. 'Υπ. Νά λάβετε υπόψη ότι  $\rho^v+\alpha_{v-1}\rho^{v-1}+\dots+\alpha_1\rho+\alpha_0=0$  ή  $\alpha_{v-1}\rho^{v-1}+\dots+\alpha_1\rho+\alpha_0=-\rho^v$

21. 'Απ. α)  $2 < \alpha < \frac{7+2\sqrt{7}}{3}$ , β)  $1 < \alpha < 2$ , γ)  $\alpha < 1$  ή  $\alpha > \frac{1}{3} \cdot (7+2\sqrt{7})$

22. 'Υπ. 'Αν  $f(\alpha)=f(\beta)=f(\gamma)=f(\delta)=3$ , τότε σχηματίστε τό πολυώνυμο  $F(x)=f(x)-3$  και παρατηρήστε ότι  $(x-\alpha) | F(x), (x-\beta) | F(x)$  κ.τ.λ.

23. 'Υπ. 'Αν  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  είναι οι ρίζες, τότε χρησιμοποιήστε τήν ταυτότητα τοῦ Lagrange για τίς τριάδες  $\sqrt{\rho_1}, \sqrt{\rho_2}, \sqrt{\rho_3}$  και  $\sqrt{\frac{1}{\rho_1}}, \sqrt{\frac{1}{\rho_2}}, \sqrt{\frac{1}{\rho_3}}$  και λάβετε υπόψη τούς τύπους Vieta.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

1.5.1. α) 'Υπ.  $\eta\mu x - \eta\mu y = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \Leftrightarrow 2\eta\mu \frac{x-y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x+y}{2} = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \Leftrightarrow 2\eta\mu \frac{x-y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} > \frac{\sqrt{3}+1}{2}$

'Απ.  $\left\{ \begin{array}{l} x=2k\pi + \frac{2\pi}{3} \\ y=-2k\pi - \frac{\pi}{6} \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$  εἴτε  $\left\{ \begin{array}{l} x=2k\pi + \frac{5\pi}{6} \\ y=-2k\pi - \frac{\pi}{3} \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$

β) 'Υπ.  $\sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu y = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow 2\eta\mu \frac{x+y}{2} \eta\mu \frac{x-y}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

'Απ.  $\left\{ \begin{array}{l} x=2k\pi + \frac{\pi}{2} \\ y=-2k\pi + \frac{\pi}{6} \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$  εἴτε  $\left\{ \begin{array}{l} x=2k\pi + \frac{7\pi}{6} \\ y=-2k\pi - \frac{\pi}{2} \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$

γ) 'Υπ.  $\eta\mu x \eta\mu y = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu(x-y) - \sigma\upsilon\nu(x+y) = \frac{3}{2}$  'Απ.  $\left\{ \begin{array}{l} x=k\pi + \frac{\pi}{3} \\ y=-k\pi + \frac{\pi}{3} \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$

δ) 'Υπ.  $\sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\upsilon\nu y = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu(x+y) + \sigma\upsilon\nu(x-y) = -1$ .

'Απ.  $\left\{ \begin{array}{l} x=k\pi + \frac{2\pi}{3} \\ y=k\pi \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$  εἴτε  $\left\{ \begin{array}{l} x=k\pi \\ y=k\pi - \frac{2\pi}{3} \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$

ε) 'Υπ.  $\frac{\sigma\upsilon\nu x}{\sigma\upsilon\nu y} = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{\sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu y}{\sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu y} = \frac{-\sqrt{3}-1}{-\sqrt{3}+1} \Leftrightarrow \frac{-2\eta\mu \frac{x+y}{2} \eta\mu \frac{x-y}{2}}{2\sigma\upsilon\nu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2}} = \frac{-\sqrt{3}-1}{-\sqrt{3}+1}$

'Απ.  $\left\{ \begin{array}{l} x=k\pi - \frac{\pi}{6} \\ y=-k\pi + \frac{2\pi}{3} \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$

στ) 'Υπ.  $\epsilon\phi x + \epsilon\phi y = 1 \Leftrightarrow \frac{\eta\mu(x+y)}{\sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu y} = 1$ .

'Απ.  $\left\{ \begin{array}{l} x=k\pi + \frac{\pi}{4} \\ y=-k\pi \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$  εἴτε  $\left\{ \begin{array}{l} x=k\pi \\ y=-k\pi + \frac{\pi}{4} \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$

ζ) 'Υπ.  $\eta\mu^2 x + \eta\mu^2 y = \frac{3+\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{2} + \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2y}{2} = \frac{3+\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu 2x + \sigma\upsilon\nu 2y = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ .

$$\text{'Απ. } \begin{cases} x=k\pi + \frac{5\pi}{12} \\ y=-k\pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \text{ είτε } \begin{cases} x=k\pi - \frac{\pi}{6} \\ y=-k\pi + \frac{5\pi}{12} \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$2. \text{'Υπ. } 4\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\gamma=3 \Leftrightarrow \eta\mu(\chi+\gamma)+\eta\mu(\chi-\gamma)=\frac{3}{2} \text{'Απ. } \begin{cases} x=\frac{4\pi}{3} \\ y=\frac{7\pi}{6} \end{cases} \text{ είτε } \begin{cases} x=\frac{7\pi}{3} \\ y=\frac{13\pi}{6} \end{cases}$$

3. α) 'Υπ. Είναι πρωτοβάθμιο σύστημα ως προς  $\eta\mu\chi$ ,  $\sigma\upsilon\nu\gamma$

$$\beta) \text{'Υπ. } \begin{cases} x+2y=\frac{\pi}{2} \\ \eta\mu\chi+\eta\mu 3y=\frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{\pi}{2}-2y \\ \eta\mu\left(\frac{\pi}{2}-2y\right)+\eta\mu 3y=\frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{\pi}{2}-2y \\ \sigma\upsilon\nu 2y+\eta\mu 3y=\frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{\pi}{2}-2y \\ 1-2\eta\mu^2y+3\eta\mu y-4\eta\mu^3y=\frac{3}{2} \end{cases} \text{ κ.τ.λ.}$$

$$\gamma) \text{'Υπ. } \begin{cases} \eta\mu\chi+\eta\mu y=\frac{3}{2} \\ \sigma\upsilon\nu\chi+\sigma\upsilon\nu\gamma=\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\eta\mu\frac{x+y}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{x-y}{2}=\frac{3}{2} \\ 2\sigma\upsilon\nu\frac{x+y}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{x-y}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\eta\mu\frac{x+y}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{x-y}{2}=\frac{3}{2} \\ \epsilon\phi\frac{x+y}{2}=\sqrt{3} \end{cases} \text{ κ.λ.}$$

4. 'Υπ. Νά θέσετε  $\sigma\phi\chi=\frac{1}{\epsilon\phi\chi}$  και  $\sigma\phi\gamma=\frac{1}{\epsilon\phi\gamma}$ ,

5. α) 'Υπ. Είναι πρωτοβάθμιο σύστημα ως προς  $\eta\mu\chi$ ,  $\sigma\upsilon\nu\chi$ . 'Η άπαλείφουσα είναι  $(\beta_2\gamma_1-\beta_1\gamma_2)^2+(\alpha_1\gamma_2-\alpha_2\gamma_1)^2=(\alpha_1\beta_2-\alpha_2\beta_1)^2$ .

β) 'Υπ. Από τό πρωτοβάθμιο σύστημα ως προς  $\mu^2, \nu^2$  βρείτε τά  $\eta\mu\chi$  και  $\sigma\upsilon\nu\chi$ . 'Η άπαλείφουσα είναι  $\mu^2+\nu^2=\lambda^2$ .

γ) 'Απ. 'Η άπαλείφουσα είναι  $\epsilon\phi\alpha \cdot (\sigma\phi\beta-\epsilon\phi\gamma)=1$ .

2.4. 1. α) 'Απ.  $2k\pi + \frac{7\pi}{6} < x < 2k\pi + \frac{11\pi}{6}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$

β) 'Απ.  $2k\pi + \frac{\pi}{4} < x < 2k\pi + \frac{7\pi}{4}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$

γ) 'Απ.  $2k\pi < x < 2k\pi + \frac{\pi}{3}$  είτε  $(2k+1)\pi < x < 2k\pi + \frac{4\pi}{3}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

δ) 'Απ.  $2k\pi + \frac{\pi}{6} < x < 2k\pi + \frac{\pi}{2}$  είτε  $2k\pi + \frac{7\pi}{6} < x < (2k+1)\pi + \frac{\pi}{2}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

2. 'Υπ. 'Η δοθείσα γράφεται:  $(\eta\mu\chi-1)(2\eta\mu\chi-1) > 0$ .

3. 'Υπ. Είναι  $\eta\mu^2\chi + \eta\mu\chi + 1 > 0$  για όλα τά τόξα  $\chi$ . 'Εργασθείτε όπως στο παράδειγμα 1 τής 2.3.

4. α) 'Απ.  $x \in \left(\frac{2\pi}{18}, \frac{3\pi}{18}\right) \cup \left(\frac{8\pi}{18}, \frac{9\pi}{18}\right) \cup \left(\frac{14\pi}{18}, \frac{15\pi}{18}\right) \cup \left(\frac{20\pi}{18}, \frac{21\pi}{18}\right) \cup \left(\frac{26\pi}{18}, \frac{27\pi}{18}\right) \cup \left(\frac{32\pi}{18}, \frac{33\pi}{18}\right)$

β) 'Απ.  $x \in \left(\frac{\pi}{15}, \frac{2\pi}{15}\right) \cup \left(\frac{7\pi}{15}, \frac{8\pi}{15}\right) \cup \left(\frac{13\pi}{15}, \frac{14\pi}{15}\right) \cup \left(\frac{19\pi}{15}, \frac{20\pi}{15}\right) \cup \left(\frac{25\pi}{15}, \frac{26\pi}{15}\right)$

5. 'Υπ. 'Η δοθείσα είναι Ισοδύναμη μέ τήν

$$(3\eta\mu x - 1)^2 \cdot (2\eta\mu x - 1) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0, \quad x \neq k\pi + \frac{3\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

4. 1. α) Τό σύστημα είναι Ισοδύναμο μέ τό

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\eta\mu(x+y)}{\sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu y} = \alpha \\ 2\eta\mu x \eta\mu y = 2\beta \\ \sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\upsilon\nu y \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\eta\mu(x+y) = \alpha \sigma\upsilon\nu(x+y) + \alpha \sigma\upsilon\nu(x-y) \\ \sigma\upsilon\nu(x-y) - \sigma\upsilon\nu(x+y) = 2\beta \\ \sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\upsilon\nu y \neq 0 \end{array} \right\}$$

β) Τό σύστημα είναι συμμετρικό καί γίνεται Ισοδύναμο μέ τό

$$\begin{aligned} \eta\mu \frac{x+y}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} &= \lambda \eta\mu \alpha \\ \epsilon\varphi \frac{x+y}{2} &= \epsilon\varphi \alpha \end{aligned}$$

2. α) 'Αφαιρώντας από τήν πρώτη τή δεύτερη καί από τή δεύτερη τήν τρίτη παίρνομε τό Ισοδύναμο σύστημα:  $\eta\mu^2 x + \eta\mu^2 y = 1 + \eta\mu z$

$$(\eta\mu z - \eta\mu x)(\eta\mu x + \eta\mu z + 1) = 0$$

$$(\eta\mu y - \eta\mu x)(\eta\mu x + \eta\mu y + 1) = 0$$

β) 'Απ. Οι λύσεις δίνονται από τά άλγεβρικά συστήματα

$$x + y = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$x - y = 2\lambda\pi \pm \frac{\pi}{4}$$

γ) 'Υπ. Θέστε  $\frac{\epsilon\varphi x}{1} = \frac{\epsilon\varphi y}{2} = \frac{\epsilon\varphi \omega}{3} = \lambda$ , όποτε είναι  $\lambda = \pm 1$ .

3. α) 'Απ.  $\frac{\alpha^2}{\mu} + \frac{\beta^2}{\nu} = 1$

β) 'Απ.  $\left(\sqrt{\frac{3\sigma\upsilon\nu\theta}{\lambda}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{3\eta\mu\theta}{\lambda}}\right)^2 = 1$

γ) 'Απ.  $\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha^2}{\beta^2} + \frac{\gamma^2}{\delta^2}\right) \cdot \left(\frac{\alpha^2}{\beta^2} + \frac{\gamma^2}{\delta^2} - 3\right) = \frac{\alpha}{\beta}$

δ) 'Απ.  $27\alpha^2\beta^3 = (1 - \alpha^2 - \beta^2)^3$

4. α) 'Απ.  $2k\pi + \frac{\pi}{2} < x < 2k\pi + \frac{7\pi}{12}$ , είτε  $2k\pi + \frac{23\pi}{12} < x < (2k+1)\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$

β) 'Υπ. Νά θέσετε  $\frac{x}{6} = y$ , όποτε ή δοθείσα γράφεται:

$$2\sigma\upsilon\nu 2y - \eta\mu 3y - 2 > 0.$$

γ) 'Υπ. Βρείτε ποϋ συναληθεϋουν οι άνισώσεις:

$$\begin{cases} 2\sigma\upsilon\nu x - 1 > 0 & \text{είτε} & 2\sigma\upsilon\nu x - 1 < 0 \\ x - 2 > 0 & & x - 2 < 0 \end{cases}$$

5. 'Υπ. 'Η δοθείσα είναι Ισοδύναμη μέ τήν άνίσωση

$$\log_{125}(\eta\mu^3 x) > \log_{125}(3\eta\mu x - 2) \Leftrightarrow \eta\mu^3 x > 3\eta\mu x - 2 >$$

# Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Μιγαδικοί αριθμοί

Σελίδα

1. Τό σύνολο $C$ των μιγαδικών αριθμών .....	5
1.1. Εισαγωγή. 1.2. Τό σύνολο $C$ σάν σύνολο διατεταγμένων ζευγών του $R \times R$ . 1.3. Ίδιότητες τής προσθέσεως και του πολλαπλασιασμού στό $C$ . 1.4. Άσκήσεις. 1.5. Συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί. 1.6. Έφαρμογές. 1.7. Άσκήσεις. 1.8. Μέτρο των μιγαδικών αριθμών. 1.9. Άσκήσεις.	
2. Γεωμετρική παράσταση των μιγαδικών αριθμών .....	18
2.1. Η άπεικόνιση των μιγαδικών αριθμών στά σημεία του επιπέδου. 2.2. Γεω- μετρική εικόνα του άθροίσματος και τής διαφορής δύο μιγαδικών αριθμών. 2.3. Άσκήσεις.	
3. Γεωμετρικές έφαρμογές του μέτρου των μιγαδικών αριθμών .....	21
3.1. Η έξίσωση του κύκλου. 3.2. Έφαρμογές. 3.3. Άσκήσεις.	
4. Πολικές συντεταγμένες μιγαδικού αριθμού .....	25
4.1. Όρισμός. 4.2. Παραδείγματα. 4.3. Άσκήσεις.	
5. Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού αριθμού .....	27
5.1. Όρισμοί και θεωρήματα. 5.2. Παραδείγματα—Έφαρμογές. 5.3. Άσκήσεις.	
6. Ρίζες των μιγαδικών αριθμών .....	33
6.1. Όρισμός—Θεώρημα. 6.2. Παραδείγματα.—Έφαρμογές. 6.3. Άσκήσεις.	
7. Σύντομη άνακεφαλαίωση .....	38
8. Άσκήσεις για έπανάληψη .....	39

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Άλγεβρικές δομές

1. Διμελείς πράξεις .....	43
1.1. Η έννοια τής διμελούς πράξεως. 1.2. Έσωτερικές πράξεις σε σύνολα μέ στοι- χεία κλάσεις Ισοδυναμίας. 1.3. Ίδιότητες των έσωτερικών πράξεων. 1.4. Ουδέ- τερο στοιχείο ως προς έσωτερική πράξη. 1.5. Συμμετρικά στοιχεία ως προς έσω- τερική πράξη. 1.6. Άπλοποιήσιμο στοιχείο ως προς έσωτερική πράξη. 1.7. Η έννοια τής άλγεβρικής δομής. 1.8. Άσκήσεις.	
2. Ήμιομάδες - Όμάδες .....	55
2.1. Ήμιομάδες. 2.2. Όμάδες. 2.3. Βασικές Ιδιότητες σε μία Όμάδα. 2.4. Άσκήσεις.	
3. Δακτύλιοι .....	59
3.1. Η έννοια του δακτύλιου. 3.2. Βασικές Ιδιότητες σε ένα δακτύλιο. 3.3. Η έν- νοια τής άκέραιας περιοχής. 3.4. Άσκήσεις.	
4. Σώματα .....	65
4.1. Η έννοια του σώματος. 4.2. Βασικές Ιδιότητες σε ένα σώμα. 4.3. Άσκήσεις.	
5. Διανυσματικοί χώροι .....	68
5.1. Η έννοια του διανυσματικού χώρου. 5.2. Βασικές Ιδιότητες σε ένα διανυ- σματικό χώρο. 5.3. Η έννοια του διανυσματικού (γραμμικού) ύποχώρου. 5.4.	

Γραμμική άνεξαρτησία – Γραμμική Έξαρτηση. 5.5. Βάση και διάσταση ενός διανυσματικού χώρου. 5.6. Άσκήσεις.

6. Σύντομη άνακεφαλαίωση .....	78
7. Άσκήσεις για επανάληψη .....	79

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Στοιχεία θεωρίας αριθμών.

1. Διαιρετότητα στο σύνολο $Z$ .....	83
1.1. Η έννοια της διαιρετότητας στο $Z$ . 1.2. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 1.3. Η έννοια της αλγοριθμικής διαιρέσεως. 1.4. Άσκήσεις. 1.5. Μέγιστος κοινός διαιρέτης άκεραίων - αλγόριθμος του Εύκλείδη 1.6. Προτάσεις με πρώτους και σχετικούς πρώτους αριθμούς. 1.7. Έλάχιστο κοινό πολλαπλάσιο άκεραίων. 1.8. Ανάλυση θετικών άκεραίων σε γινόμενο θετικών πρώτων παραγόντων. 1.9. Άσκήσεις	
2. Άκέραιες λύσεις της εξίσωσης $ax + by = \gamma$ ( $a, \beta, \gamma \in Z$ ) .....	103
2.1. Εισαγωγή. 2.2. Ύπαρξη και εύρεση άκεραιων λύσεων της $ax + by = \gamma$ ( $a, \beta, \gamma \in Z$ ). 2.3. Μέθοδοι εύρέσεως μιās άκέραιας λύσεως της $ax + by = \gamma$ με $(a, \beta) = 1$ . 2.4. Άσκήσεις.	
3. Σύντομη άνακεφαλαίωση .....	110
4. Άσκήσεις για επανάληψη .....	111

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Πολυώνυμα

1. Τό σύνολο $C_{[x]}$ τών πολυωνύμων .....	115
1.1. Ό όρισμός του $C_{[x]}$ . 1.2. Έφαρμογές. 1.3. Πρόσθεση στο $C_{[x]}$ 1.4. Πολλαπλασιασμός πολυωνύμου επί αριθμό $\lambda \in C$ . 1.5. Πολλαπλασιασμός στο $C_{[x]}$ . 1.6. Παραδείγματα. 1.7. Άσκήσεις.	
2. Διαιρετότητα πολυωνύμων .....	121
2.1. Η έννοια της διαιρετότητας στο $C_{[x]}$ . 2.2. Ιδιότητες της διαιρετότητας τών πολυωνύμων του $C_{[x]}$ . 2.3. Η αλγοριθμική διαίρεση. 2.4. Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης πολυωνύμων του $C_{[x]}$ . 2.5. Έφαρμογές. 2.6. Άσκήσεις. 2.7. Προτάσεις για τά υπόλοιπα τών διαιρέσεων τών πολυωνύμων του $C_{[x]}$ . 2.8. Έφαρμογές. 2.9. Άσκήσεις.	
3. Άριθμητική τιμή τών πολυωνύμων .....	131
3.1. Άριθμητική τιμή και ρίζα πολυωνύμου. 3.2. Σχήμα Horner (Χόρνερ). 3.3. Έφαρμογές. 3.4. Άσκήσεις.	
4. Θεωρήματα σχετικά με τīs ρίζες τών πολυωνύμων .....	136
4.1. Γενικά θεωρήματα. 4.2. Παραδείγματα-Έφαρμογές. 4.3. Άσκήσεις. 4.4. Ειδικά θεωρήματα. 4.5. Παραδείγματα-Έφαρμογές. 4.6. Άσκήσεις.	
5. Έξισώσεις 3ου και 4ου βαθμού .....	147
5.1. Εισαγωγή. 5.2. Έπίλυση της εξίσωσης $x^3 + 3ax^2 + 3\beta x + \gamma = 0$ . 5.3. Έπίλυση της εξίσωσης $x^4 + 4\alpha x^3 + 6\beta x^2 + 4\gamma x + \delta = 0$ . 5.4. Άσκήσεις.	
6. Διερεύνηση εξισώσεων και άνισώσεων .....	150
6.1. Εισαγωγή. 6.2. Διερεύνηση εξισώσεων και άνισώσεων. 6.3. Έφαρμογές σε τριγωνομετρικές εξισώσεις. 6.4. Άσκήσεις.	
7. Σύντομη άνακεφαλαίωση .....	161
8. Άσκήσεις για επανάληψη .....	162

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τριγωνομετρία

1. Τριγωνομετρικά συστήματα .....	167
1.1. Εισαγωγή. 1.2. Τριγωνομετρικά συστήματα με δύο εξισώσεις και δύο άγνωστα τόξα. 1.3. Τριγωνομετρικά συστήματα με τρεις εξισώσεις και τρία άγνωστα τόξα. 1.4. Τριγωνομετρική απαλοιφή 1.5. Άσκησης.	
2. Τριγωνομετρικές άνισώσεις .....	177
2.1. Όρισμοί. 2.2. Βασικές τριγωνομετρικές άνισώσεις. 2.3. Γενικές τριγωνομετρικές άνισώσεις. 2.4. Άσκησης.	
3. Σύντομη άνακεφαλαίωση .....	182
4. Άσκησης για επανάληψη .....	183
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ύποδειξεις για τή λύση τών άσκήσεων—Άπαντήσεις	184

ΕΚΔΟΣΗ Δ' 1981 (VII) — ΑΝΤΙΤΥΠΑ 25.000 — ΣΥΜΒΑΣΗ 3620/30.6.81

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Γ. ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.—  
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΥ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a short tail stroke.

