

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α/Β

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤ. ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΥ - ΜΑΘ. ΜΠΑΪΜΠΑ

002
ΚΛΣ
ΣΤ2Β
1096

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1971

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δ

2

MMI

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Στ.)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11 12 1952

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ



Δ 2 mmz


Κορυμφίνος (Σρ.)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤ. ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΥ — ΜΑΤΘ. ΜΠΑΪΜΠΑ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1971

002
K1Σ
ΣΤ2B
1096

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α' ΛΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

1. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ

1. 1. Είσαγωγή

Εἰς τὴν καθημερινὴν ζωὴν ὀμιλοῦμεν διὰ :

Τὴν ἀθλητικὴν ὀμάδα τῆς τάξεώς μας.

Τὴν συλλογὴν τῶν γραμματσοσῆμων μας.

Τὸν σύλλογον τῶν καθηγητῶν τοῦ γυμνασίου μας.

Τὸ σύνολον τῶν ἀντικειμένων, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται εἰς τὴν σάκκαν μας.

Ἦτοι χρησιμοποιοῦμεν τὰς λέξεις

ὀμάς, συλλογή, σύλλογος, σύνολον.

Ὅταν θέλωμεν νὰ ὀμιλήσωμεν δι' ἀντικείμενα, τὰ ὁποῖα λαμβάνομεν ὡς μίαν ὀλόκληρα.

Εἰς τὰ Μαθηματικά, ὅταν ἀναφερώμεθα εἰς ἀντικείμενα*, ὠρισμένα καὶ διακεκριμένα μεταξύ των, τὰ ὁποῖα λαμβάνομεν ὡς μίαν ὀλόκληρα, χρησιμοποιοῦμεν τὴν λέξιν σύνολον.

Τὰ ἀντικείμενα ἐκ τῶν ὁποίων ἀπαρτίζεται ἓν σύνολον τὰ ὀνομάζομεν στοιχεῖα ἢ μέλη αὐτοῦ. Π.χ. ἡ ἀνοιξις εἶναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου τῶν ἐποχῶν τοῦ ἔτους. Ἡ ὅπως λέγομεν ἡ ἀνοιξις ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον τῶν ἐποχῶν τοῦ ἔτους.

1. 2. Πότε ἓν σύνολον εἶναι καθωρισμένον

Εἰς τὸ κατωτέρω σχέδ. 1 εἰκονίζεται ἡ οἰκογένεια Σαμπάνη κατὰ τὴν ὥραν τοῦ φαγητοῦ. Ἡ οἰκογένεια αὕτη ἀποτελεῖ ἓν σύνολον τὸ ὁποῖον, ἄς ὀνομάσωμεν σύνολον Α.

Ἐάν μᾶς ἐρωτήσουν :

Ποῖον εἶναι τὸ σύνολον Α;

Θὰ ἀπαντήσωμεν : Τὸ σύνολον Α ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν πατέρα α, τὴν μητέρα β, τὸν υἱὸν γ, καὶ τὴν θυγατέρα δ. Ἡ ὅτι εἶναι τὸ σύνολον τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας Σαμπάνη.

* Ἡ λέξις ἀντικείμενον χρησιμοποιεῖται μὲ εὐρείαν σημασίαν π.χ. ὡς ἀντικείμενα λαμβάνονται καὶ ἀριθμοί, σχήματα κλπ.


Εἰς τὴν α' περίπτωσηὶν διὰ νὰ καθορίσωμεν τὸ σύνολον Α, ἀνεφέραμεν ἀκριβῶς ἀπὸ ποῖα στοιχεῖα ἀπαρτίζεται τοῦτο. Εἰς τὴν β' περίπτωσηὶν ἐχρησιμοποίησαμεν ἓν χαρακτηριστικὸν γνῶρισμα τῶν στοιχείων αὐτοῦ· τὸ γνῶρισμα «μέλος τῆς οἰκογενείας Σαμπάνη».

Γενικῶς, λέγομεν ὅτι ἓν σύνολον Α εἶναι καθωρισμένον :

α) Ὅταν γνωρίζωμεν ἀκριβῶς ἀπὸ ποῖα στοιχεῖα ἀπαρτίζεται τοῦτο.

β) Ὅταν γνωρίζωμεν ἓν χαρακτηριστικὸν γνῶρισμα τῶν στοιχείων αὐτοῦ.

Ἦτοι, ἓν γνῶρισμα, τὸ ὁποῖον μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀποφανθῶμεν, ἐὰν ἓν ὁποιοδήποτε ἀντικείμενον εἶναι ἢ δὲν εἶναι στοιχεῖον τοῦ θεωρουμένου συνόλου.



Σχ. 1. Οἰκογένεια Σαμπάνη.

Π.χ. τὸ σύνολον «οἱ μαθηταὶ τῆς τάξεώς μας μὲ ἀνάστημα ἄνω τοῦ 1,60m», εἶναι καθωρισμένον. Πράγματι· τὸ γνῶρισμα «μαθητῆς τῆς τάξεώς μας μὲ ἀνάστημα ἄνω τοῦ 1,60m» μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀπαντήσωμεν χωρὶς δισταγμούς, ἐὰν εἷς, οἷσοδήποτε, μαθητῆς τῆς τάξεώς μας ἔχη ἢ δὲν ἔχη ἀνάστημα ἄνω τοῦ 1,60m καὶ συνεπῶς εἶναι ἢ δὲν εἶναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου τούτου.

Ἀντιθέτως· τὸ σύνολον «οἱ ὑψηλοὶ μαθηταὶ τῆς τάξεώς μας» δὲν ἀποτελοῦν καθωρισμένον σύνολον. Πράγματι· τὸ γνῶρισμα «ὑψηλὸς μαθητῆς τῆς τάξεώς μας», εἰς ὠρισμένας τοῦλάχιστον περιπτώσεις, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀπαντήσωμεν, χωρὶς δισταγμούς, ἐὰν εἷς τυχῶν μαθητῆς τῆς τάξεώς μας εἶναι ἢ δὲν εἶναι ὑψηλός.

1. 3. Εἰδικὰ σύνολα

α) **Μονομελῆ σύνολα. Τὸ κενὸν σύνολον.**

Ὅταν μίαν ἡμέραν ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴν τάξιν μας δύο μαθηταὶ π.χ. ὁ Καλῆς καὶ ὁ Σαμπάνης, τότε τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων μαθητῶν ἀπαρτίζεται

ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς μαθητὰς. Ἐὰν μίαν ἄλλην ἡμέραν ἀπουσιάζη μόνον ὁ Σαμπάνης, ποῖον θὰ εἶναι τότε τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων μαθητῶν ;

Εἶναι ἓν σύνολον μὲ μ ο ν α δ ι κ ὸ ν στοιχεῖον τὸν Σαμπάνην.

Μίαν τρίτην ἡμέραν οὐδεὶς μαθητῆς ἀπουσιάζει. Ποῖον θὰ εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων μαθητῶν ἐκείνης τῆς ἡμέρας ;

Ἴσως νὰ εἴπωμεν ὅτι δὲν ὑπάρχει τότε σύνολον. Δυνάμεθα ὅμως νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων εἶναι σύνολον χωρὶς στοιχεῖα : Εἶναι τὸ κενὸν σύνολον.

Διὰ νὰ γενικεύσωμεν τὴν ἔννοιαν τοῦ συνόλου δεχόμεθα ὅτι ὑπάρχουν σύνολα μὲ ἓν μόνον στοιχεῖον (Μονομελῆ). Δεχόμεθα ἐπίσης ὅτι ὑπάρχει ἓν κενὸν σύνολον.

β) Βασικὸν σύνολον.

Ὡς ἐνθυμούμεθα ἀπὸ τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον εἰς τὴν Φυτολογίαν δὲν ἀσχολούμεθα μὲ ὅλα τὰ ἀντικείμενα ἀλλὰ μόνον μὲ τὰ φυτὰ. Ὀμοίως εἰς τὴν Ζωολογίαν ἐξετάζομεν ἀποκλειστικῶς τὰ ζῶα.

Γενικῶς, ὅταν ἀσχολούμεθα μὲ ἓν θέμα, ἓν πρόβλημα, χρησιμοποιοῦμεν ἀποκλειστικῶς στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου : ἐνὸς συνόλου εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκουν ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ προβλήματός μας. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ σύνολον τοῦτο λέγεται **βασικὸν σύνολον**, συμβολίζεται δὲ μὲ Ω . Τοιοῦτοτρόπως, εἰς τὴν Φυτολογίαν ἔχομεν ὡς βασικὸν σύνολον τὸ σύνολον τῶν φυτῶν, ἐνῶ εἰς τὴν Ζωολογίαν τὸ σύνολον τῶν ζῶων.

2. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

2. 1. Δι' ἀναγραφῆς

α) Διὰ νὰ παραστήσωμεν συμβολικῶς τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων γράφομεν

$$\{ \alpha, \epsilon, \eta, \omicron, \omega, \upsilon, \iota \}$$

Ἦτοι ἀναγράφομεν ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου ἐντὸς ἀγκίστρου, ($\{ \}$), χωρὶς νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν σειράν ἀναγραφῆς αὐτῶν. Διαβάζομεν δέ : Σύνολον μὲ στοιχεῖα $\alpha, \epsilon, \eta, \omicron, \omega, \upsilon, \iota$.

Ὁ τρόπος αὐτὸς συμβολισμοῦ τοῦ συνόλου λέγεται δι' ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων τοῦ ἢ συντόμως δι' ἀναγραφῆς.

Μάλιστα, ἐπειδὴ τὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου πρέπει νὰ εἶναι ἀνὰ δύο διαφορετικὰ (διακεκριμένα), δὲν ἀναγράφομεν δύο φορὰς τὸ αὐτὸ στοιχεῖον. Π.χ. τὸ σύνολον τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ 122 γράφεται

$$\{ 1, 2 \} \text{ ἢ } \{ 2, 1 \} \text{ ἀλλὰ ὄχι } \{ 1, 2, 2 \}.$$

β) Ἄς λάβωμεν ἤδη τὸ σύνολον τῶν λεγομένων φυσικῶν* ἀριθμῶν, οἱ ὁποῖοι

* Φυσικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3, 4...

είναι μικρότεροι του 1000. Έπειδή τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου τούτου ἔχουν μίαν διάταξιν (σειρὰν ἀναγραφῆς), δυνάμεθα νὰ τὸ παραστήσωμεν ὡς ἑξῆς :

$$\{1, 2, 3, \dots, 999\}$$

* Ἦτοι, ἀναγράφομεν ἐντὸς ἀγκίστρου κατὰ σειρὰν τὰ τρία πρῶτα στοιχεῖα, ἔπειτα τρεῖς τελείας καὶ τέλος τὸ τελευταῖον στοιχεῖον 999.

2. 2. Διὰ περιγραφῆς

Τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων δυνάμεθα νὰ τὸ παραστήσωμεν συμβολικῶς καὶ ὡς ἑξῆς :

$$\{ \text{Ὅλα τὰ στοιχεῖα } \chi, \text{ ὅπου } \chi \text{ εἶναι φωνῆεν} \}$$

$$\eta \text{ συντόμως} \quad \{ \chi \text{ ὅπου } \chi \text{ φωνῆεν} \}$$

$$\tilde{\eta} \quad \{ \chi \quad \chi \text{ φωνῆεν} \}$$

(Τὸ διαχωριστικὸν σημαίνει ὄ π ο υ).

Διαβάζομεν δὲ «σύνολον μὲ στοιχεῖα χ ὅπου χ φωνῆεν».

Ὁ τρόπος αὐτὸς τοῦ συμβολισμοῦ ἐνὸς συνόλου λέγεται διὰ περιγραφῆς τῆς χαρακτηριστικῆς ιδιότητος τῶν στοιχείων του. Ἡ συντόμως διὰ περιγραφῆς.

Παραδείγματα

α) Διὰ τὸ σύνολον τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ 1969 ἔχομεν τοὺς συμβολισμούς : $\{1, 9, 6\}$ ἢ $\{ \chi \chi \text{ ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ } 1969 \}$.

β) Διὰ τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τοῦ γυμνασίου μας ἔχομεν τὸν συμβολισμόν $\{ \chi \chi \text{ μαθητῆς τοῦ γυμνασίου μας} \}$.

(Διατὶ δὲν χρησιμοποιοῦμεν καὶ τὸν ἄλλον συμβολισμόν ;)

γ) Διὰ τὸ σύνολον, τὸ ὁποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς μῆνας Ἰούνιον, Ἰούλιον καὶ Αὐγουστον ἔχομεν τοὺς συμβολισμούς :

$$\{ \text{Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὐγουστος} \} \quad \{ \chi \chi \text{ μὴν τοῦ θέρους} \}$$

Εἰδικῶς τὸ κενὸν σύνολον * τὸ συμβολίζομεν $\{ \} \tilde{\eta} \emptyset$

2. 3. Ὁ συμβολισμὸς τοῦ «ἀνήκειν»

* Ἄς ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ σύνολον τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ 122 ἢ συμβολικῶς εἰς τὸ σύνολον $A = \{1, 2\}$. Τὰ ψηφία 1, 2 εἶναι τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου τούτου. Ἡ κατ' ἄλλον τρόπον τὰ στοιχεῖα 1, 2 ἀ ν ἦ κ ο υ ν εἰς τὸ σύνολον A. Ἡ σχέσις «1 ἀ ν ἦ κ εἰ εἰς τὸ σύνολον A» συμβολίζεται $1 \in A$.

* Δὲν πρέπει νὰ συγχέωμεν τὰς γραφὰς $\{0\}$ καὶ \emptyset ἢ πρώτη γραφή παριστάνει ἓν μονομελὲς σύνολον μὲ στοιχεῖον τὸ 0, ἐνῶ ἡ δευτέρα τὸ κενὸν σύνολον. Ἐπίσης σημειώνομεν ὅτι τὸ σύνολον $\{0\}$ εἶναι διάφορον ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 0.

Ἡ σχέση «3 δὲν ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον Α» συμβολίζεται $3 \notin A$.
 Εἶναι φανερόν ὅτι δι' ἕκαστον στοιχεῖον δύο μόνον δυνατότητες ὑπάρχουν :
 Νὰ ἀνήκη ἢ νὰ μὴ ἀνήκη εἰς ἓν σύνολον. Τοιουτοτρόπως ἔχομεν :

$$1 \in \{1, 2\}, \quad 2 \in \{1, 2\}, \quad 3 \notin \{1, 2\}, \quad 4 \notin \{1, 2\} \dots$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Παραστήσατε με ἀναγραφὴν καὶ περιγραφὴν τὸ σύνολον τῶν ἡμερῶν τῆς ἐβδομάδος, τῶν ὁποίων τὸ ὄνομα ἀρχίζει ἀπὸ Π. Γράψατε ἔπειτα συμβολικῶς ποῖαι ἡμέραι τῆς ἐβδομάδος ἀνήκουν εἰς τὸ σύνολον αὐτὸ καὶ ποῖαι δὲν ἀνήκουν.

2. Νὰ παραστήσετε διὰ περιγραφῆς τὰ σύνολα

$$A = \{ \text{Ἰανουάριος, Ἰούνιος, Ἰούλιος} \} \quad \text{καὶ} \quad B = \{ 1, 2, \dots, 9 \}$$

3. Ποῖον εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων, οἱ ὁποῖοι περιέχονται μεταξύ 4 καὶ 5 ;

4. Ἐὰν $A = \{ 0, 1, \{ 2 \} \}$, τότε ποῖαι ἀπὸ τὰς σχέσεις $0 \in A, 1 \in A, 2 \in A$ εἶναι ἀληθεῖς ;

5. Τί δύνασθε νὰ εἴπετε διὰ τὸ σύνολον $\{ \chi | \chi \text{ ὠραῖον ποίημα} \}$.

3. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΝ ΣΥΝΟΛΟΥ

3. 1. Ὅρισμοί.

Ἄς λάβωμεν ὡς βασικὸν σύνολον Ω τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τοῦ γυμνασίου μας καὶ τὰ δύο σύνολα :

$$A = \{ \chi | \chi \text{ μαθητῆς τῆς τάξεώς μας} \}.$$

$$\text{καὶ} \quad B = \{ \chi | \chi \text{ ἀριστοῦχος μαθητῆς τῆς τάξεώς μας} \}.$$

Παρατηροῦμεν ὅτι :

Ἐκαστον στοιχεῖον τοῦ Β εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ Α. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ σύνολον Β εἶναι ὑποσύνολον τοῦ συνόλου Α.

Γράφομεν δὲ συμβολικῶς

$$B \subseteq A$$

καὶ διαβάζομεν : Β εἶναι ὑποσύνολον τοῦ Α.

Γενικῶς : **Ἐμὲ σύνολον Β λέγεται ὑποσύνολον ἑνὸς συνόλου Α, ἐὰν ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ Β εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ Α.**

Ἦτοι, ὅταν $B \subseteq A$, τότε δὲν ὑπάρχει στοιχεῖον τοῦ Β τὸ ὁποῖον νὰ μὴ εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ Α.

Ἡ σχέση «Β εἶναι ὑποσύνολον τοῦ Α» διατυπώνεται καὶ ὡς ἑξῆς :

«Τὸ Β περιέχεται ἢ ἐγκλείεται εἰς τὸ Α».

Ἡ «Τὸ Α περιέχει ἢ ἐγκλείει τὸ Β».

Σημειοῦμεν ὅτι αἱ σχέσεις

«Β ἐγκλείεται εἰς τὸ σύνολον Α» (1) καὶ «α ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον Α» (2)

έχουν διαφορετική σημασία. Η (1) είναι σχέση συνόλου προς σύνολο, ενώ η (2) είναι σχέση στοιχείου προς σύνολο.

Παραδείγματα

α) Το σύνολο των φωνηέντων είναι υποσύνολο του συνόλου των γραμμάτων.

β) Το σύνολο των κατοίκων των Αθηνών είναι υποσύνολο του συνόλου των κατοίκων της Ελλάδος.

γ) Το σύνολο των μηνών της άνοιξης είναι υποσύνολο των μηνών του έτους.

δ) Το σύνολο $\{1, 2\}$ είναι υποσύνολο του $\{1, 2, 5\}$, αλλά δεν είναι υποσύνολο του $\{1, 3, 4, 5\}$ (Διατί ;)

$$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 5\} \quad , \quad \{1, 2\} \not\subseteq \{1, 3, 4, 5\}$$

3. 2. Ειδικά περιπτώσεις

1) Έκ του όρισμού του υποσυνόλου προκύπτει ότι :

Έκαστον σύνολο είναι υποσύνολο του έαυτού του.

$$\Sigma \subseteq \Sigma \quad (\text{Έγκλεισμός με εύρεϊαν έννοϊαν})$$

Παράδειγμα. Άς λάβωμεν τὸ σύνολο Σ τῶν μαθητῶν τῆς τάξεώς μας καὶ τὸ υποσύνολο αὐτοῦ A τῶν μαθητῶν, οἱ ὅποιοι μαθαίνουν Γαλλικά.

$$\text{Ἦτοι} \quad A \subseteq \Sigma$$

Ἐάν υποθέσωμεν ὅτι ὅλοι οἱ μαθηταὶ τῆς τάξεώς μας μαθαίνουν Γαλλικά, τότε τὸ σύνολο Σ ταυτίζεται μετὸ υποσύνολο αὐτοῦ A .

11) Ἐπίσης ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ υποσυνόλου προκύπτει ὅτι :

Τὸ κενὸν σύνολο εἶναι υποσύνολο παντὸς συνόλου.

$$\emptyset \subseteq \Sigma$$

Πράγματι· δὲν ὑπάρχει στοιχεῖο τοῦ κενοῦ συνόλου, τὸ ὅποιο νὰ μὴ ἀνήκη εἰς ἓν σύνολο Σ .

Παράδειγμα. Ἐάν υποθέσωμεν ὅτι οὐδεὶς μαθητῆς τῆς τάξεώς μας μαθαίνει Γαλλικά, τότε τὸ σύνολο A , υποσύνολο τοῦ Σ , εἶναι τὸ κενὸν σύνολο.

3. 3. Γνήσιον υποσύνολο συνόλου

Άς λάβωμεν τὰ σύνολα $A = \{1, 2, 3, 4\}$ καὶ $B = \{1, 2\}$

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἶναι : $B \subseteq A$. Τὸ σύνολο A ἔχει καὶ ἄλλα στοιχεῖα ἐκτὸς τῶν στοιχείων τοῦ υποσυνόλου του B . Διὰ τοῦτο τὸ σύνολο B λέγεται γνήσιον υποσύνολο τοῦ A .

Ἐάν σύνολο A ἔχη τοῦλάχιστον ἓν στοιχεῖο, ἐκτὸς τῶν στοιχείων ἐνὸς υποσυνόλου του B , τότε λέγομεν ὅτι τὸ B εἶναι γνήσιον υποσύνολο τοῦ A .

Γράφομεν δὲ $B \subset A$. (Ἐγκλεισμός με στενήν ἔννοιαν).

Π.χ. τὰ σύνολα $\{1\}$, $\{1, 2\}$ καὶ $\{2\}$ εἶναι γνήσια ὑποσύνολα τοῦ συνόλου $\{1, 2, 3\}$. Ἀντιθέτως τὸ σύνολον $\{1, 2, 3\}$ δὲν εἶναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ ἑαυτοῦ του.

3. 4. Ἰδιότητες

α) Καθὼς εἶδομεν εἰς τὴν 3, 2 ἕκαστον σύνολον Σ εἶναι ὑποσύνολον (ὄχι γνήσιον) τοῦ ἑαυτοῦ του.

$$\Sigma \subseteq \Sigma$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ σχέσις ἐγκλεισμοῦ (με εὐρείαν σημασίαν) ἔχει τὴν ἀνακλαστικὴν ἰδιότητα.

β) Ἐὰν σὰς εἴπουν ὅτι μεταξύ τριῶν συνόλων A, B, Γ ἰσχύουν αἱ σχέσεις :

$$A \subseteq B \quad (1) \quad \text{καὶ} \quad B \subseteq \Gamma \quad (2)$$

Τί συμπεραίνειτε ἀπὸ αὐτὰς διὰ τὴν σχέσιν τοῦ A ὡς πρὸς τὸ Γ ;

Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) συμπεραίνομεν ὅτι τὸ A περιέχεται εἰς τὸ Γ , $A \subseteq \Gamma$. Τὰ ἀνωτέρω διατυπώνονται συμβολικῶς ὡς ἑξῆς :

$$(A \subseteq B \quad \text{καὶ} \quad B \subseteq \Gamma) \Rightarrow A \subseteq \Gamma^* \quad (3)$$

Ἦτοι: Ἐὰν $A \subseteq B$ καὶ $B \subseteq \Gamma$, τότε θὰ εἶναι καὶ $A \subseteq \Gamma$

Ἦ $A \subseteq B$ καὶ $B \subseteq \Gamma$ συνεπάγεται ὅτι $A \subseteq \Gamma$.

Ἡ ἰδιότης αὕτη τῆς σχέσεως ἐγκλεισμοῦ λέγεται μεταβατικὴ ἰδιότης.

Ὡστε ὁ ἐγκλεισμός, με εὐρείαν σημασίαν, ἔχει τὴν ἀνακλαστικὴν καὶ τὴν μεταβατικὴν ἰδιότητα.

4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΝΟΛΟΥ **

4. 1. Καθὼς γνωρίζετε εἰς πολλὰς περιπτώσεις χρησιμοποιοῦνται διαγράμματα. Π.χ. χρησιμοποιοῦμεν διαγράμματα διὰ νὰ ἔχωμεν μίαν σύντομον καὶ παραστατικὴν εἰκόνα τῆς πορείας τοῦ πυρετοῦ ἑνὸς ἀσθενοῦς, τῶν μεταβολῶν τῆς θερμοκρασίας κατὰ μίαν περίοδον, τῆς κινήσεως τῶν κερδῶν μιᾶς ἐπιχειρήσεως...

* Τὸ σύμβολον \Rightarrow εἶναι γνωστὸν ὡς σύμβολον τῆς συνεπαγωγῆς.


** Ἡ συστηματικὴ χρῆσις διαγραμμάτων διὰ τὴν γραφικὴν παράστασιν συνόλων ὀφείλεται εἰς τὸν Ἄγγλον μαθηματικὸν J. Venn (1834-1923). Διὰ τοῦτο εἶναι γνωστὰ ὡς διαγράμματα τοῦ Venn.

Διαγράμματα χρησιμοποιούμεν, διὰ νὰ ἔχωμεν μίαν παραστατικὴν εἰκόνα συνόλων καὶ τῶν μεταξὺ αὐτῶν σχέσεων.




4. 2. Πῶς θὰ παραστήσωμεν γραφικῶς ἓν σύνολον ; Π.χ. τὸ σύνολον

$$A = \{ \alpha, \beta, \gamma \};$$

Πρὸς τοῦτο παριστάνομεν ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ συνόλου μὲ ἓν σημεῖον καὶ ἔπειτα ἐγκλείομεν ὄλα τὰ σημεῖα αὐτὰ καὶ μόνον αὐτά, ἐντὸς μιᾶς ἀπλῆς κλειστής γραμμῆς, (σχ. 2α.)



Κατὰ τὰ ἀνωτέρω : ἓν μονομελὲς σύνολον B, ἓν διμελὲς Γ, ἓν τριμελὲς Δ, ἔχουν τὰ παραπλευρῶς ἀντίστοιχα διαγράμματα σχ. 2β, 2γ καὶ 2δ.



Σχ. 2

Διὰ νὰ παραστήσωμεν γραφικῶς ὅτι τοῦ συνόλου $A = \{ 1, 2, 3 \}$ βασικὸν σύνολον εἶναι π.χ. τὸ $\Omega = \{ 1, 2, 3 \dots 9 \}$, σχηματίζομεν τὸ διάγραμμα τοῦ σχεδ. 3. Ἐπὶ τὸ διάγραμμα τοῦτο ἐννοοῦμεν ὅτι :

$$A \subseteq \Omega, \quad 1 \in A, \quad 2 \in A, \quad 3 \in A, \\ 4 \notin A, \quad 5 \notin A \dots$$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ


6. Ἀναφέρατε παραδείγματα ὑποσυνόλων τοῦ συνόλου τῶν μαθημάτων τῆς ταξέως σας.

7. Ἐάν $A = \{ 1, 2, 3 \dots 99 \}$, $B = \{ 1, 2, 3 \dots \}$ καὶ $\Gamma = \{ 1, 2, 3 \dots 999 \}$ νὰ σχηματίσετε τὰς σχέσεις ἐγκλεισμοῦ μεταξὺ αὐτῶν.

8. Ἐάν $A = \{ \chi \chi \text{ Εὐρωπαῖος} \}$, $B = \{ \chi \chi \text{ Ἕλλην} \}$, $\Gamma = \{ \chi \chi \text{ Καναδὸς} \}$ καὶ $\Delta = \{ \chi \chi \text{ Βέλγος} \}$ νὰ ἐξετάσετε ποῖα ἀπὸ τὰ σύνολα B, Γ, Δ εἶναι ὑποσύνολα τοῦ A.

9. Νὰ ἐξετάσετε ἐάν ἡ σχέση ἐγκλεισμοῦ, μὲ στενὴν σημασίαν, ἔχει τὴν ἀνακλαστικὴν ιδιότητα.

10. Ποῖα εἶναι τὰ ὑποσύνολα τοῦ συνόλου $\{ 0, 1 \}$ καὶ ποῖα τὰ γνήσια ὑποσύνολα τοῦ συνόλου $\{ 0, 1, 2 \}$.



Σχ. 3.

5. ΙΣΑ ΣΥΝΟΛΑ

5. 1. Ὅρισμός

Εἶδομεν ὅτι ἡ σειρά ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων ἑνὸς συνόλου δὲν ἔχει σημασίαν. Ἦτοι οἱ σύμβολοι $A = \{ 1, 2 \}$

καί $B = \{ 2, 1 \}$ παριστάνουν τὸ αὐτὸ σύνολον * ἢ καθὼς λέγομεν παριστάνουν δύο ἴσα σύνολα.

Ἐάν προσέξωμεν τὰ στοιχεῖα τῶν δύο αὐτῶν συνόλων A καὶ B , διακρίνομεν ὅτι :

Ἐκαστον στοιχεῖον τοῦ A εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ B ἀλλὰ καὶ
 » » B » » A

Ἐν σύνολον A λέγεται ἴσον μὲ ἓν σύνολον B , ἐάν ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ A εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ B καὶ ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ B εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ A .

Γράφομεν δὲ $A = B$ (1)

Ἡσχέσις (1) λέγεται ἰσότης. Τὰ ἑκατέρωθεν τοῦ συμβόλου (=) μέρη αὐτῆς λέγονται μέλη τῆς ἰσότητος. Πρῶτον μέλος τὸ ἐξ ἀριστερῶν καὶ δεύτερον τὸ ἐκ δεξιῶν.

Παραδείγματα

α) Τὰ σύνολα $\Gamma = \{ 3, 5, 7 \}$ καὶ $\Delta = \{ 7, 5, 3 \}$ εἶναι ἴσα καὶ γράφομεν $\Gamma = \Delta$. Ἀντιθέτως τὰ σύνολα $\Gamma = \{ 3, 5, 7 \}$ καὶ $E = \{ 3, 5, 7, 9 \}$ δὲν εἶναι ἴσα (Διατί;) καὶ γράφομεν $\Gamma \neq E$.

β) Τὰ σύνολα $K = \{ 5, 6, 4 \}$ καὶ $\Lambda = \{ \chi | \chi \text{ ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ } 4665 \}$ εἶναι ἴσα (Διατί;)

5. 2. Ἰδιότητες

i) Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ἰσότητος ἐννοοῦμεν ὅτι ἕκαστον σύνολον A εἶναι ἴσον μὲ τὸν ἑαυτὸν του.

$$A = A \quad \text{Ἀνακλαστικὴ ἰδιότης.}$$

ii) Εὐκόλως ἐννοοῦμεν ὅτι, ἐάν εἶναι $A = B$, τότε θὰ εἶναι καὶ $B = A$

Ἡ συμβολικῶς: $A = B \Rightarrow B = A$ Συμμετρικὴ ἰδιότης.

Ἡ ἰδιότης αὕτη μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐναλλάσσωμεν τὸ α' μέλος τῆς ἰσότητος μὲ τὸ β' μέλος αὐτῆς.

Π.χ. γράφομεν $\{ 3, 5, 6 \} = \{ 5, 3, 6 \}$ ἢ $\{ 5, 3, 6 \} = \{ 3, 5, 6 \}$

iii) Ἐάν γνωρίζετε ὅτι $A = B$ καὶ $B = \Gamma$, τί συνάγετε διὰ τὰ σύνολα A καὶ Γ ;

Ἐάν εἶναι $A = B$ καὶ $B = \Gamma$, τότε συμπεραίνομεν ὅτι θὰ εἶναι καὶ $A = \Gamma$. Ἡ συμβολικῶς :

$$(A = B \text{ καὶ } B = \Gamma) \Rightarrow A = \Gamma \quad \text{Μεταβατικὴ ἰδιότης.}$$

Ἡ μεταβατικὴ ἰδιότης μᾶς ἐπιτρέπει ἐμμέσους συγκρίσεις. Π.χ. χάρις εἰς

* Εἰς τὰ Μαθηματικὰ εἶναι δυνατὸν τὸ ἴδιον ἀντικείμενον (ἐννοία) νὰ παριστάνεται μὲ δύο διαφορετικὰ σύμβολα.

αὐτὴν εἶναι δυνατὸν νὰ εὗρωμεν ἕαν δύο σύνολα A καὶ Γ εἶναι ἴσα χωρὶς ἀπ' εὐθείας σύγκρισιν αὐτῶν ἀλλὰ μόνον διὰ συγκρίσεως πρὸς ἓν ἄλλο σύνολον B .
 ὥστε ἡ ἰσότης συνόλων ἔχει τὰς ιδιότητες :

1. Ἀνακλαστικὴν	$A = A$	
2. Συμμετρικὴν	$A = B \Rightarrow B = A$	
3. Μεταβατικὴν	$A = B$ $B = \Gamma$	$\Rightarrow A = \Gamma$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

11. Ποῖα ἐκ τῶν συνόλων $\{12\}$, $\{1,2\}$, $\{2,1\}$, $\{1,2,0\}$ εἶναι ἴσα μεταξύ των ;
 12. Πόσας συγκρίσεις πρέπει νὰ κάνετε, διὰ νὰ εὗρετε, ἕαν τρία σύνολα εἶναι ἴσα μεταξύ των ; Ὁμοίως, ὅταν τὰ σύνολα εἶναι τέσσαρα ;


6. ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

6.1. Πολὺ συχνὰ τὰ στοιχεῖα ἑνὸς συνόλου σχετίζονται μὲ στοιχεῖα ἑνὸς ἄλλου συνόλου.

* Ἄς εἶναι A τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς τάξεώς μας καὶ B τὸ σύνολον τῶν θρανίων τῆς αἰθούσης μας. Ὅταν λέγωμεν νὰ καθήσουν οἱ μαθηταὶ εἰς τὰς θέσεις των, ἀντιστοιχίζομεν ἕκαστον μαθητὴν (στοιχεῖον τοῦ A), μὲ ἓν θρανίον (στοιχεῖον τοῦ B). Τὸ ὠρισμένον θρανίον εἰς τὸ ὁποῖον κάθεται ὁ μαθητής.

* Ἄς λάβωμεν ἀκόμη δύο σύνολα : τὸ σύνολον Γ τῶν μαθητῶν τοῦ γυμνασίου μας καὶ τὸ σύνολον T τῶν 6 τάξεων αὐτοῦ. Ὅταν λέγωμεν οἱ μαθηταὶ νὰ μεταβῶν εἰς τὰς τάξεις των, ἀντιστοιχίζομεν ἕκαστον μαθητὴν, στοιχεῖον τοῦ Γ , μὲ μίαν τάξιν, στοιχεῖον τοῦ T , τὴν τάξιν εἰς τὴν ὁποίαν φοιτᾷ οὗτος.

6.2 * Ἄς προσέξωμεν τὰς κατωτέρω ἀντιστοιχίας (α) καὶ (β) τὰς ὁποίας ἔχομεν σημειώσει μὲ βέλη.



Καὶ αἱ δύο ἔχουν ἓν κοινὸν γνώρισμα : Ὅτι εἰς ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ συνόλου A (ἢ Γ) ἀντιστοιχεῖ ἓν καὶ μόνον ἓν στοιχεῖον τοῦ B (ἢ Δ). Π.χ. εἰς τὴν ἀντιστοιχίαν (α) καθὼς δεῖκνουν τὰ βέλη παρατηροῦμεν ὅτι :

Εἰς τὸ στοιχεῖον α τοῦ συνόλου A ἀντιστοιχεῖ τὸ 1 τοῦ B
» » » β » » 2 » B
» » » γ » » 3 » B

Ἡ ἀντιστοιχία, εἰς τὴν ὁποίαν εἰς ἕκαστον στοιχεῖον συνόλου A ἀντιστοιχεῖ ἓν καὶ μόνον ἓν στοιχεῖον τοῦ συνόλου B , λέγεται **μονοσήμαντος ἀντιστοιχία τοῦ A εἰς τὸ B** .

Ἐπιπέτως ἡ ἀνωτέρω ἀντιστοιχία (γ) δὲν εἶναι μονοσήμαντος. Διὰ τί; Παραδείγματα μονοσημάτων ἀντιστοιχιῶν ἔχομεν πολλὰ. Ἡ ἀντιστοιχία «μαθητῆς \rightarrow μὴν γεννήσεως αὐτοῦ» εἶναι μία μονοσήμαντος ἀντιστοιχία τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν εἰς τὸ σύνολον τῶν μηνῶν.

7. ΑΜΦΙΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΣΥΝΟΛΑ

7.1. Ὅρισμοί

Ἐὰν προσέξωμεν ἤδη τὴν παραπλευρῶς ἀντιστοιχίαν (I).

Εἶναι μία μονοσήμαντος ἀντιστοιχία τοῦ συνόλου A εἰς τὸ σύνολον B . Ἐπὶ πλέον ὅμως εἰς τὸ (II) βλέπομεν καὶ μίαν ἄλλην μονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν ἀπὸ τὸ B εἰς τὸ A .

Ἦτοι: Μεταξύ τῶν δύο συνόλων A καὶ B ὑπάρχει μία ἀντιστοιχία τοιαύτη, ὥστε:

Εἰς ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ A νὰ ἀντιστοιχῇ ἓν καὶ μόνον ἓν στοιχεῖον τοῦ

B , καὶ ἐπὶ πλέον εἰς ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ

B νὰ ἀντιστοιχῇ ἓν καὶ μόνον ἓν στοιχεῖον τοῦ A .

Ἡ ἀνωτέρω διπλῆ ἀντιστοιχία λέγεται **ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία** μεταξύ τῶν συνόλων A καὶ B . Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ σύνολον A λέγεται **ἰσοδύναμον** μετὰ τὸ σύνολον B .

$$(I) \quad \begin{array}{c} A = \{1, \beta, \gamma\} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ B = \{1, 2, 3\} \end{array}$$

$$(II) \quad \begin{array}{c} A = \{\alpha, \beta, \gamma\} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ B = \{1, 2, 3\} \end{array}$$

$$(III) \quad \begin{array}{c} A = \{\alpha, \beta, \gamma\} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ B = \{1, 2, 3\} \end{array}$$

Γράφομεν δὲ

$$A \sim B.$$

Ἐν σύνολον A εἶναι ἰσοδύναμον μετὰ ἓν σύνολον B , ἔὰν εἶναι δυνατόν νὰ θέσωμεν τὰ στοιχεῖα τοῦ A εἰς ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μετὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ B .

Τὸ σύμβολον \sim λέγεται σύμβολον τῆς ἰσοδυναμίας μεταξύ δύο συνόλων.

Παραδείγματα

α) Ὅταν τὸ μικρὸ παιδί μετῶν μετὰ τὰ δάκτυλα τῆς μιᾶς χειρὸς του ἀπὸ τὸ 1 ἕως καὶ τὸ 5, σχηματίζει μίαν ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μεταξύ τοῦ συνόλου τῶν δακτύλων τῆς μιᾶς χειρὸς του καὶ τοῦ συνόλου $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

β) Τὸ σύνολον τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδος εἶναι ἰσοδύναμον μετὰ τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων τῆς ἀλφαβήτου μας.

Ἀντιπαράδειγμα

Τὸ σύνολον $A = \{\alpha, \beta\}$ δὲν εἶναι ἰσοδύναμον μετὰ τὸ σύνολον $B = \{1, 2, 3\}$.

Πράγματι· ἐνῶ ἕκαστον στοιχείον τοῦ A εἶναι δυνατόν νὰ ἀντιστοιχισθῆ κατὰ μοναδικόν τρόπον, μὲ ἓν στοιχείον τοῦ B ,

π.χ. $\alpha \rightarrow 1, \quad \beta \rightarrow 2.$

ἕκαστον στοιχείον τοῦ B δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀντιστοιχισθῆ κατὰ τρόπον μοναδικόν, μὲ ἓν στοιχείον τοῦ A .

$1 \rightarrow \alpha, \quad 2 \rightarrow \beta, \quad 3 \rightarrow ;$

7.2. Παρατηρήσεις

α) Τὰ στοιχεῖα δύο ἰσοδυνάμων συνόλων δυνάμεθα νὰ τὰ ἀντιστοιχίσωμεν ἀμφιμονοσήμαντως κατὰ διαφόρους τρόπους.

Π.χ. διὰ τὰ ἰσοδύναμα σύνολα $A = \{1, 2\}$ καὶ $B = \{\alpha, \beta\}$

ἔχομεν $\alpha \leftrightarrow 1$ $\alpha \leftrightarrow 1$
 $\beta \leftrightarrow 2$ $\beta \leftrightarrow 2$ (2 τρόποι)

Ἐπίσης διὰ τὰ ἰσοδύναμα σύνολα $A = \{1, 2, 3\}$ καὶ $B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ ἔχομεν :

$1 \leftrightarrow \alpha \mid 1 \leftrightarrow \alpha \mid 1 \leftrightarrow \beta \mid 1 \leftrightarrow \beta \mid 1 \leftrightarrow \gamma \mid 1 \leftrightarrow \gamma$
 $2 \leftrightarrow \beta \mid 2 \leftrightarrow \gamma \mid 2 \leftrightarrow \alpha \mid 2 \leftrightarrow \beta \mid 2 \leftrightarrow \alpha \mid 2 \leftrightarrow \alpha$ (6 τρόποι)
 $3 \leftrightarrow \gamma \mid 3 \leftrightarrow \beta \mid 3 \leftrightarrow \alpha \mid 3 \leftrightarrow \gamma \mid 3 \leftrightarrow \alpha \mid 3 \leftrightarrow \beta$

β) Δύο ἴσα σύνολα εἶναι πάντοτε ἰσοδύναμα. ἐνῶ δύο ἰσοδύναμα δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην ἴσα.

7.3. Ἰδιότητες ἰσοδυναμίας

α) Ἀπὸ τὸν ὄρισμὸν τῶν ἰσοδυνάμων συνόλων συνάγομεν ὅτι

$A \sim A$ Ἀνακλαστικὴ ἰδιότης.

β) Ἐὰν ὑπάρχῃ μία ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν στοιχείων συνόλου A μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου B , τότε ἡ αὐτὴ ἀντιστοιχία ὑπάρχει μεταξὺ τῶν στοιχείων τοῦ B μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ A .

$A \sim B \Rightarrow B \sim A$ Συμμετρικὴ ἰδιότης

γ) Ἐὰν ὑπάρχῃ μία ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν στοιχείων τῶν συνόλων A καὶ B , $A \sim B$ καὶ ὑπάρχῃ ἀκόμη μία ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν στοιχείων τῶν συνόλων B καὶ Γ , $B \sim \Gamma$, τότε θὰ ὑπάρχῃ μία ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν συνόλων A καὶ Γ , $A \sim \Gamma$.

$(A \sim B \text{ καὶ } B \sim \Gamma) \Rightarrow A \sim \Gamma$ Μεταβατικὴ ἰδιότης.

Ωστε η σχέσις ισοδυναμίας μεταξύ συνόλων έχει τὰς ἑξῆς ιδιότητες:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Ἀνακλαστικήν | $A \sim A$ |
| 2. Συμμετρικήν | $A \sim B \Rightarrow B \sim A$ |
| 3. Μεταβατικήν | $\left. \begin{array}{l} A \sim B \\ B \sim \Gamma \end{array} \right\} \Rightarrow A \sim \Gamma$ |

Ποία ἄλλη σχέσις συνόλων ἔχει τὰς ἀνωτέρω ιδιότητες ;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

13. Ἀναφέρατε παραδείγματα μονοσημάντων ἀντιστοιχιῶν καὶ ἀμφιμονοσημάντων ἀντιστοιχιῶν.

14 Ποῖαι ἐκ τῶν σχέσεων :

$$\begin{array}{l} \phi \sim \{0\} \\ \phi \sim 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \{\phi, \{\alpha\}, \beta\} \sim \{\alpha, \beta, 1\} \\ \{\alpha, \beta, 1\} \sim \{\{\alpha, \beta\}, 1\} \end{array}$$

εἶναι ἀληθεῖς καὶ ποῖαι ψευδεῖς ;

15. Οἱ μαθηταὶ Τζιτζῆς, Παγώνης καὶ Νίκας κάθονται εἰς τρεῖς θέσεις α, β, γ . Κατὰ πόσους καὶ ποίους τρόπους εἶναι δυνατόν νὰ σχηματίσετε ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μεταξύ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν αὐτῶν καὶ τοῦ συνόλου τῶν θέσεών των ;

8. ΤΟΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ

8.1. Ὅρισμός

Εἰς τὸ σύνολον Σ τῶν μαθητῶν τῆς τάξεώς μας οἱ μαθηταὶ Νίκας, Σαμπάνης, Δουζίνας καὶ Σχοινᾶς εἶναι ἀριστοῦχοι εἰς τὰ Ἑλληνικά. Οἱ μαθηταὶ Κυριαζῆς, Κουμαντᾶνος, Νίκας, Δουζίνας καὶ Μανιάτης εἶναι ἀριστοῦχοι εἰς τὰ Μαθηματικά.

Καθὼς παρατηροῦμεν οἱ δύο μαθηταὶ Νίκας καὶ Δουζίνας εἶναι ἀριστοῦχοι καὶ εἰς τὰ δύο μαθήματα : Εἰς τὰ Μαθηματικά καὶ εἰς τὰ Ἑλληνικά. Ἄς διατυπώσωμεν τ' ἀνωτέρω εἰς τὴν γλῶσσαν τῶν συνόλων.

Θέτομεν $A = \{\text{Νίκας, Σαμπάνης, Δουζίνας, Σχοινᾶς}\}$

$B = \{\text{Κυριαζῆς, Κουμαντᾶνος, Νίκας, Δουζίνας, Μανιάτης}\}$

$\Gamma = \{\text{Νίκας, Δουζίνας}\}$

Τὸ σύνολον Γ , τὸ ὁποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ κοινὰ στοιχεῖα τῶν συνόλων A, B καὶ μόνον ἀπὸ αὐτά, λέγεται τομὴ τοῦ συνόλου A μὲ τὸ σύνολον B .

Γράφομεν δέ

$$A \cap B = \Gamma$$

(\cap εἶναι τὸ σύμβολον τῆς τομῆς)

καὶ διαβάζομεν : A τομὴ B ἴσον Γ .


Ἦτοι ἕκαστον στοιχεῖον τῆς τομῆς $A \cap B$ ἀνήκει εἰς τὸ A καὶ εἰς τὸ B .

Ἦ συμβολικῶς :


$$A \cap B = \{x/x \in A \text{ καὶ } x \in B\}$$

Ἀπὸ τὸν ὅρισμόν τῆς τομῆς ἐννοοῦμεν ὅτι :


$$A \cap B \subseteq A \quad \text{καὶ} \quad A \cap B \subseteq B,$$



(α)



(β)



(γ)

Σχ. 4.

8.2. Ίδιότητες τῆς τομῆς

α) Μεταθετική

Ἀπὸ τὸν ὄρισμὸν τῆς τομῆς ἐννοοῦμεν ὅτι

$$A \cap B = B \cap A.$$

Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἰς τὴν εὔρεσιν τῆς τομῆς δυὸ συνόλων δὲν ἔχει σημασίαν ἡ σειρά (διάταξις) κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ λάβωμεν τὰ δύο αὐτὰ σύνολα. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ τομὴ δύο συνόλων εἶναι πρᾶξις μεταθετικῆ ἢ κατ' ἄλλον τρόπον, ἔχει τὴν μεταθετικὴν ιδιότητα.

β) Προσεταιριστική

Εἰς τὰ προηγούμενα ὥρισάμεν τὴν τομὴν δυὸ συνόλων. Τί θὰ ὀνομάσωμεν τομὴν τριῶν συνόλων κατὰ σειράν A, B, Γ ;

Τομὴν τριῶν συνόλων, κατὰ τὴν σειράν A, B, Γ ὀνομάζομεν τὸ σύνολον, τὸ ὁποῖον προκύπτει, ἐὰν σχηματίσωμεν: α) τὴν τομὴν τῶν συνόλων A καὶ B , $A \cap B$, καὶ β) τὴν τομὴν τοῦ συνόλου $A \cap B$ μὲ τὸ σύνολον Γ .

* Καθὼς βλέπομεν χάρις εἰς τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ κενοῦ συνόλου κατέστη δυνατὴ ἡ τομὴ δύο συνόλων ξένων μεταξύ των.

Παραδείγματα

α) Ἐὰν $A = \{1, 2, 3, 4\}$ καὶ $B = \{0, 1, 2, 5\}$,

τότε $A \cap B = \{1, 2\}$.

Ἡ τομὴ αὕτη εἰς τὸ σχ. 4α παριστάνεται ὑπὸ τῆς σκιερᾶς ἐπιφανείας.

β) Ἐὰν $A = \{1, 2, 3, 4\}$ καὶ $B = \{1, 2\}$,

τότε $A \cap B = \{1, 2\}$

Ἡ τομὴ αὕτη εἰς τὸ σχ. 4β παριστάνεται ὑπὸ τῆς σκιερᾶς ἐπιφανείας.

γ) Ἐὰν $A = \{1, 2, 3\}$ καὶ $B = \{4, 5\}$, τότε παρατηροῦμεν ὅτι τὰ A καὶ B οὐδὲν κοινὸν στοιχεῖον ἔχουν.

Συνεπῶς $A \cap B = \emptyset$. (σχ. 4γ.)

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὕτην λέγομεν ὅτι τὰ σύνολα A καὶ B εἶναι ξένα* μεταξύ των,

Γράφομεν δὲ

$$(A \cap B) \cap \Gamma.$$

* Ἦτοι διὰ τὴν εὐρεσιν τῆς τομῆς τῶν τριῶν συνόλων, κατὰ τὴν σειράν A, B, Γ, ὅπου $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ καὶ $\Gamma = \{2, 4, 6, 8\}$ ἐκτελοῦμεν κατὰ σειράν τὰς ἀκολουθοῦσας δύο πράξεις:

$$A \cap B = \{2, 3\},$$

$$(A \cap B) \cap \Gamma = \{2, 3\} \cap \{2, 4, 6, 8\} = \{2\}$$

ὥστε

$$(A \cap B) \cap \Gamma = \{2\} \quad (1)$$

* Ἄς εὐρωμεν ἤδη καὶ τὴν τομὴν τῶν δύο συνόλων A καὶ $B \cap \Gamma$.

ἔχομεν:

$$B \cap \Gamma = \{2, 4\},$$

$$A \cap (B \cap \Gamma) = \{1, 2, 3\} \cap \{2, 4\}$$

ἢ

$$A \cap (B \cap \Gamma) = \{2\} \quad (2)$$

* Ἀπὸ τὰς (1) καὶ (2) ἔχομεν ὅτι:

$$(A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma) \quad (3)$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ τομὴ τῶν συνόλων ἔχει τὴν προσεταιριστικὴν ἰδιότητα. Ἡ ὅτι εἶναι πράξις προσεταιριστικῆ.

ὥστε ἡ τομὴ συνόλων ἔχει τὰς ιδιότητες:

1. Μεταθετικὴν

$$A \cap B = B \cap A$$

2. Προσεταιριστικὴν

$$(A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma)$$

Σημειώσεις

1) Μὲ συνδυασμὸν τῆς προσεταιριστικῆς καὶ τῆς μεταθετικῆς ιδιότητος εὐρίσκομεν ὅτι ἡ τομὴ τῶν τριῶν συνόλων δὲν ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς σειρᾶς αὐτῶν.

Π.χ. $(A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma)$ Προσεταιρ. ιδιότης

$$= A \cap (\Gamma \cap B) \quad \text{Μεταθετικῆ.}$$

$$= (A \cap \Gamma) \cap B \quad \text{Προσεταιριστικῆ.}$$

2) Ἐὰν ζητοῦμεν τὴν τομὴν περισσοτέρων συνόλων, εὐρίσκομεν τὴν τομὴν τῶν τριῶν πρώτων, ἔπειτα τὴν τομὴν τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ μὲ τὸ τέταρτον σύνολον κ.ο.κ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

16. Νὰ εὐρεθοῦν αἱ τομαὶ $A \cap B$, $A \cap \Gamma$, $(A \cap \Gamma) \cap B$, ὅπου $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{\chi \mid \chi \text{ γράμμα τῆς λέξεως « δια »}\}$ καὶ $\Gamma = \{\chi \mid \chi \text{ φωνῆεν}\}$ καὶ νὰ παρασταθοῦν μὲ διαγράμματα.

17. Ἐπαληθεύσατε ὅτι $(A \cap B) \cap \Gamma = (\Gamma \cap A) \cap B$
(Χρησιμοποιήσατε ἰδικὰ σας σύνολα).

18) Νὰ εὐρεθῆ ἡ τομὴ $A \cap \phi$, ὅπου A εἶναι τυχὸν σύνολον.

Ἐὰν $A \cap B = \phi$, τί συνάγετε διὰ τὰ σύνολα A καὶ B; Ὁμοίως ἐὰν $A \cap B = B$.

* Ἡ παρένθεσις δηλοῖ ὅτι θὰ εὐρεθῆ πρῶτον ἡ τομὴ τῶν συνόλων A καὶ B.

9.1. Όρισμός

Ας επανέλθωμεν εἰς τὰ σύνολα $A = \{\text{Νίκας, Σαμπάνης, Δουζίνας, Σχοινᾶς}\}$ καὶ $B = \{\text{Κυριαζῆς, Κουμαντᾶνος, Νίκας, Δουζίνας, Μανιάτης}\}$. Ἦτοι εἰς τὰ σύνολα τῶν ἀριστούχων μαθητῶν τῆς τάξεώς μας εἰς τὰ Ἑλληνικά (σύνολον Α) καὶ εἰς τὰ Μαθηματικά (σύνολον Β). Ἐάν ζητήσωμεν τὸ σύνολον Γ, τῶν ἀριστούχων μαθητῶν τῆς τάξεώς μας εἰς τὰ Ἑλληνικά ἢ εἰς τὰ Μαθηματικά ἢ εἰς ἀμφοτέρωθ' αὐτὰ θὰ ἔχωμεν :

$\Gamma = \{\text{Νίκας, Σαμπάνης, Δουζίνας, Σχοινᾶς, Κυριαζῆς, Κουμαντᾶνος, Μανιάτης}\}$.

Τὸ σύνολον Γ, τὸ ὁποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῶν συνόλων Α καὶ Β καὶ μόνον ἀπ' αὐτά, λέγεται ἔνωσις** τοῦ συνόλου Α μὲ τὸ σύνολον Β.

Γράφομεν δὲ

$$A \cup B = \Gamma \quad (\cup \text{ εἶναι τὸ σύμβολον τῆς ἐνώσεως)}$$

καὶ διαβάζομεν : Α ἔνωσις Β ἴσον Γ.

Κατὰ τὸν ὅρισμόν ἡ ἔνωσις $A \cup B$ δύναται νὰ ἐκφρασθῇ καὶ ὡς ἑξῆς δια τῶν στοιχείων τῶν συνόλων Α καὶ Β.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ εἴτε} *** x \in B\}$$

Ἐπίσης ἀπὸ τὸν ὅρισμόν τῆς ἐνώσεως ἐννοοῦμεν ὅτι :

$$A \subseteq A \cup B \quad \text{καὶ} \quad B \subseteq A \cup B$$

* Ἐννοεῖται ἐνταῦθα ὡς βασικὸν σύνολον τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς τάξεώς μας.

** Ἐννοεῖται ὅτι ἕκαστον κοινὸν στοιχεῖον τῶν Α καὶ Β δὲν ἐμφανίζεται δύο φορές εἰς τὴν ἔνωσιν.

*** Τὸ «εἴτε» σημαίνει εἰς τὸ Α ἢ εἰς τὸ Β ἢ εἰς ἀμφοτέρωθ'.

Παραδείγματα :

Έάν $A = \{2, 3, 4\}$ και $B = \{3, 4, 5, 6\}$, τότε $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$. Είς τὸ σχ. 5 ἡ ἔνωσις αὕτη παριστάνεται ὑπὸ τῆς σκιερᾶς ἐπιφανείας.

β) Έάν $A = \{2, 3, 4\}$ και $B = \{5, 6\}$, τότε $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ (Σχ. 7).

γ) Έάν $A = \{2, 3, 4\}$ και $B = \{2, 3\}$, τότε $A \cup B = \{2, 3, 4\} = A$ (Σχ. 6)

9.2. Ἰδιότητες

α) Μεταθετικὴ

Εἶναι φανερόν ὅτι :

$A \cup B = B \cup A$ Μεταθετικὴ ιδιότης

β) Προσεταιριστικὴ

Ὅπως και εἰς τὴν τομὴν, ἔνωσις τριῶν συνόλων κατὰ σειρὰν, A, B, Γ , λέγεται ἡ ἔνωσις τῶν δύο συνόλων $A \cup B$ και Γ . Έάν συνεπῶς εἶναι :

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ και $\Gamma = \{3, 4, 5\}$, τότε θὰ ἔχωμεν

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$(A \cup B) \cup \Gamma = \{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5\}$$

$$\tilde{\eta} \quad (A \cup B) \cup \Gamma = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad (1)$$

Εἶναι ὁμως :

$$B \cup \Gamma = \{2, 3, 4, 5\}$$

$$\text{και} \quad A \cup (B \cup \Gamma) = \{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4, 5\}$$

$$\tilde{\eta} \quad A \cup (B \cup \Gamma) = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad (2)$$

Έκ τῶν ἰσοτήτων (1) και 2) ἔχομεν ὅτι :


$$(A \cup B) \cup \Gamma = A \cup (B \cup \Gamma)$$

Ἦτοι ἡ ἔνωσις συνόλων εἶναι πράξις προσεταιριστικὴ.


γ) Οὐδέτερον στοιχεῖον

Τὸ κενὸν σύνολον ἔχει ἓνα ἰδιαίτερον ρόλον εἰς τὴν πράξιν τῆς ἐνώσεως. Εἶναι


$$A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A.$$



Σχ. 5.



Σχ. 6.



Σχ. 7.

Διὰ τοῦτο τὸ κενὸν σύνολον λέγεται οὐδέτερον στοιχείου εἰς τὴν ἔνωση συνόλων.

(Ὡστε ἡ ἔνωσις συνόλων ἔχει τὰς ιδιότητες :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Μεταθετικὴν | $A \cup B = B \cup A$ |
| 2. Προσεταιριστικὴν | $(A \cup B) \cup \Gamma = A \cup (B \cup \Gamma)$ |
| 3. Οὐδέτερον στοιχείου | $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$ |

Ποίας ἐκ τῶν ἀνωτέρω ιδιοτήτων ἔχει ἡ τομὴ συνόλων ;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

19. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ ἔνώσεις : $\{1,2,5\} \cup \{2,4,6\}$, $\{1,3,4\} \cup \{2,5,6\}$

20. Νὰ ἐπαληθεύσετε ὅτι $A \cup (\Gamma \cap B) = (A \cup \Gamma) \cap B$

Χρησιμοποιήσατε ἰδικὰ σας σύνολα

21. Ἐὰν $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4,5\}$ καὶ $\Gamma = \{0,1,2\}$ νὰ ἐξετάσετε, ἐὰν ἰσχύη ἡ σχέσηις

$$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma).$$

22. Ἐὰν διὰ τρία σύνολα A, B, Γ εἶναι $A \cup B \subset \Gamma$, ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξύ τῶν A καὶ Γ ἢ B καὶ Γ .

23. Νὰ ἐπαληθεύσετε τὰς σχέσεις : $A \cup (A \cap B) = A$ καὶ $A \cap (A \cup B) = A$ μὲ ἰδικὰ σας σύνολα.

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (ἢ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ) ΣΥΝΟΛΟΥ

10.1 Ὅρισμός

Ἄς λάβωμεν ὡς βασικὸν σύνολον Ω τὸ σύνολον τῶν γραμμάτων τῆς ἀλφάβητου μας καὶ ἄς ὀρίσωμεν ἐν ὑποσύνολον αὐτοῦ : Τὸ σύνολον A τῶν φωνηέντων. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ὀρίζεται καὶ ἐν ἄλλο σύνολον B : Τὸ σύνολον τῶν συμφώνων. Ἦτοι τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ Ω , τὰ ὅποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ A . Τὸ σύνολον B λέγεται συμπλήρωμα (ἢ συμπληρωματικόν) τοῦ συνόλου A ὡς πρὸς βασικὸν σύνολον Ω .

Γενικῶς : Συμπλήρωμα συνόλου A ὡς πρὸς βασικὸν σύνολον Ω λέγεται τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ Ω , τὰ ὅποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ A .

Τὸ συμπλήρωμα τοῦ συνόλου A ὡς πρὸς τὸ βασικὸν σύνολον Ω σημειώνεται A' .

Ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω ὀρισμὸν τοῦ συμπληρώματος τοῦ συνόλου A ὡς πρὸς βασικὸν σύνολον Ω , ἔχομεν :

$$\boxed{A \cap A' = \emptyset} \quad \text{καὶ} \quad \boxed{A \cup A' = \Omega}$$

10.2 Γραφικὴ παράστασις

Ἡ γραφικὴ παράστασις τοῦ συμπληρώματος A' ἐνὸς συνόλου A ὡς πρὸς

βασικόν σύνολον Ω ἀποδίδεται εἰς τὸ σχ. 8. (Σκιερὰ ἐπιφάνεια).

Εἶναι τὸ μέρος, τὸ ὁποῖον ἀπομένει ἀπὸ τὸ διάγραμμα τοῦ Ω , ὅταν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέρος, τὸ ὁποῖον παριστάνει τὸ A .

Παράδειγμα : Ἐὰν λάβωμεν ὡς βασικόν σύνολον Ω τὸ σύνολον $\{2,3,4,5,6\}$ καὶ τὸ σύνολον $A = \{2,3\}$, τότε τὸ συμπλήρωμα τοῦ A ὡς πρὸς τὸ Ω εἶναι τὸ $A' = \{4,5,6\}$. (Σχ. 9).

Α Σ Κ Η Σ Ι Σ

24. Ἐὰν $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, νὰ εὑρετὲ τὸ συμπλήρωμα : α) A' τοῦ $A = \{1, 3\}$ β) Τοῦ ϕ . γ) Ἐκάστου διμελούς ὑποσυνόλου τοῦ Ω .

11. ΖΕΥΓΟΣ

Προσέξατε εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα τοῦ σχ. 10.

Πῶς θὰ ὀρίσωμεν τὴν θέσιν τοῦ A ;

Θὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ A εὐρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς 3ης σειρᾶς καὶ τῆς 2ας στήλης. Θέσις τοῦ A : 3η σειρὰ καὶ 2α στήλη. Ἡ συντόμως $A (3,2)$. Ἦτοι εἰς τὴν παράστασιν $(3,2)$ ὁ α' ὄρος, τὸ 3, παριστάνει τὸν ἀριθμὸν σειρᾶς καὶ ὁ β' ὄρος, τὸ 2, τὸν ἀριθμὸν στήλης. Ἐὰν μεταβάλωμεν τὴν σειρὰν τῶν ὄρων τῆς παρενθέσεως, δὲν ὀρίζομεν πλέον τὴν θέσιν τοῦ A ἀλλὰ τοῦ B .

Θέσις τοῦ B : 2α σειρὰ 3η στήλη ἢ συντόμως $B (2, 3)$. Καταστάσεις ὡς ἡ ἀνωτέρω μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὴν χρησιμοποίησιν διμελῶν συνόλων, τῶν ὁποίων τὰ στοιχεῖα ἔχουν ὠρισμένην σειρὰν μεταξύ των.

Τὸ σύνολον δύο στοιχείων α, β , ἐκ τῶν ὁποίων τὸ α πρῶτον καὶ τὸ β δεύτερον, λέγεται διατεταγμένον ζεύγος ἢ συντόμως ζεύγος.

Γράφομεν δὲ (α, β) .

Ἦτοι ἡ γραφὴ $(3,2)$ παριστάνει ἓν ζεύγος με πρῶτον στοιχεῖον τὸ 3 καὶ δεύτερον τὸ 2. Δὲν ἀποκλείεται τὰ στοιχεῖα ἐνὸς ζεύγους νὰ εἶναι ἴσα. Π.χ. διὰ τὴν θέσιν Δ ἔχομεν τὸ ζεύγος $(2,2)$. Κατὰ τὰ ἀνωτέρω :


1) Ἀπὸ ἓν διμελὲς σύνολον $\{\alpha, \beta\}$ γεννῶνται δύο ζεύγη τὰ (α, β) καὶ (β, α) .

2) Εἶναι $(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta)$, ὅταν καὶ μόνον ὅταν $\alpha = \gamma$ καὶ $\beta = \delta$.


Ἦτοι $(\alpha, \beta) \neq (\beta, \alpha)$ ἐκτὸς ἐὰν $\alpha = \beta$.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

25. Εἰς τὸν πίνακα τοῦ σχεδίου 10 νὰ προσδιορίσετε τὰς θέσεις τῶν σημείων Γ, E με ζεύγη. Εἰς τὸν αὐτὸν πίνακα νὰ εὑρετὲ ποῖα τετραγωνίδια ὀρίζουν τὰ ζεύγη $(1,2), (2,1), (1,1), (2,2)$.



Σχ. 8.



Σχ. 9.

0	1	2	3	4
1				
2		Δ	Β	Γ
3		Α	Ε	
4				

Σχ. 10.

26. Ποιαί ἐκ τῶν σχέσεων: $x = \{x\}$, $x \in \{x\}$, $x \neq \{x\}$ εἶναι ἀληθεῖς;
27. Ἐάν $\alpha \neq \beta$ καὶ $\chi \neq \psi$, τότε δικαιολογήσατε τὴν συνεπαγωγὴν
 $\{\alpha, \chi\} \neq \{\beta, \psi\} \Rightarrow (\alpha \neq \beta \text{ καὶ } \chi \neq \psi)$
28. Διατί $A \not\subseteq B \Rightarrow A \not\subset B$
29. Ἀπὸ τὸν σύνολον $A = \{1, 2, 3, 4\}$ πόσα γνήσια ὑποσύνολα σχηματίζονται;
30. Ἐάν $A \subseteq \emptyset$, τότε δείξατε ὅτι $A = \emptyset$
31. Νὰ ἐξετασθῇ ἐάν ἀληθεύει ἡ σχέση $(A \cap B) \cup \Gamma = (A \cup \Gamma) \cap (B \cup \Gamma)$
32. Ποία ζεύγη δύνασθε νὰ σχηματίσετε μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου $\{1, 2, 3\}$;

Π Ι Ν Α Κ Σ

Τῶν κυριωτέρων συμβολισμῶν

$\alpha \in A$: Τὸ στοιχεῖον α ἀνήκει	εἰς τὸ σύνολον A
$\alpha \notin A$: » » δὲν ἀνήκει » » »	A
$\{ \}$: Ἐγκιστρον διὰ τὴν παράστασιν συνόλου	
$\chi : \chi \dots$: χ ὅπου $\chi \dots \dots$	
$\chi \chi \dots$: » » »	
\emptyset	: τὸ κενὸν σύνολον	
$A \subseteq B$: A εἶναι ὑποσύνολον τοῦ B	
$A \subset B$: A » γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ B	
\Rightarrow	: Τὸ σύμβολον τῆς συνεπαγωγῆς	
\Leftrightarrow	: » » » διπλῆς συνεπαγωγῆς.	
$A \cap B$: A τομὴ B	
$A \cup B$: A ἔνωσις B	
Ω	: Βασικὸν σύνολον	

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

12. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

12. 1. 'Επί τῆς ἔδρας τοποθετοῦμεν ἀντικείμενον α . 'Επειτα ἄλλο β , ἄλλο γ , κ.ο.κ. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν σχηματίζονται κατὰ σειράν τὰ σύνολα

$$\begin{aligned} & \{ \alpha \} \\ & \{ \alpha, \beta \} \\ & \{ \alpha, \beta, \gamma \} \quad \text{κ.ο.κ.} \end{aligned}$$

'Εάν προσέξωμεν τὸ σύνολον $\{ \alpha \}$ καὶ ὅλα τὰ πρὸς αὐτὸ ἰσοδύναμα:

π.χ. $\{ +, -, \times \} \dots$

γεννᾶται εἰς τὴν σκέψιν μας ἡ ἰδέα τοῦ ἀριθμοῦ $\bar{1}$.

'Απὸ τὸ σύνολον $\{ \alpha, \beta \}$ καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἰσοδύναμά του,

π.χ. $\{ *, +, \cdot, 0, \Delta, \times, \Psi \} \dots$

γεννᾶται εἰς τὴν σκέψιν μας ἡ ἰδέα τοῦ ἀριθμοῦ $\bar{2}$. Ὁμοίως ἀπὸ τὸ σύνολον $\{ \alpha, \beta, \gamma \}$ καὶ ὅλα τὰ ἰσοδύναμα πρὸς αὐτὸ, ἡ ἰδέα τοῦ ἀριθμοῦ $\bar{3}$ κ.ο.κ.

Οἱ ἀριθμοὶ $\bar{1}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$, ... δηλοῦν συγχρόνως τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων ἐκάστου τῶν ἀνωτέρω συνόλων. Διὰ τοῦτο λέγονται **πληθικοὶ ἀριθμοὶ** τοῦ τ ω ν . Π.χ. πληθικὸς ἀριθμὸς τοῦ συνόλου $\{ \alpha, \beta \}$ ὡς καὶ ἐκάστου τῶν ἰσοδυναμῶν πρὸς αὐτὸ συνόλων εἶναι ὁ ἀριθμὸς $\bar{2}$. Ὁμοίως, πληθικὸς ἀριθμὸς τοῦ συνόλου $\{ \alpha, \beta, \gamma \}$ καὶ ἐκάστου τῶν ἰσοδυναμῶν πρὸς αὐτὸ συνόλων, εἶναι ὁ ἀριθμὸς $\bar{3}$.

12.2 Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\begin{aligned} \{ \alpha \} \cup \{ \beta \} &= \{ \alpha, \beta \} \\ \{ \alpha, \beta \} \cup \{ \gamma \} &= \{ \alpha, \beta, \gamma \} \\ \{ \alpha, \beta, \gamma \} \cup \{ \delta \} &= \{ \alpha, \beta, \gamma, \delta \} \quad \text{κ.ο.κ.} \end{aligned}$$

'Ἦτοι τὸ σύνολον $\{ \alpha, \beta \}$ παράγεται ἀπὸ τὴν ἔνωσιν τοῦ προηγουμένου του συνόλου $\{ \alpha \}$ μὲ τὸ ξένον πρὸς αὐτὸ σύνολον $\{ \beta \}$. Ὁμοίως τὸ σύνολον $\{ \alpha, \beta, \gamma \}$ παράγεται ἀπὸ τὴν ἔνωσιν τοῦ συνόλου $\{ \alpha, \beta \}$ μὲ τὸ ξένον πρὸς αὐτὸ σύνολον $\{ \gamma \}$ κ.ο.κ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι καὶ ἕκαστος ἐκ τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4, ... προκύπτει ἐκ τοῦ προηγούμενου του 1, 2, 3, ... ἀντιστοίχως, ἐὰν οὗτος ἀυξηθῆ κατὰ τὸν ἀριθμὸν ἓνα (1). Εἶναι φανερόν ὅτι μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν δυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν ἀπεριορίστως καὶ νὰ σχηματίσωμεν τὴν σειρὰν τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν.

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Ἡ σειρὰ αὕτη ἔχει ἓν ἀρχικὸν στοιχεῖον καὶ οὐδὲν τελευταῖον. Τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν τὸ παριστάνομεν μὲ τὸ γράμμα N .

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

13. ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΙΣ

13.1 Ἐκ τοῦ συνόλου τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ σχηματίζομεν τὰ ὑποσύνολα

$$N_1 = \{1\}$$

$$N_2 = \{1, 2\}$$

$$N_3 = \{1, 2, 3\} \quad \text{κ.ο.κ.}$$

Καθὼς παρατηροῦμεν, τὸ τελευταῖον στοιχεῖον (ἀριθμὸς) ἑκάστου ἐκ τῶν συνόλων N_1, N_2, N_3, \dots εἶναι καὶ ὁ πληθικὸς ἀριθμὸς αὐτοῦ.

13.2 Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων ἑνὸς συνόλου π.χ. τοῦ συνόλου $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, λέγομεν ἓν, δύο, τρία, τέσσαρα, δεικνύοντες ἓν πρὸς ἓν τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ μέχρις ὅτου τελειώσωμεν. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἀντιστοιχίζομεν ἀμφιμονοσημάντως τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου A μὲ τὰ στοιχεῖα ἑνὸς ἐκ τῶν ὑποσυνόλων N_1, N_2, N_3, \dots τοῦ N καὶ συγκεκριμένως εἰς τὴν περίπτωσίν μας τοῦ N_4 .

$$A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$$

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Ὁ 4, τελευταῖος ἀριθμὸς τοῦ N_4 εἶναι ὁ πληθικὸς ἀριθμὸς τοῦ συνόλου A .

Ἡ εὕρεσις τοῦ πληθικοῦ ἀριθμοῦ ἑνὸς συνόλου λέγεται ἀπαρίθμησις τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου τούτου.

14. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ

14.1 Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου $A = \{\chi|\chi \text{ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος}\}$ εἶναι φανερόν ὅτι δύνανται νὰ τεθοῦν εἰς ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μὲ τὸ ἀρχικὸν ἀπόκομμα

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

τῆς σειρᾶς τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν.

Τὸ σύνολον A καὶ γενικῶς ἕκαστον σύνολον, τοῦ ὁποῖου τὰ στοιχεῖα δύναν-

ται να τεθοῦν εἰς ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μὲ τὰ στοιχεῖα ἑνὸς ἀρχικοῦ ἀποκόμματος τῆς σειρᾶς τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, λέγομεν ὅτι ἔχει πεπερασμένον πληθὸς στοιχείων ἢ ὅτι εἶναι πεπερασμένον σύνολον.

14.2 Ἄς προσπαθήσωμεν νὰ εὕρωμεν τὸν πληθικὸν ἀριθμὸν τοῦ συνόλου

$$N = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι δὲν δυνάμεθα. Ὅποιον φυσικὸν ἀριθμὸν καὶ ἐὰν σκεφθῶμεν, θὰ ὑπάρχη πάντοτε ὁ ἀμέσως ἐπόμενός του, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι καὶ αὐτὸς στοιχεῖον τοῦ συνόλου N . Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν εἶναι μὴ πεπερασμένον σύνολον ἢ ἀπειροσύνολον.

Παραθέτομεν κατωτέρω ἄλλα παραδείγματα πεπερασμένων καὶ μὴ πεπερασμένων συνόλων.

Πεπερασμένα σύνολα

- 1) Οἱ κάτοικοι τῆς γῆς
- 2) Αἱ λέξεις ἑνὸς ὠρισμένου λεξικοῦ
- 3) Τὰ κυκλοφοροῦντα αὐτοκίνητα

Μὴ πεπερασμένα.

- 1) Οἱ ἄρτιοι ἀριθμοί.
- 2) Οἱ περιττοὶ ἀριθμοί.
- 3) Τὰ σημεῖα μιᾶς εὐθείας.

15. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

15.1 Τὸν πληθικὸν ἀριθμὸν τοῦ κενοῦ συνόλου τὸν καλοῦμεν μηδέν (0). Ἡ ἔνωσις τοῦ συνόλου $\{0\}$ μὲ τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ὀνομάζεται σύνολον τῶν ἀκεραίων τῆς ἀριθμητικῆς.

$$\{0\} \cup \{1, 2, 3, \dots\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Τὸ νέον τοῦτο σύνολον παριστάνομεν συντόμως μὲ N_{II} .

Ἦτοι: $N_{\text{II}} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$


Τὰ σύμβολα μὲ τὰ ὁποῖα παριστάνομεν τοὺς ἀκεραίους λέγονται ψηφία. Εἰδικῶς τὰ ψηφία

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

ὀνομάζονται ἀραβικὰ ψηφία, διότι πρῶτοι οἱ Ἕλληνας ἀραβικοὶ ἔχρησιμοποίησαν καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τὰ παρέλαβον περὶ τὸν 9ον αἰῶνα οἱ λαοὶ τῆς Δύσεως.

15.2 Παράστασις τῶν ἀκεραίων ἐπὶ ἡμιευθείας

Χαράσσομεν ἡμιευθεῖαν Ox καὶ λαμβάνομεν ἐπ' αὐτῆς διαδοχικῶς ἴσα τμήματα OA , AB , BF , $\Gamma\Delta$, ... (σχ. 11).



Τοὺς ἀριθμοὺς $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ τοὺς παριστάνομεν μὲ τὰ σημεῖα O, A, B, Γ, \dots

άντιστοιχως. Διὰ τοῦτο τὰ σημεῖα A, B, Γ... ὀνομάζονται εἰκόνας τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν. Ἡ ἡμιευθεῖα OX λέγεται ἡμιευθεῖα διατάξεως τοῦ συνόλου τῶν ἀκεραίων.

15.3. Συγκεκριμένοι, ἀφηρημένοι, γενικοὶ ἀριθμοὶ

α) Ἀρχικῶς ὁ ἄνθρωπος ἔκανε χρῆσιν μόνον συγκεκριμένων ἀριθμῶν. Π. χ. 1 δένδρον, 2 ζῶα, 3 παιδιὰ...

Ἡ παρατήρησις ὅμως ὅτι

$$\begin{array}{rcl} 2 \text{ δένδρα} + 3 \text{ δένδρα} & = & 5 \text{ δένδρα} \\ 2 \text{ παιδιὰ} + 3 \text{ παιδιὰ} & = & 5 \text{ παιδιὰ} \\ 2 \text{ ζῶα} + 3 \text{ ζῶα} & = & 5 \text{ ζῶα} \end{array}$$

δηλαδὴ ὅτι τὸ πλῆθος τῶν μονάδων τοῦ ἀθροίσματος δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὕλικήν φύσιν ἐκάστου προσθετοῦ ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν μονάδων αὐτοῦ. πιθανῶς ὠδήγησεν εἰς τὴν ιδέαν τῶν ἀφηρημένων ἀριθμῶν.

β) Καθὼς εἶδομεν, διὰ νὰ συμβολίσωμεν τὸ σύνολον τῶν μονοψηφίων φυσικῶν ἀριθμῶν, γράφομεν

$$\{ \chi \chi \text{ μονοψηφίος φυσικὸς ἀριθμὸς} \}$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ χ χρησιμοποιεῖται διὰ νὰ παραστήσῃ ἕνα ὄρισμένον μὲν ἀλλὰ ὁποιοιδήποτε ἐκ τῶν ἀριθμῶν 1,2,3...9.

Γνωρίζομεν ὅτι διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς ὀρθογωνίου πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ. Ὁ ἴδιος κανὼν ἀποδίδεται συντόμως ὑπὸ τοῦ γνωστοῦ τύπου

$$E = \alpha \cdot \beta$$

ὅπου τὰ γράμματα α καὶ β παριστάνουν τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος ὀρθογωνίου. Ἦτοι καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν χρησιμοποιοῦμεν γράμματα διὰ νὰ παραστήσωμεν ὄρισμένους μὲν ἀλλὰ ὁποιοιδήποτε ἀριθμούς. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν λέγομεν ὅτι τὰ γράμματα α καὶ β παριστάνουν γενικοὺς ἀριθμούς.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

33. Τὸ σύνολον A $\{ \chi \chi \text{ μὴν τοῦ ἔτους} \}$ μὲ ποῖον ἐκ τῶν συνόλων N_1, N_2, N_3, \dots εἶναι ἰσοδύναμον; Ποῖος ὁ πλῆθ. ἀριθμὸς αὐτοῦ;
34. Ἀναφέρατε παραδείγματα πεπερασμένων καὶ μὴ πεπερασμένων συνόλων.
35. Νὰ εὕρθουν γνήσια ὑποσύνολα τοῦ N_0 τὰ ὅποια εἶναι ἰσοδύναμα μὲ αὐτό.

16. ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΕΩΣ

16.1 Ἀριθμησις

Καθὼς εἶδομεν, οἱ ἀκέραιοι ἀποτελοῦν μίαν σειρὰν ἀριθμῶν χωρὶς τέλος. Εἶναι δηλαδὴ ἀπειροὶ εἰς πλῆθος. Ἐὰν δι' ἕκαστον ἀκέραϊόν εἶχομεν διαφορετικόν

ὄνομα, ἄσχετον μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἄλλων, θὰ ἐχρειαζόμεθα ἀπείρους λέξεις ἢ καὶ ἀπειρα σύμβολα διὰ νὰ ὀνομάσωμεν καὶ νὰ γράψωμεν αὐτούς. Ἐκτὸς τούτου θὰ ἦτο ἀδύνατος ἡ ἀπομνημόνευσις καὶ χρησιμοποίησις τῶν ἀριθμῶν.

Προέκυψεν οὕτω τὸ ἐξῆς πρόβλημα.

Πῶς εἶναι δυνατόν μὲ συνδυασμὸν ὀλίγων λέξεων καὶ συμβόλων νὰ ὀνομάζωμεν καὶ νὰ γράψωμεν ὅλους τοὺς ἀκεραίους.

Τὴν ἀπάντησιν εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ τὴν δίδει ἡ ἀρίθμησις (προφορικὴ καὶ γραπτὴ).

16.2 Προφορικὴ ἀρίθμησις

Ἡ ἀπαρίθμησις τῶν στοιχείων ἑνὸς συνόλου μᾶς δίδει ἓνα ἀριθμὸν. Θα ἴδωμεν κατωτέρω μὲ ποῖον τρόπον δυνάμεθα νὰ ὀνομάσωμεν τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα.

Ἄς λάβωμεν ἓν σύνολον βῶλων :

α) Ἐὰν οἱ βῶλοι εἶναι ὀλιγώτεροι τῶν δέκα, χρησιμοποιοῦμεν ἓν ἐκ τῶν ἑννέα ὀνομάτων τῶν ἀριθμῶν, ἓν, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἑπτὰ, ὀκτώ, ἑννέα.

β) Ἐὰν οἱ βῶλοι εἶναι περισσότεροι ἀπὸ δέκα, σχηματίζομεν ἐκ τούτων ὅσας δεκάδας βῶλων εἶναι δυνατόν.

Οὕτω ὁ ἀριθμὸς τῶν βῶλων θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ δεκάδας καὶ πιθανῶς ἀπὸ μονάδας, π.χ. 3 μονάδας. Ἐκάστη δεκάς λέγεται μονάς 2ας τάξεως, ἐνῶ ἐκάστη μονάς λέγεται ἀπλῆ μονάς ἢ μονάς 1ης τάξεως.

γ) Ἐὰν τὰ ὑποσύνολα τῶν δεκάδων τὰ ὁποῖα εὗρομεν εἶναι περισσότερα τῶν δέκα, ἐνώνομεν αὐτὰ ἀνὰ δέκα καὶ οὕτω δημιουργεῖται μία νέα μονάς ἢ ἑκατοντάς ἢ μονάς 3ης τάξεως. Αἱ δεκάδες τῶν βῶλων αἱ ὁποῖαι πιθανῶς θὰ μείνουν θὰ εἶναι ὀλιγώτεροι τῶν δέκα, π.χ. 5. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον συνεχίζομεν μέχρις ὅτου αἱ μονάδες ἐκάστης τάξεως αἱ ὁποῖαι θὰ σχηματισθοῦν εἶναι ὀλιγώτεροι τῶν δέκα. Οὕτω, ἐὰν εὗρωμεν π.χ. 7 ἑκατοντάδας, λέγομεν :

7 ἑκατοντάδες, 5 δεκάδες, 3 μονάδες

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμῆσεως :

1) Δέκα μονάδες μιᾶς τάξεως σχηματίζουν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως.

11) Ἐκαστος ἀριθμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ μονάδας διαφόρων τάξεων.

Ἐὰν ὑπάρχουν πολλοὶ τάξεις, τὰς χωρίζομεν διαδοχικῶς, ἀνὰ τρεῖς, εἰς κλάσεις, ὅπως φαίνεται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα.

Τάξις	Όνόματα τάξεων	Γραφή με ψηφία	Κλάσεις
1η	Ἀπλῆ μονάς	1	1η κλάσις (μονάδων)
2α	Δεκάς	10	
3η	Ἐκατοντάς	100	
4η	Χιλιάς	1000	2α κλάσις (χιλιάδων)
5η	Δεκάς χιλιάδων	10000	
6η	Ἐκατοντάς χιλιάδων	100000	
7η	Ἐκατομμύριον	1000000	3η κλάσις (ἑκατομμυρίων)
8η	Δεκάς ἑκατομμυρίων	10000000	
9η	Ἐκατοντάς ἑκατομμυρίων	100000000	

Βάσις ἐνὸς συστήματος ἀριθμήσεως εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν μονάδων τὰς ὁποίας πρέπει νὰ λάβωμεν διὰ νὰ δημιουργήσωμεν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. Ἡ βάσις ἐνὸς συστήματος δύναται νὰ εἶναι δέκα, ὅπως εἰς τὰ ἀνωτέρω, 5 (πενταδικὸν σύστημα), 12 (δωδεκαδικὸν σύστημα) κ.ο.κ..

16.3. Γραπτὴ ἀρίθμησης

Διὰ νὰ γράψωμεν ἕνα ἀριθμὸν εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀπαιτοῦνται ἐν ὄλῳ δέκα διαφορετικὰ σύμβολα. Μὲ τὰ ἀραβικὰ ψηφία

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

γράφωμεν τοὺς ἀριθμοὺς ἀκολουθοῦντες τὰς ἐξῆς συμφωνίας.

α) Ἐκαστος ἀκέραιος γράφεται μὲ ἐν ἢ περισσότερα ψηφία τὰ ὅποια τίθενται τὸ ἐν παραπλευρῶς τοῦ ἄλλου. Ἐκαστὸν ψηφίον ἀναλόγως τῆς θέσεως τοῦ παριστάνει μονάδας μιᾶς τάξεως. Τὸ πρῶτον ψηφίον δεξιὰ παριστάνει μονάδας 1ης τάξεως (ἀπλᾶς μονάδας) ἕκαστον δὲ ψηφίον, τὸ ὅποιον γράφεται ἀμέσως ἀριστερὰ ἄλλου ψηφίου, παριστάνει μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως.

β) Ὄταν δὲν ὑπάρχουν μονάδες μιᾶς τάξεως, τοποθετοῦμεν εἰς τὴν θέσιν των τὸ μηδέν.

Π.χ. διὰ τὸ σύνολον τῶν βῶλων τοῦ παραδείγματος ἀντὶ 7 ἑκατοντάδες, 5 δεκάδες,, 3 μονάδες γράφωμεν 753.

17. Ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐχρησιμοποιοῦν τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμήσεως ἀλλ' ἀντὶ τῶν ἀραβικῶν συμβόλων μετεχειρίζοντο τὰ γράμματα τῆς ἀλφάβητου καὶ τὰ σύμβολα Ϛ (στίγμα), ϙ (κόππα) καὶ ϛ (σαμπί).

Ούτω διὰ τὰς ἀπλᾶς μονάδας	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
εἶχον τὰ σύμβολα	α' β' γ' δ' ε' ς' ζ' η' θ'	ἀντιστοιχῶς.
διὰ τὰς δεκάδας	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90	
τὰ σύμβολα	ι', κ', λ', μ', ν', ξ', ο', π', ς'	
διὰ τὰς ἑκατοντάδας	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900	
τὰ σύμβολα	ρ', σ', τ', υ', φ', χ', ψ', ω', ς'	

Διὰ τὰς χιλιάδας μετεχειρίζοντο τὰ ἴδια γράμματα ἀλλὰ μὲ τόνον ἀριστερὰ καὶ κάτω.

Π. χ. ἀντὶ τῶν	1000	2000	3000	
εἶχον τὰ σύμβολα	,α.	,β	,γ	ἀντιστοιχῶς

Ἡ γραφή τῶν ἄλλων ἀκεραίων γίνεται μὲ τὴν συμφωνίαν :

«Ὁ ἀριθμὸς ὁ ὁποῖος σχηματίζεται, ὅταν γράψωμεν γράμματα εἰς τὴν σειρὰν, παριστάνει τὸ ἄθροισμα τῶν μονάδων ὅλων τῶν ψηφίων».

Π. χ.	ια' σημαίνει	$10 + 1 = 11$
	ξη' σημαίνει	$60 + 8 = 68$

Ὁ ἀριθμὸς 1821 γράφεται ,αωκα'

18. Η ΡΩΜΑΙΟΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οἱ Ρωμαῖοι ἐχρησιμοποιοῦν ἐπίσης τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμῆσεως καὶ ἔγραφον τοὺς ἀριθμοὺς χρησιμοποιοῦντες ὡς ψηφία τὰ γράμματα

	I, V, X, L, C, D, M	
ἀντὶ τῶν	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000	ἀντιστοιχῶς

Διὰ τὴν γραφὴν τῶν ἄλλων ἀριθμῶν εἶχον τοὺς ἑξῆς κανόνας.

α) Ὅμοια γράμματα, ὅταν γραφοῦν τὸ ἓν παραπλευρῶς τοῦ ἄλλου, προστίθενται

Π. χ.	XX	$10 + 10 = 20$
	CCC	$100 + 100 + 100 = 300$

β) Ὅταν ἓν γράμμα γράφεται ἀριστερὰ μεγαλύτερου τοῦ ἀφαιρεῖται ἀπὸ αὐτό, ἀντιθέτως ὅταν γράφεται δεξιὰ μεγαλύτερου τοῦ, προστίθεται

Π. χ.	IV	4	XL	40	XC	90
	VI	6	LX	60	CCXVI	216

γ) Ἐκαστον ψηφίον τοποθετημένον μεταξύ δύο ἄλλων μεγαλύτερων του ἀφαιρείται ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται δεξιὰ του καὶ ἡ διαφορὰ προστίθεται εἰς τὸ ἀριστερὸν ψηφίον

$$\text{Π.χ} \quad \text{XIV} \quad 10 \cdot (5 - 1) \quad 14.$$

δ) Ὄταν ἐν γράμμα ἔχη μίαν ὀριζοντίαν γραμμὴν ἐπάνω παριστάνει χιλιάδας, δύο γραμμὰς ἑκατομμύρια κ.ο.κ.

$$\overline{\overline{\tau}} \quad 5.000 \quad \overline{\overline{\text{XIX}}} \quad 19.000.000$$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

36. α) Πόσας μονάδας, δεκάδας, ἑκατοντάδας ἔχει ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν 200, 8.000, 32.000, 1.000.000 ; β) Πόσους διψηφίους, τριψηφίους ἀριθμούς δύνασθε νὰ γράψετε μὲ ψηφίον μονάδος 3 ;

37. Νὰ εὑρετε ἓνα διψήφιον ἀριθμὸν τοιοῦτον ὥστε, ἐὰν παρεμβάλωμεν τὸ 0 μεταξύ τῶν ψηφίων του, νὰ αὐξηθῇ κατὰ 4 ἑκατοντάδας καὶ νὰ ἐλαττωθῇ κατὰ 4 δεκάδας.

38. Γράψατε διαφόρους διψηφίους ἀριθμούς καὶ ἔπειτα ἐναλλάξατε εἰς ἕκαστον τούτων τὸ ψηφίον τῶν μονάδων μὲ τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων. Τί παρατηρεῖτε διὰ τὴν μεταβολὴν τῶν ἀριθμῶν τούτων ;

39) Νὰ γράψετε μὲ ἀραβικὰ ψηφία τοὺς ἀριθμούς κγ', ρογ', σακκ', XC, CLX, MCCX, MXX.

19. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

19.1 Ἴσοι καὶ ἄνισοι ἀριθμοὶ

Ὄταν εἰσέλθωμεν εἰς ἓν λεωφορεῖον καὶ παρατηρήσωμεν τὰ δύο σύνολα, «ἐπιβάται» καὶ «καθίσματα» αὐτοῦ, εἶναι δυνατόν νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι :

I. Οἱ ἐπιβάται εἶναι ὅσοι καὶ τὰ καθίσματα. Ἦτοι τὸ πεπερασμένον σύνολον «ἐπιβάται» εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὸ πεπερασμένον σύνολον «καθίσματα».

II. Ἐκαστος ἐπιβάτης κατέχει ἓν κάθισμα καὶ μένουσιν κενὰ καθίσματα.

III. Ὑπάρχει εἰς ἕκαστον κάθισμα εἰς ἐπιβάτης καὶ ἐπὶ πλέον ὄρθιοι ἐπιβάται.

Ἐὰν παραστήσωμεν μὲ α τὸν πληθικὸν ἀριθμὸν τοῦ συνόλου «ἐπιβάται» καὶ μὲ β τὸν πληθικὸν ἀριθμὸν τοῦ συνόλου «καθίσματα», τότε :

Εἰς τὴν 1ην περίπτωσιν λέγομεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β εἶναι ἴσοι μεταξύ των καὶ γράφομεν $\alpha = \beta$

Εἰς τὴν 2αν περίπτωσιν λέγομεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς α εἶναι μικρότερος τοῦ β καὶ γράφομεν $\alpha < \beta$.

Εἰς τὴν 3ην περίπτωσιν λέγομεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς α εἶναι μεγαλύτερος τοῦ β καὶ γράφομεν $\alpha > \beta$.

Εἰς τὰς δύο τελευταίας περιπτώσεις οἱ ἀριθμοὶ εἶναι μεταξύ των ἄνισοι

Είναι φανερόν ὅτι, ἐὰν δοθοῦν οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β , μία καὶ μόνον μία ἀπὸ τὰς τρεῖς ἀνωτέρω σχέσεις θὰ ἰσχύη.

Γενικῶς: α) Δύο ἀριθμοὶ α, β λέγονται ἴσοι, ὅταν εἶναι πληθικοὶ ἀριθμοὶ ἰσοδυνάμων πεπερασμένων συνόλων.

β) Εἷς ἀκέραιος α λέγεται μεγαλύτερος ἄλλου ἀκεραίου β , ἐὰν ὁ α εἶναι πληθικὸς ἀριθμὸς ἐνὸς πεπερασμένου συνόλου A καὶ ὁ β ἐνὸς γνησίου ὑποσυνόλου B αὐτοῦ.

Ἐὰν ὁ α εἶναι μεγαλύτερος τοῦ β τότε λέγομεν ὅτι καὶ ὁ β εἶναι μικρότερος τοῦ α .

Ἡ σχέσηις $\alpha = \beta$, διὰ τῆς ὁποίας δηλώνομεν ὅτι ὁ ἀκέραιος α εἶναι ἴσος μὲ τὸν β , λέγεται ἰσότης. Τὰ ἐκατέρωθεν τοῦ συμβόλου $=$ τῆς ἰσότητος γραφόμενα λέγονται μέλη τῆς ἰσότητος: τὸ μὲν πρὸς τὰ ἀριστερὰ λέγεται πρῶτον μέλος τὸ δὲ πρὸς τὰ δεξιὰ δεύτερον μέλος αὐτῆς.

Αἱ σχέσεις $\alpha < \beta$, καὶ $\alpha > \beta$ λέγονται ἀνισότητες μὲ πρῶτον μέλος πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ δεύτερον μέλος πρὸς τὰ δεξιὰ τῶν συμβόλων ἀνισότητος ($<$ $>$)

Σημειώομεν ὅτι αἱ σχέσεις $\alpha < \beta$ καὶ $\beta < \alpha$ ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν.

19.2. Ἰδιότητες ἰσότητος

Εἶναι φανερόν ὅτι:

1. Ἐκαστος ἀκέραιος α εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἑαυτόν του.

$$\alpha = \alpha \quad \text{Ἀνακλαστικὴ ἰδιότης.}$$

2. Ἐὰν ὁ ἀκέραιος α εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀκέραιον β , τότε καὶ ὁ ἀκέραιος β εἶναι ἴσος μὲ τὸν α .

$$\alpha = \beta \Rightarrow \beta = \alpha \quad \text{Συμμετρικὴ ἰδιότης.}$$

3. Ἐὰν μεταξὺ τῶν ἀκεραίων, α, β, γ εἶναι:

$$\alpha = \beta \quad \text{καὶ} \quad \beta = \gamma, \quad \text{τότε θὰ εἶναι καὶ} \quad \alpha = \gamma$$

Ἡ συμβολικῶς
$$\left. \begin{array}{l} \alpha = \beta \\ \beta = \gamma \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha = \gamma \quad \text{Μεταβατικὴ ἰδιότης}$$

Ἡ συμμετρικὴ ἰδιότης μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐναλλάσσωμεν τὸ 1ον μέλος μιᾶς ἰσότητος μὲ τὸ 2ον, ἢ μεταβατικὴ μᾶς ἐπιτρέπει ἐμμέσους συγκρίσεις.

Αἱ ἀνωτέρω τρεῖς ἰδιότητες τῆς ἰσότητος ἀκεραίων εἶναι συνέπειαι τῶν ἰδιοτήτων τῶν ἰσοδυνάμων συνόλων.

19.3. Ἰδιότητες ἀνισότητος

Ἡ σχέσηις $5 > 5$ δὲν εἶναι ἀληθής.

Ὅμοίως δὲν εἶναι ἀληθὲς ὅτι

$$5 > 3 \Rightarrow 3 > 5$$

Γενικῶς: Εἷς τὴν ἀνισότητα ἀκεραίων δὲν ἰσχύει ἡ ἀνακλαστικὴ

και η συμμετρική ιδιότητα ισχύει όμως η μεταβατική.

Πράγματι: 'Εάν είναι $\alpha > 4$ και $4 > \beta$ θα είναι και $\alpha > \beta$

Γενικώς εάν α, β, γ , άκεραίοι, τότε

$$\text{και} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha > \beta \\ \beta > \gamma \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha > \gamma$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

40. Γράψατε την σχέση μεταξύ α και β όταν :

α) $\alpha =$ ό αριθμός τών δραχμών και $\beta =$ ό αριθμός τών διδράχμων εις έν είκοσάδραχμον.

β) $\alpha =$ πληθ. αριθμός του συνόλου $A = \{x | x \text{ ψηφίον του αριθμού } 35\}$, $\beta =$ πληθ. αριθμός του συνόλου $B = \{x | x \text{ ψηφίον του αριθμού } 15673\}$.

41. 'Εάν α, β, γ είναι τά βάρη τριών κιβωτιών A, B, Γ αντιστοίχως πώσας τó όλιγώτερον μετρήσεις χρειάζεσθε, διά νά συγκρίνετε τά βάρη αυτά ;

20. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΩΣ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ

20.1. Διάταξις

Εις έν λεξικόν δυνάμεθα νά εύρωμεν εύκόλως όποιανδήποτε λέξιν θελήσωμεν, διότι αί λέξεις είναι τοποθετημέναι κατ' άλφαβητικήν σειράν.

"Όταν ή τοποθέτησις αντικειμένων γίνεται επί τη βάσει κάποιου κανόνος, τότε λέγομεν ότι τά αντικείμενα αυτά είναι διατεταγμένα.

Οί μαθηταί κατá την ώραν τής γυμναστικής είναι διατεταγμένοι κατ' άνάστημα.

20.2. Εις τά προηγούμενα έθεωρήσαμεν τά σύνολα άνεξαρτήτως τής διατάξεως τών στοιχείων των, $\{1, 2, \dots\} = \{2, 1, \dots\}$.

Κατωτέρω θα έξετάσωμεν τó σύνολον N_0 ώς διατεταγμένον σύνολον. Τά στοιχεία του συνόλου $N_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ώς έκ του τρόπου τής κατασκευής των παρουσιάζονται εις διάταξιν αύξοντος μεγέθους.

Συγκεκριμένως :

1) 'Υπάρχει εις τó σύνολον N_0 έν πρώτον στοιχείον, τó μηδέν, τó όποίον είναι τó έλάχιστον στοιχείον και δέν ύπάρχει τελευταίον (μέγιστον).

11) "Εκαστον στοιχείον αύτου, έκτός του πρώτου, έχει άριστερά του έν ώρισμένο προηγούμενον στοιχείον τó όποίον είναι μικρότερον αύτου και δεξιά του έν ώρισμένον έπόμενον τó όποίον είναι και μεγαλύτερόν του. Π.χ. τó στοιχείον 5 έχει προηγούμενον τó 4 και έπόμενον τó 6 και είναι $4 < 5 < 6$.

Τó αυτό σύνολον N_0 δυνάμεθα νά τó διατάξωμεν και κατá τάξιν φθίνοντος (έλαττουμένου) μεγέθους :

$$N_0 = \{\dots 3, 2, 1, 0\}$$

Εἰς τὴν διάταξιν αὐτὴν :

1) Ὑπάρχει ἓν τελευταῖον στοιχεῖον τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ τὸ μικρότερον καὶ δὲν ὑπάρχει πρῶτον στοιχεῖον (μέγιστον).

11) Ἐκαστον στοιχεῖον αὐτοῦ, ἐκτὸς τοῦ τελευταίου, ἔχει ἀριστερὰ ἓν ὠρισμένον προηγούμενον τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ μεγαλύτερον του καὶ δεξιὰ ἓν ὠρισμένον ἐπόμενο μικρότερόν του. Π.χ. τὸ στοιχεῖον 5 ἔχει προηγούμενον τὸ 6, ἐπόμενο τὸ 4 καὶ εἶναι $6 > 5 > 4$.

20.3. Εἶναι φανερόν ὅτι ἕκαστον πεπερασμένον ὑποσύνολον τοῦ N_0 δυνάμεθα νὰ τὸ διατάξωμεν κατὰ τάξιν αὐξοντος ἢ φθίνοντος μεγέθους. Π.χ. ἄς λάβωμεν τὸ σύνολον $\{2,5,6,4\}$. Τοῦτο γράφεται κατὰ τάξιν αὐξοντος μεγέθους ὡς ἑξῆς :

$$\{2, 4, 5, 6\}$$

Τοιοιουτρόπως διατεταγμένον τὸ σύνολον αὐτὸ ἔχει : Ἐν πρῶτον στοιχεῖον, τὸ 2, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ τὸ μικρότερον στοιχεῖον τοῦ συνόλου, ἓν τελευταῖον στοιχεῖον, τὸ 6, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ τὸ μεγαλύτερον. Τὸ αὐτὸ σύνολον δυνάμεθα νὰ τὸ διατάξωμεν κατὰ τάξιν φθίνοντος μεγέθους :

$$\{6, 5, 4, 2\}$$

Καὶ εἰς τὴν διάταξιν αὐτὴν διακρίνομεν ἓν πρῶτον στοιχεῖον, τὸ ὁποῖον ὅμως εἶναι μεγαλύτερον ὅλων τῶν ἄλλων καὶ ἓν τελευταῖον στοιχεῖον τὸ μικρότερον ὅλων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

42. Νὰ διατάξετε κατὰ τάξιν αὐξοντος μεγέθους τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου $A = \{3, 8, 12, 5, 18\}$

43. Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου $A = \{x|x \text{ περιττὸς ἀκέραιος}\}$ νὰ διαταχθοῦν κατὰ τάξιν αὐξοντος μεγέθους, τὰ δὲ στοιχεῖα τοῦ συνόλου $B = \{x|x \text{ ἄρτιος ἀκέραιος}\}$ κατὰ τάξιν φθίνοντος μεγέθους.

44. Οἱ ἀριθμοὶ 41532 καὶ 12345 ἔχουν τὸ αὐτὸ πλῆθος ψηφίων. Ποῖον ἐξ αὐτῶν δύνασθε νὰ ἀπομνημονεύσετε εὐκολώτερον καὶ διατί ;


Νέοι συμβολισμοὶ

N Τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν

N_0 » » » ἀκεραίων τῆς Ἀριθμητικῆς

$>$ Τὸ... εἶναι μεγαλύτερον τοῦ...

$<$ Τὸ... εἶναι μικρότερον τοῦ...



Σχ. 12.

1) Το εύθ. τμήμα OA, σχ. 12, αποτελείται από τρία ίσα διαστήματα και παριστάνει τον άκεραϊον 3. Το διαδοχικόν πρὸς αὐτὸ εύθ. τμήμα AB αποτελείται ἀπὸ δύο ἴσα διαστήματα καὶ παριστάνει τὸν άκεραϊον 2. Τὸ εύθ. τμήμα $OB = OA + AB$ παριστάνει τὸ ἄθροισμα $3 + 2$

11) Ἡ πρόσθεσις τοῦ 2 εἰς τὸ 3 δυνατὸν νὰ ἐρμηνευθῆ καὶ ὡς μετατόπισις τοῦ σημείου A, εἰκόνας τοῦ 3, πρὸς τὰ δεξιὰ κατὰ 2 διαστήματα.

22. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

22.1. Ὑπαρξίς ἄθροίσματος, μονότιμον

Ἐς ἐκτελέσωμεν μερικὰς προσθέσεις μὲ στοιχεῖα τοῦ συνόλου

$$A = \{ 1, 2, 3, 4 \}$$

Π.χ. τὰς προσθέσεις: $1 + 2 = 3, \quad 1 + 3 = 4, \quad 2 + 3 = 5.$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ δύο πρῶτα ἄθροίσματα $1 + 2 = 3, \quad 1 + 3 = 4$ εἶναι στοιχεῖα τοῦ ἰδίου συνόλου, ἐνῶ τὸ τρίτον ἄθροισμα $2 + 3 = 5$ δὲν εἶναι. Τὸ τελευταῖον τοῦτο δὲν παρουσιάζεται εἰς τὸ σύνολον N_0 .

Πράγματι ἀπὸ τὴν πείραν σας γνωρίζετε ὅτι: ἐὰν δοθοῦν δύο τυχόντες άκεραῖοι α, β ὑπάρχει εἰς καὶ μόνον εἰς άκεραῖος, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ πρᾶξις τῆς προσθέσεως εἰς τὸ σύνολον N_0 εἶναι πάντοτε δυνατὴ καὶ μονότιμος.

22.2. Μεταθετικὴ

α) Παρατηροῦμεν ὅτι $2 + 3 = 3 + 2, \quad 3 + 4 = 4 + 3, \quad 5 + 6 = 6 + 5 \dots$

β) Ἐὰν εἶναι A, B δύο σύνολα ξένα μεταξύ των καὶ α, β οἱ πληθικὸι ἀριθμοὶ αὐτῶν ἀντιστοίχως.

Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ ἄθροίσματος ὁ πληθικὸς ἀριθμὸς τῆς ἐνώσεως $A \cup B$ εἶναι $\alpha + \beta$ καὶ τῆς ἐνώσεως $B \cup A$ εἶναι $\beta + \alpha$.

Ἄλλὰ $A \cup B = B \cup A$ (Διατί ;)

Ἄρα $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.

Ἦτοι, ἡ ἀλλαγὴ τῆς τάξεως τῶν προσθετέων δὲν μεταβάλλει τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ πρόσθεσις τῶν ἀκεραίων εἶναι πρᾶξις μετὰ-θετικῆ.

22.3. Προσεταιριστική

* Ἄς λάβωμεν κατὰ σειρὰν τοὺς ἀκεραίους 2, 3, 7 καὶ ἄς προσπαθήσωμεν νὰ προσθέσωμεν αὐτοὺς συγχρόνως. Παρατηροῦμεν ὅτι τοῦτο δὲν ἔχει ἔννοιαν ἢ πρόσθεσις εἶναι πρᾶξις διμελῆς : ἥτοι δύο μόνον ἀκεραίοις δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν συγχρόνως. Εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ προχωρήσωμεν μὲ δ ὄ ο προσθέσεις ὡς ἑξῆς :

$$2 + 3 = 5 \quad (1\eta \text{ πρόσθεσις})$$

$$5 + 7 = 12 \quad (2\alpha \text{ πρόσθεσις})$$

* Ἡ συντόμως $(2 + 3) + 7 = 12$ * (1)

Εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα καταλήγομεν καὶ ἐὰν ἐκτελέσωμεν κατὰ σειρὰν τὰς ἑξῆς προσθέσεις :

$$3 + 7 = 10 \quad (1\eta \text{ πρόσθεσις})$$

$$2 + 10 = 12 \quad (2\alpha \text{ πρόσθεσις})$$

* Ἡ συντόμως $2 + (3 + 7) = 12$ (2)

* Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) ἔχομεν :

$$(2 + 3) + 7 = 2 + (3 + 7)$$

Γενικῶς δι' ἐκάστην τριάδα ἀκεραίων α, β, γ ἔχομεν :

$$\boxed{(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)}$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ πρόσθεσις ἀκεραίων εἶναι πρᾶξις προσεταιριστικῆ.

Σημείωσις

Ἡ ἀνωτέρω ιδιότης προκύπτει ἐκ τῆς προσεταιριστικῆς ιδιότητος τῆς ἐνώσεως συνόλων.

22.4. Ὑπαρξις οὐδετέρου στοιχείου

* Ἀπὸ τὰς ἰσότητας

$$2 + 0 = 2, \quad 0 + 2 = 2, \quad 3 + 0 = 3, \quad 0 + 3 = 3$$

καὶ γενικῶς

$$\boxed{\alpha + 0 = \alpha, \quad 0 + \alpha = \alpha \quad \text{ὅπου } \alpha \in \mathbb{N}_0}$$

συνάγομεν ὅτι εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ὑπάρχει ἓν στοιχεῖον, τὸ μηδὲν τὸ ὁποῖον προστιθέμενον εἰς οἷονδήποτε ἀκέραιον τὸν ἀφήνει ἀμετάβλητον. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ μηδὲν εἶναι οὐδέτερον στοιχεῖον τῆς προσθέσεως ἀκεραίων.

* Ἡ παρένθεσις δηλοῖ ὅτι πρέπει νὰ εὐρεθῇ πρῶτον τὸν ἀθροισμα $2 + 3$.

Ἐὰν λάβωμεν οἰονδήποτε ἄλλον ἀκέραιον $\beta \neq 0$ εἶναι φανερόν ὅτι θὰ ἔχωμεν

$$\alpha + \beta \neq \alpha \quad \text{Π. χ. } 4 + 3 \neq 4.$$

Ἦτοι τὸ μηδέν εἶναι τὸ μοναδικόν οὐδέτερον στοιχεῖον εἰς τὴν πρόσθεσιν ἀκεραίων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

45. Συμπληρώσατε τὰς συνεπαγωγὰς

$$\alpha + \beta = \beta \implies \alpha = \dots \text{ καὶ } \alpha + \beta = \alpha \implies \beta = \dots$$

46. Ἐὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ καὶ $\alpha + \beta = 1$ ποῖαι εἶναι αἱ δυναταὶ τιμαὶ τῶν α καὶ β ;

47. Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν εἶναι 100. Πόσα ψηφία δύναται νὰ ἔχη ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν τούτων; (Ἐξετάσατε διαφόρους περιπτώσεις)

23. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΡΙΩΝ ἢ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΩΝ

23.1. Ὅρισμός

Εἰς ἓν καλάθιον ἔχομεν 2 μῆλα. Θέτομεν διαδοχικῶς εἰς αὐτὸ 3 μῆλα, 4 μῆλα καὶ 5 μῆλα. Πόσα μῆλα ἔχομεν τελικῶς εἰς τὸ καλάθιον; Τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὰς ἐξῆς κατὰ σειρὰν πράξεις μεταξύ τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4 καὶ 5

$$2 + 3 = 5$$

$$5 + 4 = 9$$

$$9 + 5 = 14$$

Ὁ ἀριθμὸς 14 εἰς τὸν ὁποῖον κατελήξαμεν τοιοῦτοτρόπως, λέγεται ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4, 5

γράφομεν δὲ $2 + 3 + 4 + 5 = 14$.

Ἦτοι: $2 + 3 + 4 + 5 = [(2 + 3) + 4] + 5 = 14$

Ὅπου ἡ γραφή $(2 + 3)$ δηλώνει ἓνα ἀριθμὸν: Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν 2 καὶ 3. Ὁμοίως ἡ γραφή $[(2 + 3) + 4]$ δηλώνει ἓνα ἀριθμὸν: Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν $(2 + 3)$ καὶ 4.

Γενικῶς: Ἄθροισμα τριῶν ἢ περισσοτέρων ἀκεραίων δοθέντων εἰς μίαν σειρὰν λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος προκύπτει, ὅταν εἰς τὸν πρῶτον ἐξ αὐτῶν προσθέσωμεν τὸν δεύτερον, εἰς τὸ εὐρεθὲν ἄθροισμα τὸν τρίτον κ.ο.κ. μέχρις ὅτου τελειώσουν ὅλοι οἱ ἀκέραιοι.

Ἦ συμβολικῶς: Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}_0$.

τότε $\alpha + \beta + \gamma + \delta = [(\alpha + \beta) + \gamma] + \delta$

23. 2. 'Ιδιότητες.

α) 'Εάν εις τὸ καλάθιον θέσωμεν πρῶτα τὰ 5 μήλα, ἔπειτα τὰ 3 καὶ τελευταία τὰ 4 εἶναι φανερόν ὅτι θὰ ἔχωμεν θέσει πάλιν τὸ αὐτὸ πλῆθος μήλων. 'Απὸ τὴν παρατήρησιν αὐτὴν ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ σειρὰ μὲ τὴν ὁποῖαν λαμβάνομεν τοὺς προσθετέους, διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμὰ τῶν, δὲν μεταβάλλει τὸ τελικὸν ἄθροισμα. Π.χ.

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + \delta + \gamma + \beta = \alpha + \gamma + \beta + \delta = \dots, \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}_0$$

'Ητοι : 'Η μεταθετικὴ ιδιότης ἰσχύει καὶ ὅταν οἱ προσθετέοι εἶναι τρεῖς ἢ περισσότεροι.

β) Εἰς τὸ παράδειγμά μας ἐλαττώνομεν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐργασιῶν μας, χωρὶς νὰ μεταβληθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν μήλων, τὰ ὅποια ἔχομεν εἰς τὸ καλάθιον, ἐὰν θέσωμεν 7 μήλα συγχρόνως ἀντὶ νὰ θέσωμεν 3 μήλα τὴν μίαν φοράν καὶ 4 τὴν ἐπομένην. 'Η παρατήρησις αὕτη μᾶς ὁδηγεῖ νὰ γράψωμεν :

$$\begin{aligned} 2 + 3 + 4 + 5 &= 2 + (3 + 4) + 5 \\ &= 2 + 7 + 5 \end{aligned}$$

καὶ γενικῶς $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + (\beta + \gamma) + \delta \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}_0$

'Ητοι : Τὸ ἄθροισμα δοθέντων ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν δύο ἢ περισσότερους τῶν προσθετέων μὲ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν

γ) Προφανῶς θὰ ἔχωμεν εἰς τὸ καλάθιον τὸ αὐτὸ πλῆθος μήλων, ἐὰν ἀντὶ τῶν 5 μήλων, τὰ ὅποια ἐθέσαμεν τὴν τελευταίαν φοράν, ἐθέτομεν διαδοχικῶς 3 μήλα καὶ 2 μήλα. 'Η παρατήρησις αὕτη μᾶς ὁδηγεῖ νὰ γράψωμεν :

$$2 + 3 + 4 + 5 = 2 + 3 + 4 + 3 + 2$$

καὶ γενικῶς $\alpha + \beta + (\gamma + \delta) = \alpha + \beta + \gamma + \delta \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}_0$

'Ητοι : Δυνάμεθα εἰς ἓν ἄθροισμα νὰ ἀντικαταστήσωμεν ἓνα προσθετέον μὲ δύο ἢ περισσότερους ἄλλους, οἱ ὅποιοι νὰ ἔχουν αὐτὸν ὡς ἄθροισμα.

Αἱ ἀνωτέρω ιδιότητες μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ συντομεύσωμεν τοὺς ὑπολογισμοὺς ἄθροισμάτων.

Παραδείγματα

$$\begin{aligned} 1. \quad 56 + 75 + 44 + 25 &= (56 + 44) + (75 + 25) \\ &= 100 + 100 = 200 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad 115 + 36 + 14 + 985 &= 100 + 15 + 36 + 14 + 985 \\ &= 100 + (15 + 985) + (36 + 14) \\ &= 100 + 1000 + 50 = 1150 \end{aligned}$$

23.3. Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα τῶν ἀνωτέρω ιδιοτήτων τῆς προσθέσεως.

Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ εἶναι τυχόντες ἀκέραιοι τότε :

1. $\alpha + \beta \in \mathbb{N}_0$
2. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
3. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
4. $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$
5. $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + \gamma + \beta + \delta = \alpha + \delta + \gamma + \beta = \dots$
6. $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + (\beta + \gamma) + \delta = \alpha + (\beta + \delta) + \gamma = \dots$
7. $\alpha + (\beta + \gamma) + \delta = \alpha + \beta + \gamma + \delta$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

48. Χρησιμοποιήσατε ιδιότητες τῆς προσθέσεως διὰ νὰ ὑπολογισθῇ συντομώτερον τὸ ἄθροισμα

$$17 + (2 + 83) + 98$$

49. Νὰ ὑπολογισθοῦν μὲ τὸν συντομώτερον τρόπον τὰ ἄθροισματα :

$$\alpha. = (5 + 20 + 4) + (95 + 80 + 996)$$

$$\beta. = 24 + (52 + 35) + (65 + 48) + 976$$

50. Χρησιμοποιήσατε τὴν μεταθετικὴν καὶ τὴν προσεταιριστικὴν ιδιότητα διὰ νὰ δικαιολογήσετε ὅτι :

$$(\alpha + \beta) + \gamma = (\alpha + \gamma) + \beta$$

23. 4. Ἐξισώσεις, ταυτότητες

* Ἀς προσέξωμεν τὰς κατωτέρω ἰσότητες :

$$3 + 4 = 7 \quad (1) \quad 5 + 3 = 9 \quad (2) \quad 5 + 9 = 14 \quad (3)$$

* Ἀπὸ αὐτὰς ἡ (1) καὶ ἡ (3) εἶναι ἀληθεῖς, ἐνῶ ἡ (2) εἶναι ψευδής.

Τί δυνάμεθα ὁμῶς νὰ εἴπωμεν διὰ τὰς κατωτέρω ἐγγράμματους ἰσότητας ;

$$\chi + 3 = 5 \quad (4) \quad \chi + 3 = 3 + \chi \quad (5)$$

Εἶναι φανερόν ὅτι ἡ (4) εἶναι ἀληθής μόνον διὰ τὴν τιμὴν $\chi = 2$, ἐνῶ ἡ (5) ἀληθεύει διὰ πᾶσαν ἀκέραιαν τιμὴν τοῦ χ .

$$\begin{array}{llll} \text{Π.χ. διὰ} & \chi = 1 & \text{ἔχομεν} & 1 + 3 = 3 + 1 \quad (4 = 4) \\ \text{»} & \chi = 2 & \text{»} & 2 + 3 = 3 + 2 \quad (5 = 5) \dots \end{array}$$

* Ἡ ἰσότης (5) ὡς καὶ πᾶσα ἐγγράμματος ἰσότης ἡ ὁποία ἀληθεύει διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ γράμματος τὸ ὁποῖον περιέχει λέγεται ταυτότης.

Ἡ ἰσότης (4) ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη ἐγγράμματος ἰσότης ἢ ὁποῖα δὲν εἶναι ταυτότης λέγεται ἐξίσωσις.

Ἡ τιμὴ τοῦ χ διὰ τὴν ὁποῖαν ἀληθεύει ἡ ἐξίσωσις λέγεται ρίζα ἢ λύσις τῆς ἐξισώσεως.

Π.χ. ὁ ἀριθμὸς $\chi = 2$ εἶναι ρίζα τῆς ἐξισώσεως (4) διότι $2 + 3 = 5$. Ἡ ἐργασία διὰ τὴν εὕρεσιν τῆς ρίζης μιᾶς ἐξισώσεως καλεῖται ἐπίλυσις τῆς ἐξισώσεως.

Εἶναι δυνατὸν μίᾳ ἐξίσωσιν νὰ μὴ ἔχη λύσιν εἰς ἓν ὠρισμένον σύνολον. Π.χ. ἡ ἐξίσωσις $\chi + 4 = 3$ δὲν ἔχει λύσιν εἰς τὸ σύνολον N_0 . Πράγματι δὲν ὑπάρχει ἀκέραιος, στοιχεῖον τοῦ συνόλου N_0 , ὁ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸ 4 δίδει ἄθροισμα 3. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ ἐξίσωσις λέγεται ἀδύνατος εἰς τὸ σύνολον N_0 .

Παραδείγματα

Ἐξισώσεις

$$\chi + 5 = 5$$

$$7 + \chi = 12$$

$$\alpha + 1 = 9$$

Ταυτότητες

$$\chi + 5 = 3 + 2 + \chi$$

$$\chi + 2 = 2 + \chi$$

$$5 + (1 + \chi) = \chi + 6$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

51. Ἐὰν χ λαμβάνῃ τιμὰς ἐκ τοῦ συνόλου $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$, νὰ εὕρεθῇ ἡ ρίζα ἐκάστης τῶν κατωτέρω ἐξισώσεων.

$$\chi + 7 = 12$$

$$\chi + 5 = 17$$

$$4 + \chi = 10$$

$$\chi + 0 = 10$$

Ποῖα ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐξισώσεων δὲν ἔχει λύσιν εἰς τὸ θεωρούμενον σύνολον τιμῶν τοῦ χ ;

52. Ποῖα ἐκ τῶν κατωτέρω ἐγγραμμάτων ἰσοτήτων εἶναι ἐξισώσεις καὶ ποῖα ταυτότητες;

$$\chi + 8 = 12$$

$$2 + (\chi + 1) = 3 + \chi,$$

$$\chi + 7 = 7 + \chi$$

$$9 + \chi = 20$$

24. Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

24.1. Ὁρισμὸς

Ὅταν δίδωμεν 100 δρχ. διὰ νὰ πληρώσωμεν εἰς ἓν κατάστημα ἀντικείμενα ἀξίας 53 δρχ., ἡ ταμίας διὰ νὰ μᾶς δώσῃ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα (ρέστα) σκέπτεται νὰ εὕρῃ πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ πρ ο σ θ ἔ σ η εἰς τὰς 53 δρχ. διὰ νὰ γίνουν αὐταὶ 100 δρχ.

Ἦτοι, ἐὰν παραστήσωμεν μὲ χ τὸν ἀριθμὸν τῶν δραχμῶν τὰς ὁποίας θὰ λάβωμεν πρέπει:

$$53 + \chi = 100$$

(1)

Ο αριθμός $\chi = 47$ ο οποίος πρέπει να προστεθῆ εἰς τὸ 53 διὰ νὰ δώσῃ ἄθροισμα 100 λέγεται διαφορά τῶν ἀριθμῶν 100 καὶ 53

$$\text{γράφομεν δὲ} \quad 100 - 53 = \chi \quad (= 47) \quad (2)$$

Γενικῶς : Ἐὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ καὶ ὑπάρχῃ ἀκέραιος χ ὁ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸ β δίδει ἄθροισμα α

$$\beta + \chi = \alpha \quad (3)$$

οὗτος λέγεται διαφορά τῶν ἀριθμῶν α καὶ β .

$$\text{γράφομεν δὲ :} \quad \alpha - \beta = \chi \quad (4)$$

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι :

α) Αἱ (3) καὶ (4) εἶναι ταυτόσημοι*, (ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν).

Ἦτοι, ἐὰν ἰσχύῃ ἢ μία ἀπ' αὐτάς, θὰ ἰσχύῃ καὶ ἡ ἄλλη.

$$\beta + \chi = \alpha \implies \alpha - \beta = \chi$$

$$\alpha - \beta = \chi \implies \beta + \chi = \alpha$$

Διὰ τοῦτο λέγονται ἰσοδύναμοι μεταξὺ τῶν ἢ ἀπλῶς ἰσοδύναμοι.

γράφομεν δὲ

$$\boxed{\beta + \chi = \alpha \iff \alpha - \beta = \chi} \quad (5)$$

Τὸ σύμβολον \iff λέγεται σύμβολον τῆς ἰσοδυναμίας δύο σχέσεων.

β) Ὑπάρχει εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 διαφορά $\alpha - \beta$ ὡςάκις μόνον εἶναι

$$\alpha \geq \beta.$$

Ἡ πράξις μὲ τὴν ὁποῖαν εἰς τὸ ζεῦγος (α, β) , ὅπου $\alpha \geq \beta$, ἀντιστοιχοῦμεν τὴν διαφοράν $\alpha - \beta$ λέγεται ἀφαίρεσις.

$$(\alpha, \beta) \longrightarrow \alpha - \beta$$

Οἱ ἀκέραιοι α, β λέγονται ὄροι τῆς ἀφαίρεσεως. Εἰδικῶς ὁ μὲν α λέγεται μειωτέος ὁ δὲ β ἀφαιρετέος. Ἡ διαφορά λέγεται καὶ ὑπόλοιπον.


24.2. Ἰσοδυναμία τῶν σχέσεων $\alpha + \beta = \gamma, \quad \gamma - \beta = \alpha, \quad \gamma - \alpha = \beta$

Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν τῆς διαφορᾶς ἔχομεν :

$$3 + 4 = 7 \iff 7 - 4 = 3$$

$$3 + 4 = 7 \iff 7 - 3 = 4$$

* Συνεπῶς δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν ἐκάστην τούτων μὲ τὴν ἄλλην ὡςάκις τοῦτο μᾶς διευκολύνει.



Γενικῶς, ὅπως φαίνεται παραστατικῶς καὶ εἰς τὸ σχ. 13, ἐὰν μεταξύ τριῶν ἀκεραίων α, β, γ εἶναι $\alpha + \beta = \gamma$, θὰ εἶναι $\gamma - \beta = \alpha$ καὶ $\gamma - \alpha = \beta$.

Ἐπίσης, ἐὰν εἶναι $\gamma - \beta = \alpha$ (ἢ $\gamma - \alpha = \beta$), θὰ εἶναι καὶ $\alpha + \beta = \gamma$.

Ἡ συμβολικῶς :

$$\alpha + \beta = \gamma \iff \begin{cases} \gamma - \beta = \alpha \\ \gamma - \alpha = \beta \end{cases}$$

Παραδείγματα :


1) Ἄφοῦ εἶναι $5 + 7 = 12$ εἶναι καὶ $12 - 7 = 5$ καθὼς καὶ $12 - 5 = 7$

2) Ἄφοῦ εἶναι $15 - 6 = 9$ εἶναι καὶ $9 + 6 = 15$, καθὼς καὶ $15 - 9 = 6$

24.3. Ἡ ἀφαίρεσις ὡς πρᾶξις ἀντίστροφος τῆς προσθέσεως

Ἐὰν εἰς τὸ 3 προσθέσωμεν τὸ 4, εὐρίσκομεν τὸ 7. Ἐὰν δὲ ἀκολούθως ἀφαιρέσωμεν τὸ 4 ἀπὸ τὸ 7, ἐπανευρίσκομεν 3.

$$3 + 4 = 7 \qquad 7 - 4 = 3$$



Ἦτοι: $(3 + 4) - 4 = 3$

Γενικῶς ἔχομεν: $(\alpha + \beta) - \beta = \alpha$,

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ ἀφαίρεσις εἶναι ἡ ἀντίστροφος πρᾶξις τῆς προσθέσεως.

24.4. Εἰδικαὶ περιπτώσεις.

i) Ἡ διαφορὰ $\alpha - 0 = \chi$.

Εἶναι $\alpha - 0 = \chi \iff 0 + \chi = \alpha \quad \eta \quad \chi = \alpha$

Ἔστω $\alpha - 0 = \alpha$

ii) Διαφορὰ δύο ἴσων ἀριθμῶν $\alpha = \beta$

Ἐχομεν: $\alpha = \beta \iff \alpha = \beta + 0$ (Οὐδέτερον στοιχείον)

$\iff \alpha - \beta = 0$ (Διατί ;)

Ἔστω, ἐὰν $\alpha = \beta$ τότε $\alpha - \beta = 0$ καὶ ἀντιστρόφως

» $\alpha - \beta = 0 \quad \gg \quad \alpha = \beta$

25. ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΑΠΛΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

25.1. Πρόβλημα

Ο Λεωνίδας είναι 29 ετών και μεγαλύτερος από τον Νίκον κατά 12 έτη. Πόσων ετών είναι ο Νίκος ;

Εάν παραστήσωμεν με χ τον αριθμό των ετών του Νίκου, θα πρέπει

$$\chi + 12 = 29 \quad (1)$$

Η (1) παριστάνει μίαν εξίσωσιν τήν ὁποίαν δυνάμεθα νά ἐπιλύσωμεν, ἐάν σκεφθῶμεν ὅτι :

$$\alpha + \beta = \gamma \iff \alpha = \gamma - \beta$$

Συνεπῶς $\chi + 12 = 29 \iff \chi = 29 - 12.$ Ἡτοι $\chi = 17$

Ὡστε ὁ Νίκος εἶναι 17 ἐτῶν.

25.2. Πρόβλημα

Ἀπό ποῖον ἀριθμόν πρέπει νά ἀφαιρέσωμεν 43 διὰ νά εὔρωμεν ὑπόλοιπον 24;

Εάν χ παριστάνη τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, πρέπει :

$$\chi - 43 = 24 \quad (3)$$

Η (3) εἶναι μία εξίσωσις. Διὰ νά τήν ἐπιλύσωμεν, σκεπτόμεθα ὅτι :

$$\gamma - \beta = \alpha \iff \gamma = \alpha + \beta \quad (4)$$

Συνεπῶς $\chi - 43 = 24 \iff \chi = 24 + 43.$ Ἡτοι $\chi = 67$

Ὡστε ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι 67.

25.3. Πρόβλημα

Κατὰ ποῖον ἀριθμόν πρέπει νά ἐλαττώσωμεν τὸ 324 διὰ νά εὔρωμεν 169;

Εάν χ παριστάνη τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, τότε συμφώνως πρὸς τὸ πρόβλημα ἔχομεν :

$$324 - \chi = 169 \quad (5)$$

Διὰ νά ἐπιλύσωμεν τήν εξίσωσιν (5), σκεπτόμεθα ὅτι :

$$\alpha - \beta = \gamma \iff \beta = \alpha - \gamma$$

Ἡτοι $324 - \chi = 169 \iff \chi = 324 - 169.$ Ὡστε $\chi = 155$

25.4. Γενικῶς

Διὰ νά ἐπιλύσωμεν μίαν εξίσωσιν τῆς μορφῆς $\chi + \beta = \gamma,$

σκεπτόμεθα ὅτι : $\alpha + \beta = \gamma \iff \alpha = \gamma - \beta$

Συνεπῶς ἔχομεν $\chi + \beta = \gamma \iff \chi = \gamma - \beta$

Με ανάλογο τρόπον εύρισκομεν ότι :

$$\chi - \alpha = \beta \iff \chi = \beta + \alpha$$

$$\alpha - \chi = \beta \iff \chi = \alpha - \beta$$

Ἐξίσωσις

$$\chi - \alpha = \beta$$

$$\chi + \beta = \alpha$$

$$\alpha - \chi = \beta$$

Λύσις

$$\chi = \beta + \alpha$$

$$\chi = \alpha - \beta$$

$$\chi = \alpha - \beta$$

Φυσικά αἱ ἀνωτέρω σχέσεις ἰσχύουν, ὅταν αἱ ἐξισώσεις εἶναι ἐπιλύσιμοι εἰς τὸ σύνολον N_0 .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

53. Συμπληρώσατε τὰς ἰσοδυναμίας

α) $5 + 7 = 12 \iff$

γ) $\alpha + \beta = 10 \iff$

β) $5 + 7 = 12 \iff$

δ) $\alpha + \beta = 10 \iff$

54. Ἐπιλύσατε τὰς ἐξισώσεις :

$$\chi + 7 = 19, \quad 18 - \chi = 11, \quad \chi - 24 = 36, \quad \text{ὅπου } \chi \in N_0$$

55. Ἡρωτήθη κάποιος διὰ τὴν ἡλικίαν του καὶ ἀπήντησεν ὅτι μετὰ 24 ἔτη θὰ εἶναι 89 ἐτῶν. Πόση εἶναι ἡ σημερινή του ἡλικία ;

56. Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν εἶναι 76. Ὁ εἰς ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ 37. Ποῖος εἶναι ὁ ἄλλος ἀριθμὸς ;

26. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

26.1 Παρατηροῦμεν ὅτι, ἐνῶ ἡ ἀφαίρεσις 7-4 εἶναι δυνατή, δὲν ὑπάρχει ἡ διαφορά 4-7 εἰς τὸ σύνολον N_0 . Ἦτοι ἡ ἀφαίρεσις ἀκεραίων δὲν εἶναι πρᾶξις μεταθετική.

26.2 Μήπως εἶναι πρᾶξις προσεταιριστική ; Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\begin{array}{r} \alpha) \quad 10 - 6 = 4 \\ \quad \quad 4 - 1 = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \beta) \quad 6 - 1 = 5 \\ \quad \quad 10 - 5 = 5 \end{array}$$

*Ἡ $(10 - 6) - 1 = 3$

*Ἡ $10 - (6 - 1) = 5$

*Ἦτοι : $(10 - 6) - 1 \neq 10 - (6 - 1)$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ ἀφαίρεσις ἀκεραίων δὲν εἶναι πρᾶξις προσεταιριστική.

26.3. Θεμελιώδης ιδιότης

Ὁ Νίκος εἶναι 18 ἐτῶν καὶ ἡ Κλαίρη 12. Ἦτοι αἱ ἡλικίαι των διαφέρουν κατὰ 6 ἔτη.

$$18 - 12 = 6 \quad (1)$$

Μετά 5 έτη ο Νίκος θα είναι 23 ετών και η Κλαίρη 17. Καί πάλιν αί ηλικίαι των θα διαφέρουν κατά 6 έτη.

$$(18 + 5) - (12 + 5) = 6 \quad (2)$$

Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (1) καί (2) ἔχομεν :

$$18 - 12 = (18 + 5) - (12 + 5)$$

Πρὸ 5 ἐτῶν ὁ Νίκος ἦτο 13 ἐτῶν ἡ δὲ Κλαίρη 7 ἐτῶν καί εἶχον πάλιν διαφορὰν ηλικίας 6 ἔτη.

$${}^* \text{Ἦτοι} \quad 18 - 12 = (18 - 5) - (12 - 5)$$

Γενικῶς διὰ τοὺς ἀκεραίους α, β, γ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \alpha - \beta &= (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) & \alpha &\geq \beta \\ \alpha - \beta &= (\alpha - \gamma) - (\beta - \gamma) & \alpha &\geq \beta, \beta \geq \gamma \end{aligned}$$

Παράδειγμα

$$7 - 4 = (7 + 2) - (4 + 2) = (7 - 2) - (4 - 2) = 3$$

26.4. Ἀφαιρέσεις ἀριθμοῦ ἀπὸ ἄθροισμα.

Διὰ τὴν εὐρεσιν τῆς διαφορᾶς $(17 + 6) - 7$ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\alpha) \quad 17 + 6 = 23 \qquad \beta) \quad 17 - 7 = 10$$

$$\quad \underline{23 - 7 = 16} \qquad \quad \underline{10 + 6 = 16}$$

$${}^* \text{Ἡ} \quad (17 + 6) - 7 = 16 \qquad {}^* \text{Ἡ} \quad (17 - 7) + 6 = 16$$

$${}^* \text{Ὡστε} \quad (17 + 6) - 7 = (17 - 7) + 6$$

Γενικῶς ἔχομεν

$$(\alpha + \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) + \beta \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0 \text{ καὶ } \alpha \geq \gamma$$

26.5 Ἀφαιρέσεις ἐνὸς ἀθροίσματος

Διὰ τὴν εὐρεσιν τῆς διαφορᾶς $15 - (5 + 7)$ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\alpha) \quad 5 + 7 = 12 \qquad \beta) \quad 15 - 5 = 10$$

$$\quad \underline{15 - 12 = 3} \qquad \quad \underline{10 - 7 = 3}$$

$${}^* \text{Ἡ} \quad 15 - (5 + 7) = 3 \qquad {}^* \text{Ἡ} \quad (15 - 5) - 7 = 3$$

$${}^* \text{Ὡστε} \quad 15 - (5 + 7) = (15 - 5) - 7$$

Γενικῶς

$$\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$$

Όπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$ και αί σημειούμεναι ἀφαιρέσεις εἶναι δυναταί.

26.6. Πρόσθεσις μιᾶς διαφορᾶς

Όμοίως διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ ἀθροίσματος $4 + (6 - 5)$ παρατηροῦμεν ὅτι

$$\begin{array}{r} \alpha) \quad 6 - 5 = 1 \\ \quad 4 + 1 = 5 \\ \hline \text{Ἔ} \quad 4 + (6 - 5) = 5 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \beta) \quad 4 + 6 = 10 \\ \quad 10 - 5 = 5 \\ \hline \text{Ἔ} \quad (4 + 6) - 5 = 5 \end{array}$$

Ἔτσι

$$4 + (6 - 5) = (4 + 6) - 5$$

Γενικῶς

$$\alpha + (\beta - \gamma) = (\alpha + \beta) - \gamma \quad \text{ὅπου } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0 \text{ και } \beta \geq \gamma$$

26.7. Ἀφαιρέσεις μιᾶς διαφορᾶς.

Όμοίως διὰ τὴν εὔρεσιν τῆς διαφορᾶς $15 - (10 - 4)$ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\begin{array}{r} \alpha) \quad 10 - 4 = 6 \\ \quad 15 - 6 = 9 \\ \hline \text{Ἔ} \quad 15 - (10 - 4) = 9 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \beta) \quad 15 + 4 = 19 \\ \quad 19 - 10 = 9 \\ \hline \text{Ἔ} \quad (15 + 4) - 10 = 9 \end{array}$$

Ἔτσι

$$15 - (10 - 4) = (15 + 4) - 10$$

Γενικῶς

$$\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta$$

ὅπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$ και αί σημειούμεναι ἀφαιρέσεις εἶναι δυναταί.

26.8. Παρατηρήσεις

1) Θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἀποδείξωμεν τὰς ἀνωτέρω ιδιότητες μὲ τὴν χρησιμοποίησην τῶν γνωστῶν ἰσοδυναμιῶν (παρ. 24.2.). Π.χ. διὰ νὰ ἀποδείξωμεν τὴν ιδιότητα $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$ ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Θέτομεν $x = \alpha - (\beta + \gamma)$, ὁπότε ἔχομεν :

$$x = \alpha - (\beta + \gamma) \iff x + (\beta + \gamma) = \alpha \quad (\text{Διατί ;})$$

$$\iff (x + \gamma) + \beta = \alpha$$

$$\iff x + \gamma = \alpha - \beta$$

$$\iff x = (\alpha - \beta) - \gamma$$


ii) Αἱ προηγούμεναι ιδιότητες μᾶς διευκολύνουν συχνὰ εἰς τὸν ἀπὸ μνήμης λογισμόν.

Π.χ. διὰ τὴν ἀπὸ μνήμης εὕρεσιν τῆς διαφορᾶς σκεπτόμεθα ὅτι :

$$192 - (50 - 8) = (192 + 8) - 50 \\ = 200 - 50 = 150$$

26.9 Ἰδιότητες τῆς διαγραφῆς

1) Ὁ ζυγὸς τοῦ σχ. 14 ἰσορροπεῖ, ὅταν τεθοῦν ἐπὶ τῶν δίσκων του τὰ βάρη A καὶ B. Ἄρα $A = B$




Σχ. 14.

Εἰς τὸν ζυγὸν τοῦ σχ. 15 ἔχομεν τοποθετή-
σει ἐπὶ τῶν δίσκων του καὶ ἓν νέον βάρος Γ, βλέ-
πομεν δὲ ὅτι καὶ πάλιν ἔχομεν ἰσορροπία. Ἄρα

$$A + \Gamma = B + \Gamma$$

Τὸ ἀνωτέρω πείραμα μᾶς διευκολύνει νὰ κα-
τανοήσωμεν τὴν ἀκόλουθον ἰδιότητα τῶν ἀριθμῶν.

Ἐὰν $\alpha = \beta$ τότε εἶναι καὶ $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$
Καὶ ἀντιστρόφως. Ἐὰν εἶναι $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$
τότε $\alpha = \beta$



Σχ. 15.

Ἡ συμβολικῶς :

$$\alpha = \beta \iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma \quad \alpha, \beta, \gamma \in N_0$$

Ἐὰν προσθέσωμεν (ἢ ἀφαιρέσωμεν) τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἰς τὰ μέλη μιᾶς ἰσότητος, λαμβάνομεν πάλιν ἰσότητα.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς ἀφαιρέσεως ἢ ἀφαιρέσεως θὰ πρέπει νὰ εἶναι δυνατὴ εἰς τὸ N_0 .


Εἰς τὴν ἀνωτέρω ἰδιότητα δυνάμεθα νὰ φθάσωμεν ὡς ἑξῆς :

Κατὰ τὴν 24.4, ἔχομεν

$$\alpha = \beta \iff \alpha - \beta = 0 \\ \iff (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) = 0 \quad (\text{Κατὰ τὴν 26.3}) \\ \iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma$$


11) Εἰς τὸν ζυγὸν τοῦ
σχ. 16 τὸ βάρος A εἶναι
μεγαλύτερον τοῦ βάρους B

$$A > B \quad (1)$$



Σχ. 16.

Εἰς τὸ ζυγὸν τοῦ σχ.
17 ἔχομεν τοποθετήσει ἐπὶ



Σχ. 17.

του βάρους A και επί του βάρους B το αυτό βάρος Γ. Παρατηρούμεν ότι :

$$A + \Gamma > B + \Gamma \quad (2)$$

Το άνωτέρω πείραμα μᾶς διευκολύνει νὰ κατανοήσωμεν ὅτι, ἐὰν μεταξύ δύο ἀκεραίων α, β εἶναι $\alpha > \beta$ τότε θὰ εἶναι καὶ $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$, ὅπου $\gamma \in \mathbb{N}_0$ καὶ ἀντιστρόφως, ἐὰν $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$ τότε θὰ εἶναι καὶ $\alpha > \beta$.

$$\alpha > \beta \iff \alpha + \gamma > \beta + \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$$

Ἐὰν προσθέσωμεν (ἢ ἀφαιρέσωμεν) τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἰς τὰ μέλη μιᾶς ἀνισότητος, λαμβάνομεν πάλιν ἀνισότητα τῆς αὐτῆς φορᾶς.

Αἱ ιδιότητες τῆς διαγραφῆς εἰς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὴν ἀφαίρεσιν εἶναι δυνατὸν νὰ γραφοῦν καὶ ὡς ἑξῆς.

$$\alpha = \beta \iff \alpha - \gamma = \beta - \gamma$$

$$\alpha > \beta \iff \alpha - \gamma > \beta - \gamma$$

ὅπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$ καὶ $\beta \geq \gamma$

Παραθέτομεν κατωτέρω συγκεντρωτικὸν πίνακα τῶν ιδιοτήτων τῆς ἀφαιρέσεως.

Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$ τότε

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | $\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma)$ | $\alpha \geq \beta$ |
| 2. | $\alpha - \beta = (\alpha - \gamma) - (\beta - \gamma)$ | $\alpha \geq \beta, \beta \geq \gamma$ |
| 3. | $\alpha = \beta \iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma$ | |
| 4. | $\alpha = \beta \iff \alpha - \gamma = \beta - \gamma$ | $\alpha \geq \gamma$ |
| 5. | $\alpha > \beta \iff \alpha + \gamma > \beta + \gamma$ | |
| 6. | $\alpha > \beta \iff \alpha - \gamma > \beta - \gamma$ | $\beta \geq \gamma$ |
| 7. | $(\alpha + \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) + \beta$ | $\alpha \geq \gamma$ |
| 8. | $\alpha + (\beta - \gamma) = (\alpha + \beta) - \gamma$ | $\beta \geq \gamma$ |
| 9. | $\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta$ | $\alpha \geq \beta - \gamma$ |
| 10. | $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$ | $\alpha \geq \beta + \gamma$ |

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

57. Νὰ ἐκτελέσετε μὲ δύο τρόπους τὰς κάτωθι πράξεις :

$$\begin{array}{ll} \alpha) & (100 - 60) + 59 \\ \gamma) & 105 - (80 - 50) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \beta) & (80 - 50) - 25 \\ \delta) & 80 + (40 - 30) \end{array}$$

58. Χρησιμοποιήσατε την ιδιότητα προσθέσεως μιᾶς διαφορᾶς εἰς ἀριθμὸν διὰ νὰ συμπληρώσατε τὰς ἰσότητες.

$$\alpha) 20 + (\alpha - 2) = \quad \beta) 60 + (\alpha - 10) =$$

59. Χρησιμοποιήσατε την ιδιότητα ἀφαιρέσεως μιᾶς διαφορᾶς διὰ νὰ συμπληρώσατε τὰς ἐξῆς ἰσότητες.

$$\alpha) 30 - (\alpha - 10) = \quad \beta) \alpha - (\beta - 12) =$$

$$\gamma) \alpha - (\dots - 5) = \alpha + 5 - \beta$$

$$60. \text{ Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ διαφορὰ } (5 + \alpha) - (3 + \alpha) =$$

27. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εἷς ταμίας ἔχει εἰς τὸ ταμεῖον του 800 δραχ. Ἐν συνεχείᾳ εἰσπράττει 120 δραχ., πληρώνει 50 δραχ. καὶ τέλος εἰσπράττει 70 δραχ. Πόσα χρήματα θὰ ἔχη τελικῶς εἰς τὸ ταμεῖον του ;

Οἱ ὑπολογισμοὶ τοῦ ταμίου μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὰς ἐξῆς κατὰ σειρὰν πράξεις μεταξὺ ἀριθμῶν :

$$800 + 120 = 920$$

$$920 - 50 = 870$$

$$870 + 70 = 940$$

Αἱ τρεῖς αὐταὶ διαδοχικαὶ πράξεις σημειώνονται χάριν συντομίας ὡς ἐξῆς :

$$800 + 120 - 50 + 70 \quad (1)$$

Ἡ γραφὴ (1) ἢ ὁποῖα παριστάνει μίαν διαδοχὴν προσθέσεων εἴτε ἀφαιρέσεων, ὀνομάζεται ἀριθμητικὴ παράστασις.

Οἱ ἀριθμοὶ 80, 120, 50 καὶ 70 λέγονται ὄροι τῆς παραστάσεως αὐτῆς. Τὸ ἐξαγόμενον τῆς διαδοχικῆς ἐκτελέσεως τῶν πράξεων λέγεται τιμὴ τῆς ἀριθμητικῆς παραστάσεως.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἡ ἀριθμητικὴ παράστασις

$$25 - 8 + 5 - 12$$

δηλώνει τὴν ἐξῆς διαδοχὴν πράξεων :

$$25 - 8 = 17, \quad 17 + 5 = 22 \quad \text{καὶ} \quad 22 - 12 = 10$$

Συνεπῶς ἔχει ἀριθμητικὴν τιμὴν 10.

Παρατήρησις

Εἶναι δυνατόν εἰς μίαν ἀριθμητικὴν παράστασιν νὰ ὑπάρχουν παρενθέσεις. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν χρησιμοποιοῦμεν τὰς ιδιότητες τῆς προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως διὰ νὰ εὐρώμεν τὴν τιμὴν τῆς.

$$\text{Π.χ.} \quad 10 + 7 - (5 - 3) = 10 + 7 + 3 - 5 = 15$$

$$10 + 7 + (5 - 3) = 10 + 7 + 5 - 3 = 19$$

$$100 - (34 + 5 + 12) = 100 - 34 - 5 - 12 = 49$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

61. Νά εὑρετε τὰς τιμὰς τῶν ἀριθμητικῶν παραστάσεων :

$$\alpha) 20 - 5 + 15 + 30 - 22 - 7 \quad \beta) 12 - 10 + 30 - 8 + 7$$

62. Νά ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

$$\alpha) 13 - (6 - 1) - (9 - 8 + 1) \quad \beta) 8 + [3 + (7 - 5) - (5 - 2)]$$

63. Νά ἐπιλυθῆ ἡ ἐξίσωσις : $x - 4 + 6 + 2 = 28$

64. Ἐάν $\alpha + \beta = 12$ νά ὑπολογισθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως

$$30 + (\alpha + 3) - (10 - \beta)$$

28. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

28.1. Ὅρισμός

Τὸ ἄθροισμα

$$12 + 12 + 12 + 12 + 12$$

ἀποτελεῖται ἀπὸ ἴσους προσθετέους. Συνεπῶς διὰ νὰ τὸ ὀρίσωμεν ἀρκεῖ νὰ γνωρίζωμεν π ο ἶ ο ν προσθετέον λαμβάνομεν καὶ π ὅ σ α ς φορές.

Διὰ τοῦτο ἀντὶ νὰ γράφωμεν

$$12 + 12 + 12 + 12 + 12 \quad \text{γράφωμεν} \quad 5 \cdot 12$$

Τὸ ἀνωτέρω ἄθροισμα ὀνομάζεται γ ι ν ὀ μ ε ν ο ν 5 ἐπὶ 12.

Εἰς τὸ γινόμενον τοῦτο ὁ ἀριθμὸς 5, ὁ ὁποῖος δηλώνει τὸ πλῆθος τῶν ἴσων ὀρων ὀνομάζεται π ο λ λ α π λ α σ ι α σ τ ῆ ς, ὁ δὲ 12 π ο λ λ α π λ α σ ι α σ τ ῆ ς. Ὁ πολλαπλασιαστής καὶ ὁ πολλαπλασιαστέος ὀνομάζονται ὄ ρ ο ι ἢ π α ρ ἄ γ ο ν τ ε ς τοῦ γινομένου.

Ὅμοιως τὸ ἄθροισμα

$$\beta + \beta + \beta + \beta$$

λέγεται γινόμενον τοῦ 4 ἐπὶ τὸ β καὶ γράφεται $4 \cdot \beta$

Γενικῶς τὸ ἄθροισμα

$$\beta + \beta + \dots + \beta \quad (\alpha \text{ φορές})$$

λέγεται γ ι ν ὀ μ ε ν ο ν τ οῦ α ἐπὶ τὸ β

Γράφεται δὲ $\alpha \cdot \beta$ ἢ $\alpha \times \beta$.

Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν τοῦτον ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ α παριστάνει ἀκέραιον μεγαλύτερον τῆς μονάδος ($\alpha > 1$).

Ἡ πρᾶξις διὰ τῆς ὁποίας εἰς τὸ ζεῦγος (α, β) ἀντιστοιχίζομεν τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \beta$ ὀνομάζεται πολλαπλασιασμός τοῦ α ἐπὶ τὸ β .

$$(\alpha, \beta) \xrightarrow{\times} \alpha \cdot \beta$$

* Δὲν πρέπει νὰ συγχέωμεν τὸ «γινόμενον» μὲ τὸν «πολλαπλασιασμόν». Ὁ πολλαπλασιασμός ἐστὶν πρᾶξις, ἐνῶ τὸ γινόμενον εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως (ἀριθμὸς).

Είναι φανερόν ότι ὅπως ἡ πρόσθεσις καὶ ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι διμελῆς πράξις.


28.2. Εἰδικαὶ περιπτώσεις

Διὰ νὰ γενικεύσωμεν τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καὶ εἰς τὴν περίπτωσηιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι 1 ἢ 0 συμφωνοῦμεν ὅτι :

$$\begin{aligned} 1 \cdot \beta &= \beta, \\ 0 \cdot \beta &= 0 \end{aligned} \quad \beta \in \mathbb{N}_0$$


28.3. Γεωμετρικὴ παράστασις τοῦ γινομένου

Τὸ παραπλευρῶς ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον, σχ. 18 ἔχει διαστάσεις 2cm καὶ 3cm καὶ εἶναι χωρισμένον εἰς τετράγωνα πλευρᾶς 1cm. Τὸ γινόμενον $2 \cdot 3 = 6$, εἶναι ἴσον μὲ τὸ πλῆθος τῶν τετραγώνων τούτων.



Σχ. 18

Γενικῶς : Ἐὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$, τότε τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \beta$ εἶναι ἴσον μὲ τὸ πλῆθος τῶν τετραγώνων πλευρᾶς 1cm εἰς τὰ ὁποῖα χωρίζεται ἓν ὀρθογώνιον μὲ διαστάσεις α cm καὶ β cm, σχ. 19.



Σχ. 19.

29. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

29.1. Ὑπαρξίς γινομένου, μονότιμον

Ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι ἕκαστον γινόμενον εἶναι ἓν ἄθροισμα :

$$\begin{aligned} \text{Π.χ.} \quad 3 \cdot 4 &= 4 + 4 + 4 \\ 5 \cdot \beta &= \beta + \beta + \beta + \beta + \beta \end{aligned}$$

ἐννοοῦμεν ὅτι, ἐὰν δοθοῦν δύο ἀκέραιοι, α, β τότε ὑπάρχει εἷς καὶ μόνον εἷς ἀκέραιος ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \beta$ αὐτῶν.

29.2. Μεταθετικὴ

$$\begin{aligned} \text{Εἶναι} \quad 3 \cdot 5 &= 5 + 5 + 5 = 15 \\ \text{Ἄλλὰ καὶ} \quad 5 \cdot 3 &= 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 \\ \text{Ἦτοι} \quad 3 \cdot 5 &= 5 \cdot 3 \end{aligned}$$

Γενικῶς ἐὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ τότε

$$\boxed{\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha}$$

Ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι πράξις μεταθετικὴ

29. 3. Ουδέτερον στοιχείον

Καθώς είδομεν :

$$3 \cdot 1 = 1 \cdot 3 = 3$$
$$5 \cdot 1 = 1 \cdot 5 = 5$$

Γενικῶς δι' ἕκαστον ἀκέραιον α εἶναι :

$$\alpha \cdot 1 = 1 \cdot \alpha = \alpha$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ μονὰς εἶναι οὐδέτερον στοιχείον εἰς τὸν πολλαπλασιασμόν καὶ μάλιστα τὸ μοναδικόν.

29. 4. Προσεταιριστικὴ

*Ὡς εἶναι τρεῖς ἀκέραιοι κατὰ σειρὰν, π.χ. οἱ ἀκέραιοι 2, 5, 6.
Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$2 \cdot 5 = 10 \qquad 5 \cdot 6 = 30$$
$$\underline{10 \cdot 6 = 60} \qquad \underline{2 \cdot 30 = 60}$$

*Ἡ $(2 \cdot 5) \cdot 6 = 60$ *Ἡ $2 \cdot (5 \cdot 6) = 60$

"Ὡστε $(2 \cdot 5) \cdot 6 = 2 \cdot (5 \cdot 6)$

Γενικῶς δι' ἑκάστην τριάδα ἀκεραίων α, β, γ , εἶναι :

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$$

Ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι πρᾶξις προσεταιριστικὴ

29. 5. Ἐπιμεριστικὴ

α) Ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν :

Εἶναι $3 \cdot (2 + 5) = (2 + 5) + (2 + 5) + (2 + 5)$

ἢ $3 \cdot (2 + 5) = (2 + 2 + 2) + (5 + 5 + 5)$

ἢ $3 \cdot (2 + 5) = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 5$

(Μὲ τὴν γραφὴν $2 \cdot 3 + 3 \cdot 5$ ἐννοοῦμεν τὸ ἀθροισμα $(2 \cdot 3) + (3 \cdot 5)$)

Γενικῶς δι' ἑκάστην τριάδα ἀκεραίων α, β, γ εἶναι :

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

Ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι πρᾶξις ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν.

β) Ὡς πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν :

Παρατηροῦμεν ὅτι : $3 \cdot (7 - 5) = 3 \cdot 2 = 6$

*Ἀλλὰ καὶ $3 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = 21 - 15 = 6$

*Ἄρα $3 \cdot (7 - 5) = 3 \cdot 7 - 3 \cdot 5$

Γενικῶς ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$ καὶ $\beta > \gamma$

τότε

$$\alpha \cdot (\beta - \gamma) = \alpha \cdot \beta - \alpha \cdot \gamma$$

‘Ο πολλαπλασιασμός είναι πράξις έπιμεριστική ως προς την άφαιρέσειν.

‘Εφαρμογαί

1) ‘Η ισότης

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

γράφεται

$$\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta + \gamma)$$

Διατί ;

Τò α’ μέλος αύτῆς είναι άθροισμα δυò γινομένων, ενώ τò β’ μέλος γινόμενον ενός αριθμού επί έν άθροισμα. Συμφώνως προς αύτήν έχομεν :

$$\alpha) \quad 5 \cdot 4 + 5 \cdot 6 = 5 \cdot (4 + 6) \\ = 5 \cdot 10$$

$$\beta) \quad 2 \cdot \alpha + 3 \cdot \alpha = (2 + 3) \cdot \alpha \\ = 5 \cdot \alpha$$

2) ‘Η έπιμεριστική ιδιότης τού πολλαπλασιασμοῦ ως προς τήν πρόσθεσιν μᾶς έπιτρέπει νά ύπολογίσωμεν τò γινόμενον : $(\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta)$ (άθροισμα επί άθροισμα).

$$(\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta) = (\alpha + \beta) \cdot \gamma + (\alpha + \beta) \cdot \delta$$

‘Η

$$(\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta) = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma + \alpha \cdot \delta + \beta \cdot \delta$$

‘Ητοι : Διά νά πολλαπλασιάσωμεν άθροισμα επί άθροισμα πολλα-
σιάζομεν έκαστον προσθετέον τού ενός άθροίσματος με έκαστον προσ-
θετέον τού άλλου άθροίσματος και προσθέτομεν τὰ μερικά γινόμενα.

Π. χ. διά τò γινόμενον $(2 + 4) \cdot (3 + 5)$

έχομεν : $(2 + 4) \cdot (3 + 5) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 5 \\ = 6 + 10 + 12 + 20 = 48$

29. 6. ‘Ιδιότητες διαγραφῆς

α) ‘Από τήν γνωστήν ισοδυναμίαν

$$\alpha = \beta \iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma \quad \text{όπου } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$$

έχομεν

$$\alpha = \beta \iff \alpha + \alpha = \beta + \alpha$$

$$\alpha = \beta \iff \alpha + \alpha = \beta + \beta \quad \text{έπειδή } \alpha = \beta$$

ἤ

$$\alpha = \beta \iff 2 \cdot \alpha = 2 \cdot \beta$$

Εἶναι φανερόν ότι εάν συνεχίσωμεν όμοίως, εύρίσκομεν

$$\alpha = \beta \iff 3 \cdot \alpha = 3 \cdot \beta$$

Γενικῶς, εάν $\gamma \in \mathbb{N}$

τότε

$$\alpha = \beta \iff \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$$

‘Υπογραμμίζομεν ότι ἡ άνωτέρω ισοδυναμία ισχύει όταν ó γ είναι φυ-
σικός αριθμός και όχι μηδέν.

Π.χ. Έκ τῆς ισότητος $6 \cdot \chi = 6 \cdot 7$

ἐπεταί ὅτι $\chi = 7$

ἐνῶ ἐκ τῆς ισότητος $0 \cdot 6 = 0 \cdot 3$

δὲν ἐπεταί ὅτι $6 = 3$

β) Σκεπτόμενοι ὡς ἀνωτέρω, ἐκ τῆς σχέσεως

$$\alpha > \beta \iff \alpha + \gamma > \beta + \gamma$$

ὁδηγοῦμεθα εἰς τὴν σχέσιν

$$\alpha > \beta \iff \alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma \quad \text{ὅπου } \gamma \in \mathbb{N}$$

Π.χ. Έκ τῆς ἀνισότητος $3 > 2$ συνάγομεν ὅτι καὶ $3 \cdot 1524 > 2 \cdot 1524$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

65. Συμπληρώσατε τὰς ισότητας

$$6 \cdot 9 = 9 + 9 + \dots \quad 4 \cdot \alpha = \alpha +$$

66. Συμπληρώσατε τὴν συνεπαγωγὴν $\alpha \cdot \beta = \alpha \implies \beta = ;$

ὅπου $\alpha \neq 0$. Τί δύνασθε νὰ εἴπετε ὅταν $\alpha = 0$

67. Συμπληρώσατε τὰς ισότητας

$$4 \cdot \beta = \beta \cdot \dots \quad 3 \cdot (5 \cdot \alpha) = 15 \cdot \dots$$

68. Νὰ εὑρετε κατὰ δύο τρόπους τὰ γινόμενα

α) $3(4+7)$ β) $(3+2) \cdot (5+4)$ γ) $(8+3) \cdot (12+5)$

69. Νὰ γράψετε ὑπὸ μορφήν γινομένου τὰ ἀθροίσματα

α) $3 \cdot \alpha + 5 \cdot \alpha,$ $7 \cdot \alpha + 3 \cdot \alpha + 2 \cdot \alpha,$ $6 + 9$

70. Τί παθαίνει τὸ γινόμενον δύο ἀκεραίων ὅταν ὁ εἰς ἐξ αὐτῶν αὐξάνεται ἢ ἐλαττοῦται κατὰ μονάδα.

(Χρησιμοποιήσατε ἀριθμητικὰ παραδείγματα καὶ ἐπειτα γενικοὺς ἀριθμούς).

30. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Μία πόλις ἔχει 3 Γυμνάσια. Ἐκαστον Γυμνάσιον ἔχει 6 τάξεις. Ἐκάστη τάξις ἔχει 2 τμήματα. Ἐκαστον τμήμα ἔχει 50 μαθητὰς. Πόσους μαθητὰς ἔχουν τὰ Γυμνάσια τῆς πόλεως αὐτῆς :

Διὰ νὰ ὑπολογίσωμεν τὸν συνολικὸν ἀριθμὸν τῶν μαθητῶν τῶν τριῶν αὐτῶν Γυμνασίων δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν ὡς ἐξῆς :

Ἀριθμὸς τάξεων $3 \cdot 6 = 18$

» τμημάτων $18 \cdot 2 = 36$ ἢ $(3 \cdot 6) \cdot 2 = 36$

» μαθητῶν $36 \cdot 50 = 1800$ ἢ $[(3 \cdot 6) \cdot 2] \cdot 50 = 1800$

Ὁ ἀριθμὸς 1800 λέγεται γινομένου τῶν ἀριθμῶν 3, 6, 2, 50 κατὰ τὴν σειράν αὐτήν·

γράφομεν δὲ $3 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 50 = 1800$

Ἦτοι $3 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 50 = [(3 \cdot 6) \cdot 2] \cdot 50$

Σημειώνομεν ὅτι ἡ γραφή $(3 \cdot 6)$ δηλώνει ἕνα ἀριθμὸν: τὸ γινόμενον $3 \cdot 6 = 18$, ἡ δὲ γραφή $[(3 \cdot 6) \cdot 2]$ δηλώνει ἕνα ἀριθμὸν: τὸ γινόμενον $18 \cdot 2$.

Γενικῶς ὀνομάζομεν γινόμενον τριῶν ἢ περισσοτέρων ἀκεραίων δοθέντων εἰς μίαν σειρὰν, τὸν ἀριθμὸν τὸν ὁποῖον εὐρίσκομεν ὅταν πολλαπλασιάσωμεν τὸν πρῶτον ἐπὶ τὸν δεῦτερον, τὸ γινόμενον ἐπὶ τὸν τρίτον κ.ο.κ. μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου.

*Ἡ συμβολικῶς: Ἐάν $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \in N_0$ τότε $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = [(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma] \cdot \delta$

31. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

31. 1. Μεταθετικὴ ιδιότης

Εἶναι $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 6 \cdot 4 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$

*Ἀλλὰ καὶ $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 4 = 10 \cdot 3 \cdot 4 = 30 \cdot 4 = 120$

*Ἦτοι $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 4$

Γενικῶς $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot \delta \cdot \beta \cdot \gamma = \gamma \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \delta = \dots$, ὅπου $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in N_0$

31. 2. Συνθετικὴ, ἀναλυτικὴ

Εἶναι $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 6 \cdot 4 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$

ἀλλὰ καὶ $2 \cdot (3 \cdot 4) \cdot 5 = 2 \cdot 12 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$

*Ἦτοι $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 2 \cdot (3 \cdot 4) \cdot 5$

Γενικῶς $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma \dots$ ὅπου $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in N_0$

*Ἦτοι εἰς τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων δυνάμεθα:

α) Νὰ ἀντικαταστήσωμεν δύο (ἢ περισσοτέρους) παράγοντας μὲ τὸ γινόμενον αὐτῶν.

β) Νὰ ἀντικαταστήσωμεν ἕνα παράγοντα μὲ δύο (ἢ περισσοτέρους) ἄλλους οἱ ὁποῖοι ἔχουν αὐτὸν ὡς γινόμενον.

*Ἐφαρμογαί. 1) $6 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 2 = 6 \cdot 100 \cdot 2 = 1200$

11) $20 \cdot 25 \cdot 3 = 5 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 3 = 5 \cdot 100 \cdot 3 = 1500$

31. 3. Γινόμενον ἐπὶ ἀριθμὸν

*Ἐάν πολλαπλασιάσωμεν τὸ γινόμενον $(2 \cdot 3 \cdot 5)$ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον 4.

*Ἐχομεν $(2 \cdot 3 \cdot 5) \cdot 4 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 4$ (Ἀναλυτικὴ ιδιότης)

καὶ $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 4 = 2 \cdot 3 \cdot (5 \cdot 4)$ (Συνθετικὴ ιδιότης)

*Ἦτοι $(2 \cdot 3 \cdot 5) \cdot 4 = 2 \cdot 3 \cdot (5 \cdot 4)$

Γενικῶς

$$\begin{aligned}(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta &= \alpha \cdot \beta \cdot (\gamma \cdot \delta) \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma \quad \text{ὅπου } \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}_0 \\ &= (\alpha \cdot \delta) \cdot \beta \cdot \gamma\end{aligned}$$

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἓν γινόμενον μὲ ἓνα ἀριθμὸν ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἓνα μόνον παράγοντα τοῦ γινομένου μὲ τὸν ἀριθμὸν αὐτόν.

Ἐφαρμογή: $(2 \cdot \alpha) \cdot 3 = (2 \cdot 3) \cdot \alpha = 6 \cdot \alpha$

31. 4. Γινόμενον ἐπὶ γινόμενον

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ γινόμενον 2.3 ἐπὶ τὸ γινόμενον 4.5.

Ἐχομεν: $(2 \cdot 3) \cdot (4 \cdot 5) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$ (Ἀναλυτικὴ ἰδιότης)

Γενικῶς

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot (\gamma \cdot \delta) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \quad \text{ὅπου } \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}_0$$

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο γινόμενα ἀρκεῖ νὰ σχηματίσωμεν ἓν νέον γινόμενον τὸ ὁποῖον νὰ περιέχῃ ὅλους τοὺς παράγοντας τῶν δύο γινομένων καὶ μόνον αὐτούς.

Ἐφαρμογή: $(2 \cdot \alpha) \cdot (3 \cdot \beta) = 2 \cdot \alpha \cdot 3 \cdot \beta = (2 \cdot 3) \alpha \cdot \beta = 6 \cdot \alpha \cdot \beta$ ὅπου $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$

32. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΩΝ

Οἱ ἀριθμοὶ 0, 7, 14, 21, 28 προκύπτουν ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ 7 ἐπὶ 0, 1, 2, 3, 4 ἀντιστοίχως. Διὰ τοῦτο λέγονται πολλαπλασία τοῦ 7.

Γενικῶς τὸ γινόμενον ἑνὸς ἀκεραίου α μὲ οἰοδήποτε ἀκέραιον λέγεται πολλαπλάσιον τοῦ α .

Ἦτοι τὰ πολλαπλάσια τοῦ $\alpha \in \mathbb{N}_0$ εἶναι: $0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots$

Τὸ σύνολον $\Pi(7) = \{0, 7, 14, 21, 28, \dots\}$

τὸ ὁποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ πολλαπλάσια τοῦ 7, λέγεται σύνολον τῶν πολλαπλασίων τοῦ ἀκεραίου 7.

Τοιοῦτρόπως τὸ σύνολον τῶν πολλαπλασίων τοῦ α εἶναι:

$$\Pi(\alpha) = \{0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots\}$$

Εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ σύνολον τῶν πολλαπλασίων ἑνὸς ἀκεραίου εἶναι ἓν ἀπειροσύνολον.

Παρατηρήσεις

1) Ἐπειδὴ $0 \cdot \alpha = 0$, ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}_0$, ἔπεται ὅτι τὸ 0 εἶναι πολλαπλάσιον οἰοδήποτε ἀκεραίου.

2) Ἐπειδὴ $\alpha \cdot 1 = \alpha$, ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}_0$, ἔπεται ὅτι ἕκαστος ἀκέραιος εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ ἑαυτοῦ του.

Π Ι Ν Α Ξ

Ίδιότητων του πολλαπλασιασμού

1. Έάν $\alpha, \beta \in \mathbf{N}_0$, τότε υπάρχει εἷς καὶ μόνον εἷς ἀκέραιος $\gamma = \alpha \cdot \beta$.
2. Έάν $\alpha, \beta \in \mathbf{N}_0$, τότε $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$
3. Έάν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{N}_0$, τότε $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$
4. » » τότε $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$
5. » $\alpha \in \mathbf{N}_0$ τότε $\alpha \cdot 1 = 1 \cdot \alpha = \alpha$
6. » $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{N}_0$ τότε $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot \gamma \cdot \beta \cdot \delta = \alpha \cdot \delta \cdot \beta \cdot \gamma$.
7. » $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbf{N}_0$ τότε $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot (\delta \cdot \beta) \cdot \gamma$
8. » » τότε $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot \beta \cdot (\gamma \cdot \delta)$
9. » » τότε $(\alpha \cdot \beta) \cdot (\gamma \cdot \delta) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$
10. » $\alpha, \beta \in \mathbf{N}_0, \gamma \in \mathbf{N}$ » $\alpha = \beta \iff \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$
11. » » » $\alpha > \beta \iff \alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

71. Εἰς τὰς ἰσότητας 1) $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = 24$ 11) $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = 72$ νὰ δώσετε ἐκάστην δυνατὴν τιμὴν εἰς τὰ γράμματα α, β, γ ὥστε νὰ ἀληθεύουν αὐτὰ.
72. Ποῖα ἰδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ γράψωμεν :
- 1) $2 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 4 = 8 \cdot 63 = 2 \cdot 7 \cdot 36$ 11) $25 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 5 = 100 \cdot 5 = 25 \cdot 20$
73. Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν εἶναι 50. Πῶς θὰ μεταβληθῇ τοῦτο :
- α) Έάν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἕνα παράγοντα ἐπὶ 3, β) ἐάν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἕνα παράγοντα ἐπὶ 5 καὶ τὸν ἄλλον ἐπὶ 2.
74. Συμπληρώσατε τὰς κατωτέρω σχέσεις :
- $$\chi = 3 \iff 5 \cdot \chi = ; \quad \chi < 4 \iff 7 \cdot \chi < \dots$$
75. α) Γράψατε τὸ σύνολον τῶν πολλαπλασιῶν τοῦ 6 τὰ ὅποια περιέχονται μεταξὺ 20 καὶ 76.
β) Γράψατε 3 διψήφια καὶ 4 τριψήφια πολλαπλασία τοῦ 15.

33. Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

33. 1. Όρισμός

Ό ἐπιστάτης τοῦ Γυμνασίου διὰ νὰ δώσῃ 5 κιμωλίας εἰς ἕκαστον τῶν 12 τμημάτων αὐτοῦ λαμβάνει ἐν ὄλῳ κιμωλίας $12 \cdot 5 = 60$.

Όταν φθάσῃ εἰς τὴν Α' τάξιν λησμονεῖ πόσας κιμωλίας πρέπει νὰ δώσῃ εἰς ἕκαστον τμημα. Τοιοῦτοτρόπως γεννᾶται τὸ ἔξης πρόβλημα :

Τὸ γινόμενον τοῦ 12 μὲ «κάποιον» ἀκέραιον ἰσοῦται μὲ 60. Ποῖος εἶναι ὁ ἀκέραιος οὗτος;

Ἦτοι, ἐάν παραστήσωμεν μὲ χ τὸν ζητούμενον ἀκέραιον θὰ πρέπει

$$12 \cdot \chi = 60 \quad (1)$$

Ο αριθμός $\chi = 5$ με τον όποιον πρέπει να πολλαπλασιάσωμεν τον 12 διὰ να δώση γινόμενον 60 λέγεται ἀκριβές πηλίκον τῶν ἀριθμῶν 60 καὶ 12

Γράφομεν δὲ $60 : 12 = \chi$ (2)

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐννοῦμεν ὅτι αἱ σχέσεις (1) καὶ (2) ἐκφράζουν τὸ αὐτὸ πρόβλημα, ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν (εἶναι ταυτόσημοι). Ἦτοι: Ἐὰν ἰσχύη ἑκάστη ἀπὸ αὐτὰς θὰ ἰσχύη καὶ ἡ ἄλλη. Διὰ τοῦτο γράφομεν

$$12 \cdot \chi = 60 \iff 60 : 12 = \chi$$

Γενικῶς: Ἐὰν $\beta \in \mathbb{N}_0, \alpha \in \mathbb{N}$ καὶ ὑπάρχη ἀκέραιος χ τοιοῦτος ὥστε

$$\alpha \cdot \chi = \beta$$

τότε λέγομεν ὅτι ὁ χ εἶναι τὸ ἀκριβές πηλίκον τοῦ β διὰ α .

Γράφομεν δὲ $\beta : \alpha = \chi$

Ἡ πρᾶξις μετὴν ὁποῖαν εἰς τὸ ζεῦγος (β, α) ἀντιστοιχοῦμεν τὸ ἀκριβές πηλίκον $\beta : \alpha$, ἐὰν ὑπάρχη, ὀνομάζεται τελεία διαίρεσις.

$$(\beta, \alpha) \xrightarrow{\quad} \beta : \alpha$$

β εἶναι ὁ διαιρετέος αὐτῆς καὶ ὁ α διαιρέτης. Τὸ σύμβολον τῆς διαιρέσεως εἶναι :

33.2. Ἄς ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ παράδειγμά μας.

Ὁ ἐπιστάτης ἐγνώριζεν ὅτι ὁ 60 ἦτο πολλαπλάσιον τοῦ 12. Ἐλησμόνησεν ὁμως ποῖον πολλαπλάσιον.

Ἄς ἴδωμεν πρὸς τοῦτο τὰ διαδοχικὰ πολλαπλάσια τοῦ 12

0·12	1·12	2·12	3·12	4·12	5·12 . . .
"Η 0	12	24	36	48	60 . . .

Μεταξὺ αὐτῶν ὑπάρχει τὸ 60. Εἶναι δὲ $60 = 5 \cdot 12$. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ 5 εἶναι τὸ ἀκριβές πηλίκον τοῦ 60 διὰ 12.

Γενικῶς, ἐὰν α καὶ β εἶναι δύο ἀκέραιοι, $\alpha \neq 0$, διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἀκριβές πηλίκον $\beta : \alpha$ σχηματίζομεν τὸ σύνολον τῶν διαδοχικῶν πολλαπλασιῶν τοῦ α .

$$\{ 0 \cdot \alpha, 1 \cdot \alpha, 2 \cdot \alpha, 3 \cdot \alpha, \dots, \pi \cdot \alpha, \dots \}$$

Ἐπὶ τούτῳ ὑπάρχουν τότε δύο περιπτώσεις :

- 1) Ὁ β νὰ εἶναι στοιχεῖον τοῦ ἀνωτέρω συνόλου· π.χ. νὰ εἶναι $\beta = \pi \cdot \alpha$. Τότε ὑπάρχει εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 ἀκριβές πηλίκον τοῦ β διὰ α · εἶναι τὸ π .
- 11) Ὁ β νὰ μὴ εἶναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου τούτου. Τότε δὲν ὑπάρχει ἀκριβές πηλίκον τοῦ β διὰ α εἰς τὸ \mathbb{N}_0 .

“Ωστε: ‘Η τελεία διαιρέσεις β διὰ α είναι δυνατή εις τὸ σύνολον N_0 μόνον ὅταν ὁ β εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ α .

33.3. Ἴσοδυναμία σχέσεων $\alpha \cdot \beta = \gamma$, $\gamma : \beta = \alpha$, $\gamma : \alpha = \beta$.

Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν τῆς διαιρέσεως ἔχομεν :

$$\begin{aligned} 3 \cdot 4 = 12 & \iff 12 : 4 = 3 \\ 4 \cdot 3 = 12 & \iff 12 : 3 = 4 \end{aligned}$$

Γενικῶς, ὅπως φαίνεται παραστατικῶς καὶ εἰς τὸ σχ. 19, ἐὰν μεταξὺ τριῶν ἀκεραίων α , β , γ εἶναι $\alpha \cdot \beta = \gamma$, θὰ εἶναι ἐπίσης καὶ $\gamma : \beta = \alpha$ καὶ $\gamma : \alpha = \beta$. Ἐπίσης, ἐὰν εἶναι $\gamma : \beta = \alpha$ (ἢ $\gamma : \alpha = \beta$) θὰ εἶναι καὶ $\alpha \cdot \beta = \gamma$.

Ἡ συμβολικῶς :

$\alpha \cdot \beta = \gamma$	\iff	$\gamma : \beta = \alpha$
$\alpha \cdot \beta = \gamma$	\iff	$\gamma : \alpha = \beta$

Παραδείγματα

- α) Ἀφοῦ εἶναι $4 \cdot 5 = 20$ εἶναι ἐπίσης $20 : 4 = 5$ καὶ $20 : 5 = 4$
 β) Ἀφοῦ εἶναι $36 : 12 = 3$ εἶναι ἐπίσης $3 \cdot 12 = 36$ καὶ $36 : 3 = 12$

33.4. Ἐπίλυσις ἀπλῶν ἐξισώσεων

- α) Νὰ εὐρεθῇ ἄριθμὸς x τοιοῦτος ὥστε $8 \cdot x = 56$
 Διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἀνωτέρω ἐξίσωσιν σκεπτόμεθα ὅτι :

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \beta = \gamma & \iff \beta = \gamma : \alpha \\ \text{Ἄρα } 8 \cdot x = 56 & \iff x = 56 : 8 \quad \text{Ἦτοι } x = 7 \end{aligned}$$

Ἐπαλήθευσις $8 \cdot 7 = 56$

- β) Νὰ εὐρεθῇ ἄριθμὸς x τοιοῦτος ὥστε $x : 7 = 4$

$$\begin{aligned} \text{Σκεπτόμεθα ὅτι } \gamma : \beta = \alpha & \iff \gamma = \alpha \cdot \beta \\ \text{Ἄρα } x : 7 = 4 & \iff x = 7 \cdot 4 \quad \text{Ἦτοι } x = 28 \end{aligned}$$

Ἐπαλήθευσις $28 : 7 = 4$

- γ) Νὰ εὐρεθῇ ἄριθμὸς x τοιοῦτος ὥστε $72 : x = 8$

$$\begin{aligned} \text{Σκεπτόμεθα ὅτι } \alpha : \gamma = \beta & \iff \alpha : \beta = \gamma \\ \text{Ἄρα } 72 : x = 8 & \iff 72 : 8 = x \quad \text{Ἦτοι } x = 9 \\ \text{Ἐπαλήθευσις } 72 : 9 & = 8 \end{aligned}$$

Γενικῶς, ἐκάστη ἐξίσωσις τῆς μορφῆς $\alpha \cdot x = \beta$ ἔχει τὴν λύσιν $x = \beta : \alpha$

Ὁμοίως ἡ ἐξίσωσις τῆς μορφῆς $x : \alpha = \beta$ ἔχει τὴν λύσιν $x = \beta \cdot \alpha$

καὶ ἡ ἐξίσωσις τῆς μορφῆς $\beta : x = \alpha$ ἔχει τὴν λύσιν $x = \beta : \alpha$

ὅπου $\alpha \in N$, $\beta \in N_0$ καὶ αἱ ἐξισώσεις ἔχουν λύσιν εἰς τὸ σύνολον N_0 .

Ἐξίσωσις	Λύσις
$\alpha \cdot \chi = \beta$	$\chi = \beta : \alpha$
$\chi : \alpha = \beta$	$\chi = \beta \cdot \alpha$
$\beta : \chi = \alpha$	$\chi = \beta : \alpha$

33.5. Ἡ διαίρεσις ὡς πρᾶξις ἀντίστροφος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Ἐάν τὸν ἀριθμὸν 4 πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 5 λαμβάνομεν 20. Ἐάν τὸν 20 διαιρέσωμεν διὰ 5 ἐπανευρίσκομεν 4

$$4 \cdot 5 = 20 \quad \text{καὶ} \quad 20 : 5 = 4$$

*Ἦτοι :

$$(4 \cdot 5) : 5 = 4$$

Γενικῶς

$$(\alpha \cdot \beta) : \beta = \alpha$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ διαίρεσις εἶναι ἀντίστροφος πρᾶξις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

34. Εἰδικαὶ Περίπτωσις Διαίρεσεως

34.1. Ἡ διαίρεσις $0 : \alpha$, ὅπου $\alpha \in \mathbf{N}$.

Θέτομεν $0 : \alpha = \chi \iff 0 = \chi \cdot \alpha$

Ἐπειδὴ $\alpha \neq 0$, τὸ γινόμενον $\chi \cdot \alpha$ εἶναι 0 μόνον ὅταν $\chi = 0$.

*Ἄρα $0 : \alpha = 0$

34.2. Ἡ διαίρεσις $0 : 0$

Θέτομεν $0 : 0 = \chi \iff 0 = 0 \cdot \chi$

Ἡ ἰσότης $0 = 0 \cdot \chi$ ἀληθεύει δι' οἰανδήποτε τιμὴν τοῦ χ . (Διὰτί ;)

Συνεπῶς, ἕκαστος ἀριθμὸς δύναται νὰ εἶναι πηλίκον τῆς διαίρεσεως $0 : 0$
Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ διαίρεσις $0 : 0$ εἶναι ἀόριστος.

34.3. Ἡ διαίρεσις $\alpha : 0$, ὅπου $\alpha \in \mathbf{N}$

Θέτομεν $\alpha : 0 = \chi \iff \alpha = 0 \cdot \chi$

Ἡ ἰσότης $\alpha = 0 \cdot \chi$ δι' οὐδεμίαν τιμὴν τοῦ χ ἀληθεύει (Διὰτί) ;

Συνεπῶς ἡ διαίρεσις $\alpha : 0$ εἶναι ἀδύνατος.

34.4. Ἡ διαίρεσις $\alpha : 1$, ὅπου $\alpha \in \mathbf{N}_0$

Θέτομεν $\alpha : 1 = \chi \iff \alpha = \chi \cdot 1 \iff \alpha = \chi$

*Ἄρα $\alpha : 1 = \alpha$

34.5. Ἡ διαίρεσις $\alpha : \alpha$ ὅπου $\alpha \in \mathbf{N}$

Θέτομεν $\alpha : \alpha = \chi \iff \alpha = \alpha \cdot \chi$

Ἡ ισότης $\alpha = \alpha \cdot \chi$ ἀληθεύει μόνον ὅταν $\chi = 1$ (Διὰτί ;)

*Ἀρα $\alpha : \alpha = 1$

A Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

76) Ἀπὸ τὴν ισότητα $325 = 13 \cdot 25$ ποίας τελείας διαιρέσεις συνάγετε;

77. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἐξισώσεις :

α) $20 \cdot \chi = 80$

β) $\chi : 19 = 21$

γ) $63 : \chi = 7$

78. Ποῖα ἀπὸ τὰς κατωτέρω Ισότητας εἶναι ἀληθεῖς καὶ ποῖα δὲν εἶναι ;

$0 : 5 = 5$

$0 : 3 = 0$

$0 : 0 = 2$

$3 : 0 = 3$

$3 : 1 = 0$

$3 : 1 = 3$

$6 : 6 = 1$

$6 : 6 = 0$

35. Η ΑΤΕΛΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

3.5.1 Ὅρισμός

Καθὼς εἶδομεν ἡ ἐξίσωσις $12 \cdot \chi = 60$ ἔχει τὴν λύσιν $\chi = 5$ διότι ὁ 60 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 12.

*Ἄς λάβωμεν ἀντὶ τοῦ 60 τὸν ἀκέραιον 67· ἦτοι ἄς λάβωμεν τὴν ἐξίσωσιν

$$12 \cdot \chi = 67$$

Διὰ νὰ ἴδωμεν ἐὰν ἡ ἀνωτέρω ἐξίσωσις ἔχη λύσιν εἰς τὸ σύνολον \mathbf{N}_0 ἀρκεῖ νὰ ἴδωμεν ἐὰν τὸ 67 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 12. Διὰ τοῦτο γράφομεν τὸ σύνολον τῶν διαδοχικῶν πολλαπλασίων τοῦ 12.

$$A = \{ 12 \cdot 0, 12 \cdot 1, 12 \cdot 2, 12 \cdot 3, 12 \cdot 4, 12 \cdot 5, 12 \cdot 6, \dots \}$$

$$\text{*Ἡ } A = \{ 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 \dots \}$$

Καθὼς παρατηροῦμεν τὸ 67 δὲν εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 12. Τοῦτο σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει εἰς τὸ σύνολον \mathbf{N}_0 ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 67 διὰ 12. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι ἡ διαίρεσις εἶναι ἀτελής εἰς τὸ σύνολον \mathbf{N}_0 . Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ 67 περιέχεται μεταξύ δύο διαδοχικῶν πολλαπλασίων τοῦ 12. Συγκεκριμένως μεταξύ τοῦ 60 καὶ τοῦ 72.

$$60 < 67 < 72$$

$$\text{*Ἡ } 5 \cdot 12 < 67 < 6 \cdot 12$$

Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω διπλὴν ἀνισότητα ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 5 εἶναι ὁ μέγιστος ἀκέραιος μὲ τὸν ὅποιον εἶναι δυνατὸν νὰ πολλαπλασιασθῇ ὁ 12 καὶ νὰ δώσῃ γινόμενον μικρότερον τοῦ 67. Τὸν ἀκέραιον 5 ὀνομάζομεν ἀκέραιον πηλίκον τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως 67 διὰ 12· τὴν δὲ διαφορὰν

$$67 - 5 \cdot 12 = 67 - 60 = 7$$

ὀνομάζομεν ὑπόλοιπον αὐτῆς.

Γενικῶς : Ἐὰν εἶναι α καὶ β δύο ἀκέραιοι $\alpha \neq 0$, $\beta > \alpha$ τότε, ἐὰν τὸ β δὲν εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ α , θὰ περιέχεται μεταξύ δύο διαδοχικῶν πολλαπλασίων $\pi \alpha$ καὶ $(\pi + 1) \cdot \alpha$ αὐτοῦ.

$$\text{*Ἦτοι :} \quad \pi \cdot \alpha < \beta < (\pi + 1) \cdot \alpha \quad (1)$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι ἡ διαίρεσις β διὰ α εἶναι ἀτελής εἰς τὸ σύνολον N_0 .

Ἀπὸ τὴν διπλὴν ἀνισότητα (1) ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ ἀκέραιος π εἶναι ὁ μέγιστος ἀκέραιος τοῦ ὁποίου τὸ γινόμενον ἐπὶ α εἶναι μικρότερον τοῦ β . Διὰ τοῦτο ὁ ἀκέραιος π λέγεται ἀκέραιον πηλίκον τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως β διὰ α .

$$\text{Ἡ διαφορά} \quad \beta - (\pi \cdot \alpha) = \nu \quad (2)$$

εἶναι μικρότερα τοῦ α (διατί;) καὶ ὀνομάζεται ὑπόλοιπον τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως β διὰ α .

Ἐκ τῆς (2) λαμβάνομεν

$$\left. \begin{aligned} \beta &= (\pi \alpha) + \nu \\ \nu &< \alpha \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Ἐπειδὴ δὲ συνήθως παριστάνομεν μὲ Δ τὸν διαιρέτεον, δ τὸν διαιρέτην, π τὸ πηλίκον καὶ ν τὸ ὑπόλοιπον, αἱ ἀνωτέρω σχέσεις (3) γράφονται :

$$\left. \begin{aligned} \Delta &= \delta \cdot \pi + \nu \\ \nu &< \delta \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Αἱ σχέσεις (4), ὡς εἶναι γραμμῆναι, ἀποτελοῦν τὰς βασικὰς συνθήκας τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως. Μᾶς ἐπιτρέπουν δὲ ἐκ τῶν Δ καὶ δ νὰ εὕρωμεν κατὰ ἓνα μόνον τρόπον * δύο ἄλλους ἀριθμούς : τὸ ἀκέραιον πηλίκον π καὶ τὸ ὑπόλοιπον ν τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως Δ διὰ δ .

Εἰς τὸ παράδειγμά μας ἡ σχέσις

$$67 = 5 \cdot 12 + 7$$

δηλώνει ὅτι ὁ 5 εἶναι τὸ ἀκέραιον πηλίκον, ὁ 12 διαιρέτης καὶ ὁ $7 < 12$ τὸ ὑπόλοιπον.

Ἡ ἴδια σχέσις δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ λάβωμεν τὸν 12 ὡς πηλίκον καὶ τὸν 5 ὡς διαιρέτην, διότι τότε τὸ ὑπόλοιπον 7 θὰ ἦτο μεγαλύτερον τοῦ διαιρέτου 5.

Παρατηρήσεις

i) Ἐὰν εἰς τὰς συνθήκας (4) εἶναι $\nu = 0$, ἔχομεν $\Delta = \delta \cdot \pi$.

*Ἦτοι ἡ διαίρεσις εἶναι τελεία καὶ ὁ ἀκέραιος π εἶναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον αὐτῆς.

ii) Ἐὰν λάβωμεν $\Delta = 2$ καὶ $\delta = 3$ ἦτοι $\Delta < \delta$ παρατηροῦμεν ὅτι αἱ συνθήκαι (4) ἀληθεύουν μόνον ὅταν $\pi = 0$.

* Πράγματι $(\pi \cdot \delta) + \nu < (\pi \cdot \delta) + \delta$ διότι $\nu < \delta$
 $\eta \quad \Delta < (\pi + 1) \delta$

Δηλαδή ὁ ἀκέραιος π εἶναι ὁ μοναδικὸς μέγιστος ἀκέραιος διὰ τὸν ὅποιον εἶναι $\pi \cdot \delta < \Delta$.

$$2 = 0 \cdot 3 + 2 \quad \text{καί} \quad 2 < 3$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι τὸ ἀκέραιον πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2 διὰ 3 εἶναι τὸ μηδέν.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

79. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ δύο διαδοχικά πολλαπλάσια τοῦ 15 μεταξύ τῶν ὁποίων περιέχεται ὁ ἀριθμὸς 80. Νὰ ἐκφρασθῇ τὸ ἀποτέλεσμα μὲ μίαν διπλῆν ἀνισότητα· νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀκέραιον πηλίκον καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως.

80. Νὰ γραφῇ τὸ σύνολον τῶν ὑπολοίπων τῶν διαιρέσεων αἱ ὁποῖαι ἔχουν ὡς διαιρέτην :

$$\text{i) } 4 \qquad \text{ii) } 9 \qquad \text{iii) } \gamma \in \mathbb{N}_0$$

81. Συμπληρώσατε τὸν ἀκέραιον ὁ ὁποῖος λείπει εἰς τὰς ἰσότητες :

$$\dots = 97 \cdot 122 - 38$$

$$615 = \dots \cdot 30 - 15$$

82. Ὁ διαιρέτης μᾶς διαιρέσεως εἶναι ἴσος μὲ 7 ποῖα εἶναι αἱ δυνατὰ τιμὰ τοῦ ὑπολοίπου;

36. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

36.1. Παρατηροῦμεν ὅτι ἐνῶ $35 : 7 = 5$, δὲν ὑπάρχει ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως $7 : 35$ εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 .

Ἔστω : **Δὲν ἰσχύει ἡ μεταθετικὴ ιδιότης.**

36.2. Ἐὰς λάβωμεν τὰς διαιρέσεις $(40 : 10) : 2$ καὶ $40 : (10 : 2)$

ἔχομεν : α) $40 : 10 = 4$ καὶ $4 : 2 = 2$

ἔστω $(40 : 10) : 2 = 2$ (1)

β) $10 : 2 = 5$ καὶ $40 : 5 = 8$

ἔστω $40 : (10 : 2) = 8$ (2)

Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) προκύπτει ὅτι

$$(40 : 10) : 2 \neq 40 : (10 : 2)$$

Ἔστω : **Δὲν ἰσχύει ἡ προσεταιριστικὴ ιδιότης.**

36.3. Πολλαπλασιασμὸς τῶν ὄρων διαιρέσεως μὲ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμὸν.

Εἰς τὸν παραπλεύρως πίνακα ἔχομεν συγκεντρώσει στοιχεῖα ἀπὸ τέσσαρας διαιρέσεις. Ἐὰς προσέξωμεν τὸν διαιρετέον (Δ), τὸ διαιρέτην (δ), τὸ πηλίκον (π) καὶ τὸ ὑπόλοιπον (ν). Παρατηροῦμεν ὅτι :

Ἐὰν πολλαπλασιάζεται ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης ἐπὶ 2, 3, 4 τότε τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 2, 3, 4 ἀντιστοίχως.

Δ	δ	π	ν
23	5	4	3
46	10	4	6
69	15	4	9
92	20	4	12

Γενικῶς, ἄς λάβωμεν τὰς συνθήκας διαιρέσεως

$$\Delta = \delta \cdot \pi + \nu, \quad \nu < \delta$$

καὶ ἄς πολλαπλασιάσωμεν ἐκάστην τούτων μετὰ τὸν φυσικὸν ἀριθμὸν μ .

$$\begin{array}{l} \text{Ἔχομεν} \\ \text{ἢ} \\ \text{»} \end{array} \quad \begin{array}{l} \Delta \cdot \mu = (\delta \cdot \pi + \nu) \cdot \mu, \\ \Delta \cdot \mu = \mu \cdot \delta \cdot \pi + \mu \cdot \nu, \\ \Delta \cdot \mu = (\mu \cdot \delta) \cdot \pi + \mu \cdot \nu \end{array} \quad \begin{array}{l} \mu \cdot \nu < \mu \cdot \delta \\ \mu \cdot \nu < \mu \cdot \delta \\ \mu \cdot \nu < \mu \cdot \delta \end{array} \quad (1)$$

Ἐκ τῶν συνθηκῶν (1) συνάγομεν ὅτι τὸ γινόμενον $\mu \cdot \nu$ εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως εἰς τὴν ὁποίαν διαιρετέος εἶναι τὸ γινόμενον $\Delta \cdot \mu$, διαιρέτης τὸ γινόμενον $\delta \cdot \mu$ καὶ πηλίκον τὸ π .

Ὡστε: Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν καὶ τοὺς δύο ὅρους μιᾶς διαιρέσεως μετὰ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμὸν τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται μετὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Τοιουτοτρόπως, μία τελεία διαιρέσις παραμένει τελεία καὶ μετὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ὀρων τῆς μετὰ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμὸν.

36.4. Διαίρεσις διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ ἑνὸς ἀθροίσματος μετὰ ὅρους πολλαπλάσια τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

Εἰς τὸ ἄθροισμα $12 + 20 + 16$ ὅλοι οἱ ὅροι του εἶναι πολλαπλάσια τοῦ 4.

$$\begin{array}{l} \text{Ἦτοι ἔχομεν:} \\ 12 = 4 \cdot 3 \quad \Leftrightarrow \quad 12 : 4 = 3 \\ 20 = 4 \cdot 5 \quad \Leftrightarrow \quad 20 : 4 = 5 \\ \underline{16 = 4 \cdot 4} \quad \Leftrightarrow \quad \underline{16 : 4 = 4} \end{array}$$

Ἀπὸ τὰ πρῶτα μέλη τῶν ἀνωτέρω ἰσοδυναμιῶν ἔχομεν

$$12 + 20 + 16 = 4 \cdot 3 + 4 \cdot 5 + 4 \cdot 4$$

$$\text{Ἦ} \quad 12 + 20 + 16 = 4 \cdot (3 + 5 + 4) \quad (\text{Διατί ;})$$

$$\text{Ἦ} \quad (12 + 20 + 16) : 4 = 3 + 5 + 4 \quad (1)$$

Ἀπὸ τὰ δεύτερα μέλη ἔχομεν

$$(12 : 4) + (20 : 4) + (16 : 4) = 3 + 5 + 4 \quad (2)$$

Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) λαμβάνομεν

$$(12 + 20 + 16) : 4 = (12 : 4) + (20 : 4) + (16 : 4)$$

Γενικῶς: Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma, \in N_0$ καὶ πολλαπλάσια τοῦ ν τότε

$$(\alpha + \beta + \gamma) : \nu = (\alpha : \nu) + (\beta : \nu) + (\gamma : \nu)$$

Ὡστε: Ἡ διαίρεσις εἶναι ἐπιμεριστικὴ πρᾶξις ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν ὅταν αἱ μερικαὶ διαιρέσεις εἶναι δυναταὶ εἰς τὸ N_0 .

36.5. Διαίρεσις διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ μιᾶς διαφορᾶς μετὰ ὅρους πολλαπλάσια τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

Οί άκέραιοι 28 και 21 είναι πολλαπλάσια του 7.

$$\text{Ήτοι έχουμε} \quad 28 = 4 \cdot 7 \iff 28 : 7 = 4$$

$$\text{και} \quad \underline{21 = 3 \cdot 7} \iff \underline{21 : 7 = 3}$$

Από τὰ πρῶτα μέλη τῶν άνωτέρω ίσοδυναμιῶν έχουμε

$$28 - 21 = 7 \cdot 4 - 7 \cdot 3 = 7 \cdot (4 - 3) \quad (\text{Διατί ;})$$

$$\text{Ήτοι} \quad (28 - 21) : 7 = 4 - 3 \quad (1)$$

Από τὰ δεύτερα μέλη τῶν ίδιων ίσοδυναμιῶν έχουμε

$$(28 : 7) - (21 : 7) = 4 - 3 \quad (2)$$

Εκ τῶν (1) και (2) έχουμε :

$$(28 - 21) : 7 = (28 : 7) - (21 : 7)$$

Γενικῶς, εάν οί άκέραιοι α, β είναι πολλαπλάσια του φυσικοῦ άριθμοῦ v και

$\alpha > \beta$ τότε

$$\boxed{(\alpha - \beta) : v = (\alpha : v) - (\beta : v)}$$

Ὡστε : Ἡ διαίρεσις είναι επιμεριστική πράξις ὡς πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν ὅταν ὅλαι αἱ μερικαὶ διαιρέσεις είναι δυνατὰ εἰς τὸ \mathbb{N}_0 .

36.6. Διαιρέσεις διὰ φυσικοῦ άριθμοῦ ἐνός γινομένου τὸ ὁποῖον ἔχει ἕνα τοῦλάχιστον παράγοντα πολλαπλάσιον τοῦ άριθμοῦ αὐτοῦ.

Ἐστω τὸ γινόμενον $13 \cdot 12 \cdot 5$ τοῦ ὁποῖου ὁ παράγων 12 είναι πολλαπλάσιον τοῦ 4.

$$\begin{aligned} \text{Ἐχουμε} \quad 13 \cdot 12 \cdot 5 &= 13 \cdot (3 \cdot 4) \cdot 5 \\ &= 4 \cdot (13 \cdot 3 \cdot 5) \end{aligned} \quad (\text{Διατί ;})$$

$$\text{Ἡ} \quad (13 \cdot 12 \cdot 5) : 4 = 13 \cdot 3 \cdot 5 \\ = 13 \cdot (12 : 4) \cdot 5$$

Γενικῶς, εάν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0, v \in \mathbb{N}$ και $\beta =$ πολλαπλάσιον τοῦ v τότε

$$\boxed{(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) : v = \alpha \cdot (\beta : v) \cdot \gamma} \quad (1)$$

Εἰδική περίπτωση

Ἐάν $v = \beta$, ἡ σχέση (1) γίνεται

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) : \beta = \alpha \cdot (\beta : \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot 1 \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma$$

Ὡστε: Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἕν γινόμενον δι' ἐνός ἐκ τῶν παραγόντων του, ἀρκεῖ νὰ ἐξαλείψωμεν αὐτὸν ἀπὸ τὸ γινόμενον.

Ἐφαρμογή : $(25 \cdot 38 \cdot 13) : 38 = 25 \cdot 13$

36.7. Πηλίκον άριθμοῦ διὰ γινομένου

Διὰ τὸ πηλίκον $50 : (2 \cdot 5)$ έχουμε

$$2.5 = 10 \quad \text{και} \quad 50 : 10 = 5$$

$$\text{Ήτοι} \quad 50 : (2.5) = 5 \quad (1)$$

Παρατηρούμεν όμως ότι

$$50 : 2 = 25 \quad \text{και} \quad 25 : 5 = 5$$

$$\text{Ήτοι} \quad (50 : 2) : 5 = 5 \quad (2)$$

Έκ τῶν (1) και (2) ἔχομεν ὅτι

$$50 : (2.5) = (50 : 2) : 5$$

Γενικῶς, ἔαν $\alpha \in \mathbb{N}_0$ και $\beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}$, ἔχομεν :

$$\alpha : (\beta \cdot \gamma \cdot \delta) = | (\alpha : \beta) : \gamma | : \delta$$

μέ τήν προϋπόθεσιν ὅτι ὄλαι αἱ σημειούμεναι διαιρέσεις εἶναι δυναταί εἰς τὸ \mathbb{N}_0 .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

83. Ὑπολογίσατε μέ διαφόρους τρόπους τὰ ἐξῆς πηλικά :

$$36 : (3 \cdot 4) = \quad (36 + 24) : 12$$

$$(24 - 8) : 2 = \quad (53 \cdot 14) : 7$$

$$(12 \cdot 19 \cdot 5) : 19 = \quad (12 \cdot 19 \cdot 5) : 38$$

84) Νά ἐκτελεσθοῦν αἱ διαιρέσεις :

$$(27 \cdot \alpha - 12) : 3, \quad 36\alpha : (3\alpha \cdot 4) = \quad (120 \cdot \alpha + 8\alpha + 24) : 8$$

85. Ἐπαληθεύσατε ὅτι, ἔαν εἰς τὸν διαιρετέον μιᾶς διαιρέσεως προσθέσωμεν ἓν πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως δέν μεταβάλλεται.

37. ΑΛΛΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

37.1. Ἐκτὸς τῶν ἀριθμητικῶν παραστάσεων αἱ ὁποῖαι περιέχουν προσθέσεις εἴτε ἀφαιρέσεις συνητήσαμεν ἤδη και ἄλλας ἀριθμητικὰς παραστάσεις, ἤτοι ἀριθμητικὰς παραστάσεις εἰς τὰς ὁποίας εἶναι σημειωμένοι και ἄλλαι πράξεις (πολλαπλασιασμός ἢ διαιρέσεις).

$$\text{37.2.} \quad \text{Ήως γνωστὸν ἢ γραφή} \quad 3 + (8 : 2) \quad (1)$$

δηλώνει τὰς ἐξῆς κατὰ σειράν πράξεις :

$$\alpha) \quad 8 : 2 = 4 \quad \text{και} \quad \beta) \quad 3 + 4 = 7$$

$$\text{Ήτοι} \quad 3 + (8 : 2) = 3 + 4 = 7$$

$$\text{Ήμοίως ἢ γραφή} \quad 23 - (8 \cdot 2) \quad (2)$$

$$\text{δηλώνει :} \quad \alpha) \quad 8 \cdot 2 = 16 \quad \text{και} \quad \beta) \quad 23 - 16 = 7$$

$$\text{Ήτοι} \quad 23 - (8 \cdot 2) = 23 - 16 = 7$$

Διὰ νὰ ἀπλοποιήσωμεν τήν γραφήν τῶν παραστάσεων (1) και (2) παραλείπομεν τὰς παρενθέσεις και συμφωνοῦμεν τὰ ἐξῆς :

Όταν εἰς μίαν ἀριθμητικὴν παράστασιν εἶναι σημειωμένοι και πολλαπλασιασμοὶ ἢ διαιρέσεις ἐκτελοῦμεν πρῶτα τὰς πράξεις αὐτὰς και

Έπειτα τὰς προσθέσεις ἢ ἀφαιρέσεις κατὰ σειράν ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ.

Παραδείγματα

Ἐντὶ $7 + (4 \cdot 5)$ γράφομεν $7 + 4 \cdot 5$ καὶ εὐρίσκομεν $7 + 20 = 27$
 » $(20 : 5) - 2$ » $20 : 5 - 2$ » $4 - 2 = 2$
 » $(60 : 2) + (5 \cdot 3)$ » $60 : 2 + 5 \cdot 3$ » $30 + 15 = 45$
 » $3 + (7 \cdot 2) - (2 + 3 \cdot 2)$ » $3 + 7 \cdot 2 - (2 + 6)$
 ἢ $3 + 14 - 8$ » $17 - 8 = 9$

Ὁμοίως ἡ γραφή $6 \cdot 5 - 7 \cdot 3 + 1$ σημαίνει $(6 \cdot 5) - (7 \cdot 3) + 1 = 30 - 21 + 1 = 10$
 » » $12 : 2 + 3 \cdot 2 - 1$ » $(12 : 2) + (3 \cdot 2) - 1 = 6 + 6 - 1 = 11$
 » » $3 \cdot 4 : 2 + 5$ » $(3 \cdot 4) : 2 + 5 = 12 : 2 + 5 = 11$

Ἐντιπαράδειγμα

Ἡ παράστασις $(7 + 4) \cdot 5$ δὲν γράφεται $7 + 4 \cdot 5$
 Πράγματι: $(7 + 4) \cdot 5 = 11 \cdot 5 = 55$ ἐνῶ $7 + 4 \cdot 5 = 7 + 20 = 27$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

86. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ κάτωθι ἀριθμητικαὶ παραστάσεις:

- α) $6 \cdot 5 - 3 \cdot 2$ β) $6 \cdot 5 - 3 \cdot 2 - 2$
 γ) $88 : 4 \cdot 2 + 3 \cdot 4 - 5$ δ) $120 : 8 - 2 \cdot 4 + 2$
 ε) $3 + 4 \cdot 2 + 8 \cdot (12 - 4)$

Π Ι Ν Α Κ

Ἰδιοτήτων τῆς διαιρέσεως

1. $\Delta : \delta = \pi \iff \Delta = \delta \cdot \pi$ (τελεία διαιρέσεις)
2. $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ καὶ $\upsilon < \delta$ (ἀτελής διαιρέσεις)
3. Ἐάν $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ καὶ $\upsilon < \delta$
 τότε $\mu \cdot \Delta = (\mu \cdot \delta) \pi + \mu \cdot \upsilon$ καὶ $\mu \cdot \upsilon < \mu \cdot \delta$
4. $(\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$
5. $(\alpha - \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) - (\beta : \gamma)$
6. $(\alpha \cdot \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) \cdot \beta$
7. $\alpha : (\beta \cdot \gamma) = (\alpha : \beta) : \gamma$
8. $0 : \alpha = 0$, $0 : 0$ ἀόριστος,
 $\alpha : \alpha = 1$ $\alpha : 0$ ἀδύνατος,

Ἐννοεῖται ὅτι αἱ ἀνωτέρω ιδιότητες ἰσχύουν ὑπὸ τοὺς ἐξῆς περιορισμοὺς :

- α) Οἱ διαιρέται νὰ εἶναι διάφοροι τοῦ μηδενός.
 β) Αἱ σημειωμένα διαιρέσεις νὰ εἶναι δυνατὰ εἰς τὸ N_0 .

38. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Καθώς εἶδομεν εἰς τὸν κεφάλαιον τῆς ἀριθμήσεως ἕκαστος ἀριθμὸς εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀποτελεῖται ἀπὸ μονάδας διαφόρων τάξεων. Π.χ. ὁ ἀριθμὸς 2537 ἀποτελεῖται ἀπὸ 7 μονάδας (Μ), 3 δεκάδας (Δ), 5 ἑκατοντάδας (Ε) καὶ 2 χιλιάδας (Χ), γράφεται δὲ κατὰ τρόπον ἀνεπτυγμένον ὡς ἑξῆς :

$$2537 = 2 X + 5 E + 3 \Delta + 7 M$$

Ὅμοίως $4052 = 4 X + 0 E + 5 \Delta + 2 M$

Ἡ ἀνωτέρω ἀνεπτυγμένη γραφή καὶ αἱ ιδιότητες τῶν πράξεων θὰ μᾶς βοηθήσουν εἰς τὴν κατανόησιν τῆς τεχνικῆς τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

39. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

39.1. Διακρίνομεν τὰς ἑξῆς περιπτώσεις :

α) Οἱ ἀριθμοὶ εἶναι μονοψηφιοί.

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα δύο μονοψηφίων, π.χ. τὸ ἄθροισμα 5 σὺν 3, ἀρκεῖ νὰ γράψωμεν μετὰ τὸ 5 τοὺς τρεῖς διαδοχικοὺς ἀκεραίους 6, 7, 8 καὶ νὰ λάβωμεν τὸν τελευταῖον ἐξ αὐτῶν. Τὸ ἄθροισμα δύο μονοψηφίων ὀφείλομεν νὰ τὸ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης.

Ὁ κατωτέρω πίναξ μᾶς βοηθεῖ εἰς τὴν ἀσκήσιν τῆς προσθέσεως μονοψηφίων ἀριθμῶν.

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ὁ τρόπος συντάξεως τοῦ πίνακος γίνεται ἀμέσως φανερός, ὅταν προσέξωμεν κατὰ ποῖον τρόπον εἶναι γραμμένοι αἱ διαδοχικαὶ σειραὶ τῶν ἀριθμῶν. Τὸ ἄθροισμα π.χ. $5 + 3$ εὐρίσκειται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς σειρᾶς μὲ ἐπικεφαλίδα 5 καὶ τῆς στήλης μὲ ἐπικεφαλίδα 3. Τὸ ἴδιον ἄθροισμα εὐρίσκομεν εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς σειρᾶς μὲ ἐπικεφαλίδα 3 καὶ τῆς στήλης μὲ ἐπικεφαλίδα 5. Διὰτι ;

β) Οί αριθμοί είναι πολυψήφιοι.

Ἡ πρόσθεσις πολυψηφίων ἀριθμῶν ἀνάγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν μονοψηφίων ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{r} \text{Ἔστω τὸ ἄθροισμα} \quad 235 + 528 \\ 235 = 2E + 3\Delta + 5M \\ 528 = 5E + 2\Delta + 8M \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 235 \\ 528 \end{array}} \right\} \text{(Πρόσθεσις ἄθροισμάτων)}$$

$$7E + 5\Delta + 13M = 7E + 6\Delta + 3M \quad (\text{Διότι } 10M = 1\Delta)$$

$$= 763$$

Συνομώτερον ἢ ἀνωτέρω διαδικασία ἐκτελεῖται μὲ τὴν γνωστὴν πρακτικὴν διάταξιν τῆς προσθέσεως. Θέτομεν τὰς μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως εἰς τὴν αὐτὴν στήλην καὶ μεταφέρομεν νοερῶς τὸ κρατούμενον μιᾶς τάξεως εἰς τὴν ἀμέσως ἐπομένην τάξιν.

$$\begin{array}{r} 235 \\ 528 \\ \hline 763 \end{array}$$

39.2. Δι' ἐφαρμογῆς τῶν ιδιοτήτων τῆς προσθέσεως εἶναι δυνατόν νὰ ἐλέγξωμεν ἐὰν ἔν ἄθροισμα εὐρέθη ὀρθῶς (δοκιμῆ) ἢ καὶ νὰ ἐκτελέσωμεν πολλακίς ἀσφαλέστερον μίαν πρόσθεσιν.

895	Ἡ πρόσθεσις ἐκ	124	} Μερικὰ ἄθροίσματα		
379	τῶν ἄνω πρὸς	7832		} 7956	
+ 27	τὰ κάτω καὶ ἀν-	28	} Ἡ ἀντικατάστασις		
1521	τιστρόφως πρέ-	589		} προσθετέων μὲ τὸ	
2822	πει νὰ δώσῃ τὸ	375			} ἄθροισμα τῶν διευ-
	αὐτὸ ἀποτέλεσμα	8948 = 8948			
	(Διατί;)		} τὸ τελικὸν ἀποτέ-		
				} λεσμα (Διατί;)	

40. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

40.1. Διακρίνομεν τὰς ἑξῆς περιπτώσεις :

α) Οί αριθμοί εἶναι μονοψήφιοι

$$9 - 5 = 4 \quad \text{διότι} \quad 4 + 5 = 9$$

β) Ἐκαστὸν ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου εἶναι μικρότερον ἢ ἴσον τοῦ ψηφίου τῆς αὐτῆς τάξεως τοῦ μειωτέου.

$$\begin{array}{r} 678 = 6E + 7\Delta + 8M \\ 375 = 3E + 7\Delta + 5M \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 678 \\ 375 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Ἀφαίρεσις ἄθροισματος} \\ \text{ἀπὸ ἄθροισμα} \end{array}$$

$$3E + 0\Delta + 3M = 303$$

$$\begin{array}{r} \text{Συντόμως} \\ 678 \\ - 375 \\ \hline 303 \end{array}$$

γ) Μερικὰ ψηφία τοῦ ἀφαιρετέου εἶναι μεγαλύτερα τῶν ἀντιστοιχῶν ψηφίων τοῦ μειωτέου.

$$4827 = 4X + 8E + 2\Delta + 7M$$

$$369 = 3E + 6\Delta + 9M$$

Προσθέτομεν εἰς τὸν μειωτέον καὶ ἀφαιρέ-
τέον τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἤτοι προσθέτομεν:

Εἰς τὸν μειωτέον 10M, 10Δ

Εἰς τὸν ἀφαιρέτέον 1Δ, 1E

$$4X + 8E + 2\overset{10}{\Delta} + 7M$$

$$+ 3E + 6\overset{10}{\Delta} + 9M$$

$$\hline 4X + 4E + 5\Delta + 8M = 4458$$

Ἡ συντόμως 4827

$$- 369$$

$$\hline 4458$$

40.2. Δοκιμὴ

Διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀφαιρέσεως, χρησιμοποιοῦμεν μίαν ἀπὸ τὰς γνω-
στὰς ἰσοδυναμίας.

$$\alpha - \beta = \gamma \iff \alpha = \beta + \gamma \iff \alpha - \gamma = \beta$$

$$\text{Π.χ. } 837 - 253 = 584 \iff 584 + 253 = 837 \iff 837 - 584 = 253$$

41. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

41.1. Διακρίνομεν τὰς ἑξῆς περιπτώσεις :

α) Γινόμενον μονοψηφίων

$$\begin{aligned} \text{Π.χ.} \quad 3 \cdot 5 &= 5 + 5 + 5 \\ &= 10 + 5 = 15 \end{aligned}$$

Τὰ γινόμενα, τὰ ὁποῖα εὐρίσκομεν, ὅταν πολλαπλασιάσωμεν δύο οἰοῦσθῆ-
ποτε μονοψηφίους ἀριθμοὺς εἶναι συγκεντρωμένα εἰς τὸν κατωτέρω Πυθαγο-
ρείον* πίνακα :

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81

* Πυθαγόρας : Ἕλληνας φιλόσοφος καὶ μαθηματικός, γεννηθεὶς εἰς Σάμον περὶ τὸ 580
π.χ. Ἰδρυτὴς τῆς Πυθαγορείου Σχολῆς, ἧτις ἀπέτελεσεν κέντρον ἀναπτύξεως τῶν Μαθηματικῶν,
καὶ ἰδίως τῆς Γεωμετρίας.

Ο τρόπος τῆς κατασκευῆς τοῦ πίνακος γίνεται ἀμέσως φανερός, ἐὰν προσέξωμεν ὅτι ι) ἡ πρώτη στήλη ἔχει μόνον μηδενικά. ιι) Εἰς τὴν δευτέραν στήλην οἱ ἀριθμοὶ αὐξάνονται κατὰ ἓν, εἰς τὴν τρίτην κατὰ δύο, εἰς τὴν τετάρτην κατὰ τρία κ.ο.κ.

Τὸ γινόμενον $5 \cdot 7$ εὐρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς σειρᾶς με ἐπικεφαλίδα 5 καὶ τῆς στήλης με ἐπικεφαλίδα 7 ἢ...

β) Ὁ εἰς παράγων εἶναι 10, 100, 1000 κ.ο.κ.

Π.χ.

$$\begin{aligned} 15 \cdot 10 &= 15 \text{ δεκάδες} \\ &= 150 \text{ μονάδες} \\ 15 \cdot 100 &= 15 \text{ ἑκατοντάδες} \\ &= 1500 \text{ μονάδες} \end{aligned}$$

Ὡστε:...

γ) Ὁ εἰς παράγων μονοψήφιος καὶ ὁ ἄλλος πολυψήφιος

Π.χ.

$$\begin{array}{r} 218 = 2E + 1\Delta + 8M \quad (\text{Ἐπιμεριστικὴ ιδιότης}) \\ \times \quad 3 \\ \hline 654 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ \hline 6E + 3\Delta + 24M = 6E + 5\Delta + 4M \\ = 654 \end{array}$$

δ) Καὶ οἱ δύο παράγοντες πολυψήφιοι

Π.χ.

$$\begin{aligned} 318 \cdot 253 &= 318 \cdot (2E + 5\Delta + 3M) \\ &= 318 \cdot 200 + 318 \cdot 50 + 318 \cdot 3 \quad (\text{Ἐπιμεριστικὴ ιδιότης}) \end{aligned}$$

Ἵπολογίζομεν τὰ μερικὰ γινόμενα καὶ προσθέτομεν:

$$\begin{array}{r} 318 \cdot 200 = (318 \cdot 2) \cdot 100 = 636 \cdot 100 = 63600 \quad (\text{Γινόμενον ἐπὶ } 200) \\ 318 \cdot 50 = (318 \cdot 5) \cdot 10 = 1590 \cdot 10 = 15900 \quad \text{»} \quad \text{»} \quad 50 \\ 318 \cdot 3 = 954 \quad \text{»} \quad \text{»} \quad 3 \end{array}$$

$$318 \cdot 200 + 318 \cdot 50 + 318 \cdot 3 = 80454$$

Ἡ διάταξις τῆς πράξεως γίνεται κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον ὡς ἑξῆς:

$$\begin{array}{r} 318 \\ \times 253 \\ \hline 954 \quad (\text{Γινόμενον } 318 \text{ ἐπὶ } 3) \\ 1590 \quad (\text{»} \quad \text{»} \quad \text{»} \quad 50) \\ 636 \quad (\text{»} \quad \text{»} \quad \text{»} \quad 200) \\ \hline 80454 \end{array}$$

Ὄταν ὁ πολλαπλασιαστής ἔχῃ ἐνδιάμεσα μηδενικά ἔχομεν τὴν ἐξῆς συντομίαν:

$$\begin{array}{r}
 \times \quad 3768 \\
 \quad 1007 \\
 \hline
 26376 \\
 0000 \\
 0000 \\
 \hline
 3768 \\
 \hline
 3794376
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \times \quad 3768 \\
 \quad 1007 \\
 \hline
 26376 \\
 3768 \\
 \hline
 3794376
 \end{array}$$

41.2. Δοκιμή τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Διὰ τὴν δοκιμὴν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ χρησιμοποιοῦμεν τὴν μεταθετικὴν ιδιότητα, ἐναλλάσσοντες τὸν πολλαπλασιαστὴν μὲ τὸν πολλαπλασιαστέον.

41.3. Συντομίαι τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Εἰς πολλὰς περιπτώσεις ἡ ἐφαρμογὴ τῶν γνωστῶν ιδιοτήτων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ μᾶς ὁδηγεῖ συντομώτερον εἰς τὸ ἀποτέλεσμα.

α) Ὁ εἰς τῶν παραγόντων εἶναι, 9, 99, 999,

$$\begin{aligned}
 \text{Π.χ. } 35 \cdot 9 &= 35 \cdot (10 - 1) \\
 &= 35 \cdot 10 - 35 \cdot 1 \\
 &= 350 - 35 = 315
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 28 \cdot 99 &= 28 \cdot (100 - 1) \\
 &= 2800 - 28 \cdot 1 \\
 &= 2800 - 28 = 2772
 \end{aligned}$$

β) Ὁ εἰς τῶν παραγόντων εἶναι 11, 101, 1001,

$$\begin{aligned}
 \text{Π.χ. } 32 \cdot 11 &= 32 \cdot (10 + 1) \\
 &= 32 \cdot 10 + 32 \cdot 1 \\
 &= 320 + 32 = 352
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 175 \cdot 101 &= 175 \cdot (100 + 1) \\
 &= 17500 + 175 \cdot 1 \\
 &= 17500 + 175 = 17675
 \end{aligned}$$

42. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

Διὰ τὴν κατανόησιν τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῆς διαιρέσεως, ὑπενθυμίζομεν τὰς βασικὰς συνθήκας.

$$\left. \begin{array}{l} \Delta = \delta\pi + \upsilon \\ \upsilon < \delta \end{array} \right\}$$

Διακρίνομεν τὰς ἐξῆς περιπτώσεις :

42.1. Ὁ διαιρέτης καὶ τὸ πηλίκον εἶναι μονοψήφιοι

*Ἐστω ἡ διαιρέσις τοῦ 65 διὰ 7. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ πυθαγορείου πίνακος εὐρίσκομεν

$$65 = 7 \cdot 9 + 2$$

*Ἄρα $\pi = 9$ καὶ $\upsilon = 2$

Αί διαιρέσεις αὐται ἐκτελοῦνται συνήθως ἀπὸ μνήμης.

42. 2. Ὁ διαιρέτης μονοψήφιος καὶ τὸ πηλίκον πολυψήφιον.

*Ἐστω ἡ διαίρεσις 953 διὰ 7.

Εἶναι: $7.100 < 953 < 7.1000$

*Ἄρα τὸ πηλίκον θὰ εἶναι τριψήφιος ἀριθμός.

Διὰ τὸν ὑπολογισμόν τῶν ψηφίων τοῦ ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς:

α) Ψηφίον ἐκατοντάδων (E): Ὁ Διαιρετέος γράφεται

$$\begin{aligned} 953 &= 9E + 5\Delta + 3M \\ &= (7E + 2E) + 5\Delta + 3M \end{aligned}$$

Ἡ διαίρεσις $7E : 7$ εἶναι τέλεια καὶ δίδει πηλίκον 1. *Ἄρα $E = 1$.

β) Ψηφίον δεκάδων (Δ): Ἀπὸ τὴν προηγουμένην διαίρεσιν ἔχομεν ὑπόλοιπον

$$\begin{aligned} 2E + 5\Delta + 3M &= 25\Delta + 3M \\ &= (21\Delta + 4\Delta) + 3M \end{aligned}$$

Αἱ 21Δ διαιρούμεναι διὰ 7 δίδουν ἀκριβῆς πηλίκον 3. *Ἄρα $\Delta = 3$.

γ) Ψηφίον μονάδων (M): Ἡ προηγουμένη διαίρεσις ἀφήνει ὑπόλοιπον

$$\begin{aligned} 4\Delta + 3M &= 43M \\ &= 42M + 1M \end{aligned}$$

Αἱ $42M$ διαιρούμεναι διὰ 7 δίδουν ἀκριβῆς πηλίκον 6. *Ἄρα $M = 6$.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω τὸ ζητούμενον πηλίκον εἶναι

$$1E + 3\Delta + 6M = 136$$

Τὸ τελικὸν ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως εἶναι 1.

Εἰς τὴν χώραν μας ἡ ἀνωτέρω διαδοχὴ τῶν πράξεων γίνεται συντόμως μὲ τὴν γνωστὴν πρακτικὴν διάταξιν τῆς διαιρέσεως

953	7
25	
43	136
1	

42.3. Ὁ διαιρέτης καὶ τὸ πηλίκον εἶναι πολυψήφιοι.

Καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν εὐρίσκομεν πρῶτον τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων τοῦ πηλίκου, ἐν συνεχείᾳ ὑπολογίζομεν τὰ ψηφία αὐτοῦ, ὡς ἀνωτέρω.

Παράδειγμα 1ον: Εἰς τὴν διαίρεσιν 3763 διὰ 23 τὸ πηλίκον εἶναι τριψήφιον, διότι

$$23 \cdot 100 < 3763 < 23 \cdot 1000$$

Διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς πράξεως, γράφομεν :

$$\begin{aligned} 3763 &= 3X + 7E + 6\Delta + 3M \\ &= 37E + 6\Delta + 3M \end{aligned}$$

Παράδειγμα 2ον : Εἰς τὴν διαίρεσιν $3763:52$ τὸ πηλίκον εἶναι διψήφιον, διότι

$$52 \cdot 10 < 3763 < 52 \cdot 100$$

Διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς πράξεως γράφομεν

$$\begin{aligned} 3763 &= 3X + 7E + 6\Delta + 3M \\ &= 37E + 6\Delta + 3M \\ &= 376\Delta + 3M \end{aligned}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ἀρχίζομεν ἀπὸ τὰς δεκάδας τοῦ διαιρετέου, διότι αἱ ἑκατοντάδες τοῦ (37) δὲν διαιροῦνται διὰ τοῦ 52.

Εἰς τὴν πρακτικὴν διάταξιν τῆς διαιρέσεως τοῦτο σημαίνει ὅτι, ἐνῶς ὁ διαιρετέος ἔχει δύο ψηφία, χωρίζομεν τρία ψηφία ἀπὸ τὸν διαιρετέον διὰ νὰ ἀρχίσωμεν τὴν διαίρεσιν.

Διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς διαιρέσεως χρησιμοποιοῦμεν τὰς συνθήκας.

$$\left. \begin{aligned} \Delta &= \delta\pi + \nu \\ \nu &< \delta \end{aligned} \right\}$$

Π.χ. εἰς τὴν διαίρεσιν μὲ $\Delta = 953$ καὶ $\delta = 7$

ἡ εὕρεσις τοῦ $\pi = 136$ καὶ $\nu = 1$, εἶναι ὀρθή, διότι $1 < 7$ καὶ $953 = 7 \cdot 136 + 1$.

43. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

43.1. Πρόσθεσις

Πρόβλημα : Ἡ ΣΤ' τάξις ἐνὸς Γυμνασίου ἔχει 48 μαθητάς, ἡ Ε' 15 περισσότερους ἀπὸ τὴν ΣΤ' καὶ ἡ Δ' 12 περισσότερους ἀπὸ τὴν Ε'. Πόσους μαθητάς ἔχουν συνολικῶς αἱ 3 αὗται τάξεις ;

Κατὰ τὸ πρόβλημα τοῦτο ἔχομεν :

Ἀριθμὸς μαθητῶν	ΣΤ' τάξεως	48
	Ε' »	$48 + 15$
	Δ' »	$(48 + 15) + 12$

Συνολικὸς ἀριθμὸς μαθητῶν : $48 + (48 + 15) + (48 + 15) + 12$

$$\eta \quad 48 + 63 + 75 = 186$$

"Ὡστε αἱ 3 τελευταῖαι τάξεις ἔχουν συνολικῶς 186 μαθητᾶς.

43.2. Ἀφαιρέσεις.

Ἡ ἀφαίρεσις χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ἐπίλυσιν προβλημάτων τῶν ἐξῆς δύο τύπων :

α) Ἔχει τις α δραχ. καὶ δαπανᾷ ἐξ αὐτῶν β δραχ. Πόσαι δραχμαὶ ἀπομένουν ;

β) Ἔχει τις α δραχμάς καὶ εἰς ἄλλος β δραχ. Πόσας δραχμάς περισσοτέρας ἀπὸ τὸν δευτέρον ἔχει ὁ πρῶτος ; (Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι $\alpha > \beta$).

Εἶναι φανερόν ὅτι καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις θὰ πρέπει ἀπὸ τὸ α νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ β . Εἰς τὴν πρώτην ὅμως περίπτωσιν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀφαιρέσεως αὐτῆς δεικνύει πόσαι δραχ. ἀπέμειναν διὰ τοῦτο καὶ ὀνομάζεται ὑ π ὅ λ ο ι π ο ν τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ α πλὴν β .

Εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀφαιρέσεως δεικνύει τὴν ὑ π ε ρ ο χ ῆ ν τῶν χρημάτων τοῦ πρώτου ὡς πρὸς τὰ χρήματα τοῦ δευτέρου διὰ τοῦτο ὀνομάζεται δ ι α φ ο ρ ᾶ μεταξύ α καὶ β .

Σ η μ ε ῖ ω σ ι ς. Σημειοῦμεν ὅτι, ὡσάκις ἔχομεν νὰ προσθέσωμεν ἢ ἀφαιρέσωμεν συγκεκριμένους ἀριθμούς, πρέπει νὰ προσέχωμεν νὰ εἶναι οὗτοι ὁμοειδεῖς (νὰ ἀναφέρονται εἰς πράγματα μὲ τὴν ἴδιαν ὀνομασίαν).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

87. Τὸ ἄθροισμα τριῶν ἀριθμῶν εἶναι 53775. Τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων εἶναι 43253 καὶ ὁ δεύτερος εἶναι 17473. Νὰ εὑρεθοῦν οἱ ἄλλοι ἀριθμοί.

88. Εἰς ἔμπορος ὀφείλει 300.000 δραχ. καὶ κατέβαλεν ἑναντι τοῦ χρέους του διαδοχικῶς 27450 δραχ. 65880 δραχ. 84978 δραχ. Πόσα χρήματα ὀφείλει ἀκόμη ;

89. Εἰς ἕν ἐργοστάσιον ἐργάζονται 100 ἄτομα, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ. Οἱ ἄνδρες καὶ τὰ παιδιὰ μαζὺ εἶναι 70, ἐνῶ οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ μαζὺ 40. Πόσοι εἶναι οἱ ἄνδρες, πόσαι αἱ γυναῖκες καὶ πόσα τὰ παιδιὰ ;

90. Ἐάν ἐλαττώσωμεν κατὰ 35 τὸν μειωτέον μιᾶς διαφορᾶς καὶ αὐξήσωμεν τὸν ἀφαιρέτεον κατὰ 16, ποῖαν μεταβολὴν ὑφίσταται ἡ διαφορὰ ;

44. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Καθὼς εἶναι γνωστὸν ὁ πολλαπλασιασμὸς χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ἐπίλυσιν προβλημάτων τοῦ ἐξῆς τύπου.

Δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων. Π.χ. ἐν αὐτοκίνητον τρέχει μὲ σταθερὰν ταχύτητα 60 km/h. Εἰς 4 h πόσα χιλιόμετρα θὰ διανύσῃ ;

Ἔχομεν	$60 \text{ km} + 60 \text{ km} + 60 \text{ km} + 60 \text{ km}$
ἢ	$4 \cdot 60 \text{ km} = 240 \text{ km}$.

Εἰς τὰ προβλήματα τοῦ ἀνωτέρω τύπου πολλαπλασιάζομεν ἕνα συγκεκριμένον ἀριθμὸν (πολλαπλασιαστέος) μὲ ἕνα ἄλλον, τὸν ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς

άφηρημένον (πολλαπλασιαστικής). Ὡς τόσον ὑπάρχουν προβλήματα, εἰς τὰ ὅποια ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο συγκεκριμένους ἀριθμούς· τότε τὸ ἐξαγόμενον εἶναι ἑτεροειδές καὶ πρὸς τοὺς δύο παράγοντας.

Π.χ. διὰ τὴν εὐρεσιν τοῦ ἐμβαδοῦ ἑνὸς ὀρθογωνίου με διαστάσεις 3 m καὶ 4 m, ἔχομεν

$$3m \cdot 4m = 12 m^2 \quad (m \neq m^2).$$

45. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

1ον Πρόβλημα: Θέλομεν νὰ μοιράσωμεν 3.600 δραχ. εἰς 8 ἀπόρους μαθητὰς. Πόσας δραχμάς θὰ δώσωμεν εἰς ἕκαστον;

Καθὼς γνωρίζομεν, ὅταν δίδεται ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ὁμοειδοῦς πρὸς αὐτὰς μονάδος, ἐκτελοῦμεν διαίρεσιν.

Συγκεκριμένως διὰ τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ἔχομεν:

$$3.600 \text{ δραχ.} : 8 = 450 \text{ δραχ.}$$

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι: Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (3.600 δραχ.), διαιρέτης εἶναι ὁ ἀφηρημένος ἀριθμὸς 8, ὁ ὁποῖος δεικνύει εἰς πόσα ἴσα μέρη μερίζεται ὁ διαιρετέος, τὸ δὲ πηλίκον εἶναι ὁμοειδές πρὸς τὸν διαιρετέον ὡς μέρος αὐτοῦ.

2ον Πρόβλημα: Θέλομεν νὰ τοποθετήσωμεν 1.300 kg. σάπωνος εἰς κιβώτια χωρητικότητος 25 kg. Πόσα κιβώτια θὰ χρειασθῶμεν;

Καθὼς γνωρίζομεν, ὅταν δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (χωρητικότης ἑνὸς κιβωτίου) καὶ ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν ὁμοειδῶν πρὸς αὐτὴν μονάδων, ζητοῦμεν δὲ νὰ εὐρωμεν τὸ πλῆθος τῶν πολλῶν αὐτῶν μονάδων, ἐκτελοῦμεν διαίρεσιν.

Συγκεκριμένως εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ἔχομεν:

$$1300 \text{ kg.} : 25 \text{ kg.} = 52$$

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι:

Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (1300 kg.), διαιρέτης ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (25 kg.) καὶ πηλίκον ὁ ἀφηρημένος ἀριθμὸς 52, ὁ ὁποῖος δηλώνει πόσας φορὰς περιέχεται ὁ διαιρετέος εἰς τὸν διαιρετέον.

Τὰ ἀνωτέρω δύο προβλήματα εἶναι ἀντιπροσωπευτικὰ τῶν δύο γνωστῶν τύπων διαίρεσεως: Μερισμοῦ (1ον πρόβλημα) καὶ μετρήσεως (2ον πρόβλημα).

Καθὼς εἶδομεν εἰς τὴν διαίρεσιν μερισμοῦ, μερίζομεν ἓν μέγεθος (Διαιρετέος) εἰς ἴσα μέρη (τὸ πλῆθος των καθορίζει ὁ διαιρέτης). Εἰς τὴν διαίρεσιν μετρήσεως εὐρίσκομεν πόσας τὸ πολὺ φορὰς ἓν μέγεθος (διαιρέτης) περιέχεται εἰς ἓν ἄλλο ὁμοειδές πρὸς αὐτὸ μέγεθος (διαιρετέος).

Καὶ εἰς τὰ δύο εἶδη διαίρεσεως, ἂν ὑπάρχη ὑπόλοιπον, εἶναι ὁμοειδές πρὸς τὸν διαιρετέον.

Τὸ εἶδος τῆς διαίρεσεως καθορίζεται ἐκάστην φορὰν ἐκ τῆς φύσεως τοῦ προβλήματος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

91. Δύο έργαται ειργάσθησαν μερικὰς ἡμέρας καὶ ἔλαβον ὁ μὲν πρῶτος 750 δρχ., ὁ δὲ δευτέρος 525 δρχ. Ὁ πρῶτος ἐλάμβανεν 15 δρχ. τὴν ἡμέραν περισσότερον ἀπὸ τὸν δευτέρον Ζητεῖται: α) Πόσας ἡμέρας ειργάσθησαν, β) τὸ ἡμερομίσθιον ἐκάστου.

92. Ἡγόρασε κάποιος ἀπὸ τὸν παντοπώλην 11 kg. ἐλαίου καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ἓν χιλιοδραχμον. Ὁ παντοπώλης τοῦ ἐπέστρεψεν 769 δρχ. Πόσον ἠγόρασεν τὸ κιλὸν τοῦ ἐλαίου;

93. 12 άτομα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐπλήρωσαν μαζῶ δι' ἓν γεῦμα 364 δρχ. Ἐκαστος ἐκ τῶν ἀνδρῶν ἐπλήρωσεν 32 δρχ. καὶ ἐκάστη ἐκ τῶν γυναικῶν 28 δρχ. Πόσοι ἦσαν οἱ ἄνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναῖκες;

94. Εἰς τὸ γινόμενον 427. 25 ἀξάνομεν τὸν πολλαπλασιαστέον κατὰ 36. Νὰ εὑρεθῇ πόσῳ ἀξάνει τὸ γινόμενον, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν κανονικῶς τὸν πολλαπλασιασμόν.

95. Μία ἀγελὰς μετὰ τοῦ μόσχου τῆς ἐπωλήθησαν ἀντὶ 4800 δρχ. Ἡ ἀξία τῆς ἀγελᾶδος ἦτο 8πλασία τῆς ἀξίας τοῦ μόσχου σὺν 300 δρχ. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀξία ἐκάστου ζώου.

96. Ὑπάλληλος ὑπελογίσθη ὅτι, ἐάν δαπανᾷ 5520 δρχ. τὸν μῆνα, εἰς ἓν ἔτος θὰ ἔχη ἔλλειμα 6.720 δρχ. Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ δαπανᾷ τὸν μῆνα, διὰ νὰ ἔχη περίσσευμα 4.320 δρχ.;

97. Ἐν ἀτμόπλοιον, κινούμενον με ταχύτητα 14 κόμβων τὴν ὥραν, διέτρεξε τὴν ἀπόστασιν μετὰξὺ δύο λιμένων εἰς 9 ὥρας. Με ποῖαν ταχύτητα ἔπρεπε νὰ κινηθῇ διὰ νὰ φθάσῃ 2 ὥρας ἐνωρίτερον.

98. Εἰς ἔμπορος ἠγόρασεν 180 kg καφέ πρὸς 56 δρχ. τὸ kg. Ἐπώλησεν ἔπειτα ἓν μέρος αὐτοῦ πρὸς 72 δρχ. τὸ kg καὶ τὸ ἄλλο τοῦ ἔμεινε κέρδος. Ποσα kg τοῦ ἔμειναν ὡς κέρδος;

Π Ι Ν Α Ε

Βασικῶν ιδιοτήτων τῶν πράξεων εἰς τὸ N_0

1. Ὑπάρξεως : Ἐὰν $\alpha, \beta \in N_0$, ὑπάρχει εἷς καὶ μόνον εἷς, μονότιμον : ἀριθμὸς γ ἴσος με $\alpha + \beta$, καὶ εἷς καὶ μόνον εἷς ἀριθμὸς δ ἴσος με $\alpha \cdot \beta$.

2. Μεταθετικὴ : $\left. \begin{array}{l} \alpha + \beta = \beta + \alpha \\ \alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha \end{array} \right\} \alpha, \beta \in N_0$

3. Προσεταιριστικὴ : $\left. \begin{array}{l} (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma) \\ (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \end{array} \right\} \alpha, \beta, \gamma \in N_0$

4. Ἐπιμεριστικὴ : $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$ »

5. Οὐδέτερον στοιχείον : $\left. \begin{array}{l} \alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha \\ \alpha \cdot 1 = 1 \cdot \alpha = \alpha \end{array} \right\} \alpha \in N_0$

6. Διαγραφῆς : $\left. \begin{array}{l} \alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma \\ \alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma \\ \alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma \\ \alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma \end{array} \right\} \begin{array}{l} \alpha, \beta, \gamma \in N_0 \\ \alpha, \beta \in N_0, \gamma \in N \\ \alpha, \beta, \gamma \in N_0 \\ \alpha, \beta \in N_0, \gamma \in N \end{array}$

99. Οί μικροί τροχοί μιᾶς ἀμάξης κάμνουν 56 στροφὰς ἀνά λεπτόν, ἐνῶ οἱ μεγάλοι 42. Πόσας ὀλιγωτέρας στροφὰς θὰ κάμουν οἱ μεγάλοι τροχοί εἰς 2 ὥρας.

100. Μὲ ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸ 4227 διὰ νὰ εὐρωμεν πηλίκον 13 καὶ ὑπόλοιπον 171 ;

101. 9 ἐργάται καὶ 5 ἐργάτριαι δι' ἐργασίαν 6 ἡμερῶν ἔλαβον 11340 δρχ. Ἐάν ἐκάστη ἐργάτρια λαμβάνη 70 δρχ. τὴν ἡμέραν ὀλιγώτερον ἀπὸ ἕκαστον ἐργάτην, πόσον εἶναι τὸ ἡμερομίσθιον ἐκάστου ἐργάτου ;

102. Τρεῖς ἀδελφοὶ ἐπλήρωσαν ἓν χρέος ἐξ 125.000 δρχ. Οἱ δύο μεγαλύτεροι ἐπλήρωσαν ἕκαστος κατὰ 12.500 δρχ. ὀλιγώτερα ἀπὸ τὸ διπλάσιον τῶν ὄσων ἐπλήρωσεν ὁ τρίτος. Πόσα χρήματα ἐπλήρωσεν ἕκαστος ;

103. Ἐμπορὸς ἐχώρισεν ὕφασμα εἰς δύο τεμάχια, τὰ ὁποῖα διέφερον εἰς μῆκος κατὰ 42 m. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ μήκη τῶν τεμαχίων, ἐάν γνωρίζωμεν ὅτι τὸ μῆκος τοῦ πρώτου ἦτο τετραπλάσιον ἀπὸ τὸ μῆκος τοῦ δευτέρου.

104. Κάποιος ἠγόρασεν 360 ὠὰ πρὸς 27 δρχ. τὰ 15 καὶ ἄλλα 360 πρὸς 21 δρχ. τὰ 18. Ἀπὸ τὰ ὠὰ αὐτὰ 72 κατεστράφησαν καὶ τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἐπώλησεν πρὸς 45 δρχ. τὰ 27. Πόσας δραχμάς ἐκέρδισεν οὗτος ;

105. Τὸ ἡμερομίσθιον ἐνὸς τεχνίτου εἶναι 3/πλάσιον τοῦ ἡμερομισθίου τοῦ βοηθοῦ του. Εἰς 5 ἡμέρας ἐργασίας ἔλαβον καὶ οἱ δύο 1200 δρχ. Ποῖον εἶναι τὸ ἡμερομίσθιον ἐκάστου ;

106. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἐξισώσεις

$$3x + (5x + 1) = 33, \quad 2 \cdot (3x + 4) = 20$$

107. Νὰ ὑπολογίσετε τὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν τῆς παραστάσεως

$$10\alpha - 2\beta + 3(\gamma - \alpha) + 2(\alpha + 3\beta - \gamma) \quad \text{ὅταν } \alpha = 5, \beta = 9, \gamma = 10$$

108. Ποῖου ἀριθμοῦ τὸ πενταπλάσιον ἡλαττωμένον κατὰ 30 ἰσοῦται μὲ τὸν ἀριθμὸν ἡυξημένον κατὰ 10 ;

109. Μία μητέρα ἔχει ἡλικίαν τριπλασίαν τῆς κόρης της. Αἱ ἡλικίαι καὶ τῶν δύο μαζὺ εἶναι 80 ἔτη. Ποῖα εἶναι ἡ ἡλικία τῆς κόρης καὶ ποῖα τῆς μητέρας ;

110. Δείξτε ὅτι τὸ ἄθροισμα τριῶν διαδοχικῶν ἀκεραίων εἶναι πάντοτε πολλαπλάσιον τοῦ 3

111. Εἰς τὰς σχέσεις $\alpha - 15 = \beta$, $\alpha - 15 < \beta$ ποῖα εἶναι αἱ μικρότεροι δυναταὶ τιμαί, τὰς ὁποίας δύνανται νὰ λάβουν τὰ α καὶ β ;

112. Ποίας τιμὰς πρέπει νὰ λάβη ὁ α , ἵνα αἱ παραστάσεις

$$\alpha \cdot (7 - \beta) \quad \text{καὶ} \quad \alpha \cdot 7 - \beta$$

εἶναι ἴσαι μεταξύ των ;

113. Ἐστω ὅτι $B = 25.8.28$ χωρὶς νὰ ὑπολογισθῇ ἡ τιμὴ τοῦ B, νὰ εὐρετε τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ B διὰ 28, 100, 56.

114. Διαιρέσατε τὸ 353 διὰ 43. Κατὰ πόσας μονάδας δυνάμεθα νὰ αὐξήσωμεν τὸν διαιρετέον, χωρὶς νὰ μεταβληθῇ τὸ πηλίκον.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

46. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

46.1. Όρισμός

Μία πολυκατοικία έχει 5 όροφους. Έκαστος όροφος έχει 5 διαμερίσματα και έκαστον διαμέρισμα 5 δωμάτια. Πόσα διαμερίσματα και πόσα δωμάτια έχει ή πολυκατοικία;

Είναι φανερόν ότι ό μέν αριθμός τών διαμερισμάτων είναι $5 \cdot 5 = 25$
 ό δέ αριθμός τών δωματίων είναι $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

Τό γινόμενον $5 \cdot 5$ αποτελείται από δύο παράγοντας ίσους με τόν αριθμόν 5, λέγεται δέ δευτέρα δύναμις του 5 και γράφεται συντόμως 5^2 .

Τό γινόμενον $5 \cdot 5 \cdot 5$ αποτελείται από τρεις παράγοντας ίσους με τόν αριθμόν 5, λέγεται δέ τρίτη δύναμις του 5 και γράφεται συντόμως 5^3 .

Ώστε εάν $a \in \mathbb{N}_0$, τότε :

Τό γινόμενον $a \cdot a$ λέγεται δευτέρα δύναμις του a και γράφεται a^2

Τό γινόμενον $a \cdot a \cdot a$ λέγεται τρίτη δύναμις του a και γράφεται a^3


Τό γινόμενον $a \cdot a \cdot a \cdot a$ λέγεται τετάρτη δύναμις του a και γράφεται a^4 .

κ.ο.κ.

Γενικώς: Έάν n αριθμός μεγαλύτερος τής μονάδος, τό γινόμενον n παραγόντων ίσων με a , λέγεται n ι ο σ τ ή δύ ν α μ ι ς του a .
 Γράφομεν δέ a^n .

$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_n \text{ παράγοντες}$	Όπου $n \in \mathbb{N}$ και $n > 1$
--	-------------------------------------

Ό αριθμός a λέγεται βάση τής δυνάμεως. Ό αριθμός n , τόν όποιον γράφομεν δεξιά και όλίγον ύψηλότερον τής βάσεως, λέγεται εκθέτης τής δυνάμεως.



Ή πράξις, δια τής όποίας από ένα αριθμόν εύρισκομεν τήν νιοστήν δύ-

ναμιν αὐτοῦ α', λέγεται ὕψωσις τοῦ α εἰς τὴν ν, τὸ δὲ ἐξαγόμενον λέγεται τιμὴ τῆς δυνάμεως α'.

Παραδείγματα

$$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4$$

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^5$$

$$5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$$

$$\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha = \alpha^6$$

46.2. Παρατηρήσεις

α) Ἡ ἀντιμετάθεσις τῆς βάσεως μὲ τὸν ἐκθέτην εἰς μίαν δύναμιν α' μεταβάλλει τὴν τιμὴν τῆς δυνάμεως, ὅταν $\alpha \neq \nu$.

Π.χ. $5^2 = 25$ ἐνῶ $2^5 = 32$

β) Δὲν πρέπει νὰ συγχέωμεν τὰς γραφὰς 2^3 καὶ $2 \cdot 3$, διότι

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \quad \text{ἐνῶ} \quad 2 \cdot 3 = 3 + 3 = 6.$$

γ) Ἡ δευτέρα δύναμις ἐνὸς ἀριθμοῦ λέγεται καὶ τετράγωνον αὐτοῦ, ἐνῶ ἡ τρίτη δύναμις κύβος αὐτοῦ.

46.3. Εἰδικαὶ περιπτώσεις

I. Δυνάμεις τοῦ 0

Κατὰ τὸν ὅρισμόν τῆς δυνάμεως ἔχομεν

$$0^2 = 0 \cdot 0 = 0, \quad 0^3 = 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

Γενικῶς $0^\nu = \underbrace{0 \cdot 0 \cdot \dots \cdot 0}_{\nu \text{ παράγοντες}} = 0$, ὅπου $\nu \in \mathbb{N}$, $\nu \geq 2$

II. Δυνάμεις τοῦ 1

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1, \quad 1^3 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

Γενικῶς: $1^\nu = \underbrace{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1}_{\nu \text{ παράγοντες}} = 1$ ὅπου $\nu \in \mathbb{N}$, $\nu \geq 2$

III. Δυνάμεις τοῦ 10

Κατὰ τὸν ὅρισμόν τῆς δυνάμεως ἔχομεν

$$10^2 = 10 \cdot 10 = 100$$

$$10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$$

$$10^4 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$$

$$10^5 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 100\,000$$

Γενικῶς: Ἐκάστη δύναμις τοῦ 10 ἰσοῦται μὲ τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικά, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ ἐκθέτης.

Ἡ χρησιμοποίησις δυνάμεων τοῦ 10 συντομεύει τὴν γραφὴν καὶ τὴν ἐκτέλεσιν πράξεων μὲ μεγάλους ἀριθμούς.

Παραδείγματα

α) $10.000.000 = 10^7$

β) $36.000.000 = 36.1000.000 = 36 \cdot 10^6$

γ) Ἡ ταχύτης τοῦ φωτός εἶναι $299.00000000 \text{ cm ἀνὰ sec}$
ἢ $299 \cdot 10^8 \text{ cm ἀνὰ sec}$.

47. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

47. 1. Γινόμενον δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ

Ἐὰν λάβωμεν τὰ γινόμενα $3^2 \cdot 3^3$ καὶ $\alpha^3 \cdot \alpha^4$. Ἐχομεν :

$$\begin{aligned} 3^2 \cdot 3^3 &= (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3) \\ &= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \\ &= 3^5 = 3^{2+3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha^3 \cdot \alpha^4 &= (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha) \cdot (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha) \\ &= \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \\ &= \alpha^7 = \alpha^{3+4} \end{aligned}$$

Γενικῶς :

$\alpha^m \cdot \alpha^n = \alpha^{m+n}$	ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}_0$, $m, n, \rho \in \mathbb{N}$
$\alpha^m \cdot \alpha^n \cdot \alpha^\rho = \alpha^{m+n+\rho}$	καὶ $m, n, \rho > 1$

Διὰ τὴν ἀποπλασιαστικὴν δυνάμει μὲ τὴν αὐτὴν βάσιν, σχηματίζομεν μίαν δύναμιν μὲ τὴν ἰδίαν βάσιν καὶ ἐκθέτην τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν.

47. 2. Δύναμις γινομένου

Ἐὰν λάβωμεν τὰς δυνάμεις $(3 \cdot 5)^2$ καὶ $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^3$. Ἐχομεν :

$$\begin{aligned} (3 \cdot 5)^2 &= (3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5) \\ &= 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 5 \\ &= 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \\ &= 3^2 \cdot 5^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^3 &= (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \\ &= \alpha \beta \gamma \cdot \alpha \beta \gamma \cdot \alpha \beta \gamma \\ &= \alpha \alpha \alpha \cdot \beta \beta \beta \cdot \gamma \gamma \gamma \\ &= \alpha^3 \cdot \beta^3 \cdot \gamma^3 \end{aligned}$$

Γενικῶς :

$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^n = \alpha^n \cdot \beta^n \cdot \gamma^n$	ὅπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$, $n \in \mathbb{N}$ καὶ $n > 1$
---	--

Διὰ τὴν ἀποπλασιαστικὴν ἐν γινόμενον εἰς μίαν δύναμιν ὑψώνομεν ἕκαστον παράγοντα τοῦ γινομένου εἰς τὴν δύναμιν αὐτήν.

47. 3. Ὑψώσεις δυνάμεως εἰς δύναμιν

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῆς δυνάμεως, τὸ γινόμενον $3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2$ δύναται νὰ γραφῆι $(3^2)^3$. Ἡ γραφὴ αὐτὴ λέγεται ὑψώσεις δυνάμεως εἰς δύναμιν.

Ἐπομένως

$$\begin{aligned} (3^2)^3 &= 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 \\ &= 3^{2+2+2} = 3^{3 \cdot 2} \end{aligned}$$

Γενικῶς

$$(a^{\mu})^{\nu} = a^{\mu \cdot \nu} \quad \text{ὅπου } a \in \mathbb{N}_0, \mu, \nu \in \mathbb{N} \text{ καὶ } \mu, \nu > 1$$

Διὰ νὰ ὑψώσωμεν μίαν δύναμιν εἰς ἄλλην δύναμιν, σχηματίζομεν μίαν δύναμιν μὲ τὴν ἰδίαν βάσιν καὶ ἐκθέτην τὸ γινόμενον τῶν ἐκθετῶν.

47. 4. Πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ

Ἀπὸ τὴν ἰσότητα

$$5^3 \cdot 5^4 = 5^7$$

συνάγομεν ὅτι 5^3 εἶναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 5^7 διὰ 5^4

*Ἦτοι $5^7 : 5^4 = 5^3$

*Ἡ $5^7 : 5^4 = 5^{7-4}$

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι, $a^7 : a^4 = a^{7-4}$

Γενικῶς

$$a^{\mu} : a^{\nu} = a^{\mu - \nu} \quad \text{ὅπου } \mu, \nu \in \mathbb{N} \text{ καὶ } \mu > \nu$$

Τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτην τὴν διαφορὰν τῶν ἐκθετῶν (Διαιρετέου μείον διαιρετέου).

47. 5. Ἐφαρμογαὶ

Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις

$$3 \cdot 5^2, \quad 3 \cdot 5^2 + 2, \quad 3 \cdot 5 + 2^2, \quad 3 \cdot (5 + 2)^2$$

*Ἐχομεν

$$3 \cdot 5^2 = 3 \cdot 25 = 75$$

$$3 \cdot 5^2 + 2 = 3 \cdot 25 + 2 = 77$$

$$3 \cdot 5 + 2^2 = 3 \cdot 5 + 4 = 19$$

$$3 \cdot (5 + 2)^2 = 3 \cdot 7^2 = 3 \cdot 49 = 147$$

48. ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΔΙΑ $\nu=1$ ΚΑΙ $\nu=0$

48. 1. Τὸ σύμβολον a^1 , $a \in \mathbb{N}_0$

Εἶναι δυνατὸν, κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ιδιότητος 47. 4, νὰ εὐρωμεν :

$$\begin{aligned} & \text{ἢ} & a^3 : a^2 &= a^{3-2} \\ & & a^3 : a^2 &= a^1 \end{aligned}$$

Ἡ γραφὴ a^1 , κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῆς δυνάμεως, δὲν ἔχει ἔννοιαν, διότι ὁ ἐκθέτης τῆς εἶναι μικρότερος τοῦ 2. Διὰ νὰ γενικεύσωμεν τὴν ἰσχὺν τῆς ιδιότητος 47. 4 δεχόμεθα ὅτι καὶ τὸ σύμβολον a^1 παριστᾷ δύναμιν. Ἦτοι ἐπεκτείνομεν τὴν ἔννοιαν τῆς δυνάμεως, καὶ ὅταν $\nu=1$

Διὰ νὰ ὀρίσωμεν τὴν τιμὴν τῆς δυνάμεως αὐτῆς, σκεπτόμεθα ὅτι :

$$\alpha^3 \cdot \alpha^2 = (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha) \cdot (\alpha \cdot \alpha)$$

$$\eta \quad \alpha^3 \cdot \alpha^2 = \alpha^5$$

Διὰ τοῦτο θέτομεν

$$\alpha^1 = \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{N}_0$$

Ἦτοι: Ἡ πρώτη δύναμις ἑνὸς ἀριθμοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἀριθμὸς.

Παραδείγματα

$$8^1 = 8, \quad 2^3 \cdot 2^1 = 2^{3+1} = 2^4, \quad (\alpha^5)^1 = \alpha^{5 \cdot 1} = \alpha^5$$

48. 2. Τὸ σύμβολον α^0 , $\alpha \in \mathbb{N}$

Σκεπτόμενοι ὅπως προηγουμένως, εὐρίσκομεν :

$$\alpha^3 \cdot \alpha^3 = \alpha^{3-3} = \alpha^0 \quad (1)$$

$$\alpha^3 \cdot \alpha^3 = 1 \quad (2)$$

Διὰ νὰ ἰσχύη γενικῶς ἡ ιδιότης 47. 4 δεχόμεθα ὅτι τὸ σύμβολον α^0 παριστᾷ δύναμιν καὶ θέτομεν

$$\alpha^0 = 1, \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

Ἡ μηδενικὴ δύναμις παντὸς φυσικοῦ ἀριθμοῦ ἰσοῦται μὲ τὴν μονάδα.

Παραδείγματα

$$7^0 = 1, \quad (3.5)^0 = 1, \quad (\alpha^3)^0 = 1$$

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα ιδιοτήτων τῶν δυνάμεων

- | | |
|--|---|
| 1. $\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\mu+\nu}$ | ὅπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$
$\nu \in \mathbb{N}$ |
| 2. $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^\nu = \alpha^\nu \cdot \beta^\nu \cdot \gamma^\nu$ | |
| 3. $(\alpha^\mu)^\nu = \alpha^{\mu \cdot \nu}$ | |
| 4. $\alpha^\mu : \alpha^\nu = \alpha^{\mu-\nu}$ | $\mu > \nu$ |
| 5. $\alpha^1 = \alpha, \alpha^0 = 1$ | |

Σημείωσις

Δὲν ὀρίζομεν τὸ σύμβολον 0^0 . Ἡ ἐξέτασις αὐτοῦ θὰ γίνη εἰς ἄλλην τάξιν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

115. Γράψατε ὑπὸ μορφήν δυνάμεων τὰ γινόμενα :

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3,$$

$$1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1,$$

$$0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0,$$

$$\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$$

116. Να εύρετε τὰς τιμὰς τῶν παραστάσεων

$$3^4 - 2^3 + 1^{15}, \quad 7^3 - 2^2 \cdot 2^3 + 1, \quad (2^3 \cdot 3^2)^2 - 5^2$$
$$5 \cdot 2^7 \cdot 4, \quad 7 \cdot 3^4 \cdot 9$$

117. Να εύρετε τὰ τετράγωνα καὶ τοὺς κύβους τῶν ἀριθμῶν :
10, 20, 30, 40 Τὶ παρατηρεῖτε;

118. Χρησιμοποιήσατε ιδιότητες τῶν δυνάμεων διὰ νὰ ὑπολογίσετε συντόμως τὰ γινόμενα

$$2^3 \cdot 5^3, \quad 4^2 \cdot 25^2, \quad 2^4 \cdot 8^2 \cdot 125^2 \cdot 5^4$$

119. Τὶ παθαίνει τὸ τετράγωνον ἑνὸς ἀκεραίου, ὅταν διπλασιάζωμεν, τριπλασιάζωμεν... τοῦτον. Χρησιμοποιήσατε παραδείγματα.

49. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

49. 1. Τετράγωνον ἀθροίσματος

Διὰ νὰ ὑπολογίσωμεν τὸ τετράγωνον τοῦ ἀθροίσματος $3+5$ δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν καὶ ὡς ἐξῆς :

$$\begin{aligned}(5+3)^2 &= (5+3) \cdot (5+3) && (\text{Ὁρισμὸς δυνάμεως}) \\ &= 5 \cdot 5 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 3 && (\text{Ἐπιμεριστική ιδιότης}) \\ &= 5^2 + 2 \cdot (5 \cdot 3) + 3^2 \\ &= 25 + 30 + 9 = 64\end{aligned}$$

Γενικῶς, διὰ δύο ἀκεραίους α, β ἔχομεν

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)^2 &= (\alpha+\beta) \cdot (\alpha+\beta) \\ &= \alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \beta + \beta \cdot \alpha + \beta \cdot \beta \\ &= \alpha^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2\end{aligned}$$

*Ἦτοι, ἔχομεν τὸν τύπον

$$\boxed{(\alpha+\beta)^2 = \alpha^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2} \quad (1)$$

Ὁ τύπος οὗτος συχνὰ εἶναι χρήσιμος διὰ τὴν συντόμευσιν τῶν ὑπολογισμῶν μας.

$$\begin{aligned}\text{Π.χ. } 1001^2 &= (1000+1)^2 \\ &= 1000^2 + 2 \cdot 1000 \cdot 1 + 1^2 \\ &= 1000 \cdot 000 + 2000 + 1 = 1002001\end{aligned}$$

49. 2. Τετράγωνον διαφορᾶς

Διὰ τὸ τετράγωνον τῆς διαφορᾶς $8-3$, ἔχομεν

$$(8-3)^2 = 5^2 = 25 \quad (1)$$

Ἄλλὰ καὶ $8^2 - 2 \cdot 8 \cdot 3 + 3^2 = 64 - 48 + 9 = 25 \quad (2)$

Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) ἔχομεν

$$(8-3)^2 = 8^2 - 2 \cdot (8 \cdot 3) + 3^2$$


Γενικῶς, δι' οἰουσδήποτε ἀκεραίους α, β , ὅπου $\alpha > \beta$, εἶναι :

$$(\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 - 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2 \quad (2)$$

Ἐφαρμογή

$$\begin{aligned} 999^2 &= (1000 - 1)^2 \\ &= 1000^2 - 2 \cdot 1000 \cdot 1 + 1 \\ &= 1000000 - 2000 + 1 = 998001 \end{aligned}$$

Παραθέτομεν κατωτέρω γεωμετρικὴν παράστασιν τῶν ἀνωτέρω δύο τύπων



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

120. Νὰ εὑρετε συντόμως τὰ τετράγωνα τῶν ἀκεραίων : 102, 98, 998, 1002.

121. Νὰ εὑρετε τὰ τετράγωνα τῶν παραστάσεων :

$$2 + \alpha, \quad \alpha + 3, \quad 2\alpha + 3$$

122. Μὲ ἀριθμητικὰ παραδείγματα ἐπαληθεύσατε ὅτι :

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = \alpha^2 - \beta^2 \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0 \quad \alpha > \beta$$

50. ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ 10 ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΕΩΣ

Γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 1265 τοῦ δεκαδικοῦ συστήματος ἀποτελεῖται ἀπὸ 1 χιλιάδα, 2 ἑκατοντάδας, 6 δεκάδας καὶ 5 μονάδας, γράφεται δὲ

$$\begin{aligned} 1265 &= 1X + 2E + 6\Delta + 5M \\ \eta \quad 1265 &= 1 \cdot 1000 + 2 \cdot 100 + 6 \cdot 10 + 5 \cdot 1 \quad (1) \end{aligned}$$

Οἱ ἀκέραιοι 1000, 100, 10, 1 εἶναι ὅλοι δυνάμεις τοῦ 10. Συγκεκριμένως εἶναι : $1000 = 10^3$, $100 = 10^2$, $10 = 10^1$ καὶ $1 = 10^0$

Ἐὰν θέσωμεν τὰς ἀνωτέρω δυνάμεις τοῦ 10 εἰς τὴν (1), ἔχομεν

$$1265 = 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

Εἶναι φανερόν ὅτι ὑπὸ τὴν μορφήν αὐτὴν δυνάμεθα νὰ θέσωμεν οἰονδήποτε ἄλλον ἀκέραιον, γραμμένον εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμῆσεως.

Παραδείγματα

$$36723 = 3 \cdot 10^4 + 6 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

$$52001 = 5 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0$$

Ἀντιστρόφως, ὅταν δοθῆ ἓν ἄθροισμα διαδοχικῶν δυνάμεων τοῦ 10 πολλαπλασιασμένων μὲ ἀκεραίους μικροτέρους τοῦ 10, ὅπως εἶναι τὸ ἄθροισμα

$$\chi = 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

ἔχομεν :

$$\chi = 3 \cdot 1000 + 2 \cdot 100 + 9 \cdot 10 + 5 \cdot 1$$

ἦ

$$\chi = 3 \text{ X} + 2\text{E} + 9 \text{ Δ} + 5\text{M}$$

ἦ

$$\chi = 3295$$

Ὅμοίως διὰ τὸ ἄθροισμα

$$\psi = 3 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

ἔχομεν :

$$\psi = 3 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 4 \cdot 1$$

ἦ

$$\psi = 3004$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

123. Νὰ γράψετε τοὺς ἀκεραίους 2378, 3005 10709 ὑπὸ μορφήν ἄθροίσματος δυνάμεων τοῦ 10 πολλαπλασιασμένων μὲ 0, 1, 2... 9.

124. Τὰ κατωτέρω ἄθροίσματα

$$\alpha = 8 \cdot 10^4 + 0 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

$$\beta = 5 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3$$

$$\gamma = 7 \cdot 10^9 + 5 \cdot 10^6 + 3 \cdot 2^2$$

ποίους ἀκεραίους παριστάνουν;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

125. Ἐὰν $\alpha = 2^3 \cdot 3$, $\beta = 2^4 \cdot 3^2$ καὶ $\gamma = 2^3 \cdot 5 \cdot 7$, νὰ εὑρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν ἀριθμητικῶν παραστάσεων:

$$\alpha^2 \cdot \beta, \quad (\alpha^2 \cdot \beta^2)^2, \quad (\alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma)^3, \quad \beta : \alpha, \quad \beta^2 : \alpha$$

126. Νὰ εὑρετε τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως :

$$(3^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3) : (9^2 \cdot 25)$$

127. Νὰ ἐκφράσετε ὑπὸ μορφήν δυνάμεως τὰ ἄθροίσματα :

$$9 + 6 \cdot \beta + \beta^2, \quad 4\alpha^2 - 4\alpha + 1$$

128. Νὰ ἐκφράσετε ὑπὸ μορφήν γινομένου τὴν διαφορὰν $25\alpha^2 - 9$. (ἀσκ. 122).

129. Ποίων ἀριθμῶν εἶναι τετράγωνα οἱ ἀριθμοί:

$$2^6 \cdot 3^2, \quad 5^4 \cdot 7^2, \quad 3^2 \cdot 2^4 \cdot 5^2, \quad 9 \cdot 5^4, \quad 36 \cdot 2^8 \cdot 3^{10}$$

130. Τί παθαίνει ὁ κύβος ἑνὸς ἀριθμοῦ ἂν ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν α ἐπὶ 2, 3, 4; Χρησιμοποίησατε παραδείγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΣ

51. ΔΙΑΙΡΕΤΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

51. 1. Ἀκέραιος διαιρετὸς διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ

Ὡς γνωστὸν ὁ 20 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5, ($20=4\cdot 5$).

Πολλὰς φορές ἀντὶ νὰ λέγωμεν 20 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5 λέγομεν

20 εἶναι διαιρετὸς διὰ 5
ἢ 5 εἶναι διαιρέτης τοῦ 20

Γενικῶς, ἐὰν ὁ ἀκέραιος α εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ β , τότε λέγομεν ὅτι ὁ α εἶναι διαιρετὸς διὰ β ἢ ὅτι ὁ β εἶναι διαιρέτης τοῦ α .

51.2. Πρῶτοι καὶ σύνθετοι ἀριθμοὶ

Ἄς εὔρωμεν τοὺς διαιρέτας τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Διαιρέται τοῦ 2 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 2

Διαιρέται τοῦ 3 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 3

Διαιρέται τοῦ 4 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 2, 4

Διαιρέται τοῦ 5 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 5

Διαιρέται τοῦ 6 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 2, 3, 6

Διαιρέται τοῦ 7 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 7

Διαιρέται τοῦ 8 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 2, 4, 8

Διαιρέται τοῦ 9 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 3, 9

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι :

α) Ὑπάρχουν ἀκέραιοι, οἱ ὅποιοι δὲν ἔχουν ἄλλους διαιρέτας ἐκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ των καὶ τῆς μονάδος. Ὅπως π.χ. οἱ ἀκέραιοι 2, 3, 5, 7.

β) Ὑπάρχουν ἀκέραιοι, οἱ ὅποιοι ἔχουν καὶ ἄλλους διαιρέτας ἐκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ των καὶ τῆς μονάδος.

Ἄπο τὰς παρατηρήσεις αὐτὰς ὀδηγοῦμεθα εἰς τὸν ἐξῆς ὀρισμὸν :

Ἐκαστος φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τῆς μονάδος λέγεται, πρῶτος ἂν ἔχη δύο μόνον διαιρέτας, σύνθετος* ἂν ἔχη ἕνα τοῦλάχιστον διαιρέτην, ἐκτὸς τῆς μονάδος καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του.

Σημειώσεις

Σημειοῦμεν ὅτι ὁ δεύτερος εἰς σειρὰν διαιρέτης ἐκάστου τῶν ἀνωτέρω ἀκεραίων 2, 3, ..., 9, εἶναι πρῶτος ἀριθμὸς. Τὸ αὐτὸ δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν οἰουδήποτε ἀκεραίου.

51. 3. Κόσκινο τοῦ Ἐρατοσθένους

Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Πόσοι εἶναι οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ καὶ κατὰ ποῖον τρόπον θὰ τοὺς εὗρωμεν;

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐγνώριζον ὅτι δὲν ὑπάρχει μέγιστος πρῶτος ἀριθμὸς: ἦτοι τὸ σύνολον τῶν πρώτων ἀριθμῶν εἶναι μὴ πεπερασμένον.

{2, 3, 5, 7, 11, 13...}

Ἐγνώριζον ἀκόμη, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀπλοῦς κανὼν ὁ ὁποῖος νὰ μᾶς δίδῃ τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλον τοὺς διαφόρους πρώτους ἀριθμοὺς. Εἶχον ὅμως ἀνακαλύψει μίαν μέθοδον διὰ νὰ εὕρισκωμεν τοὺς πρώτους ἀριθμοὺς, οἱ ὁποῖοι εἶναι μικρότεροι ἀπὸ ἕνα δεδομένον ἀκέραιον. Ἡ μέθοδος αὕτη εἶναι γνωστὴ ὡς κόσκινο τοῦ Ἐρατοσθένους** καὶ ἔχει συντόμως ὡς ἑξῆς.

Διὰ τὴν εὕρεσιν τῶν πρώτων ἀριθμῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι μικρότεροι π.χ. τοῦ 100, γράφομεν ὅλους τοὺς ἀκεραίους 1, 2, 3, ..., 100. Ἐν συνεχείᾳ διαγράφομεν:

- 1) τὴν μονάδα
- 2) τὰ πολλαπλάσια τοῦ 2 ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ $2^2=4$
- 3) τὰ πολλαπλάσια τοῦ 3 ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ $3^2=9$
- 4) τὰ πολλαπλάσια τοῦ 5 ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ $5^2=25$
- 5) τὰ πολλαπλάσια τοῦ 7 ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ $7^2=49$

Οἱ ἀριθμοὶ οἱ ὁποῖοι ἀπομένουν εἶναι ὅλοι οἱ πρῶτοι, οἱ μικρότεροι τοῦ 100. Εἶναι δὲ οἱ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

131. Εἰς τὸ σύνολον $A = \{2, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 29\}$ ποῖα ἐκ τῶν στοιχείων του εἶναι πρῶτοι καὶ ποῖα σύνθετοι ἀριθμοὶ;

132. Τὸ διπλάσιον ἐνὸς πρώτου ἀριθμοῦ εἶναι πρῶτος ἢ σύνθετος ἀριθμὸς;

* Ἡ ὀνομασία σύνθετος ἀριθμὸς δικαιολογεῖται ἐκ τοῦ ὅτι ἕκαστος σύνθετος ἀριθμὸς δύναται νὰ ἐκφρασθῇ ὡς γινόμενον πρώτων παραγόντων. Π.χ. $6=2 \cdot 3$, $30=2 \cdot 3 \cdot 5$

** Ὁ Ἐρατοσθένης (276 – 195 π.Χ.) ὑπῆρξεν εἰς ἐκ τῶν ἐπισημόνων καὶ λογίων τῆς ἀρχαιότητος. Διεκρίθη ὡς μαθηματικὸς, φιλόλογος, γεωγράφος, ἱστορικὸς καὶ ποιητής.

133. Ποιον είναι το σύνολον τῶν διαιρετῶν τῶν ἀριθμῶν :

$$25=5^2, 49=7^2, 11^2, 13^2; \quad \text{Τι παρατηρεῖτε;}$$

134. Μία δύναμις a^n ἐνὸς ἀκεραίου $a > 1$, ἢμπορεῖ ἄραγε νὰ εἶναι πρῶτος ἀριθμὸς, ὅταν $n > 1$;

52. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΙΡΕΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΥ

52. 1. Ὡς γνωστὸν ὁ 5 διαιρεῖ ἕκαστον πολλαπλάσιον αὐτοῦ. Ἦτοι διαιρεῖ τοὺς ἀριθμοὺς: $0 \cdot 5 = 0, 1 \cdot 5 = 5, 2 \cdot 5 = 10, 3 \cdot 5 = 15 \dots$

Ἀντιστρόφως. Ἐὰν ὁ 5 διαιρῆ ἓνα ἀριθμὸν α , οὗτος θὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5.

$$\alpha : 5 = \beta \iff \alpha = 5 \cdot \beta \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$$

Ὡστε: ὁ 5 διαιρεῖ ὅλα τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ καὶ μόνον αὐτά.

Γενικῶς ἐκ τῆς γνωστῆς ἰσοδυναμίας

$$\alpha : \beta = \gamma \iff \alpha = \beta \cdot \gamma$$

ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ἐκαστος φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρεῖ τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ καὶ μόνον αὐτά.

52. 2. Ὁ φυσικὸς ἀριθμὸς 5 διαιρεῖ τοὺς ἀριθμοὺς 15 καὶ 30, διότι εἶναι πολλαπλάσια αὐτοῦ.

$$\text{Ἦτοι ἔχομεν} \quad 15 = 3 \cdot 5$$

$$30 = 6 \cdot 5$$

Ἄρα

$$\begin{aligned} 15 + 30 &= 3 \cdot 5 + 6 \cdot 5 \\ &= 5 \cdot (3 + 6) \quad (\text{ἐπιμεριστική ιδιότητα}) \\ &= 5 \cdot 9 = \text{πολλαπλάσιον } 5 \end{aligned}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα $15 + 30$ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5 καὶ συνεπῶς διαιρετὸν διὰ 5. Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα $15 + 30 + 40$ εἶναι διαιρετὸν διὰ 5.

Ἄπὸ τὰς παρατηρήσεις αὐτὰς συνάγομεν ὅτι :

Ἐὰν εἷς φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρῆ δύο ἢ περισσοτέρους ἄλλους, θὰ διαιρῆ καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.

Ἐφαρμογή: Διαιρεῖ ὁ ἀριθμὸς 6 τὸν 324;

$$\text{Γράφομεν} \quad 324 = 300 + 24$$

Εὐκόλως διακρίνομεν ὅτι ὁ 6 διαιρεῖ τὸ 300 καὶ τὸ 24, ἄρα θὰ διαιρῆ καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν $300 + 24 = 324$.

52. 3. Κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα ὁ ἀριθμὸς 5, ἀφοῦ διαιρεῖ τὸν ἀριθμὸν 15, θὰ διαιρῆ καὶ τὸ ἄθροισμα $15 + 15 + 15$, ἢτοι τὸ γινόμενον $3 \cdot 15$.

Ὡστε: **Ἐὰν εἷς φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρῆ ἓνα ἄλλον, θὰ διαιρῆ καὶ τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ.**

Ἐφαρμογή: Διαιρεῖ ὁ ἀριθμὸς 4 τὸν ἀριθμὸν 280; Ἀφοῦ ὁ 4 διαιρεῖ τὸ 28 θὰ διαιρῆ καὶ τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ $28 \cdot 10 = 280$.

52. 4. Ὁ φυσικὸς ἀριθμὸς 5 διαιρεῖ τοὺς ἀριθμοὺς 60 καὶ 35. Θὰ διαιρῆ καὶ τὴν διαφορὰν τῶν 60-35;

$$\begin{aligned} \text{Εἶναι :} & & 60 &= 5 \cdot 12 \\ & & 35 &= 5 \cdot 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{*Αρα} & & 60 - 35 &= 5 \cdot 12 - 5 \cdot 7 \\ & & &= 5 \cdot (12 - 7) \\ & & &= 5 \cdot 5 = \text{πολλαπλάσιον } 5 \end{aligned}$$

Ἔστωτε: Ἐὰν εἷς φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρῆ δύο ἄλλους, θὰ διαιρῆ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν.

***Εφαρμογή:** Διαιρεῖ ὁ ἀριθμὸς 2 τὸν ἀριθμὸν 196;

$$\text{Γράφομεν} \quad 196 = 200 - 4$$

Εὐκόλως διακρίνομεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 2 διαιρεῖ τοὺς ἀριθμοὺς 200 καὶ 4.

Συνεπῶς διαιρεῖ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν $200 - 4 = 196$.

52. 5. Ἐὰν διαιρέσωμεν τὸν ἀκέραιον 78 διὰ τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ 9 εὐρίσκωμεν πηλίκον 8 καὶ ὑπόλοιπον 6.

$$\begin{aligned} \text{*Ἦτοι :} & & 78 &= 9 \cdot 8 + 6 & & 6 < 9 \\ & \eta & 78 - 9 \cdot 8 &= 6 \end{aligned}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ διαιρετέος 78 καὶ ὁ διαιρέτης 9 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 3. Ὁ 3 ὡς διαιρῶν τὸ 9 ὀφείλει νὰ διαιρῆ καὶ τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ $9 \cdot 8$. Ἐπειδὴ δὲ διαιρεῖ καὶ τὸ 78 θὰ διαιρῆ καὶ τὴν διαφορὰν $78 - 9 \cdot 8 = 6$.

Ὁμοίως παρατηρήσεις δυνάμεθα νὰ κάνωμεν εἰς ὅλας τὰς ἀτελεῖς διαιρέσεις.

Ἔστωτε: Ἐὰν εἷς φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρῆ τὸν διαιρετέον καὶ τὸν διαιρέτην μιᾶς ἀτελοῦς διαιρέσεως, θὰ διαιρῆ καὶ τὸ ὑπόλοιπον αὐτῆς.

***Εφαρμογή:** Οἱ ἀκέραιοι 69 καὶ 9 εἶναι διαιρετοὶ διὰ τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ 3. Καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτῶν 6 εἶναι διαιρετὸν διὰ 3. Σημειῶνομεν ὅτι τὸ πηλίκον 7 τῆς διαιρέσεως τοῦ 69 διὰ 9 δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην διαιρετὸν διὰ 3.

ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ἐὰν ὁ φυσικὸς ἀριθμὸς α	1) $\beta + \gamma$
διαιρῆ τοὺς ἀκεραίους β καὶ	2) $\beta - \gamma$, $\beta > \gamma$
γ , τότε θὰ διαιρῆ καὶ τοὺς :	3) $\beta \cdot \lambda$ ἢ $\gamma \cdot \lambda$ $\lambda \in \mathbb{N}$
	4) $u = \beta \cdot -\gamma \cdot \pi$ $u < \gamma$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

135. Οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β , ὅπου $\alpha > \beta$, εἶναι διαιρετοὶ διὰ τοῦ 5. Νὰ σχηματίσετε μὲ αὐτοὺς ἄλλους ἀριθμοὺς διαιρετοὺς διὰ 5.

136. Νά εξετάσετε εάν οι αριθμοί: $A=7\cdot\alpha+21$ και $B=28\cdot\alpha+14$, $\alpha\in\mathbb{N}$, είναι διαιρέτοι διά 7.

137. Νά εξετάσετε εάν ο αριθμός $X=18\alpha^2\cdot\beta$ είναι διαιρέτος διά 9.

138. Ο 9 είναι διαιρέτης των αριθμών 27, 45 και 81. Αιτιολογήσατε διατί θά είναι διαιρέτης και των αριθμών 153, 243, 378.

53. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΟΣ

53. 1. Διά νά διαπιστώσωμεν εάν ο άκεραίος α είναι διαιρέτος διά τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ β , δυνάμεθα νά ἐκτελέσωμεν τήν διαίρεσιν τοῦ α διά β καί νά ἴδωμεν εάν αὕτη εἶναι τελεία ἢ ὄχι.

Ἐν τούτοις εἶναι δυνατόν, δι' ὠρισμένας τιμὰς τοῦ β , νά διακρίνωμεν εάν ὁ α εἶναι ἢ ὄχι διαιρέτος διά β , χωρίς νά ἐκτελέσωμεν τήν διαίρεσιν. Αἱ ιδιότητες τῶν διαιρετῶν θά μᾶς ὀδηγήσουν εἰς κανόνας, κριτήρια διαιρετότητος, τὰ ὁποῖα θά μᾶς ἐπιτρέπουν νά διακρίνωμεν συντόμως πότε ὁ άκεραίος α εἶναι διαιρέτος διά τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ β . Τά ἐπόμενα κριτήρια ἰσχύουν διά τὸ δεκαδικὸν σύστημα γραφῆς τῶν άκεραίων.

53. 2. Τρόπος ἐργασίας

Εἰς τήν εὔρεσιν τῶν κριτηρίων διαιρετότητος θά ἀκολουθήσωμεν κατωτέρω τήν ἐξῆς γενικὴν μέθοδον. Διά νά διακρίνωμεν π.χ., εάν ὁ άκεραίος 2630 εἶναι διαιρέτος διά 25, ἀναλύομεν αὐτὸν εἰς δύο μέρη

$$2630=2500+130$$

τοιαῦτα, ὥστε τὸ πρῶτον μέρος νά φαίνεται ἀμέσως ὅτι εἶναι διαιρέτον διά 25, ὁπότε ἡ προσοχή μας περιορίζεται εἰς τὸ δεύτερον μέρος αὐτοῦ.

Γενικῶς διά νά διακρίνωμεν εάν ὁ άκεραίος α εἶναι διαιρέτος διά τοῦ φυσικοῦ β , ἀναλύομεν τὸ α κατὰ τὸν τύπον

$$\alpha = \text{πολλαπλάσιον } \beta + \nu \quad (1)$$

53. 3. 1ον κριτήριον. Ἄριθμοι διαιρέτοι διά 10, 100, 1000 . . .

Ἄς λάβωμεν τὸν ἀριθμὸν 3567 καί ἄς ἀναλύσωμεν αὐτὸν κατὰ τὸν τύπον (1).

Συγκεκριμένως ἔχομεν :

$$\begin{array}{l} \eta \\ \eta \\ \eta \end{array} \quad \begin{array}{l} 3567=3560+7 \\ 3567=356\cdot 10+7 \\ 3567=\text{πολλαπλάσιον } 10+7 \end{array}$$

Ἄνωτέρω ὁ ἀριθμὸς 3567 ἀνελύθη εἰς δύο μέρη (προσθετέους). Τὸ πρῶτον μέρος διαιρεῖται διά 10, ὡς πολλαπλάσιον αὐτοῦ. Συνεπῶς, εάν καί τὸ δεύτερον μέρος (7) διαιρῆται διά 10, ὁλόκληρος ὁ ἀριθμὸς θά εἶναι διαιρέτος διά 10.

Ἦτοι εἷς ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διὰ 10, ἂν τὸ τελευταῖον ψηφίον αὐτοῦ διαιρῆται διὰ 10, δηλαδὴ ἂν εἶναι 0.

Μὲ ὁμοιον τρόπον ἐργαζόμεθα καὶ ὅταν ὁ διαιρέτης εἶναι 100, 1000....

$$\begin{array}{ll} \text{Π.χ.} & 3567 = 3500 + 67 \\ \eta & 3567 = 35 \cdot 100 + 67 \\ \eta & 3567 = \text{πολλαπλάσιον } 100 + 67 \end{array}$$

Ἔστω: **Εἷς ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διὰ 10, 100, 1000 . . . , ἂν λήγη τοῦλάχιστον εἰς ἓν, δύο, τρία, . . . μηδενικὰ ἀντιστοίχως.**

Ἐφαρμογή: Ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς: 175, 15360, 38600, 1867 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 10 οἱ 15360, 38600 ἐνῶ διὰ 100 εἶναι διαιρετὸς ὁ 38600

53. 4. 2ον κριτήριον. Ἀριθμοὶ διαιρετοὶ διὰ 2 ἢ διὰ 5

Ἄς λάβωμεν τὸν ἀριθμὸν 1536 καὶ ἄς ἀναλύσωμεν αὐτὸν κατὰ τὸν τύπον (1).

$$\begin{array}{ll} \text{Συγκεκριμένως ἐπειδὴ} & 2 \cdot 5 = 10 \\ \text{γράφομεν} & 1536 = 153 \cdot 10 + 6 \\ \eta & 1536 = \text{πολλαπλάσιον } 10 + 6 \end{array} \quad (2)$$

Ἄς προσέξωμεν εἰς τὸ δεύτερον μέρος τῆς (2). Ἐκαστος τῶν ἀκέραιων 2 καὶ 5 διαιρεῖ τὸν 10 ὡς πολλαπλάσιον αὐτοῦ. Ἄρα θὰ διαιρῆ καὶ τὰ πολλαπλάσια τοῦ 10. Ἐὰν καὶ ὁ 6, τελευταῖον ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ, διαιρῆται διὰ 2 ἢ 5, ὁλόκληρος ὁ ἀριθμὸς θὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ 2 ἢ 5 ἀντιστοίχως.

Ἔστω: **Εἷς ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διὰ 2 ἢ 5, ἂν τὸ τελευταῖον ψηφίον του εἶναι διαιρετὸν διὰ 2 ἢ 5 ἀντιστοίχως.**

Παράδειγμα

Ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 172, 57, 1160, 475 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2 οἱ 172, 1160 καὶ διὰ 5 οἱ 1160, 475.

Σημείωσις

Οἱ ἀκέριοι, οἱ ὅποιοι εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2, λέγονται ἄρτιοι ἀριθμοί. Ἦτοι ἄρτιοι εἶναι ὅλα τὰ πολλαπλάσια τοῦ 2. Διὰ τοῦτο ὁ συμβολισμὸς

$$\alpha = 2 \cdot \nu \text{ ὅπου } \nu \in \mathbb{N}_0$$

σημαίνει ὅτι ὁ ἀκέριος α εἶναι ἄρτιος ἀριθμὸς. Οἱ ἀκέριοι, οἱ ὅποιοι δὲν εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2, λέγονται περιττοὶ ἀριθμοί. Οὗτοι διαιρούμενοι διὰ 2 ἀφήνουν ὑπόλοιπον πάντοτε 1. Διὰ τοῦτο ὁ συμβολισμὸς

$$\alpha = 2 \cdot \nu + 1 \text{ ὅπου } \nu \in \mathbb{N}_0$$

σημαίνει ὅτι ὁ α εἶναι περιττὸς ἀριθμὸς.

θά είναι διαιρετὸς καὶ διὰ 3. Τὸ ἀντίστροφον ὁμως δὲν ἰσχύει. Εἶναι δυνατόν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων ἑνὸς ἀριθμοῦ νὰ εἶναι διαιρετὸν διὰ 3 ὄχι ὁμως καὶ διὰ 9, π.χ. ὁ ἀριθμὸς 33.

Παραδείγματα

Ἐκ τῶν ἀριθμῶν 561, 783, 75234, 11342 εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 9 μόνον ὁ ἀριθμὸς 783 ἐνῶ διὰ 3 οἱ ἀριθμοὶ 561, 75234, 783.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

139. Ποιοὶ ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 216, 7852, 189756, 810, 3775, 328 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2, 5, 4, 25, 3, 9;

140. Εἰς τὸ τέλος τῶν ἀριθμῶν 13, 63, 22 νὰ θέσετε ἓν ψηφίον, ὥστε νὰ προκύψουν ἀριθμοὶ διαιρετοὶ συγχρόνως διὰ 5 καὶ 9

141. Δίδονται οἱ ἀριθμοὶ 10802, 180540· ἀντικαταστήσατε τὰ μηδέν με ἄλλα ψηφία, ὥστε νὰ προκύψουν ἀριθμοὶ διαιρετοὶ συγχρόνως διὰ 4 καὶ 9.

142. Νὰ ἀντικαταστήσετε τὸ τετραγωνίδιον με ἓν ψηφίον, ὥστε ὁ ἀριθμὸς 35 \square , ἐὰν διαιρεθῇ διὰ 9, νὰ ἀφήσῃ ὑπόλοιπον 4.

54. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

54. 1. Ἄς προσέξωμεν τὰς ἰσότητας
 $3 \cdot 4 = 12$
 $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

Τὰ πρῶτα μέλη αὐτῶν παριστάνουν τοὺς ἀριθμοὺς 12 καὶ 30 ὑπὸ μίαν ἄλλην μορφήν. Ὑπὸ μορφήν γινομένου παραγόντων.

Ἡ γραφή ἑνὸς ἀριθμοῦ ὑπὸ τὴν μορφήν αὐτὴν λέγεται ἀνάλυσις τοῦ ἀριθμοῦ εἰς γινόμενον παραγόντων ἢ παραγοντοποίηση αὐτοῦ.

Εἰς τὴν δευτέραν ἰσότητα παρατηροῦμεν ὅτι ὅλοι οἱ παράγοντες εἰς τοὺς ὁποίους ἀνελύθη ὁ ἀριθμὸς 30 εἶναι πρῶτοι ἀριθμοί. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἀνελύσαμεν τὸν ἀριθμὸν 30 εἰς γινόμενον πρῶτων παραγόντων ἢ ὅτι ἔχομεν πλήρη παραγοντοποίησιν αὐτοῦ.

Πολὺ συχνὰ εἰς τὰ μαθηματικὰ μᾶς διευκολύνει ἡ παράστασις ἑνὸς ἀριθμοῦ ὑπὸ μορφήν γινομένου πρῶτων παραγόντων. Διὰ νὰ ἀναλύσωμεν ἕνα σύνθετον ἀριθμὸν εἰς γινόμενον πρῶτων παραγόντων, π.χ. τὸν ἀριθμὸν 150, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{ll} 150 = 2 \cdot 75 & \text{Διότι } 2 \cdot 75 = 150 \\ = 2 \cdot 3 \cdot 25 & \text{» } 3 \cdot 25 = 75 \\ = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 & \text{» } 5 \cdot 5 = 25 \\ = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 & \end{array}$$

Ἦτοι εὕρισκομεν τὸν ἐλάχιστον πρῶτον παράγοντα (δευτέρον διαιρέ-

την) του 150, τον 2, έπειτα τον ελάχιστον πρώτον παράγοντα του πηλίκου $150:2=75$, τον 3, τον ελάχιστον πρώτον παράγοντα του πηλίκου $75:3=25$, τον 5.

Τοιουτοτρόπως καταλήγουμε εις τὸ γινόμενον $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$ τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ παράγοντες εἶναι πρώτοι. Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία γράφεται συντόμως κατὰ τὴν κατωτέρω διάταξιν

150	2	$150:2=75$
75	3	$75:3=25$
25	5	$25:5=5$
5	5	$5:5=1$
1		

Ἦτοι $150=2 \cdot 3 \cdot 5^2$

Ἄλλα παραδείγματα

60	2	72	2	180	2
30	2	36	2	90	2
15	3	18	2	45	3
5	5	9	3	15	3
1		3	3	5	5
		1		1	

ἦτοι $60=2^2 \cdot 3 \cdot 5$

ἦτοι $72=2^3 \cdot 3^2$

ἦτοι $180=2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

54. 3. Ἐφαρμογαὶ

Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ γινόμενον $72 \cdot 2^5 \cdot 7$

Ἐχομεν

$$72 = 2^3 \cdot 3^2$$

Ἄρα

$$72 \cdot 2^5 \cdot 7 = (2^3 \cdot 3^2) \cdot (2^5 \cdot 7)$$

$$= (2^3 \cdot 2^5) \cdot 3^2 \cdot 7$$

$$= 2^8 \cdot 3^2 \cdot 7$$

$$= 256 \cdot 9 \cdot 7 = 16128$$

Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ πηλίκον

$$(2^{10} \cdot 3^2) : 256$$

Ἐχομεν

$$256 = 2^8$$

Ἄρα

$$(2^{10} \cdot 3^2) : 256 = (2^{10} \cdot 3^2) : 2^8$$

$$= (2^{10} : 2^8) \cdot 3^2$$

$$= 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ πηλίκον $12^3 : (2 \cdot 6^3)$

Ἐχομεν

$$12^3 \quad (2^2 \cdot 3)^3 = 2^6 \cdot 3^3, \quad 2 \cdot 6^3 = 2 \cdot (2 \cdot 3)^3 = 2^4 \cdot 3^3$$

Ἄρα

$$12^3 \quad (2 \cdot 6^3) = (2^6 \cdot 3^3) : (2^4 \cdot 3^3)$$

$$= 2^2 = 4$$

143. Νά συγκριθοῦν οἱ ἀριθμοὶ

$$216 \quad \text{καὶ} \quad 2^8 \cdot 3^3$$

144. Νά ἀναλυθοῦν εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων οἱ ἀκεραῖοι

$$580, 612, 1245, 1440$$

145. Ἐὰν $\alpha = 2^5 \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7^2$, $\beta = \alpha^4 \cdot 3^5 \cdot 7$ καὶ $\gamma = 2^2 \cdot 3^5 \cdot 7$

νά εὑρεθοῦν τὰ γινόμενα

$$\alpha \cdot \beta, \quad \alpha \cdot \gamma, \quad (\alpha^2 \cdot \beta) \cdot \gamma$$

καὶ τὰ πηλίκα $\alpha:\beta$, $(\alpha \cdot \beta):\gamma$

146. Ἀφοῦ ἀναλύσετε εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων τοὺς ἀκεραῖους 6, 15, 18, 30 νά εὑρετε τὰ τετράγωνα αὐτῶν. Τί παρατηρεῖτε διὰ τοὺς ἐκθέτας; Στηριζόμενοι εἰς τὴν παρατήρησίν σας, νά εὑρετε ποῖων ἀκεραίων τὰ τετράγωνα εἶναι οἱ ἀκεραῖοι $2^a \cdot 3^b$, $2^a \cdot 3^2 \cdot 5^4$ καὶ 256.

55. ΚΟΙΝΟΙ ΔΙΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ Μ.Κ.Δ. ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

55. 1. Ἄς λάβωμεν δύο ἀριθμούς, τοὺς 16 καὶ 24 καὶ ἄς εὔρωμεν τὰ σύνολα τῶν διαιρετῶν αὐτῶν. Ἐχομεν :

$$\text{Σύνολον τῶν διαιρετῶν τοῦ } 16 : A = \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

$$\text{»} \quad \text{»} \quad \text{24} : B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

Ἄς σχηματίσωμεν καὶ τὴν τομὴν τῶν συνόλων A καὶ B

$$A \cap B = \{1, 2, 4, 8\}$$

Εἰς τὸ σύνολον $A \cap B$ παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς :

i) Ἐχει ὡς στοιχεῖα τοὺς ἀριθμούς, οἱ ὅποιοι εἶναι οἱ κοινὸι διαιρετῆς τῶν 16 καὶ 24. Διὰ τοῦτο καὶ λέγεται σύνολον τῶν κοινῶν διαιρετῶν τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν.

ii) Εἶναι πεπερασμένον σύνολον καὶ ἔχει ὡς ἐλάχιστον στοιχεῖον τὸ 1 καὶ μέγιστον τὸ 8. Τὸν ἀκεραῖον 8, μέγιστον στοιχεῖον τοῦ συνόλου τῶν κοινῶν διαιρετῶν, ὀνομάζομεν μέγιστον κοινὸν διαιρέτην τῶν ἀριθμῶν 16 καὶ 24, σημειώνομεν δὲ συντόμως Μ.Κ.Δ. $(16, 24) = 8$.

iii) Τὸ σύνολον Γ τῶν διαιρετῶν τοῦ Μ.Κ.Δ., $\Gamma = \{1, 2, 4, 8\}$, ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον $A \cap B = \{1, 2, 4, 8\}$.

$$\text{Ἦτοι} : A \cap B = \Gamma$$

Μὲ ἐντελῶς ἀνάλογον τρόπον δυνάμεθα νά εὔρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. τριῶν ἢ περισσοτέρων ἀκεραίων.

Π.χ. διὰ τοὺς ἀκεραῖους 12, 20, 28 ἔχομεν :

$$\text{Σύνολον διαιρετῶν τοῦ } 12 : A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

$$\text{Σύνολον διαιρετῶν τοῦ } 20 : B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$$

$$\text{Σύνολον διαιρετῶν τοῦ } 28 : \Gamma = \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$$

Σύνολον κοινῶν διαιρετῶν :

$$\Delta = A \cap B \cap \Gamma = \{1, 2, 4\}$$

"Ωστε Μ.Κ.Δ. (12, 20, 28) είναι ο 4.

Αί άνωτέρω παρατηρήσεις μās διευκολύνουν εις τήν κατανόησιν τών έξής γενικών προτάσεων.

"Ας είναι α, β, γ... δύο η περισσότεροι άκεραίοι, έκ τών όποίων ο εις τού-
λάχιστον είναι διάφορος του μηδενός. Π.χ. $\alpha \neq 0$.

Το σύνολον Δ τών κοινών διαιρετών αυτών :

ι) Δέν είναι δυνατόν νά είναι το κενόν σύνολον

Γνωρίζομεν ότι όλοι οί αριθμοί έχουν διαιρέτην τήν μονάδα.

"Αρα και ή τομή Δ θα έχη έν τουλάχιστον στοιχείον, τήν μονάδα.

ιι) Είναι πεπερασμένον σύνολον, διότι όλα τά στοιχεΐα του είναι μικρό-
τερα (ή ίσα) μέ α. Συνεπώς ύπάρχει έν μέγιστον στοιχείον : ο Μ.Κ.Δ. τών
δοθέντων αριθμών.

ιιι) Ταυτίζεται μέ το σύνολον τών διαιρετών του Μ.Κ.Δ. τών δοθέντων
αριθμών.

55. 2. 'Αριθμοί πρώτοι πρός άλλήλους

"Ας ζητήσωμεν τόν Μ.Κ.Δ. τών αριθμών 5 και 8. Έχομεν :

Σύνολον διαιρετών του 5 : $A = \{1, 5\}$

Σύνολον διαιρετών του 8 : $B = \{1, 2, 4, 8\}$

"Αρα Μ.Κ.Δ. (5, 8) είναι ή μονάς.

"Όταν δύο η περισσότεροι άκεραίοι, όπως οί 5 και 8, έχουν ως Μ.Κ.Δ. τήν
μονάδα, λέγονται πρώτοι πρός άλλήλους.

55. 3. Παρατήρησις

Δέν πρέπει νά συγχέωμεν τās έννοιās :

1) «Πρώτος αριθμός» π.χ. ο 7 είναι πρώτος αριθμός.

2) «Πρώτοι πρός άλλήλους αριθμοί» π.χ. οί αριθμοί 6, 4, 9 είναι πρώτοι
πρός άλλήλους χωρίς έκαστος τούτων νά είναι πρώτος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

147. Εύρετε τά σύνολα τών διαιρετών τών αριθμών 15, 20, 30 και τόν Μ.Κ.Δ. αυτών.

148. 'Ο Μ.Κ.Δ. τριών αριθμών είναι ο 17. Ποιον είναι το σύνολον τών κοινών διαιρετών
των αριθμών αυτών;

149. Εύρετε τόν Μ.Κ.Δ. τών αριθμών 3, 8, 30.

150. Δύο αριθμοί είναι πρώτοι πρός άλλήλους. 'Ο εις είναι άρτιος. Είναι δυνατόν και ο
άλλος νά είναι άρτιος η όχι και διατί;

56. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Κ.Δ.

56. 1. 1η 'Ιδιότης

"Ας θεωρήσωμεν τόν Μ.Κ.Δ. $(36, 14) = 2$ και ως άντικαταστήσωμεν τόν
36 μέ τήν διαφοράν $36 - 14 = 22$

Παρατηρούμεν ὅτι $M.K.A. (22, 14)=2$

"Ωστε $M.K.A. (36, 14)=M.K.A. (36-14, 14)$.

Εἰς τὴν ἀνωτέρω παρατήρησιν δυνάμεθα νὰ φθάσωμεν, ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι οἰοσδήποτε κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 36 καὶ 14, συνεπῶς καὶ ὁ $M.K.A.$ αὐτῶν, ὀφείλει νὰ διαιρῆ καὶ τὴν διαφορὰν $36-14$ (§ 52. 4).

Γενικῶς: Ὁ $M.K.A.$ δύο ἢ περισσοτέρων ἀκεραίων δὲν ἀλλάζει, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν τὸν ἓνα ἐξ αὐτῶν μὲ τὴν διαφορὰν αὐτοῦ καὶ ἐνὸς ἄλλου ἐκ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Ἐφαρμογή. Ἐὰς ἐφαρμόσωμεν διαδοχικῶς τὴν ἀνωτέρω ιδιότητα διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ $M.K.A.$ τῶν ἀριθμῶν 42 καὶ 18 .

Ἐπειδὴ $42-18=24$, $24-18=6$, $18-6=12$, $12-6=6$

Ἐχομεν: $M.K.A. (42, 18)=M.K.A. (24, 18)=M.K.A. (6, 18)=M.K.A. (6, 12)=M.K.A. (6, 6)=6$

Ἡ εὔρεσις τοῦ $M.K.A.$ διὰ τῆς μεθόδου αὐτῆς εἶναι ἐπίτονος, ἰδίως ὅταν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι μεγάλοι.

56. 2. 2α Ἰδιότης

Ἐὰς ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ παράδειγμα τῆς 1ης ιδιότητος καὶ ὡς ἀντικαταστήσωμεν τὸν 36 μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ 14 δηλ. 8. Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ πάλιν $M.K.A. (8, 14)=2$

Ἦτοι: $M.K.A. (36, 14)=M.K.A. (8, 14)$

Εἰς τὴν ἀνωτέρω παρατήρησιν ὀδηγούμεθα, ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι ὁ οἰοσδήποτε κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 36 καὶ 14, συνεπῶς καὶ ὁ $M.K.A.$ αὐτῶν, ὀφείλει νὰ διαιρῆ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως 36 διὰ 14. (§ 52. 5).

Γενικῶς: Ὁ $M.K.A.$ δύο ἢ περισσοτέρων ἀκεραίων δὲν ἀλλάζει, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν ἓνα ἐξ αὐτῶν μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ δι' ἐνὸς ἄλλου ἐκ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

57. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ* ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

Εἰς τὴν 2αν ιδιότητα τοῦ $M.K.A.$ στηρίζεται μίᾳ σύντομος μέθοδος διὰ τὴν εὔρεσιν $M.K.A.$ δύο ἀκεραίων. Ἡ μέθοδος αὕτη λέγεται Εὐκλείδειος ἀλγόριθμος ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ μεγάλου Ἑλληνος μαθηματικοῦ Εὐκλείδου ὁ ὅποιος τὴν ἐδίδαξεν.

* Ἡ λέξις ἀλγόριθμος εἶναι ἀραβικῆς προελεύσεως καὶ σημαίνει μίαν σειρὰν πράξεων, ἢ ὅποια ἐπαναλαμβανομένη μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὴν εὔρεσιν τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος π.χ. τὴν εὔρεσιν τοῦ $M.K.A.$

Παράδειγμα

Νὰ εὐρεθῆ ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 256 καὶ 120.

$$\begin{aligned} \text{Ἐχομεν : } \text{Μ.Κ.Δ. } (256, 120) &= \text{Μ.Κ.Δ. } (16, 120) \text{ διότι } 256 = 2 \cdot 120 + 16 \\ &= \text{Μ.Κ.Δ. } (16, 8) \text{ διότι } 120 = 7 \cdot 16 + 8 \\ &= \text{Μ.Κ.Δ. } (8, 0) \text{ διότι } 16 = 2 \cdot 8 + 0 \end{aligned}$$

Ἡ πράξις διατάσσεται σχηματικῶς ὡς ἑξῆς.

Πηλίκα		2	7	2
Ἀριθμοὶ	256	120	16	8 Μ.Κ.Δ.
Ὑπόλοιπα	16	8	0	8

Γενικῶς ἔχομεν τὸν ἑξῆς κανόνα

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. δύο ἀκεραίων α καὶ β , ὅταν $\alpha > \beta$, διαιροῦμεν τὸ α διὰ β :

ι) Ἐὰν τὸ ὑπόλοιπον εἶναι 0, τότε Μ.Κ.Δ. $(\alpha, \beta) = \beta$

ιι) Ἐὰν ἡ διαίρεσις τοῦ α διὰ β δίδῃ ὑπόλοιπον $u_1 \neq 0$, διαιροῦμεν τὸ β διὰ u_1 . Ἐὰν τὸ προκύπτων ὑπόλοιπον u_2 τῆς νέας διαίρεσεως εἶναι μηδὲν ($u_2 = 0$), τότε Μ.Κ.Δ. $(\alpha, \beta) = u_1$. Ἐὰν $u_2 \neq 0$, διαιροῦμεν τὸ u_1 διὰ u_2 κ.ο.κ. μέχρις ὅτου εὐρωμεν μίαν διαίρεσιν μὲ ὑπόλοιπον 0. Αὐτὸ θὰ συμβῆ κατ' ἀνάγκην, διότι οἱ ἀκέραιοι β, u_1, u_2 , γίνονται διαρκῶς μικρότεροι $\beta > u_1 > u_2 \dots$

Ὁ διαιρέτης τῆς τελευταίας διαίρεσεως εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀκεραίων α καὶ β .

58. ΕΥΡΕΣΙΣ Μ.Κ.Δ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΕΡΑΙΩΝ

58. 1. Ἐὰν εὐρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 96, 72 καὶ 24. Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ μικρότερος τούτων, ὁ 24, εἶναι κοινὸς διαιρέτης τῶν 96 καὶ 72. Ἐὰν σκεφθῶμεν δὲ ὅτι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν τριῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν 96, 72, 24, δὲν δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 24, (Διατί;), ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ 24 εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν.

58. 2. Ἐὰν εὐρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 36, 48, 60.

Γνωρίζομεν ὅτι τὸ σύνολον τῶν κοινῶν διαιρητῶν τῶν ἀριθμῶν 60 καὶ 48 ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον τῶν διαιρητῶν τοῦ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν. Δυνάμεθα συνεπῶς νὰ ἀντικαταστήσωμεν τοὺς δύο ἀριθμοὺς 48 καὶ 60 διὰ τοῦ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν, δηλαδὴ τὸν 12. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν καταλήγωμεν εἰς τὴν εὐρεσιν τοῦ Μ.Κ.Δ. δύο ἀριθμῶν τοῦ 36 καὶ 12.

Ἦτοι Μ.Κ.Δ. $(36, 48, 60) = \text{Μ.Κ.Δ. } (36, 12) = 12$.

Ἐντελῶς ἀναλόγως ἐργαζόμεθα καὶ ὅταν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι περισσότεροι τῶν τριῶν. Τοὺς ἀντικαθιστῶμεν ἀνὰ δύο μὲ τὸν Μ.Κ.Δ. αὐτῶν ἕως ὅτου καταλήξωμεν εἰς τὴν περίπτωσιν εὐρέσεως Μ.Κ.Δ. δύο ἀριθμῶν.

58.3. Πολλὰς φορές εἰς τὴν πρᾶξιν ἐφαρμοζόμεν καὶ τὴν ἐξῆς σύντομον διάταξιν, ἡ ὁποία εἶναι μία ἐφαρμογὴ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ Μ.Κ.Δ.

α) Γράφομεν εἰς μίαν σειρὰν τοὺς δοθέν-
τας ἀριθμοὺς. 240 48 64

β) Τὸν μικρότερον ἐξ αὐτῶν (48) τὸν γρά-
φομεν πάλιν εἰς τὴν ἰδίαν στήλην· κάτωθι
δὲ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν γράφομεν τὸ ὑπό-
λοιπον τῆς διαιρέσεως ἐκάστου διὰ τοῦ 48. 0 48 16
0 0 16

γ) Ἐπαναλαμβάνομεν τὴν ἰδίαν διαδικασίαν* μέχρις οὗτοῦ εὐρωμεν εἰς μίαν
σειρὰν μηδενικὰ καὶ ἓνα μὴ μηδενικὸν ἀριθμὸν (16).

Οὗτος θὰ εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

$$\text{Μ.Κ.Δ. } (240, 48, 64) = 16$$

59. ΕΥΡΕΣΙΣ Μ. Κ. Δ. ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΔΙ' ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥΤΩΝ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Ποῖος εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀκεραίων 120, 360, 36;

* Ἄς ἀναλύσωμεν κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον εἰς γινόμενον πρῶτων πα-
ραγόντων τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς.

$$\begin{aligned} \text{Ἔχομεν :} & \quad 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \\ & \quad 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \\ & \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2 \end{aligned}$$

Παρατηροῦμεν τὰ ἐξῆς :

α) Οἱ ἀριθμοὶ 2 καὶ 3 εἶναι οἱ μόνοι κοινοὶ πρῶτοι παράγοντες εἰς τὰ ἀνω-
τέρω γινόμενα, ἄρα θὰ εἶναι κοινοὶ διαιρέται τῶν ἀριθμῶν 120, 360 καὶ 36.

β) Ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν 120, 360, 36 δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχη ἄλλους πρῶτους
παράγοντας ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 2 καὶ 3· μάλιστα θὰ περιέχη ἕκαστον
τούτων μὲ τὸν μικρότερον ἐκθέτην τὸν ὁποῖον ἔχει οὗτος εἰς τὰς ἀναλύσεις.

Εἰς τὸν Μ.Κ.Δ. δὲν δυνάμεθα νὰ συμπεριλάβωμεν τὸν παράγοντα 5,
διότι ὁ 5 δὲν διαιρεῖ τὸν 36, οὔτε τὰς δυνάμεις 2^3 ἢ 3^2 , διότι τὸ 2^3 δὲν διαιρεῖ
τὸν 36 καὶ τὸ 3^2 τὸν 120.

$$\begin{aligned} \text{Ἔστωε :} & \quad \text{Μ.Κ.Δ. } (120, 360, 36) = 2^2 \cdot 3 \\ & \quad \quad \quad = 4 \cdot 3 = 12 \end{aligned}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὀδηγούμεθα εἰς τὸν ἐξῆς γενικὸν κανόνα.

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενον
πρῶτων παραγόντων, σχηματίζομεν τὸ γινόμενον τῶν κοινῶν πρῶτων
παραγόντων αὐτῶν λαμβάνοντες ἕκαστον παράγοντα μὲ τὸν μικρότερον
ἐκθέτην.

* Λαμβάνοντες πάντοτε τὸν μικρότερον ἀριθμὸν, διάφορον τοῦ μηδενός.

Ἐφαρμογή: Ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^3$, $2^2 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7$, $2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11$ εἶναι $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

151. Νὰ εὑρετε τὸν Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν: α) 78, 104, β) 504, 576, 1140
 γ) 24, 72, 108
152. Ποῖος εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν:
 α) $2^2 \cdot 5$, 300, $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$ β) $3 \cdot 5 \cdot 7$, $2^2 \cdot 5 \cdot 11$, $2 \cdot 3^2 \cdot 11^2$
153. Μία χορωδία ἀποτελεῖται ἀπὸ 60 ὑψιφώνους, 120 μέσους καὶ 40 βαθυφώνους. Πόσας τὸ πολὺ ὁμοίας ὁμάδες δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν ἐξ αὐτῶν καὶ πόσους ὑψιφώνους, μέσους καὶ βαθυφώνους θὰ ἔχη ἐκάστη ὁμάς;
154. Ἀπὸ τὰς ἰσότητας $33=11 \cdot 3$, $132=11 \cdot 12$, $154=11 \cdot 14$ νὰ εὑρετε ἓνα κοινὸν διαιρέτην τῶν ἀριθμῶν 33, 132 καὶ 154.
155. Δύο ἀριθμοὶ ἔχουν τὸν 15 ὡς κοινὸν διαιρέτην. Δείξατε ὅτι οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ θὰ ἔχουν καὶ ἄλλους κοινούς διαιρέτας.

60. ΚΟΙΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Ἐὰν λάβωμεν δύο ἀριθμούς π.χ. τοὺς 3 καὶ 5 καὶ ἄς σχηματίσωμεν τὰ σύνολα τῶν πολλαπλασίων αὐτῶν. Ἐχομεν:

Σύνολον πολλαπλασίων τοῦ 3: $\Pi_1 = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, \dots\}$

Σύνολον πολλαπλασίων τοῦ 5: $\Pi_2 = \{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, \dots\}$.

Ἡ τομὴ τῶν συνόλων Π_1 καὶ Π_2

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \{0, 15, 30, \dots\}$$

εἶναι ἓν νέον σύνολον τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς στοιχεῖα τὰ κοινὰ πολλαπλάσια τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 5. Τὸ ἐλάχιστον στοιχεῖον, ἐκτὸς τοῦ μηδενός, τοῦ συνόλου τούτου εἶναι ὁ ἀκέραιος 15. Διὰ τοῦτο ὁ ἀκέραιος 15 ὀνομάζεται ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 5.

Σημειώνεται δὲ συντόμως Ε.Κ.Π. (3, 5)

Ἐὰς σχηματίσωμεν τὸ σύνολον

$$\Pi = \{x \mid x \text{ πολλαπλάσιον τοῦ Ε.Κ.Π.}\} = \{0, 15, 30, 45, \dots\}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τοῦτο ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \{0, 15, 30, \dots\}$$

Ἦτοι:

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \Pi$$

Ὅμοιās παρατηρήσεις δυνάμεθα νὰ κάμωμεν καὶ ὅταν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι τρεῖς ἢ περισσότεροι.

Π.χ. διὰ τὸ Ε.Κ.Π. (12, 15, 20) ἔχομεν:

Σύνολον πολλαπλασίων 12: $\Pi_1 = \{0, 12, 24, 36, 48, 60, \dots\}$

Σύνολον πολλαπλασίων 15: $\Pi_2 = \{0, 15, 30, 45, 60, 75, \dots\}$

Σύνολον πολλαπλασίων 20: $\Pi_3 = \{0, 20, 40, 60, 80, \dots\}$

καὶ ἐπομένως

$$\begin{aligned} \Pi_1 \cap \Pi_2 \cap \Pi_3 &= \{0, 60, 120, \dots\} \\ &= \{x \mid x \text{ πολ./σιον τοῦ } 60\} \end{aligned}$$

Αί άνωτέρω παρατηρήσεις μās διευκολύνουν εις τήν κατανόησιν τών έξής γενικών προτάσεων :

Έάν δοθοῦν δύο ή περισσότεροι φυσικοί αριθμοί, τότε τὸ σύνολον τών κοινών πολλαπλασίων των :

1) Είναι έν άπειροσύνολον, διότι μεταξύ τών άλλων στοιχείων του περιέχει τὸ γινόμενον τών αριθμῶν αὐτῶν ὡς καί τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ, τὰ όποια είναι εις άπειρον πλῆθος (Διατί;)

2) Έχει έν ελάχιστον στοιχείον, διάφορον τοῦ μηδενός, τὸ όποιον είναι καί τὸ Ε.Κ.Π. τών δοθέντων αριθμῶν.

3) Ταυτίζεται με τὸ σύνολον τών πολλαπλασίων τοῦ Ε.Κ.Π. τών δοθέντων αριθμῶν.

61. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π. ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Εις τήν προηγουμένην παράγραφον έγνωρίσαμεν μίαν γενικήν μέθοδον εύρέσεως τοῦ Ε.Κ.Π. δύο ή περισσοτέρων φυσικῶν αριθμῶν. Ή μέθοδος αὕτη είναι επίπρονος, ιδίως όταν οί αριθμοί είναι μεγάλοι.

Τὰ κατωτέρω παραδείγματα μās οδηγοῦν εις δύο άλλους τρόπους εύρέσεως τοῦ Ε.Κ.Π., οί όποιοι μās είναι χρήσιμοι εις τούς ύπολογισμούς.

Παράδειγμα 1ον

Νά εύρεθῆ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν αριθμῶν 20 καί 24.

Έχομεν :

Σύνολον πολ/σίων τοῦ 20: $\Pi_1 = \{0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, \dots\}$

Σύνολον πολ/σίων τοῦ 24: $\Pi_2 = \{0, 24, 48, 72, 96, 120, \dots\}$

Σύνολον $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \{0, 120, 240, \dots\}$

Ώστε Ε.Κ.Π. (20, 24) = 120

Άς αναλύσωμεν ἤδη τούς αριθμούς 20, 24 καί τὸ Ε.Κ.Π. αὐτῶν 120, εις γινόμενα πρώτων παραγόντων.

Έχομεν $20 = 2^2 \cdot 5$
 $24 = 2^3 \cdot 3$
 $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

Άρα αντί Ε.Κ.Π. (20, 24) = 120
 έχομεν Ε.Κ.Π. ($2^2 \cdot 5$, $2^3 \cdot 3$) = $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ (1)

Όμοίως εργαζόμενοι εύρίσκομεν ότι :
 Ε.Κ.Π. ($2^3 \cdot 7$, $2 \cdot 3 \cdot 5$) = $2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ (2)

Ε.Κ.Π. ($2 \cdot 3$, $2 \cdot 5$, $3^2 \cdot 7$) = $2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ (3)

Αί άνωτέρω ισότητες (1), (2), (3) μās οδηγοῦν εις τὸν έξής κανόνα :

Διά νά εύρωμεν τὸ Ε.Κ.Π. αριθμῶν αναλελυμένων εις γινόμενον πρώτων παραγόντων, σχηματίζομεν τὸ γινόμενό τών μεγίστων δυνά-

μεων τῶν κοινῶν καὶ μὴ κοινῶν παραγόντων, οἱ ὅποιοι ὑπάρχουν εἰς τὰς ἀναλύσεις τῶν ἀριθμῶν.

Παράδειγμα 2ον

Νὰ εὐρεθῇ ὁ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν 12, 14, 42.

Γράφομεν τοὺς ἀριθμοὺς εἰς μίαν σειρὰν καὶ φέρομεν κατακόρυφον εὐθεῖαν δεξιὰ τοῦ τελευταίου. Ἐὰν ὑπάρχουν δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι ἔχουν ἓνα κοινὸν πρῶτον διαιρέτην, γράφομεν αὐτὸν δεξιὰ τῆς κατακόρυφου γραμμῆς καὶ διαιροῦμεν τοὺς ἀριθμοὺς δι' αὐτοῦ. Κάτωθεν τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι διαιροῦνται ἀκριβῶς, γράφομεν τὰ πηλικά τῶν διαιρέσεων, τοὺς δὲ ἄλλους μεταφέρομεν ὡς ἔχουν.	12	14	42	2
	6	7	21	3
	2	7	7	7
	2	1	1	

$$\text{Ε.Κ.Π. (12, 14, 42)} = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 2 \\ = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

Τοιοῦτοτρόπως λαμβάνομεν μίαν νέαν σειρὰν ἀριθμῶν εἰς αὐτὴν ἐργαζόμεθα ὁμοίως, ἔως ὅτου φθάσωμεν εἰς σειρὰν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι ἀνὰ δύο εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. Τὸ Ε.Κ.Π., ἴσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν διαιρετῶν, τοὺς ὁποίους ἐγράψαμεν δεξιὰ τῆς κατακόρυφου, πολλαπλασιασμένον ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν τῆς τελευταίας σειρᾶς.

Παρατήρησις

Τὸ Ε.Κ.Π. δοθέντων ἀριθμῶν, τῶν ὁποίων ὁ μεγαλύτερος ἐξ αὐτῶν εἶναι διαιρετὸς δι' ὄλων τῶν ἄλλων, εἶναι ὁ μεγαλύτερος οὗτος ἀριθμὸς (Διατί;)

Π.χ. Ε.Κ.Π. (6, 12, 48) = 48

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

156. Νὰ εὑρετε τὸ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν :

α) 6, 18 β) 8, 20, 30 γ) 14, 31, 24, 48

157. Ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς: 885, 1670, 8976, 336 καὶ 2340 εἶναι κοινὰ πολλαπλάσια τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 5;

158. Ποῖον εἶναι τὸ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν $2^2 \cdot 5 \cdot 7$ καὶ 644;

159. Τρεῖς ποδηλάται ἀναχωροῦν συγχρόνως ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐνὸς κυκλικοῦ στίβου καὶ κινοῦνται κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν. Ὁ πρῶτος διανύει τὸν στίβον εἰς 25 sec, ὁ δεύτερος εἰς 36 sec καὶ ὁ τρίτος εἰς 45 sec. Μετὰ πόσον χρόνον ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως των θὰ συναντηθοῦν εἰς τὸ σημεῖον τῆς ἀφετηρίας καὶ πόσους γύρους θὰ ἔχη κάνει ἕκαστος ἐξ αὐτῶν;

160. Οἱ μαθηταὶ μῆς τάξεως δύνανται νὰ παραταχθοῦν εἰς τριάδας ἢ τετράδας ἢ πεντάδας χωρὶς νὰ περισσεύη κανεὶς, εἶναι δὲ ὀλιγώτεροι ἀπὸ 80. Πόσους μαθητὰς ἔχει ἡ τάξις;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

161. Όλα τὰ ψηφία ἐνὸς ἀριθμοῦ εἶναι 5. Εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι διαιρετὸς ὁ ἀριθμὸς διὰ 2 ἢ 3 ἢ 4 ἢ 5 ἢ 9;

162. Εἰς ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διὰ 9. Ἐὰν ἀλλάξωμεν τὴν σειρὰν τῶν ψηφίων τῶν, ὁ νέος ἀριθμὸς θὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ 9;

163. Δίδεται ὁ ἀριθμὸς 7254; Ἀντικαταστήσατε τὰ ἐρωτηματικὰ μὲ ψηφία ὥστε ὁ προκύπτων ἀριθμὸς νὰ εἶναι διαιρετὸς συγχρόνως διὰ 4 καὶ 9.

164. Ἡ διαίρεσις ἐνὸς ἀκεραίου α διὰ 72 ἀφ'ἣνι ὑπόλοιπον 64. Ποῖος εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν α καὶ 72;

165. Νὰ εὑρεθοῦν δύο ἀριθμοὶ οἱ ὅποιοι νὰ ἔχουν ἀθροισμα 288 καὶ Μ.Κ.Δ. 24.

166. Δικαιολογήσατε διατί, ὅταν ἓνας ἀκέραιος διαιρῆ δύο ἄλλους ἀκεραίους, θὰ διαιρῆ καὶ τὸν Μ.Κ.Δ. αὐτῶν.

167. Νὰ εὑρετε τὸν Μ.Κ.Δ. καὶ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν: $A=2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$ καὶ $B=2^2 \cdot 3^4 \cdot 5$. Ἐπειτα νὰ συγκρίνετε τὸ γινόμενον $A \cdot B$ μὲ τὸ γινόμενον τοῦ Μ.Κ.Δ. ἐπὶ τὸ Ε.Κ.Π. Τί παρατηρεῖτε;

168. Οἱ μαθηταὶ ἐνὸς σχολείου εἶναι τόσοι ὥστε, ἐὰν τοποθετηθοῦν κατὰ 10 δας λείπει εἷς, ἐνῶ ἐὰν τοποθετηθοῦν κατὰ 9 δας περισσεύουν 7. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου τούτου, ἐὰν γνωρίζωμεν ὅτι εἶναι περισσότεροι ἀπὸ 300 καὶ ὀλιγώτεροι ἀπὸ 400;

169. Θέλωμεν νὰ μοιράσωμεν 8800 δρχ., 200 ζεύγη κάλτσες καὶ 80 φανέλλες ἐξ ἴσου εἰς πτωχὰς οἰκογενεῖας. Πόσας τὸ πολὺ οἰκογενεῖας δυνάμεθα νὰ βοηθήσωμεν καὶ πόσα ἀπὸ ἕκαστον εἶδος θὰ λάβῃ ἕκαστη οἰκογένεια;

170. Τρία ἀτμόπλοια ἐκτελοῦντα τὰ δρομολογία τῶν ἀνεχώρησαν συγχρόνως μίαν ἡμέραν ἐκ Πειραιῶς. Τὸ πρῶτον ἀτμόπλοιο ἐπανέρχεται καὶ ἀναχωρεῖ πάλιν ἐκ Πειραιῶς ἀνὰ 18 ἡμέρας, τὸ δεύτερον ἀνὰ 20 ἡμέρας καὶ τὸ τρίτον ἀνὰ 24 ἡμέρας.

Μετὰ πόσας τὸ ὀλιγώτερον ἡμέρας θὰ συναντηθοῦν καὶ πάλιν εἰς τὸν Πειραιᾶ;

171. Εἰς μίαν ἀτελῆ διαίρεσιν ὁ διαιρετέος εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5 καὶ ὁ διαιρέτης 25. Ποῖον εἶναι τὸ σύνολον τῶν δυνατῶν τιμῶν τοῦ ὑπολοίπου;



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ


62. ΚΛΑΣΜΑΤΑ

62. 1. Διαίρεσις εὐθ. τμήματος διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ

α) Εἰς τὸ παραπλεύρως σχεδ. 20 διακρίνομεν πῶς χωρίζομεν γεωμετρικῶς τὸ εὐθ. τμήμα AB εἰς 5 ἴσα μέρη.

Ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄκρου A φέρομεν ἡμιευθεῖαν Ax καὶ ἐπ' αὐτῆς λαμβάνομεν διαδοχικῶς 5 ἴσα εὐθ. τμήματα.

$$AM = MN = NP = P\Sigma = \Sigma T$$



Σχ. 20

Φέρομεν τὸ εὐθ. τμήμα TB καὶ ἐκ τῶν σημείων M, N, P, Σ παραλλήλους πρὸς TB. Μὲ τὸν διαβήτην μας ἐπαληθεύομεν ὅτι αὗται χωρίζουν τὸ τμήμα AB εἰς 5 ἴσα τμήματα.

$$A\Gamma = \Gamma\Delta = \Delta E = E Z = Z B$$

Μὲ ὅμοιον τρόπον ἐργαζόμεθα διὰ νὰ χωρίσωμεν τὸ AB εἰς ν ($\nu \in \mathbb{N}$) ἴσα τμήματα.

β) Ἐὰν προσέξωμεν ἓν ἀπὸ τὰ 5 ἴσα τμήματα τοῦ AB, π.χ. τὸ AΓ.

Εἶναι $5 \cdot A\Gamma = AB$

Τὸ εὐθ. τμήμα AΓ λέγεται πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ AB διὰ 5.

Γράφομεν δὲ $AB : 5 = A\Gamma$


Ἦτοι $5 \cdot A\Gamma = AB \iff AB : 5 = A\Gamma$

Γενικῶς: Ὀνομάζομεν πηλίκον διαιρέσεως ἑνὸς τμήματος α διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ ν ἓν εὐθ. τμήμα β τοιοῦτον, ὥστε $\nu \cdot \beta = \alpha$

$$\alpha : \nu = \beta \iff \nu \cdot \beta = \alpha \quad \nu \in \mathbb{N}$$

Ειδικῶς διὰ $n=1$ θέτομεν $\alpha:1=\alpha$

62. 2. Κλασματική μονάς



Εἰς τὸ σχ. 21 εἶναι $AM=AB:2$.

Ἄλλος τρόπος νὰ δηλώσωμεν τοῦτο εἶναι νὰ εἴπωμεν AM εἶναι «ἐν δεύτερον τοῦ AB » ἢ «ἐν δεύτερον ἐπὶ AB », νὰ γράψωμεν δὲ

$$AM = \frac{1}{2} \cdot AB$$

Ἦτοι ἡ γραφή $\frac{1}{2}$ παριστάνει ἓνα «νέον» ἀριθμὸν τοιοῦτον ὥστε τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ AB νὰ ἰσοῦται μὲ τὸ πηλίκον $AB:2$

$$\frac{1}{2} \cdot AB = AB : 2$$

Ὅμοίως θεωροῦμεν «νέους» ἀριθμοὺς $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$ τοιοῦτους ὥστε :

$$\frac{1}{3} \cdot AB = AB : 3, \quad \frac{1}{4} \cdot AB = AB : 4, \quad \frac{1}{5} \cdot AB = AB : 5 \dots$$

Ἐκαστος ἐκ τῶν «νέων» αὐτῶν ἀριθμῶν

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{4} \dots \frac{1}{v} \quad v \in \mathbb{N}$$

λέγεται κλασματικὴ μονάς.

Κατὰ τ' ἀνωτέρω : Ἐὰν $\frac{1}{v}$ εἶναι μία κλασματικὴ μονάς καὶ AB ἓν εὐθ. τμήμα, τότε

$$\frac{1}{v} \cdot AB = AB : v$$

62. 3. Κλασματικοὶ ἀριθμοὶ

α) Ὅπως ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα σχηματίζομεν τοὺς ἀκεραίους ἀριθμοὺς, π.χ. $1+1=2 \cdot 1=2$, $1+1+1=3 \cdot 1=3$, τοιοιτοτρόπως ἀπὸ ἐκάστην κλασματικὴν μονάδα σχηματίζομεν «νέους» ἀριθμοὺς, τοὺς κλασματικούς.

Συγκεκριμένως: Ἀντὶ «2 φορές τὸ $\frac{1}{7}$ » λέγομεν «γινόμενον 2 ἐπὶ $\frac{1}{7}$ » ἢ «κλάσμα δύο ἑβδομα».

Γράφομεν δὲ $2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{7}$

Ἐπίσης $3 \cdot \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$, $3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$, $5 \cdot \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$

Γενικῶς, ἀντὶ «α φορὰς τὸ $\frac{1}{\beta}$ » λέγομεν «γινόμενον α ἐπὶ $\frac{1}{\beta}$ » ἢ «κλάσμα α διὰ β».

Γράφομεν δὲ

$$\alpha \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \text{ὅπου } \alpha \in \mathbb{N}_0 \text{ καὶ } \beta \in \mathbb{N}.$$

Ἦτοι: **Ἐκαστον κλάσμα εἶναι γινόμενον ἑνὸς ἀκεραίου ἐπὶ μίαν κλασματικὴν μονάδα.**

Εἰς τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$ ὁ ἀκέραιος ἀριθμὸς α (ὑπεράνω τῆς ὀριζοντίας γραμμῆς) λέγεται ἀριθμητής, ἐνῶ ὁ φυσικὸς ἀριθμὸς β (κάτω τῆς ὀριζοντίας γραμμῆς) παρονομαστής. Οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β λέγονται ὄροι τοῦ κλάσματος αὐτοῦ.

62. 4. Γινόμενον κλάσματος ἐπὶ εὐθ. τμήμα

Ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω, τὸ γινόμενον μιᾶς κλασματικῆς μονάδος $\frac{1}{\nu}$ ἐπὶ εὐθ. τμήμα AB ἰσοῦται μὲ τὸ πηλίκον AB:ν. Κατωτέρω θὰ ὀρίσωμεν τὸ γινόμενον ἑνὸς κλάσματος ἐπὶ εὐθ. τμήμα.

Χαράσσομεν ἓν εὐθ. τμήμα AB καὶ εὐρίσκομεν:



α) Τὸ πηλίκον αὐτοῦ διὰ 4

β) Τὸ γινόμενον τοῦ 3 ἐπὶ τὸ εὐρεθὲν πηλίκον, σχ. 22.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν δύο ἀνωτέρω διαδοχικῶν πράξεων ἦτοι τὸ τμήμα

$$EZ = 3 \cdot \Gamma\Delta$$

$$\eta \quad EZ = 3 \cdot \left(\frac{1}{4} AB \right)$$

λέγεται γινόμενον τοῦ κλάσματος $\frac{3}{4}$ ἐπὶ τὸ εὐθ. τμήμα AB.

Γράφομεν δέ: $EZ = \frac{3}{4} \cdot AB$

Ὡστε: $\frac{3}{4} \cdot AB = 3 \cdot \left(\frac{1}{4} AB \right)$

Γενικῶς: Γινόμενον κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$ ἐπὶ εὐθ. τμήμα AB λέγεται τὸ γινόμενον τοῦ α ἐπὶ τὸ τμήμα $\frac{1}{\beta} \cdot AB$.

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot AB = \alpha \cdot \left(\frac{1}{\beta} \cdot AB \right)$$



Π.χ. εἰς τὸ σχῆδιον 23 ἔχομεν

Σχ. 23

$$AG = \frac{2}{5} \cdot AZ, \quad AE = \frac{4}{5} \cdot AZ, \quad AD = \frac{3}{4} \cdot AE \dots$$

62. 5. Ἡ ἀκεραία μονὰς ὡς κλάσμα

Εἰς τὸ σχ. 23 εἶναι

$$AB + BG + \Gamma\Delta + \Delta E + EZ = AZ$$

$$\eta \quad \frac{1}{5} \cdot AZ + \frac{1}{5} \cdot AZ + \frac{1}{5} \cdot AZ + \frac{1}{5} \cdot AZ + \frac{1}{5} \cdot AZ = AZ$$

$$\eta \quad 5 \cdot \left(\frac{1}{5} AZ \right) = AZ$$

$$\eta \quad \frac{5}{5} \cdot AZ = 1 \cdot AZ$$

Ἡ τελευταία ἰσότης μᾶς ὀδηγεῖ νὰ γράψωμεν

$$\frac{5}{5} = 1$$

$$\text{Ὅμοίως} \quad \frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{4}{4} = \frac{5}{5} = \frac{\alpha}{\alpha} = 1 \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

$$\text{Κατ' ἐπέκτασιν δὲ σημειώνομεν καὶ} \quad \frac{1}{1} = 1$$

Ἡτοι: **Ἐκαστον κλάσμα μὲ ἴσους ὄρους ἰσοῦται μὲ τὴν μονάδα.**

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

172. Ποῖον κλάσμα τῆς ὀρθῆς γωνίας εἶναι μία γωνία 40° , 50° ;

173. Νὰ γράψετε ἐν εὐθ. τμήμα AB καὶ ἔπειτα τμήματα ἴσα πρὸς $\frac{1}{3} \cdot AB$, $\frac{1}{4} \cdot AB$,

$$\frac{2}{3} \cdot AB, \quad \frac{3}{4} \cdot AB.$$

174. Ποια γινόμενα παριστούν τὰ κλάσματα $\frac{3}{11}$, $\frac{5}{13}$, $\frac{7}{9}$;


175. Ἐάν $\chi \in \mathbb{N}_0$, νὰ εὑρετε διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ χ τὸ κλάσμα $\frac{5}{\chi+3}$ ἰσοῦται μὲ 1.

176. Διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ $\chi \in \mathbb{N}_0$ τὸ κλάσμα $\frac{2 \cdot \chi + 3}{9}$ ἰσοῦται μὲ τὴν μονάδα;

63. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΕΠΙ ΚΛΑΣΜΑ


63. 1. Ὅρισμός

Ἐὰν προσπαθῆσωμεν νὰ ὀρίσωμεν τὸ γινόμενον $3 \cdot \frac{2}{7}$



Εἰς τὸ σχ. 24α ἐσχηματίσαμεν ἀρχικῶς τὸ γινόμενον $\frac{2}{7} \cdot AB$ καὶ ἔπειτα τὸ

γινόμενον $3 \cdot \left(\frac{2}{7} AB\right)$.



Εἰς τὸ σχ. 24β ἐσχηματίσαμεν τὸ γινόμενον $\frac{6}{7} \cdot AB$

Σχ. 24

Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις κατελήξαμεν εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα. Ἦτοι ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ $\frac{2}{7}$ ἐπὶ AB καὶ ἔπειτα τὸ 3 ἐπὶ τὸ εὑρεθὲν γινόμενον, θὰ εὑρωμεν τὸ γινόμενον $\frac{6}{7} \cdot AB$.

$$3 \cdot \left(\frac{2}{7} \cdot AB\right) = \frac{6}{7} \cdot AB$$

Ἡ παρατήρησις αὕτη μᾶς ὀδηγεῖ νὰ λάβωμεν

$$3 \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{7} \quad \eta \quad 3 \cdot \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 2}{7}$$

Γενικῶς:

$$\alpha \cdot \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0, \gamma \in \mathbb{N} \quad (1)$$

Τὸ γινόμενον ἀκεραίου α ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{\beta}{\gamma}$ ἰσοῦται πρὸς τὸ κλάσμα

$$\frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma}$$

63. 2. Έφαρμογαι

i) Έάν εις τόν τύπον (1) θέσωμεν $\gamma = \beta$, θά ἔχωμεν $\alpha \cdot \frac{\beta}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta}$.

Ἦ

$$\boxed{\alpha = \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta}} \quad (2)$$

Ὁ τύπος (2) μᾶς ἐπιτρέπει :

α) Νά θέσωμεν τόν ἀκέραιον α ὑπό μορφήν κλάσματος.

Παραδείγματα :

$$2 = \frac{2 \cdot 3}{3} = \frac{2 \cdot 4}{4} = \frac{2 \cdot 5}{5} \dots$$

$$\alpha = \frac{\alpha \cdot 2}{2} = \frac{\alpha \cdot 3}{3} = \frac{\alpha \cdot 4}{4} = \frac{\alpha \cdot 5}{5} \dots$$

β) Νά θέσωμεν ὑπό μορφήν ἀκεραίου ἐν κλάσμα τοῦ ὁποίου ὁ ἀριθμητήσ εἶναι γινόμενον ἑνὸς ἀκεραίου ἐπὶ τὸν παρονομαστήν.

Παραδείγματα :

$$\frac{2 \cdot 3}{3} = 2, \quad \frac{3 \cdot 3}{3} = 3, \quad \frac{4 \cdot 3}{3} = 4 \dots$$

$$\frac{2 \cdot \alpha}{\alpha} = 2, \quad \frac{3 \cdot \alpha}{\alpha} = 3, \quad \frac{4 \cdot \alpha}{\alpha} = 4 \dots \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

ii) Έάν εις τόν τύπον (1) θέσωμεν $\gamma = \alpha$ θά ἔχωμεν

$$\alpha \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\alpha} \quad \text{καὶ ἐπειδὴ} \quad \frac{\alpha \cdot \beta}{\alpha} = \beta$$

θά ἔχωμεν

$$\boxed{\alpha \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \beta} \quad (3)$$

Ὁ τύπος (3) δηλοῖ ὅτι τὸ γινόμενον ἑνὸς φυσικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ κλάσμα μὲ παρονομαστήν τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν ἰσοῦται μὲ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος.

Παραδείγματα :

$$3 \cdot \frac{2}{3} = 2, \quad 4 \cdot \frac{3}{4} = 3, \quad 5 \cdot \frac{3}{5} = 3$$

$$\alpha \cdot \frac{2}{\alpha} = 2, \quad \alpha \cdot \frac{3}{\alpha} = 3, \quad \alpha \cdot \frac{4}{\alpha} = 4 \quad \text{ὅπου} \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

177. Ἐὰν αὐξήσωμεν τὸν ἀριθμὸν 36 κατὰ τὰ $\frac{3}{9}$ αὐτοῦ πόσος θὰ γίνη;

178. Νὰ γραφοῦν ὡς ἀκέραιοι τὰ κλάσματα :

$$\frac{12}{4}, \quad \frac{5 \cdot \alpha}{5}, \quad \frac{5 \cdot \alpha}{\alpha} \quad \text{ὅπου } \alpha \in \mathbb{N}$$

179. Εἰς τὰς κατωτέρω ἰσότητος ἀντικαταστήσατε τὸ χ μὲ κατάλληλον ἀκέραιον ὥστε αὐτὰ νὰ εἶναι ἀληθεῖς

$$4 = \frac{11 + \chi}{5}, \quad \chi = \frac{24}{4}, \quad 9 = \frac{3\chi + 3}{6}$$

64. Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ

64. 1. Ὅρισμός

Χαράξατε ἓν εὐθ. τμήμα AB καὶ εὔρετε :

α) τὰ $\frac{6}{8}$ αὐτοῦ καὶ β) τὰ $\frac{3}{4}$ αὐτοῦ. Συγκρίνατε αὐτά. Τί παρατηρεῖτε;

$$\text{Εἶναι} \quad \frac{3}{4} \cdot AB = \frac{6}{8} \cdot AB \quad (1)$$

Ἡ ἀνωτέρω ἰσότης μᾶς ὁδηγεῖ νὰ λάβωμεν τὰ κλάσματα $\frac{3}{4}$ καὶ $\frac{6}{8}$ ὡς ἴσα μεταξύ των.

$$\text{Ἦτοι:} \quad \frac{3}{4} = \frac{6}{8}$$

Γενικῶς : Ἐὰν $\frac{\alpha}{\beta} \cdot AB = \frac{\gamma}{\delta} \cdot AB$, ὅπου $\alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0$, $\beta, \delta \in \mathbb{N}$,

τότε λέγομεν ὅτι τὰ κλάσματα $\frac{\alpha}{\beta}$ καὶ $\frac{\gamma}{\delta}$ εἶναι ἴσα μεταξύ των ἢ ἀπλῶς ἴσα· γράφομεν δὲ

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$

64. 2. Χαρακτηριστικὴ ιδιότης

Ἄς ἴδωμεν πῶς εἶναι δυνατὸν ἕκαστον τῶν ἴσων κλασμάτων $\frac{3}{4}$ καὶ $\frac{6}{8}$ νὰ προκύψῃ ἀπὸ τὸ ἄλλο. Παρατηροῦμεν ὅτι ἐὰν μὲν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ $\frac{3}{4}$ ἐπὶ 2 θὰ εὔρωμεν $\frac{6}{8}$. Ἐὰν δὲ διαιρέσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ

$$\frac{6}{8} \text{ διὰ } 2 \text{ εὔρισκομεν } \frac{3}{4}.$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}, \quad \frac{6}{8} = \frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}.$$

Ἀπὸ τὴν παρατήρησιν αὐτὴν ὀδηγοῦμεθα εἰς τὴν ἐξῆς θεμελιώδη ιδιότητα τῶν ἴσων κλασμάτων.

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους ἑνὸς κλάσματος ἐπὶ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμὸν ἢ ἔαν τοὺς διαιρέσωμεν διὰ τοῦ αὐτοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ, ὅταν εἶναι δυνατὰ αἱ διαιρέσεις, τότε προκύπτει κλάσμα ἴσον πρὸς τὸ ἀρχικόν.

$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \gamma}, \quad \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \gamma} = \frac{(\alpha \cdot \gamma) : \gamma}{(\beta \cdot \gamma) : \gamma} = \frac{\alpha}{\beta} \quad \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \gamma \in \mathbb{N} \end{array}$
--

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἔαν δοθῇ ἓν κλάσμα, π.χ. τὸ $\frac{3}{4}$, δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν μὴ πεπερασμένον πλῆθος κλασμάτων ἴσων πρὸς αὐτό.

$$\begin{aligned} \text{Ἦτοι: } \frac{3}{4} &= \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3 \cdot 4}{4 \cdot 4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \dots \\ &= \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{16} = \frac{15}{20} = \dots \end{aligned}$$

Τὸ σύνολον ὄλων αὐτῶν τῶν ἴσων κλασμάτων λέγομεν ὅτι ἀποτελεῖ μίαν κλάσιν ἰσοδυναμίας.

Ὅμοίως τὸ σύνολον τῶν κλασμάτων τῶν ἴσων πρὸς τὸ $1/2$, ἦτοι τὸ σύνολον

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}, \dots \right\}$$

ἀποτελεῖ μίαν ἄλλην κλάσιν ἰσοδυναμίας.

Γενικῶς τὸ σύνολον ὄλων τῶν κλασμάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι ἴσα πρὸς δοθὲν κλάσμα, ἀποτελεῖ μίαν κλάσιν ἰσοδυναμίας.

65. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

65. 1. Ἀνάγωγα κλάσματα

1) Ἄς προσέξωμεν τὰ κλάσματα μιᾶς κλάσεως ἰσοδυναμίας, π.χ. τῆς κλάσεως

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}, \dots \right\}$$

Μεταξὺ ὄλων αὐτῶν τῶν κλασμάτων πλέον εὔχρηστον εἶναι τὸ κλάσμα

$\frac{1}{2}$. (Διατί;). Οί ὄροι τούτου εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ λέγεται ἀνάγωγον κλάσμα.

Γενικῶς: "Ὅταν ἓν κλάσμα ἔχη τοὺς ὄρους του πρώτους πρὸς ἀλλήλους λέγεται ἀνάγωγον.

Παραδείγματα

Τὰ κλάσματα $\frac{2}{5}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{8}{11}$ εἶναι ἀνάγωγα. Ἀντιθέτως τὰ κλάσματα $\frac{2}{6}$, $\frac{4}{8}$, $\frac{2}{36}$ δὲν εἶναι ἀνάγωγα. (Διατί;)

65. 2. Ἀπλοποιήσις κλάσματος

Ἐὰν μᾶς δοθῇ ἓν ἀνάγωγον κλάσμα, π.χ. τὸ κλάσμα $\frac{1}{2}$, τότε δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους αὐτοῦ ἐπὶ 2, 3, 4 . . . καὶ νὰ εὑρωμεν τὰ μὴ ἀνάγωγα κλάσματα $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{8}$. . . τὰ ὁποῖα εἶναι ἴσα πρὸς αὐτό.

Ἀντιστρόφως ἐὰν μᾶς δοθῇ ἓν μὴ ἀνάγωγον κλάσμα, π.χ. τὸ κλάσμα $\frac{24}{60}$, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τοὺς ὄρους του διὰ τοῦ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν,

$$\text{Μ.Κ.Δ. (24 καὶ 60)} = 12, \quad \frac{24}{60} = \frac{24:12}{60:12} = \frac{2}{5}$$

καὶ νὰ εὑρωμεν τὸ ἴσον πρὸς αὐτὸ ἀνάγωγον κλάσμα.

Τὸ ἀνάγωγον κλάσμα $\frac{2}{5}$ ἔχει τοὺς ὄρους του μικρότερος ἀπὸ τοὺς ἀντιστοίχους ὄρους τοῦ ἴσου πρὸς αὐτὸ κλάσματος $\frac{24}{60}$. εἶναι ὅπως λέγομεν ἀπλούστερον. Διὰ τοῦτο ἡ ἀνωτέρω ἐργασία λέγεται ἀπλοποιήσις τοῦ κλάσματος $\frac{24}{60}$.

Γενικῶς: Ἀπλοποιήσις ἐνὸς κλάσματος λέγεται ἡ εὑρεσις ἄλλου κλάσματος ἴσου πρὸς αὐτὸ ἀλλὰ μὲ μικρότερους ὄρους.

Παραδείγματα ἀπλοποιήσεως

$$\begin{array}{l|l} \frac{125}{1500} = \frac{125:125}{1500:125} = \frac{1}{12} & \frac{2 \cdot \alpha}{5 \cdot \alpha} = \frac{(2 \cdot \alpha) : \alpha}{(5 \cdot \alpha) : \alpha} \\ & = \frac{2 \cdot (\alpha : \alpha)}{5 \cdot (\alpha : \alpha)} = \frac{2}{5} \quad \alpha \in \mathbb{N} \end{array}$$

Διότι Μ.Κ.Δ. (125, 1500) = 125

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

180. Γράψατε το σύνολο των κλασμάτων τα όποια έχουν παρονομαστήν 30 ή 50 και είναι ίσα πρὸς τὸ κλάσμα $\frac{5}{6}$.

181. Νὰ εὑρεθῆ κλάσμα ἴσον πρὸς τὸ $\frac{3}{5}$ καὶ τοῦ ὁποίου οἱ ὄροι ἔχουν Μ.Κ.Δ. τὸν ἀριθμὸν 7.

182. Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ κλάσματα

$$\frac{3 \cdot 5^2 + 3 \cdot 10}{15}, \quad \frac{3^6 \cdot 5^8 \cdot 7^4}{3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^6}, \quad \frac{2 \cdot \alpha + 3 \cdot \alpha}{6 \cdot \alpha} \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

183. Μία ὀποιαδήποτε κλασματική μονὰς εἶναι ἀνάγωγος κλάσμα; Διατί;

184. Νὰ προσδιορίσετε τὸν ἀκέραιον χ εἰς τρόπον ὥστε

$$\frac{2\chi + 2}{5} = \frac{8}{10}$$

66. Ο ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΣ ΠΗΛΙΚΟΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

66. 1. Ἐχομεν ὀρίσει τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$, $\alpha \in \mathbb{N}_0$, $\beta \in \mathbb{N}$ ὡς γινόμενον τοῦ ἀκεραίου α ἐπὶ τὴν κλασματικὴν μονάδα $\frac{1}{\beta}$, $\frac{\alpha}{\beta} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$.

Κατωτέρω θὰ ἴδωμεν μίαν ἄλλην σημασίαν τοῦ κλάσματος αὐτοῦ.

66. 2. Ἐς ζητήσωμεν τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2:3. Ἦτοι ἄς ζητήσωμεν ἓνα ἀριθμὸν τοῦ ὁποίου τὸ γινόμενον ἐπὶ 3 νὰ ἰσοῦται μὲ 2. Ὡς γνωστὸν δὲν ὑπάρχει τοιοῦτος ἀκέραιος. Ὑπάρχει ὁμως κλάσμα

Πράγματι $3 \cdot \frac{2}{3} = 2$

Ἡ ἀνωτέρω ἰσότης μᾶς ἐπιτρέπει νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{2}{3}$ εἶναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2:3. (Διατί; Ἐνθυμηθῆτε ὅτι $\delta \cdot \pi = \Delta \iff \Delta : \delta = \pi$)

Ὡστε $2 : 3 = \frac{2}{3}$

Γενικῶς διὰ τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$ $\left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta \in \mathbb{N}, \end{array} \right\}$

ἔχομεν $\beta \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \alpha$

Ἦτοι $\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta} \quad \alpha \in \mathbb{N}_0, \beta \in \mathbb{N} \quad (1)$

66. 3. Συμπέρασμα

Χάρης εις τὰ κλάσματα ἐκάστη διαιρέσις κατέστη δυνατή καὶ τελεία ἐκτὸς βεβαίως τῆς περιπτώσεως εἰς τὴν ὁποίαν ὁ διαιρέτης εἶναι μηδέν. Τὸ ἀκριβὲς πηλίκον ἐκάστης διαιρέσεως, μὲ διαιρέτην διάφορον τοῦ μηδενός, εἶναι κλάσμα μὲ ἀριθμητὴν τὸν διαιρετέον καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρέτην.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ἀριθμητῆς} \quad \alpha = \text{Διαιρετέος} \\ \text{Παρονομαστῆς} \quad \beta = \text{διαιρέτης} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \quad \text{ἀκριβὲς πηλίκον}$$

66. 4. Λόγος δύο ἀκεραίων

Τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2 διὰ 3, ἥτοι τὸ κλάσμα $\frac{2}{3}$, λέγεται καὶ λόγος τοῦ 2 πρὸς τὸ 3.

Γενικῶς, ἐὰν $\alpha \in \mathbb{N}_0$ καὶ $\beta \in \mathbb{N}$, τότε λόγος τοῦ α πρὸς τὸ β λέγεται τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$.

66. 5. Ἡ ἐξίσωσις $\alpha \cdot \chi = \beta$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$, $\beta \in \mathbb{N}_0$.

Τὸ συμπέρασμα τῆς 66.3 μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἐξίσωσιν $\alpha \cdot \chi = \beta$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$, $\beta \in \mathbb{N}_0$, καὶ ὅταν ἀκόμη β δὲν εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ α .

Π.χ. διὰ τὴν ἐξίσωσιν $2 \cdot \chi = 3$ συμφώνως πρὸς τὴν γνωστὴν ἰσοδυναμίαν

$$\alpha \cdot \beta = \gamma \iff \beta = \gamma : \alpha$$

ἔχομεν

$$2 \cdot \chi = 3 \iff \chi = 3 : 2 = \frac{3}{2}$$

Γενικῶς διὰ τὴν ἐξίσωσιν $\alpha \cdot \chi = \beta$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$, $\beta \in \mathbb{N}_0$, ἔχομεν

$$\alpha \cdot \chi = \beta \iff \chi = \beta : \alpha$$

ἢ

$$\alpha \cdot \chi = \beta \iff \chi = \frac{\beta}{\alpha}$$

66. 6. Παρατηρήσεις

α) Τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{1}$, $\alpha \in \mathbb{N}_0$.

$$\text{Κατὰ τὸν τύπον } \alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}$$

ἔχομεν

$$\left. \begin{array}{l} 3 : 1 = \frac{3}{1} \\ 3 : 1 = 3 \end{array} \right\} \text{ Ἄρα } 3 = \frac{3}{1}$$

Ἄλλὰ

$$3 : 1 = 3$$

‘Ομοίως $4 = \frac{4}{1}, 5 = \frac{5}{1}, 6 = \frac{6}{1}, \dots$

και γενικῶς :

$$\alpha = \frac{\alpha}{1} \quad \text{ὅπου } \alpha \in \mathbb{N}_0$$

β) Τὸ κλάσμα $\frac{0}{\alpha}, \alpha \in \mathbb{N}$

εἶναι $0:2 = \frac{0}{2}$ } "Αρα $\frac{0}{2} = 0$
 ἀλλὰ $0:2 = 0$ }

‘Ομοίως $\frac{0}{3} = 0, \frac{0}{4} = 0, \frac{0}{5} = 0 \dots,$

Γενικῶς :

$$\frac{0}{\alpha} = 0 \quad \text{ὅπου } \alpha \in \mathbb{N}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

185. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἀκριβῆ πηλικά τῶν διαιρέσεων $5:9, 3\alpha^2:5\alpha$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$.

186. Εἰς μίαν ἐκδρομὴν ἐκ τῶν 48 μαθητῶν τῆς τάξεως ἀπουσίαζον οἱ 2. Ποῖος εἶναι ὁ λόγος τῶν ἀριθμῶν τῶν ἀπόντων μαθητῶν α) πρὸς τὸν συνολικὸν ἀριθμὸν τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως, β) πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως οἱ ὅποιοι ἦσαν παρόντες εἰς τὴν ἐκδρομὴν;

187. Ἐπιλύσατε τὰς ἐξισώσεις :

$$2 \cdot x = 5, \quad \frac{x}{3} = 4, \quad \frac{x}{2} = 0, \quad \frac{2x+1}{3} = 3$$

188. Ποῖα ἐκ τῶν κατωτέρω ἰσοτήτων εἶναι ἀληθεῖς;

$$\frac{0}{4} = 0, \quad \frac{0}{4} = 4, \quad \frac{5}{5} = 0, \quad \frac{5}{1} = 5, \quad \frac{6}{0} = 6$$

67. ΟΜΩΝΥΜΑ, ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

67. 1. ‘Ορισμοὶ

Τὰ κλάσματα $\frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$, ἔχουν ἓν κοινὸν γνῶρισμα : Ἔχουν ἴσους παρονομαστές. Διὰ τοῦτο λέγονται ὁμῶνυμα.

Τὰ κλάσματα $\frac{3}{8}$ καὶ $\frac{4}{7}$ ἔχουν διαφορετικούς παρονομαστές. Διὰ τοῦτο λέγονται ἑτερόνυμα.

67. 2. Τροπή έτερωνύμων κλασμάτων εις όμώνυμα

Συχνά εις τούς ύπολογισμούς είναι ανάγκη νά έχωμεν όμώνυμα κλάσματα. Γεννάται συνεπώς τό πρόβλημα : Πώς θά τρέψωμεν έτερώνυμα κλάσματα εις ίσα πρós αυτά όμώνυμα.

Άς λάβωμεν δύο κλάσματα, π.χ. τά κλάσματα $\frac{9}{10}$, $\frac{7}{8}$ και άς προσπαθήσωμεν νά τά τρέψωμεν εις άλλα ίσα πρós αυτά άλλα όμώνυμα. Πρós τοϋτο εύρίσκομεν τά ίσα πρós αυτά κλάσματα :

$$\frac{9}{10} = \frac{18}{20} = \frac{27}{30} = \frac{36}{40} = \frac{45}{50} \dots$$

$$\frac{7}{8} = \frac{14}{16} = \frac{21}{24} = \frac{28}{32} = \frac{35}{40} = \frac{42}{48} \dots$$

Άς προσέξωμεν τά όμώνυμα κλάσματα $\frac{36}{40}$ και $\frac{35}{40}$, τά όποια είναι ίσα πρós τά κλάσματα $\frac{9}{10}$ και $\frac{7}{8}$ αντίστοιχώς

$$\frac{9}{10} = \frac{36}{40}, \quad \frac{7}{8} = \frac{35}{40}$$

Παρατηρούμεν τά έξής :

α) Ό κοινός παρονομαστής 40 είναι τό Ε.Κ.Π. τών παρονομαστών 10 και 8.

β) Έκαστον πολλαπλάσιον τοϋ 40, ήτοι έκαστον κοινόν πολλαπλάσιον τών παρονομαστών 8 και 10, δύναται νά χρησιμοποιηθῆ ώς κοινός παρονομαστής όμωνύμων κλασμάτων αντίστοιχώς ίσων πρós τό κλάσματα

$$\frac{9}{10} \text{ και } \frac{7}{8}$$

$$\frac{9}{10} = \frac{72}{80} = \frac{108}{120} = \dots$$

$$\frac{7}{8} = \frac{70}{80} = \frac{105}{120} = \dots$$

Είναι όμως προτιμότερον νά χρησιμοποιούμεν τό Ε.Κ.Π. διά νά έχωμεν κλάσματα μέ τούς μικρότερους δυνατούς όρους.

Έκ τῆς πρώτης παρατηρήσεως οδηγούμεθα εις τόν γνωστόν τρόπον τροπῆς έτερωνύμων κλασμάτων εις όμώνυμα ίσα πρós αυτά.

67. 3. Παραδείγματα

1) Διά τὰ κλάσματα $\frac{2}{15}$ καὶ $\frac{7}{9}$ ἔχομεν :

$$\alpha) \text{ Ε.Κ.Π. } (15, 9) = 45 \quad \beta) 45 : 15 = 3, \quad 45 : 9 = 5$$

$$\gamma) \frac{2}{15} = \frac{2 \cdot 3}{15 \cdot 3} = \frac{6}{45}, \quad \frac{7}{9} = \frac{7 \cdot 5}{9 \cdot 5} = \frac{35}{45}$$

2) Διά τὰ κλάσματα $\frac{4}{15}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{2}{3}$ ἔχομεν :

$$\alpha) \text{ Ε.Κ.Π. } (15, 12, 3) = 60 \quad \beta) 60 : 15 = 4, \quad 60 : 12 = 5, \quad 60 : 3 = 20$$

$$\gamma) \frac{4}{15} = \frac{4 \cdot 4}{15 \cdot 4} = \frac{16}{60}, \quad \frac{5}{12} = \frac{5 \cdot 5}{12 \cdot 5} = \frac{25}{60}, \quad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 20}{3 \cdot 20} = \frac{40}{60}$$

3) Διά τὰ κλάσματα $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, τῶν ὁποίων οἱ παρονομασταὶ εἶναι

ἀνά δύο πρῶτοι μεταξύ των, ἔχομεν :

α) Ε.Κ.Π. $(2, 3, 5) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$, β) $(2 \cdot 3 \cdot 5) : 2 = 3 \cdot 5$, $(2 \cdot 3 \cdot 5) : 3 = 2 \cdot 5$, $(2 \cdot 3 \cdot 5) : 5 = 2 \cdot 3$

$$\gamma) \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 5 \cdot 3}{2 \cdot 5 \cdot 3} = \frac{15}{30}, \quad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 5} = \frac{20}{30}, \quad \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 3}{5 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{18}{30}$$

67. 4. Μία ἄλλη ιδιότης τῶν ἴσων κλασμάτων

1) Ἐὰν λάβωμεν δύο ἴσα κλάσματα, π.χ. τὰ κλάσματα $\frac{2}{3}$ καὶ $\frac{6}{9}$, καὶ

ἂς σχηματίσωμεν τὸ γινόμενον τοῦ ἀριθμητοῦ ἐκάστου τούτων μὲ τὸν παρονομαστήν τοῦ ἄλλου. Ἦτοι τὰ γινόμενα $2 \cdot 9$ καὶ $6 \cdot 3$. Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ γινόμενα αὐτὰ εἶναι ἴσα

$$2 \cdot 9 = 6 \cdot 3 \quad (= 18).$$

Ὁμοίως διὰ τὰ ἴσα κλάσματα $\frac{3}{7}$, $\frac{12}{28}$ ἔχομεν

$$3 \cdot 28 = 7 \cdot 12$$

Γενικῶς ἂς λάβωμεν δύο τυχόντα ἴσα κλάσματα

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \\ \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \quad (1)$$

καὶ ἂς τρέψωμεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta}, \quad \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta}$$

Θά είναι
$$\frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta} = \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta} \quad (2)$$

Έκ τῆς ισότητος (2) ἐννοοῦμεν ὅτι $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$

Ὡστε:
$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma, \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \quad (3)$$

ii) Εἶναι εὐκόλον νὰ ἐπαληθεύσωμεν ὅτι ἡ ἀνωτέρω συνεπαγωγή ἰσχύει καὶ ἀντιστρόφως.

Π.χ. ἐκ τῆς ισότητος $3 \cdot 4 = 6 \cdot 2$ προκύπτει ὅτι $\frac{3}{6} = \frac{2}{4}$

Ὁμοίως ἐκ τῆς ισότητος $7 \cdot 8 = 4 \cdot 14$ » » $\frac{7}{4} = \frac{14}{8}$

Γενικῶς
$$\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \quad (4)$$

Ἐκ τῶν (3) καὶ (4) ἔχομεν ὅτι

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \iff \alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma \quad \beta, \delta \in \mathbb{N}, \quad \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0$$

Ἡ ἀνωτέρω σχέσις μᾶς δίδει ἕνα ἄλλον τρόπον διὰ νὰ ἐξακριβώσωμεν ἂν δύο κλάσματα εἶναι ἴσα.

Παραδείγματα

Τὰ κλάσματα $\frac{3}{10}$, $\frac{21}{70}$ εἶναι ἴσα, διότι $3 \cdot 70 = 10 \cdot 21$ ($=210$)

Ἀντιθέτως τὰ κλάσματα $\frac{7}{9}$ καὶ $\frac{20}{27}$ δὲν εἶναι ἴσα, διότι $7 \cdot 27 \neq 9 \cdot 20$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

189. Νὰ τρέψετε εἰς ὁμώνυμα τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα

$$\frac{3}{10}, \quad \frac{2}{2^3 \cdot 5}, \quad \frac{1}{4}$$

190. Ὁμοίως τὰ κλάσματα $\frac{14}{35}$, καὶ $\frac{18}{27}$.

191. Ποία ἐκ τῶν κατωτέρω ζευγῶν κλασμάτων ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἴσα κλάσματα;

$$\alpha) \frac{7}{75}, \frac{35}{375} \quad \beta) \frac{3}{29}, \frac{7}{90} \quad \gamma) \frac{2}{11}, \frac{14}{77}$$

Ἔργασθητε χωρὶς νὰ τρέψετε τὰ κλάσματα εἰς ὁμώνυμα.

192. Ἀπὸ τὴν ἰσότητα $\alpha \cdot 4 = 2.18$ ποίας ἰσότητος κλασμάτων συνάγετε; $\alpha \in \mathbb{N}_0$

68. Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ

68. 1. Όρισμός


Ἐς λάβωμεν ἓν εὐθ. τμήμα καὶ ἄς σχηματίσωμεν:

α) τὰ $\frac{2}{3}$ αὐτοῦ καὶ β) τὰ $\frac{3}{4}$ αὐτοῦ,



σχ. 25. Παρατηροῦμεν ὅτι

$$\frac{3}{4} \cdot AB > \frac{2}{3} \cdot AB$$



Σχ. 25

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ $\frac{3}{4}$ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ $\frac{2}{3}$ ἢ ὅτι τὸ $\frac{2}{3}$ εἶναι μικρότερον τοῦ $\frac{3}{4}$.

Γράφομεν δὲ ἀντιστοίχως

$$\frac{3}{4} > \frac{2}{3} \quad \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$$

Γενικῶς: Ἐὰν $\frac{\alpha}{\beta} \cdot AB > \frac{\gamma}{\delta} \cdot AB$ ὅπου $\alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0$ καὶ $\beta, \delta \in \mathbb{N}$ τότε


λέγομεν ὅτι $\frac{\alpha}{\beta}$ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ $\frac{\gamma}{\delta}$.

Γράφομεν δὲ $\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\gamma}{\delta}$.

68. 2. Ὁμώνυμα κλάσματα

Εἶναι φανερόν ὅτι

$$\frac{3}{4} \cdot AB > \frac{2}{4} \cdot AB, \text{ σχ. 26}$$



Ἄρα $\frac{3}{4} > \frac{2}{4}$.

Σχ. 26

Γενικῶς: Μεταξὺ δύο ὁμωνύμων κλασμάτων μεγαλύτερον εἶναι τὸ ἔχον μεγαλύτερον ἀριθμητήν.



$\frac{\alpha}{\gamma} > \frac{\beta}{\gamma} \quad \text{ἐὰν} \quad \alpha > \beta \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0 \\ \gamma \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$

68. 3. Κλάσματα με ίσους αριθμητές

Είναι φανερόν ότι

$$\frac{2}{3} AB > \frac{2}{4} AB, \text{ σχ. } 27$$

Άρα $\frac{2}{3} > \frac{2}{4}$



Σχ. 27

Γενικώς : Μεταξύ δύο κλασμάτων με ίσους αριθμητές μεγαλύτερον είναι τὸ ἔχον μικρότερον παρονομαστήν

$\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\alpha}{\gamma} \quad \text{ἐὰν} \quad \beta < \gamma \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \gamma \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$

68. 4. Τυχόντα κλάσματα

α) Ἐὰς προσπαθῆσωμεν νὰ εὕρωμεν ποῖον ἐκ τῶν κλασμάτων $\frac{3}{5}$ καὶ

$\frac{2}{3}$ εἶναι μεγαλύτερον.

Τὰ κλάσματα αὐτὰ οὔτε ὁμώνυμα εἶναι οὔτε ἴσους ἀριθμητὰς ἔχουν.

Ἐὰς τὰ τρέψωμεν εἰς ὁμώνυμα. Ἔχομεν

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3}, \quad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὰ ὁμώνυμα κλάσματα $\frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3}$ καὶ $\frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5}$ εἶναι

$3 \cdot 3 < 2 \cdot 5$ τοῦτο σημαίνει ὅτι

$$\frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3} < \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} \quad \text{ἢ} \quad \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$$

β) Ἐὰς λάβωμεν ἤδη τὰ τυχόντα κλάσματα $\frac{\alpha}{\beta}$ καὶ $\frac{\gamma}{\delta}$ καὶ ἄς τρέψωμεν

αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta}, \quad \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta}$$

Παρατηροῦμεν τότε ὅτι ἡ σύγκρισις τῶν κλασμάτων $\frac{\alpha}{\beta}$, $\frac{\gamma}{\delta}$ ἀνάγεται

εις την σύγκρισιν τῶν ἀριθμητῶν $\alpha \cdot \delta$ καὶ $\beta \cdot \gamma$ τῶν ἀντιστοίχως ἴσων πρὸς αὐτὰ κλασμάτων $\frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta}$ καὶ $\frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta}$

Ἦτοι: ἐὰν $\alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma$, τότε $\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\gamma}{\delta}$

ἐὰν $\alpha \cdot \delta < \beta \cdot \gamma$, τότε $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\gamma}{\delta}$

Ἡ ἀνωτέρω ιδιότης ἰσχύει καὶ ἀντιστρόφως. Ἦτοι:

Ἐὰν $\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\gamma}{\delta}$, τότε καὶ $\alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma$ $\alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0$
 » $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\gamma}{\delta}$, » $\alpha \cdot \delta < \beta \cdot \gamma$ $\beta, \delta \in \mathbb{N}$

68. 5. Ἐφαρμογαὶ

1) Σύγκρισις μὲ τὴν μονάδα

Παρατηροῦμεν ὅτι: $\frac{3}{5} < \frac{5}{5}$ ἢ $\frac{3}{5} < 1$

$\frac{6}{5} > \frac{5}{5}$ ἢ $\frac{6}{5} > 1$

Γενικῶς: Ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς εἶναι μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ, τὸ κλάσμα εἶναι μικρότερον τῆς μονάδος. Ἀντιστρόφως: ἐὰν τὸ κλάσμα εἶναι μικρότερον τῆς μονάδος τότε ὁ ἀριθμητὴς εἶναι μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ.

$$\alpha < \beta \iff \frac{\alpha}{\beta} < 1$$

Ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς εἶναι μεγαλύτερος τοῦ παρονομαστοῦ, τὸ κλάσμα εἶναι μεγαλύτερον τῆς μονάδος καὶ ἀντιστρόφως.

$$\alpha > \beta \iff \frac{\alpha}{\beta} > 1$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ κλάσμα λέγεται καταχρηστικὸν

2) Νὰ συγκριθοῦν τὰ κλάσματα $\frac{327}{421}$, $\frac{79}{85}$


Ἐχομεν $327 \cdot 85 = 27795$ $421 \cdot 79 = 33259$

Εἶναι $27795 < 33259$ ἄρα $\frac{327}{421} < \frac{79}{85}$

193. Νά διατάξετε κατά σειράν αύξοντος μεγέθους τὰ κλάσματα $\frac{8}{9}$, $\frac{27}{35}$, $\frac{15}{19}$ χωρὶς νὰ τρέψετε αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα.

194. Νά εὑρετε τὸ σύνολον τῶν ἀναγῶγων κλασμάτων τὰ ὅποια εἶναι μικρότερα τῆς μονάδος καὶ ἔχουν παρονομαστήν μικρότερον τοῦ 5, νὰ διατάξετε δὲ αὐτὰ κατά σειράν αύξοντος μεγέθους.

69. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ



Σχ. 28

69. 1. Διὰ τὸ εὐθ. τμήμα AB τοῦ σχ. 28 δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι τοῦτο εἶναι ἴσον πρὸς τὸ $\frac{1}{2}$ ἢ τὰ $\frac{2}{4}$ ἢ τὰ $\frac{3}{6}$ τοῦ ΑΓ.

$$AB = \frac{1}{2} \cdot ΑΓ \quad \text{ἢ} \quad AB = \frac{2}{4} \cdot ΑΓ \quad \text{ἢ} \quad AB = \frac{3}{6} \cdot ΑΓ \dots$$

Ἡ παρατήρησις αὕτη μᾶς ἐπιτρέπει νὰ εἴπωμεν ὅτι τὰ κλάσματα

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{2}{4}, \quad \frac{3}{6}, \quad \frac{4}{8}, \quad \frac{5}{10} \dots$$

δὲν εἶναι διαφορετικοὶ ἀριθμοί, ἀλλὰ μόνον διαφορετικαὶ παραστάσεις, «ἀντιπρόσωποι» ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Μὲ ἄλλους λόγους: Ἡ κλάσις ἰσοδυναμίας $\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8} \dots \right\}$ ὀρίζει ἓνα καὶ μόνον ἓνα ἀριθμὸν τὸν ὅποιον καὶ ὀνομάζομεν ρητὸν ἀριθμὸν τῆς ἀριθμητικῆς ἢ ἀπλῶς ρητὸν.

Ὅμοίως ἐκάστη τῶν κλάσεων ἰσοδυναμίας $\left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{6}, \frac{3}{9}, \frac{4}{12} \dots \right\}$, $\left\{ \frac{1}{4}, \frac{2}{8}, \frac{3}{12} \dots \right\}$, $\left\{ \frac{1}{5}, \frac{2}{10}, \frac{3}{15} \dots \right\}$, ὀρίζει ἓνα ρητὸν ἀριθμὸν. Εἰς

τοὺς ὑπολογισμοὺς εἰς ρητὸς «ἀντιπροσωπεύεται» μὲ ἓν ὀποιοδήποτε ἀπὸ τὰ κλάσματα τῆς κλάσεως ἰσοδυναμίας ἣ ὅποια ὀρίζει αὐτόν, συνήθως ὅμως μὲ τὸ ἐξ αὐτῶν ἀνάγωγον κλάσμα. Π.χ. ὁ ρητὸς τὸν ὅποιον ὀρίζει ἣ κλάσις ἰσοδυναμίας

$$\left\{ \frac{3}{7}, \frac{6}{14}, \frac{9}{21} \dots \right\}$$

δύνανται να αντιπροσωπευθῆ με ἓν ἐκ τῶν κλασμάτων $\frac{3}{7}, \frac{6}{14}, \frac{9}{21} \dots$.
 συνήθως ὁμως ἀντιπροσωπεύεται με τὸ ἀνάγωγον κλάσμα $\frac{3}{7}$.

Ἐξ ἄλλου εἶναι φανερόν ὅτι ἕκαστος ἀκέραιος ἢ κλάσμα δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύσῃ ἓνα καὶ μόνον ἓνα ρητόν.

Π.χ. ὁ ἀκέραιος 2 δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύσῃ τὸν ρητὸν τὸν ὁποῖον ὀρίζει ἡ κλάσις ἰσοδυναμίας

$$\left\{ \frac{2}{1}, \frac{4}{2}, \frac{6}{3} \dots \right\}$$

καὶ οὐδένα ἄλλον. (Διατί;).

Εἰς τὰ ἐπόμενα ἡ ἔκφρασις «ρητὸς $\frac{1}{2}$ » σημαίνει «κλάσμα $\frac{1}{2}$ καὶ οἷονδῆποτε ἄλλο κλάσμα ἴσον πρὸς αὐτό». Μετὴν σημασίαν αὐτὴν τὸ κλάσμα $\frac{1}{2}$ θὰ χρησιμοποιῆται ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ ρητοῦ

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6} \dots \right\}$$

Κατὰ τ' ἀνωτέρω ἡ γραφὴ $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ δηλώνει ὅτι τὰ κλάσματα εἶναι ἴσα. Δηλώνει ἐπίσης καὶ ὅτι $\frac{1}{2}$ καὶ $\frac{2}{4}$ εἶναι διαφορετικαὶ γραφαὶ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ρητοῦ.

Τὸ σύνολον τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς παριστάνεται συνήθως μετὸ σύμβολον Q_0^+ . Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ποίαν σχέσιν ἔχουν μεταξύ των τὰ δύο σύνολα N_0 καὶ Q_0^+ ;

Ὡς γνωστὸν ἕκαστος ἀκέραιος εἶναι ρητὸς.

$$\text{Π.χ. } 3 = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} \dots, \quad 0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{2} = \frac{0}{3} \dots$$


Ἐξ ἄλλου ὑπάρχουν ρητοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἀκέραιοι. Π.χ. $\frac{2}{3} \notin N_0$.

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ σύνολον N_0 εἶναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ συνόλου Q_0^+ .

$$N_0 \subset Q_0^+$$

69. 2. Ήμιευθεία διατάξεως τοῦ συνόλου \mathbb{Q}_0^+

Γνωρίζομεν νὰ παριστάνωμεν ἀκεραίους μὲ σημεῖα μιᾶς ἡμιευθείας. Ἐὰς ἴδωμεν πῶς δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν ρητούς μὲ σημεῖα ἡμιευθείας.



Σχ. 29

Ἐπὶ ἡμιευθείας Ox σημειώνομεν ἴσα τμήματα $OA=AB=BG \dots$, σχ. 29. Εἶναι φυσικὸν νὰ παραστήσωμεν τοὺς ρητούς $0 = \frac{0}{1}$, $1 = \frac{1}{1}$, $2 = \frac{2}{1}$, $3 = \frac{3}{1}$, μὲ τὰ σημεῖα O, A, B, Γ ἀντιστοίχως.

Τὸν ρητὸν $\frac{1}{2}$ τὸν παριστάνωμεν μὲ τὸ μέσον τοῦ τμήματος OA . Ὁμοίως τὸν ρητὸν $\frac{3}{2}$ παριστάνομεν μὲ τὸ μέσον M τοῦ εὐθ. τμήματος AB .

Διὰ νὰ παραστήσωμεν τὸν ρητὸν $\frac{3}{4}$ χωρίζομεν τὸ τμήμα OA εἰς 4 ἴσα τμήματα. Τὸ τρίτον κατὰ σειρὰν πρὸς τὰ δεξιὰ σημεῖον διαιρέσεως τοῦ OA παριστάνει τὸν ρητὸν τοῦτον.

Εἶναι φανερόν ὅτι μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν ἕκαστον ρητὸν μὲ ἓν καὶ μόνον ἓν σημεῖον τῆς ἡμιευθείας Ox .

Διὰ τὴν παράστασιν αὐτὴν τῶν ρητῶν παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς:

α) Ὁ ρητὸς $\frac{3}{2}$ εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ τμήματος OM , σχ. 29, μὲ μονάδα μετρήσεως τὸ τμήμα OA .

Γενικῶς ἕκαστος ρητὸς α παριστάνεται μὲ ἓν σημεῖον M_α τῆς Ox τοιοῦτον ὥστε ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ τμήματος OM_α νὰ εἶναι α . (Μονὰς εἶναι πάντοτε τὸ τμήμα OA).

β) Δύο ἄνιστοι ρητοὶ α, β παριστάνονται μὲ δύο διαφορετικὰ σημεῖα M_α, M_β τοιαῦτα ὥστε, ἐὰν α εἶναι μεγαλύτερος β , τότε τὸ M_α κεῖται «δεξιὰ» τοῦ M_β .

Ἦτοι τὸ σύνολον τῶν ρητῶν \mathbb{Q}_0^+ εἶναι διατεταγμένον ἐπὶ τῆς ἡμιευθείας Ox . Διὰ τοῦτο ἡ ἡμιευθεία Ox λέγεται καὶ ἡμιευθεῖα διατάξεως τοῦ συνόλου τῶν ρητῶν.

Σημείωσις

Καθὼς εἶδομεν ἕκαστος ρητὸς παριστάνεται μὲ ἓν καὶ μόνον ἓν σημεῖον τῆς ἡμιευθείας διατάξεως Ox .

Γεννάται τὸ ἐρώτημα: Ἐκαστὸν σημεῖον τῆς ἡμιευθείας Ox παριστάνει ἓνα ρητόν;

Ἡ ἀπάντησις εἰς τὸ ἐρώτημα τοῦτο εἶναι ἀρνητικὴ. Εἰς ἄλλην τάξιν θὰ μάθωμεν ὅτι ὑπάρχουν σημεῖα τῆς Ox τὰ ὁποῖα οὐδένα ρητὸν παριστάνουν. Τὰ σημεῖα αὐτὰ θὰ «συμπληρωθοῦν» μετὰ «νέους» ἀριθμούς, τοὺς ἀσυνμμέτρους.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

195. Νὰ γραφῆ μετὰ ἀναγραφῆν τῶν στοιχείων του τὸ σύνολον $\left\{x \mid x = \frac{3}{5}\right\}$.

196. Πῶς ἐπὶ τῆς ἡμιευθείας διατάξεως φαίνεται ὅτι τὰ κλάσματα $\frac{3}{4}, \frac{6}{8}, \frac{9}{12}, \dots$ ἀντιπροσωπεύουν τὸν ἴδιον ρητόν;

197. Ἐπὶ τῆς ἡμιευθείας διατάξεως νὰ τοποθετήσετε τοὺς ρητοὺς

$$\frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4}, \quad 1 \frac{1}{4}.$$

ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ


70. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

70. 1. Ὅταν οἱ ρητοὶ ἀντιπροσωπεύωνται ὑπὸ ὁμωνύμων κλασμάτων.

1) Εἰς τὸ σχ. 30 ὅπου ἐλάβομεν

$AB = BG = \Gamma\Delta = \Delta E = EZ = ZH$ εἶναι

$$AG + GZ = AZ$$



$$\text{ἢ} \frac{2}{6} \cdot AH + \frac{3}{6} \cdot AH = \frac{5}{6} \cdot AH$$

Σχ. 30

Ἡ ἀνωτέρω ἰσότης μεταξὺ τῶν τμημάτων αὐτῶν μᾶς ὁδηγεῖ νὰ λάβωμεν τὸν ρητὸν $\frac{5}{6}$ ὡς ἄθροισμα τῶν ρητῶν $\frac{2}{6}$ καὶ $\frac{3}{6}$,

$$\text{γράφομεν δέ:} \quad \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6} \quad \text{ἢ} \quad \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{2+3}{6}$$

Γενικῶς: Ὀνομάζομεν ἄθροισμα δύο ρητῶν $\frac{\alpha}{\gamma}$ καὶ $\frac{\beta}{\gamma}$ τὸν ρητὸν $\frac{\alpha+\beta}{\gamma}$

Γράφομεν δέ

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha+\beta}{\gamma} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0 \\ \gamma \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

70. 2. "Όταν οί ρητοί αντιπροσωπεύονται υπό έτερωνύμων κλασμάτων

Είς τήν περίπτωσιν αὐτήν τρέπομεν τὰ έτερώνυμα κλάσματα εἰς ὁμώνυμα (ἐπιλέγομεν ὡς αντιπροσώπους τῶν ρητῶν ὁμώνυμα κλάσματα) καί ἐργαζόμεθα ὡς προηγουμένως.

Παραδείγματα: α) $\frac{3}{5} + \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 7}{5 \cdot 7} + \frac{2 \cdot 5}{7 \cdot 5}, \quad \frac{3 \cdot 7 + 2 \cdot 5}{5 \cdot 7} = \frac{31}{35}$

β) $\frac{2 \cdot \alpha}{11} + \frac{3 \cdot \alpha}{22} = \frac{4 \cdot \alpha}{22} + \frac{3 \cdot \alpha}{22} = \frac{(4+3) \cdot \alpha}{22} = \frac{7 \cdot \alpha}{22}$

Γενικῶς :

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta} + \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta} = \frac{\alpha \cdot \delta + \gamma \cdot \beta}{\beta \cdot \delta} \quad \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

70. 3. Μεικτοί

Γνωρίζομεν ὅτι τὸ ἄθροισμα $2 + \frac{3}{4}$ γράφεται συντόμως $2 \frac{3}{4}$ καί υπό τήν μορφήν αὐτήν λέγεται μεικτός ἀριθμός.

"Ἦτοι $2 \frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{2}{1} + \frac{3}{4}$

ἢ $2 \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{11}{4}$

Ἀντιστρόφως ἕκαστον κλάσμα μεγαλύτερον τῆς ἀκεραίας μονάδος δύναται νὰ τεθῆ υπό μορφήν μεικτοῦ. Π.χ. διὰ τὸ κλάσμα $\frac{22}{5}$ ἔχομεν :

$$22 = 4 \cdot 5 + 2$$

$$\frac{22}{5} = \frac{4 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{4 \cdot 5}{5} + \frac{2}{5}$$

ἢ $\frac{22}{5} = 4 + \frac{2}{5} = 4 \frac{2}{5}$



Όμοιως διὰ τὸ κλάσμα $\frac{9}{5}$ ἔχομεν $9 = 1 \cdot 5 + 4$

$$\frac{9}{5} = \frac{1 \cdot 5}{5} + \frac{4}{5}$$

$$= 1 + \frac{4}{5} = 1 \frac{4}{5}$$

Γενικῶς ἐὰν $\alpha \in \mathbb{N}_0$, $\beta \in \mathbb{N}$ καὶ $\alpha > \beta$ τότε κατὰ τὸν γνωστὸν τύπον $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$, $\upsilon < \delta$ ἔχομεν

$$\alpha = \beta \cdot \pi + \upsilon, \quad \upsilon < \beta$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta \cdot \pi}{\beta} + \frac{\upsilon}{\beta} = \pi + \frac{\upsilon}{\beta}$$

ὅπου π εἶναι τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$.

Ὡστε: "Ἐκαστος μεικτὸς δύναται νὰ τεθῆ ὑπὸ μορφήν κλάσματος. Ἀντιστρόφως ἕκαστον κλάσμα μεγαλύτερον τῆς ἀκεραίας μονάδος δύναται νὰ τεθῆ ὑπὸ μορφήν μεικτοῦ.

70. 4. Διατήρησις τῶν ιδιοτήτων τῆς προσθέσεως εἰς τὸ σύνολον \mathbb{Q}_0^+

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ πρόσθεσις δύο ρητῶν ἀνάγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν ἀριθμητῶν δύο ὁμωνύμων κλασμάτων· δηλαδὴ εἰς τὴν πρόσθεσιν ἀκεραίων. Τοῦτο σημαίνει ὅτι αἱ γνωσταὶ ιδιότητες τῆς προσθέσεως ἀκεραίων ἰσχύουν καὶ εἰς τὴν πρόσθεσιν ρητῶν. Τοιοῦτοτρόπως διὰ τὰς βασικὰς ιδιότητας τῆς προσθέσεως ἔχομεν:

ι) Ὑπαρξίς ἀθροίσματος, μονότιμον

Ἐὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ καὶ $\pi \in \mathbb{N}$, τότε τὸ ἀθροισμα $\frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi}$ εἶναι εἰς καὶ μόνον εἰς ρητὸς ἀριθμὸς.

ιι) Μεταθετικότης

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha + \beta}{\pi} \\ \frac{\beta}{\pi} + \frac{\alpha}{\pi} = \frac{\beta + \alpha}{\pi} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} = \frac{\beta}{\pi} + \frac{\alpha}{\pi} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0 \\ \pi \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

iii) Προσεταιριστικότητα

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} \right) + \frac{\gamma}{\pi} &= \frac{\alpha+\beta}{\pi} + \frac{\gamma}{\pi} = \frac{\alpha+\beta+\gamma}{\pi} \\ \frac{\alpha}{\pi} + \left(\frac{\beta}{\pi} + \frac{\gamma}{\pi} \right) &= \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta+\gamma}{\pi} = \frac{\alpha+\beta+\gamma}{\pi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$
$$\left(\frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} \right) + \frac{\gamma}{\pi} = \frac{\alpha}{\pi} + \left(\frac{\beta}{\pi} + \frac{\gamma}{\pi} \right) \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0 \text{ και } \pi \in \mathbb{N}$$

iv) Ουδέτερον στοιχείο

$$\frac{\alpha}{\pi} + 0 = \frac{\alpha}{\pi} + \frac{0}{\pi} = \frac{\alpha+0}{\pi} \Rightarrow \frac{\alpha}{\pi} + 0 = \frac{\alpha}{\pi} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \pi \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

v) Γενίκευσις τῆς προσεταιριστικότητος

Εἰς τὸ σύνολον \mathbb{Q}_0^+ τὸ ἄθροισμα πολλῶν προσθετέων ὀρίζεται ὅπως καὶ εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 . Εἶναι δὲ εὐκόλον νὰ ἐπαληθεύσωμεν ὅτι :

1) Ἐν ἄθροισμα ρητῶν εἶναι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν σειρὰν τῶν προσθετέων.

2) Εἰς ἓν ἄθροισμα ρητῶν δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν :

α) Δύο ἢ περισσοτέρους προσθετέους μὲ τὸ ἄθροισμά των.

β) Ἐνα προσθετέον μὲ ἄλλους ἔχοντας ἄθροισμα αὐτόν.

Παραδείγματα

$$2 \frac{3}{7} + \frac{2}{7} = 2 + \left(\frac{3}{7} + \frac{2}{7} \right) = 2 \frac{5}{7}$$

$$2 + \frac{3}{7} + 5 = (2 + 5) + \frac{3}{7} = 7 \frac{3}{7}$$

$$2 \frac{1}{4} + 3 \frac{5}{8} + 5 = (2 + 3 + 5) + \left(\frac{1}{4} + \frac{5}{8} \right) = 10 \frac{7}{8}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

198. Νὰ ὑπολογισθοῦν κατὰ τὸν ἀπλούστερον τρόπον τὰ ἄθροίσματα :

$$\alpha = \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} + \frac{3}{5} \right), \quad \beta = \left(2 \frac{1}{3} + \frac{4}{9} \right) + \left(\frac{3}{8} + 4 \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{5}{9} + \frac{1}{4} \right)$$

199. Νὰ τεθῆ ὑπὸ μορφήν μεικτοῦ ἑκάστον τῶν κλασμάτων $\frac{17}{9}$, $\frac{35}{11}$, $\frac{23}{8}$.

200. Μία γωνία εἶναι ἴση μὲ τὰ $\frac{3}{9}$ τῆς ὀρθῆς, μία ἄλλη μεγαλύτερα αὐτῆς κατὰ τὰ $\frac{2}{13}$ τῆς ὀρθῆς. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο αὐτῶν γωνιῶν.

201. Να εύρεθῆ τὸ βάρους τριῶν δοχείων α,β,γ ἂν εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ α' ζυγίζει $10\frac{2}{5}$ kg, τὸ β' $1\frac{3}{4}$ kg περισσότερον τοῦ α' καὶ τὸ γ' $2\frac{4}{5}$ kg, περισσότερον ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῶν α' καὶ β'.

71. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

71. 1. Ὅρισμὸς

Ἡ ἀφαίρεσις εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν Q_0^+ ὀρίζεται ὅπως καὶ εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων N_0 .

Π.χ. λέγομεν ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν ρητῶν $\frac{5}{7}$ καὶ $\frac{3}{7}$ εἶναι $\frac{2}{7}$ καὶ γράφομεν

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{7} = \frac{2}{7} \quad \text{διότι} \quad \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

Γενικῶς $\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi} = \frac{\chi}{\pi}$ σημαίνει ὅτι $\frac{\chi}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha}{\pi}$ $\left. \begin{array}{l} \alpha, \beta, \chi \in N_0 \\ \pi \in N \end{array} \right\}$

Ἦτοι

$$\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi} = \frac{\chi}{\pi} \iff \frac{\chi}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha}{\pi}$$

71. 2. Εὐρεσις τῆς διαφορᾶς

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν δύο ρητῶν π.χ. τὴν διαφορὰν $\frac{7}{13} - \frac{4}{13}$ σκεπτόμεθα ὅτι πρέπει νὰ εὐρωμεν ἓνα ρητὸν $\frac{\chi}{13}$ τοιοῦτον ὥστε $\frac{\chi}{13} + \frac{4}{13} = \frac{7}{13}$

$$\text{Ἦτοι} \quad \frac{7}{13} - \frac{4}{13} = \frac{\chi}{13} \iff \frac{\chi}{13} + \frac{4}{13} = \frac{7}{13} \quad (1)$$

$$\iff \frac{\chi+4}{13} = \frac{7}{13} \quad (2)$$

Ἀλλὰ ἐκ τῆς (2) ἐννοοῦμεν ὅτι $\chi+4=7 \iff \chi=7-4$

$$\text{Ὡστε} \quad \frac{7}{13} - \frac{4}{13} = \frac{7-4}{13}$$

$$\text{Γενικῶς} \quad \frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha-\beta}{\pi} \quad (3)$$

Ἐκ τῆς (3) εἶναι φανερὸν ὅτι

ὑπάρχει διαφορὰ $\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi}$ ὅταν καὶ μόνον ὅταν $\alpha \geq \beta$.

$$\text{"Ωστε } \frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha - \beta}{\pi}, \quad \text{όπου } \begin{matrix} \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0 \\ \pi \in \mathbb{N} \end{matrix} \quad \text{καί } \alpha \geq \beta$$

Ἐάν οἱ ρητοὶ τῶν ὁποίων ζητοῦμεν τὴν διαφορὰν παριστάνωνται ὑπὸ ἑτερωνύμων κλασμάτων, τότε τρέπομεν τὰ κλάσματα αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα καὶ ἐργαζόμεθα ὡς ἄνωτέρω.

$$\text{Π.χ.} \quad \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} - \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{2 \cdot 4 - 1 \cdot 3}{3 \cdot 4}$$

$$\text{"Η} \quad \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8-3}{12} = \frac{5}{12}$$

$$\begin{aligned} \text{Γενικῶς: } \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\gamma}{\delta} &= \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta} - \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta} \\ &= \frac{\alpha \cdot \delta - \gamma \cdot \beta}{\beta \cdot \delta} \quad \text{όπου } \begin{matrix} \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta \in \mathbb{N} \end{matrix} \quad \text{καί } \alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma \end{aligned}$$

71. 3. Ἰδιότητες

Καθὼς βλέπομεν, ἡ ἀφαίρεσις ρητῶν «μεταφέρεται» εἰς ἀφαίρεσιν τῶν ἀριθμητῶν δύο ὁμώνυμων κλασμάτων· ἤτοι εἰς ἀφαίρεσιν δύο ἀκεραίων. Ἀπὸ τὴν παρατήρησιν αὐτὴν ἐννοοῦμεν ὅτι ὅλαι αἱ γνωσταὶ ἰδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 ἰσχύουν καὶ εἰς τὸ σύνολον \mathbb{Q}^+ .

71. 4. Παραδείγματα

$$1. \quad 5 \frac{1}{2} - 3 = \left(5 + \frac{1}{2}\right) - 3 = (5 - 3) + \frac{1}{2} = 2 \frac{1}{2}$$

$$[\text{Κατὰ τὸν τύπον } (\alpha + \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) + \beta]$$

$$2. \quad 5 \frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \left(5 + \frac{7}{8}\right) - \frac{3}{8} = 5 + \left(\frac{7}{8} - \frac{3}{8}\right) = 5 \frac{4}{8}$$

$$[\text{Κατὰ τὸν τύπον } (\alpha + \beta) - \gamma = \alpha + (\beta - \gamma)]$$

$$\begin{aligned} 3. \quad 9 \frac{4}{7} - 5 \frac{3}{7} &= 9 \frac{4}{7} - \left(5 + \frac{3}{7}\right) \\ &= \left(9 \frac{4}{7} - 5\right) - \frac{3}{7} \\ &= 4 \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = 4 \frac{1}{7} \end{aligned}$$

$$[\text{Κατὰ τὸν τύπον } \alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma]$$



$$4. \quad 9 \frac{4}{7} - 5 \frac{4}{7} = \left(9 + \frac{4}{7}\right) - \left(5 + \frac{4}{7}\right) = 9 - 5 = 4$$

Κατά τὸν τύπον $(\alpha \pm \mu) - (\beta \pm \mu) = \alpha - \beta$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

202. Νὰ ἐκτελεσθοῦν κατὰ δύο τρόπους αἱ πράξεις

$$\frac{25}{8} - \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{4}\right), \quad \frac{25}{8} - \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{4}\right)$$

203. Ποῖον ρητὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ $\frac{4}{9}$ διὰ νὰ εὕρωμεν ἄθροισμα $1 \frac{1}{3}$;

204. Ποῖαν μεταβολὴν ὑφίσταται τὸ κλάσμα $\frac{5}{7}$, ἐὰν προσθέσωμεν τὴν μονάδα α) εἰς τὸν ἀριθμητὴν β) εἰς τὸν παρανομαστήν γ) καὶ εἰς τοὺς δύο ὅρους αὐτοῦ;

205. Τρεῖς ἀδελφοὶ α, β, γ διένειμον ἓνα ἀγρόν. Ὁ α' ἔλαβε $4 \frac{2}{5}$ στρέμματα ὀλιγώτερα ἀπὸ τὸν β' καὶ $3 \frac{1}{2}$ στρέμματα ὀλιγώτερα ἀπὸ τὸν γ'. Νὰ εὑρετε πόσα στρέμματα ἔλαβεν ἕκαστος, ἐὰν γνωρίζετε ὅτι ὁ γ' ἔλαβεν $7 \frac{1}{2}$ στρέμματα.

206. Κατὰ ποῖον ρητὸν πρέπει νὰ ἐλαττωθῇ ὁ 2 $\frac{3}{7}$ διὰ νὰ γίνῃ ἴσος μὲ $1 \frac{8}{9}$;

72. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ


72. 1. Ὅρισμός

Ὡς γνωστὸν τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς ὀρθογωνίου δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου $E = \alpha \cdot \beta$, ὅπου α, β εἶναι αἱ διαστάσεις (εἰς ὁμοειδεῖς μονάδας) τοῦ ὀρθογωνίου, καὶ E τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ εἰς τετραγωνικὰς μονάδας τῶν διαστάσεων αὐτοῦ.

Π.χ. ἐὰν $\alpha = 2 \text{ cm}$, $\beta = 3 \text{ cm}$, τότε $E = 2 \cdot 3 \text{ cm}^2$.

Ἐὰν ἴδωμεν ποῖον εἶναι τὸ ἔμβαδὸν E ἑνὸς ὀρθογωνίου μὲ διαστάσεις $\frac{4}{5} \text{ m}$ καὶ $\frac{3}{4} \text{ m}$.

Τὸ τετράγωνον τοῦ σχ. 31 πλευρᾶς 1 m (μία τετραγωνικὴ μονάδα) εἶναι χωρισμένον εἰς 5 ἴσας ταινίας ὀριζωντίως καὶ εἰς 4 ἴσας ταινίας κατακορύφως. Τοιοῦτοτρόπως τὸ τετράγωνον αὐτὸ εἶναι χωρισμένον εἰς $5 \cdot 4 = 20$ ἴσα ὀρθογώνια, ἕκαστον τῶν ὁποίων ἔχει ἔμβαδὸν ἴσον πρὸς τὸ $1/20$ τοῦ ἔμβαδοῦ τῆς τετραγωνικῆς μονάδος (1 m^2). Παρατηροῦμεν



Σχ. 31

ὅμως ὅτι τὸ ὀρθογώνιον μὲ διαστάσεις $\frac{4}{5}$ m καὶ $\frac{3}{4}$ m, (σκιερὰ ἐπιφάνεια τοῦ σχ. 31) καλύπτει ἀκριβῶς 12 ἀπὸ τὰ 20 ἴσα ὀρθογώνια τῆς τετραγωνικῆς αὐτῆς μονάδος.

$$\text{* Ἐὰν} \quad E = \frac{3}{4} \text{ m} \cdot \frac{4}{5} \text{ m} = \frac{12}{20} \text{ m}^2.$$

$$\eta \quad E = \frac{3}{4} \text{ m} \cdot \frac{4}{5} \text{ m} = \frac{3 \cdot 4}{4 \cdot 5} \text{ m}^2. \quad (1)$$

Μὲ ὅμοιον τρόπον, ἀπὸ τὸ αὐτὸ σχέδιον, εὐρίσκομεν π.χ. ὅτι

$$\frac{3}{4} \text{ m} \cdot \frac{2}{5} \text{ m} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 5} \text{ m}^2. \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \text{ m} \cdot \frac{4}{5} \text{ m} = \frac{1 \cdot 4}{4 \cdot 5} \text{ m}^2. \quad (3)$$

Αἱ ἀνωτέρω ἰσότητες (1), (2), (3), μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὸν ἐξῆς ὀρισμὸν τοῦ γινομένου δύο ρητῶν.

* Ἐὰν $\frac{\alpha}{\beta}$, $\frac{\gamma}{\delta}$ εἶναι δύο ρητοὶ τότε ὀνομάζομεν γινόμενον αὐτῶν τὸν ρητὸν $\frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta}$.

Γράφομεν δὲ

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta} \\ \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

Παραδείγματα

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 7} = \frac{6}{35}$$

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

72. 2. Διατήρησις τῶν ἰδιοτήτων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Καθὼς εἶδομεν, ὁ πολλαπλασιασμὸς ρητῶν ἀνάγεται εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ἀριθμητῶν καὶ τῶν παρονομαστῶν δύο κλασμάτων τὰ ὁποῖα ἀντιπροσωπεύουν τοὺς ρητούς· ἤτοι εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν ἀκεραίων. Διὰ τοῦτο ὄλαι αἱ γνωσταὶ ἰδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 ἰσχύουσιν καὶ εἰς τὸ σύνολον \mathbb{Q}_0^+

ι) Ὑπαρξίς γινομένου, μονότιμον

Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν προκύπτει ὅτι τὸ γινόμενον δύο ρητῶν εἶναι πάντοτε εἷς καὶ μόνον εἷς ρητός.

ιι) Μεταθετικότης

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta} \\ \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma \cdot \alpha}{\delta \cdot \beta} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

ιιι) Προσεταιριστικότης

$$\left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \right) \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha \cdot \gamma \cdot \epsilon}{\beta \cdot \delta \cdot \zeta} \Rightarrow \left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \right) \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right)$$
$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right) = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma \cdot \epsilon}{\delta \cdot \zeta} = \frac{\alpha \cdot \gamma \cdot \epsilon}{\beta \cdot \delta \cdot \zeta}$$

ιiv) Οὐδέτερον στοιχείον

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{1}{1} = \frac{\alpha \cdot 1}{\beta \cdot 1} \quad \eta \quad \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{1}{1} = \frac{\alpha}{\beta}$$

v) Ἐπιμεριστικότης ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν ἢ ἀφαιρέσιν

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta} \pm \frac{\epsilon}{\zeta} \right) = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \pm \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta}$$

vi) Γινόμενον πολλῶν παραγόντων

Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων ὀρίζεται ὅπως καὶ εἰς τὸ σύνολον N_0 .
Ἦτοι ἔχομεν :

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \cdot \frac{\eta}{\theta} = \left[\left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \right) \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right] \cdot \frac{\eta}{\theta}$$

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \cdot \frac{\eta}{\theta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\eta}{\theta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \dots$$

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \cdot \frac{\eta}{\theta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right) \cdot \frac{\eta}{\theta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\eta}{\theta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right) \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \dots$$

Ὅπου $\alpha, \gamma, \epsilon, \eta \in N_0$ καὶ $\beta, \delta, \zeta, \theta \in N$

72. 3. Ἐφαρμογαί

α) Πολλαπλασιασμὸς κλάσματος ἐπὶ διαιρέτην τοῦ παρανομαστοῦ.

$$3 \cdot \frac{5}{6} = \frac{3 \cdot 5}{6} = \frac{(3 \cdot 5) : 3}{6 : 3} = \frac{5}{2} = 2 \frac{1}{2}$$

$$\alpha \cdot \frac{\beta}{\alpha \cdot \gamma} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\alpha \cdot \gamma} = \frac{\beta}{\gamma} \quad \left. \begin{array}{l} \beta \in \mathbb{N}_0 \\ \alpha, \gamma \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \text{ "Άρα... } .$$

β) Μεικτός επί κλάσμα

$$6 \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \left(6 + \frac{4}{5}\right) \cdot \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \dots$$

γ) Μεικτός επί μεικτόν

$$\begin{aligned} 36 \frac{2}{5} \cdot 2 \frac{3}{4} &= \left(36 + \frac{2}{5}\right) \cdot \left(2 + \frac{3}{4}\right) \\ &= 36 \cdot 2 + 36 \cdot \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \cdot 2 + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \\ &= 72 + 27 + \frac{4}{5} + \frac{3}{10} = 100 \frac{1}{10} \end{aligned}$$

(Διπλή εφαρμογή τῆς ἐπιμεριστικῆς ιδιότητος)

72. 4. Ἀντίστροφοι ἀριθμοί

α) Προσέξτε τὰ γινόμενα

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3}, \quad 2 \cdot \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{7} \cdot 7$$

Ἐκαστον τούτων ἰσοῦται μὲ τὴν μονάδα.

β) Ποιοὶ ρητοὶ ἐπαληθεύουσιν τὰς ἐξισώσεις

$$\frac{3}{7} \cdot \chi = 1, \quad \frac{1}{5} \cdot \psi = 1$$

Εἶναι $\chi = \frac{7}{3}$ καὶ $\psi = 5$

Ἐὰν δύο ρητοὶ α, β ἔχουν γινόμενον ἴσον μὲ 1, τότε λέγομεν ὅτι ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν εἶναι ἀντίστροφος τοῦ ἄλλου.

Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ἐκαστος ρητὸς ἔχει ἓνα, πολλοὺς ἢ οὐδένα ἀντίστροφον;

Εἶναι εὐκόλον νὰ διακρίνωμεν ὅτι:

α) Τὸ μηδὲν οὐδένα ἀντίστροφον ἔχει (Διατί; Εἶναι δυνατὸν τὸ γινόμενον τοῦ μηδενὸς μὲ οἰονδήποτε ρητὸν νὰ ἰσοῦται μὲ 1;)

β) Ἐὰν μᾶς δοθῇ εἷς ρητὸς, π.χ. ὁ $\frac{4}{9}$, τότε ὁ ρητὸς $\frac{9}{4}$ εἶναι ἀντίστροφος αὐτοῦ καὶ μάλιστα ὁ μοναδικός.

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{9}{4} = 1$$

Γενικῶς: "Ἐκαστος ρητὸς $\frac{\alpha}{\beta}$, διάφορος τοῦ μηδενός, ἔχει ἓνα καὶ μόνον ἓνα ἀντίστροφον τὸν ρητὸν $\frac{\beta}{\alpha}$

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta \cdot \alpha} = 1 \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

207. Ἐπαληθεύσατε ὅτι $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2 \cdot 3}$, $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{3 \cdot 4}$ καὶ ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν νὰ εὑρετε ὅτι:

$$\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha+1} = \frac{1}{\alpha \cdot (\alpha+1)} \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

208. Δύο ἀδελφοὶ α, β διένειμον μίαν περιουσίαν. Ὁ α' ἔλαβεν τὸ $\frac{1}{3}$ αὐτῆς καὶ τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ ὑπολοίπου. Ποῖον κλάσμα τῆς περιουσίας ἔλαβεν ὁ β' ;

209. Ὑπολογίσατε μὲ δύο τρόπους τὰ γινόμενα

$$\alpha) \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{4}{9} + \frac{1}{2} \right) \quad \beta) \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{5}{9} - \frac{1}{2} \right)$$

$$\gamma) 3 \frac{1}{2} \cdot 5 \frac{2}{3} \quad \delta) 4 \frac{3}{4} \cdot 3 \frac{4}{5}$$

210. Συμπληρώσατε τὰς ἰσότητας $1 \frac{4}{9} \cdot \dots = 1$, $\frac{3}{8} \cdot \dots = 0$, $\frac{3}{8} \cdot \frac{5}{9} \cdot \dots = \frac{5}{24}$

211. Ὑπολογίσατε μὲ τὸν συντομώτερον τρόπον τὰ γινόμενα:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{9}{7}, \quad \frac{4}{5} \cdot \frac{10}{8} \cdot \frac{11}{12} \cdot \frac{24}{22}$$

73. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

73. 1. Ὅρισμός

Ἡ διαίρεσις εἰς τὸ σύνολον \mathbb{Q}^+ ὀρίζεται ὅπως καὶ εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 .

Π.χ. λέγομεν ὅτι τὸ (ἀκριβές) πηλίκον τοῦ ρητοῦ $\frac{8}{9}$ διὰ τοῦ ρητοῦ 4

εἶναι ὁ ρητὸς $\frac{2}{9}$ καὶ γράφομεν

$$\frac{8}{9} : 4 = \frac{2}{9} \quad \text{διότι} \quad \frac{2}{9} \cdot 4 = \frac{8}{9}$$

Γενικῶς $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \chi$ σημαίνει ὅτι $\frac{\gamma}{\delta} \cdot \chi = \frac{\alpha}{\beta}$

Ήτοι:

$$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \chi \iff \frac{\gamma}{\delta} \cdot \chi = \frac{\alpha}{\beta} \quad \frac{\alpha}{\beta}, \frac{\gamma}{\delta}, \chi \in \mathbb{Q}_0^+$$

73. 2. Εύρεσις τοῦ πηλίκου

Διὰ τὴν εὐρεσιν τοῦ (ἀκριβοῦς) πηλίκου μιᾶς διαιρέσεως, π.χ. τῆς διαιρέσεως $4 : \frac{2}{3}$ σκεπτόμεθα ὅτι πρέπει νὰ εὐρωμεν ἕνα ρητὸν χ τοιοῦτον ὥστε

$$\frac{2}{3} \cdot \chi = 4$$

Ήτοι $4 : \frac{2}{3} = \chi \iff \frac{2}{3} \cdot \chi = 4$ (1)

Ἄς προσπαθῆσωμεν νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἐξίσωσιν $\frac{2}{3} \cdot \chi = 4$

$$\frac{2}{3} \cdot \chi = 4 \iff \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot \chi \right) = \frac{3}{2} \cdot 4 \quad (\text{Πολ/σμός ἐπὶ } \frac{3}{2})$$

$$\iff \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \right) \cdot \chi = 4 \cdot \frac{3}{2} \quad (\text{Προσεταιριστική ιδιότης})$$

$$\iff \chi = 4 \cdot \frac{3}{2} \quad \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1 \right)$$

Ὡστε $4 : \frac{2}{3} = 4 \cdot \frac{3}{2}$

Μὲ ὅμοιον τρόπον εὐρίσκομεν ὅτι $\frac{5}{8} : \frac{4}{7} = \frac{5}{8} \cdot \frac{7}{4}$

$$\frac{5}{8} : 3 = \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3}$$

Γενικῶς

$$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ὅπου} \\ \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

Τὸ (ἀκριβές) πηλίκον ἑνὸς ρητοῦ δι' ἄλλου, μὴ μηδενικοῦ, ἰσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ διαιρετέου ἐπὶ τὸν ἀντίστροφον τοῦ διαιρέτου.

Παρατήρησις

Ὅπως γνωρίζομεν, εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 ἡ διαίρεσις εἶναι δυνατὴ καὶ τελεία μόνον ὅταν ὁ διαιρετέος εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου καὶ ὁ διαιρέτης

είναι διάφορος του μηδενός. Είς το σύνολον Q_0^+ ή διαιρέσεις είναι δυνατή και τελεία έκτός μόνον τῆς περιπτώσεως εἰς τὴν ὅποιαν ὁ διαιρέτης εἶναι μηδέν.

73. 3. Διατήρησις τῶν ἰδιοτήτων

Εἶναι εὐκόλον νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ὅλαι αἱ ἰδιότητες τῆς διαιρέσεως εἰς τὸ σύνολον N_0 ἰσχύουν καὶ εἰς τὸ σύνολον Q_0^+ καὶ μάλιστα μὲ ὀλιγωτέρους περιορισμούς.

Παραθέτομεν κατωτέρω σύντομον πίνακα τούτων.

$$1. \left(\frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi'} \right) : \frac{\gamma}{\pi''} = \left(\frac{\alpha}{\pi} : \frac{\gamma}{\pi''} \right) + \left(\frac{\beta}{\pi'} : \frac{\gamma}{\pi''} \right)$$

$$2. \left(\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi'} \right) : \frac{\gamma}{\pi''} = \left(\frac{\alpha}{\pi} : \frac{\gamma}{\pi''} \right) - \left(\frac{\beta}{\pi'} : \frac{\gamma}{\pi''} \right)$$

$$3. \left(\frac{\alpha}{\pi} \cdot \frac{\beta}{\pi'} \right) : \frac{\gamma}{\pi''} = \left(\frac{\alpha}{\pi} : \frac{\gamma}{\pi''} \right) \cdot \frac{\beta}{\pi'}$$

$$4. \frac{\alpha}{\pi} : \left(\frac{\beta}{\pi'} \cdot \frac{\gamma}{\pi''} \right) = \left(\frac{\alpha}{\pi} : \frac{\beta}{\pi'} \right) : \frac{\gamma}{\pi''}$$

$$5. \frac{\alpha}{\pi} = \frac{\beta}{\pi'} \iff \frac{\alpha}{\pi} \cdot \frac{\gamma}{\pi''} = \frac{\beta}{\pi'} \cdot \frac{\gamma}{\pi''}$$

$$6. \frac{\alpha}{\pi} > \frac{\beta}{\pi'} \iff \frac{\alpha}{\pi} \cdot \frac{\gamma}{\pi''} > \frac{\beta}{\pi'} \cdot \frac{\gamma}{\pi''}$$

73. 4. Ἐφαρμογαὶ

1. Διαίρεισις διὰ διαιρέτου τοῦ ἀριθμητοῦ

$$\frac{4.5}{3} : 5 = \frac{4.5}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4.5}{3 \cdot 5} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma} : \beta = \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma} \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma \cdot \beta} = \frac{\alpha}{\gamma}$$

$$\text{Ἦτοι } \left. \begin{array}{l} \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma} : \beta = \frac{\alpha}{\gamma} \\ \alpha \in N_0 \\ \beta, \gamma \in N \end{array} \right\}$$

2. Μεικτὸς διὰ ἀκεραίου

$$24 \frac{3}{4} : 4 = (24 : 4) + \left(\frac{3}{4} : 4 \right) = 6 + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = 6 \frac{3}{16}$$

3. Μεικτός διά κλάσματος

$$3 \frac{1}{2} : \frac{4}{5} = 3 \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4} = \left(3 \cdot \frac{5}{4}\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4}\right) = 4 \frac{3}{8}$$

4. Μεικτός διά μεικτοῦ

$$6 \frac{2}{3} : 2 \frac{3}{6} = 6 \frac{2}{3} : \frac{15}{3} = 6 \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{15} = 2 \frac{2}{3}$$

(Χρησιμοποιήσατε και άλλους τρόπους)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

212. Εάν πολλαπλασιάσετε ένα αριθμόν επί $\frac{2}{3}$ θα εύρετε 48. Ποίος είναι ο αριθμός;
213. Ο λόγος ενός ρητού προς $\frac{7}{8}$ ισοῦται με $\frac{7}{8}$. Ποίος είναι ο ρητός αὐτός;
214. Ὑπολογίσατε με δύο τρόπους τὰ ἐξαγόμενα $\left(8 + 6 \frac{4}{9}\right) : 2$, $\left(3 \frac{6}{7} - 1 \frac{4}{5}\right) : 3$
215. Πόσον αὐξάνεται ἢ ἐλαττοῦται ὁ ρητός $\frac{3}{5}$ ἐάν τὸν διαιρέσωμεν διὰ $\frac{3}{4}$;
216. Με ποῖον ρητὸν πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸν $\frac{4}{9}$ διὰ νὰ λάβωμεν πηλίκον 8;

74. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΡΗΤΩΝ

74. 1. Ὁρισμοί

Ὅπως ἀντὶ $2 \cdot 2 \cdot 2$ γράφομεν 2^3 ὁμοίως ἀντὶ $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}$ γράφομεν $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

Ἦτοι:
$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^3 = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

καὶ γενικῶς:
$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdots \text{(} n \text{ παράγοντες)} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν αὐτὸν ἔχομεν

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{2^4}{3^4}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3}{4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{3^3}{4^3}$$

Γενικώς :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\nu} &= \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdots \quad (\nu \text{ παράγοντες}) \\ &= \frac{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots (\nu \text{ παράγοντες})}{\beta \cdot \beta \cdot \beta \cdots (\nu \text{ παράγοντες})} \end{aligned}$$

*Η

$$\boxed{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\nu} = \frac{\alpha^{\nu}}{\beta^{\nu}} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \nu \in \mathbb{N} \end{array} \right\}}$$

74. 2. Όπως εις τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 , ἐλάβομεν $\alpha^0=1$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$, ὁμοίως λαμβάνομεν

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^0 = 1 \quad \text{ὅπου} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}.$$

74. 3. Ἰδιότητες

Εὐκόλως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$1. \quad \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^2}{3^2} \cdot \frac{2^3}{3^3} = \frac{2^2 \cdot 2^3}{3^2 \cdot 3^3} = \frac{2^{2+3}}{3^{2+3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2+3}$$

$$\text{Γενικῶς :} \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu} \cdot \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\nu} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu+\nu} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \mu, \nu \in \mathbb{N} \end{array} \right\}.$$

$$2. \quad \left(\frac{2}{3}\right)^5 : \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left[\left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] : \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^3.$$

$$\text{Γενικῶς :} \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu} : \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\nu} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu-\nu} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \mu, \nu \in \mathbb{N}, \mu \geq \nu \end{array} \right\}$$

$$3. \quad \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}\right)^2 = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}\right) \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^2$$

$$\text{Γενικῶς :} \quad \left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta}\right)^{\mu} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta}\right)^{\mu} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta, \mu \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

$$4. \quad \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{2+2+2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{3 \cdot 2}$$

$$\text{Γενικῶς :} \quad \left[\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu}\right]^{\nu} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu \cdot \nu} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \nu, \mu \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

217. Υπολογίσατε τὰς δυνάμεις :

$$\left(\frac{2}{5}\right)^4, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^6, \quad \left(\frac{3}{5}\right)^3, \quad \left(\frac{5}{9}\right)^3$$

218. Προσδιορίσατε τὸν ἀκέραιον α ὥστε νὰ ἀληθεύη ἡ ἰσότης

$$\frac{\alpha}{625} = \left(\frac{7}{25}\right)^2$$

219. Γράψατε ὑπὸ μορφήν μιᾶς δυνάμεως τὰ κάτωθι γινόμενα ἢ πηλίκα

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{8}{27}\right)^2, \quad \frac{2^3}{5^2} \cdot \left(\frac{8}{125}\right)^2, \quad \left(\frac{4}{9}\right)^4 : \left(\frac{2}{3}\right)^2, \quad \left(\frac{3}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{7}{9}\right)^0 : \frac{9}{16}$$

75. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

75. 1. Ὅρισμός

Ὅπως γράφομεν $2:3 = \frac{2}{3}$, $3:5 = \frac{3}{5}$,

κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν συμφωνοῦμεν νὰ γράφωμεν

$$\frac{2}{3} : 5 = \frac{\frac{2}{3}}{5}, \quad 3 : \frac{2}{5} = \frac{3}{\frac{2}{5}}, \quad \frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{5}}$$

Γενικῶς τὸ πηλίκον $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta}$ τῶν ρητῶν $\frac{\alpha}{\beta}$ καὶ $\frac{\gamma}{\delta}$ γράφεται καὶ ὑπὸ τὴν μορφήν

$$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} \quad \text{ὅπου} \quad \alpha \in \mathbb{N}_0, \quad \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}$$

Ὑπὸ τὴν μορφήν αὐτὴν δὲ λέγεται σύνθετον κλάσμα.

Γενικῶς : **Σύνθετον κλάσμα** λέγεται τὸ κλάσμα τοῦ ὁποίου εἰς τοῦ-
λάχιστον ὄρος εἶναι κλάσμα.

Πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως ἡ γραμμὴ τοῦ συνθέτου κλάσματος γράφεται πάντοτε μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν γραμμὴν ἐκάστου κλάσματος-ὄρου αὐτοῦ.

Π.χ. διὰ τὸ πηλίκον $\frac{2}{3} : 4$ γράφομεν $\frac{\frac{2}{3}}{4}$ καὶ ὄχι $\frac{2}{4}$.

Διὰ νὰ διακρίνωμεν τὰ κλάσματα τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμητὴς εἶναι ἀκέ-

ραίος καί ὁ παρονομαστής φυσικὸς ἀπὸ τὰ σύνθετα κλάσματα, ὀνομάζομεν τὰ πρῶτα ἀπλᾶ κλάσματα.

75. 2. Τροπὴ συνθέτου κλάσματος εἰς ἀπλοῦν

Διὰ νὰ ἐκτελέσωμεν πράξεις μὲ σύνθετα κλάσματα πρέπει νὰ τὰ τρέψωμεν πρῶτα εἰς ἀπλᾶ.

Πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὅτι ἓν σύνθετον κλάσμα παριστάνει τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ αὐτοῦ.

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5}$$

Ἦτοι :

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5}$$

$$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma}$$

Ἦτοι :

$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma} \quad \text{ὅπου} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$
--

Δυνάμεθα ὁμῶς νὰ ἐργασθῶμεν καὶ ὡς ἑξῆς :

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 3 \cdot 7}{\frac{5}{7} \cdot 3 \cdot 7} = \frac{2 \cdot 7}{5 \cdot 3}, \quad \frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta \cdot \delta}{\frac{\gamma}{\delta} \cdot \beta \cdot \delta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma}$$

Ἦτοι στηριζόμενοι εἰς τὴν θεμελιώδη ιδιότητα τῶν κλασμάτων πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους τοῦ συνθέτου κλάσματος ἐπὶ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν τῶν ἀπλῶν κλασμάτων αὐτοῦ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

220. Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{2}} + \frac{1}{3}, \quad \frac{4}{7} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2}, \quad \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \cdot 2} + 1, \quad \frac{2 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^2}{\left(1 - \frac{1}{8}\right)^2}$$

221) Ποιον εκ τῶν κατωτέρω δύο συνθέτων κλασμάτων είναι τὸ μεγαλύτερον;

$$\frac{2}{2} \text{ καὶ } \frac{2}{2}$$

76. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

76. 1. Εἰς τὰ προβλήματα τεσσάρων πράξεων, τὰ ὅποια ἔχομεν ἐπιλύσει, ὡς βασικὸν σύνολον ἀριθμῶν εἶχομεν τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων N_0 . Ἡδη ἡ ἐπέκτασις τῶν τεσσάρων πράξεων καὶ εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν ἀριθμῶν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιλύσωμεν καὶ νέους τύπους προβλημάτων.

76. 2. Πρόσθεσις — Ἀφαιρέσις

Πρόβλημα

Θέλει τις νὰ διανύσῃ μίαν ἀπόστασιν 25 km εἰς τρεῖς ἡμέρας. Τὴν α' ἡμέραν διήνυσε $8\frac{1}{3}$ km καὶ τὴν β' ἡμέραν 3 km περισσότερα τῆς α'. Πόσα χιλιόμετρα πρέπει νὰ διανύσῃ τὴν τρίτην ἡμέραν;

Ἐπίλυσις

Κατὰ τὸ πρόβλημα ἔχομεν τὴν ἑξῆς σειράν προσθέσεων καὶ ἀφαιρέσεων :

Ἀριθμὸς km διανυθέντων τὴν α' ἡμέραν : $8\frac{1}{3}$

Ἀριθμὸς km διανυθέντων τὴν β' ἡμέραν : $8\frac{1}{3} + 3 = 11\frac{1}{3}$

Ἀριθμὸς km διανυθέντων τὴν α' καὶ β' ἡμέραν : $8\frac{1}{3} + 11\frac{1}{3} = 19\frac{2}{3}$

Ἀριθμὸς km τὰ ὅποια θὰ διανύσῃ τὴν γ' ἡμέραν :

$$25 - 19\frac{2}{3} = 24\frac{3}{3} - 19\frac{2}{3} = 5\frac{1}{3}$$

Ὡστε τὴν τρίτην ἡμέραν πρέπει νὰ διανύσῃ $5\frac{1}{3}$ km.

76. 3. Πολλαπλασιασμός

Πρόβλημα 1ον

Τὸ 1 m ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται $60\frac{1}{2}$ δραχ. Πόσον τιμῶνται τὰ 5 m τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος;

Ἐπίλυσις

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ γνωρίζομεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ζητοῦ-

μεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν ὁμοειδῶν πρὸς αὐτὴν μονάδων. Ὡς γνωστὸν θὰ ἐκτελέσωμεν πολλαπλασιασμόν. Πολλαπλασιαστέος εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ πολλαπλασιαστής ὁ ἀριθμὸς τῶν μονάδων τῶν ὁποίων ζητοῦμεν τὴν τιμὴν.

$$\text{Ἐχομεν} \quad 5 \cdot 60 \frac{1}{2} = 302 \frac{1}{2}$$

Ἦτοι τὰ 5 m ὑφάσματος τιμῶνται $302 \frac{1}{2}$ δρχ.

Πρόβλημα 2ον

Τὸ 1 m ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 60 δρχ. Πόσον τιμῶνται τὰ $\frac{7}{10}$ m τοῦ

ἰδίου ὑφάσματος;

Ἐπίλυσις

Ἐὰν φαντασθῶμεν ὅτι τὸ ἓν μέτρον, ὅπως καὶ ἡ ἀξία αὐτοῦ, χωρίζεται εἰς 10 ἴσα μέρη, τότε τὸ $\frac{1}{10}$ τοῦ μέτρου θὰ ἔχη ἀξίαν τὸ $\frac{1}{10}$ τῶν 60 δρχ. Ἐπομένως τὰ $\frac{7}{10}$ τοῦ μέτρου θὰ ἀξίζουσιν τὰ $\frac{7}{10}$ τῶν 60 δρχ. Γνωρίζομεν ὁμῶς ὅτι διὰ νὰ εὗρωμεν τὰ $\frac{7}{10}$ τοῦ 60 πολλαπλασιάζομεν τὸ $\frac{7}{10}$ ἐπὶ 60.

$$\frac{7}{10} \cdot 60 = 42.$$

Ἦτοι τὰ $\frac{7}{10}$ m. ὑφάσματος ἀξίζουσιν 42 δρχ.

Πρόβλημα 3ον

Τὸ 1 m ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται $60 \frac{1}{2}$ δρχ. Πόσον τιμῶνται τὰ $5 \frac{1}{4}$ m

τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος;

Ἐπίλυσις

Σκεπτόμενοι ὅπως καὶ προηγουμένως εὐρίσκομεν ὅτι

$$\text{τὰ } 5 \frac{1}{4} \text{ m} = \frac{21}{4} \text{ m ὑφάσματος ἀξίζουσιν τὰ } \frac{21}{4} \text{ τῶν } 60 \frac{1}{2} \text{ δρχ.}$$

$$5 \frac{1}{4} \cdot 60 \frac{1}{2} = 317 \frac{5}{8}.$$

Ὡστε, τὰ $5 \frac{1}{4}$ m ὑφάσματος ἀξίζουσιν $317 \frac{5}{8}$ δρχ.

Ἀπὸ τὴν ἐπίλυσιν τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων συνάγομεν ὅτι :

Ἢταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς ἀκεραίας μονάδος καὶ θέλωμεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν ὁμοειδῶν πρὸς αὐτὴν μονάδων ἢ μέρους αὐτῆς, ἐκτελοῦμεν πολλαπλασιασμόν.

Πολλαπλασιαστέος εἶναι, πάντοτε, ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ἀκεραίας μονάδος καὶ πολλαπλασιαστής ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων ἢ τῶν μερῶν τῆς μονάδος.

Σημείωσις

Είναι γνωστόν ὅτι καὶ διὰ τὴν εὕρεσιν μέρους ἑνὸς ἀριθμοῦ πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ ζητούμενον μέρος αὐτοῦ. Π. χ. τὰ $\frac{3}{5}$ τοῦ ἀρι-

θμοῦ 30 εἶναι $\frac{3}{5} \cdot 30 = 18$.

76. 4. Διαιρέσεις

Πρόβλημα 1ον

Τὰ 4 kg ἑνὸς ἐμπορεύματος τιμῶνται 20 $\frac{2}{5}$ δραχ. Πόσον τιμᾶται τὸ 1 kg αὐτοῦ;

Ἐπίλυσις

Ἐπειδὴ γνωρίζομεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων καὶ ζητοῦμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς, ὁμοειδοῦς πρὸς αὐτάς, μονάδος, θὰ ἐκτελέσωμεν, κατὰ τὰ γνωστά, διαιρέσιν.

$$20 \frac{2}{5} : 4 = 5 \frac{1}{10}$$

Ἦτοι τὸ 1 kg τοῦ ἐμπορεύματος ἀξίζει 5 $\frac{1}{10}$ δραχ.

Πρόβλημα 2ον

Τὰ $\frac{5}{7}$ kg ἑνὸς ἐμπορεύματος τιμῶνται 20 δραχ. Πόσον τιμᾶται τὸ 1 kg αὐτοῦ;

Ἐπίλυσις

Σκεπτόμεθα ὅτι, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὴν τιμὴν τοῦ 1 kg ἐπὶ $\frac{5}{7}$, θὰ πρέπει νὰ εὕρωμεν 20 δραχ. Συνεπῶς, κατὰ τὸν ὅρισμόν τῆς τελείας διαιρέσεως, ἡ τιμὴ τοῦ 1 kg, θὰ εἶναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 20 διὰ $\frac{5}{7}$.

$$20 : \frac{5}{7} = 20 \cdot \frac{7}{5} = 28$$

Ὡστε τὸ 1 kg τοῦ ἐμπορεύματος τιμᾶται 28 δραχ.

Ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων συνάγομεν ὅτι :

Ὅταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων ἀκεραίων ἢ κλασματικῶν ἢ μέρους καὶ ζητοῦμεν νὰ εὕρωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς (ἀκεραίας μονάδος), ὁμοειδοῦς πρὸς τὰς πολλὰς, ἐκτελοῦμεν διαιρέσιν.

Διαιρετέος εἶναι πάντοτε ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων ἢ τοῦ μέρους. Τὴν διαιρέσιν αὐτὴν ἔχομεν ὀνομάσει μερισμόν.

Πρόβλημα 3ον

Τὸ 1 kg ἑνὸς ἐμπορεύματος τιμᾶται 10 $\frac{2}{5}$ δραχ. Πόσα kg ἐμπορεύματος ἀγοράζομεν μὲ 33 $\frac{4}{5}$ δραχ;

Ἐπίλυσις

Εἶναι φανερόν ὅτι, ἐάν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν kg τὰ ὁποῖα θέλομεν νὰ ἀγοράσωμεν, ἐπὶ τὴν τιμὴν τοῦ 1 kg, θὰ πρέπει νὰ εὐρωμεν $33 \frac{4}{5}$ δραχ. Συνεπῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν ζητουμένων kg θὰ εἶναι τὸ ἀκριβὲς

πηλίκον τῆς διαιρέσεως $33 \frac{4}{5}$ διὰ $10 \frac{2}{5}$

$$33 \frac{4}{5} : 10 \frac{2}{5} = 3 \frac{1}{4}$$

Ἦτοι, θὰ ἀγοράσωμεν $3 \frac{1}{4}$ kg ἐμπορεύματος.

Ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συνάγομεν ὅτι :

Ὅταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος καὶ τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν ὁμοειδῶν ἀκεραίων ἢ κλασματικῶν μονάδων καὶ ζητοῦμεν πόσαι εἶναι αὐται, ἐκτελοῦμεν διαίρεσιν.

Διαιρετέος εἶναι πάντοτε ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων. Τὴν διαίρεσιν αὐτὴν ἔχομεν ὀνομάσει **μέτρησιν**.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

222. Τρία πρόσωπα ἐμοιράσθησαν ἓν τεμάχιον ὑφάσματος. Τὸ α' ἔλαβεν $12 \frac{3}{5}$ m, τὸ β' ἔλαβε $2 \frac{2}{3}$ m ὀλιγώτερα τοῦ α' καὶ $2 \frac{5}{8}$ m περισσότερα τοῦ γ'. Πόσον ἦτο τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος;

223. Εἰς ἔμπορος ἠγόρασε ἐμπορεύματα ἀξίας 72000 δραχ. καὶ κατέβαλε ἀμέσως τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς ἀξίας των. Πόσα ὀφείλει ἀκόμη;

224. Ὁ σίτος δίδει τὰ $\frac{11}{12}$ τοῦ βάρους του εἰς ἄλευρον καὶ τὸ ἄλευρον δίδει τὰ $\frac{13}{10}$ τοῦ βάρους του εἰς ἄρτον. Πόσον ἄρτον θὰ λάβωμεν ἀπὸ 150 kg σίτου;

225. Ἐν ὥρολόγιον εἰς $15 \frac{1}{2}$ h μένει ὀπίσω $\frac{6}{60}$ h. Πόσον μένει ὀπίσω εἰς μίαν ὥραν;

226. Μία ἐλαστικὴ σφαῖρα ἀφέθη νὰ πέσῃ ἐλευθέρως εἰς τὸ πάτωμα καὶ ἀναπηδᾷ ἐκὰς τὴν φορὰν εἰς τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ προηγουμένου ὕψους. Ἀφοῦ προσέκρουσεν 3 φορὰς εἰς τὸ πάτωμα ἀνῆλθεν εἰς ὕψος 48 cm. Ἀπὸ ποῖον ὕψος ἀφέθη νὰ πέσῃ;

77. ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ

Πρόβλημα 1ον

Τὰ 5 kg ἀλεύρου τιμῶνται 30 δραχ. Πόσον τιμῶνται τὰ 8 kg ἄλευρου;

Ἐπίλυσις

Δυνάμεθα νὰ ἀναλύσωμεν τὸ πρόβλημα εἰς τὰ ἑξῆς δύο ἀπλᾶ προβλήματα:

α) Τὰ 5 kg ἀλεύρου ἀξίζουν 30 δραχ.

Τὸ 1 kg αλεύρου πόσον ἀξίζει;

Εἶναι $\frac{30}{5} = 6$. Συνεπῶς τὸ 1 kg αλεύρου ἀξίζει 6 δρχ.

β) Τὸ 1 kg αλεύρου ἀξίζει 6 δρχ. Τὰ 8 kg πόσον ἀξίζουν;

Εἶναι $8 \cdot 6 = 48$. Συνεπῶς τὰ 8 kg αλεύρου ἀξίζουν 48 δρχ.

Κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἀνάλυσιν διὰ νὰ εὐρωμεν ἐκ τῆς τιμῆς τῶν 5 kg τὴν τιμὴν τῶν 8 kg εὐρήκαμεν πρῶτον τὴν τιμὴν τοῦ 1 kg καὶ ἔπειτα τὴν τιμὴν τῶν 8 kg αλεύρου.

Διὰ τοῦτο ὁ τρόπος αὐτὸς ἐργασίας λέγεται μέθοδος ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.



Αἱ ἐπιλύσεις τῶν δύο ἀπλῶν προβλημάτων γράφονται συντόμως ὡς ἑξῆς.

Τὰ 5 kg αλεύρου ἀξίζουν 30 δρχ.

Τὸ 1 kg » ἀξίζει $\frac{30}{5}$ δρχ.

Τὰ 8 kg » ἀξίζουν $8 \cdot \frac{30}{5}$ δρχ. = 48 δρχ.

Πρόβλημα 2ον

Τὰ $\frac{2}{3}$ μιᾶς ἀποστάσεως εἶναι 24 km. Πόσα km εἶναι τὰ $\frac{3}{5}$ τῆς ἀποστάσεως ταύτης;

Ἐπίλυσις

Χάριν συντομίας τρέπομεν εἰς ὁμώνυμα τὰ κλάσματα $\frac{2}{3}$ καὶ $\frac{3}{5}$. Λαμβάνομεν $\frac{10}{15}$ καὶ $\frac{9}{15}$.

Σκεπτόμεθα ὅτι

τὰ $\frac{10}{15}$ τῆς ἀποστάσεως εἶναι 24 km

τὸ $\frac{1}{15}$ » » » $\frac{24}{10}$ km

τὰ $\frac{9}{15}$ » » » $9 \cdot \frac{24}{10}$ km = $21 \frac{3}{5}$ km

Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ εὐρήκαμεν πρῶτον τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς κλασματικῆς μονάδος ($\frac{1}{15}$) καὶ ἐν συνεχείᾳ τῶν πολλῶν κλασματικῶν μονάδων ($\frac{9}{15}$).

Πρόβλημα 3ον

Τὰ $\frac{2}{3}$ καὶ τὰ $\frac{3}{4}$ ἐνὸς ἀριθμοῦ εἶναι 51. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς;

Ἐπίλυσις

Εἶναι $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12}$

Τὰ $\frac{17}{12}$ τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι 51

Τὸ $\frac{1}{12}$ » » » $\frac{51}{17} = 3$

Τὰ $\frac{12}{12}$ » » » $3 \cdot 12 = 36$

Ὡστε ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι ὁ 36.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

227. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ ὁποίου τὰ $\frac{7}{12}$ εἶναι 21;

228. Ἐὰν τὸ $\frac{1}{5}$ ἑνὸς ἀριθμοῦ τὸ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ $\frac{1}{2}$ αὐτοῦ εὐρίσκομεν τὸν ἀριθμὸν 7. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς;

229. Τὰ $\frac{3}{4}$ kg ἐλαίου ἔχουν 18 δρχ. Πόσον ἔχουν τὰ $2\frac{4}{5}$ kg αὐτοῦ;

230. Μία δεξαμενὴ περιέχει 216 kg. ὕδατος καὶ εἶναι γεμάτη κατὰ τὰ $\frac{3}{7}$ αὐτῆς. Πόσα kg ὕδατος ἀπαιτοῦνται ἀκόμη διὰ νὰ γεμίση;

231. Τὸ τριπλάσιον καὶ τὰ $\frac{2}{3}$ ἑνὸς ἀριθμοῦ ἀποτελοῦν τὸν ἀριθμὸν 11. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτός;

78. ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙ' ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Πρόβλημα 1ον

Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ κλάσμα $\frac{4}{7}$ διὰ νὰ λάβωμεν ἄθροισμα $1\frac{6}{11}$;

Σχηματισμὸς τῆς ἐξισώσεως.

Ἐὰν παραστήσωμεν μὲ x τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, κατὰ τὸ πρόβλημα θὰ ἔχωμεν

$$\frac{4}{7} + x = 1\frac{6}{11}$$

Ἐπίλυσις τῆς ἐξισώσεως.

$$\frac{4}{7} + x = 1\frac{6}{11} \iff x = 1\frac{6}{11} - \frac{4}{7} \text{ ἢ } x = \frac{75}{77}$$

Ἐπαλήθευσις.

$$\frac{4}{7} + \frac{75}{77} = \frac{119}{77} = 1\frac{42}{77} = 1\frac{6}{11}$$

Ὡστε ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι $\frac{75}{77}$

Πρόβλημα 2ον

Έν δοχείον ἔχει $18\frac{3}{4}$ kg ἑλαίου. Πόσα kg αὐτοῦ πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν

διὰ νὰ μείνουν $6\frac{4}{5}$ kg ἑλαίου εἰς τὸ δοχείον;

Σχηματισμὸς τῆς ἐξισώσεως.

Ἐὰν παραστήσωμεν μὲ x τὸ ἀριθμὸν kg. ἑλαίου τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν, θὰ ἔχωμεν

$$18\frac{3}{4} - x = 6\frac{4}{5}$$

Ἐπίλυσις τῆς ἐξισώσεως.

$$18\frac{3}{4} - x = 6\frac{4}{5} \iff 18\frac{3}{4} - 6\frac{4}{5} = x \quad \eta \quad x = 11\frac{19}{20}$$

Ἐπαλήθευσις $18\frac{3}{4} - 11\frac{19}{20} = 17\frac{35}{20} - 11\frac{19}{20} = 6\frac{4}{5}$.

Ὡστε πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν $11\frac{19}{20}$ kg

Πρόβλημα 3ον

Τὰ $\frac{2}{5}$ τοῦ βάρους ἑνὸς κιβωτίου εἶναι $30\frac{1}{2}$ kg. Ποῖον εἶναι τὸ βάρος ὁλοκλήρου τοῦ κιβωτίου;

Σχηματισμὸς τῆς ἐξισώσεως.

Ἐὰν παραστήσωμεν μὲ x τὴν ἀριθ. τιμὴν τοῦ βάρους τοῦ κιβωτίου θὰ ἔχωμεν

$$\frac{2}{5} \cdot x = 30\frac{1}{2}$$

Ἐπίλυσις τῆς ἐξισώσεως.

$$\frac{2}{5} \cdot x = 30\frac{1}{2} \iff x = 30\frac{1}{2} : \frac{2}{5} \quad \eta \quad x = 76\frac{1}{4}$$

Ἐπαλήθευσις. $\frac{2}{5} \cdot 76\frac{1}{4} = \frac{2}{5} \cdot \frac{305}{4} = \frac{305}{10} = 30\frac{1}{2}$

Ὡστε τὸ βάρος ὁλοκλήρου τοῦ κιβωτίου εἶναι $76\frac{1}{4}$ kg

Παρατηρήσεις

α) Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα γίνεται φανερόν ὅτι διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν ἓν πρόβλημα μὲ τὴν βοήθειαν ἐξισώσεων, ἀκολουθοῦμεν γενικῶς τὰ ἑξῆς στάδια :

- 1) Παριστάνομεν με χ τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν τοῦ προβλήματος.
- 2) Σχηματίζομεν μίαν ἐξίσωσιν διὰ τῆς ὁποίας ἐκφράζομεν με μαθηματικὰς σχέσεις τὴν λεκτικὴν διατύπωσιν τοῦ προβλήματος.
- 3) Ἐπιλύομεν τὴν ἐξίσωσιν.
- 4) Ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ πρόβλημα καὶ δίδομεν τὴν ἀπάντησιν εἰς αὐτὸ προσέχοντες πάντοτε ποῖον στοιχεῖον τοῦ προβλήματος ὠνομάσαμεν εἰς τὴν ἀρχὴν με χ .
- 5) Εἶναι δυνατὸν ὠρισεμένας φορὰς ἢ ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος νὰ μὴ εἶναι ἐπιλύσιμος εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀριθμῶν τοὺς ὁποίους χρησιμοποιοῦμεν. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι τὸ πρόβλημά μας δὲν ἔχει λύσιν εἰς τὸ θεωρούμενον σύνολον ἀριθμῶν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

232. Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ $\frac{3}{5}$ διὰ νὰ λάβωμεν ἄθροισμα $7\frac{2}{3}$;
233. Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν $2\frac{3}{4}$ kg ἀπὸ ἓν δοχεῖον βενζίνης, θὰ μείνουν εἰς αὐτὸ $8\frac{1}{5}$ kg. Πόσα kg βενζίνης περιέχει τὸ δοχεῖον;
234. Δύο ἀριθμοὶ ἔχουν γινόμενον 32. Ὁ εἰς ἕξ αὐτῶν εἶναι $18\frac{2}{5}$. Ποῖος εἶναι ὁ ἄλλος ;
235. Ἐὰν ἀπὸ τὸ διπλάσιον ἑνὸς ἀριθμοῦ ἀφαιρέσετε τὸ κλάσμα $\frac{2}{5}$, θὰ εὑρετε $7\frac{3}{5}$. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτός;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

236. Κρουνὸς γεμίζει μίαν δεξαμενὴν εἰς 8 h, δεύτερος εἰς 12 h καὶ τρίτος εἰς 15 h. Ἐὰν ἀνοίξωμεν ταυτόχρονα τοὺς τρεῖς κρουνούς εἰς πόσον χρόνον θὰ γεμίση ἡ δεξαμενὴ; Ποῖον μέρος αὐτῆς θὰ ἔχη γεμίση ἕκαστος κρουνός;
237. Τρεῖς ἀδελφοὶ ἐκληρονόμησαν τὰ $\frac{8}{9}$ μιᾶς περιουσίας. Ἐκαστος τούτων ἔλαβεν 2400 δρχ. Πόση ἦτο ὁλόκληρος ἡ περιουσία;
238. Ἡ ἀξία ἑνὸς οἰκοπέδου ἠυξήθη κατὰ τὰ $\frac{3}{20}$ τῆς ἀξίας τοῦ προηγουμένου ἔτους καὶ ἀνῆλθεν εἰς 325.000 δρχ. Πόση ἦτο ἡ ἀξία τοῦ οἰκοπέδου πρὸ τῆς αὐξήσεως;
239. Ἐν ἐμπόρευμα κατὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ εἶχεν φθορὰν ἴσην πρὸς τὰ $\frac{3}{40}$ τῆς ἀξίας του. Νὰ εὑρετε τὴν ἀξίαν τοῦ ἐμπορεύματος αὐτοῦ πρὸ τῆς φθορᾶς, ἔαν γνωρίζετε ὅτι μετὰ τὴν φθορὰν ἡ ἀξία ἦτο 60.000 δρχ.
240. Τὰ $\frac{2}{5}$ τῶν $\frac{3}{4}$ τῆς ἡλικίας ἑνὸς ἀτόμου εἶναι 18 ἔτη. Πόση εἶναι ἡ ἡλικία του;
241. Τὰ $\frac{3}{4}$ ἑνὸς ἀριθμοῦ ἔαν αὐξηθῶν κατὰ τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτοῦ δίδουν ἀποτέλεσμα 21. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς οὗτος;
242. Τὸ $\frac{1}{3}$ καὶ τὰ $\frac{3}{8}$ ἑνὸς ποσοῦ εἶναι 3400 δρχ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ποσοῦν τοῦτο.
243. Ἐὰν ἀπὸ ἓν ποσοῦν ἀφαιρέσωμεν τὰ $\frac{3}{4}$ αὐτοῦ καὶ τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ ὑπολοίπου, θὰ ἀπομείνουν 1440 δρχ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀρχικὸν ποσοῦν.
244. Ἐξ ἄτομα διένειμον μεταξύ των τὰ $\frac{5}{8}$ ἑνὸς ποσοῦ καὶ ἀπέμειναν 57.600 δρχ. Ποῖον ἦτο τὸ ἀρχικὸν ποσοῦν;
245. Νὰ μοιρασθοῦν 20.230 δρχ. εἰς τρία ἄτομα α' , β' , γ' εἰς τρόπον ὥστε : τὸ μερίδιον τοῦ β' νὰ εἶναι τὰ $\frac{7}{22}$ τοῦ μεριδίου τοῦ α' καὶ τὸ μερίδιον τοῦ γ' νὰ εἶναι τὰ $\frac{16}{33}$ τοῦ μεριδίου τοῦ α' .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ'.

79. ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Κατωτέρω θα χρησιμοποιήσωμεν τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμῆσεως καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν ἀριθμῶν οἱ ὅποιοι εἶναι μικρότεροι τῆς ἀκεραίας μονάδος.

79. 1. Δεκαδικαὶ κλασματικαὶ μονάδες. Δεκαδικὴ κλίμαξ

Ἀπὸ τὰς κλασματικὰς μονάδας

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{100}, \frac{1}{500}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10000}$$

αἱ κλασματικαὶ μονάδες $\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10000}$

ἔχουν ἓν ἰδιαιτέρον γνῶρισμα. Ἔχουν ὡς παρονομαστὰς δυνάμεις τοῦ 10.
 $10=10^1, 100=10^2, 1000=10^3, 10.000=10^4.$

Διὰ τοῦτο ὀνομάζονται δεκαδικαὶ κλασματικαὶ μονάδες.
 Ἰδιαιτέρως :

Τὸ $\frac{1}{10}$ λέγεται δεκαδικὴ κλασμ. μονὰς 1ης τάξεως

Τὸ $\frac{1}{100}$ » » » » 2ας »

Τὸ $\frac{1}{1000}$ » » » » 3ης » κ.ο.κ.

Τὰς ἀνωτέρω δεκαδικὰς κλασματικὰς μονάδας, δυνάμεθα νὰ τὰς γράψωμεν κατὰ τάξιν φθίνοντος μεγέθους ἔξ ἀριστέρων πρὸς τὰ δεξιὰ :

$$\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10.000} \dots \quad (1)$$

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι

$$10 \cdot \frac{1}{10.000} = \frac{1}{1000}, \quad 10 \cdot \frac{1}{1000} = \frac{1}{100}, \quad 10 \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{10}$$

Ἦτοι εἰς τὴν κλίμακα (1) ἐκάστη δεκαδικὴ κλασματικὴ μονὰς εἶναι δεκαπλασία ἀπὸ τὴν ἀμέσως ἐπομένην της (πρὸς τὰ δεξιὰ) καὶ ὑποδεκαπλασία ἀπὸ τὴν ἀμέσως προηγουμένην της (πρὸς τὰ ἀριστερά).

Ὡς ἐνθυμούμεθα δὲ καὶ ἡ δεκαδικὴ κλίμαξ

$$\dots 10000, 1000, 100, 10, 1 \quad (2)$$

ἔχει τὴν αὐτὴν ἰδιότητα,

$$1 \cdot 10 = 10, \quad 10 \cdot 10 = 100, \quad 10 \cdot 100 = 1000, \quad 10 \cdot 1000 = 10000$$

Ἄρα δυνάμεθα νὰ συνδυάσωμεν τὰς δύο αὐτὰς κλίμακας (1) καὶ (2), διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὴν ἀκόλουθον πλήρη κλίμακα τῶν ἀκεραίων καὶ τῶν δεκαδικῶν κλασματικῶν μονάδων κατὰ φθίνουσαν τάξιν μεγέθους ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ.

$$\dots 10.000, 1000, 100, 10, 1, \quad 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, \dots$$

$$\eta \dots 10^4, \quad 10^3, \quad 10^2, 10^1, 10^0, 1/10^1, 1/10^2, 1/10^3, \quad 1/10^4 \dots (3)$$

Καθὼς παρατηροῦμεν ἡ τελευταία αὕτη κλίμαξ εἶναι ἀπεριόριστος πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ.

79. 2. Δεκαδικὰ κλάσματα. Δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ.

Ἐκαστον κλάσμα τοῦ ὁποίου ὁ παρονομαστής εἶναι δύναμις τοῦ δέκα λέγεται δεκαδικὸν κλάσμα. Π.χ. τὰ κλάσματα

$$\frac{3}{10}, \frac{7}{100}, \frac{254}{1000}, \text{ εἶναι δεκαδικὰ κλάσματα.}$$

Μὲ τὴν βοήθειαν τῆς δεκαδικῆς κλίμακος (3) δυνάμεθα νὰ θέτωμεν τὰ δεκαδικὰ κλάσματα ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν. Π.χ. ὅπως ὁ ἀκέραιος 547 γράφεται

$$547 = 5 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 7$$

$$= 5 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

Ὅμοίως καὶ τὸ δεκαδικὸν κλάσμα 547/1000 γράφεται

$$\frac{547}{1000} = \frac{500+40+7}{1000} = \frac{500}{1000} + \frac{40}{1000} + \frac{7}{1000}$$

$$= \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{7}{1000} = 5 \cdot \frac{1}{10^1} + 4 \cdot \frac{1}{10^2} + 7 \cdot \frac{1}{10^3}$$

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἔχομεν :

$$135 \frac{24}{100} = \frac{13524}{100} = \frac{1 \cdot 10000 + 3 \cdot 1000 + 5 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 4}{100}$$

$$= \frac{1 \cdot 10000}{100} + \frac{3 \cdot 1000}{100} + \frac{5 \cdot 100}{100} + \frac{2 \cdot 10}{100} + \frac{4 \cdot 1}{100}$$

$$= 1 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 2 \cdot \frac{1}{10^1} + 4 \cdot \frac{1}{10^2} \quad (4)$$

Ἐπειδὴ δὲ εἰς ὁλόκληρον τὴν κλίμακα μονάδων 10 μονάδες μιᾶς τάξεως ἰσοδυναμοῦν μὲ μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, γράφομεν τὸ 2ον μέλος τῆς (4) ὡς ἑξῆς

$$135,24 \quad (5)$$

ὅπου ἡ ὑποδιαστολὴ χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν χωρὶς τὰς ἀκεραίας μονάδας ἀπὸ τὰς δεκαδικάς. Συγκεκριμένως: ἀριστερὰ τῆς ὑποδιαστολῆς εὐρίσκονται κατὰ σειράν τὰ ψηφία τῶν ἀκεραίων μονάδων, τῶν δεκάδων, τῶν ἑκατοντάδων ... δεξιὰ δὲ καὶ κατὰ σειράν τὰ ψηφία τῶν δεκάτων, τῶν ἑκατοστῶν ...

Ὅταν εἰς ρητὸς γράφεται ὑπὸ τὴν μορφήν (5), λέγεται δεκαδικὸς ἀριθμὸς*. Τὰ ψηφία τοῦ δεκαδικοῦ μέρους ἑνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ λέγονται δεκαδικὰ ψηφία αὐτοῦ.

79. 3. Παραδείγματα

$$\begin{aligned} \alpha) \quad \frac{3756}{10000} &= \frac{3000}{10000} + \frac{700}{10000} + \frac{50}{10000} + \frac{6}{10000} \\ &= \frac{3}{10} + \frac{7}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{6}{10000} \\ &= 3 \cdot \frac{1}{10^1} + 7 \cdot \frac{1}{10^2} + 5 \cdot \frac{1}{10^3} + 6 \cdot \frac{1}{10^4} \end{aligned}$$

$$\text{Ἦτοι:} \quad \frac{3756}{10000} = 0,3756 \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \beta) \quad \frac{30402}{1000} &= \frac{3 \cdot 10000}{1000} + \frac{0 \cdot 1000}{1000} + \frac{4 \cdot 100}{1000} + \frac{0 \cdot 10}{1000} + \frac{2 \cdot 1}{1000} \\ &= 3 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0 + 4 \cdot \frac{1}{10^1} + 0 \cdot \frac{1}{10^2} + 2 \cdot \frac{1}{10^3} \end{aligned}$$

(Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν ἑκατοστὰ ἐθέσαμεν εἰς τὴν θέσιν των 0.)

$$\text{Ἦτοι} \quad \frac{30402}{1000} = 30,402 \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \gamma) \quad \frac{342}{10000} &= \frac{300+40+2}{10000} = \frac{300}{10000} + \frac{40}{10000} + \frac{2}{10000} \\ &= 3 \cdot \frac{1}{10^3} + 4 \cdot \frac{1}{10^4} + 2 \cdot \frac{1}{10^4} \end{aligned}$$

* Πρὸκειται περὶ μιᾶς ἄλλης, ἀπλουστερας γραφῆς ἑνὸς ρητοῦ ἀριθμοῦ.

$$\text{Ἦτοι} \quad \frac{342}{10000} = 0,0342 \quad (8)$$

Ἀντιστρόφως: εἷς δεκαδικὸς ἀριθμὸς π.χ. ὁ δεκαδικὸς 3,02, γράφεται ὑπὸ μορφήν κλάσματος ὡς ἑξῆς:

$$\begin{aligned} 3,02 &= 3 + 0,02 = 3 + 0 \cdot \frac{1}{10^1} + 2 \cdot \frac{1}{10^2} \\ &= \frac{3 \cdot 10^2}{10^2} + \frac{0 \cdot 10^1}{10^2} + \frac{2 \cdot 1}{10^2} \\ &= \frac{3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2}{10^2} = \frac{302}{100} \end{aligned}$$

$$\text{Ἦτοι} \quad 3,02 = \frac{302}{100} \quad (9)$$

Ἀπὸ τὰς ἰσότητας (6), (7), (8) καὶ (9) ἐννοοῦμεν τοὺς ἑξῆς κανόνας.

1. Διὰ νὰ γράψωμεν ἓν δεκαδικὸν κλάσμα ὑπὸ μορφήν δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ, γράφομεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος καὶ χωρίζομεν ἐκ δεξιῶν τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα μηδενικά ἔχει ὁ παρονομαστής.

$$\text{Π.χ.} \quad \frac{349}{100} = 3,49 \quad \frac{28}{1000} = 0,028$$

2. Διὰ νὰ γράψωμεν ἓνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν ὑπὸ μορφήν δεκαδικοῦ κλάσματος παραλείπομεν τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ γράφομεν αὐτὸν ὡς ἀριθμητὴν κλάσματος μὲ παρονομαστὴν τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικά, ὅσα δεκαδικὰ ψηφία ἔχει οὗτος.

$$\text{Π.χ.} \quad 0,005 = \frac{5}{1000}, \quad 32,04 = \frac{3204}{100}$$

79. 4. Ἀπαγγελία δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ.

Διὰ νὰ ἀπαγγείλωμεν τὸν δεκαδικὸν 4,125 λέγομεν

τέσσαρα καὶ ἑκατὸν εἴκοσι πέντε χιλιοστά.

ἢ τέσσαρα ἀκέραιος, ἓν δέκατον, δύο ἑκατοστὰ καὶ πέντε χιλιοστὰ

ἢ τέσσαρες χιλιάδες, ἑκατὸν εἴκοσι πέντε χιλιοστὰ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

246. Γράψατε ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν τὰ κάτωθι δεκαδικὰ κλάσματα:

$$\frac{1}{10^5}, \quad \frac{23}{10^4}, \quad \frac{201}{100000}, \quad \frac{234}{10^2}$$

247. Γράψατε ὑπὸ μορφήν δεκαδικῶν κλασμάτων τοὺς κάτωθι δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς:

$$4,002, \quad 1,002, \quad 0,005, \quad 0,000104$$

80. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

80. 1. Έκ τῶν ἴσων κλασμάτων

$$\frac{24}{10} = \frac{240}{100} = \frac{2400}{1000} \dots$$

ἔχομεν

$$2,4 = 2,40 = 2,400 \dots$$

Παρατηροῦμεν δηλαδή ὅτι :

Ἐάν εἰς τὸ τέλος ἑνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ γράψωμεν ὁσαδήποτε μηδενικά ἢ ἔαν παραλείψωμεν ἀπὸ τὸ τέλος του ὅσα μηδενικά τυχὸν ὑπάρχουν, ἡ τιμὴ του δὲν μεταβάλλεται.

80. 2. Παρατηροῦμεν ἐπίσης ὅτι

$$\frac{245}{1000} \cdot 10 = \frac{245}{100}$$

$$\frac{245}{1000} \cdot 100 = \frac{245}{10}$$

$$\frac{245}{1000} \cdot 1000 = 245$$

$$\text{ἢ } 0,245 \cdot 10 = 2,45$$

$$0,245 \cdot 100 = 24,5$$

$$0,245 \cdot 1000 = 245$$

Ἦτοι : Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1000 ..., ἀρκεῖ νὰ μεταθέσωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ μίαν, δύο, τρεῖς... θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ ἀντιστοίχως.

Παρατηροῦμεν ἀκόμη ὅτι :

$$\frac{245}{1000} : 10 = \frac{245}{10000}$$

$$\frac{245}{1000} : 100 = \frac{245}{100000}$$

$$\text{Ἦ } 0,245 : 10 = 0,0245$$

$$0,245 : 100 = 0,00245$$

Ἦτοι : Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἕνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν διὰ 10, 100, 1000... ἀρκεῖ νὰ μεταθέσωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ μίαν, δύο, τρεῖς... θέσεις πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἀντιστοίχως.

Σημειώσεις

Ἐάν τὰ ὑπάρχοντα δεκαδικὰ ψηφία δὲν ἀρκοῦν, τὰ συμπληρώνομεν μὲ μηδενικά. Π.χ. $0,24 \cdot 1000 = 240$, $0,24 : 1000 = 0,00024$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

248. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ γινόμενα

$$4,002 \cdot 10, \quad 4,002 \cdot 100, \quad 4,002 \cdot 10^6$$

249. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ πηλικά

$$4,002 : 10, \quad 4,002 : 100, \quad 4,002 : 10^6$$

250. Συμπληρώσατε τὰς ἰσότητες

$$7,05 \cdot 10 = \dots \dots 100 = \dots \dots 1000$$



81. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

81. 1. Νά εύρεθῆ τὸ ἄθροισμα :

$$\chi = 13,45 + 12,7 + 0,3$$

Γράφομεν τοὺς δεκαδικούς ἀριθμούς ὑπὸ μορφήν δεκαδικῶν κλάσμάτων καὶ προσθέτομεν αὐτά.

$$13,45 + 12,7 + 0,3 = \frac{1345}{100} + \frac{127}{10} + \frac{3}{10} = \frac{1345}{100} + \frac{1270}{100} + \frac{30}{100} = \frac{1345 + 1270 + 30}{100}$$

Ἡ πρόσθεσις (I) δίδει τὸ ἄθροισμα εἰς τὸν ἀριθμητὴν τοῦ τελευταίου

κλάσματος. Ἄρα $\chi = \frac{2645}{100} = 26,45$

(I)	$\begin{array}{r} 1345 \\ 1270 \\ \underline{30} \\ 2645 \end{array}$	(II)	$\begin{array}{r} 13,45 \\ 12,7 \\ \underline{0,3} \\ 26,45 \end{array}$
-----	---	------	--

Τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα δίδει συντόμως καὶ ἡ πρόσθεσις (II).

Εἰς αὐτὴν αἱ ὑποδιαστολαί, ἄρα καὶ τὰ ψηφία τῆς αὐτῆς τάξεως, εὐρίσκονται εἰς τὴν ἴδιαν στήλην. Ἐκ τούτου ὀδηγούμενοι συνάγομεν τὸν γνωστὸν κανόνα προσθέσεως δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

82. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Νά εύρεθῆ ἡ διαφορά $\delta = 31,4 - 8,32$

Ἔργαζόμενοι ὡς ἀνωτέρω, ἔχομεν

$$31,4 - 8,32 = \frac{314}{10} - \frac{832}{100} = \frac{3140}{100} - \frac{832}{100} = \frac{3140 - 832}{100}$$

Ἀπὸ τὴν ἀφαίρεσιν (I) ἔχομεν τὴν διαφοράν εἰς τὸν ἀριθμητὴν τοῦ τελευταίου κλάσματος.

Ἄρα $\delta = \frac{2308}{100} = 23,08$

(I)	$\begin{array}{r} 3140 \\ - 832 \\ \hline 2308 \end{array}$	(II)	$\begin{array}{r} 31,40 \\ - 8,32 \\ \hline 23,08 \end{array}$
-----	---	------	--

Εἰς τὸ ἴδιον ἀποτέλεσμα φθάνομεν συντόμως καὶ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν (II). Ἐξ αὐτῆς συνάγομεν τὸν γνωστὸν κανόνα ἀφαιρέσεως δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

Σκόπιμον εἶναι νὰ συμπληρώνομεν τὰ ἐλλείποντα δεκαδικὰ ψηφία τῶν ἀριθμῶν μετὰ μηδενικά διὰ νὰ ἀποφεύγονται λάθη.

83. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ἄς εὔρωμεν τὸ γινόμενον $\chi = 15,32 \cdot 3,4$
 Δυνάμεθα νὰ γράψωμεν

$$\chi = \frac{1532}{100} \cdot \frac{34}{10} = \frac{1532 \cdot 34}{100 \cdot 10} = \frac{52088}{1000} = 52,088$$

Παρατηροῦμεν ὅτι

α) Ὁ ἀριθμητὴς τοῦ κλάσματος $52088/1000$ προκύπτει ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δοθέντας δεκαδικούς, ὡς ἐὰν ἦσαν ἀκέραιοι.

β) Ὁ παρανομαστὴς ὀρίζει ὅτι θὰ χωρίσωμεν τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουν ὁμοῦ καὶ οἱ δύο παράγοντες.

Ὡστε: **Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικούς ἀριθμούς, πολλαπλασιάζομεν αὐτούς ὡς ἐὰν ἦσαν ἀκέραιοι καὶ εἰς τὸ γινόμενον χωρίζομεν ἀπὸ δεξιά τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες ὁμοῦ.**

Ἡ διάταξις τῆς πράξεως γίνεται ὡς κατωτέρω

$\begin{array}{r} 15,32 \\ \times 3,4 \\ \hline 6128 \\ 4596 \\ \hline 52,088 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2,35 \\ \times 6 \\ \hline 14,10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0,67 \\ \times 3,2 \\ \hline 134 \\ 201 \\ \hline 2,144 \end{array}$
--	---	--

Γενικὴ παρατήρησις

Καθὼς εἶδομεν οἱ δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι δεκαδικὰ κλάσματα γραμμένα ὑπὸ ἄλλην μορφήν. Διὰ τοῦτο ὅλαι αἱ ιδιότητες τῶν ρητῶν ἀριθμῶν, τὰς ὁποίας εἶδομεν εἰς τὴν πρόσθεσιν, ἀφαίρεσιν καὶ πολλαπλασιασμόν ἰσχύουν καὶ δι' αὐτούς. Π.χ. ἡ πρόσθεσις δεκαδικῶν εἶναι μεταθετικὴ καὶ προσεταιριστικὴ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

251. Νὰ εὔρετε τὰ ἀθροίσματα :
- 1) $28,3 + 0,625$ 11) $6,25 + 47,4 + 175,803$
252. Νὰ εὔρεθοῦν αἱ διαφοραὶ :
- 1) $0,84 - 0,76$ 11) $12 - 0,075$ 111) $135,1 - 37,803$
253. Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ πολλαπλασιασμοί :
- 1) $3,45 \cdot 0,37$ 11) $101,11 \cdot 31,9$ 111) $0,01^3 \cdot 0,02$
254. Χρησιμοποιήσατε γνωστὴν ιδιότητα διὰ νὰ ὑπολογίσετε συντόμως τὰς ἀριθμητικὰς παραστάσεις :
- 1) $9,1 \cdot 72,65 + 0,9 \cdot 72,65$
 11) $81,2 \cdot 0,48 - 81,2 \cdot 13,42$

255. Νά υπολογισθῆ με δύο τρόπους ἡ ἀριθμητικὴ παράστασις

$$8,12 - (0,385 - 0,03)$$

256. Ἐν πεντάδραχμον ἔχει πᾶχος 1,5 cm. Πόσον ὕψος ἔχει μία στήλη ἀπὸ 35 πεντάδραχμα, 1) εἰς dm καὶ 1) εἰς cm. Πόσον ὕψος ἔχουν τὰ 0,75 τῆς στήλης, εἰς cm;

84. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

84. 1. Ὁ διαιρέτης εἶναι ἀκέραιος

α) Ἄς προσέξωμεν τὴν διαίρεσιν 8,55:3

Δυνάμεθα νὰ γράψωμεν

$$8,55:3 = \frac{855}{100} : 3 = \frac{855:3}{100} = \frac{285}{100} = 2,85$$

Εὐρίσκομεν συντόμως τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα κατὰ τὴν γνωστὴν παραπλεύρως διάταξιν.

$$\begin{array}{r|l} 8,55 & 3 \\ 25 & 2,85 \\ 15 & \\ 0 & \end{array}$$

Εἰς τὴν διάταξιν αὐτὴν, ὅταν δεξιὰ τοῦ πρώτου ὑπολοίπου 2 τοποθετοῦμεν τὸ 5, σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς 25, ὁ ὁποῖος σημαίνει πλεόν δέκατα ($2,5 = \frac{25}{10}$). Ἐπομένως καὶ τὸ δεύτερον ψηφίον τοῦ πηλίκου θὰ εἶναι δέκατα. Διὰ τοῦτο καὶ ἐθέσαμεν πρὸ αὐτοῦ ὑποδιαστολὴν.

Ὅμοίως, τὸ νέον ὑπόλοιπον εἶναι ἑκατοστά. $0,15 = \frac{15}{100}$.

Ἐπομένως καὶ τὸ νέον ψηφίον τοῦ πηλίκου θὰ εἶναι ἑκατοστά κ.ο.κ.

Ὡστε: **Διὰ νὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν δι' ἀκέραιου, διαιροῦμεν αὐτοὺς ὡς ἐὰν ἦσαν ἀκέραιοι, θέτομεν δὲ εἰς τὸ πηλίκον ὑποδιαστολὴν ἀμέσως μόλις τελειώσει ἡ διαίρεσις τοῦ ἀκέραιου μέρους.**

β) Ἄς προσέξωμεν τὴν διαίρεσιν 2,3:3.

Δυνάμεθα πάλιν νὰ γράψωμεν

$$2,3:3 = \frac{23}{10} : 3 = \frac{23}{30}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{23}{30}$ εἶναι ἀνάγωγον καὶ ὁ παρονομαστής του δὲν εἶναι, οὔτε δύναται νὰ γίνῃ δύναμις τοῦ 10. (Τὸ 23 δὲν διαιρεῖται διὰ 3).

Ἦτοι τὸ κλάσμα $\frac{23}{3 \cdot 10} = \frac{23}{30}$ δὲν εἶναι δεκαδικὸν κλάσμα· ἄρα καὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2,3:3.

Ὡστε : τὸ πηλίκον ἐνὸς δεκαδικοῦ δι' ἀκεραίου δὲν εἶναι πάντοτε δεκαδικὸν κλάσμα.

Τὶ ὅμως θὰ λάβωμεν ὡς πηλίκον εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν;

Δυνάμεθα :

1) Νὰ λάβωμεν τὸ κλάσμα $23/30$ ὡς τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 2,3 διὰ 3.

2) Νὰ εὕρωμεν τὸ πηλίκον κατὰ προσέγγισιν μὲ τὸν ἐξῆς τρόπον.

Ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν, ὡς εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα.

$$2,3 \begin{array}{r} 3 \\ 2 \overline{) 0,7} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Ἡ διαίρεσις ἀφήνει ὑπόλοιπον } 0,2 = \frac{2}{10}. \text{ Ἥτοι τὸ ἀκρι-} \\ \text{βὲς πηλίκον εἶναι : } 0,7 \text{ καὶ } \frac{2}{3} \text{ τοῦ δεκάτου. Ἐὰν συνεπῶς} \end{array}$$

παραλείψωμεν τὸ ὑπόλοιπον καὶ λάβωμεν ὡς πηλίκον τὸ 0,7 κάνομεν λάθος.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ λάθος αὐτὸ εἶναι μικρότερον τοῦ ἐνὸς δεκάτου.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ 0,7 εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως κατὰ προσέγγισιν δεκάτου.

Ἐπειδὴ εἶναι καὶ μικρότερον τοῦ πραγματικοῦ, ὀνομάζεται πηλίκον κατὰ προσέγγισιν δεκάτου κατ' ἔλλειψιν. Ἐὰν ἀντὶ νὰ παραλείψωμεν τὸ ὑπόλοιπον $2/3$ τοῦ δεκάτου, τὸ ὁποῖον εἶναι μεγαλύτερον τοῦ ἡμίσεως δεκάτου, τὸ κάνωμεν ἐν δέκατον καὶ τὸ προσθέτωμεν εἰς τὸ 0,7, θὰ ἔχωμεν ὡς πηλίκον 0,8. Τὸ πηλίκον τώρα εἶναι μεγαλύτερον τοῦ ἀληθοῦς πηλίκου κατὰ $1/3$ τοῦ δεκάτου. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι τὸ πηλίκον εὐρέθη κατὰ προσέγγισιν δεκάτου καθ' ὑπεροχήν.

Ἐφ' ὅσον θελήσωμεν μεγαλυτέραν προσέγγισιν δυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν τὴν διαίρεσιν καὶ νὰ εὕρωμεν, πηλίκον κατὰ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ, χιλιοστοῦ κ.ο.κ. ὡς κατωτέρω :

Προσέγγισις ἑκατοστοῦ

$$2,3 \begin{array}{r} 3 \\ 20 \overline{) 0,76} \\ 2 \end{array}$$

Κατ' ἔλλειψιν : 0,76

Καθ' ὑπεροχήν : 0,77

Προσέγγισις χιλιοστοῦ

$$2,3 \begin{array}{r} 3 \\ 20 \overline{) 0,766} \\ 20 \overline{) 0,766} \\ 2 \end{array}$$

Κατ' ἔλλειψιν : 0,766

Καθ' ὑπεροχήν : 0,767

Παρατηροῦμεν ἐπὶ πλέον ὅτι : τὸ ἑκάστοτε νέον ὑπόλοιπον εἶναι πάντοτε 2. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅσον καὶ ἂν συνεχίσωμεν τὴν διαίρεσιν δὲν θὰ τελειώσῃ αὕτη ποτὲ καὶ ὅτι εἰς τὸ πηλίκον θὰ εὐρίσκωμεν διαρκῶς τὸ αὐτὸ ψηφίον 6.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 2, 3 διὰ 3 ἢ τὸ κλάσμα $23/30$ δὲν δύναται νὰ λάβῃ τερματιζομένην δεκαδικὴν μορφήν. Διὰ νὰ δηλώσωμεν δὲ τοῦτο γράφομεν, $\frac{23}{30} = 0,766 \dots$

84. 2. Διαιρέτης δεκαδικός αριθμός

*Εστω πρὸς ἐκτέλεσιν ἡ διαιρέσις $0,45:1,5$

Ἡ περίπτωση αὐτὴ ἀνάγεται εἰς τὴν διαιρέσιν μὲ διαιρέτην ἀκέραιον. Πράγματι: $0,45:1,5=4,5:15=0,3$ (πολλαπλασιασμός ἐπὶ 10).

Ὁμοίως τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 49 διὰ 0,72 εὐρίσκεται ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρέσιν 4900 διὰ 72 (πολλαπλασιασμός ἐπὶ 100). Ἡ διαιρέσις αὕτη εἶναι ἀτελής. Τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀρχικῆς διαιρέσεως δὲν εἶναι 4, ἀλλὰ $\frac{4}{100}$. Διατί;

$$\begin{array}{r|l} 4900 & 72 \\ 580 & 68 \\ \hline & 4 \end{array}$$

Σημείωσις

Δυνάμεθα πάντοτε νὰ τρέπωμεν τοὺς δεκαδικούς διαιρέτας εἰς δεκαδικὰ κλάσματα ὁπότε ἐκτελοῦμεν διαιρέσιν διὰ κλάσματος.

85. ΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ

Γνωρίζομεν ὅτι ἕκαστον κλάσμα παριστάνει τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρανομαστοῦ του. Διὰ νὰ τὸ τρέψωμεν εἰς δεκαδικὸν ἐκτελοῦμεν τὴν διαιρέσιν αὐτήν. Π.χ. διὰ τὰ κλάσματα

$$\frac{3}{5}, \quad \frac{7}{8}, \quad \frac{7}{6} \quad \text{ἔχομεν:}$$

$$\begin{array}{r|l} 30 & 5 \\ 0 & 0,6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 70 & 8 \\ 60 & 0,875 \\ 40 & \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 7 & 6 \\ 10 & 1,166 \\ 40 & \\ 40 & \\ 4 & \end{array}$$

*Ἦτοι $\frac{3}{5} = 0,6$

$\frac{7}{8} = 0,875$

$\frac{7}{6} = 1,166 \dots$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ κλάσματα $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{8}$, τρέπονται εἰς τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς ἐνῶ τὸ κλάσμα $\frac{7}{6}$ εἶναι ἀδύνατον νὰ λάβῃ τερματιζομένην δεκαδικὴν μορφήν.

86. ΠΟΙΑ ΑΝΑΓΩΓΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Εἶδομεν ἀνωτέρω ὅτι ὠρισμένα κλάσματα τρέπονται εἰς τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς ἐνῶ ἄλλα δὲν τρέπονται. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Δυνά-

μεθα να διακρίνωμεν, πρὶν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, ἂν ἓν κλάσμα τρέπεται εἰς τερματιζόμενον δεκαδικὸν ἀριθμὸν;

Εἰς τὴν ἀπάντησιν θὰ ὀδηγηθῶμεν ἀπὸ τὰς ἐξῆς παρατηρήσεις :

α) Ἐὰν λάβωμεν τοὺς τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς 0,4, 0,15, 0,625 καὶ ἂς εὕρωμεν τὰ δεκαδικὰ κλάσματα εἰς τὰ ὁποῖα τρέπονται οὗτοι. Ἔχομεν :

$$0,4 = \frac{4}{10}, \quad 0,15 = \frac{15}{100}, \quad 0,625 = \frac{625}{1000}$$

Μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν, ὥστε νὰ καταστοῦν ταῦτα ἀνάγωγα, ἔχομεν :

$$\frac{4}{10} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot 5} = \frac{2}{5}, \quad \frac{15}{100} = \frac{3 \cdot 5}{2^2 \cdot 5^2} = \frac{3}{2^2 \cdot 5}, \quad \frac{625}{1000} = \frac{5^4}{2^3 \cdot 5^3} = \frac{5}{2^3}.$$

Παρατηροῦμεν ὅτι :

Τὰ ἀνάγωγα κλάσματα, εἰς τὰ ὁποῖα τρέπονται οἱ ἀνωτέρω δεκαδικοί, ἔχουν παρονομαστὰς μόνον δυνάμεις τῶν ἀριθμῶν 2 καὶ 5 ἢ μόνον τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν.

β) Ἐὰν λάβωμεν ἀνάγωγα κλάσματα, π.χ. τὰ $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{9}{20}$, τῶν ὁποίων οἱ παρονομασταὶ οὐδένα πρῶτον παράγοντα διαφορετικὸν ἀπὸ τοὺς 2 καὶ 5 περιέχουν.

Ἔχομεν :

$$\frac{1}{2} = \frac{5 \cdot 1}{5 \cdot 2} = \frac{5}{10} = 0,5 \quad \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10} = 0,6 \quad \frac{9}{20} = \frac{5 \cdot 9}{5 \cdot 20} = 0,45$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ κλάσματα δίδουν τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων ἐννοοῦμεν ὅτι :

Διὰ νὰ τρέπεται ἓν ἀνάγωγον κλάσμα εἰς τερματιζόμενον δεκαδικὸν ἀριθμὸν πρέπει καὶ ἀρκεῖ, ὁ παρονομαστής του, ἀναλελυμένος εἰς γινόμενον πρῶτων παραγόντων, νὰ ἔχη ὡς μόνους πρῶτους παράγοντας τοὺς 2 καὶ 5 ἢ τὸν ἓνα ἐξ αὐτῶν.

Παράδειγμα

Τὸ ἀνάγωγον κλάσμα $\frac{147}{40}$ τρέπεται εἰς τερματιζόμενον δεκαδικὸν, διότι ὁ παρονομαστής του, $40 = 2^3 \cdot 5$, ἔχει ὡς μόνους πρῶτους παράγοντας τοὺς 2 καὶ 5. Ἀντιθέτως τὸ κλάσμα $\frac{2}{35}$ δὲν τρέπεται, διότι ὁ παρονομαστής του, $35 = 5 \cdot 7$, ἔχει ὡς πρῶτον παράγοντα καὶ τὸ 7.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

257. Νά επιλυθούν αι εξισώσεις :

α) $5 \cdot \chi = 0,0125$

β) $12 \cdot \chi = 0,0144$

258. Νά τραπούν εις δεκαδικούς τὰ κλάσματα :

$\frac{1}{8}$, $\frac{3}{25}$, $\frac{7}{2^2 \cdot 5^3}$, $\frac{9}{2^2 \cdot 5}$

259. Νά εκτελεσθούν αι πράξεις :

i) $\frac{3}{8} - 0,07$

ii) $\frac{3}{5} \cdot 0,75$

iii) $0,225:5$

260. Νά εύρετε με προσέγγισιν εκατοστοῦ τὰ πηλικά τῶν διαιρέσεων :

i) $10:28$

ii) $6,4:3$

261. Ποία ἀπό τὰ κάτωθι κλάσματα τρέπονται εις τερματιζομένους δεκαδικούς :

$\frac{3}{5}$, $\frac{11}{50}$, $\frac{7}{15}$, $\frac{6}{48}$, $\frac{9}{32}$, $\frac{718}{325}$

262. Νά γράψετε τὸ σύνολον τῶν κλασματικῶν μονάδων με παρανομαστήν μικρότερον τοῦ 20, αι ὁποῖαι τρέπονται εις τερματιζομένους δεκαδικούς.

87. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ἐκ τῶν παρονομαστῶν τῶν ἀναγῶγων κλασμάτων $\frac{2}{3}$, $\frac{9}{11}$, $\frac{1}{12}$

διακρίνομεν ὅτι ταῦτα δὲν τρέπονται εις τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς.

*Ἄς προσέξωμεν τὰ πηλικά τῶν διαιρέσεων 2:3, 9:11 καὶ 1:12.

$\begin{array}{r} 20 \\ 20 \\ 20 \\ 20 \\ 2 \\ \dots \\ \dots \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ \hline 0,666\dots \end{array}$	$\begin{array}{r} 90 \\ 20 \\ 90 \\ 20 \\ 9 \\ \dots \\ \dots \end{array}$	$\begin{array}{r} 11 \\ \hline 0,8181\dots \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 40 \\ 40 \\ 4 \\ \dots \\ \dots \end{array}$	$\begin{array}{r} 12 \\ \hline 0,0833\dots \end{array}$
--	---	--	---	---	---

Διακρίνομεν ὅτι τὰ ψηφία ἐκάστου πηλίκου ἐπαναλαμβάνονται ἀπεριορίστως, τὰ αὐτὰ καὶ με τὴν ἰδίαν σειρὰν διαδοχῆς. (Διατί;) Ἐπαναλαμβάνονται, ὅπως λέγομεν, περιοδικῶς.

Διὰ τοῦτο οἱ ἀριθμοὶ :

$0,666\dots$, $0,8181\dots$, $0,08333\dots$

λέγονται περιοδικοὶ δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ.

Τὸ τμήμα τοῦ δεκαδικοῦ μέρους, τὸ ὁποῖον ἐπαναλαμβάνεται λέγεται περίοδος.

Π.χ.	τοῦ ἀριθμοῦ	0, 666 ...	περίοδος εἶναι	6
	»	»	0,8181 ...	»
	»	»	0,0833 ...	»
				81
				3

Εἰς τοὺς περιοδικούς ἀριθμούς 0,666... καὶ 0,8181... παρατηροῦμεν ὅτι ἡ περίοδος ἀρχίζει ἀμέσως μετὰ τὴν ὑποδιαστολήν. Διὰ τοῦτο οὗτοι λέγονται ἀπλοὶ περιοδικοί. Εἰς τὸν δεκαδικὸν 0,0833... ἡ περίοδος ἀρχίζει μετὰ ἀπὸ δύο δεκαδικὰ ψηφία. Ἦτοι τὸ δεκαδικὸν μέρος αὐτοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν περιοδικὸν τμήμα καὶ ἀπὸ ἓν μὴ περιοδικόν. Διὰ τοῦτο οὗτος λέγεται μεικτὸς περιοδικός.

$$\text{Ἀπὸ τὰς ἰσότητας: } \frac{4}{10} = 0,4 = 0,4000\dots, \quad \frac{25}{100} = 0,25 = 0,25000\dots$$

Εἶναι εὐκόλον νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι καὶ ἕκαστον κλάσμα τὸ ὁποῖον τρέπεται εἰς τερματιζόμενον δεκαδικὸν δύναται νὰ λάβῃ μορφήν περιοδικοῦ ἀριθμοῦ. Ἄρκει νὰ θεωρήσωμεν ὡς περίοδόν του τὸ 0.

Δυνάμεθα λοιπὸν γενικῶς νὰ εἴπωμεν ὅτι:

Ἐκαστος ρητὸς ἀριθμὸς δύναται νὰ τεθῆ ὑπὸ μορφήν δεκαδικοῦ περιοδικοῦ ἀριθμοῦ ἢ ὅπως λέγομεν ἔχει ἓν δεκαδικὸν περιοδικὸν ἀνάπτυγμα.

Ἀντιστρόφως:

Ἐκαστος περιοδικὸς ἀριθμὸς παριστάνει ἓνα ρητὸν, τὸν ὁποῖον δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν.

Διακρίνομεν πρὸς τοῦτο τὰς ἐξῆς περιπτώσεις:

α) Ὁ περιοδικὸς ἀριθμὸς εἶναι ἀπλοῦς: π.χ. ὁ 0,777...

Ἐὰν ὀνομάσωμεν μὲ x τὸν ζητούμενον ρητὸν ἀριθμὸν, θὰ ἔχωμεν τὴν ἰσότητα:

$$x = 0,777\dots \quad (1)$$

ι) Πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη τῆς (1) ἐπὶ 10 $\rightarrow 10 \cdot x = 7,77\dots \quad (2)$

ii) Ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς (2)

τοὺς ἴσους ἀριθμούς x καὶ 0,777...

$$\begin{array}{r} \rightarrow \frac{x = 0,777\dots}{\text{Διαφορὰ} \quad 9 \cdot x = 7} \end{array}$$

$$\text{Ἄρα} \quad x = \frac{7}{9} \quad \text{ἢ} \quad 0,777\dots = \frac{7}{9}$$

Ὅμοίως διὰ τὸν περιοδικὸν ἀριθμὸν $x = 0,636363\dots \quad (3)$

ι) Πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 100 τὰ μέλη τῆς (3) $100 \cdot x = 63,6363\dots \quad (4)$

ii) Ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς (4)

τοὺς ἴσους ἀριθμούς x καὶ 0,636363...

$$x = 0,636363\dots$$

$$\text{Διαφορὰ} \quad 99 \cdot x = 63$$

$$\text{ἢ} \quad x = \frac{63}{99}$$

265) Είς τὸ σύνολον $A = \left\{ \frac{2}{5}, \frac{1}{7}, \frac{3}{12}, \frac{5}{8}, \frac{15}{45}, \frac{4}{40} \right\}$. ποῖον εἶναι τὸ ὑποσύνολον

κλασμάτων, τὰ ὅποια τρέπονται εἰς δεκαδικούς περιοδικούς ἀριθμούς :


266. Δείξατε ὅτι τὸ κλάσμα : $\frac{\frac{1}{5} - 0,1}{\frac{1}{5} + 0,1}$ τρέπεται εἰς ἀπλοῦν περιοδικόν.

267. Νὰ ἐκτελέσετε τὰς πράξεις :

i) $\frac{5}{6} + 2,353535 \dots$ ii) $0,7272 \dots - 0,444 \dots$

88. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΥΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

88. 1. Ὡς γνωστόν, ἐάν δοθῇ ἓν εὐθ. τμήμα AB καὶ εἰς ρητὸς $\lambda \neq 0$, δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν ἓν ἄλλο εὐθύγραμμον τμήμα ἴσον πρὸς τὸ γινόμενον $\lambda \cdot AB$. Π.χ. ἐάν δοθῇ ἓν εὐθύγραμμον τμήμα AB καὶ ὁ ρητὸς $3/4$, δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν εὐθ. τμήμα $\Gamma\Delta = 3/4 \cdot AB$



Σχ. 33

Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ χωρίσωμεν τὸ AB εἰς 4 ἴσα τμήματα καὶ νὰ λάβωμεν ἓν τμήμα ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα ἐκ τριῶν αὐτῶν. Τοιοῦτοτρόπως εἰς τὸ σχ. 33 ἔχομεν $\Gamma\Delta = \frac{3}{4} \cdot AB$

Ὁ ρητὸς $\frac{3}{4}$ λέγεται λόγος τοῦ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ AB· γράφομεν δὲ $\frac{\Gamma\Delta}{AB} = \frac{3}{4}$.

Ὡστε $\frac{\Gamma\Delta}{AB} = \frac{3}{4}$ σημαίνει ὅτι $\Gamma\Delta = \frac{3}{4} \cdot AB$

$$\frac{\Gamma\Delta}{AB} = \frac{3}{4} \iff \Gamma\Delta = \frac{3}{4} \cdot AB$$

Συμφώνως πρὸς τ' ἀνωτέρω εἰς τὸ παραπλευρῶς σχ. 34 ὅπου ἐλάβομεν $AB = B\Gamma = \Gamma\Delta$ ἔχομεν

$$AB = \frac{1}{3} \cdot A\Delta \iff \frac{AB}{A\Delta} = \frac{1}{3}$$

$$AB = \frac{1}{2} \cdot A\Gamma \iff \frac{AB}{A\Gamma} = \frac{1}{2}$$

$$A\Gamma = \frac{2}{3} \cdot A\Delta \iff \frac{A\Gamma}{A\Delta} = \frac{2}{3}$$




Σχ. 34

88. 2. Ἐξετάσωμεν καὶ τὸ ἀντίστροφον πρόβλημα.

Ἦτοι: ἐὰν δοθοῦν δύο εὐθ. τμήματα, AB, ΓΔ, δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν τὸν λόγον τοῦ AB, πρὸς τὸ ΓΔ $\neq 0$;


1) Εἰς τὸ σχ. 35 τὸ τμήμα ΓΔ χωρεῖ ἀκριβῶς 4 φορές εἰς τὸ τμήμα AB.



Σχ. 35

Ἦτοι ἔχομεν $AB = 4 \cdot \Gamma\Delta \iff \frac{AB}{\Gamma\Delta} = 4$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ λόγος τοῦ AB πρὸς τὸ ΓΔ ἰσοῦται μὲ 4. Ἐὰν δὲ τὸ ΓΔ ληφθῆ ὡς μονὰς μετρήσεως τοῦ AB τότε ὁ ἀκέραιος 4 εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ AB.



Σχ. 36

2) Εἰς τὸ σχῆμα 36 τὸ ΓΔ δὲν χωρεῖ ἀκριβῶς n φορές ($n \in \mathbb{N}$) εἰς τὸ AB. Διὰ τοῦτο χωρίζομεν τὸ ΓΔ εἰς ἴσα μέρη, π.χ. εἰς 10 ἴσα μέρη. Ἐὰν ὀνομάσωμεν M τὸ ἓν ἀπὸ αὐτά, θὰ ἔχωμεν: $\Gamma\Delta = 10 \cdot M \iff M = \frac{1}{10} \cdot \Gamma\Delta$ (1)

Ἄς μετρήσωμεν ἤδη τὸ AB μὲ μονάδα τὸ M. Εἶναι δυνατὸν:


α) Ἡ μονὰς μετρήσεως M νὰ χωρῆ εἰς τὸ AB ἀκριβῶς n φορές ($n \in \mathbb{N}$) π.χ. 12 φορές ὅπως εἰς τὸ AB, σχ. 36.

Ἦτοι $AB = 12 \cdot M$ ἢ $AB = 12 \cdot \left(\frac{1}{10} \Gamma\Delta\right)$

ἢ $AB = \frac{12}{10} \cdot \Gamma\Delta \iff \frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{12}{10}$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ ρητὸς $\frac{12}{10} = 1,2$, εἶναι ὁ λόγος τοῦ AB πρὸς τὸ ΓΔ ἢ ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ AB μὲ μονάδα μετρήσεως τὸ ΓΔ.

β) Ἡ μονὰς μετρήσεως M νὰ μὴ χωρῆ ἀκριβῶς n φορές ($n \in \mathbb{N}$) εἰς τὸ AB, ὅπως π.χ. φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 37. ὅπου εἶναι $12 \cdot M < AB < 13 \cdot M$ (Διότι $EB < M$).



Σχ. 37

Ἦτοι $AB > \frac{12}{10} \cdot \Gamma\Delta$ καὶ $AB < \frac{13}{10} \cdot \Gamma\Delta$

ἢ $\frac{12}{10} < \frac{AB}{\Gamma\Delta} < \frac{13}{10}$

Καθώς βλέπομεν εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ λόγος τοῦ AB πρὸς τὸ ΓΔ εἶναι μόνον κατὰ προσέγγισιν (κατ' ἔλλειψιν) ἴσος πρὸς $\frac{12}{10} = 1,2$.

Ἦτοι ἡ ἀριθμ. τιμὴ τοῦ AB μὲ μονάδα μετρήσεως τὸ ΓΔ εἶναι κατὰ προσέγγισιν (κατ' ἔλλειψιν) ἴση πρὸς 1,2. Τὴν ἀνωτέρω προσέγγισιν δυνάμεθα νὰ τὴν κάνωμεν ὅσον θέλομεν μεγάλην. Ἄρκει πρὸς τοῦτο νὰ λάβωμεν ὡς μονάδα M 10 ἢ 100 ἢ 1000 . . . φορές μικροτέραν*.

88. 3. Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι $AB = 12 \cdot M$, $\Gamma\Delta = 10 \cdot M$ ὁπότε $AB/\Gamma\Delta = 12/10$, σχ. 36.

Ἐκ τῶν ἰσοτήτων αὐτῶν, ἂν προσέξωμεν ὅτι οἱ ρητοὶ 10 καὶ 12 εἶναι ἀντιοίχως αἱ ἀριθμητικαὶ τιμαὶ τῶν τμημάτων ΓΔ καὶ AB μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα μετρήσεως M,

ἔχομεν

$$\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{12}{10} = \frac{\text{Ἀριθ. τιμὴ τοῦ AB μὲ μονάδα M}}{\text{Ἀριθ. τιμὴ τοῦ ΓΔ μὲ μονάδα M}}$$

Ἦτοι: Ὁ λόγος ἑνὸς εὐθ. τμήματος πρὸς ἓν ἄλλο εἶναι ἴσος πρὸς τὸν λόγον τῆς ἀριθμ. τιμῆς τοῦ πρώτου πρὸς τὴν ἀριθμ. τιμὴν τοῦ δευτέρου, ἂν μετρηθοῦν μὲ τὴν ἰδίαν μονάδα καὶ τὰ δύο.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{\alpha \cdot M}{\beta \cdot M} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{\alpha}{\beta}$$

Σημειώνομεν ὅτι ὁ ἀνωτέρω λόγος εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὴν μονάδα τὴν ὁποίαν θὰ χρησιμοποιήσωμεν διὰ τὴν μέτρησιν τῶν δύο αὐτῶν τμημάτων.

Π.χ. ἂν εἶναι $AB = 40$ cm καὶ $\Gamma\Delta = 50$ cm.

ὁπότε $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{40}{50}$, τότε θὰ εἶναι $AB = 0,4$ m, $\Gamma\Delta = 0,5$ m καὶ $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{0,4}{0,5} = \frac{40}{50}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

268. Χαράξατε ἓν εὐθ. τμήμα M καὶ ἔπειτα τρία ἄλλα τμήματα A, B, Γ τοιαῦτα ὥστε :

$$\frac{A}{M} = 2, \quad \frac{B}{M} = 2,5, \quad \frac{\Gamma}{M} = 3.$$

269. Τρία εὐθ. τμήματα A, B, Γ ἐμετρήθησαν μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα M καὶ αἱ τιμαὶ τῶν ἦσαν αἱ ἑξῆς :

$$A = \frac{3}{4} \cdot M, \quad B = 5 \cdot M, \quad \Gamma = 2 \cdot M$$

Νὰ εὑρεθοῦν οἱ λόγοι: $\frac{A}{M}, \frac{M}{A}, \frac{A}{B}, \frac{A}{\Gamma}, \frac{B}{\Gamma}$.

* Ὑπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ὅσονδήποτε μικρὰν κι ἂν λάβωμεν τὴν μονάδα M, ἡ ἀκριβὴς τιμὴ τοῦ λόγου $AB/\Gamma\Delta$ δὲν εἶναι ρητὸς ἀριθμὸς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

89. ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

89. 1. Όρισμός

Ός γνωστόν αἱ μονάδες μετρήσεως τόξων, γωνιῶν, χρόνου, δὲν ἔχουν δεκαδικὰς ὑποδιαίρεσεις.

$$1^{\circ} = 60', \quad 1' = 60'', \quad 1 \text{ h} = 60 \text{ min}, \quad 1 \text{ min} = 60 \text{ sec.}$$

Συνεπῶς ὅταν μετρήσωμεν μίαν γωνίαν ἢ ἓν τόξον ἢ ἓν χρονικὸν διάστημα μὲ τὰς μονάδας αὐτάς, εἶναι πιθανὸν νὰ εὔρωμεν τιμὰς συγκεκριμένους ἀριθμούς ὅπως π.χ. $30^{\circ} 20' 10''$ ἢ $2 \text{ h } 10 \text{ min } 5 \text{ sec.}$

Οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἄλλους συγκεκριμένους τῶν ὁποίων οἱ μονάδες εἶναι πολλαπλάσια ἢ ὑποπολλαπλάσια τῆς αὐτῆς ἀρχικῆς μονάδος. Διὰ τοῦτο λέγονται συμμιγεῖς ἀριθμοί.

Τοὺς ἕως τώρα γνωστοὺς μας ἀριθμούς διὰ νὰ τοὺς διακρίνωμεν ἀπὸ τοὺς συμμιγεῖς θὰ τοὺς λέγωμεν ἀπλοῦς ἀριθμούς.

89. 2. Τροπὴ συμμιγοῦς ἀριθμοῦ εἰς ἀπλοῦν

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς γωνίας $10^{\circ} 20' 12''$ εἰς δευτέρα λεπτά σκεπτόμεθα ὅτι :

$$\alpha) 1^{\circ} = 60' \quad \text{Ἄρα } 10^{\circ} = 10 \cdot 60' = 600'$$

$$\beta) 1' = 60'' \quad \text{Ἄρα } 600' + 20' = 620', \quad 620' = 620 \cdot 60'' = 37200''$$

$$\gamma) 37200'' + 12'' = 37212''$$

$$\text{Ἦτοι :} \quad 10^{\circ} 20' 12'' = 37212''$$

Ὅμοίως διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν χρόνον $1 \text{ h } 20 \text{ min } 15 \text{ sec}$ εἰς δευτερόλεπτα (sec) σκεπτόμεθα ὅτι :

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}, \quad 1 \text{ min} = 60 \text{ sec}$$

$$\text{Ἄρα :} \quad 60 \text{ min} + 20 \text{ min} = 80 \text{ min}, \quad 80 \text{ min} = 80 \cdot 60 \text{ sec} = 4800 \text{ sec.}$$

$$4800 \text{ sec} + 15 \text{ sec} = 4815 \text{ sec.}$$

$$\text{Ἦτοι :} \quad 1 \text{ h } 20 \text{ min } 15 \text{ sec} = 4815 \text{ sec.}$$

89. 3. Τροπὴ συμμιγοῦς εἰς μονάδας μιᾶς τάξεως αὐτοῦ

Διὰ νὰ τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ $2 \text{ h } 10 \text{ min } 45 \text{ sec}$ εἰς πρῶτα λεπτά (min) σκεπτόμεθα ὅτι

$$2 \text{ h} = 2 \cdot 60 \text{ min} = 120 \text{ min}, \quad 45 \text{ sec} = \frac{45}{60} \text{ min} = 0,75 \text{ min}$$

$$\text{Άρα: } 2 \text{ h } 10 \text{ min } 45 \text{ sec} = 120 \text{ min} + 10 \text{ min} + 0,75 \text{ min} \\ = 130,75 \text{ min.}$$

Θά ήτο όμως δυνατόν νά τρέψωμεν πρώτα τόν συμμαγιή εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως (sec) καί ἔπειτα νά τρέψωμεν αὐτάς εἰς πρώτα λεπτά (min).

$$\alpha) 2 \text{ h} = 120 \text{ min}, \quad 120 \text{ min} + 10 \text{ min} = 130 \text{ min.}$$

$$130 \text{ min} = 130 \cdot 60 \text{ sec} = 7800 \text{ sec} \quad 7800 \text{ sec} + 45 \text{ sec} = 7845 \text{ sec.}$$

$$\beta) 7845 \text{ sec} : 60 = 130,75 \text{ min.}$$

$$\text{Ἦτοι: } \quad 2 \text{ h. } 10 \text{ min } 45 \text{ sec} = 130,75 \text{ min.}$$

89. 4. Τροπή ἀπλοῦ συγκεκριμένου ἀριθμοῦ εἰς συμμαγιή

Εἶναι φανερόν ὅτι ἔχομεν σαφεστέραν ἀντίληψιν τῆς διαρκείας ἑνὸς ταξιδίου ἐάν μᾶς εἴπουν ὅτι τοῦτο διήρκεσεν 1 h 20 min 10 sec παρ' ὅτι ἐάν μᾶς εἴπουν ὅτι διήρκεσεν 4810 sec (1 h 20 min 10 sec).

Τὸ γεγονός τοῦτο μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τὴν τροπὴν ἑνὸς ἀπλοῦ συγκεκριμένου ἀριθμοῦ εἰς συμμαγιή.

Διὰ νά τρέψωμεν ἓνα ἀπλοῦν συγκεκριμένον ἀριθμόν, π.χ. τὸν ἀριθμόν 4830 sec, εἰς συμμαγιή, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

1) Διαιροῦμεν τὰ 4830 sec διὰ 60, ὅποτε εὐρίσκομεν 80 min καὶ 30 sec.

2) Διαιροῦμεν τὰ 80 min διὰ 60 ὅποτε εὐρίσκομεν 1 h. καὶ 20 min.

$$\alpha) \begin{array}{r|l} 4830 \text{ sec} & 60 \\ 30 \text{ sec} & 80 \text{ min} \end{array}$$

$$\beta) \begin{array}{r|l} 80 \text{ min} & 60 \\ 20 \text{ min} & 1 \text{ h} \end{array}$$

$$\text{Ἦτοι} \quad 4830 \text{ sec} = 1 \text{ h } 20 \text{ min } 30 \text{ sec.}$$

Ὁμοίως διὰ νά τρέψωμεν τὸν συγκεκριμένον ἀριθμόν 72620'' εἰς συμμαγιή ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς:

$$\alpha) \begin{array}{r|l} 72620'' & 60 \\ 126 & 1210' \\ 62 & \\ 20'' & \end{array}$$

$$\beta) \begin{array}{r|l} 1210' & 60 \\ 10' & 20^\circ \end{array}$$

$$\text{Ἦτοι} \quad 72620'' = 20^\circ 10' 20''$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

270. Νά τραποῦν εἰς δευτερόλεπτα (sec).

$$\alpha) 3 \text{ h } 25 \text{ min } 40 \text{ sec} \quad \beta) 2 \text{ h } 10 \text{ min } 48 \text{ sec}$$

271. Νά τραποῦν εἰς πρῶτα λεπτὰ :

$$\alpha) 2^{\circ} 32' 48'' \quad \beta) 9^{\circ} 20' 15''$$

272. Νά τραποῦν εἰς συμμιγεῖς :

$$\alpha) 3 \frac{1}{4} \text{ h}, \quad \beta) 2 \frac{4^{\circ}}{5}$$

273. Ὁ χρόνος μεταξύ δύο πανσελήνων εἶναι 29 ἡμ., 12 h 43 min. Νά τραπῆ ὁ χρόνος οὗτος α) εἰς sec β) εἰς min.

90. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΣΥΜΜΙΓΩΝ

90. 1. Πρόσθεσις

Νά εὔρεθῆ τὸ ἄθροισμα

$$\begin{array}{r} 25^{\circ} 17' 32'' + 5^{\circ} 20' 19'' + 10^{\circ} 32' 51'' \\ \hline \text{Ἔχομεν} \quad 25^{\circ} 17' 32'' \\ \quad \quad 5^{\circ} 20' 19'' \quad + \\ \quad \quad 10^{\circ} 32' 51'' \\ \hline 40^{\circ} 69' 102'' \quad \eta \quad 40^{\circ} 70' 42'' \quad \eta \quad 41^{\circ} 10' 42'' \end{array}$$

90. 2. Ἀφαιρέσις

α) Νά εὔρεθῆ ἡ διαφορά $18^{\circ} 20' 31'' - 7^{\circ} 17' 26''$

$$\begin{array}{r} \text{Ἔχομεν} \quad 18^{\circ} 20' 31'' \\ \quad \quad 7^{\circ} 17' 26'' \\ \hline 11^{\circ} 3' 5'' \end{array}$$

β) Νά εὔρεθῆ ἡ διαφορά $18^{\circ} 20' 31'' - 7^{\circ} 24' 41''$

$$\begin{array}{r} \text{Ἔχομεν} \quad 18^{\circ} 20' 31'' \quad 18^{\circ} 19' 91'' \quad 17^{\circ} 79' 91'' \\ \quad \quad 7^{\circ} 24' 41'' \quad \eta \quad 7^{\circ} 24' 41'' \quad \eta \quad 7^{\circ} 24' 41'' \\ \hline \quad 10^{\circ} 55' 50'' \end{array}$$

Ἦτοι διὰ νὰ καταστήσωμεν δυνατὰς τὰς ἀφαιρέσεις (ὅπου δὲν ἦσαν δυναταί), ἀνελύσαμεν μίαν μονάδα εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως...

91. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΣΥΜΜΙΓΩΝ

91. 1. Πολλαπλασιασμός ἐπὶ ἀκέριον

Νά εὔρεθῆ τὸ γινόμενον ($13^{\circ} 20' 12''$). 6

$$\begin{array}{r} 13^{\circ} 20' 12'' \\ \quad \quad 6 \times \\ \hline 78^{\circ} 120' 72'' \quad \eta \quad 78^{\circ} 121' 12'' \quad \eta \quad 80^{\circ} 1' 12'' \end{array}$$

*Ηδη είναι εύκολον νά ἐννοήσωμεν ὅτι πρέπει νά πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν ὥρῶν ἐπὶ τὸν συμμιγῆ $30^{\circ}20'10''$.

$$2 \frac{27}{40} \cdot (30^{\circ} 20' 10'') = 81^{\circ} 8' 56,75''$$

91. 6. Διαίρεσις διὰ συμμιγοῦς

α) Μερισμὸς

*Ἐν κινητὸν εἰς 2 h 40 min διατρέχει τόξον $34^{\circ} 9' 20''$. Πόσον τόξον (τοῦ ἰδίου κύκλου) διατρέχει εἰς μίαν ὥραν;

*Ἐπίλυσις

Τρέπομεν τὸν χρόνον 2 h 40 min εἰς ὥρας: $2 \text{ h } 40 \text{ min} = 2 \frac{2}{3} \text{ h}$.

*Ἀρκεῖ ἤδη νά ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν $(34^{\circ} 9' 20'') : 2 \frac{2}{3}$

$$(34^{\circ} 9' 20'') : 2 \frac{2}{3} = 12^{\circ} 48' 30''.$$

*Ὡστε τὸ κινητὸν εἰς 1 h διατρέχει τόξον $12^{\circ} 48' 30''$

β) Μέτρησις

*Ἐν κινητὸν εἰς 1 h διατρέχει τόξον $3^{\circ} 20' 10''$. Εἰς πόσον χρόνον θὰ διατρέξῃ τόξον (τοῦ αὐτοῦ κύκλου) $23^{\circ} 21' 10''$;

*Ἐπίλυσις

*Ἐχομεν τὴν διαίρεσιν:

$$(23^{\circ} 21' 10'') : (3^{\circ} 20' 10'')$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τρέπομεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς κατωτέρας τάξεως (εἰς sec) καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν κατὰ τὰ γνωστά.

$$23^{\circ} 21' 10'' = 84070'', \quad 3^{\circ} 20' 10'' = 12010'' \quad 84070 : 12010 = 7$$

*Ἦτοι τὸ κινητὸν θὰ διατρέξῃ τόξον $23^{\circ} 21' 10''$ εἰς 7 h.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

274. *Ἐν κινητὸν διατρέχει ἐπὶ ἐνὸς κύκλου τόξον $5^{\circ}10'20''$ εἰς 1 min. Πόσον τόξον τοῦ ἰδίου κύκλου θὰ διατρέξῃ εἰς 8 min.

275. *Ἐν ὥρολόγιον εἰς 6 h μένει ὀπίσω 8 min, 30 sec. Πόσον μένει ὀπίσω εἰς 1 h;

276. *Ἐν αὐτοκίνητον διατρέχει εἰς 1 min 30 sec ἀπόστασιν 1 km. Εἰς πόσον χρόνον θὰ διατρέξῃ ἀπόστασιν $8 \frac{3}{4}$ km.

277. Τὰ $5/8$ ἐνὸς τόξου ἔχουν τιμὴν $50^{\circ}12'55''$. Πόση εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ τόξου τούτου;
278. Ἐν διαστημικὸν πλοῖον ἐκτελεῖ μίαν πλήρη περιφορὰν περὶ τὴν γῆν εἰς 1 h καὶ 12 min. Πόσας τοιαύτας περιφορὰς ἐκτελεῖ εἰς 14 h 24 min;
279. Ἐν διαστημόπλοιον ἐκτελεῖ μίαν πλήρη περιφορὰν τῆς γῆς εἰς 1 h 20 min. Εἰς πόσον χρόνον θὰ διανύσῃ τοῦτο τόξον $30^{\circ} 20'$ τῆς ἀνωτέρω περιφορᾶς;
- (Θεωροῦμεν τὴν τροχιὰν τοῦ διαστημοπλοίου κυκλικήν).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

- 280) Εἰς μεικτὸν γυμνάσιον ἐνεγράφησαν 635 μαθηταὶ καὶ μαθήτριά. Ἐὰν ἐνεγράφησαν 50 μαθηταὶ ὀλιγώτεροι καὶ 15 μαθήτριά περισσότεροι ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν καὶ τῶν μαθητριῶν θὰ ἦτο ὁ αὐτός. Πόσοι μαθηταὶ καὶ πόσαι μαθήτριά ἐνεγράφησαν;
281. Ἐργάτης ἐξετέλεσεν τὰ $3/5$ ἐνὸς ἔργου ἐργασθεὶς 12 h μετὰ τὰς ὁποίας προσελήφθη καὶ δεύτερος ἐργάτης. Τοιοῦτοτρόπως τὸ ἔργον ἐξετελέσθη ἐν ὄλῳ εἰς 15 h. Ποῖον μέρος τοῦ ἔργου ἐξετέλεσεν ὁ δεύτερος ἐργάτης;
282. Ἐκ δύο πόλεων Α, Β ἀναχωροῦν συγχρόνως δύο κινητὰ α, β. Ἐὰν ἡ ταχύτης τοῦ α εἶναι μεγαλύτερα τῆς ταχύτητος τοῦ β κατὰ 10 km τὴν ὥραν καὶ τὰ κινητὰ κινήθουν κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν, θὰ συναντηθοῦν μετὰ 42 h. Ἐὰν δὲ κινήθουν ἀντιθέτως θὰ συναντηθοῦν μετὰ 7 h. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ ταχύτητες καὶ ἡ ἀπόστασις ΑΒ.
283. Ἐργολάβος ἔχει 3 συνεργεῖα ἐργατῶν. Τὸ α' δύναται νὰ περατώσῃ ἐν ἔργον εἰς 8 ἡμέρας, τὸ β' εἰς 5 ἡμέρας καὶ τὸ γ' εἰς 15 ἡμέρας. Λαμβάνει ὁ ἐργολάβος τὰ $2/3$ τῶν ἐργατῶν τοῦ α' συνεργεῖου, τὸ $1/3$ τοῦ β' καὶ τὰ $3/4$ τοῦ γ' καὶ σχηματίζει νέον συνεργεῖον. Εἰς πόσας ἡμέρας τὸ νέον τοῦτο συνεργεῖον θὰ περατώσῃ τὸ αὐτὸ ἔργον;
284. Μία περιουσία ἔπρεπε νὰ διανεμηθῇ μεταξὺ τῶν κληρονόμων θανόντος, ἕκαστος τῶν ὁποίων θὰ ἐλάμβανε 288000 δρχ. Λόγῳ ὁμως τῆς παραιτήσεως δύο ἐξ αὐτῶν οἱ ὑπόλοιποι ἔλαβον ἀνὰ 432000 δρχ. ἕκαστος. Πόσοι ἦσαν οἱ κληρονόμοι;
285. Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμὸς τοῦ ὁποίου τὰ $2/3$ αὐξανόμενα κατὰ 52 δίδουν ἄθροισμα μεγαλύτερον τοῦ διπλασίου του κατὰ 12.
286. Εἰς πόσας ὥρας θὰ ἐκτελέσουν ἔργον τι τρεῖς ἐργάται ἐργαζόμενοι ὁμοῦ, ὅταν ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος ἐκτελοῦν ὁμοῦ ἐργαζόμενοι τὸ ἡμισυ τοῦ ἔργου εἰς 6 h καὶ ὁ πρῶτος καὶ ὁ τρίτος ὁλόκληρον τὸ ἔργον εἰς 15 h. καὶ ὁ β' καὶ ὁ γ' εἰς 20 h.
287. Ἀποθνήσκων τις ἀφήνει εἰς τὸν υἱὸν του τὰ $2/5$ τῆς περιουσίας του, εἰς τὴν θυγατέραν τὰ $3/8$ καὶ εἰς τὴν σύζυγόν του τὸ ὑπόλοιπον ἦτοι 315.000 δρχ. Πῶση ἦτο ἡ περιουσία;
288. Ἐνας ἐργάτης ἐκτελεῖ τὰ $2/3$ ἐνὸς ἔργου εἰς 9 ἡμέρας. Ἄλλος ἐργάτης ἐκτελεῖ τὰ $5/8$ τοῦ ἴδιου ἔργου εἰς 5 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἐκτελέσουν τὸ ἔργον τοῦτο ἐὰν ἐργασθοῦν συγχρόνως καὶ οἱ δύο ἐργάται;
289. Τὰ $2/3$ τοῦ $1/4$ τῶν $3/5$ τῆς ἡλικίας ἐνὸς ἀνθρώπου εἶναι 10 ἔτη. Πόση εἶναι ἡ ἡλικία τοῦ ἀνθρώπου τούτου.
290. Τρεῖς ἐργάται ἐμοιράσθησαν 19600 δρχ. κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε ὁ εἰς τούτων νὰ λάβῃ 800 δρχ. ὀλιγώτερας τῶν ὄσων, ἔλαβεν ἕκαστος τῶν δύο ἄλλων. Πόσα χρήματα ἔλαβεν ἕκαστος;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

1. 1. Τὸ παρὸν βιβλίον μᾶς εἰσάγει εἰς ἓνα βασικόν, ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέροντα καὶ χρήσιμον κλάδον τῶν Μαθηματικῶν, εἰς τὴν Γεωμετρίαν.

Τὸ ὄνομα «Γεω-μετρία» μαρτυρεῖ τὴν προέλευσίν της. Πρακτικαὶ ἀνάγκαι, ὅπως ἡ μέτρησις τεμαχίων γῆς, στερεῶν σωμάτων, καθὼς καὶ ἡ ἐξέτασις τοῦ σχήματος αὐτῶν ὠδήγησαν εἰς τὰς πρώτας γεωμετρικὰς γνώσεις.

1. 2. Μεταξὺ τῶν διαφόρων στερεῶν*, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται γύρω μας, εἶναι εὐκόλον νὰ παρατηρήσωμεν μερικὰ βασικά, κοινὰ γνωρίσματα :

Τὸ βάρος : "Ὅλα τὰ στερεὰ σώματα ἔχουν βάρος.

Τὸν ὄγκον : "Ἦτοι τὴν περιορισμένην ἔκτασιν τὴν ὁποῖαν καταλαμβάνει ἕκαστον στερεὸν εἰς τὸ ἀπεριόριστον διάστημα (χώρον) τοῦ περιβάλλοντός μας. Αὕτη ἐκτείνεται ἐντὸς τοῦ χώρου εἰς βάθος, εἰς πλάτος καὶ εἰς μήκος. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἕκαστον στερεὸν σῶμα καθὼς καὶ ὁ περιβάλλων χώρος ἔχουν τρεῖς διαστάσεις.

Τὸ σχῆμα. "Ἐκαστον στερεὸν ἔχει μίαν ὠρισμένην μορφήν, ἐν ὠρισμένον σχῆμα. Τὴν μορφήν (σχῆμα) τοῦ στερεοῦ τὴν ἀντιλαμβάνομεθα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

1. 3. Ἡ συστηματικὴ σπουδὴ τῶν στερεῶν σωμάτων ἐπέβαλεν τὴν ἐξέτασιν τούτων ἀπὸ διαφόρους ἀπόψεις. Πρῶτοι οἱ ἀρχαῖοι "Ἕλληνες** φιλό-

*Ἐνα ὑλικὸν σῶμα λέγεται στερεόν, ἐὰν τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος αὐτοῦ εἶναι ἀμετάβλητα ὅταν αἱ ἐξωτερικαὶ συνθήκαι δὲν ἀλλάζουν αἰσθητῶς.


** Αἱ μέχρι τὴν ἐποχὴν ἐκείνην γεωμετρικαὶ γνώσεις ἀπετέλουν μίαν πρακτικὴν τέχνην καὶ ὄχι ἐπιστήμην. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐδημιούργησαν τὸ λαμπρὸν οἰκοδόμημα τῆς Μαθηματικῆς ἐπιστήμης.

σοφοί ἐξήτασαν τὰ στερεά, ἰδιαιτέρως ὡς πρὸς τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος, ἀδιαφοροῦντες διὰ τὰ λοιπὰ γνωρίσματα αὐτῶν (βάρος, ὕλην, χρῶμα . . .). Τοιοῦτοτρόπως ἀπὸ τὰ στερεὰ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὠδηγήθησαν εἰς τὴν ἰδέαν τοῦ γεωμετρικοῦ στερεοῦ. Ἐὰν φαντασθῆτε ἓν στερεὸν μὲ σχῆμα καὶ μέγεθος ὠρισμένα καὶ ἀμετάβλητα εἰς τὰς μετατοπίσεις τοῦ ἐντὸς τοῦ χώρου, χωρὶς ἄλλα γνωρίσματα (βάρος, χρῶμα . . .) θὰ ἔχετε τὴν ἰδέαν ἑνὸς γεωμετρικοῦ στερεοῦ. Βεβαίως εἰς τὸ φυσικὸν μας περιβάλλον δὲν ὑπάρχει τοιοῦτον στερεὸν χωρὶς ὕλην, βάρος . . . Ὅπως δὲν ὑπάρχει π.χ. ὕλικὸς ἄξων περι τὸν ὁποῖον περιστρέφεται ἡ γῆ ἀλλὰ εἶναι μόνον νοητός.

Γεωμετρικὰ στερεὰ ὑπάρχουν μόνον εἰς τὰς σκέψεις μας, εἶναι δημιουργήματα τοῦ νοῦ μας, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ τὰ φυσικὰ στερεὰ, ὅταν «λησμονήσωμεν» ὠρισμένα γνωρίσματα αὐτῶν.

2. ΑΠΛΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

1. 2. Ἀπὸ τὸ δημοτικὸν σχολεῖον ἔχετε μίαν πρώτην γνωριμίαν μὲ μερικὰ ἀπλὰ γεωμετρικὰ στερεά, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα φυσικὰ στερεά.




Ἄνω: Εἰκόνες φυσικῶν στερεῶν. Κάτω: Εἰκόνες γεωμετρικῶν στερεῶν.

Κατωτέρως θὰ περιγράψωμεν συντόμως δύο χαρακτηριστικὰ ἐκ τῶν ἀπλουστέρων γεωμ. στερεῶν. Τὸ ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον καὶ τὸν κύλινδρον.

2. 2. Τὸ ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον

Ἐν κυτίον ἀπὸ κιμωλίας ἢ ἀπὸ σπέρτα, πολλὰ κιβώτια καὶ γενικῶς πολλὰ ἀντικείμενα τοῦ περιβάλλοντός μας ἔχουν σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλε-

πιπέδου. Ἐὰς προσέξωμεν τὸ ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον τοῦ σχ. 2. Παρατηροῦμεν ὅτι ὁλόκληρος ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ 6 διακεκριμένα ἐπίπεδα μέρη, τὰς ἕδρας. Ἐκάστη ἕδρα ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου. Ἄνὰ δύο ἀπέναντι ἕδραι δὲν τέμνονται, ἐνῶ ἀνὰ δύο συνεχόμεναι τέμνονται (συναντῶνται) κατὰ μίαν γραμμὴν. Ἐκάστη ἀπὸ τὰς γραμμὰς αὐτὰς λέγεται ἀκμὴ τοῦ στερεοῦ. Μερικαὶ ἀπὸ τὰς ἀκμὰς ἀνὰ τρεῖς τέμνονται (συναντῶνται) εἰς ἓν σημεῖον. Ἐκαστον τῶν σημείων αὐτῶν λέγεται κορυφή τοῦ ὀρθογ. παραλληλεπιπέδου.





Σχ. 2

Ἦτοι ἕκαστον ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἔχει :
6 ἕδρας, 12 ἀκμὰς καὶ 8 κορυφάς.

2. 3. Ὁ κύλινδρος

Ἐν κυτίον γάλακτος, εἰς κλειστός σωλὴν θερμάστρας ἢ ὕδατος, πολλὰ μολύβια, ἢ ἄξονες διαφόρων ἐργαλείων, μηχανῶν, ἔχουν σχῆμα κυλίνδρου.



Σχ. 3

Μία περιστρεφόμενη θύρα, ὅπως π.χ. ὠρισμένοι θύραι τραπεζῶν καὶ μεγάλων καταστημάτων, μᾶς δεικνύει πῶς γεννᾶται εἰς κύλινδρος ἐκ τῆς περιστροφῆς ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ περὶ μίαν πλευρὰν ΑΔ αὐτοῦ (σχ. 3).

Ἐὰς προσέξωμεν ἓνα κύλινδρον π.χ. τὸν κύλινδρον τοῦ σχ. 3. Παρατηροῦμεν ὅτι οὗτος περατοῦται :

α) Εἰς μίαν καμπύλην ἐπιφάνειαν, ἢ ὁποία γεννᾶται ὑπὸ τῆς πλευρᾶς ΒΓ κατὰ τὴν περιστροφὴν αὐτῆς περὶ τὴν ΑΔ.

β) Εἰς δύο ἐπιπέδους ἐπιφάνειας, αἱ ὁποῖαι γεννῶνται ὑπὸ τῶν πλευρῶν ΑΒ, ΓΔ κατὰ τὴν περιστροφὴν τοῦ ὀρθογωνίου ΑΒΓΔ περὶ τὴν ΑΔ.


Παρατηροῦμεν ἀκόμη ὅτι ἕκάστη ἐπίπεδος ἐπιφάνεια τοῦ κυλίνδρου περατοῦται εἰς μίαν καμπύλην γραμμὴν, ἢ ὁποία ὀνομάζεται κύκλος.

3. ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

3. 1. Τὸ γεωμετρικὸν σχῆμα ὡς σύνολον σημείων

α) Καθὼς εἶδομεν εἰς τὸ ὀρθογ. παραλ/δρον ἀνὰ δύο συνεχόμεναι ἀκμαὶ μιᾶς ἕδρας αὐτοῦ συναντῶνται εἰς ἓν σημεῖον. Ὁ κόκκος κόνεως, τὸ ἴχνος τῆς μύτης τοῦ μολυβιοῦ μας (ὅταν τὸ κρατοῦμεν ἀκίνητον) εἰς τὸ σχέδιον,

μᾶς δίδουν μίαν ιδέαν τοῦ σημείου. Τὸ σημεῖον ὡς γεωμετρικὸν στοιχεῖον δὲν ἔχει διαστάσεις. Ἀπλῶς ὀρίζει μίαν θέσιν. Εἰς τὸ σχέδιον τὸ παριστάνομεν μὲ μίαν τελείαν καὶ τὸ ὀνομάζομεν μὲ ἓν κεφαλαῖον γράμμα (Σημεῖον Α, Σημεῖον Β...).



Σχ. 4

β) Ἐὰν μετακινήσωμεν χωρὶς διακοπὴν τὴν μύτην τοῦ μολυβιοῦ μας ἐπὶ τοῦ χάρτου, τότε τὸ ἴχνος αὐτῆς παριστάνει μίαν γραμμὴν, σχ. 4. Ἀλλὰ εἰς ἐκάστην θέσιν τοῦ μολυβιοῦ, τὸ ἴχνος τῆς μύτης του παριστάνει ἓν σημεῖον. Ἦτοι ἡ γραμμὴ δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς μία συνεχῆς σειρά διαδοχικῶν θέσεων ἑνὸς σημείου


τὸ ὁποῖον μετατοπίζεται εἰς τὸν χῶρον. Διὰ τοῦτο λαμβάνομεν τὴν γραμμὴν ὡς σύνολον σημείων (σημειοσύνολον).

Ἐξ ἄλλου τὰ γνωστὰ μας σχήματα (τὸ ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον, ὁ κύκλος, τὸ τρίγωνον...) ἀπαρτίζονται ἀπὸ γραμμᾶς. Εἶναι συνεπῶς καὶ αὐτὰ σύνολα σημείων.

3. 2. Ἰσότης γεωμετρικῶν σχημάτων

Τὸ σχ. 5 δεικνύει πῶς δυνάμεθα νὰ ἀναπτύξωμεν τὴν ἐπιφάνειαν ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου (σχ. 5α) ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου μᾶς ἕδρας αὐτοῦ (σχ. 5β).

Ἐπὶ διαφανοῦς φύλλου χάρτου ἀντιγράφομεν τὸ σχῆμα τῆς ἕδρας ΑΒΓΔ.



Σχ. 5

Τὸ ἀντίγραφον τοῦτο δυνάμεθα νὰ τὸ τοποθετήσωμεν καταλλήλως ἐπὶ τοῦ σχήματος τῆς ἀπέναντι ἕδρας ΕΖΗΘ εἰς τρόπον ὥστε τὰ δύο σχήματα νὰ ἐφαρμόσουν καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἓν σχῆμα*. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ δύο αὐτὰ σχήματα εἶναι ἴσα μεταξύ των ἢ ἀπλῶς ἴσα.

Γενικῶς: Δύο γεωμετρικὰ σχήματα Σ, Σ' λέγονται ἴσα μεταξύ των, ὅταν εἶναι δυνατόν νὰ τοποθετήσωμεν τὸ ἓν ἐπὶ τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐφαρμόσουν καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἓν σχῆμα.

* Ἡ ἐργασία αὐτὴ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν νοερὰν μετατόπισιν τῶν γεωμετρικῶν σχημάτων.

Γράφομεν δὲ $\Sigma = \Sigma'$ *

Κατὰ τ' ἀνωτέρω :

Αἱ ἀπέναντι ἔδραι ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου εἶναι ἴσαι.


Ὅταν δύο γεωμ. σχήματα Σ , Σ' δὲν εἶναι ἴσα μεταξύ των, λέγομεν ὅτι εἶναι ἄνισα καὶ γράφομεν $\Sigma \neq \Sigma'$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Ἀναφέρατε φυσικὰ ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα ἔχουν σχῆμα γνωστῶν γεωμετρικῶν στερεῶν.
2. Κατασκευάσατε ὑποδείγματα (μοντέλα) κύβου, πρίσματος, πυραμίδος καὶ περιγράψατε αὐτά.
3. Μὲ ἓν διαφανὲς φύλλον χάρτου συγκρίνατε τὰ σχήματα τῶν παραπλευρῶν ἐδρῶν ἑνὸς τριγωνικοῦ πρίσματος. Πόσας συγκρίσεις χρειάζεσθε ;
4. Εὑρετε φυσικὰ ἀντικείμενα τῶν ὁποίων τὸ σχῆμα εἶναι σύνθεσις σχημάτων ἀπλῶν γεωμ. στερεῶν.

4. Η ΕΥΘΕΙΑ

4. 1. Μία φωτεινὴ ἀκτίς, ἓν τευτωμένον νῆμα, εἰκονίζουσι εὐθείας γραμμὰς. Ἡ εὐθεῖα ὡς γεωμετρικὸν στοιχεῖον δὲν ἔχει τὰ γνωρίσματα τῶν ὑλικῶν εὐθειῶν (πάχος, χρῶμα, βῆρος). Ἐχει μόνον μίαν διάστασιν· ἐκτείνεται εἰς μήκος. Εἰς τὴν πρακτικὴν ἡ εὐθεῖα ἀντιπροσωπεύεται συνήθως ἀπὸ τὴν ἀκμὴν ἑνὸς κανόνος σχεδιάσεως. Π.χ. διὰ νὰ ἐλέγξωμεν ἂν μία ἀκμὴ ἑνὸς στερεοῦ εἶναι εὐθεῖα, τοποθετοῦμεν ἐπ' αὐτῆς τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος καὶ ἐξετάζομεν ἂν αἱ δύο αὐταὶ ἀκμαὶ εἶναι δυνατόν νὰ ἐφαρμόσουν.



Σχ. 6

Ὅμοίως μὲ ὄδηγόν τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος χαράσσομεν εὐθείας γραμμὰς, σχ. 6.

4. 2. Εἰς τὸ σχέδιόν σας σημειώσατε ἓν σημεῖον Α. Πόσαι εὐθεῖαι διέρχονται δι' αὐτοῦ; Ἄπειροι.

Σημειώσατε ἐπίσης δύο διαφορετικὰ σημεῖα Β, Γ. Πόσαι εὐθεῖαι διέρχονται καὶ διὰ τῶν δύο αὐτῶν σημείων; Μία καὶ μόνον μία.

Παρατηρήσεις ὡς αἱ ἀνωτέρω μᾶς ἐξηγοῦν διατὶ εἰς τὴν Γεωμετρίαν δεχόμεθα ὅτι :

Διὰ δύο διαφορετικῶν σημείων διέρχεται μία καὶ μόνον μία εὐθεῖα.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι δύο διαφορετικὰ σημεῖα Α, Β ὀρίζουσι μίαν εὐθεῖαν : τὴν εὐθεῖαν ΑΒ ἢ ΒΑ.

* Ἡτοι ἡ ἰσότης $\Sigma = \Sigma'$ σημαίνει ἑνταῦθα ὅτι τὸ Σ εἶναι ἐφαρμόσιμον (δύναται νὰ ἐφαρμόσῃ) ἐπὶ τοῦ Σ' .

Ἐπίσης μίαν εὐθείαν τὴν ὀνομάζομεν μὲ ἓν μικρὸν γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου μας. (εὐθεῖα ϵ , εὐθεῖα δ ...).

4. 4. Εἶναι εὐκόλον νὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι ἡ εὐθεῖα προεκτείνεται ὅσον θέλομεν. Διὰ τοῦτο εἰς τὴν Γεωμετρίαν δεχόμεθα ὅτι :

Ἡ εὐθεῖα δύναται νὰ προεκταθῆ ἀπεριορίστως ἐκατέρωθεν.

4. 5. α) Προσέξατε τὰς εὐθείας τῶν πλευρῶν ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου. Ἐνὰ δύο ἀπέναντι εὐρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον καὶ οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχουν. Ἀντιθέτως ἀνά δύο συνεχόμενα ἔχουν ἓν κοινὸν σημεῖον.


β) Εἰς τὸ «ἐπίπεδον» ἑνὸς φύλλου τοῦ τετραδίου χαράξατε δύο εὐθείας.

Πόσα τὸ πολὺ κοινὰ σημεῖα δυνατόν νὰ ἔχουν αὐταί;

Παρατηροῦμεν ὅτι :

Ἡ οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχουν, ὅσονδῆποτε καὶ ἂν προεκταθοῦν, ὅπως π.χ. αἱ εὐθεῖαι α , α' τοῦ σχ. 7.

Ἡ ἔχουν ἓν μόνον κοινὸν σημεῖον, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ ζεύγη τῶν εὐθειῶν β , β' καὶ γ , γ' τοῦ σχ. 7.



Σχ. 7

Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν λέγομεν ὅτι αἱ εὐθεῖαι α , α' εἶναι παράλληλοι*, ἔνῳ εἰς τὴν δευτέραν ὅτι τέμνονται. Τὸ μοναδικὸν κοινὸν σημεῖον αὐτῶν λέγεται σημεῖον τομῆς.

Αἱ ἀνωτέρω παρατηρήσεις μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὸ ἐξῆς συμπέρασμα τὸ ὁποῖον ἰσχύει τόσον διὰ τὰς ὑλικὰς εὐθείας τοῦ σχεδίου ὅσον καὶ διὰ τὰς γεωμετρικὰς εὐθείας.

Δύο διαφορετικαὶ εὐθεῖαι τοῦ ἐπιπέδου εἶναι δυνατόν :

α) Οὐδὲν κοινὸν σημεῖον νὰ ἔχουν, ὁπότε λέγομεν ὅτι εἶναι μεταξὺ των παράλληλοι.

β) Νὰ ἔχουν ἓν μόνον κοινὸν σημεῖον, ὁπότε λέγομεν ὅτι τέμνονται.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5. Σημειώσατε δύο σημεῖα A , B καὶ ἔπειτα χαράξατε δύο εὐθείας ϵ , ϵ' τοιαύτας ὥστε $A\epsilon\epsilon$, $B\epsilon\epsilon$, $A\epsilon\epsilon'$.

6. Μὲ τὴν βοήθειαν τῆς ἀκμῆς τοῦ κανόνος νὰ εὑρετε ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου εὐθείας. Τί παρατηρεῖτε;

7. Σημειώσατε εἰς τὸ τετραδίδιον σας τρία διαφορετικὰ σημεῖα καὶ χαράξατε ἔπειτα ὅλας

* Μὲ τὰς παραλλήλους εὐθείας θὰ ἀσχοληθῶμεν ἐκτενέστερον εἰς ἄλλο κεφάλαιον.

τὰς εὐθείας, αἱ ὁποῖαι διέρχονται ἀπὸ αὐτά. Πόσαι τοιαῦται εὐθεῖαι ὑπάρχουν; (Διακρίνατε περιπτώσεις).


8. Ἐπαναλάβετε τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα διὰ τέσσαρα διαφορετικὰ σημεῖα. (Διακρίνατε διαφοροὺς περιπτώσεις).

9. Διὰ τρεῖς εὐθεῖας α , β , γ καὶ ἓν σημεῖον M τοῦ ἐπιπέδου γνωρίζετε ὅτι $M \in (\alpha \cap \beta) \cap \gamma$. Ποῖον εἶναι τὸ σχετικὸν σχέδιον;

5. ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ

5. 1. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ πίνακος, τοῦ ἡμεροῦντος ὕδατος, τοῦ λείου δαπέδου, εἶναι ὑλικάι παραστάσεις ἐπιπέδων ἐπιφανειῶν. Ἀπὸ αὐτὰς ἐδημιουργήθη εἰς τὴν σκέψιν μας ἡ γεωμετρικὴ ἰδέα τῆς ἐπιπέδου ἐπιφανείας ἢ ἀπλῶς τοῦ ἐπιπέδου.

5. 2. Διὰ νὰ ἐλέγξωμεν ἐὰν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ πίνακος εἶναι ἐπίπεδος, τοποθετοῦμεν ἐπ' αὐτῆς τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος. Πρέπει τότε, ὁποιαδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι ἡ θέσις τοῦ κανόνος, ἡ εὐθεῖα, ἡ ὁποία ὀρίζεται ἀπὸ δύο σημεῖα αὐτοῦ, νὰ εὑρίσκεται ὁλόκληρος ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου.




Σχ. 8

Ἀπὸ τὸ πείραμα τοῦτο ὀδηγοῦμεθα εἰς τὴν ἐξῆς ιδιότητα τοῦ ἐπιπέδου :

Ἡ εὐθεῖα ἡ ὁποία ὀρίζεται ἀπὸ δύο ὁποιαδήποτε διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου κεῖται ὁλόκληρος ἐπ' αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω πρότασιν ἐννοοῦμεν ὅτι, ὅπως ἡ εὐθεῖα δὲν ἔχει ἄκρα, ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ τὴν προεκτείνωμεν ὅσον θέλομεν, τοιοῦτοτρόπως καὶ τὸ ἐπίπεδον προεκτείνεται ἀπεριορίστως πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις αὐτοῦ.



Σχ. 9

5. 3. α) Ἡ θύρα τοῦ σχεδ. 9 παριστάνει ἓν ἐπίπεδον τὸ ὁποῖον διέρχεται ἀπὸ δύο διαφορετικὰ σημεῖα A , B (τὰ κέντρα τῶν στροφῶν). Ἀπὸ τὴν στροφὴν τοῦ ἐπιπέδου τῆς θύρας περὶ τὴν εὐθεῖαν AB αὐτοῦ ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ἀπὸ μίαν εὐθεῖαν διέρχονται ἄπειρα ἐπίπεδα.

Τὰ ἐπίπεδα αὐτὰ ἀντιπροσωπεύονται ἀπὸ τὰς διαφοροὺς θέσεις τῆς στροφομένης θύρας.

β) Ἐὰν τοποθετήσωμεν μίαν καρφίδα εἰς τὸ δάπεδον, (σημεῖον Γ) ἐκτὸς τῆς εὐθείας AB τῶν στροφῶν, τότε ἡ θύρα θὰ προσκρούσῃ εἰς αὐτὴν καὶ θὰ σταθεροποιηθῇ εἰς μίαν ὠρισμένην θέσιν.

Ἦτοι: Μία εὐθεῖα AB καὶ ἓν σημεῖον Γ ἐκτὸς αὐτῆς ὀρίζουν ἓν καὶ μόνον ἓν ἐπίπεδον.


Εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦτο κεῖται ἡ εὐθεῖα AB καὶ τὸ σημεῖον Γ .

γ) Ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι ἡ εὐθεῖα AB ὀρίζεται ἀπὸ τὰ δύο διαφορετικὰ σημεῖα A, B , τότε ἡ προηγουμένη πρότασις διατυπώνεται καὶ ὡς ἑξῆς:


Τρία διαφορετικὰ σημεῖα A, B, Γ μὴ κείμενα ἐπ' εὐθείας ὀρίζουν ἓν καὶ μόνον ἓν ἐπίπεδον.

5. 6. Γένεσις ἐπιπέδου διὰ κινήσεως εὐθείας


Τὰ κατωτέρω σχέδια 10α, β, γ δεικνύουν πῶς γεννᾶται ἓν ὑλικὸν ἐπίπεδον διὰ καταλλήλου μετατοπίσεως μιᾶς ὑλικῆς εὐθείας.



(α)



(β)



(γ)

Σχ. 10

α) Διὰ στροφῆς μιᾶς εὐθείας

Ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου ἑνὸς σκληροῦ φύλλου χάρτου σχεδιάζομεν μίαν εὐθεῖαν ϵ καὶ ἔπειτα κατὰ μῆκος αὐτῆς τοποθετοῦμεν τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος, (σχ. 11). Ἐὰν ἤδη περιστρέψωμεν τὸν κανόνα περὶ ἓν σημεῖον A τῆς ϵ , προσέχοντες ὥστε ἡ ἀκμὴ του νὰ παραμένῃ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ χάρτου, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι εἰς μίαν πλήρη περιστροφήν, ἡ ἀκμὴ τοῦ κανόνος θὰ διαγράψῃ ὁλόκληρον τὸ ἐπίπεδον.

Ὁ ἀνωτέρω τρόπος ἐργασίας εἶναι μία στροφή τῆς εὐθείας ϵ περὶ τὸ σημεῖον A .

β) Διὰ παραλλήλου μετατοπίσεως


Ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ πίνακος ἢ μιᾶς πινακίδος σχεδιάσωμεν, τοποθετοῦμεν τὸ ταῦ, ὡς δεικνύει τὸ σχ. 12 καὶ ὀλισθαίνομεν αὐτὸ προσέχοντες ὥστε ἡ κεφαλὴ του νὰ ἐφαρμολῆ σταθερῶς ἐπὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ πίνακος (ἢ τῆς πινακίδος).

Παρατηροῦμεν ὅτι κατὰ τὴν ὀλίσθησιν αὐτὴν ἡ εὐθεῖα ϵ τῆς ἀκμῆς τοῦ βραχίονος τοῦ ταῦ διαγράφει τὸ ἐπίπεδον τοῦ πίνακος.


Ὁ ἀνωτέρω τρόπος ἐργασίας λέγεται παράλληλος μετατόπισις τῆς εὐθείας ϵ .

Ἀπὸ τ' ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Μία ἐπίπεδος ἐπιφάνεια γεννᾶται διὰ καταλλήλου μετατοπίσεως μιᾶς εὐθείας.



Σχ. 11



Σχ. 12

5. 7. Τὸ ἐπίπεδον ὡς σημειοσύνολον

Ἐπειδὴ ἡ εὐθεῖα εἶναι ἓν σημειοσύνολον, τὸ δὲ ἐπίπεδον γεννᾶται ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν, εἶναι φυσικὸν νὰ θεωρήσωμεν τὸ ἐπίπεδον ὡς σημειοσύνολον*.

(Ἐὰν κτυπήσωμεν ἓνα σπόγγον ἐπὶ τοῦ πίνακος τότε ὁ πίναξ καλύπτεται μὲ κόνιν κιμωλίας Ἐὰν ἕκαστος κόκκος κόνεως παριστάνη ἓν σημεῖον, τότε τὸ στρῶμα τῆς κόνεως τοῦ πίνακος παριστάνει τὸ σημειοσύνολον τοῦ ἐπιπέδου).

5. 8. Τομὴ δύο διαφορετικῶν ἐπιπέδων

Προσέξατε δύο συνεχόμενας ἔδρας τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Ἐχουν κοινὰ σημεῖα κείμενα ἐπὶ μιᾶς εὐθείας. Ὄταν δύο διαφορετικὰ ἐπίπεδα ἔχουν κοινὰ σημεῖα, τότε λέγομεν ὅτι τέμνονται. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ σύνολον τῶν κοινῶν σημείων εἶναι μία εὐθεῖα, ἢ ὁποῖα λέγεται τομὴ τῶν δύο ἐπιπέδων.

5. 9. Ἐπίπεδα σχήματα

Εἰς τὸ βιβλίον αὐτὸ θὰ περιορισθῶμεν εἰς τὴν μελέτην γεωμετρικῶν σχημάτων ὅπως εἶναι ἡ εὐθεῖα, ὁ κύκλος, τὸ τρίγωνον, ἡ γωνία, τὰ ὅποια ἔχουν ὅλα τῶν τὰ σημεῖα ἐπὶ ἑνὸς ἐπιπέδου καὶ ὀνομάζονται διὰ τοῦτο ἐπίπεδα σχήματα. Ὁ ἰδιαίτερος κλάδος τῆς γεωμετρίας ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται εἰς τὰ ἐπίπεδα σχήματα, λέγεται ἐπιπέδομετρία.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10 Ἀναφέρατε παραδείγματα σχηματισμοῦ ἑνὸς ἐπιπέδου διὰ καταλλήλου κινήσεως εὐθείας.

* Τὸ σημειοσύνολον ἑνὸς ἐπιπέδου εἶναι διαφορετικὸν εἶδος σημειοσυνόλου ἀπὸ τὸ σημειοσύνολον μιᾶς εὐθείας.

11. Ἐξετάσατε ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ εἶναι ἐπίπεδον σχῆμα ἕν τρίγωνον.

12. Ἐξετάσατε ἂν εἶναι δυνατὸν ἕν τετράπλευρον νὰ μὴ εἶναι ἐπίπεδον σχῆμα.

13. Τέσσαρα διαφορετικὰ σημεῖα δὲν εὐρίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου. Ἐξετάσατε ἂν τρία ἐξ αὐτῶν εὐρίσκονται ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας.

14. Πόσα ἐπίπεδα ὀρίζουν 4 διαφορετικὰ σημεῖα ἀνὰ τρία τῶν ὁποίων δὲν κείνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας;

ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΤΡΙΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

6. Η ΗΜΙΕΥΘΕΙΑ

Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας $\chi\chi'$ σημειώνομεν ἓν σημεῖον A , σχ. 13.

Παρατηροῦμεν τότε ὅτι ἡ ϵ χωρίζεται εἰς δύο ἀπεριόριστα μέρη. Ἐκαστον τούτων λέγεται ἡμιευθεΐα.

Τὸ σημεῖον A , τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ μοναδικὸν ἄκρον ἐκάστης τῶν ἡμιευθειῶν τοῦ σχ. 13α, λέγεται ἄρ χ ἢ ἐκάστης τῶν ἡμιευθειῶν τούτων.




Ἦτοι, ἡ ἡμιευθεΐα δύναται νὰ προεκταθῆ ἀπεριόριστως πρὸς μίαν μόνον κατεύθυνσιν.

Μία ἡμιευθεΐα ὀνομάζεται κατὰ δύο τρόπους :

α) Μὲ δύο κεφαλαῖα γράμματα, π.χ. AM . Ἐκ τούτων τὸ μὲν πρῶτον εἶναι τὸ ὄνομα τῆς ἀρχῆς, τὸ δὲ δεύτερον ἑνὸς ὁποιοῦδήποτε ἄλλου σημείου αὐτῆς. Π.χ. ἡ ἡμιευθεΐα AM τοῦ σχ. 13β ἔχει ἀρχὴν τὸ A .

β) Μὲ ἓν κεφαλαῖον γράμμα, τὸ ὄνομα τῆς ἀρχῆς τῆς, καὶ ἓν μικρὸν γράμμα διὰ τὴν κατεύθυνσιν πρὸς τὴν ὁποῖαν ἡ ἡμιευθεΐα δύναται νὰ προεκταθῆ ἀπεριόριστως. Π.χ., εἰς τὸ σχ. 13α, τὸ σημεῖον A χωρίζει τὴν εὐθεΐαν $\chi\chi'$ εἰς τὰς δύο ἡμιευθεΐας $A\chi$ καὶ $A\chi'$. Ἐκάστη τῶν ἡμιευθειῶν τούτων λέγεται ἀντίθετος ἢ ἀντικειμένη τῆς ἄλλης.

7. ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΝ ΤΜΗΜΑ



σχ. 14

Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ϵ σημειώνομεν δύο σημεῖα A, B .

Τὸ σύνολον τὸ ὁποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ δύο σημεῖα καὶ ἀπὸ τὰ μεταξύ αὐτῶν κείμενα σημεῖα τῆς εὐθείας ϵ λέγεται εὐθύγραμμον τμήμα AB ἢ BA .

Τὰ σημεῖα A, B λέγονται ἄκρᾳ τοῦ εὐθ. τμήματος AB . Ἐὰν τὰ ἄκρα αὐτὰ συμπίπτουν ($A \equiv B$), τότε τὸ AB λέγεται μηδενικὸν εὐθύγραμμον τμήμα.


8. Η ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

8. 1. Εἰς τὸ σχ. 15 ἔχομεν τέσσαρα εὐθύγραμμα τμήματα. Κατὰ σειράν τὰ $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$ καὶ ΔE . Παρατηροῦμεν ὅτι :


Τὸ πρῶτον AB καὶ τὸ δεύτερον $B\Gamma$ ἔχουν ἓν κοινὸν ἄκρον καὶ δὲν κείνται ἐπ' εὐθείας. Ὅμοίως τὸ δεύτερον $B\Gamma$ καὶ τὸ τρίτον $\Gamma\Delta$ ἔχουν ἓν κοινὸν ἄκρον καὶ δὲν κείνται ἐπ' εὐθείας κ.ο.κ. Ἡ γραμμὴ $AB\Gamma\Delta E$ λέγεται τεθλασμένη γραμμή.

Τῆς ἀνωτέρω τεθλασμένης γραμμῆς τὰ σημεῖα A, B, Γ, Δ, E λέγονται κορυφαί. Τὰ σημεῖα A καὶ E ἄκρα καὶ τὰ τμήματα $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$ καὶ ΔE πλευραί.

8. 2. Μία τεθλασμένη γραμμὴ τοῦ ἐπιπέδου λέγεται κυρτὴ ὅταν ἡ



Σχ. 15



Σχ. 16

εὐθεῖα, ἢ ὁποῖα διέρχεται ἀπὸ δύο τυχούσας διαδοχικὰς κορυφὰς αὐτῆς, ἀφήνη ὅλας τὰς ἄλλας κορυφὰς πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος μετὰ τῆς τεθλασμένης γραμμῆς. Π.χ. ἡ τεθλασμένη γραμμὴ τοῦ σχ. 16

εἶναι κυρτὴ ἐνῶ ἡ τεθλασμένη γραμμὴ τοῦ σχ. 15 δὲν εἶναι κυρτὴ. Διατί;

8. 3. Ὄταν τὰ ἄκρα μιᾶς τεθλασμένη γραμμῆς συμπίπτουν, σχ. 16, τότε αὕτη λέγεται κλειστὴ τεθλασμένη γραμμὴ ἢ πολὺγωνον.

Ἐν πολὺγωνον ἔχει τὸν ἴδιον ἀριθμὸν κορυφῶν καὶ πλευρῶν. Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι 3, 4, 5, ..., τὸ πολὺγωνον λέγεται τρίγωνον, τετράπλευρον, πεντάγωνον ... ἀντιστοίχως. Ἐκαστον εὐθ. τμήμα τὸ ὁποῖον συνδέει δύο μὴ γειτονικὰς κορυφὰς τοῦ πολυγώνου λέγεται διαγώνιος αὐτοῦ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

15. Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ϵ σημειώσατε δύο διαφορετικὰ σημεῖα A καὶ B . Ποῖαι ἡμιευθεῖαι ὀρίζονται α) με ἀρχὴν τὸ A β) με ἀρχὴν τὸ B ;

16. Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ϵ σημειώσατε 4 διαφορετικὰ σημεῖα A, B, Γ, Δ . Νὰ εὑρετε ὅλα τὰ εὐθύγραμμα τμήματα τὰ ὁποῖα σχηματίζονται.

17. Ἐπὶ ἐνὸς ἐπιπέδου σημειώσατε 5 διαφορετικὰ σημεῖα A, B, Γ, Δ, E τοιαῦτα ὥστε ἀνὰ τρία νὰ μὴ κείνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας. Πόσα εὐθ. τμήματα ὀρίζονται τοιουτοτρόπως;

18. Νά σχεδιάσετε ἓν ἐξάγωνον καὶ ἔπειτα νά εὑρετε πόσαι διαγώνιοι ἄγονται α) ἐκ μιᾶς κορυφῆς, β) ἐξ ὅλων τῶν κορυφῶν αὐτοῦ ὁμοῦ.

19. Τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα νά ἐξετασθῆ καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν 7/γώνου, 8/γώνου.

9. ΙΣΑ, ΑΝΙΣΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

9. 1. Ὅρισμοί

Χαράσσομεν δύο εὐθύγραμμα τμήματα AB , $\Gamma\Delta$ καὶ μίαν ἡμιευθεῖαν Ox . Μὲ τὸν διαβήτην ἢ τὸ διαστημόμετρον μεταφέρονε τὸ AB ἐπὶ τῆς Ox εἰς τρόπον ὥστε τὸ ἓν ἄκρον του νά συμπίπτῃ μὲ τὴν ἀρχὴν O αὐτῆς, σχ. 17.

Τὸ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνομεν καὶ διὰ τὸ $\Gamma\Delta$.

Ὑπάρχουν τότε ἀποκλειστικῶς τὰ ἀκόλουθα τρία ἐνδεχόμενα :



α) Τὸ Δ νά κεῖται μεταξύ τῆς ἀρχῆς O καὶ τοῦ B , σχ. 17α. Λέγομεν τότε ὅτι AB εἶναι μεγαλύτερον τοῦ $\Gamma\Delta$ καὶ γράφομεν $AB > \Gamma\Delta$.

β) Τὸ B νά κεῖται μεταξύ τῆς ἀρχῆς O καὶ τοῦ Δ (σχ. 17β), ὁπότε λέγομεν ὅτι AB εἶναι μικρότερον τοῦ $\Gamma\Delta$ καὶ γράφομεν $AB < \Gamma\Delta$.

γ) Τὸ B νά συμπίπτῃ (ταυτισθῆ) μὲ τὸ Δ (σχ. 17γ). λέγομεν δὲ ὅτι AB εἶναι ἴσον μὲ $\Gamma\Delta$ καὶ γράφομεν $AB = \Gamma\Delta$.

Ὅταν AB δὲν εἶναι ἴσον μὲ $\Gamma\Delta$, ὁπότε θὰ εἶναι ἢ μεγαλύτερον ἢ μικρότερον ἀπὸ αὐτό, λέγομεν ὅτι τὰ τμήματα AB καὶ $\Gamma\Delta$ εἶναι ἀνίσα· γράφομεν δὲ $AB \neq \Gamma\Delta$.

Σημειωτέον ὅτι αἱ σχέσεις $AB > \Gamma\Delta$ καὶ $\Gamma\Delta < AB$ ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν.



Σχ. 17

9. 2. Ἰδιότητες

α) Ἀπὸ τὸν ὅρισμόν τῆς ἰσότητος εὐθ. τμημάτων ἐννοοῦμεν ὅτι :

1) $AB = AB$. Ἀνακλαστικὴ ἰδιότης.

2) Ἐὰν εἶναι $AB = \Gamma\Delta$, τότε θὰ εἶναι καὶ $\Gamma\Delta = AB$.

Ἡ συμβολικῶς :

$$AB = \Gamma\Delta \Rightarrow \Gamma\Delta = AB \quad \text{Συμμετρικὴ ἰδιότης}$$

β) Ἐὰν συγκρίνοντες τρία εὐθύγραμμα τμήματα AB , $\Gamma\Delta$, EZ εὑρετε ὅτι :

$AB=ΓΔ$ (1) και $ΓΔ=EΖ$ (2) τί συμπεραίνετε διὰ τὰ AB και $EΖ$;
 Ἀπὸ τὰς ἰσότητας (1) και (2) συμπεραίνομεν ὅτι και $AB=EΖ$.
 (Ἐπαληθεύσατε τὸ συμπέρασμα τοῦτο μὲ τὸν διαβήτην σας).

Ἡ συμβολικῶς :

$(AB=ΓΔ \text{ και } ΓΔ=EΖ) \Rightarrow AB=EΖ$ Μεταβατικὴ ἰδιότης.

γ) Μὲ τὸν διαβήτην σας εὐρίσκετε ὅτι $AB > ΓΔ$ και $ΓΔ > EΖ$. Κατόπιν τούτου δύνασθε νὰ συγκρίνετε, χωρὶς ὄργανα, τὰ τμήματα AB και $EΖ$; Θὰ εἶναι $AB > EΖ$.

Ὡστε: $(AB > ΓΔ \text{ και } ΓΔ > EΖ) \Rightarrow AB > EΖ$ Μεταβατικὴ ἰδιότης.

9. 3. Μέσον εὐθυγρ. τμήματος

Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας $χ'χ$ σημειώνομεν ἓν σημεῖον O . Ἐπειτα ἐπὶ τῶν ἀντιθέτων ἡμιευθειῶν $Oχ, Oχ'$, μὲ τὸν διαβήτην μας, λαμβάνομεν δύο ἴσα τμήματα OM, OM' .

Λέγομεν ὅτι τὸ σημεῖον O εἶναι μέσον τοῦ εὐθ. τμήματος MM' .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

20. Ἐάν ἓν εὐθ. τμήμα AB δὲν εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ ἓν ἄλλο $ΓΔ$ τότε θὰ εἶναι ὅπωςδῆποτε ἴσον μὲ αὐτό;
21. Χαράξατε τρία εὐθ. τμήματα και κατατάξατε αὐτὰ κατὰ μέγεθος. Ποία ἰδιότης θὰ σᾶς διευκολύνη διὰ νὰ κάνετε ὀλιγωτέρας συγκρίσεις;
22. Τὸ αὐτὸ πρόβλημα και εἰς τὴν περίπτωσιν τεσσάρων εὐθ. τμημάτων.


10. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

10. 1. Ἐπὶ εὐθείας ϵ σημειώνομεν τρία διαφορετικὰ σημεῖα $A, B, Γ$, κατὰ τὴν διάταξιν (σειράν) τοῦ σχ. 18.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ τμήματα $AB, BΓ$, ἔχουν τὸ ἓν ἄκρον, τὸ B , κοινὸν και μεταξύ τῶν δύο ἄλλων ἄκρων. Διὰ τοῦτο λέγονται διαδοχικὰ ἢ ἐφεξῆς. Τὸ εὐθ. τμήμα $AΓ$ λέγεται ἄθροισμα τῶν διαδοχικῶν εὐθ. τμημάτων AB και $BΓ$.



Σχ. 18



Σχ. 19

Γράφομεν δὲ

$$AB+BΓ=AΓ$$

10. 2. Δίδονται δύο εὐθύγραμμα τμήματα $AB, ΓΔ$.

Μὲ τὸν διαβήτην μας ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ϵ λαμβάνομεν διαδοχικὰ τμήματα $EΖ=AB$ και $ZΗ=ΓΔ$.

Τὸ εὐθ. τμήμα $EΗ=EΖ+ZΗ$ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν εὐθυγράμμων τμημάτων AB και $ΓΔ$. $AB+ΓΔ=EΗ$

Ἡ πράξις διὰ τῆς ὁποίας εἰς ἕκαστον ζεύγος εὐθυγράμμων τμημάτων ἀντιστοιχίζομεν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο τούτων τμημάτων, λέγεται πρὸς - θέσις αὐτῶν.


10. 3 Ἄθροισμα περισσοτέρων εὐθ. τμημάτων

Τρία ἢ περισσότερα κατὰ σειράν εὐθ. τμήματα ἐπὶ μιᾶς εὐθείας λέγονται διαδοχικὰ ὅταν τὸ 2ον εἶναι ἐφεξῆς πρὸς τὸ 1ον, τὸ 3ον πρὸς τὸ 2ον κ.ο.κ.

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα τριῶν ἢ περισσοτέρων εὐθ. τμημάτων εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων, εἰς τὸ ἄθροισμα τοῦτο προσθέτομεν τὸ τρίτον εὐθ. τμήμα κ.ο.κ.

10. 4. Ἰδιότητες

Καθὼς φαίνεται εἰς τὸ σχ. 20 μὲ τὸν διαβήτην μας δυνάμεθα νὰ ἐπα-



Σχ. 20

ληθεύσωμεν ὅτι εἰς τὸ σύνολον τῶν εὐθ. τμημάτων ἡ πρόσθεσις εἶναι πράξις μεταθετικὴ καὶ προσεταιριστικὴ.

10. 5. Μία βασικὴ ιδιότης τῶν εὐθ. τμημάτων

Σημειώνομεν δύο σημεῖα A, καὶ B. Χαράσσομεν ἔπειτα τὸ εὐθύγραμμον τμήμα AB καθὼς καὶ ἄλλας τεθλασμένας γραμμὰς μὲ ἄκρα τὰ σημεῖα A καὶ B, (σχ. 21).


Ἄς εὕρωμεν τὰ ἄθροίσματα $AG + \Gamma\Delta + \Delta B$, $AE + EZ + ZH + HB$ καὶ ὅς συγκρίνωμεν ἕκαστον τούτων μὲ τὸ εὐθύγραμμον τμήμα AB.

Θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι :

$$AB < AG + \Gamma\Delta + \Delta B$$

$$AB < AE + EZ + ZH + HB$$

Αἱ ἄνωτέρω παρατηρήσεις μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὴν ἑξῆς γεωμετρικὴν πρότασιν :



Σχ. 21

Τὸ εὐθ. τμήμα εἶναι μικρότερον πάσης ἄλλης γραμμῆς, ἢ ὁποία ἔχει ἄκρα τὰ ἄκρα τοῦ εὐθ. τμήματος.

11. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

11. 1. Ἐὰς σημειώσωμεν ἐπ' εὐθείας εἰς  δύο διαδοχικὰ εὐθύγραμμα τμήματα AB καὶ BΓ, σχ. 22.

Θὰ ἔχωμεν τότε

$$AB + BΓ = AΓ \quad (1)$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ εὐθύγραμμον τμήμα BΓ* προστίθεται εἰς τὸ AB διὰ τὴν δόσιν ἄθροισμα τὸ AΓ. Διὰ τοῦτο λέγεται διαφορὰ τῶν AΓ καὶ AB.

Γράφομεν δὲ $AΓ - AB = BΓ$ (2)

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι ὑπάρχει διαφορὰ AΓ - AB ὡς ἂν τὸ AΓ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ AB.

Γενικῶς: Ἐὰν α εἶναι ἐν εὐθύγραμμον τμήμα, μεγαλύτερον ἀπὸ ἄλλο β ($\alpha > \beta$), τότε ὑπάρχει εὐθ. τμήμα γ τὸ ὁποῖον προστιθέμενον εἰς τὸ β δίδει τὸ α. Τοῦτο λέγεται διαφορὰ α μείον β.

Γράφομεν δὲ $\alpha - \beta = \gamma$

Ἡ πράξις μὲ τὴν ὁποῖαν εὐρίσκομεν τὴν διαφορὰν $\alpha - \beta$ λέγεται ἀφαίρεσις τοῦ β ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον αὐτοῦ α.

11. 2. Ἐὰς προσέξωμεν πάλιν εἰς τὰς ἰσότητας (1) καὶ (2). Κατὰ τὸν ὁρισμὸν τῆς διαφορᾶς ἐκάστη ἀπὸ αὐτὰς ἔχει ὡς συνέπειαν τὴν ἄλλην.

Ἦτοι:

$$AB + BΓ = AΓ \Rightarrow AΓ - AB = BΓ \quad (3)$$


$$AΓ - AB = BΓ \Rightarrow AB + BΓ = AΓ \quad (4)$$

Αἱ συνεπαγωγαὶ (3) καὶ (4) γράφονται ὁμοῦ ὡς ἑξῆς:

$$AB + BΓ = AΓ \iff AΓ - AB = BΓ \quad (5)$$

11. 3. Δίδονται δύο εὐθύγραμμα τμήματα AB, ΓΔ, ($AB > \Gamma\Delta$). Πῶς θὰ εὐρώμεν τὴν διαφορὰν τῶν $AB - \Gamma\Delta$;

Ἐπὶ τοῦ μεγαλύτερου τμήματος AB λαμβάνομεν σημεῖον E τοιοῦτον ὥστε $AE = \Gamma\Delta$, σχ. 23. Τὸ τμήμα EB ἰσοῦται μὲ τὴν διαφορὰν $AB - \Gamma\Delta$. Διὰ τὴν



* ὅπως καὶ ὅλα τὰ τμήματα τὰ ἴσα πρὸς τὸ BΓ

Σχ. 23

Ένα αριθμόν δ όποϊος λέγεται *αριθμητική τιμή* ή *άπλως τιμή* του *εὐθ. τμήματος*.

Π.χ. ἐάν ονομάσωμεν AB τήν μίαν πλευράν του πίνακος τῆς τάξεώς μας καί εὐρωμεν ὅτι αὕτη περιέχει 6 φορές ἀκριβῶς τήν μεγαλύτεραν πλευράν του γνώμονος, τότε ὁ ἀριθμός 6 εἶναι ἡ ἀριθμητική τιμή ἢ ἡ τιμή τῆς πλευρᾶς AB μέ μονάδα μετρήσεως τήν μεγαλύτεραν πλευράν του γνώμονος.

Ἐάν ὁμως ὡς μονάδα μετρήσεως λάβωμεν τήν μικροτέραν πλευράν του γνώμονος καί εὐρωμεν ὅτι αὕτη περιέχεται 9 φορές ἀκριβῶς εἰς τήν πλευράν AB , τότε ὁ ἀριθμός 9 εἶναι ἡ ἀριθμητική τιμή ἢ ἡ τιμή τῆς πλευρᾶς AB μέ μονάδα μετρήσεως τήν μικροτέραν πλευράν του γνώμονος.

Παρατήρησις

Ἐάν κατὰ τήν μέτρησιν ἡ μονάς M τήν όποίαν ἐκλέξαμεν δέν περιέχεται ἀκριβῶς n φορές ($n \in \mathbb{N}$) εἰς τὸ μετρούμενον τμήμα, τότε λαμβάνομεν μίαν ἄλλην μονάδα 10 ἢ 100 ἢ $1000 \dots$ φορές μικροτέραν τῆς M .

13. 2. Μονάδες μετρήσεως εὐθ. τμημάτων

Σχεδόν ὅλα τὰ κράτη διὰ τὰ διευκολύνουν τὰς συναλλαγὰς συνεφώνησαν καί ἔλαβον τήν ἰδίαν μονάδα μετρήσεως εὐθυγρ. τμημάτων.

Αὕτη εἶναι τὸ *Γ α λ λ ι κ ὸ ν μέ τ ρ ο ν** ἢ *άπλως μέ τ ρ ο ν* (m). Τοῦτο εἶναι ἴσον πρὸς τὸ $1/40.000.000$ ἐνὸς μεσημβρινοῦ τῆς γῆς.

Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι εἰς τὸ σύστημα μετρήσεων, τὸ όποϊον ἔχει ὡς βάσιν τὸ μέτρον, αἱ διάφοροι μονάδες εἶναι ἀκριβῶς 10 , 100 , 1000 φορές μεγαλύτεραι ἢ μικρότεραι αὐτοῦ. Ἦτοι ἀκολουθοῦν τὸ δεκαδικὸν σύστημα γεγονὸς τὸ όποϊόν διευκολύνει εἰς τοὺς σχετικούς ὑπολογισμούς.

I. Ὑποδιαιρέσεις τοῦ m

Τὸ δεκατόμετρον: $dm = 1/10 \quad m$

Τὸ ἑκατοστόμετρον: $cm = 1/100 \quad m$

Τὸ χιλιοστόμετρον: $mm = 1/1000 \quad m$

II. Πολλαπλάσια τοῦ m

Τὸ δεκάμετρον: $dam = 10 \quad m$

Τὸ ἑκατόμετρον: $hm = 100 \quad m$

Τὸ χιλιόμετρον: $km = 1000 \quad m$

Παραπλεύρως παραθέτομεν πίνακα ὑποδιαιρέσεων ἢ πολλαπλασιῶν τοῦ m αἱ όποῖαι χρησιμοποιοῦνται συνήθως ὡς μονάδες. Ἀπὸ τὸν πίνακα αὐτὸν προκύπτουν αἱ σχέσεις:

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$$

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} = 10000 \text{ dm} = 100000 \text{ cm}$$

* Ἄλλαι χρησιμοποιούμεναι μονάδες μήκους εἶναι αἱ ἑξῆς:

$$1 \text{ τεκτονικός πῆχυς} = 0,75 \text{ m} = 75 \text{ cm}$$

$$1 \text{ ὑάρδα (yrd)} = 0,914 \text{ m} = 91,4 \text{ cm} = 914 \text{ mm}$$

* Σήμερον τὸ μέτρον καθορίζεται ὑπὸ τοῦ προτύπου μέτρου τὸ όποϊον φυλάσσεται εἰς τὸ ἐν Σέντες τῆς Γαλλίας διεθνὲς γραφεῖον μέτρων καί σταθμῶν. Βάσει αὐτοῦ βαθμολογοῦνται μέ ἀκριβείαν οἱ συνήθεις κανόνες, μέτρα, μετροταινίαι...

Ἐκάστη ὑάρδα ὑποδιαιρεῖται εἰς 3 πόδας (ft)

Ἐκαστος ποὺς » εἰς 12 Ἴντσας (in)

Ἦτοι $1 \text{ yrd} = 3 \text{ ft} = 36 \text{ in}$

Εἰς τὴν ναυτιλίαν ἐξ ἄλλου χρησιμοποιεῖται τὸ γαλλικὸν ναυτικὸν μίλιον = 1852 m.

13. 3. Σημείωσις

Ἐὰν κατὰ τὴν μέτρησιν ἑνὸς εὐθ. τμήματος AB εὕρωμεν ὅτι ἡ μονὰς 1 cm περιέχεται εἰς αὐτὸ ἀκριβῶς 3 φορές τότε γράφομεν :

$AB = 3 \text{ cm}$ καὶ διάβάζομεν : τὸ AB ἔχει μῆκος 3 cm.

Ἦτοι ἡ γραφὴ $\Gamma\Delta = 2 \text{ m}$ σημαίνει ὅτι τὸ $\Gamma\Delta$ ἔχει μῆκος 2 m.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

27. Γράψατε ἓν εὐθύγραμμον τμήμα AB καὶ ἔπειτα ἐπαληθεύσατε ὅτι

$$2 \cdot (3 \cdot AB) = (2 \cdot 3) \cdot AB$$

28. Ἐπὶ μιᾷ εὐθείᾳ ε σημειώσατε δύο τμήματα AB καὶ $\Gamma\Delta$ τοιαῦτα, ὥστε $AB \parallel \Gamma\Delta = \emptyset$ καὶ $AB = \Gamma\Delta = 2 \text{ cm}$. Νὰ ἐξετάσετε ἐὰν $AG = BD$.

29. Εἰς τριψήφιος ἀκέρατος, π.χ. ὁ 856, παριστάνει χιλιοστὰ (mm). Ποῖον ψηφίον αὐτοῦ παριστάνει cm καὶ ποῖον dm.

30. Ἐπὶ ἡμιευθείᾳ O χ λαμβάνομεν σημεῖα A, B τοιαῦτα, ὥστε $OA = 4 \text{ cm}$ καὶ $OB = 6 \text{ cm}$. Ἐὰν M εἶναι τὸ μέσον τοῦ AB, νὰ ὑπολογισθῇ τὸ μῆκος τοῦ OM. Γενίκευσις διὰ $OA = \alpha$ καὶ $OB = \beta$.

31. Μὲ πόσα m ἰσοῦται τὸ 1/100 τοῦ γαλλικοῦ ναυτικοῦ μιλίου.


32. Μὲ πόσα mm ἰσοῦται μῆκος 2 Ἴντσῶν (in).

14. ΤΟ ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΟΝ

Εἰς τὸ ἐπίπεδον Π χαράσσομεν μίαν εὐθεῖαν ϵ . Αὕτη διαχωρίζει τὰ ἐκτὸς αὐτῆς σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου εἰς δύο «περιοχάς» I καὶ II, σχ. 25.

Τὰ σημεῖα A, B κεῖνται ἀμφοτέρα εἰς τὴν μίαν ἀπὸ τὰς περιοχὰς αὐτάς. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς εὐθείας ϵ .

Εἰς τὸ αὐτὸ σχέδιον τὰ σημεῖα Γ καὶ Δ ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ϵ ν κεῖται εἰς τὴν μίαν περιοχὴν καὶ τὸ ἄλλο εἰς τὴν ἄλλην, λέγομεν ὅτι κεῖνται ἐκ αὐτῶν ἑκαστῶν τῆς εὐθείας ϵ .



Σχ. 25

Τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου, τὰ ὁποῖα κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς εὐθείας ϵ , λέγεται ἡμιεπίπεδον.

Ἡ εὐθεῖα ϵ λέγεται ἀκμὴ τοῦ ἡμιεπιπέδου τούτου.

Εἶναι φανερὸν ὅτι ἓν ἡμιεπίπεδον ὀρίζεται ὑπὸ τῆς ἀκμῆς ϵ καὶ ἑνὸς ση-

μείου αὐτοῦ, κειμένον ἐκτὸς τῆς ϵ . Διὰ νὰ ὀνομάσωμεν ἔν ἡμιεπίπεδον ἀνα-
 φέρομεν π ρ ὦ τ ο ν τὴν ἀκμὴν καὶ ἔπειτα ἔν σημείον αὐτοῦ. Π.χ. εἰς τὸ σχέ-
 διον 25, διακρίνομεν τὸ ἡμιεπίπεδον (ϵ, A) ἢ (ϵ, B) ἢ (ϵ, Δ) καὶ τὸ ἡμιεπίπεδον
 (ϵ, Γ) .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι, ἐάν εἰς ἐπίπεδον Π δοθῇ μία εὐθεῖα ϵ ,
 τότε ὀρίζονται τρία σημειοσύνολα, ὑποσύνολα τοῦ Π . Ἡ εὐθεῖα ϵ (τὸ ἔν) καὶ
 τὰ δύο ἡμιεπίπεδα τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀκμὴν τὴν ϵ (τὰ δύο ἄλλα). Τὰ δύο ὡς
 ἄνω ἡμιεπίπεδα λέγονται ἀ ν τ ῖ θ ε τ α μεταξὺ τῶν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

33. Ἡ ἔνωση ἑνὸς ἡμιεπίπεδου καὶ τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ λέγεται κλειστὸν ἡμιεπί-
 πεδον. Ἐάν ὀνομάσωμεν K_1, K_2 τὰ δύο κλειστὰ ἡμιεπίπεδα, τὰ ὁποῖα ὀρίζονται ἐπὶ ἐπι-
 πέδου Π ὑπὸ μιᾶς εὐθείας ϵ αὐτοῦ, νὰ εὑρετε τὰ σύνολα $K_1 \cup K_2$ καὶ $K_1 \cap K_2$.


34. Εἰς ἔν ἐπίπεδον χαραξάτε δύο εὐθείας τεμνομένας καὶ σημειώσατε τὰ 4 ἡμιεπίπεδα τὰ
 ὁποῖα ὀρίζουν αὐταί.

15. Η Γ Ω Ν Ι Α

15. 1. Ὅρισμός

Χαραξοσομεν δύο ἡμιευθεῖας OA, OB μὲ κοινὴν ἀρχὴν O , σχ. 26. Σχη-
 ματίζεται τότε μία γωνία.

Γενικῶς : "Ἐκαστον ζευγὸς ἡμιευθειῶν μὲ κοινὴν ἀρχὴν λέγεται γωνία.



Αἱ δύο ἡμιευθεῖαι καλοῦνται πλευραὶ
 τῆς γωνίας ἢ δὲ κοινὴ ἀρχὴ αὐτῶν κορυφή.

Π.χ. ἡ γωνία τοῦ σχ. 26 ἔχει κορυφὴν τὸ
 σημεῖον O καὶ πλευρὰς τὰς ἡμιευθεῖας OA, OB .

Ὄνομάζομεν μίαν γωνίαν :

α) Μὲ τὸ γράμμα τῆς κορυφῆς τῆς.

β) Μὲ τρία γράμματα· ἐξ αὐτῶν τὸ μὲν
 μεσαῖον εἶναι τὸ γράμμα τῆς κορυφῆς τὰ δὲ
 ἄλλα δύο εἶναι γράμματα δύο σημείων: "Ἐν ἀπὸ

ἐκάστην πλευρὰν αὐτῆς. Π.χ. εἰς τὸ σχ. 26 εἰκονίζεται ἡ γωνία O ἢ γωνία
 AOB ἢ BOA . Ἡ συμβολικῶς : \hat{O} ἢ \hat{AOB} ἢ \hat{BOA} .

γ) Μὲ ἔν μικρὸν γράμμα τοποθετούμενον πλησίον τῆς κορυφῆς. Π.χ. διὰ
 τὴν γωνίαν τοῦ σχ. 26 λέγομεν : γωνία α ἢ συμβολικῶς $\hat{\alpha}$.


15. 2. Ἐσωτερικόν, ἐξωτερικόν γωνίας. Κυρτή, μὴ κυρτή γωνία

Εἰς τὴν γωνίαν AOB , σχ. 27α, θεωροῦμεν :

1) Τὸ ἡμιεπίπεδον (ϵ, B) . Ἦτοι τὸ ἡμιεπίπεδον τῆς εὐθείας ϵ , (τῆς πλευ-
 ρᾶς OA) καὶ ἑνὸς σημείου B τῆς πλευρᾶς OB , σχ. 27β.

ii) Τὸ ἡμιεπίπεδον (ϵ' , A). Ἦτοι τὸ ἡμιεπίπεδον τῆς εὐθείας ϵ' , (τῆς πλευρᾶς OB) καὶ ἐνὸς σημείου A τῆς πλευρᾶς OA, σχ. 27γ.


iii) Τὴν τομὴν τῶν δύο αὐτῶν ἡμιεπιπέδων (ϵ , B) \cap (ϵ' , A), σχ. 27δ. (Δι-



Σχ. 27

πλογραμμωσκιασμένον μέρος τοῦ ἐπιπέδου). Ἡ τομὴ αὕτη λέγεται ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας AOB. Τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου, τὰ ὁποῖα

δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας, οὔτε εἰς τὰς πλευρὰς αὐτῆς, λέγεται ἐξωτερικὸν τῆς γωνίας AOB. Ἡ ἔνωσις τῆς γωνίας AOB καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ αὐτῆς λέγεται κυρτὴ γωνία AOB. Ἡ ἔνωσις τῆς γωνίας AOB καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ αὐτῆς λέγεται μὴ κυρτὴ γωνία AOB.



Σχ. 28

Ὡστε: Ἐκάστη γωνία ὀρίζει μίαν κυρτὴν καὶ μίαν μὴ κυρτὴν γωνίαν.

Ἐπειδὴ εἰς τὴν τάξιν αὐτὴν θὰ ἀσχοληθῶμεν κυρίως μὲ κυρτὰς γωνίας,


εἰς τὰ ἐπόμενα ὅταν γράφωμεν γωνία AOB ἢ \widehat{AOB} , θὰ ἐννοοῦμεν τὴν κυρτὴν γωνίαν AOB. Εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν θὰ γίνεται εἰδικὴ μνεῖα.

15. 3. Σχηματισμὸς γωνίας διὰ στροφῆς

α) Οἱ δύο δεῖκται τοῦ ὥρολογίου εἰκονίζουσι δύο ἡμιευθείας κοινῆς ἀρχῆς O, αἱ ὁποῖαι στρέφονται εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν περὶ τὸ O. Εἰς ἐκάστην θέσιν ὀρίζουσι μίαν κυρτὴν καὶ μίαν μὴ κυρτὴν γωνίαν.

β) Φαντασθῆτε ὅτι δύο ἡμιευθεῖαι OA, OB συμπίπτουν, σχ. 29α, ὅπως συμβαίνει ἐνίοτε μὲ τοὺς δείκτας τοῦ ὥρολογίου. Κρατοῦμεν τὴν μίαν σταθεράν, τὴν OA καὶ στρέφωμεν* περὶ τὸ O τὴν OB (προσεχόντες ὥστε νὰ παραμένῃ αὕτη πάντοτε ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου). Εἰς ἐκάστην θέσιν ἡ OB μετὰ τῆς OA ὀρίζει μίαν κυρτὴν καὶ μίαν μὴ κυρτὴν γωνίαν, σχ. 29. Εἰδικῶς:

1) Εἰς τὸ σχ. 29δ ἡ OB ἔχει γίνῃ ἀντίθετος τῆς OA. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην λέγομεν ὅτι αἱ δύο ἀντίθετοι ἡμιευθεῖαι OA, OB σχηματίζουν εὐθεῖαν γωνίαν.



Σχ. 29

* Ἡ στροφή προφανῶς δύναται νὰ γίνῃ κατὰ δύο φοράς. Κατὰ τὴν φοράν τῆς κινήσεως τῶν δεικτῶν τοῦ ὥρολογίου ἢ κατὰ τὴν ἀντίθετον αὐτῆς. Πρὸς τὸ παρὸν δὲν θὰ λαμβάνωμεν ὑπ' ὄψιν μας κατὰ ποίαν φοράν ἐγένετο ἡ στροφή.

11) Εἰς τὸ σχ. 29στ ἡ OB ἔχει συμπίπτει μετὰ τὴν OA μετὰ ἀπὸ μίαν πλήρη στροφήν. Δι' αὐτὸ λέγομεν αἱ συμπίπτουσαι ἡμιευθεῖαι OA, OB σχηματίζουν μίαν π λ ῆ ρ η γ ω ν ῖ α ν.

Σημειώσεις

1) Ὡς ἐσωτερικὸν μιᾶς εὐθείας γωνίας λαμβάνομεν τὸ ἐν ἐκ τῶν ἡμιεπιπέδων τὰ ὁποῖα ὀρίζουν αἱ πλευραὶ αὐτῆς. Ὡς ἐσωτερικὸν μιᾶς πλήρους γωνίας λαμβάνομεν ὁλόκληρον τὸ ἐπίπεδον.


11) Ἡ γωνία ἡ ὀριζομένη διὰ στροφῆς μιᾶς ἡμιευθεῖας περὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῆς εἶναι πολὺ χρήσιμος εἰς τὴν μέτρησιν περιστροφικῶν κινήσεων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

35. Νὰ ὀνομάσετε διαφόρους γωνίας ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου.

36. Χαράξατε δύο τεμνομένας εὐθείας ϵ, ϵ' καὶ ἔπειτα χρωματίσατε τὰ 4 ἡμιεπίπεδα τὰ ὁποῖα ὀρίζουν αὐταὶ (ἕκαστον με διαφορετικὸν χρῶμα). Ποῖα εἶναι τὰ ἐσωτερικὰ τῶν τεσσάρων γωνιῶν, τὰς ὁποῖας ὀρίζουν αἱ δύο τεμνόμεναι εὐθεῖαι;

37. Ὀνομάσατε ὅλας τὰς κυρτὰς καὶ μὴ κυρτὰς γωνίας, αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται ὑπὸ τῶν ἡμιευθεῶν OA, OB, OG τοῦ παραπλεύρους σχεδίου 30.




Σχ. 30

16. ἸΣΑΙ, ΑΝΙΣΟΙ ΓΩΝΙΑΙ

16. 1. Ὅρισμοὶ

Σχεδιάζομεν δύο γωνίας AOB καὶ $A'O'B'$, σχ. 31α. Ἐπειτα μετὰ ἓν φύλλον διαφανοῦς χάρτου λαμβάνομεν τὸ ἀποτύπωμα τῆς μιᾶς, π.χ. τῆς γωνίας $A'O'B'$, καὶ τὸ ἐπιθέτομεν ἐπὶ τῆς ἄλλης, ὡς δεικνύει τὸ σχ. 31β, γ, δ. Ἦτοι αἱ μὲν



Σχ. 31

δύο πλευραὶ $OA, O'A'$ νὰ συμπίπτουν (ταυτισθοῦν) αἱ δὲ δύο ἄλλαι $OB, O'B'$ νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὸ ἐν ἀπὸ τὰ δύο ἡμιεπίπεδα, τὰ ὁποῖα ὀρίζει ἡ εὐθεῖα OA .

Ἐπὶ τούτοις τὰ ἑξῆς τρία ἐνδεχόμενα.

α) Ἡ πλευρὰ $O'B'$ νὰ εὐρεθῇ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας AOB , σχ. 31β. Λέγομεν τότε ὅτι ἡ γωνία AOB εἶναι μεγαλύτερα τῆς γωνίας $A'O'B'$.

Γράφομεν δὲ $\widehat{AOB} > \widehat{A'O'B'}$

β) Ἡ πλευρὰ $O'B'$ νὰ εὐρεθῇ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τῆς γωνίας AOB , σχ. 31γ. Λέγομεν τότε ὅτι ἡ γωνία AOB εἶναι μικρότερα τῆς γωνίας $A'O'B'$.

Γράφομεν τότε

$$\widehat{A'OB'} < \widehat{AOB}$$

γ) 'Η πλευρά $O'B'$ νά ταυτισθῆ με τὴν πλευρὰν OB , σχ. 31δ. Λέγομεν τότε ὅτι ἡ γωνία $A'O'B'$ εἶναι ἴση με τὴν γωνίαν AOB καὶ γράφομεν :

$$\widehat{A'OB'} = \widehat{AOB}$$


'Εννοεῖται ὅτι αἱ σχέσεις

$$\widehat{A'OB'} > \widehat{AOB} \quad \text{καὶ} \quad \widehat{AOB'} < \widehat{AOB}$$

ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν.

16. 2. Παρατηρήσεις

α) Εἶναι φανερόν ὅτι, ἐὰν δύο κυρταὶ γωνίαι α , β εἶναι ἴσαι, τότε καὶ αἱ ὑπ' αὐτῶν ὀριζόμεναι μὴ κυρταὶ γωνίαι α' , β' ἀντιστοίχως εἶναι ἐφαρμόσιμοι, σχ. 32. Συνεπῶς εἶναι καὶ αὐταὶ ἴσαι.



Σχ. 32

β) Δύο εὐθεῖαι γωνίαι εἶναι μεταξύ των ἴσαι.

γ) 'Εκάστη μὴ κυρτὴ γωνία εἶναι μεγαλυτέρα οἰασδήποτε κυρτῆς.

16. 3. 'Ιδιότητες τῆς ἰσότητος γωνιῶν

α) 'Εκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ἰσότητος γωνιῶν ἐννοοῦμεν ὅτι ἐκάστη γωνία εἶναι ἴση πρὸς ἑαυτήν.

$$\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha}$$

'Ανακλαστικὴ ἰδιότης

β) 'Ομοίως ἐννοοῦμεν ὅτι ἐὰν εἶναι $\widehat{\alpha} = \widehat{\beta}$, τότε θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\beta} = \widehat{\alpha}$.

'Η συμβολικῶς :

$$\widehat{\alpha} = \widehat{\beta} \Rightarrow \widehat{\beta} = \widehat{\alpha} \quad \text{Συμμετρικὴ ἰδιότης}$$

γ) 'Εὰν $\widehat{\alpha} = \widehat{\beta}$ καὶ $\widehat{\beta} = \widehat{\gamma}$ τί συνάγομεν διὰ τὰς γωνίας α καὶ γ ;

Εὐκόλως συμπεραίνομεν ὅτι καὶ $\widehat{\alpha} = \widehat{\gamma}$

'Η συμβολικῶς :

$$(\widehat{\alpha} = \widehat{\beta} \quad \text{καὶ} \quad \widehat{\beta} = \widehat{\gamma}) \Rightarrow \widehat{\alpha} = \widehat{\gamma} \quad \text{Μεταβατικὴ ἰδιότης}$$

16. 4. 'Ιδιότητες τῆς ἀνισότητος γωνιῶν

α) 'Επειδὴ ἀληθεύει ἡ ἰσότης $\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha}$ δὲν ἀληθεύουν αἱ ἀνισότητες :

$$\widehat{\alpha} > \widehat{\alpha} \quad \text{καὶ} \quad \widehat{\alpha} < \widehat{\alpha}$$

β) 'Εὰν εἶναι $\widehat{\alpha} > \widehat{\beta}$ προφανῶς δὲν θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\beta} > \widehat{\alpha}$.

γ) $(\widehat{\alpha} > \widehat{\beta} \quad \text{καὶ} \quad \widehat{\beta} > \widehat{\gamma}) \Rightarrow \widehat{\alpha} > \widehat{\gamma}$

'Ωστε: 'Η ἀνισότης γωνιῶν ἔχει τὴν μεταβατικὴν ἰδιότητα ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν ἀνακλαστικὴν καὶ τὴν συμμετρικὴν.


17. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

17. 1. Έφεξις γωνία

Εἰς τὸ σχ. 33 αἱ κυρταὶ γωνίαι AOM καὶ MOB ἔχουν τὴν πλευρὰν OM κοινὴν, τὰς δὲ πλευρὰς OA, OB, ἐκατέρωθεν τῆς εὐθείας τῆς κοινῆς πλευρᾶς OM. Διὰ τοῦτο λέγονται ἐφεξις.

Δύο κυρταὶ γωνίαι τοῦ ἐπιπέδου λέγονται ἐφεξις ὅταν ἔχουν μίαν πλευρὰν κοινὴν καὶ τὰς μὴ κοινὰς πλευρὰς αὐτῶν ἐκατέρωθεν τῆς εὐθείας τῆς κοινῆς πλευρᾶς.

Π.χ. εἰς τὸ σχ. 33 αἱ γωνίαι AOM, MOB εἶναι ἐφεξις ἐνῶ αἱ γωνίαι AOM, AOB δὲν εἶναι. (Διατί;)



Σχ. 33


17. 2. ἄθροισμα γωνιῶν.

Διὰ νὰ προσθέσωμεν δύο γωνίας α , β , σχ. 34α, τὰς καθιστῶμεν ἐφεξις, σχ. 34β. (Μὲ τὴν βοήθειαν διαφανοῦς χάρτου).


Ἡ κυρτὴ (ἢ μὴ κυρτὴ) γωνία AOB ἢ ὁποία γεννᾶται ὑπὸ μιᾶς ἡμιεὐθείας ὅταν αὐτὴ, διαγράφη διαδοχικῶς τὰς ἐφεξις κυρτὰς γωνίας α , β καὶ μόνον αὐτάς, λέγεται ἄθροισμα τῶν γωνιῶν τούτων.

Γράφομεν δὲ $\widehat{\alpha} + \widehat{\beta} = \widehat{AOB}$

Τοιοιτοτρόπως εἰς τὸ σχ. 33 τὸ ἄθροισμα τῶν κυρτῶν γωνιῶν AOM καὶ MOB εἶναι ἡ κυρτὴ γωνία AOB,



Σχ. 34



Σχ. 35


ἡ κυρτὴ γωνία AOB, εἰς τὸ σχ. 35 ἄθροισμα τῶν κυρτῶν γωνιῶν AOB καὶ BOG εἶναι ἡ μὴ κυρτὴ γωνία AOG.

17. 3. Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἄθροισμα περισσοτέρων γωνιῶν, εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων. Εἰς τὸ ἄθροισμα τοῦτο προσθέτομεν τὴν τρίτην γωνίαν κ.ο.κ.

17. 4. Ἰδιότητες

Μὲ τὴν βοήθειαν ἑνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου δυνάμεθα νὰ ἐπαλη-

θεύσωμεν ὅτι ἡ πρόσθεσις γωνιῶν εἶναι πρᾶξις μεταθετικὴ καὶ προσεταιριστικὴ.



18. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

18. 1. Ὅρισμός


Ἐὰν ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ σχ. 33. Ἐὰν εἰς τὴν γωνίαν AOM προσθέσωμεν τὴν γωνίαν MOB θὰ εὐρωμεν τὴν γωνίαν AOB. Διὰ τοῦτο ἡ γωνία MOB λέγεται **διαφορὰ** τῶν γωνιῶν AOB καὶ AOM.

Γράφομεν δέ :

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB} \quad (1)$$

Εἶναι φανερόν ὅτι ὑπάρχει διαφορὰ

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} \text{ ἔπειδὴ } \widehat{AOB} > \widehat{AOM}$$



Σχ. 37

$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB}$ καὶ $\widehat{AOM} + \widehat{MOB} = \widehat{AOB}$ ἔχει ὡς συνέπειαν τὴν ἄλλην.

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB} \Rightarrow \widehat{AOM} + \widehat{MOB} = \widehat{AOB}$$

$$\widehat{AOM} + \widehat{MOB} = \widehat{AOB} \Rightarrow \widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB}$$

Διὰ τοῦτο γράφομεν :

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB} \Leftrightarrow \widehat{AOM} + \widehat{MOB} = \widehat{AOB}$$

Γενικῶς δι' ἕκαστον ζευγὸς γωνιῶν $\hat{\alpha}$ καὶ $\hat{\beta}$ ὅπου $\hat{\alpha} > \hat{\beta}$ ἔχομεν:

$$\hat{\alpha} - \hat{\beta} = \hat{\gamma} \Leftrightarrow \hat{\beta} + \hat{\gamma} = \hat{\alpha}$$

18. 3. Εύρεσις τῆς διαφορᾶς

Διὰ τὴν εὐρεσιν τῆς διαφορᾶς δύο γωνιῶν AOB , $A'O'B'$, ἐργαζόμεθα ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχ. 37. Ἦτοι τοποθετοῦμεν τὴν μικροτέραν γωνίαν $A'O'B'$ ἐπὶ τῆς γωνίας AOB εἰς τρόπον ὥστε νὰ ταυτισθοῦν αἱ δύο πλευραὶ OA , $O'A'$ ἢ δὲ $O'B'$ νὰ εὐρεθῆ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας AOB .

Τότε ἔχομεν $\widehat{BOB'} = \widehat{AOB} - \widehat{A'O'B'}$

Εἰδικῶς ὅταν αἱ γωνίαι AOB , $A'O'B'$ εἶναι ἴσαι, τότε λέγομεν ὅτι ἡ διαφορὰ των εἶναι μηδενικὴ γωνία.

Μία μηδενικὴ γωνία ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἡμιευθείας, αἱ ὁποῖαι ταυτίζονται (συμπίπτουν) καὶ ἔχει ὡς ἐσωτερικὸν αὐτῆς τὸ κενὸν σύνολον.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

38. Πόσας συγκρίσεις χρειάζεσθε διὰ νὰ βεβαιωθῆτε ὅτι τρεῖς γωνίαι εἶναι μεταξύ των ἴσαι;

39. Χαράξατε τρεῖς γωνίας, ἔπειτα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαφανοῦς κατατάξατε αὐτάς κατὰ μέγεθος.

40. Χαράξατε τρεῖς γωνίας $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$, $\hat{\gamma}$ καὶ ἔπειτα ἐπαληθεύσατε μὲ αὐτάς ὅτι $\hat{\alpha} + (\hat{\beta} + \hat{\gamma}) = (\hat{\alpha} + \hat{\gamma}) + \hat{\beta}$.

41. Χαράξατε τρεῖς γωνίας $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$, $\hat{\gamma}$, ὅπου $\hat{\alpha} > \hat{\beta} > \hat{\gamma}$ καὶ ἐπαληθεύσατε μὲ αὐτάς ὅτι $\hat{\alpha} - \hat{\gamma} > \hat{\beta} - \hat{\gamma}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

42. Ἐπὶ εὐθείας εὐρίσκονται κατὰ σειρὰν τὰ σημεῖα A , B , Γ καὶ Δ . Εἶναι δὲ τὸ $B\Gamma$ 3 cm μεγαλύτερον τοῦ AB καὶ 2 cm μικρότερον τοῦ $\Gamma\Delta$. Νὰ εὐρετε τὰ μήκη τῶν τμημάτων τούτων ἐὰν γνωρίζετε ὅτι $A\Delta = 17$ cm.

43. Γράψατε δύο εὐθ. τμήματα α , β ($\alpha > \beta$) καὶ ἐπαληθεύσατε ὅτι $\alpha) 2(\alpha + \beta) = 2\alpha + 2\beta$, $\beta) 2(\alpha - \beta) = 2\alpha - 2\beta$, $\gamma) \alpha > \beta \Rightarrow 3 \cdot \alpha > 3 \cdot \beta$

44. Γράψατε δύο εὐθ. τμήματα α , β καὶ ἔπειτα σχηματίσατε τμήματα ἴσα μὲ $2\alpha + \beta$, $\alpha + 2\beta$.

45. Γράψατε ἓν εὐθ. τμήμα α καὶ ἐπαληθεύσατε ὅτι $2 \cdot (3 \cdot \alpha) = (2 \cdot 3) \cdot \alpha$.

46. Γράψατε τρία εὐθ. τμήματα α , β , γ καὶ ἐπαληθεύσατε ὅτι $\alpha > \beta \Rightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma$

47. Μὲ εὐθ. τμήματα α , β , γ ἐπαληθεύσατε ὅτι $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma) = (\gamma + \alpha) + \beta$.

48. Μὲ τὴν βοήθειαν ἑνὸς διαφανοῦς νὰ εὐρετε τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς τριγώνου.

49. Ὁμοίως ἑνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου.

50. Μὲ κατάλληλα εὐθ. τμήματα α , β , γ ἐπαληθεύσατε ὅτι $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

19. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΥΘΕΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ (ΑΞΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ)

19. 1. Είσαγωγή


Ἡ «συμμετρία» συνανατᾶται συχνὰ εἰς τὴν φύσιν, εἰς σχέδια, εἰς τὰς κατασκευάς. Τὴν ἀντιλαμβανόμεθα καθὼς παρατηροῦμεν ἓν φύλλον δένδρου, τὸν σκελετὸν ἑνὸς ζώου, μίαν πεταλούδαν...



19. 2. Ὅρισμός

Εἰς τὸ ἐπίπεδον Π ἑνὸς φύλλου χάρτου χαράσσομεν μίαν εὐθεῖαν ϵ . Ὅριζονται τότε δύο ἀντίθετα ἡμιεπίπεδα: Τὰ Π_1 , Π_2 , σχ. 38α.

Ἄς διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον Π περὶ τὴν εὐθεῖαν αὐτοῦ ϵ , σχ. 38β. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι τὰ δύο ἡμιεπίπεδα Π_1 , Π_2 συμπίπτουν. Ἐκαστον δὲ σημεῖον



Σχ. 38

τοῦ ἑνὸς ἡμιεπιπέδου, π.χ. τὸ σημεῖον M τοῦ Π_1 συμπίπτει μὲ ἓν σημεῖον M' τοῦ Π_2 , σχ. 38β, γ.

Τὸ σημεῖον M' λέγεται συμμετρικὸν τοῦ σημείου M ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ .

Ἄπο τὰ ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι, ἕκαστον σημεῖον τοῦ Π_1 ἔχει ἓν (καὶ μόνον ἓν) συμμετρικὸν σημεῖον ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ . Τοῦτο εὐρίσκεται ἐπὶ τοῦ Π_2 . Ὁμοίως ἕκαστον σημεῖον τοῦ Π_2 ἔχει ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ , ἓν (καὶ μόνον ἓν) συμμετρικὸν σημεῖον καὶ εὐρίσκεται τοῦτο ἐπὶ τοῦ Π_1 .

Διὰ τὰ σημεία τῆς εὐθείας ϵ παρατηροῦμεν ὅτι κατὰ τὴν δίπλωσιν ἕκα-

στον τούτων μένει ακίνητον ἢ ὅπως λέγομεν συμπίπτει (ταυτίζεται) μετὸ συμμετρικόν του.

Ἦτοι: Ἐὰν εἰς ἐπίπεδον Π δοθῆ ἡ μία εὐθεῖα ϵ , τότε μεταξύ τῶν σημείων τοῦ Π δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν μίαν ἀντιστοιχίαν τοιαύτην ὥστε: Εἰς ἕκαστον σημεῖον M τοῦ Π νὰ ἀντιστοιχῆ τὸ συμμετρικὸν M' αὐτοῦ ὡς πρὸς τὴν ϵ .

Ἡ ἀντιστοιχία αὕτη ὀνομάζεται συμμετρία ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν (ἄξονα) ϵ . Χάριν συντομίας ἀντὶ «συμμετρία ὡς πρὸς εὐθεῖαν» γράφομεν $\Sigma(\epsilon)$.

Εἰς τὴν δίπλωσιν περὶ τὴν ϵ ἀντὶ νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ M συμπίπτει μετὸ M' δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ M' συμπίπτει μετὸ M . Ἦτοι ὅτι καὶ τὸ M' εἶναι συμμετρικὸν τοῦ M .


Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ σημεῖα M, M' εἶναι μεταξύ των συμμετρικὰ ἢ ἀπλῶς συμμετρικὰ ἢ ὁμόλογα εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$.

19. 3. Ἐὰν στρέψωμεν ὁλόκληρον τὸ ἐπίπεδον Π περὶ τὴν εὐθεῖαν αὐτοῦ ϵ , κατὰ ἡμισεῖαν στροφῆν, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἕκαστον σημεῖον M αὐτοῦ ἐναλλάσσεται μετὸ συμμετρικόν του M' . (Τὸ M λαμβάνει τὴν θέσιν τοῦ M' καὶ τὸ M' τοῦ M).

20. ΕΥΘΕΙΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ. ΟΡΘΑΙ ΓΩΝΙΑΙ

20. 1. Ὁρθὴ γωνία

Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$, σχ. 39 εὐρίσκομεν* τὸ συμμετρικὸν M' ἐνὸς σημείου M , ($M \notin \epsilon$) καὶ χαράσσομεν τὸ εὐθ. τμῆμα MM' τὸ ὁποῖον τέμνει τὴν ϵ εἰς τὸ σημεῖον I .



Σχ. 39

Ἐὰν προσέξωμεν τὰς δύο γωνίας $\widehat{MIZ} = \widehat{\omega}$

καὶ $\widehat{M'IZ} = \widehat{\omega'}$.

α) Ἐχουν ἄθροισμα μίαν εὐθεῖαν γωνίαν.

$$\widehat{\omega} + \widehat{\omega'} = 1 \text{ εὐθεῖα γωνία}$$

β) Κατὰ τὴν δίπλωσιν περὶ τὴν ϵ ἡ κοινὴ πλευρὰ αὐτῶν IZ θὰ μένη ἀκίνητος αἱ δὲ

ἄλλαι πλευραὶ IM, IM' , θὰ συμπέσουν. (Τὸ I θὰ μένη ἀκίνητον, ἐνῶ τὰ M καὶ M' θὰ συμπέσουν).

Ἐκ τῆς παρατήρησιν αὐτὴν ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ γωνίαι ω, ω' εἶναι ἴσαι.

$$\widehat{\omega} = \widehat{\omega'}$$

Ἦντο: αἱ γωνίαι $\widehat{\omega}, \widehat{\omega'}$ ἔχουν ἄθροισμα μίαν εὐθεῖαν γωνίαν καὶ εἶναι ἴσαι.

* Διὰ δίπλωσεως περὶ τὴν ϵ .

Ἐκάστη τούτων λέγεται ὀρθή γωνία

Ἦτοι: **Ἐκείνη γωνία εἶναι ἡμισυ μιᾶς εὐθείας γωνίας**

Ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι ὅλαι αἱ εὐθεῖαι γωνία εἶναι ἴσαι συμπεραίνομεν ὅτι:

Ἐὰν αἱ ὀρθαὶ γωνία εἶναι ἴσαι.

20. 2. Εὐθεῖαι κάθετοι

Αἱ εὐθεῖαι MM' καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων κεῖνται αἱ πλευραὶ μιᾶς ὀρθῆς γωνίας λέγονται **κάθετοι** μεταξύ των ἢ ἀπλῶς **κάθετοι**. Διὰ τὸ νὰ γράψωμεν συντόμως ὅτι δύο εὐθεῖαι δ, δ' εἶναι κάθετοι γράφομεν:

$\delta \perp \delta'$ ἢ $\delta' \perp \delta$.

Ὅταν δύο εὐθεῖαι τέμνονται, ἀλλὰ ὄχι καθέτως, λέγομεν ὅτι τέμνονται **πλαγίως** ἢ ὅτι εἶναι μεταξύ των **πλαγίαι**.

Παραδείγματα εὐθειῶν καθέτων μεταξύ των γνωρίζομεν πολλά. (Π.χ., ἀνά δύο συνεχόμενα ἄκμια ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εἶναι τμήματα καθέτων εὐθειῶν.

20. 3. Ἐὰν ἐπανεέλθωμεν εἰς τὸ σχ. 39. Κατὰ τὴν δίπλωσιν περὶ τὴν ϵ εἶναι φανερόν ὅτι θὰ συμπέσουν καὶ τὰ τμήματα IM, IM' .

Ἦστε: Ἡ εὐθεῖα ϵ διχοτομεῖ τὸ εὐθ. τμήμα MM' καὶ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν εὐθεῖαν αὐτοῦ. Ἡ κατ' ἄλλην ἔκφρασιν: Ἡ εὐθεῖα ϵ εἶναι κάθετος πρὸς τὸ τμήμα MM' εἰς τὸ μέσον I αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ ϵ εἶναι ἡ **μέσοκάθετος** τοῦ εὐθ. τμήματος MM' .

Ἦστε: **Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$: M, M' συμμετρικὰ σημαίνει ὅτι ἡ ϵ εἶναι ἡ μέσοκάθετος τοῦ MM'**


21. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

21. 1. Νὰ κατασκευασθῇ μία ὀρθή γωνία.


Διὰ τὸ νὰ χαράξωμεν πρακτικῶς μίαν ὀρθὴν γωνίαν χρησιμοποιοῦμεν τὸν **γνώμονα** (τρίγωνον), σχ. 40α, ἐργαζόμεθα δὲ ὡς ἑξῆς:

Χαράσσομεν μίαν ἡμιευθεῖαν OA καὶ ἔπειτα τοποθετοῦμεν τὸν γνώμονα εἰς τρόπον ὥστε: Ἡ κορυφή τῆς ὀρθῆς γωνίας αὐτοῦ νὰ ταυτισθῇ μετὸ O , καὶ ἡ μία ἄκμῃ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς OA . Ἐπειτα μετὴν μίαν χεῖρα μας κρατοῦμεν σταθερῶς τὸν γνώμονα καὶ μετὴν ἄλλην χαράσσομεν τὴν ἡμιευθεῖαν OB κατὰ μῆκος τῆς ἄλλης ἄκμῆς αὐτοῦ, σχ. 40β.

Μὲ ὁμοιον τρόπον ἐλέγχομεν ἂν μία γωνία εἶναι ὀρθή ἢ ἂν δύο εὐθεῖαι εἶναι κάθετοι μεταξύ των.



(α)




Σχ. 40

(β)

21. 2. Νά χαραχθῆ κάθετος ἀπὸ σημείου A πρὸς εὐθεῖαν ε

α) Ἐὰν A κεῖται ἐπὶ τῆς ε.

Τοποθετοῦμεν τὸν γνῶμονα ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου εἰς τρόπον ὥστε ἡ μία ἀκμὴ αὐτοῦ νὰ ἐφαρμόζη ἐπὶ τῆς ε, σχ. 41β. Ἐπειτα μετακινουῦμεν τὸν γνῶμονα, προσέχοντες νὰ ἐφαρμόζη πάντοτε ἡ ἀκμὴ του ἐπὶ τῆς ε, μέχρις ὅτου ἡ κορυφὴ τῆς ὀρθῆς γωνίας ταυ-




Σχ. 41

τισθῆ μετὰ τὸ σημεῖον A, σχ. 41α. Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν χαρασσομεν τὴν εὐθεῖαν ε' ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ μοναδικὴ κάθετος πρὸς τὴν ε εἰς τὸ σημεῖον A αὐτῆς.

β) Ἐὰν τὸ A κεῖται ἐκτὸς τῆς ε.

Ἔργαζόμεθα ὡς προηγουμένως μετὰ τὴν διαφορὰν ὅτι εἰς τὴν τελικὴν θέσιν τοῦ γνῶμονος τὸ A θὰ κεῖται ἐπὶ τῆς ε'. Τοιοῦτοτρόπως, εἰς τὸ σχ. 42, ἡ εὐθεῖα ε' εἶναι κάθετος πρὸς τὴν εὐθεῖαν ε καὶ διέρχεται διὰ τοῦ σημείου A. Τὸ σημεῖον O ὅπου ἡ ε' συναντᾷ τὴν ε λέγεται ὀρθὴ προβολὴ ἢ ἀπλῶς προβολὴ τοῦ σημείου A ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν ε.




Σχ. 42

21. 3. Εἰς ἀνωτέραν τάξιν θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι :


Ἐξ ὅλων τῶν εὐθειῶν τοῦ ἐπιπέδου αἱ ὁποῖαι διέρχονται διὰ τοῦ A, ὑπάρχει μία καὶ μόνον μία κάθετος πρὸς τὴν εὐθεῖαν ε.

21. 4. Ἀπόστασις σημείου ἀπὸ εὐθείαν

Εἰς ἓν φύλλον χάρτου χαρασσομεν μίαν εὐθεῖαν ε καὶ λαμβάνομεν ἓν σημεῖον A ἐκτὸς αὐτῆς. Ἐπειτα φέρομεν τὴν κάθετον AO ἐκ τοῦ A πρὸς τὴν ε καὶ διάφορα ἄλλα εὐθ.



Σχ. 43



Σχ. 44

καὶ διάφορα ἄλλα εὐθ. τμήματα AB_1, AB_2, AB_3, AB_4 , ἐκ τοῦ σημείου A μέχρι τῆς εὐθείας ε. Ἐὰν μετὰ τὸν διαβήτην μας συγκρίνωμεν τὸ τμήμα AO μετὰ τὰ τμήματα AB_1, AB_2, AB_3 καὶ AB_4 , θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι:

Τὸ κάθετον τμήμα AO εἶναι μικρότερον παντὸς ἄλλου τμήματος ἀπὸ τὸ σημεῖον A μέχρι τῆς εὐθείας ε.

Ἦτοι: $AO < AB_1, \quad AO < AB_2, \quad AO < AB_3 \dots$

Τὸ μήκος τοῦ καθέτου τμήματος ΑΟ λέγεται ἀπόστασις τοῦ σημείου Α ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν ε.

21. 5. Νὰ εὐρεθῇ τὸ συμμετρικὸν Μ' ἐνὸς σημείου Μ εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς εὐθεῖαν ε.

α) Ἐὰν Μ κεῖται ἐκτὸς τῆς ε, σχ. 44.

Φέρομεν τὴν κάθετον ἐκ τοῦ Μ πρὸς τὴν ε. Ἐπειτα δὲ ἐπ' αὐτῆς καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ σημείου τομῆς Ι μετὰ τῆς ε, λαμβάνομεν ἴσα τμήματα $IM = IM'$.

Τὸ σημεῖον Μ' εἶναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ Μ εἰς τὴν Σ(ε). Διατί;

β) Ἐὰν Μ κεῖται ἐπὶ τῆς ε.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν, καθὼς εἶδομεν εἰς τὴν παρ. 19.2, τὸ Μ' συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ Μ', $M \equiv M'$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

51. Χαράξατε μίαν εὐθεῖαν ε καὶ νὰ λάβετε δύο σημεῖα Α, Β. Εἰς τὴν Σ(ε) νὰ εὐρετε τὰ συμμετρικὰ τῶν Α, Β καὶ τοῦ μέσου Μ τοῦ εὐθ. τμήματος ΑΒ. Τὶ παρατηρεῖτε διὰ τὴν θέσιν τοῦ συμμετρικοῦ τοῦ Μ;

52. Χαράξατε μίαν εὐθεῖαν ε καὶ δύο συμμετρικὰ σημεῖα Α, Α' ὡς πρὸς αὐτὴν. Ἐὰν Ο εἶναι ἐν σημεῖον τῆς ε συγκρίνατε τὰ τμήματα ΟΑ καὶ ΟΑ'.

53. Χαράξατε ἓν εὐθ. τμήμα ΑΒ καὶ δύο εὐθείας δ, δ' καθέτους πρὸς αὐτὸ εἰς τὰ σημεῖα Α καὶ Β ἀντιστοίχως.


54. Χαράξατε μίαν εὐθεῖαν ε καὶ ἓν εὐθ. τμήμα ΑΒ. Νὰ εὐρετε, εἰς τὴν Σ(ε), τὰ συμμετρικὰ διαφόρων σημείων τοῦ ΑΒ. Τὶ παρατηρεῖτε;

55. Κατασκευάσατε ἓν ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον.

22. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΥΘΕΙΑΝ

22. 1. Ὅρισμός

Ἐὰς λάβωμεν ἓν σχῆμα (Κ) καὶ ἄς εὐρωμεν εἰς τὴν Σ(ε) τὰ συμμετρικὰ Α', Β', Γ' ... τῶν σημείων Α, Β, Γ, ... αὐτοῦ, σχ. 45. Τὸ σχῆμα (Κ') τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ συμμετρικὰ τῶν σημείων τοῦ σχήματος (Κ) καὶ μόνον ἀπὸ αὐτά, λέγεται **συμμετρικὸν τοῦ (Κ) εἰς τὴν Σ(ε)**. Εἶναι φανερόν ὅτι καὶ τὸ σχῆμα (Κ) εἶναι συμμετρικὸν τοῦ (Κ') εἰς τὴν ἰδίαν συμμετρίαν $(K) \leftrightarrow (K')$. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ σχήματα (Κ) καὶ (Κ') εἶναι **μεταξύ των συμμετρικὰ ἢ ἀπλῶς συμμετρικὰ ἢ ὁμόλογα**.



Σχ. 45

22. 2. Ἰσότης συμμετρικῶν σχημάτων

Ἐὰς στρέψωμεν τὸ ἐπίπεδον Π περὶ τὴν εὐθεῖαν αὐτοῦ ε, κατὰ ἡμισείαν στροφῆν. Ἐκαστὸν σημεῖον τοῦ (Κ) θὰ λάβῃ τὴν θέσιν τοῦ συμμετρικοῦ του

εις τὸ σχῆμα (Κ'). Ἐπίσης ἕκαστον σημεῖον τοῦ (Κ') θὰ λάβῃ τὴν θέσιν τοῦ συμμετρικοῦ του εἰς τὸ (Κ). Ἦτοι τὰ συμμετρικὰ σχήματα (Κ) καὶ (Κ') εἶναι ἐφαρμοσίμα (ἴσα).

Ἔστω: **Εἰς τὴν Σ(ε)** τὰ συμμετρικὰ σχήματα εἶναι ἴσα.

22. 3. Σπουδαία παρατήρησις.

Εἶναι εὐκόλον νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ ἡμίσεια στροφή τοῦ ἐπιπέδου περὶ τὴν ε ἀναστρέφει* τὸ ἐπίπεδον. Συνεπῶς δύο συμμετρικὰ σχήματα εἰς τὴν Σ(ε) εἶναι ἐφαρμοσίμα μόνον ἔπειτα ἀπὸ ἀναστροφήν τοῦ ἐνὸς ἐξ αὐτῶν. Π.χ. τὰ σχήματα (Κ) καὶ (Κ') τοῦ σχ. Α' δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὰ φέρωμεν εἰς σύμπτωσιν μὲ ἀπλήν ὀλίσθησιν. Πρέπει καὶ νὰ ἀναστρέψωμεν τὸ ἐν ἐξ αὐτῶν. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ σχήματα (Κ) καὶ (Κ') εἶναι κατ' ἀναστροφήν ἴσα.

Ἔστω: **Εἰς τὴν Σ(ε)** δύο ὁμόλογα σχήματα εἶναι κατ' ἀναστροφήν ἴσα.

23. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ


23. 1. Παραπλεύρως παραθέτομεν εἰκόνας συμμετρικῶν σχημάτων. Ὅπως βλέπομεν εἶναι σχήματα κατ' ἀναστροφήν ἴσα.



23. 2. Συμμετρικὸν εὐθ. τμήματος

Ὡς εἶδομεν προηγουμένως τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς σχήματος, ὡς πρὸς εὐθεῖαν, εἶναι ἐν σχῆμα ἴσον πρὸς αὐτό.

Συνεπῶς τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς εὐθ. τμήματος AB, ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ε, εἶναι ἐν εὐθ. τμήμα A'B' ἴσον πρὸς τὸ AB. Διὰ νὰ τὸ εὕρωμεν δέ, ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν τὰ συμμετρικὰ τῶν ἄκρων τοῦ AB. Τὰ κατωτέρω σχέδια 46 δεικνύουσιν τὸ συμμετρικὸν A'B' τοῦ τμήματος AB εἰς πέντε διαφορετικὰς περιπτώσεις.



Σχ. 46

* Κάνει τὴν «ἐπάνω» ὄψιν τοῦ ἐπιπέδου «κάτω» καὶ τὴν «κάτω» ὄψιν «ἐπάνω».

Ειδικῶς εἰς τὸ σχ. 46α παρατηροῦμεν ὅτι ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν μόνον τὸ συμμετρικὸν B' τοῦ B , διότι τὸ A κεῖται ἐπὶ τῆς ϵ , συνεπῶς συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικὸν τοῦ A' .

Εἰς τὸ σχ. 46β, αἱ εὐθεῖαι τῶν συμμετρικῶν τμημάτων $AB, A'B'$ συναντοῦν τὴν ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον. (Διατί; Ποῖον εἶναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ σημείου τομῆς τῶν εὐθειῶν ϵ καὶ AB ;).

Εἰς τὸ σχ. 46γ αἱ εὐθεῖαι τῶν AB καὶ $A'B'$ εἶναι παράλληλοι μεταξύ των καὶ πρὸς τὴν ϵ .

Εἰς τὸ σχ. 46δ τὰ εὐθ. τμήματα AB καὶ $A'B'$ συναντοῦν τὴν ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον.

Εἰς τὸ σχ. 46ε τὰ $AB, A'B'$ εἶναι τμήματα τῆς αὐτῆς εὐθείας ἢ ὅποια εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ϵ . (Διατί;)

Ἔστω: α) Ἐὰν τὸ AB κεῖται ἐπὶ εὐθείας παραλλήλου πρὸς τὴν ϵ , τότε καὶ τὸ $A'B'$ κεῖται ἐπίσης ἐπὶ παραλλήλου πρὸς τὴν ϵ .

β) Ἐὰν τὸ AB τέμνῃ τὴν ϵ , τότε καὶ τὸ $A'B'$ τέμνῃ τὴν ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον.


γ) Ἐὰν τὸ AB κεῖται ἐπὶ εὐθείας καθέτου πρὸς τὴν ϵ , τότε καὶ τὸ $A'B'$ κεῖται ἐπὶ τῆς ἰδίας εὐθείας.

23. 3. Συμμετρικὸν ἡμιευθείας $O\chi$. Διχοτόμος γωνίας

α) Ὅταν O κεῖται ἐπὶ τῆς ϵ :

Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὴν συμμετρικὴν τῆς ἡμιευθείας $O\chi$ ἀρκεῖ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ συμμετρικὸν τῆς ἀρχῆς O καὶ ἑνὸς οἰουδήποτε σημείου αὐτῆς A .

Ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ O εἶναι σημεῖον τῆς ϵ , συνεπῶς συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικὸν O' αὐτῆς ($O \equiv O'$). Διὰ τοῦτο εὐρίσκομεν μόνον τὸ συμμετρικὸν A' ἑνὸς σημείου A τῆς $O\chi$ καὶ χαράσσομεν ἔπειτα τὴν ἡμιευθεῖαν OA' . Αὕτη εἶναι ἡ ζητούμενη.



Σχ. 47

Ἄς προσέξωμεν τὰς γωνίας ω, ω' τὰς ὁποίας σχηματίζουν αἱ συμμετρικαὶ ἡμιευθεῖαι OA, OA' μετὰ τῆς OZ , σχ. 47.


Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ δίπλωσις τοῦ ἐπιπέδου περὶ τὴν ϵ ἀφήνει ἀκίνητον τὴν OZ καὶ φέρει εἰς σύμπτωσιν τὰς OA, OA' . Ἀπὸ τὴν παρατήρησιν αὐτὴν ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ ἀνωτέρω γωνίαι ω καὶ ω' εἶναι ἴσαι.

Ἡ ἡμιευθεῖα OZ , ἡ ὁποία κεῖται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας AOA' καὶ τὴν χωρίζει εἰς δύο ἴσας γωνίας, λέγεται διχοτόμος αὐτῆς.

β) Ὅταν O κεῖται ἐκτὸς τῆς ϵ .

Διακρίνομεν ἰδιαιτέρως δύο περιπτώσεις:

ι) 'Η $O\chi$ τέμνει τήν ϵ και ιι) ἡ $O\chi$ κείται ἐπὶ εὐθείας παραλλήλου πρὸς αὐτήν, σχ. 48. Καί εἰς τὰς δύο περιπτώσεις τὰ ἀρχικά σημεῖα O, O' τῶν συμμετρικῶν ἡμιευθειῶν $O\chi, O'\chi'$ εἶναι συμμετρικά.



Σχ. 48


Συνεπῶς διὰ νὰ χαράξωμεν τήν $O'\chi'$ ἀρκεῖ νὰ εὐρώμεν ἐκτὸς τοῦ O' καὶ τὸ συμμετρικὸν A' ἐνὸς ἄλλου σημείου A , τῆς $O\chi$. Ἰδιαιτέρως παρατηροῦμεν ὅτι :

Εἰς τὴν α' περίπτωσιν αἱ εὐθεῖαι $O\chi, O'\chi'$ συναντοῦν τήν ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον.

Εἰς τὴν β' περίπτωσιν αἱ συμμετρικαὶ ἡμιευθεῖαι $O\chi, O'\chi'$ εἶναι παράλληλοι* μεταξύ των καὶ πρὸς τήν ϵ , κείνται δέ, πρὸς τὸ αὐτὸ ἡμιεπίπεδον ἀκμῆς OO' (ὁμόροποι).

23. 4. Συμμετρικὸν εὐθείας α

Διὰ νὰ εὐρώμεν τήν συμμετρικὴν α' τῆς εὐθείας α , ἀρκεῖ νὰ εὐρώμεν δύο οἰαδήποτε σημεῖα αὐτῆς. Ἦτοι τὰ συμμετρικά A', B' δύο τυχόντων σημείων A, B τῆς α . Διακρίνομεν ἰδιαιτέρως τέσσαρας περιπτώσεις :



Σχ. 49

α) Ὄταν ἡ α τέμνη τήν ϵ .

Τότε αἱ συμμετρικαὶ εὐθεῖαι α, α' συναντοῦν τήν ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον καὶ σχηματίζουν ἴσας γωνίας $\omega = \omega'$, με αὐτήν, σχ. 49α.

β) Ὄταν ἡ α εἶναι παράλληλος πρὸς τήν ϵ .

Τότε αἱ συμμετρικαὶ εὐθεῖαι α, α' εἶναι παράλληλοι μεταξύ των καὶ πρὸς τήν ϵ . (Διατί; Ἐάν ἡ α' ἔτεμνε τήν ϵ εἰς ἓν σημεῖον A , ποῖον θὰ ἦτο τὸ συμ-

* Δύο ἡμιευθεῖαι εἶναι παράλληλοι μεταξύ των ὅταν κείνται ἐπὶ παραλλήλων εὐθειῶν.

μετρικόν αὐτοῦ . . .). Ἐὰν διπλώσωμεν δὲ τὸ ἐπίπεδον περὶ τὴν ϵ θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι ἡ ταινία* τῶν παραλλήλων α καὶ ϵ θὰ ἔλθῃ εἰς σύμπτωσιν μὲ τὴν ταινίαν τῶν παραλλήλων ϵ καὶ α' .

Ἦτοι: Ἡ ϵ χωρίζει τὴν ταινίαν τῶν παραλλήλων α καὶ α' εἰς δύο ἴσας (ἐφαρμοσίμους) ταινίας.

γ) Ὅταν $\alpha \perp \epsilon$

Παρατηροῦμεν τότε ὅτι ἕκαστον σημεῖον τῆς α ἔχει τὸ συμμετρικόν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς α . Ἦτοι ἡ α συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς ($\alpha \equiv \alpha'$).

δ) Ὅταν $\alpha \equiv \epsilon$

Τότε ἕκαστον σημεῖον τῆς α συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικόν του. Ἦτοι ἡ α ταυτίζεται μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς ($\alpha \equiv \alpha'$).

Ἦσπερ: Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ τὸ συμμετρικόν μιᾶς εὐθείας α εἶναι μία εὐθεῖα α' καὶ ἓάν:


α) Ἡ α τέμνῃ τὴν ϵ καὶ ἡ α' τέμνῃ τὴν ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον.

β) Ἡ α εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ϵ καὶ ἡ α' εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ϵ .

γ) Ἡ α εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ϵ ἢ κεῖται ἐπ' αὐτῆς, τότε ἡ α' συμπίπτει μὲ τὴν α .

23. 5. Συμμετρικὸν γωνίας

Εἰς τὸ σχ. 50 φαίνεται τὸ συμμετρικὸν γωνίας AOB εἰς τρεῖς διαφορετικὰς περιπτώσεις. Εἶναι ὡς ἀνεμένετο, μία γωνία $A'O'B'$ κατ' ἀναστροφὴν ἴση μὲ αὐτὴν, ἔχει δὲ τὴν κορυφὴν καὶ τὰς πλευρὰς ἀντιστοίχως συμμετρικὰ τῆς κορυφῆς καὶ τῶν πλευρῶν τῆς δοθείσης γωνίας. Συνεπῶς διὰ νὰ τὴν κατασκευά-



Σχ. 50


σωμεν ἀρκεῖ νὰ κατασκευάσωμεν τὸ συμμετρικὸν τῆς κορυφῆς O καθὼς καὶ τὰ συμμετρικὰ τῶν πλευρῶν OA , OB .

* Ταινία δύο παραλλήλων λέγεται τὸ μέρος τοῦ ἐπιπέδου τὸ ὁποῖον περικλείεται ὑπ' αὐτῶν.

23. 6. Συμμετρικὸν τριγώνου

Χαράσσομεν ἓν τρίγωνον ΑΒΓ. Διὰ τὸ νὰ εὕρωμεν τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ εἰς τὴν Σ(ε) εὐρίσκομεν τὰ συμμετρικὰ τῶν κορυφῶν Α, Β, Γ, τὰ Α' Β', Γ' ἀντιστοίχως.

Τὸ τρίγωνον Α'Β'Γ' εἶναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ τριγώνου ΑΒΓ εἰς τὴν Σ(ε) (Διατί;). Ἡ διπλωσις περὶ τὴν ε φέρει εἰς σύμπτωσιν τὰ δύο αὐτὰ τρίγωνα, συνεπῶς φέρει εἰς σύμπτωσιν τὰς γωνίας καὶ τὰς πλευρὰς τοῦ ἑνὸς μὲ τὰς ὁμολόγους πρὸς αὐτὰς γωνίας καὶ πλευρᾶς τοῦ ἄλλου :



ε "Ἦτοι εἰς τὸ σχ. 51 ἔχομεν :

$$A = \hat{A}', \quad B = \hat{B}', \quad \Gamma = \hat{\Gamma}'$$

$$\text{καὶ} \quad AB = A'B' \quad B\Gamma = B'\Gamma', \quad \Gamma A = \Gamma'A'$$

Γενικῶς διὰ δύο συμμετρικὰ εὐθ. σχήματα (K), (K') δυνάμεθα νὰ διατυπώσωμεν τὸν ἑξῆς κανόνα :

"Όταν δύο εὐθ. σχήματα (K), (K') εἶναι συμμετρικὰ ὡς πρὸς εὐθείαν τότε τὰ ὁμολογὰ στοιχεῖα αὐτῶν εἶναι ἴσα.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

56. Νὰ εὕρετε τὸ συμμετρικὸν ἑνὸς εὐθ. τμήματος ΑΒ ὡς πρὸς εὐθείαν ε κάθετον πρὸς αὐτὸ εἰς τὸ Α.

57. Νὰ εὐρεθῇ ἡ συμμετρικὴ μιᾶς ἡμιευθείας Οχ ὡς πρὸς εὐθείαν ε κάθετον πρὸς τὴν εὐθείαν τῆς Οχ. (Διακρίνατε δύο περιπτώσεις).

58. Νὰ εὕρετε τὰ συμμετρικὰ (K'), (K'') ἑνὸς σχήματος (K) ὡς πρὸς δύο εὐθείας ε, ε'. Τί παρατηρεῖτε; (Λάβετε ὡς σχῆμα (K) ἓν τετράπλευρον).

59. Νὰ σχεδιάσετε ἓν ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον καὶ νὰ εὕρετε τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ:

α) Ὡς πρὸς τὴν εὐθείαν μιᾶς πλευρᾶς αὐτοῦ.

β) Ὡς πρὸς τὴν εὐθείαν μιᾶς διαγωνίου αὐτοῦ.

60. Νὰ χαράξετε μίαν εὐθείαν ε, μίαν ἡμιευθεῖαν Οχ, (ὄπου Ο, κεῖται ἐπὶ τῆς ε) καὶ τὴν συμμετρικὴν αὐτῆς Οχ' ὡς πρὸς τὴν ε. Ἐπειτα ἐπὶ τῶν ἡμιευθεῖων Οχ, Οχ' δύο ἴσα τμήματα ΟΑ = ΟΑ' καὶ νὰ ἐξετάσετε, χωρὶς ὄργανα, ἐὰν τὰ σημεῖα Α, Α' εἶναι συμμετρικά.

61. Ἐπὶ εὐθείας ε φέρομεν κάθετον δ, ἡ ὁποία τέμνει τὴν ε εἰς τὸ σημεῖον Α. Ἐπὶ τῆς δ καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ Α λαμβάνομεν δύο ἴσα τμήματα ΑΒ καὶ ΑΒ'. Ἐὰν Ο εἶναι τυχὸν σημεῖον τῆς ε νὰ δικαιολογήσετε ὅτι τὰ τμήματα ΟΒ καὶ ΟΒ' εἶναι ἴσα.

24. ΑΞΩΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

24. 1. Ὅρισμός

Γνωρίζομεν ὅτι ἐὰν μία εὐθεῖα δ εἶναι κάθετος πρὸς εὐθείαν ε, τότε εἰς τὴν Σ(ε) ἡ δ συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς δ' (23.4.). Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ εὐθεῖα δ ἔχει τὴν εὐθείαν ε ἄξονα συμμετρίας.

Γενικῶς: Ἐὰν εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ ἔν σχῆμα (Κ) συμπίπτῃ μὲ τὸ συμμετρικόν του (Κ'), τότε λέγομεν ὅτι τὸ σχῆμα (Κ) ἔχει τὴν εὐθεῖαν ϵ ἄξονα συμμετρίας.

24. 2. Παραδείγματα

α) Τὰ σχήματα τοῦ σχ. 52 ἔχουν ἄξονα συμμετρίας.

β) Μία εὐθεῖα δ ἔχει ἑκάστην κάθετον πρὸς αὐτὴν ἄξονα συμμετρίας.

Ἄλλὰ καὶ εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὸν ἑαυτὸν της, ἡ δ συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν της. $\delta \equiv \delta'$.

Ἦτοι: **Ἐκάστη εὐθεῖα ἔχει ἀπείρους ἄξονας συμμετρίας τὸν ἑαυτὸν της καὶ πᾶσαν κάθετον πρὸς αὐτὴν.**

γ) Ἄς εὐρώμεν τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς εὐθ. τμήματος AB ὡς πρὸς τὴν μεσοκάθετον μ αὐτοῦ, σχ. 53.

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὴν $\Sigma(\mu)$ τὰ σημεῖα A καὶ B εἶναι ὁμόλογα (διατί;) Ἄλλὰ καὶ ἕκαστον σημεῖον M τοῦ AB ἔχει τὸ ὁμόλογόν του M' ἐπὶ τοῦ AB. Ἦτοι εἰς τὴν $\Sigma(\mu)$ τὸ τμήμα AB συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικόν του. Μὲ ἄλλους λόγους τὸ AB ἔχει τὴν μεσοκάθετον αὐτοῦ μ ἄξονα συμμετρίας.

Ἐξ ἄλλου καὶ εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ ἐπὶ τῆς ὁποίας κεῖται τὸ AB τὸ τμήμα τοῦτο συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικόν του. (Διατί);

Σχ. 53


Ἔστω: **Ἐν εὐθ. τμήμα ἔχει δύο ἄξονας συμμετρίας, τὴν μεσοκάθετον αὐτοῦ καὶ τὴν εὐθεῖαν ἐπὶ τῆς ὁποίας κεῖται.**

δ) Μία ἡμιευθεῖα OX ἔχει μοναδικὸν ἄξονα συμμετρίας τὴν εὐθεῖαν ἐπὶ τῆς ὁποίας κεῖται αὕτη (Διατί;)

ε) Ἄς ἀναζητήσωμεν ἄξονα συμμετρίας μιᾶς γωνίας AOB. Πρὸς τοῦτο εὐρίσκομεν τὴν διχοτόμον* αὐτῆς OZ καὶ στρέφομεν περὶ αὐτὴν τὸ ἐπίπεδον κατὰ ἡμισείαν στροφήν, σχ. 54. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι:

α) Ἡ διχοτόμος OZ μένει ἀκίνητος.

β) Αἱ πλευραὶ OA, OB ἐναλλάσσονται. (Ἐκάστη τούτων λαμβάνει τὴν θέσιν τῆς ἄλλης).



Σχ. 54

* Ἐπὶ τοῦ παρόντος εὐρίσκομεν τὴν διχοτόμον, ἐὰν διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον τῆς γωνίας εἰς τρόπον ὥστε ἑκάστη πλευρὰ αὐτῆς νὰ ἔλθῃ εἰς σύμπτωση μὲ τὴν ἄλλη.

Ἦτοι εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ ἡ γωνία AOB συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς.

Συμπέρασμα :

Ἐκάστη γωνία ἔχει ἄξονα συμμετρίας τὴν εὐθεῖαν τῆς διχοτόμου αὐτῆς.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

62. Νὰ εὑρετε σύμβολα (ἀριθμοὺς, γράμματα) τὰ ὁποῖα ἔχουν ἓνα ἢ περισσοτέρους ἀξονας συμμετρίας.

63. Σχεδιάσατε ἓν ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον καὶ μὲ διπλώσεις προσπαθήσατε νὰ εὑρετε ἀξονας συμμετρίας αὐτοῦ. Τὸ αὐτὸ ἐπαναλάβετε καὶ εἰς ἓν τετράγωνον.

64. Εἰς ἓν φύλλον τετραγωνισμένου χάρτου σχεδιάσατε ἓν εὐθύγραμμον σχῆμα, τὸ ὁποῖον νὰ ἔχη ὡς ἀξονα συμμετρίας μίαν εὐθεῖαν τῆς ἐκλογῆς σας.

65. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς $O\chi$ γωνίας $\chi O\psi$ λαμβάνομεν δύο σημεῖα A, B καὶ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς $O\psi$ δύο σημεῖα A', B' τοιαῦτα ὥστε : $OA=OA', OB=OB'$.

α) Εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας νὰ εὑρετε τὰ ὁμόλογα τῶν $A, B, OA, OB, AA', AB', A'B$.

β) Διατὶ αἱ εὐθεῖαι AB' καὶ $A'B$ τέμνονται ἐπὶ τῆς διχοτόμου;


25. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΥ

25. 1. Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας λαμβάνομεν σημεῖον O καὶ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ δύο ἴσα τμήματα $OA=OB$, σχ. 55. Ἐπειτα φέρομεν τὴν εὐθεῖαν ϵ κάθετον πρὸς τὴν AB εἰς τὸ σημεῖον O αὐτῆς. Ἦτοι τὴν μεσοκάθετον τοῦ τμήματος AB .

Ἄς συγκρίνωμεν τὰς ἀποστάσεις MA, MB ἑνὸς σημείου M τῆς ϵ ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ AB .

Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ παρατηροῦμεν ὅτι τὰ A, B εἶναι μεταξύ των ὁμόλογα ἐνῶ τὸ M εἶναι ὁμόλογον πρὸς ἑαυτό. Συνεπῶς καὶ τὰ τμήματα MA, MB , εἶναι ὁμόλογα καὶ ἴσα.

$$MA=MB$$



Σχ. 55

Εἶναι φανερὸν ὅτι ὅπως εἰργάσθημεν μὲ τὸ σημεῖον M εἶναι δυνατὸν νὰ ἐργασθῶμεν μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο σημεῖον τῆς ϵ .

Ἦτοι: M κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκάθετου τοῦ $AB \Rightarrow MA=MB$ (1)

25. 2. Ἄς λάβωμεν μὲ τὸν διαβήτην μας ἓν σημεῖον M τοῦ ἐπιπέδου, τοιοῦτον ὥστε $MA=MB$, καὶ ἄς φέρωμεν τὴν διχοτόμον MO τῆς γωνίας AMB , σχ. 55.

Εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν MO γνωρίζομεν ὅτι αἱ πλευραὶ MA, MB τῆς γωνίας AMB εἶναι ὁμόλογα.

Ἦτοι : Εἰς τὴν δίπλωσιν περὶ τὴν MO αἱ πλευραὶ MA, MB θὰ συμπίσουν. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι $MA=MB$, θὰ συμπίσουν καὶ τὰ σημεῖα A καὶ B . Αὐτὸ σημαίνει

ὅτι καὶ τὰ A, B εἶναι ὁμόλογα. Συνεπῶς ἡ εὐθεῖα $MO = \epsilon$ εἶναι ἡ μεσοκάθετος τοῦ AB .

Ὡστε: $MA = MB \Rightarrow M$ κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου τοῦ AB . (2)

Μὲ τὰ ὄργανά σας δύνασθε νὰ ἐπαληθεύσετε ὅτι εἰς τὸ ἐπίπεδον ὁποιοδήποτε σημεῖον N , ἐκτὸς τῆς μεσοκαθέτου τοῦ AB , ἀπέχει ἄνισον ἀπὸ τὰ ἄκρα A καὶ B τοῦ AB .

25. 3. Αἱ ἀνωτέρω προτάσεις διὰ τὴν μεσοκάθετον διατυπώνονται ὁμοῦ ὡς ἑξῆς:

Εἰς τὸ ἐπίπεδον τὰ σημεῖα τῆς μεσοκαθέτου πρὸς εὐθ. τμῆμα AB καὶ μόνον αὐτὰ ἀπέχουν ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰ ἄκρα αὐτοῦ.

Ἡ συμβολικῶς:

$$MA = MB \iff M \text{ κεῖται εἰς τὴν μεσοκάθετον τοῦ } AB$$

Μία ἄλλη διατύπωσις τῆς ἰδίας προτάσεως εἶναι ἡ ἀκόλουθος:

Ὁ γεωμετρικὸς τόπος* τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου, τὰ ὁποῖα ἀπέχουν ἐξ ἴσου ἀπὸ δύο σημεία A καὶ B αὐτοῦ, εἶναι ἡ μεσοκάθετος πρὸς τὴν AB .

26. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ


26. 1. Χαράσσομεν δύο εὐθείας δ, ϵ καθετοῦς μεταξύ των, σχ. 56.

Ποῖον εἶναι τὸ συμμετρικὸν τῆς δ εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$;

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ δ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ϵ . Ἄρα συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς ($\delta \equiv \delta'$).

Ὡστε: Ἐὰν δύο εὐθεῖαι εἶναι κάθετοι μεταξὺ των, τότε ἐκάστη τούτων συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν ἄλλην.

Ἡ συμβολικῶς: Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$: $\delta \perp \epsilon \Rightarrow \delta \equiv \delta'$.



Σχ. 56

26. 2. Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ μία εὐθεῖα $\delta \neq \epsilon$ συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς ($\delta \equiv \delta'$). Ποῖα εἶναι ἡ θέσις τῆς δ ὡς πρὸς τὴν ϵ ;

Σκεπτόμεθα ὅτι: Ἐφ' ὅσον ἡ δ συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς πρέπει τὸ συμμετρικὸν M' τυχόντος σημείου M τῆς δ νὰ κεῖται ἐπὶ τῆς δ . Ἀλλὰ ἡ MM' εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ϵ . Ἦτοι ἡ δ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ϵ .

* Ἡ ἔννοια καὶ ὁ ὅρος «γεωμετρικὸς τόπος» ὀφείλεται εἰς τὸν διάσημον Ἑλληνα φιλόσοφον καὶ μαθηματικὸν τῆς ἀρχαιότητος Πλάτωνα.

Ὡστε: Ἐάν εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ μία εὐθεῖα $\delta \neq \epsilon$ συμπίπτῃ μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς, τότε αἱ εὐθεῖαι δ καὶ ϵ εἶναι κάθετοι μεταξὺ τῶν.

Ἡ συμβολικῶς: Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$: $\delta \equiv \delta' \Rightarrow \delta \perp \epsilon$ (2)

26. 3. Αἱ συνεπαγωγαὶ (1) καὶ (2) γράφονται ὁμοῦ ὡς ἑξῆς:

$$\boxed{\text{Εἰς τὴν } \Sigma(\epsilon) : \delta \perp \epsilon \iff \delta \equiv \delta', \quad \delta \neq \epsilon}$$

Ἴνα εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ μία εὐθεῖα $\delta \neq \epsilon$ συμπίπτῃ μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ϵ .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


66. Ἐάν M, M' εἶναι ἓν ζεῦγος σημείων συμμετρικῶν ὡς πρὸς εὐθείαν ϵ καὶ N ἓν σημεῖον τῆς ϵ , τί συνάγετε διὰ τὰ τμήματα NM καὶ NM' ;

67. Ἐάν τὸ σημεῖον N τῆς προηγουμένης ἀσκήσεως κεῖται ἐκτὸς τῆς εὐθείας ϵ , τί συνάγετε διὰ τὰ τμήματα NM καὶ NM' ;


68. Χαράξατε μίαν εὐθείαν ϵ καὶ ἐκ σημείου M ἐκτὸς τῆς ϵ φέρατε τὴν κάθετον MO πρὸς αὐτήν. Ἐπειτα φέρατε ἐκ τοῦ M δύο πλάγιας πρὸς τὴν ϵ . Εἰς ποίαν περίπτωσιν τὰ τμήματα τῶν πλαγίων ἀπὸ τὸ M μέχρι τῆς ϵ εἶναι ἴσα;

69. Σχηματίσατε μίαν γωνίαν $\chi O \psi$ καὶ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς $O\chi$ σημειώσατε ἓν σημεῖον A . Νὰ εὐρεθῇ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς $O\psi$ ἓν σημεῖον B τὸ ὅποιον νὰ ἀπέχη ἕξ ἴσου ἀπὸ τὴν κορυφὴν O καὶ ἀπὸ τὸ σημεῖον A .


27. ΟΞΕΙΑΙ, ΑΜΒΛΕΙΑΙ ΓΩΝΙΑΙ



Σχ. 57



Σχ. 58



Σχ. 59

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὀρθὴν γωνίαν, τὴν εὐθείαν γωνίαν καὶ τὴν πλήρη γωνίαν τὰς ὁποίας ἔχομεν γνωρίσει, ὑπάρχει καὶ πλῆθος διαφόρων ἄλλων γωνιῶν.

27. 1. Ὁξεία γωνία

Ἐκάστη γωνία μικρότερα τῆς ὀρθῆς λέγεται ὀξεία γωνία.

27. 2. Ἀμβλεία γωνία

Ἐκάστη γωνία μεγαλύτερα τῆς ὀρθῆς καὶ μικρότερα τῆς εὐθείας γωνίας λέγεται ἀμβλεία γωνία.

28. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ, ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΚΟΡΥΦΗΝ ΓΩΝΙΑΙ


28. 1. Συμπληρωματικά

Χαράσσομεν μίαν ὀρθήν γωνίαν καὶ φέρομεν μίαν ἡμιευθείαν OM εἰς τὸ ἔσωτερικὸν αὐτῆς, σχ. 60.


Αἱ γωνίαι AOM καὶ MOB ἔχουν ἄθροισμα μίαν ὀρθήν γωνίαν.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἐκάστη τούτων εἶναι συμπληρωματικὴ τῆς ἄλλης. Ἡ ὅτι εἶναι μεταξύ των συμπληρωματικά.

Γενικῶς: Δύο γωνίαι λέγονται συμπληρωματικά ὅταν ἔχουν ἄθροισμα μίαν ὀρθήν γωνίαν



Σχ. 60



Σχ. 61

28. 2. Παραπληρωματικά

Εἰς τὸ σχ. 61 αἱ γωνίαι O_1 καὶ O_2 ἔχουν ἄθροισμα μίαν εὐθείαν γωνίαν. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἐκάστη τούτων εἶναι παραπληρωματικὴ τῆς ἄλλης ἢ ὅτι εἶναι μεταξύ των παραπληρωματικά.

Γενικῶς: Δύο γωνίαι λέγονται παραπληρωματικά ὅταν ἔχουν ἄθροισμα μίαν εὐθείαν γωνίαν.

28. 3. Παρατηρήσεις


Εἰς τὰ σχήματα 60, 61 αἱ γωνίαι ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι συμπληρωματικά ἢ παραπληρωματικά εἶναι καὶ ἐφεξῆς. Ἡτοι αἱ γωνίαι AOM καὶ MOB , σχ. 60, εἶναι ἐφεξῆς συμπληρωματικά ἔνῳ αἱ γωνίαι O_1 καὶ O_2 , σχ. 61, εἶναι ἐφεξῆς παραπληρωματικά.

28. 4. Κατὰ κορυφήν γωνίαι

Ἐὰν προσέξωμεν τὰς γωνίας O_1, O_2 τοῦ σχ. 62. Αἱ πλευραὶ τῆς μιᾶς εἶναι ἀντίθετοι τῶν πλευρῶν τῆς ἄλλης ἀντιστοίχως. Διὰ τοῦτο λέγονται κατὰ κορυφήν γωνίαι.

Ἔστω: Δύο γωνίαι λέγονται κατὰ κορυφήν ἔὰν αἱ πλευραὶ τῆς μιᾶς εἶναι ἡμιευθεῖαι ἀντίθετοι τῶν πλευρῶν τῆς ἄλλης.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εἰς τὸ αὐτὸ σχέδιον καὶ αἱ γωνίαι O_3, O_4 εἶναι κατὰ κορυφήν.



σχ. 62

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

70. Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ὀργάνων σας χαράξατε μίαν ὀξεῖαν γωνίαν καὶ ἔπειτα μίαν συμπληρωματικὴν καὶ μίαν παραπληρωματικὴν αὐτῆς.

71. Εἶναι δυνατόν δύο ὀξεῖαι γωνίαὶ ἢ δύο ἀμβλείαι γωνίαὶ νὰ εἶναι παραπληρωματικά;

72. Δύο παραπληρωματικά γωνίαὶ εἶναι ἴσαι. Τί συμπεραίνετε δι' ἐκάστην τούτων;

73. Χαράξατε δύο εὐθείας τεμνομένης και εὑρετε ὄλα τὰ ζεύγη τῶν παραπληρωματικῶν γωνιῶν τὰ ὅποια ὑπάρχουν εἰς τὸ σχέδιον αὐτό.

74. Διατί ὅταν δύο γωνίαί εἶναι παραπληρωματικά τῆς αὐτῆς γωνίας εἶναι ἴσαι; Μὲ τὴν βοήθειαν τούτου ἀποδείξατε ὅτι δύο κατὰ κορυφήν γωνίαί εἶναι ἴσαι.

29. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

29. 1. Εἰς τὰς κατασκευάς, εἰς τοὺς ὑπολογισμούς, εἰς τὴν τεχνικὴν ἔχομεν ἀνάγκην μετρήσεως γωνιῶν. Ὅταν μετρῶμεν μίαν γωνίαν κυρτὴν ἢ μὴ κυρτὴν, δὲν μετροῦμεν φυσικὰ τὰς πλευράς, οὔτε τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῆς, ἀλλὰ πόσῃν περιστροφῇ ὀρίζει αὕτη.

29. 2. Ἀριθμητικὴ τιμὴ γωνίας

Ὅπως εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν εὐθυγράμμων τμημάτων, διὰ νὰ μετρήσωμεν μίαν γωνίαν πρέπει πρῶτον νὰ ἐκλέξωμεν μίαν ὠρισμένην γωνίαν ὡς μονάδα. Ἐπειτα νὰ εὑρωμεν πόσας φοράς περιέχει ἡ δοθεῖσα γωνία τὴν μονάδα καὶ τὰ μέρη αὐτῆς.

Προκύπτει τοιοῦτοτρόπως εἰς ἀριθμὸς ὁ ὁποῖος λέγεται ἀριθμητικὴ τιμὴ ἢ τιμὴ τῆς γωνίας.

29. 3. Μονάδες μετρήσεως γωνιῶν

Συνήθεις μονάδες μετρήσεως γωνιῶν, εἶναι ἡ ὀρθὴ γωνία (L), ἡ γωνία μιᾶς μοίρας (1°) καὶ ἡ γωνία ἑνὸς βαθμοῦ (1 gr).

α) Ἡ γωνία μιᾶς μοίρας ἰσοῦται μὲ τὸ $1/90$ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἢ τὸ $1/360$ τῆς πλήρους γωνίας.

$$1^\circ = 1/90 L$$

Ἐκάστη γωνία μιᾶς μοίρας ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 γωνίας τοῦ ἑνὸς πρώτου λεπτοῦ ($1'$). Ἐκάστη δὲ γωνία ἑνὸς πρώτου λεπτοῦ ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 γωνίας τοῦ ἑνὸς δευτέρου λεπτοῦ ($1''$).

Ἦτοι:

$$1^\circ = 60', \quad 1' = 60''$$

β) Ἐκάστη γωνία ἑνὸς βαθμοῦ ἰσοῦται μὲ $1/100$ τῆς ὀρθῆς γωνίας
Κατὰ τὰ ἀνωτέρω:

Μία πλήρης γωνία ἰσοῦται μὲ 4 L ἢ 360° ἢ 400 gr

Μία εὐθεῖα γωνία ἰσοῦται μὲ 2 L ἢ 180° ἢ 200 gr

29. 4. Σημειώσεις

Ἐὰν κατὰ τὴν μέτρησιν μιᾶς γωνίας ω εὑρωμεν ὅτι ἡ μονὰς μία μοίρα περιέχεται εἰς αὐτὴν π.χ. ἀκριβῶς 60 φοράς τότε γράφομεν:

$$\widehat{\omega} = 60^\circ$$

29. 5. Γωνιόμετρον (Μοιρογωνμόνιον)

Διὰ τὴν μέτρησιν γωνιῶν χρησιμοποιοῦμεν συχνὰ τὸ γωνιόμετρον


Τὸ ὄργανον τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν ἡμικύκλιον, μετάλλινον ἢ πλαστικόν, διηρημένον εἰς 180 ὑποδιαίρέσεις ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ ἀντιστρόφως. Αἱ ἐνδείξεις ἀναγράφονται ἀνά 10° . Ἀναφέρομεν κατωτέρω παραδείγματα δύο χρήσεων τοῦ γωνιομέτρου.

29. 6. Νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ δοθείσης γωνίας AKB , σχ. 63.


Τοποθετοῦμεν τὸ γωνιόμετρον εἰς τρόπον ὥστε νὰ ταυτισθοῦν:

α) Τὸ κέντρον O αὐτοῦ, μὲ τὴν κορυφὴν K τῆς γωνίας, καὶ β) ἡ διάμετρος τοῦ γωνιομέτρου μὲ τὴν μίαν πλευρὰν KA τῆς γωνίας. (Ἡ πλευρὰ KA νὰ διέρχεται διὰ τοῦ μηδενὸς τῆς κλίμακος μετρήσεως).

Ἦδη ἀρκεῖ νὰ ἀναγνώσωμεν εἰς τὴν βαθμολογημένην κλίμακα τὴν ἐν-



Σχ. 63



Σχ. 64

δειξιν τὴν ὁποίαν δεικνύει ἡ πλευρὰ KB . Π.χ. ἡ γωνία AKB τοῦ σχ. 63 εἶναι περίπου 130°

29. 7. Νὰ κατασκευασθῇ γωνία 80° μὲ μίαν πλευρὰν δοθείσαν ἡμιευθεῖαν OA .

Τοποθετοῦμεν τὸ γωνιόμετρον εἰς τρόπον ὥστε νὰ ταυτισθῇ:

α) τὸ κέντρον αὐτοῦ O μὲ τὴν ἀρχὴν O τῆς δοθείσης ἡμιευθείας καὶ β) ἡ διάμετρος τοῦ γωνιομέτρου μὲ τὴν ἡμιευθεῖαν OA .

(Ἡ OA νὰ διέρχεται ἐκ τοῦ μηδενὸς τῆς κλίμακος).

Ἐπειτα χαράσσομεν τὴν ἡμιευθεῖαν OB ἡ ἧποία διέρχεται ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς ἐνδείξεως 80° τοῦ γωνιομέτρου, σχ. 64.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

75. Μία γωνία εἶναι διπλασία μιᾶς συμπληρωματικῆς τῆς. Νὰ εὑρετε εἰς μοίρας, εἰς βαθμοὺς καὶ εἰς ὄρθας, ἐκάστην τῶν γωνιῶν αὐτῶν.

76. Μία γωνία ὑπερβαίνει τὴν παραπληρωματικὴν αὐτῆς κατὰ 30° . Νὰ ὑπολογίσετε ἐκάστην τῶν δύο αὐτῶν γωνιῶν.

30. 1. Όρισμός

α) Είς εν επίπεδον σημειώσατε σημείον O και με την βοήθειαν του διαβήτου, εύρετε διάφορα άλλα σημεία $M_1, M_2, M_3 \dots$ τὰ ὅποια ἀπέχουν 4 cm ἀπὸ τὸ O , σχ. 65.

Ποῖον εἶναι τὸ σχῆμα τῶν σημείων αὐτῶν;

β) Στερεώνομεν τὰ σκέλη τοῦ διαβήτου μας ὥστε νὰ μὴ μεταβάλλεται ἡ γωνία αὐτῶν. Ἐπειτα, στηρίζομεν τὴν αἰχμὴν τοῦ ἑνὸς σκέλους εἰς ἐν σημείον O ἑνὸς ἐπιπέδου καὶ περιφέρομεν τὸν διαβήτην εἰς τρόπον ὥστε ἡ γραφίς τοῦ ἄλλου σκέλους νὰ ἐγγίζη συνεχῶς τὸ ἐπίπεδον. Τοιοιυτρόπως ἡ γραφίς χαράσσει μίαν γραμμὴν, σχ. 66, τῆς ὁποίας ὄλα τὰ σημεία ἀπέχουν ἐξ ἴσου ἀπὸ τὸ σημείον O .


γ) Ἐάν εἰς τὸ ἐπίπεδον δοθῇ ἐν σημείον O καὶ ἐν εὐθ. τμῆμα α , τότε τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου τὰ ὅποια ἀπέχουν ἀπὸ τὸ O ἀπόστασιν ἴσην με α , λέγεται κύκλος.

Τὸ σημείον O λέγεται κέντρον καὶ τὸ τμῆμα α ἀκτίς τοῦ κύκλου. Ἐπειδὴ ὁ κύκλος ὀρίζεται ἐὰν γνωρίζωμεν τὸ κέντρον O καὶ τὴν ἀκτίνα α αὐτοῦ, συμβολίζεται (O, α) .


30. 2. Στοιχεῖα τοῦ κύκλου

α) Ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ σημεία


1) Εἰς τὸ σχ. 67 τὸ σημείον A ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρον O ἀπόστασιν



Σχ. 65



Σχ. 66



Σχ. 67

μικροτέρην τῆς ἀκτίνας α , ($OA < \alpha$) καὶ λέγεται ἐσωτερικὸν σημείον τοῦ κύκλου (O, α) . Εἰς τὸ αὐτὸ σχέδιον τὸ σημείον B ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρον O ἀπόστασιν OB μεγαλυτέραν τῆς ἀκτίνας α , ($OB > \alpha$) καὶ λέγεται ἐξωτερικὸν σημείον τοῦ κύκλου (O, α) .

Τὸ σύνολον τῶν ἐσωτερικῶν σημείων τοῦ κύκλου λέγεται ἐσωτερικὸν τοῦ κύκλου. Τὸ σύνολον τῶν ἐξωτερικῶν σημείων τοῦ κύκλου λέγεται ἐξωτερικὸν τοῦ κύκλου.

Ἦτοι :

$OA < \alpha \iff A$ κείται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ κύκλου.

$OM = \alpha \iff M$ κείται ἐπὶ τοῦ κύκλου

$OB > \alpha \iff B$ κείται εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τοῦ κύκλου.

β) Χορδὴ, διάμετρος, τόξον.


Ἐὰν A, B εἶναι δύο σημεῖα τοῦ κύκλου, τότε τὸ εὐθ.

τμήμα AB λέγεται χορδὴ τοῦ κύκλου.

Εἰδικῶς ἐὰν μία χορδὴ $\Gamma\Delta$ διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου O τοῦ κύκλου, αὕτη λέγεται διάμετρος τοῦ κύκλου, σχ. 68.

Ἐκάστη χορδὴ, π.χ. ἡ χορδὴ AB , σχ. 68, χωρίζει τὸν κύκλον εἰς δύο μέρη τὰ ὁποῖα κείνται ἐκατέρωθεν αὐτῆς. Ἐκαστὸν τούτων λέγεται τόξον.

Ἦτοι ἡ χορδὴ AB ὀρίζει εἰς τὸν κύκλον δύο τόξα μὲ ἄκρα τὰ σημεῖα A καὶ B .



Σχ. 68

31. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

31. 1. Εἶναι φανερὸν ὅτι ἐκάστη διάμετρος ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἀκτίνων.

Ἄρα: **Ἄλλαι αἱ διαμέτροι κύκλου εἶναι ἴσαι.**

31. 2. Ἄς χαραξωμεν μὲ τὸν διαβήτην ἕνα κύκλον, μίαν διάμετρον AB αὐτοῦ καὶ ἄς διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου περὶ τὴν διάμετρον AB .

Ἡ δίπλωσις αὕτη :

α) Θὰ ἀφήσῃ ἀκίνητον τὸ κέντρον O τοῦ κύκλου.


β) Θὰ φέρῃ τυχὸν σημεῖον M αὐτοῦ εἰς σημεῖον M' καὶ θὰ εἶναι $OM = OM'$. (Διατί;).

Ἦτοι, θὰ φέρῃ ἕκαστον σημεῖον τοῦ κύκλου ἐπὶ τοῦ ἰδίου κύκλου. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ συμμετρικὸν τοῦ κύκλου ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν AB εἶναι ὁ ἴδιος ὁ κύκλος.

Ἦτοι: **1. Ἡ εὐθεῖα ἐκάστης διαμέτρου εἶναι ἄξων συμμετρίας τοῦ κύκλου.**

2. Ἐκάστη διάμετρος χωρίζει τὸν κύκλον εἰς δύο ἴσα μέρη.

Ἐκαστὸν τῶν δύο τούτων μερῶν τοῦ κύκλου λέγεται ἡμικύκλιον.



Σχ. 69

32. ΙΣΟΤΗΣ ΚΥΚΛΩΝ, ΤΟΞΩΝ

32. 1. Ἰσότης, ἀνισότης κύκλων

Χαράσσομεν δύο κύκλους (O, α) , (O', α') μὲ ἴσας ἀκτίνων $\alpha = \alpha'$. Ἐπειτα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαφανοῦς ἐπιθέτομεν τὸν ἕνα ἐπὶ τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον

ώστε να συμπέσουν τα κέντρα O, O' αυτών. Παρατηρούμεν τότε ότι οί δύο κύκλοι ταυτίζονται.

Τò πείραμα τούτο οδηγεί εις τὸν ἐξῆς ὀρισμόν.

Όταν αἱ ἀκτίνες δύο κύκλων εἶναι ἴσαι τότε καὶ οἱ κύκλοι εἶναι ἴσοι.

Ἀντιστρόφως· δυνάμεθα νὰ ἐπαληθεύσωμεν ὅτι :

Ἐὰν δύο κύκλοι εἶναι ἴσοι θὰ ἔχουν ἴσας ἀκτῖνας.

$$(O, \alpha) = (O', \alpha') \iff \alpha = \alpha'$$

Ἐὰν δύο κύκλοι δὲν εἶναι ἴσοι τότε λέγονται ἄνισοι.

32. 2. Τόξα ἴσων κύκλων

Χαράσσομεν δύο κύκλους μὲ ἴσας ἀκτῖνας : Ἕτοι δύο ἴσους κύκλους.

Ἐπὶ τῶν δύο τούτων κύκλων λαμβάνομεν δύο τόξα AB καὶ $A'B'$.

Ἐπειτα μὲ τὴν βοήθειαν ἑνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου, ἐπιθέτομεν τὸν ἕνα κύκλον ἐπὶ τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον ὥστε οἱ δύο κύκλοι νὰ ἐφαρμόσουν. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι, τὸ τόξον AB τοῦ ἑνὸς κύκλου ταυτίζεται μὲ τὸ τόξον $A'B'$ τοῦ ἄλλου κύκλου (ἔστω καὶ ἂν χρειασθῆ νὰ περιστρέψωμεν περὶ τὸ κέντρον τὸν ἕνα κύκλον) ἢ δὲν ταυτίζεται. Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν λέγομεν ὅτι τὰ δύο τόξα $AB, A'B'$ εἶναι ἴσα καὶ εἰς τὴν δευτέραν ὅτι εἶναι ἄνισα. Ἕτοι εἰς δύο ἴσους κύκλους (ἢ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον) δύο τόξα εἶναι ἴσα ἢ ἄνισα.

32. 3. Ἐλασσον, μεῖζον τόξον

Καθὼς εἶδομεν τὰ ἄκρα A, B μιᾶς χορδῆς AB εἶναι ἄκρα δύο τόξων τοῦ κύκλου. Τὰ τόξα αὐτὰ εἶναι ἄνισα. Τὸ ἕν, τὸ μικρότερον, ὀνομάζεται ἔλασσον τόξον AB καὶ τὸ ἄλλο, τὸ μεγαλύτερον, μεῖζον τόξον AB .

Εἰς τὰ ἐπόμενα ὁσάκις γράφομεν «τόξον AB » ἢ συμβολικῶς \widehat{AB} , θὰ ἐννοοῦμεν τὸ ἔλασσον τόξον AB . Διὰ τὸ μεῖζον τόξον θὰ γίνεταί εἰδικὴ μνεῖα.



Σχ. 70

32. 4. Τόξα ἀνίσων κύκλων

Χαράξατε δύο ἀνίσους κύκλους καὶ μὲ τὴν βοήθειαν ἑνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου προσπαθήσατε νὰ φέρετε εἰς σύμπτωσιν (νὰ ἐφαρμόσετε) ἕν τόξον τοῦ ἑνὸς μὲ ὁποιοδήποτε τόξον τοῦ ἄλλου. Θὰ πεισθῆτε ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

77. Χαράξατε δύο κύκλους (O, α) καὶ (O, β) ὅπου $\alpha > \beta$. Νὰ εὑρετε τὸ σύνολον τῶν ση-

μείων του επιπέδου τα όποια είναι έσωτερικά του κύκλου (O, α) και έξωτερικά του κύκλου (O, β).

78. Θέλουμε να χαράξουμε κύκλους με ακτίνα μήκους 3 cm και διερχομένους από το αυτό σημείον Α. Πόσους τοιούτους κύκλους δυνάμεθα να χαράξουμε εις το επίπεδον; Ποῦ εὐρίσκονται τὰ κέντρα αὐτῶν;

79. Εἰς ἓνα κύκλον χαράξατε δύο διαμέτρους καθέτους μεταξύ των. Ἐπειτα μετὰ τὴν βοήθειαν ἑνὸς φύλλον διαφανοῦς χάρτου συγκρίνατε τὰ ὑπ' αὐτῶν ὀριζόμενα 4 τόξα τοῦ κύκλου.

80. Χαράξατε εὐθ. τμήμα ΑΒ μήκους 4 cm. Ἐπειτα νὰ εὐρετε σημεία τοῦ επιπέδου τὰ ὅποια ἀπέχουν 3 cm ἀπὸ ἕκαστον ἄκρον τοῦ ΑΒ.

33. ΑΘΡΟΙΣΜΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΞΩΝ ἸΣΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

33. 1. Ὅρισμοί

α) Εἰς τὸ κατωτέρω σχ. 71 τὰ ἐλάσσονα τόξα ΑΒ, ΒΓ ἔχουν τὸ ἓν ἄκρον αὐτῶν κοινὸν καὶ μεταξύ τῶν δύο ἄλλων ἄκρων. Διὰ τοῦτο λέγονται **διαδοχικά**.

Τὸ μείζον ἢ ἔλασσον τόξον ΑΓ, τὸ ὅποιον περιέχει τὸ σημεῖον Β λέγεται **ἄθροισμα** τῶν διαδοχικῶν τόξων ΑΒ καὶ ΒΓ.

Γράφομεν δὲ $\widehat{ΑΒ} + \widehat{ΒΓ} = \widehat{ΑΓ}$ (1)

β) Τὸ τόξον ΒΓ προστίθεται εἰς τὸ τόξον ΑΒ καὶ δίδει ἄθροισμα τὸ τόξον ΑΓ καὶ λέγεται διὰ τοῦτο **διαφορὰ** τῶν τόξων ΑΓ καὶ ΑΒ.


Γράφομεν δὲ :

$$\widehat{ΑΓ} - \widehat{ΑΒ} = \widehat{ΒΓ} \quad (2)$$


Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἀπὸ τὴν (1) ἔχομεν ἀκόμη ὅτι

$$\widehat{ΑΓ} - \widehat{ΒΓ} = \widehat{ΑΒ} \quad (\text{Διατί;})$$


33. 2. Διὰ νὰ προσθέσωμεν μὴ διαδοχικά τόξα τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἢ



Σχ. 71



Σχ. 72



Σχ. 73

δύο ἴσων κύκλων, μετὰ ἓν φύλλον διαφανοῦς χάρτου τὰ καθιστῶμεν διαδοχικά καὶ ἔπειτα τὰ προσθέτομεν.

Π.χ. διὰ νὰ προσθέσωμεν τὰ τόξα ΑΒ καὶ ΓΔ τοῦ σχ. 72 λαμβάνομεν :

$$\widehat{ΕΖ} = \widehat{ΑΒ} \quad \text{καὶ} \quad \widehat{ΖΗ} = \widehat{ΓΔ}$$

Ἄρα :

$$\widehat{ΑΒ} + \widehat{ΓΔ} = \widehat{ΕΖ} + \widehat{ΖΗ}$$

Ἄρα :

$$\widehat{ΑΒ} + \widehat{ΓΔ} = \widehat{ΕΖΗ}$$



81. Με την βοήθειαν ενός φύλλου διαφανούς χάρτου επαληθεύσατε ότι η πρόσθεσις τῶν τόξων ἴσων κύκλων εἶναι πράξις μεταθετική καὶ προσεταιριστική.

82. Εἰς δύο ἴσους κύκλους δύο τόξα (ἐλάσσονα) εἶναι ἴσα. Τὶ συνάγετε διὰ τὰ ἀντίστοιχα μείζονα τόξα αὐτῶν; Δικαιολογήσατε τὴν ἀπάντησίν σας.

83. Εἰς δύο ἴσους κύκλους σημειώσατε δύο ἄνισα ἐλάσσονα τόξα. Με τὴν βοήθειαν ενός φύλλου διαφανούς χάρτου νὰ συγκρίνετε τὰ ἀντίστοιχα μείζονα τόξα αὐτῶν. Τὶ παρατηρεῖτε;

34. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΣ ΓΩΝΙΑ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΝ ΤΟΞΟΝ


34. 1. Ὁρισμοί

Ἐκάστη γωνία AOB, ἡ ὁποία ἔχει τὴν κορυφήν της εἰς τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, λέγεται ἐπίκεντρος γωνία εἰς τὸν κύκλον τοῦτον. Τὰ σημεία A, B εἰς τὰ ὁποῖα ἡ ἐπίκεντρος γωνία AOB, σχ. 74, τέμνει τὸν κύκλον εἶναι ἄκρα δύο τόξων. Τὸ μὲν ἔλασσον τόξον AB λέγεται ἀντίστοιχον τόξον τῆς κυρτῆς ἐπικέντρου γωνίας AOB, τὸ δὲ μείζον τόξον AB ἀντίστοιχον τὸ ξον τῆς μὴ κυρτῆς ἐπικέντρου γωνίας AOB.


34. 2. Σχέσις ἐπικέντρων γωνιῶν καὶ ἀντιστοιχῶν τόξων

α) Εἰς δύο ἴσους κύκλους σημειώνομεν δύο ἴσας ἐπικέντρους γωνίας AOB καὶ A'O'B', σχ. 75.

Ἐὰν μὲ τὴν βοήθειαν διαφανοῦς χάρτου φέρωμεν εἰς σύμπτωσιν τὰς γωνίας αὐτάς, εἶναι φανερόν, ὅτι θὰ ἐφαρμόζουν καὶ τὰ ἀντίστοιχα τόξα.



Σχ. 74



Σχ. 75

β) Εἰς δύο ἴσους κύκλους, μὲ ἓν φύλλον διαφανοῦς χάρτου, σημειώνομεν δύο ἴσα τόξα $AB = A'B'$. Ἐὰν φέρωμεν εἰς σύμπτωσιν τὰ τόξα αὐτά, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι καὶ αἱ ἀντίστοιχοι ἐπίκεντροι γωνίαι αὐτῶν συμπίπτουν (ταυτίζονται).

Τὰ ἀνωτέρω πειράματα μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὴν ἐξῆς γεωμετρικὴν πρότασιν.

Εἰς δύο ἴσους κύκλους (ἢ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον):

Εἰς ἴσας κυρτάς (ἢ μὴ κυρτάς) ἐπικέντρους γωνίας ἀντιστοιχοῦν ἴσα τόξα καὶ ἀντιστρόφως· εἰς ἴσα τόξα ἀντιστοιχοῦν ἴσαι κυρταὶ (ἢ μὴ κυρταὶ) ἐπίκεντροι γωνίαι.

*Ἡ συμβολικῶς :

Εἰς ἴσους κύκλους : $\widehat{AB} = \widehat{A'B'} \iff \widehat{AOB} = \widehat{A'O'B'}$

35. ΙΣΑ ΤΟΞΑ, ΙΣΑΙ ΧΟΡΔΑΙ

35. 1. α) Είς δύο ίσους κύκλους (ἢ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον) χαράξατε, μετὴν βοήθειαν φύλλου διαφανοῦς χάρτου, δύο ἴσας χορδὰς $AB = A'B'$ καὶ συγκρίνατε τὰ δύο ἐλάσσονα καθὼς καὶ τὰ δύο μείζονα τόξα $AB, A'B'$. Φέρατε πρὸς τοῦτο (μετὴν βοήθειαν φύλλου διαφανοῦς χάρτου) εἰς σύμπτωσιν τοὺς ἴσους κύκλους εἰς τρόπον ὥστε νὰ συμπέσουν αἱ ἴσαι χορδαί. Τί παρατηρεῖτε;

β) Εἰς δύο ἴσους κύκλους (ἢ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον) σημειώσατε, μετὴν φύλλου διαφανοῦς χάρτου, δύο ἴσα τόξα καὶ ἔπειτα συγκρίνατε τὰς χορδὰς αὐτῶν.

Πρὸς τοῦτο φέρατε εἰς σύμπτωσιν τοὺς δύο ἴσους κύκλους εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐφαρμόσουν τὰ ἴσα τόξα. Τί παρατηρεῖτε;

Τὰ ἀνωτέρω πειράματα μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὰς ἑξῆς γεωμετρικὰς προτάσεις.

Εἰς ἴσους κύκλους ἢ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον :

1. Εἰς ἴσας χορδὰς ἀντιστοιχοῦν ἴσα ἐλάσσονα ἢ μείζονα τόξα.

2. Εἰς ἴσα τόξα ἀντιστοιχοῦν ἴσαι χορδαί.

Σημειώσεις

Ἡ 1η ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἰδιοτήτων μᾶς ἐπιτρέπει νὰ λάβωμεν εἰς ἴσους κύκλους ἴσα τόξα, λαμβάνοντες μετὸν διαβήτην ἴσας χορδὰς.


35. 2. Μέσον τόξου. Διχοτόμος ἐπικέντρου γωνίας

Εἰς ἓνα κύκλον σημειώνομεν δύο διαδοχικὰ ἴσα τόξα, $\widehat{AB} = \widehat{BG}$, σχ. 76. Τὸ σημεῖον Β τὸ ὁποῖον κεῖται εἰς τὸ τόξον ΑΓ καὶ τὸ χωρίζει εἰς δύο ἴσα τόξα λέγεται μέσον αὐτοῦ.

Παρατηροῦμεν ἤδη ὅτι αἱ κυρταὶ ἐπικέντροι γωνίαι AOB καὶ BOG εἶναι ἴσαι. (Διατί; Προσέξατε τὰ ἀντίστοιχα τόξα αὐτῶν). Ἄρα ἡ ἡμιευθεῖα OB , ἡ ὁποία διέρχεται ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ τόξου ΑΓ εἶναι καὶ διχοτόμος τῆς ἐπικέντρου γωνίας AOG .

Ἡ διχοτόμος μιᾶς ἐπικέντρου γωνίας διέρχεται ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς.

Ἡ πρότασις αὕτη μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κατασκευάσωμεν μετὰ χάρακα τὴν διχοτόμον μιᾶς ἐπικέντρου γωνίας, ὅταν γνωρίζωμεν τὸ μέσον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς.



Σχ. 76

36. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΞΩΝ

36. 1. Ἀριθμητικὴ τιμὴ τόξου


Διὰ νὰ μετρήσωμεν ἓν τόξον AB συγκρίνομεν αὐτὸ μετὰ ἓν ἄλλο τόξον M τοῦ ἰδίου κύκλου, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς μονάδα. Ἀπὸ τὴν σύγκρισιν

αυτήν προκύπτει εἰς ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος δεικνύει πόσας φορές χωρεῖ ἡ μονὰς τόξων (καὶ τὰ μέρη αὐτῆς) εἰς τὸ μετρούμενον τόξον. Ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ ἢ τιμὴ τοῦ τόξου.

36. 2. Μονάδες μετρήσεων τόξων

α) Μονὰς μετρήσεως τόξων εἶναι τὸ τόξον μιᾶς μοίρας (1°). Αὕτη ὀρίζεται ὡς ἑξῆς :

Φαντασθῆτε ὅτι ἐκ τοῦ κέντρου O τοῦ κύκλου φέρομεν ἡμιευθείας OA , OB , OC ... οὕτως ὥστε νὰ σχηματίσωμεν 360 διαδοχικὰ ἴσα τόξα, σχ. 77.



Σχ. 77

Ἐκαστον τῶν τόξων τούτων λέγεται τόξον μιᾶς μοίρας.

Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ ἀντίστοιχοι ἐπίκεντρον γωνίαι τῶν τόξων τούτων εἶναι ἴσαι. Ἐκάστη δὲ τούτων εἶναι ἴση μὲ 1° .

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰς ἐπίκεντρον γωνίαν μιᾶς μοίρας ἀντιστοιχεῖ τόξον μιᾶς μοίρας, εἰς ἐπίκεντρον γωνίαν 2, 3, 4... μοιρῶν ἀντιστοιχεῖ τόξον 2, 3, 4... μοιρῶν ἀντιστοίχως.

Ἦτοι ἡ τιμὴ μιᾶς ἐπίκεντρον γωνίας εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴν τιμὴν τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς (ὅταν μετρηθοῦν μὲ μοίρας).

Διὰ τοῦτο, ὅταν μετρῶμεν μὲ τὸ μοιρογνωμόνιον μίαν γωνίαν (§ 29), τὴν καθιστῶμεν ἐπίκεντρον καὶ μετροῦμεν τὸ ἀντίστοιχον τόξον αὐτῆς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ μοιρογνωμονίου.

β) Ἐκαστον τόξον μιᾶς μοίρας (1°) ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 ἴσα τόξα. Ἐκαστον τούτων λέγεται τόξον ἑνὸς πρώτου λεπτοῦ ($1'$). Ὁμοίως, ἕκαστον τόξον ἑνὸς πρώτου λεπτοῦ ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 ἴσα τόξα. Ἐκαστον τούτων, λέγεται τόξον τοῦ ἑνὸς δευτέρου λεπτοῦ ($1''$).

$$1^\circ = 60', \quad 1' = 60'', \quad 1^\circ = 3600''$$

γ) Ἄλλαι μονάδες μετρήσεως τόξων εἶναι τὸ ἀκτίνιον καὶ ὁ βαθμός (gr).


Τόξον ἑνὸς ἀκτινίου = Τόξον μὲ μήκος ἴσον πρὸς τὴν ἀκτίνα τοῦ κύκλου.

Τόξον ἑνὸς βαθμοῦ = Τόξον ἴσον πρὸς τὸ $1/400$ τοῦ κύκλου.

Ὁ βαθμὸς ὑποδιαιρεῖται εἰς δέκατα (dgr), ἑκατοστάς (mgr).

Παρατηρήσεις

α) Ὅταν δύο τόξα ἔχουν τὴν αὐτὴν τιμὴν δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην ἴσα.



Σχ. 78

Π.χ. τὰ τόξα $AB, \Gamma\Delta$ τοῦ σχεδ. 78, ἔχουν ἴσας τιμὰς (εἰς μοίρας) χωρὶς νὰ εἶναι ἴσα.

β) Ἡ λέξις «μοίρα» ὅταν χρησιμοποιεῖται ὡς μονὰς τόξων δηλώνει ἓν τόξον, ἐνῶ ὅταν χρησιμοποιεῖται ὡς μονὰς γωνιῶν δηλώνει μίαν γωνίαν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

84. Εἰς ἓνα κύκλον φέρατε δύο καθέτους μεταξύ των διαμέτρους. Συγκρίνατε ἔπειτα τὰς τέσσαρας χορδὰς αἱ ὁποῖαι ὀρίζονται ὑπ' αὐτῶν.

85. Μὲ τρεῖς διαμέτρους χωρίζομεν ἓνα κύκλον εἰς 6 ἴσα τόξα. Νὰ εὑρετε τὰς τιμὰς (εἰς μοίρας) καὶ τῶν 6 τόξων ὡς καὶ τῶν ἀντιστοίχων ἐπικέντρων γωνιῶν αὐτῶν.

86. Εἰς ἓνα κύκλον νὰ λάβετε δύο ἀνίσους χορδὰς καὶ ἔπειτα νὰ συγκρίνετε τὰς ἀποστάσεις τοῦ κέντρου ἀπὸ αὐτάς. Τί παρατηρεῖτε; Διατυπώσατε τὰ συμπεράσματά σας.


87. Νὰ ἐξετάσετε ἐὰν ἡ μεσοκάθετος μιᾶς χορδῆς διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου καὶ διὰ τῶν μέσων τῶν τόξων αὐτῆς.

37. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ


37. 1. Ἐὰν σᾶς ζητήσουν νὰ χαράξετε μίαν εὐθείαν καὶ ἓνα κύκλον, εἰς ποίας θέσεις εἶναι δυνατὸν νὰ τοποθετήσετε τὴν εὐθείαν ὡς πρὸς τὸν κύκλον;

Αἱ δυνατὰ σχετικαὶ θέσεις φαίνονται εἰς τὸ σχ. 79.

Εἰς ἐκάστην περιπτώσιν θὰ συγκρίνωμεν τὴν ἀκτίνα α μὲ τὴν ἀπόστασιν δ τοῦ κέντρου O ἀπὸ τὴν εὐθείαν.



Σχ. 79



Σχ. 80

37. 2. Χαράσσομεν ἓνα κύκλον (O, α) καὶ τρεῖς εὐθεῖας $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ εἰς ἀποστάσεις ἀπὸ τὸ κέντρον $OA > \alpha, OB = \alpha$ καὶ $OG < \alpha$ ἀντιστοίχως, σχ. 80.

Διακρίνομεν τότε τὰ ἑξῆς :

1η περίπτωσης : $OA > \alpha$.

O ὑδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχει ἡ εὐθεῖα μὲ τὸν κύκλον. (Διατί; Συγκρίνατε τὴν ἀπόστασιν τοῦ κέντρου O ἀπὸ ἓν σημεῖον τῆς ϵ_1 μὲ τὴν ἀκτίνα α).

2α περίπτωσης : $OB = \alpha$

Τὸ σημεῖον B τῆς ϵ_2 κεῖται ἐπὶ τοῦ κύκλου. Ὅλα τὰ ἄλλα σημεῖα τῆς ϵ_2 ἀπέχουν ἀπὸ τὸ κέντρον ἀπόστασιν μεγαλυτέραν τῆς $OB = \alpha$ (§ 21. 4.)

Συνεπῶς τὸ B εἶναι τὸ μοναδικὸν κοινὸν σημεῖον τῆς εὐθείας ϵ_2 μὲ τὸν κύκλον. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ εὐθεῖα ϵ_2 εἶναι ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου εἰς τὸ σημεῖον B αὐτοῦ τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται σημεῖον ἐπαφῆς.

3η περίπτωση: $OG < \alpha$

Το σημείον Γ είναι έσωτερικόν του κύκλου (O, α) ή δέ ευθεία ϵ_3 έχει δύο κοινά σημεία Μ και Ν μέ τον κύκλον, διά τουτο λέγεται τέμνουσα αυτού.

Ώστε:

Έάν $\delta > \alpha$ τότε ή ευθεία είναι έξωτερική (Ουδέν κοινόν σημείον)

» $\delta = \alpha$ » ή » » έφαπτομένη (1 κοινόν σημείον).

» $\delta < \alpha$ » ή » » τέμνουσα (2 κοινά σημεία)

Αί τρείς αύται προτάσεις ίσχύουν και άντιστρόφως.

Ήτοι: Έάν δέν υπάρχουν κοινά σημεία, τότε* είναι $\delta > \alpha$

Έάν υπάρχει 1 μόνον κοινόν σημείον, τότε $\delta = \alpha$

Έάν υπάρχουν 2 κοινά σημεία, τότε είναι $\delta < \alpha$

Αί έξ (6) άνωτέρω προτάσεις γράφονται συμβολικώς ως έξης:

$$\delta > \alpha \iff \epsilon \cap (O, \alpha) = \emptyset, \quad \epsilon = \text{έξωτερική του κύκλου} \quad (1)$$

$$\delta = \alpha \iff \epsilon \cap (O, \alpha) = \{B\} \quad \epsilon = \text{έφαπτομένη} \quad (2)$$

$$\delta < \alpha \iff \epsilon \cap (O, \alpha) = \{M, N\} \quad \epsilon = \text{τέμνουσα} \quad (3)$$

37. 3. Παρατηρήσεις


α) Η έφαπτομένη του κύκλου εις το σημείον Μ αυτού είναι κάθετος προς την άκτινα ΟΜ. Άντιστρόφως, έάν ΟΜ είναι μία άκτις του κύκλου και φέρομεν την κάθετον προς αυτήν εις το άκρον της Μ, αυτή θα είναι έφαπτομένη του κύκλου εις το σημείον Μ. (Διατί;)

Ήτοι: Η κάθετος προς μίαν άκτινα εις το άκρον αυτής είναι έφαπτομένη του κύκλου.


β) Έάν διπλώσωμεν το επίπεδον του σχ. 80 περί την ευθείαν ΟΓ, τα κοινά σημεία Μ και Ν θα συμπέσουν**. Ήτοι ή ΟΓ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΜΝ.

37. 4. Έφαρμογαι

α) Νά κατασκευασθή ή έφαπτομένη κύκλου εις σημείον Μ αυτού.



Σχ. 81



Σχ. 82

Χαράσσομεν την άκτινα ΟΜ και έπειτα την κάθετον προς αυτήν εις το σημείον Μ, σχ. 81.

* Ίδου πώς δυνάμεθα νά δικαιολογήσωμεν την μίαν από αυτάς, π.χ. την πρώτην. Έάν δέν ήτο $\delta > \alpha$, θα ήτο:

$$\delta < \alpha, \text{ όπότε ή } \epsilon \text{ θα είχε 2 κοινά σημεία μέ τον κύκλον}$$

$$\delta = \alpha, \text{ » ή } \epsilon \text{ » » 1 κοινόν σημείον » » »}$$

** Η ευθεία ΟΓ είναι: α) Φορεύς μιās διαμέτρου, ήτοι άξων συμμετρίας του κύκλου.

β) Κάθετος προς την ευθείαν ϵ_3 ήτοι άξων συμμετρίας αυτής.

β) Νὰ κατασκευασθῆ κύκλος ἀκτίνοσ α ὁ ὁποῖοσ νὰ ἐφάπτεται μιᾶσ δοθεῖσ ἐϋθεῖασ ϵ εἰσ τὸ σημεῖον A αὐτῆσ, σχ. 82.

ι) Χαράσσομεν τὴν ἐϋθεῖαν δ κάθετον πρὸσ τὴν ἐϋθεῖαν ϵ εἰσ τὸ σημεῖον A αὐτῆσ.

ιι) Ἐπὶ τῆσ δ λαμβάνομεν τμῆμα $OA = \alpha$ καὶ γράφομεν τὸν κύκλον (O, α) . Ὁ κύκλοσ οὗτοσ εἶναι ὁ ζητούμενοσ .

Πράγματι ἡ ἀκτίσ OA εἶναι κάθετοσ πρὸσ τὴν ἐϋθεῖαν ϵ εἰσ τὸ σημεῖον A . Συνεπῶσ ὁ κύκλοσ (O, OA) ἐφάπτεται τῆσ ἐϋθεῖασ ϵ (§37. 3).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

88. Νὰ εὑρετε τὸν ἀριθμὸν τῶν κοινῶν σημείων ἐϋθεῖασ ϵ καὶ κύκλου (O, α) εἰσ τὰσ ἐξῆσ περιπτώσεισ :

α) Ὄταν $\alpha = 3$ cm καὶ $\delta = 2$ cm, β) ὅταν $\alpha = 3$ cm καὶ $\delta = 3$ cm, γ) ὅταν $\alpha = 3$ cm καὶ $\delta = 4$ cm.


Ὅπου δ εἶναι ἡ ἀπόστασισ τοῦ κέντροσ O ἀπὸ τὴν ἐϋθεῖαν ϵ .

89. Νὰ χαράξετε ἐφαπτομένησ κύκλου εἰσ τὰ ἄκρα μιᾶσ διαμέτροσ αὐτοῦ.

90. Νὰ χαράξετε ἐϋθ. τμῆμα AB καὶ ἔπειτα κύκλουσ ἐφαπτομένουσ αὐτοῦ εἰσ τὸ ἄκρον A . Πόσασ λύσεισ ἔχει τὸ πρόβλημα;


38. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ

38. 1. Ἄσ χαράξωμεν δύο κύκλουσ μὲ κέντρα O, O' . Ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι ἡ ἐϋθεῖα μιᾶσ διαμέτροσ κύκλου εἶναι ἄξων σμμετρίας αὐτοῦ, εἶναι εὔκολον νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ἡ ἐϋθεῖα OO' εἶναι ἄξων σμμετρίας τοῦ σχήματοσ τῶν δύο κύκλων. Ἡ ἐϋθεῖα OO' λέγεται διὰ κέντροσ τῶν δύο τούτων κύκλων, σχ. 83.



Σχ. 83

38. 2. Ποῖαι εἶναι αἱ δυναταὶ σχετικαὶ θέσεισ μεταξὺ δύο κύκλων (O, α) , (O', α') εἰσ τὸ ἐπίπεδο; ($\alpha > \alpha'$).



Σχ. 84

Διακρίνομεν τὰσ ἀνωτέρω εἰκονιζόμενασ περιπτώσεισ.

1η περίπτωση

Οἱ κύκλου εἶχουν δύο κοινὰ σημεία· τὰ σημεῖα A, A' , σχ. 84α. Λέγομεν τότε ὅτι οἱ κύκλου τέμνονται τὸ δὲ τμῆμα AA' εἶναι ἡ κοινὴ χορδὴ

Ἐὰν διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον τοῦ σχήματος περὶ τὸν ἄξονα συμμετρίας OO' τῶν δύο κύκλων.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ δύο κοινὰ σημεῖα A, A' συμπίπτουν. (Διατί;).

Ἦτοι ἡ διάκεντρος εἶναι μεσοκάθετος τῆς κοινῆς χορδῆς AA' .

2α περίπτωσης

Οἱ κύκλοι ἔχουν μόνον ἓν κοινὸν σημεῖον. Τοῦτο κεῖται ἐπὶ τῆς διακέντρου*, σχ. 84β, καὶ λέγεται σημεῖον ἐπαφῆς, οἱ δὲ κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἐξωτερικῶς ἢ ἐσωτερικῶς (2 περιπτώσεις).

3η περίπτωσης

Οἱ δύο κοινὸν σημεῖον ἔχουν οἱ κύκλοι (σχ. 84 γ, δ, ε).

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν οἱ δύο κύκλοι :

i) Ἦ εὐρίσκονται ἐκτὸς ἀλλήλων (σχ. 84 γ).

ii) Ἦ ὁ εἷς εὐρίσκεται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἄλλου (σχ. 84 δ).

iii) Ἦ ἔχουν κοινὸν κέντρον (ὁμόκεντροι κύκλοι, σχ. 84 ε).

38.3. Ἐὰν συγκρίνωμεν τὸ ἄθροισμα $\alpha + \alpha'$ ἢ τὴν διαφορὰν $\alpha - \alpha'$ τῶν ἀκτίων μὲ τὴν ἀπόστασιν $OO' = \delta$ τῶν δύο κέντρων εἰς τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις.

α) Ὄταν οἱ κύκλοι τέμνονται: Τότε μὲ τὸν διαβήτην εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\delta < \alpha + \alpha' \text{ καὶ } \delta > \alpha - \alpha' \text{ ἢ συντόμως } \alpha - \alpha' < \delta < \alpha + \alpha'$$

β) Ὄταν οἱ κύκλοι ἐφάπτονται. Τότε εἶναι $\delta = \alpha + \alpha'$, ἐὰν ἐφάπτονται ἐξωτερικῶς καὶ $\delta = \alpha - \alpha'$, ἐὰν ἐφάπτονται ἐσωτερικῶς.

γ) Ὄταν ἕκαστος κύκλος εὐρίσκεται εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τοῦ ἄλλου. Τότε εἶναι $\delta > \alpha + \alpha'$.

δ) Ὄταν ὁ εἷς κύκλος κεῖται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἄλλου. Τότε εἶναι $\delta < \alpha - \alpha'$.

Αἱ ἀνωτέρω τέσσαρες προτάσεις ἰσχύουν καὶ ἀντιστρόφως. (Διατυπώσατε αὐτάς).

Θέσεις 2 κύκλων	Σχέσεις μεταξύ τῶν δ καὶ $\alpha + \alpha'$	Ἀριθμὸς κοινῶν σημείων
Κύκλοι τεμνόμενοι	$\alpha - \alpha' < \delta < \alpha + \alpha'$	2
» ἐφαπτόμενοι	$\delta = \alpha \pm \alpha'$	1
» ἐξωτερικοὶ ἀλλήλων	$\delta > \alpha + \alpha'$	0
Ὁ εἷς κύκλος ἐσωτερικὸς τοῦ ἄλλου	$\delta < \alpha - \alpha'$	0

* Τὰ δύο σημεῖα τομῆς A, A' τοῦ σχ. 84α συμπίπτουν εἰς τὸ σχ. 84β.

91. 'Εάν α, α' παριστοῦν τὰ μήκη εἰς (cm) τῶν ἀκτίνων δύο κύκλων καὶ δ τὸ μήκος τῆς διακέντρου αὐτῶν (εἰς cm), νὰ εὑρετε τὰς σχετικές θέσεις τῶν δύο αὐτῶν κύκλων εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ παραπλεύρους πίνακος.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
δ	5	1	6	2	2
α	3	3	3	5	5
α'	3	2	2	2	3


γράψατε κύκλον μὲ κέντρον τὸ μέσον τοῦ AB καὶ ἀκτίνα τοιαύτην ὥστε οἱ δύο κύκλοι α) νὰ ἐφάπτονται ἐσωτερικῶς, β) νὰ τέμνωνται, γ) νὰ μὴ ἔχουν κοινὰ σημεῖα.

92. Γράψατε εὐθ. τμήμα AB μήκους 5 cm καὶ κύκλον κέντρου A καὶ ἀκτίνος 3 cm. *Επειτα

39. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

39. 1. Ἡ χρησιμοποίησις διαφανοῦς χάρτου καὶ γνώμονος εἰς τὴν κατασκευὴν ἑνὸς σχεδίου, ἀνεξαρτήτως τῶν προσπαθειῶν μας, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει μεγάλην ἀκρίβειαν. Διὰ τοῦτο ἐφεξῆς θὰ χρησιμοποιοῦμεν μόνον κανόνα, (χάρακα), καὶ διαβήτην. Μὲ τὸν ὅρον δὲ γεωμετρικὴ κατασκευὴ θὰ ἐννοοῦμεν κατασκευὴν μὲ χρησιμοποίησιν μόνον κανόνος καὶ διαβήτου.

39. 2. Ἐκ σημείου A, ἐκτὸς εὐθείας ϵ , νὰ ἀχθῆ κάθετος πρὸς αὐτήν



Σχ. 85

1) Μὲ κέντρον ἓν σημεῖον O τῆς εὐθείας ϵ καὶ ἀκτίνα OA γράφομεν κύκλον, σχ. 85α.

2) Μὲ κέντρον ἓν ἄλλο σημεῖον O' τῆς ϵ καὶ ἀκτίνα $O'A$ γράφομεν κύκλον, σχ. 85β.

3) Χαράσσομεν τὴν κοινὴν χορδὴν AA' αὐτῶν, σχ. 85γ.


Ἡ εὐθεῖα AA' εἶναι ἡ ζητούμενη κάθετος πρὸς τὴν ϵ . (Διατί;).

39. 3. Νὰ κατασκευασθῆ ἡ μεσοκάθετος εὐθυγρ. τμήματος AB

1) Μὲ κέντρον τὸ ἄκρον A καὶ ἀκτίνα AB γράφομεν κύκλον, σχ. 86α.

2) Μὲ κέντρον τὸ ἄλλο ἄκρον B καὶ ἀκτίνα ἴσην μὲ τὴν προηγουμένην γράφομεν κύκλον, σχ. 86β.

3) Χαράσσομεν τήν κοινήν χορδήν ΓΓ'. Αὕτη εἶναι ἡ μεσοκάθετος τοῦ τμήματος AB, σχ. 86γ.



Σχ. 86


Με τὸν ἴδιον τρόπον χωρίζομεν ἐν εὐθύγρ. τμήμα εἰς 2 ἴσα μέρη.

39. 4. Νὰ κατασκευασθῇ ἡ κάθετος πρὸς εὐθείαν ϵ εἰς δεδομένον σημείον A αὐτῆς

Ἐπὶ τῆς ϵ καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ A λαμβάνομεν δύο ἴσα τμήματα $AB=AG$. Με τὸν τρόπον αὐτὸν κατεστήσαμεν τὸ A μέσον τοῦ BG. Ἄρκει συνεπῶς νὰ χαράξωμεν κατὰ τὰ γνωστὰ τὴν μεσοκάθετον αὐτοῦ.

39. 5. Νὰ κατασκευασθῇ γωνία ἴση πρὸς δοθείσαν γωνίαν $\chi\theta\psi$.

1. Χαράσσομεν μίαν ἡμιευθείαν $O'x'$, σχ. 87.



Σχ. 87

2. Με κέντρον O καὶ ἀκτίνα ὄσῃν θέλομεν (ὄχι πολὺ μικράν) γράφομεν τόξον κύκλου, τὸ ὁποῖον τέμνει τὰς πλευράς Oχ, Oψ εἰς τὰ σημεῖα A, B ἀντιστοίχως, σχ. 87α. Με ἄλλους λόγους : Καθιστῶμεν τὴν γωνίαν $\chi\theta\psi$ ἐπίκεντρον.

3. Με κέντρον O' καὶ ἀκτίνα ἴσην με τὴν προηγουμένην γράφομεν δεύτερον τόξον κύκλου, τὸ ὁποῖον τέμνει τὴν $O'x'$ εἰς ἓν σημεῖον A' , σχ. 87β.

4. Μὲ κέντρον A' καὶ ἀκτίνα ἴσην μὲ τὴν χορδὴν AB γράφομεν ἓν τρίτον τόξον κύκλου, τὸ ὁποῖον νὰ τέμνῃ τὸ δεύτερον εἰς ἓν σημεῖον B' , σχ. 87γ.

Ἡ γωνία $A'O'B'$ εἶναι ἡ ζητουμένη. Ἴδου διατί :

α) Οἱ δύο κύκλοι (O, OA) καὶ $(O', O'A')$ εἶναι ἴσοι ἐκ κατασκευῆς.

β) Αἱ χορδαὶ AB καὶ $A'B'$ αὐτῶν εἶναι ἴσαι.

γ) Τὰ τόξα $AB, A'B'$ εἶναι ἴσα. (Διατί;)

Συνεπῶς καὶ αἱ ἐπίκεντροι γωνίαι AOB καὶ $A'O'B'$ εἶναι ἴσαι.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αἱ κατωτέρω κατασκευαὶ νὰ γίνουν διὰ τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου.

93. Νὰ χαράξετε ἓν εὐθ. τμήμα AB καὶ ἔπειτα καθέτους πρὸς αὐτὸ εἰς τὰ ἄκρα A καὶ B .

94. Νὰ χαράξετε μίαν ἡμιεὐθεῖαν καὶ ἔπειτα μίαν ὀρθὴν γωνίαν μὲ μίαν πλευρὰν τὴν ἡμιεὐθεῖαν αὐτήν.

95. Νὰ χωρίσετε ἓν εὐθ. τμήμα εἰς 4 ἴσα μέρη.

96. Νὰ γράψετε κύκλον μὲ διάμετρον ἴσην πρὸς δοθὲν εὐθ. τμήμα.

97. Νὰ χαράξετε ἐφαπτομένης κύκλου εἰς τὰ ἄκρα μίᾶς χορδῆς αὐτοῦ.

40. ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ


Εἰς ἓν ἐπίπεδον δίδονται δύο διαφορετικὰ σημεῖα A, B καὶ ζητοῦμεν νὰ χαράξωμεν κύκλον διερχόμενον δι' αὐτῶν.

Γνωρίζομεν ὅτι ἕκαστον σημεῖον O τῆς μεσοκαθέτου τῆς AB , σχ. 88, ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰ ἄκρα A καὶ B ($OA=OB$). Ἐὰν συνεπῶς μὲ κέντρον τὸ σημεῖον O καὶ ἀκτίνα OA γράψωμεν κύκλον, οὗτος θὰ διέλθῃ καὶ διὰ τοῦ B .

Πόσας λύσεις ἔχει τὸ πρόβλημα τοῦτο;

Εἶναι φανερόν ὅτι ὅπως εἰργάσθημεν μὲ τὸ σημεῖον O δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο σημεῖον τῆς μεσοκαθέτου.

Ἦτοι ὑπάρχουν εἰς τὸ ἐπίπεδον ἄπειροι κύκλοι διερχόμενοι διὰ τῶν σημείων A καὶ B . Τὰ κέντρα ὧν αὐτῶν εἶναι σημεῖα τῆς μεσοκαθέτου πρὸς τὸ τμήμα AB .



Σχ. 88

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

98. Σημειώσατε τρία διαφορετικὰ σημεῖα μὴ κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας καὶ κατασκευάσατε κύκλον διερχόμενον καὶ διὰ τῶν τριῶν αὐτῶν σημείων. Πόσους τοιούτους κύκλους δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν;

99. Σημειώσατε 4 διαφορετικὰ σημεῖα A, B, Γ, Δ μὴ κείμενα ἀνὰ τρία ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας. Ἐπειτα χαράξατε δύο κύκλους, οἱ ὁποῖοι διέρχονται ὁ μὲν εἰς διὰ τῶν A, B, Γ , ὁ δὲ ἄλλος διὰ τῶν A, B, Δ .

41. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ)

Ἡ συμμετρία ὡς πρὸς εὐθεΐαν δὲν εἶναι τὸ μόνον εἶδος συμμετρίας, τὸ ὁποῖον συναντῶμεν εἰς τὸ περιβάλλον μας.

Εἰς τὸ σχ. 89 διακρίνομεν μίαν ἄλλην συμμετρίαν· τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς σημεῖον.




Σχ. 89

41. 1. Ὅρισμός

Εἰς τὸ ἐπίπεδον Π δίδονται δύο διαφορετικὰ σημεῖα O καὶ A . Χαράσσομεν τὴν εὐθεΐαν AO καὶ ἐπ' αὐτῆς λαμβάνομεν σημεῖον A' εἰς τρόπον ὥστε νὰ εἶναι $OA = OA'$, σχ. 90. Ἦτοι τὸ σημεῖον O νὰ εἶναι μέσον τοῦ τμήματος AA' . Τὸ σημεῖον A' λέγεται συμμετρικὸν τοῦ A ὡς πρὸς τὸ O . Μὲ ὅμοιον τρόπον δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ συμμετρικὸν ἐκάστου σημείου τοῦ ἐπιπέδου ὡς πρὸς τὸ σημεῖον O .

Συνεπῶς: Ἐὰν εἰς τὸ ἐπίπεδον Π δοθῇ ἓν σημεῖον O , δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν μεταξὺ τῶν σημείων αὐτοῦ μίαν ἀντιστοιχίαν τοιαύτην ὥστε:



Σχ. 90

Εἰς ἕκαστον σημεῖον M τοῦ Π νὰ ἀντιστοιχῇ ἓν καὶ μόνον ἓν σημεῖον τοῦ Π , τὸ συμμετρικὸν M' τοῦ M ὡς πρὸς O .

Ἡ ἀντιστοιχία αὕτη ὀνομάζεται συμμετρία ὡς πρὸς τὸ O γράφεται δὲ συντόμως $\Sigma(O)$.

Εἰς τὴν $\Sigma(O)$ τὸ M' εἶναι συμμετρικὸν τοῦ M . Ἀπὸ τὸν τρόπον ὁμοῦ εὐρέσεως τοῦ M' ἐννοοῦμεν ὅτι εἰς τὴν ἰδίαν συμμετρίαν καὶ τὸ M εἶναι συμμετρικὸν τοῦ M' . Ἦτοι: Εἰς τὴν $\Sigma(O)$ τὰ σημεῖα M, M' ἀντιστοιχοῦν διττῶς (ἀμφιμοσημάντως)


μεταξύ των ($M \rightleftarrows M'$). Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι εἰς τὴν $\Sigma(O)$ τὰ σημεῖα M, M' εἶναι συμμετρικὰ μεταξύ των ἢ ἀπλῶς συμμετρικὰ ἢ ὁμόλογα. Εἰδικῶς τὸ σημεῖον O , τὸ ὁποῖον εἰς τὴν $\Sigma(O)$ λέγεται κέντρον συμμετρίας, συμπίπτει (ταυτίζεται) μὲ τὸ συμμετρικὸν του.

Ὡστε: Εἰς τὴν $\Sigma(O)$: M, M' εἶναι συμμετρικὰ σημαίνει ὅτι: τὸ O εἶναι μέσον τοῦ τμήματος MM' .


41. 2. Εἰς ἓν φύλλον χάρτου σημειώνομεν σημεῖον M , σχ. 91α. Διπλώνομεν ἔπειτα τὸ φύλλον τοῦτο δύο φορές διαδοχικῶς. Τὴν πρώτην φοράν κατὰ μίαν εὐθεΐαν αὐτοῦ ϵ , μὴ διερχομένην διὰ τοῦ M , σχ. 91β, καὶ τὴν δευτέραν κατὰ εὐθεΐαν ϵ' κάθετον πρὸς τὴν ϵ , σχ. 91γ (Διπλῆ δίπλωσις).

Σημειώνομεν τὸ συμμετρικὸν M' τοῦ M εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ καὶ τὸ συμμετρικὸν M'' τοῦ M' εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon')$. Ἐὰν ἀναπτύξωμεν ἤδη τὸ φύλλον καὶ ἄς προσέξωμεν

τὴν θέσιν τῶν σημείων M καὶ M'' ὡς πρὸς τὸ σημεῖον τομῆς O τῶν δύο καθέτων εὐθειῶν ϵ, ϵ' . Διαπιστώνομεν* ὅτι τὸ O εἶναι μέσο τῆς τμήματος



Σχ. 91




τος MM'' . Ἦτοι τὰ σημεία M, M'' εἶναι συμμετρικὰ ὡς πρὸς κέντρον συμμετρίας τὸ O .

Τὸ ἀνωτέρω πείραμα μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὸ ἑξῆς συμπέρασμα :

Τὸ ἀποτέλεσμα δύο διαδοχικῶν συμμετριῶν ὡς πρὸς δύο εὐθείας καθέτους εἶναι μία συμμετρία ὡς πρὸς τὴν τομὴν τῶν εὐθειῶν αὐτῶν.

41. 3. Ἐπὶ ἑνὸς φύλλου σχεδίου σημειώνομεν σημεῖον O καὶ δύο συμμετρικὰ ὡς πρὸς αὐτὸ σημεῖα M, M' , σχ. 92. Ἐπειτα ἐπιθέτομεν ἐπ' αὐτοῦ φύλλον διαφανοῦς χάρτου καὶ ἀφοῦ σταθεροποιήσωμεν** τὰ δύο φύλλα εἰς τὸ O περιστρέφομεν τὸ διαφανὲς περὶ τὸ O κατὰ ἡμισείαν στροφὴν. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ στροφή



Σχ. 92

αὕτη φέρει τὸ μὲν M εἰς τὸ M' τὸ δὲ M' εἰς τὸ M .

Ἡ παρατήρησις αὕτη μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὸ ἀκόλουθον συμπέρασμα.


Ἐὰν στρέψωμεν τὸ ἐπίπεδον ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ του περὶ τὸ O κατὰ ἡμισείαν στροφὴν, τότε ἕκαστον σημεῖον αὐτοῦ ἐναλλάσσεται μὲ τὸ συμμετρικόν του ὡς πρὸς O .

42. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟΝ

42. 1. Ὅρισμός Ἐὰς εὐρωμεν εἰς τὴν $\Sigma(O)$ τὰ ὁμόλογα A', B', Γ, \dots

τῶν σημείων A, B, Γ, \dots ἑνὸς σχήματος (K) , σχ. 93.

Τὸ σχῆμα (K') , τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ὁμόλογα ὅλων τῶν σημείων τοῦ (K) καὶ μόνον ἀπὸ αὐτά, λέγεται συμμετρικὸν τοῦ σχήματος (K) εἰς τὴν $\Sigma(O)$.



Σχ. 93


* Ἡ ἀπόδειξις θὰ δοθῇ ἀργότερον.

** Μὲ τὴν βοήθειαν μιᾶς καρφίδος.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶναι φανερόν ὅτι καὶ τὸ (Κ) εἶναι συμμετρικὸν τοῦ (Κ') εἰς τὴν Σ(Ο). Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ σχήματα (Κ) καὶ (Κ') εἶναι συμμετρικὰ μεταξύ των ἢ ἀπλῶς συμμετρικὰ ὡς πρὸς Ο.

42. 2. Ἰσότης συμμετρικῶν σχημάτων

Καθὼς εἶδομεν, ἐὰν στρέψωμεν τὸ ἐπίπεδον ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ του περὶ τὸ



Σχ. 94. Εἰκόνες συμμετρικῶν σχημάτων

Ο κατὰ ἡμισείαν στροφὴν, ἕκαστον σημεῖον ἐναλλάσσεται μὲ τὸ συμμετρικόν του, συνεπῶς καὶ ἕκαστον σχῆμα (Κ) τοῦ ἐπιπέδου μὲ τὸ συμμετρικόν του (Κ').

Ἦτοι: Δύο σχήματα συμμετρικὰ ὡς πρὸς κέντρον εἶναι ἴσα.


42. 3. Παρατήρησις

Ἀντιθέτως πρὸς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς εὐθείαν, ὅπου ἐν σχῆμα (Κ) ἐφαρμόζει ἐπὶ τοῦ συμμετρικοῦ (Κ') ἀφοῦ πρὶν τὸ ἐν ἀπὸ αὐτὰ ἀναστραφῆ, εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς σημεῖον ἢ ἀνωτέρω ἐφαρμογὴ ἐπιτυγχάνεται μόνον δι' ὀλισθήσεως. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς σημεῖον δύο συμμετρικὰ σχήματα εἶναι ἐϋθέως ἴσα.

43. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕἰΣ ΤΗΝ Σ(Ο)

43. 1. Συμμετρικὸν ἡμιευθείας Αχ

Καθὼς εἶδομεν, τὰ συμμετρικὰ σχήματα ὡς πρὸς κέντρον εἶναι ἴσα. Συνεπῶς καὶ τὸ συμμετρικὸν ἡμιευθείας Αχ θὰ εἶναι ἐπίσης ἡμιευθεῖα. Διὰ νὰ τὴν εὗρωμεν δέ, ἀρκεῖ νὰ εὗρωμεν τὸ συμμετρικὸν τοῦ ἄκρου Α καὶ ἐνὸς ἄλλου σημείου Μ αὐτῆς. Διακρίνομεν ἰδιαιτέρως τὰς ἐξῆς περιπτώσεις.



1) Ἐὰν $O \equiv A$, σχ. 95.

Σχ. 95

Παρατηροῦμεν ὅτι :

α) Τὸ συμμετρικὸν τῆς ἀρχῆς Α συμπίπτει μὲ τὸ Α β) τὸ συμμετρικὸν τυχόντος σημείου Μ τῆς Αχ κεῖται ἐπὶ τῆς ἀντιθέτου ἡμιευθείας αὐτῆς Αχ'. Ἀπὸ τὴν παρατήρησιν αὐτὴν ὀδηγούμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ συμμετρικὸν τῆς ἡμιευθείας Αχ εἶναι ἡ ἀντίθετος αὐτῆς ἡμιευθεῖα Αχ'.

2) Ἐὰν τὸ Ο κεῖται ἐκτὸς τῆς εὐθείας τῆς Αχ, σχ. 96.

Εὐρίσκομεν τὰ συμμετρικὰ δύο σημείων Α καὶ Μ, τῆς Αχ.

Παρατηροῦμεν ὅτι :

α) Ταῦτα κεῖνται ἐπὶ ἡμιευθείας Α'χ' παραλλήλου* πρὸς τὴν Αχ.


* Τὸ ὅτι αἱ Αχ, Α'χ' εἶναι παράλληλοι τὸ διαπιστώνομεν μὲ παράλληλον μετατόπισιν. Δυνάμεθα ὁμῶς καὶ νὰ τὸ δικαιολογήσωμεν ὡς ἐξῆς. Ἐὰν αἱ εὐθεῖαι τῶν ἡμιευθειῶν Αχ, Α'χ' εἶχον ἓν κοινὸν σημεῖον, τότε τοῦτο...

β) Αί παράλληλοι ήμιευθείαι $A\chi$, $A'\chi'$ εύρισκονται εις τὰ αντίθετα ήμιεπίπεδα άκμής AA' (άντίρροποι).

43. 2. Συμμετρικόν εύθείας ϵ

α) Έάν O κεΐται επί τής ϵ .

Άπό τήν §43.1 έννοοϋμεν ότι τó συμμετρικόν ϵ' εύθείας ϵ διερχομένης διά τοϋ κέντρου O συμπίπτει με τήν ϵ ($\epsilon \equiv \epsilon'$).



Σχ. 96


β) Έάν O κεΐται έκτός τής ϵ .

Σκεπτόμεθα ότι τó συμμετρικόν τής ϵ πρέπει νά είναι μία εύθεια ϵ' (§42.2). Συνεπώς διά νά τήν προσδιορίσωμεν άρκεΐ νά εύρωμεν τὰ συμμετρικά A' και B' δύο σημείων A, B τής ϵ , σχ. 97. Με παράλληλον μετατόπισιν διαπιστώνομεν ότι ή ϵ' είναι παράλληλος πρós τήν ϵ . Τοϋτο άλλωστε έπρεπε νά τó αναμένωμεν άφοϋ, καθώς είδομεν, τó συμμετρικόν ήμιευθείας μή διερχομένης διά τοϋ O , είναι ήμιευθεία παράλληλος πρós αύτήν.


43. 3. Συμμετρικόν γωνίας. Ίσότης τών κατά κορυφήν γωνιών

Εΐναι φανερόν ότι διά νά εύρωμεν τó συμμετρικόν μιās γωνίας άρκεΐ νά εύρωμεν τὰ συμμετρικά τών πλευρών αύτής.


Διακρίνομεν τās έξής περιπτώσεις



Σχ. 97



Σχ. 98



Σχ. 99

α) Όταν ή κορυφή συμπίπτει με τó κέντρον συμμετρίας.

Άς εύρωμεν τó συμμετρικόν τής γωνίας AOB , σχ. 98.

Εις τήν $\Sigma(O)$ αί ήμιευθείαι OA, OB έχουν συμμετρικάς τās αντίθετους αύτών ήμιευθείας OA', OB' άντιστοίχως. Τυχοϋσα ήμιευθεία OM , έσωτερική τής γωνίας AOB , έχει συμμετρικήν τήν αντίθετον αύτής OM' , έσωτερικήν τής γωνίας $A'OB'$.

*Ητοι: Εις τήν $\Sigma(O)$ ή γωνία AOB έχει ώς συμμετρικήν τήν κατά κορυφήν αύτής γωνίαν.

Άπό τήν ίσότητα τών συμμετρικών σχημάτων συμπεραΐνομεν ότι:

Αί κατά κορυφήν γωνίαι είναι ίσαι.


β) Όταν η κορυφή δὲν συμπίπτει μὲ τὸ κέντρο συμμετρίας.

Ἄς εὔρωμεν τὸ συμμετρικὸν τῆς γωνίας $\chi\Lambda\psi$, σχ. 99.

Εὐρίσκομεν ἡμιευθείας $A'\chi'$, $A'\psi'$ συμμετρικὰς τῶν $A\chi$, $A\psi$ ἀντιστοίχως εἰς τὴν $\Sigma(O)$. Ἡ γωνία $\chi'A'\psi'$ εἶναι συμμετρικὴ τῆς γωνίας $\chi\Lambda\psi$ εἰς τὴν $\Sigma(O)$.

43. 4. Συμμετρικὸν εὐθ. τμήματος

Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ συμμετρικὸν ἑνὸς εὐθ. τμήματος AB ἀρκεῖ νὰ εὔρωμεν τὰ συμμετρικὰ τῶν ἄκρων A καὶ B αὐτοῦ.



Σχ. 100


Εἰς τὸ σχ. 100 φαίνεται τὸ συμμετρικὸν τοῦ εὐθ. τμήματος AB εἰς τὴν $\Sigma(O)$, ὅπου τὸ O κεῖται ἐκτὸς εὐθείας AB .

Εἶναι τὸ εὐθ. τμήμα $A'B'$ παράλληλον καὶ ἴσον πρὸς τὸ AB . Ἔχει δὲ ὡς ἄκρα A' , B' τὰ συμμετρικὰ τῶν ἄκρων τοῦ AB .

43. 5. Συμμετρικὸν τριγώνου

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ συμμετρικὸν τριγώνου $AB\Gamma$ εἰς τὴν $\Sigma(O)$ εὐρίσκομεν τὰ συμμετρικὰ A' , B' , Γ' τῶν κορυφῶν αὐτοῦ, σχ. 101. Τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ εἶναι τὸ ζητούμενον· εἶναι δὲ εὐθέως ἴσον μὲ τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$.

Εἶναι εὐκόλον νὰ ἐνοήσωμεν ὅτι ἐὰν φέρωμεν εἰς συμπτωσιν τὰ δύο ἴσα τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ $A'B'\Gamma'$, τότε ἐκάστη πλευρὰ καὶ ἐκάστη γωνία τοῦ ἑνὸς τριγώνου συμπίπτει μὲ μίαν πλευρὰν καὶ μὲ μίαν γωνίαν τοῦ ἄλλου τριγώνου. Τοιοῦτοτρόπως εἰς τὰ ἴσα τρίγωνα τοῦ σχ. 101 ἔχομεν τὰς ἑξῆς ἰσότητες.



Σχ. 101

$$\begin{aligned} \widehat{A} &= \widehat{A'} \\ AB &= A'B' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \widehat{B} &= \widehat{B'} \\ B\Gamma &= B'\Gamma' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \widehat{\Gamma} &= \widehat{\Gamma'} \\ A\Gamma &= A'\Gamma' \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

100. Χαράξατε δύο τεμνομένας εὐθείας ϵ , ϵ' . Μετρήσατε τὴν μίαν ἀπὸ τὰς 4 σχηματιζομένας γωνίας καὶ ὑπολογίσατε τὰς ἄλλας τρεῖς γωνίας.

101. Νὰ εὑρετε τὸ συμμετρικὸν μιᾶς μὴ κυρτῆς γωνίας ὡς πρὸς τὴν κορυφὴν αὐτῆς.

102. Χαράξατε δύο εὐθείας ϵ , ϵ' τεμνομένας εἰς τὸ σημεῖον O . Ἐπὶ τῆς ϵ καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ O , λάβετε δύο σημεία A , B τοιαῦτα ὥστε $OA=OB$. Ἐπὶ δὲ τῆς ϵ' καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ O , δύο ἄλλα σημεία τοιαῦτα ὥστε $OG=OD$:

α) Εἰς τὴν $\Sigma(O)$ νὰ εὑρετε τὰ ὁμόλογα τῶν OA , $\Gamma\Delta$, καὶ BA .

β) Νὰ ἐξετάσετε ἐὰν αἱ εὐθεῖαι $A\Gamma$ καὶ $B\Delta$ εἶναι παράλληλοι.

103. Εἰς τὸ σχέδιον τῆς προηγουμένης ἀσκῆσεως νὰ ἐξετάσετε διατὶ ἡ εὐθεῖα τῶν μέσων τῶν τμημάτων $A\Gamma$ καὶ $B\Delta$ διέρχεται διὰ τοῦ σημείου O .

104. Ποῖον εἶναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ σχήματος $AB\Gamma\Delta$, τῆς ἀσκῆσεως 103 εἰς τὴν $\Sigma(O)$;

44. ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ


44. 1. Ὅρισμὸς

Ποῖον εἶναι τὸ συμμετρικὸν ἑνὸς κύκλου εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὸ κέντρον O αὐτοῦ;

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ συμμετρικὸν ἑνὸς σημείου A αὐτοῦ εἶναι τὸ σημείον A' , τὸ ὁποῖον κεῖται ἐπὶ τοῦ ἰδίου κύκλου ($OA = OA'$), σχ. 102.

Γενικῶς τὸ συμμετρικὸν ἑκάστου σημείου τοῦ κύκλου κεῖται ἐπὶ τοῦ ἰδίου κύκλου.

Ἦτοι: Εἰς τὴν $\Sigma(O)$, ὁ κύκλος (O, α) συμπίπτει μὲ τὸν συμμετρικὸν του. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ κέντρον τοῦ κύκλου εἶναι κέντρον συμμετρίας αὐτοῦ.




Σχ. 102

Γενικῶς: Ἐν σημείον O εἶναι κέντρον συμμετρίας σχήματος, ἐὰν εἰς τὴν $\Sigma(O)$, τὸ σχῆμα τοῦτο συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικὸν του.

Ἐν σχῆμα δυνατόν νὰ ἔχη ἓν ἢ περισσότερα κέντρα συμμετρίας.

44. 2. Παραδείγματα

α) Τὰ σύμβολα X , H , N , Ξ , Z ἔχουν κέντρον συμμετρίας. Ποῖον;



Σχ. 103

β) Τὸ μέσον εὐθ. τμήματος εἶναι τὸ μοναδικὸν κέντρον συμμετρίας αὐτοῦ. (Διατί;).

γ) Εἶδομεν ὅτι τὸ συμμετρικὸν εὐθείας ὡς πρὸς σημείον αὐτῆς εἶναι ἡ ἴδια εὐθεῖα.

Ἦτοι:

Ἡ εὐθεῖα ἔχει ἕκαστον σημείον αὐτῆς κέντρον συμμετρίας. Ἀντιθέτως:

Μία ἡμιευθεῖα οὐδὲν κέντρον συμμετρίας ἔχει. (Διατί;).

δ) Εἰς τὸ σχέδιον 103 ὑπάρχει κέντρον συμμετρίας; Ποῖον;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


105. Νὰ εὑρετε γνωστὰ σύμβολα, σχέδια, μὲ κέντρον συμμετρίας.

106. Νὰ εὑρετε τὸ κέντρον συμμετρίας:

α) Δύο τεμνομένων ευθειών. β) Δύο παραλλήλων και ίσων ευθ. τμημάτων. γ) Δύο κατά κορυφήν γωνιών. δ) Τοῦ σχήματος, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν ευθ. τμήμα καὶ τὴν μεσοκάθετον αὐτοῦ.

45. ΕΥΘΕΙΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Γνωρίζομεν ἤδη τί εἶναι παράλληλοι εὐθεῖαι. Κατωτέρω θὰ ἔχωμεν τὴν εὐκαιρίαν διὰ μίαν καλυτέραν γνωριμίαν μὲ αὐτάς.



Σχ. 104

Εἰς ἓν ἐπίπεδον χαράσσομεν μίαν εὐθεῖαν ϵ καὶ δύο καθέτους πρὸς αὐτὴν $\delta \perp \epsilon$, $\delta' \perp \epsilon$. (σχ. 104).

Ἐὰν προσέξωμεν τὰς δύο διαφορετικὰς εὐθεῖας δ , δ' .

- α) Εὐρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον καὶ
- β) δὲν τέμνονται*

Δύο εὐθεῖαι, αἱ ὁποῖαι εὐρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον καὶ δὲν τέμνονται, λέγονται παράλληλοι

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Ἐάν δύο εὐθεῖαι τοῦ ἐπιπέδου εἶναι κάθετοι πρὸς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν, τότε αὐταὶ εἶναι μεταξύ των παράλληλοι.

Ἡ συμβολικῶς : $\left\{ \begin{array}{l} \delta, \delta' \in \Pi \text{ καὶ} \\ \delta \perp \epsilon \\ \delta' \perp \epsilon \end{array} \right\} \Rightarrow \delta \parallel \delta'$


46. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΠΡΟΣ ΕΥΘΕΙΑΝ

Διὰ νὰ χαράξωμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον A εὐθεῖαν παράλληλον πρὸς τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ϵ , σχ. 105, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

1. Τοποθετοῦμεν κατὰ μῆκος τῆς ϵ μίαν ἀπὸ τὰς καθέτους πλευρὰς τοῦ γνώμονος γ . Π.χ. τὴν πλευρὰν α .

2. Κατὰ μῆκος τῆς δευτέρας καθέτου πλευρᾶς αὐτοῦ β , τοποθετοῦμεν τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνα K .

3. Κρατοῦμεν ἀκίνητον τὸν κανόνα καὶ μετακινούμεν (μὲ ὀλίσθησιν) τὸν γνώμονα προσέχοντας νὰ ἐφαρμόζη διαρκῶς ἢ δευτέρα κάθετος πλευρὰ β αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ κανόνα. Εἰς τὴν θέσιν (I) τοῦ γνώμονος, σχ. 105, ἡ κάθετος πλευρὰ α αὐτοῦ διέρχεται διὰ τοῦ σημείου A .



Σχ. 105

4. Χαράσσομεν τὴν εὐθεῖαν ϵ' ἢ ὁποῖα ὀρίζεται ὑπὸ τῆς πλευρᾶς α . Ἡ εὐθεῖα αὕτη διέρχεται διὰ τοῦ σημείου A καὶ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ . (Διατί;).

* Ἐὰν ἐτέμνοντο (ἔστω εἰς τὴν προέκτασίν των), τότε ἀπὸ τὸ σημεῖον τομῆς θὰ εἶχομεν δύο καθέτους πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ

Γενικῶς ἐκάστη θέσις τῆς πρώτης καθέτου πλευρᾶς α ὀρίζει μίαν παράλληλον εὐθεΐαν πρὸς τὴν εὐθεΐαν ϵ .

47. ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΝ ΑΙΤΗΜΑ

Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα :

Μήπως ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον A ἦτο δυνατόν νὰ χαράξωμεν καὶ ἄλλην παράλληλον πρὸς τὴν εὐθεΐαν ϵ ; Πρακτικῶς εἰς τὸ σχέδιόν μας βεβαιούμεθα ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Εἰς τὴν Γεωμετρίαν, τὴν ὁποίαν μελετοῦμεν, παραδεχόμεθα ὅτι :

Ἐκ τῆς ἑνὸς σημείου ἐκτὸς εὐθείας, μία καὶ μόνον μία παράλληλος διέρχεται πρὸς τὴν εὐθεΐαν αὐτήν.

Ἡ ἀνωτέρω πρότασις εἶναι θεμελιώδης, εἶναι δὲ γνωστὴ ὡς **Εὐκλείδειο ν* αἴτημα**.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

107. Χαράξατε δύο εὐθείας παραλλήλους καὶ μίαν ἄλλην εὐθεΐαν κάθετον πρὸς τὴν μίαν ἀπὸ αὐτάς. Πῶς τέμνει ἡ κάθετος αὐτὴ τὴν ἄλλην παράλληλον; Χρησιμοποιήσατε τὰ ὄργανά σας.


108. Χαράξατε δύο εὐθείας παραλλήλους καὶ μίαν ἄλλην παράλληλον πρὸς μίαν ἀπὸ αὐτάς. Ποία ἡ θέσις τῆς τελευταίας αὐτῆς εὐθείας ὡς πρὸς τὴν ἄλλην παράλληλον; (Χρησιμοποιήσατε παράλληλον μετατόπισιν).

109. Νὰ εὑρετε διατί αἱ ἐφαπτόμενα κύκλου εἰς τὰ ἄκρα μιᾶς διαμέτρου αὐτοῦ εἶναι παράλληλοι.

48. ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ

48. 1. Χαράσσομεν δύο εὐθείας παραλλήλους, $\epsilon \parallel \epsilon'$, λαμβάνομεν δὲ ἓν σημεῖον A τῆς ϵ καὶ ἓν σημεῖον A' τῆς ϵ' . Ἄς συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὸ μέσον O_1 τοῦ τμήματος AA' , σχ. 106.

α) Εἶναι φανερόν ὅτι τὰ A καὶ A' εἶναι συμμετρικά.



β) Ἡ συμμετρικὴ τῆς ϵ , ὅπως γνωρίζομεν (§43.2), εἶναι παράλληλος πρὸς αὐτήν καὶ διέρχεται διὰ τοῦ A' . Ἦτοι εἶναι ἡ ϵ' .


* **Εὐκλείδης**: Διάσημος Ἕλληνας μαθηματικός (300 π.Χ.). Εἰς τὸ περίφημον ἔργον του εἰς τὰς «Στοιχεῖα», ὄργάνωσε κατὰ θαυμάσιον τρόπον τὰς μαθηματικὰς γνώσεις τῆς ἐποχῆς του. Ἐκτοτε τὰ «Στοιχεῖα» ἀποτελοῦν τὰς βάσεις τῆς γεωμετρικῆς μορφώσεως.

γ) Όμοιως ή συμμετρική τῆς ϵ' εἶναι ή ϵ .

Ἀπό τὰ ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι :

Εἰς τὴν $\Sigma(O_1)$ τὸ σχῆμα τῶν δύο παραλλήλων ϵ, ϵ' ἔχει κέντρον συμμετρίας τὸ σημεῖον O_1 .

48. 2. Ἄραγε τὸ σημεῖον O_1 εἶναι τὸ μοναδικὸν κέντρον συμμετρίας τῶν παραλλήλων ϵ, ϵ' ; Εἰς τὸ σχ. 107, ἐπὶ τῶν ἰδίων εὐθειῶν ϵ, ϵ' ἔχομεν λάβει ἐν ἄλλο ζεύγος σημείων B, B' , τοῦ ὁποῖου τὸ μέσον O_2 εἶναι διάφορον τοῦ O_1 . Ἐργαζόμενοι ὡς ἀνωτέρω εὐρίσκομεν ὅτι καὶ τὸ σημεῖον O_2 εἶναι κέντρον συμμετρίας τῶν ϵ, ϵ' .



Σχ. 110

48. 3. Ἀπὸ τὰ προηγούμενα ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ σχῆμα τῶν δύο παραλλήλων ϵ, ϵ' ἔχει ἄπειρα κέντρα συμμετρίας.

Ἄς εὐρωμεν μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ: Τὰ O_1, O_2, O_3, \dots , σχ. 108. Παρατηροῦμεν ὅτι ὅλα κεῖνται ἐπὶ εὐθείας μ παραλλήλου πρὸς τὰς ϵ, ϵ' . Ἡ εὐθεῖα μ λέγεται μεσοπαράλληλος τῶν δύο παραλλήλων ϵ, ϵ' .

48. 4. Λαμβάνομεν ἐν τυχόν σημείον N τῆς μεσοπαράλληλου μ τῶν ϵ, ϵ' , σχ. 109. Ἐπειτα διὰ τοῦ N φέρομεν διάφορα εὐθ. τμήματα v_1, v_2, v_3, \dots περατούμενα εἰς τὰς παραλλήλους ϵ, ϵ' . Μὲ τὸν διαβήτην μας εἶναι εὐκολον νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι τὸ σημεῖον N εἶναι τὸ μέσον ἐκάστου τῶν τμημάτων τούτων. Ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν αὐτὴν ὀδηγοῦμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι :

Πᾶν σημεῖον τῆς μεσοπαράλληλου μ εἶναι κέντρον συμμετρίας τοῦ σχήματος τῶν δύο παραλλήλων ϵ, ϵ' .

48. 5. Ἄς διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον τῶν δύο παραλλήλων ϵ, ϵ' περὶ τὴν μεσοπαράλληλον μ αὐτῶν. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι αἱ παράλληλοι ϵ, ϵ' συμπίπτουν: Ἀπὸ τὸ πείραμα τοῦτο ὀδηγοῦμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι :

Ἡ μεσοπαράλληλος μ εἶναι ἄξων συμμετρίας τῶν δύο παραλλήλων ϵ, ϵ' .

49. ΓΩΝΙΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΤΕΜΝΟΥΣΗΣ ΑΥΤΑΣ

Χαράσσομεν δύο εὐθείας α, β καὶ μίαν τρίτην τέμνουσαν αὐτάς, σχ. 110. Καθὼς παρατηροῦμεν, τὸ κοινὸν σημεῖον A τῶν εὐθειῶν α καὶ γ εἶναι κορυφή 4 ᾠγωνίων (A_1, A_2, A_3, A_4) μὲ τὴν μίαν πλευρὰν ἐπὶ τῆς γ καὶ τὴν ἄλλην ἐπὶ τῆς α . Όμοίως τὸ σημεῖον B , τῶν εὐθειῶν β καὶ γ , εἶναι κορυφή 4 ᾠγωνίων (B_1, B_2, B_3, B_4) μὲ τὴν μίαν πλευρὰν ἐπὶ τῆς γ καὶ τὴν ἄλλην ἐπὶ τῆς β .

Ἀπὸ τὰς 8 αὐτάς ᾠγωνίας αἱ 4, καὶ συγκεκριμένως αἱ A_1, A_2, B_1, B_2 , ἔχουν

ὡς μίαν πλευρὰν τὴν ἡμιευθεῖαν AB ἢ τὴν ἡμιευθεῖαν BA καὶ λέγονται ἐσωτερικαὶ ἢ ἐντὸς.

Αἱ ἄλλαι τέσσαρες γωνίαι, αἱ A_3, A_4, B_3, B_4 , ἔχουν ὡς μίαν πλευρὰν τὴν ἡμιευθεῖαν AZ ἢ τὴν ἡμιευθεῖαν BZ' καὶ λέγονται ἐξωτερικαὶ ἢ ἐκτὸς.

Αἱ γωνίαι A_1 καὶ B_1 , ἐπειδὴ εἶναι ἀμφοτέροι ἐντὸς καὶ κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς τεμνοῦσης γ , λέγονται ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. Ὁμοίως καὶ αἱ γωνίαι A_2, B_2 .

Αἱ γωνίαι A_2 καὶ B_1 εἶναι ἀμφοτέροι ἐντὸς ἀλλὰ οὐχὶ καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς τεμνοῦσης γ καὶ λέγονται ἐντὸς ἐναλλάξ. Ὁμοίως καὶ αἱ γωνίαι A_1 καὶ B_2 .

Αἱ γωνίαι A_4 καὶ B_1 κεῖνται ἢ μία ἐντὸς, ἢ ἄλλη ἐκτὸς ἀλλὰ ἀμφοτέροι πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς γ καὶ λέγονται ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.

50. ΓΩΝΙΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΗΣ ΑΥΤΑΣ

Εἰς τὸ σχ. 111 ἔχομεν χαράξει δύο παραλλήλους, $e \parallel e'$, καὶ μίαν εὐθεῖαν η τέμνουσαν αὐτὰς εἰς τὰ σημεῖα A καὶ A'.

Ἐὰς συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὸ μέσον O τοῦ τμήματος AA'.

Παρατηροῦμεν ὅτι: αἱ εὐθεῖαι e, e' εἶναι συμμετρικαὶ ἢ δὲ η συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς. Συνεπῶς τὸ O εἶναι κέντρον συμμετρίας τοῦ σχήματος.

α) Ἐὰς προσέξωμεν ἤδη δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας τοῦ σχήματος αὐτοῦ. Παρατηροῦμεν ὅτι: Αἱ ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίαι α' καὶ γ εἶναι συμμετρικαὶ ὡς πρὸς O ἄρα καὶ ἴσαι.

$$\widehat{\alpha'} = \widehat{\gamma}$$


β) Ἐὰν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν μας ὅτι καὶ $\widehat{\alpha} = \widehat{\gamma}$ (κατὰ κορυφὴν γωνίαι), εὐρίσκομεν ὅτι καὶ: $\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha'}$

$$(\widehat{\alpha} = \widehat{\gamma} \text{ καὶ } \widehat{\gamma} = \widehat{\alpha'}) \Rightarrow \widehat{\alpha} = \widehat{\alpha'}$$

γ) Ἐπειδὴ $\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha'}$ καὶ $\widehat{\alpha} + \widehat{\delta} = 2L$ θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\alpha'} + \widehat{\delta} = 2L$

Ἔστωτε: Δύο εὐθεῖαι παράλληλοι σχηματίζουν μὲ μίαν τέμνουσαν αὐτάς:


- 1) Τὰς ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας ἴσας.
- 2) Τὰς ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας ἴσας.
- 3) Τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας παραπληρωματικὰς.



Σχ. 111

51. ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ

51. 1. Σχηματίζομεν δύο ίσας γωνίας, $\widehat{\omega} = \widehat{\varphi}$ και τὰς τοποθετοῦμεν ὅπως δεικνύει τὸ σχ. 112. Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ σχέδιον αὐτὸ αἱ εὐθεῖαι ϵ, ϵ' τέμνονται ὑπὸ τῆς εὐθείας OO' καὶ σχηματίζουν δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας ἴσας. Ποίαν θέσιν ἔχουν μετὰ τῶν αἱ εὐθεῖαι ϵ, ϵ' ; Μὲ παράλληλον μετατόπισιν διαπιστώνομεν ὅτι αἱ εὐθεῖαι ϵ, ϵ' εἶναι παράλληλοι.



Σχ. 112

Τοῦτο δικαιολογεῖται ὡς ἑξῆς :

Ἐὰν ἡ ϵ' δὲν ἦτο παράλληλος πρὸς τὴν ϵ τότε ὡς γνωστὸν θὰ ὑπῆρχε μία ἄλλη εὐθεῖα η , ἡ ὅποια θὰ διήρχετο διὰ τοῦ O καὶ θὰ ἦτο παράλληλος πρὸς τὴν ϵ . Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν αἱ γωνία φ' καὶ ω , σχ. 112, θὰ ἦσαν ἴσαι (ἐντὸς ἐναλλάξ τῶν παραλλήλων ϵ καὶ η).

Ἦτοι θὰ ἦτο $\left. \begin{matrix} \widehat{\omega} = \widehat{\varphi} \\ \widehat{\omega} = \widehat{\varphi}' \end{matrix} \right\} \Rightarrow \widehat{\varphi} = \widehat{\varphi}'$

Ἀπὸ τὴν ἰσότητα τῶν γωνιῶν φ καὶ φ' ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ εὐθεῖαι ϵ' καὶ η συμπίπτουν.

Ὡστε: Ἐὰν δύο εὐθεῖαι τέμνονται ὑπὸ τρίτης καὶ σχηματίζουν δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας ἴσας θὰ εἶναι παράλληλοι.

51. 2. Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω πρότασιν προκύπτουν καὶ αἱ ἑξῆς :

Ἐὰν δύο εὐθεῖαι τεμνόμεναι ὑπὸ τρίτης σχηματίζουν :
 δύο ἐντὸς, ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας ἴσας
 ἢ δύο ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας παραπληρωματικὰς
 τότε αὐταὶ θὰ εἶναι παράλληλοι.

Σύνοψις. Αἱ προτάσεις τῶν παραγράφων 50 καὶ 51 συνοψίζονται ὡς ἑξῆς :

$\epsilon \parallel \epsilon' \iff$	$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{ Ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίαὶ ἴσαι.} \\ 2. \text{ Ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίαὶ ἴσαι.} \\ 3. \text{ Ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίαὶ παραπληρωματικαί.} \end{array} \right.$
-------------------------------------	--

52. Ἐφαρμογαί

52. 1. Ἡ πρότασις τῆς παρ. 50 μᾶς ἐπιτρέπει, ὅταν γνωρίζομεν μίαν ἀπὸ τὰς 8 γωνίας αἱ ὅποια σχηματίζονται ὑπὸ δύο παραλλήλων καὶ μιᾶς τεμνοῦσης αὐτάς, νὰ ὑπολογίσωμεν τὰς ἄλλας 7.

Π.χ. ἐὰν εἰς τὸ σχ. 111 εἶναι $\widehat{\alpha} = 60^\circ$ τότε θὰ ἔχωμεν :


$$\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha}' = \widehat{\gamma} = \widehat{\gamma}' = 60^\circ$$

$$\widehat{\beta} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \quad \text{καὶ} \quad \widehat{\beta} = \widehat{\delta} = \widehat{\beta}' = \widehat{\delta}' = 120^\circ$$

52. 2. Ἡ πρότασις τῆς παρ. 51 μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὸν ἐξῆς τρόπον χαράξεως παραλλήλων μὲ γνώμονα καὶ κανόνα.

Ἔστω ὅτι θέλωμεν νὰ χαράξωμεν εὐθεῖαν εἴ παραλληλον πρὸς δοθεῖσαν εὐθεῖαν ϵ , σχ. 113.

Πρὸς τοῦτο τοποθετοῦμεν κατὰ μῆκος τῆς ϵ μίαν πλευρὰν τοῦ γνώμονος καὶ ἐφαρμόζομεν εἰς μίαν ἐκ τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος (θέσις α'). Ἐπειτα ὀλισθαίνομεν τὸν γνῶμονα, κατὰ μῆκος τῆς ἀκμῆς τοῦ κανόνος εἰς μίαν ἄλλην θέσιν (θέσις β'). Εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν χαράσσομεν εὐθεῖαν εἴ κατὰ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ γνῶμονος, ἡ ὁποία ἀρχικῶς ἐφήρμοξε ἐπὶ τῆς εὐθείας ϵ . Αἱ εὐθεῖαι ϵ , ϵ' εἶναι μεταξὺ των παράλληλοι. (Διατί; Προσέξατε τὰς γωνίας α , α' τοῦ σχεδίου 113).



Σχ. 113

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

110. Δύο εὐθεῖαι παράλληλοι τέμνονται ὑπὸ τρίτης εὐθείας καὶ σχηματίζουν μίαν γωνίαν 75° . Νὰ εὑρετε τὰς τιμὰς (εἰς μοίρας) τῶν ἄλλων 7 γωνιῶν.

111. Χαράξατε δύο εὐθείας παραλλήλους $\alpha // \beta$ καὶ ἔπειτα δύο ἄλλας παραλλήλους $\gamma // \delta$, αἱ ὁποῖαι τέμνουν τὰς δύο πρώτας. Νὰ εὑρετε ὅλας τὰς ἴσας γωνίας τοῦ σχήματος αὐτοῦ.

112. Δύο εὐθεῖαι παράλληλοι ($\alpha // \beta$) τέμνονται ὑπὸ εὐθείας γ καὶ σχηματίζουν δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας ὀρθάς. Ποῖαν θέσιν ἔχει ἡ εὐθεῖα γ ὡς πρὸς τὰς εὐθείας α καὶ β ;

113. Ἀπὸ ἓν σημεῖον τῆς διχοτόμου μιᾶς γωνίας 50° φέρομεν παραλλήλους πρὸς τὰς πλευρὰς αὐτῆς. Νὰ ὑπολογίσετε τὰς ἄλλας γωνίας τοῦ σχήματος αὐτοῦ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

114. Νὰ χαράξατε δύο ἴσους κύκλους καὶ ἔπειτα ἓνα ἄξονα συμμετρίας τοῦ σχήματος τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς κύκλους.

115. Δύο εὐθεῖαι παράλληλοι τέμνονται ὑπὸ τρίτης εὐθείας καὶ σχηματίζουν δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας παραπληρωματικὰς. Ποῖα εἶναι ἡ θέσις τῆς τεμνουσῆς ὡς πρὸς τὰς πλευρὰς;

116. Τὸ ἄθροισμα 4 διαδοχικῶν γωνιῶν εἶναι 360° . Ἐὰν ἡ 1η εἶναι 70° , ἡ 2α τριπλασία τῆς τρίτης καὶ ἡ 4η ἴση μὲ 90° , ὑπολογίσετε ἐκάστην τῶν γωνιῶν αὐτῶν.

117. Δύο εὐθεῖαι ϵ , ϵ' τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον O . Ἐὰν λάβωμεν ἐπὶ τῆς ϵ : $AO=OB$ καὶ ἐπὶ τῆς ϵ' : $GO=OD$, νὰ ἐξετάσετε ἔαν αἱ εὐθεῖαι AD καὶ GB εἶναι παράλληλοι. Νὰ εὑρετε ἐπίσης τὸ συμμετρικὸν τοῦ σχήματος $AGBD$ ὡς πρὸς τὸ O .

118. Χαράσσομεν μίαν εὐθεῖαν ϵ καὶ δύο ἡμιευθείας $A\chi$, $B\psi$, ὅπου A , $B \in \epsilon$. Ἐπειτα χαράσσομεν τὰς συμμετρικὰς $A\chi'$, $B\psi'$ τῶν ἡμιευθειῶν $A\chi$, $B\psi$ εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$. Ἐὰν M , M' εἶναι τὰ σημεῖα τομῆς τῶν $A\chi$, $B\psi$ καὶ $A\chi'$, $B\psi'$, νὰ ἐξετάσετε ἔαν ἡ ϵ εἶναι μεσοκάθετος πρὸς τὸ τμήμα MM' (Δικαιολογήσατε τὴν ἀπάντησίν σας).

119. Ἐξετάσατε ἔαν ἰσχύει ἡ ἐξῆς πρότασις :

Εἰς τὴν συμμετρίαν (ὡς πρὸς εὐθεῖαν ἢ πρὸς σημεῖον) ἡ τομὴ δύο σχημάτων (K) , (Λ) ἔχει ὁμόλογον τὴν τομὴν τῶν ὁμολόγων (K') , (Λ') τῶν σχημάτων (K) καὶ (Λ) .

Λάβατε ὡς σχήματα (K) , (Λ) 2 εὐθείας ἢ δύο κύκλους ἢ εὐθεῖαν καὶ κύκλον.

120. Χαράξατε δύο τεμνομένας εὐθείας ϵ , ϵ' . Ἐπειτα γράψατε κύκλον μὲ κέντρον τὸ σημεῖον τομῆς αὐτῶν O . Ἐὰν ὁ κύκλος οὗτος τέμνη τὴν μὲν ϵ εἰς τὰ σημεῖα A , Γ τὴν δὲ ϵ' εἰς τὰ B καὶ Δ , νὰ εὑρετε :


α) τὰ συμμετρικὰ τῶν AB , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, ΔA , $A\Gamma$, $B\Delta$, ὡς πρὸς τὸ O .

β) τὸ συμμετρικὸν τοῦ σχήματος $AB\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ κέντρον O . Τί παρατηρεῖτε;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

53. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

53. 1. Ἐὰν εἶναι A, B, Γ τρία διαφορετικὰ σημεῖα, μὴ κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας, σχ. 114. Τὸ σύνολον τῶν εὐθ. τμημάτων $AB, B\Gamma, \Gamma A$ λέγεται τριγώνον.




Σχ. 114

Τὰ σημεῖα A, B, Γ , λέγονται κορυφαί, ἐνῶ τὰ εὐθ. τμήματα $AB, B\Gamma$ καὶ ΓA πλευραὶ τοῦ τριγώνου τούτου.

Ἐν τριγώνον με κορυφὰς A, B, Γ , ὀνομάζεται τριγώνον $AB\Gamma$ ἢ συμβολικῶς: $\Delta. AB\Gamma$.

53. 2. Εἰς τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, σχ. 115, ἔχομεν σημειώσει τὰ τρία ἡμιεπίπεδα ($B\Gamma, A$), (AB, Γ) καὶ ($A\Gamma, B$). Ἦτοι τὰ ἡμιεπίπεδα τὰ ὁποῖα ὀρίζει ἡ εὐθεῖα ἐκάστης πλευρᾶς μετὴν ἀπέναντι αὐτῆς κορυφῆν. Ἡ τομὴ καὶ τῶν τριῶν αὐτῶν ἡμιεπιπέδων λέγεται ἐσωτερικὸν τοῦ τριγώνου. Ἐκαστον σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου τὸ ὁποῖον δὲν κεῖται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ τριγώνου, οὔτε εἰς τὰς πλευρὰς αὐτοῦ, λέγεται ἐξωτερικὸν τοῦ τριγώνου.



Σχ. 115

Ἐκάστη κορυφὴ τοῦ τριγώνου εἶναι κορυφὴ μιᾶς κυρτῆς γωνίας εἰς τὰς πλευρὰς τῆς ὁποίας κεῖνται δύο πλευραὶ τοῦ τριγώνου· λέγεται δὲ γωνία τοῦ τριγώνου. Συνήθως ἐκάστη γωνία τοῦ τριγώνου ὀνομάζεται μετὸ γράμμα τῆς κορυφῆς τῆς. Π.χ. γωνία A , γωνία B , γωνία Γ .


Εἰς τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ ἡ γωνία A ἔχει προσκειμέναν τὰς πλευρὰς AB καὶ $A\Gamma$ καὶ ἀπέναντι τὴν πλευρὰν $B\Gamma$.

Αἱ τρεῖς πλευραὶ καὶ αἱ τρεῖς γωνίαι ἑνὸς τριγώνου λέγονται πρῶτεύοντα στοιχεῖα αὐτοῦ.

54. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

54. 1. Ύψος

Ἀπὸ τὴν κορυφὴν Α τριγώνου ΑΒΓ, σχ. 116, 117, δυνάμεθα νὰ χαράξωμεν μίαν κάθετον πρὸς τὴν εὐθεῖαν τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς ΒΓ.



Τὸ τμήμα ΑΔ τῆς καθέτου ταύτης ἢ καὶ ὁλόκληρος ἡ εὐθεῖα τῆς καθέτου, λέγεται ὕψος τοῦ τριγώνου ΑΒΓ πρὸς τὴν πλευρὰν ΒΓ. Τὸ σημεῖον Δ λέγεται ἴχνος τοῦ ὕψους τούτου.

54. 2. Διάμεσος

Ἡ κορυφή Α καὶ τὸ μέσον Μ τῆς ἀπέναντι αὐτῆς πλευρᾶς ΒΓ, σχ. 118, ὀρίζουν τὸ εὐθ. τμήμα ΑΜ. Τὸ τμήμα τοῦτο ἢ καὶ ὁλόκληρος ἡ εὐθεῖα αὐτοῦ λέγεται διάμεσος τοῦ τριγώνου ΑΒΓ πρὸς τὴν πλευρὰν ΒΓ.

54. 3. Διχοτόμος

Τὸ τμήμα ΑΕ, σχ. 119, τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας Α τριγώνου ΑΒΓ ἢ καὶ ὁλόκληρος ἡ ἡμιευθεῖα αὐτῆς λέγεται διχοτόμος τῆς γωνίας Α τοῦ τριγώνου τούτου. Τὸ σημεῖον Ε λέγεται ἴχνος τῆς διχοτόμου αὐτῆς.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω :

Ἐκαστον τρίγωνον ἔχει 3 ὕψη, 3 διαμέσους καὶ 3 διχοτόμους


Τὰ ὕψη, αἱ διάμεσοι καὶ αἱ διχοτόμοι λέγονται δευτερεύοντα στοιχεῖα τοῦ τριγώνου. Ἀργότερον θὰ γνωρίσωμεν καὶ ἄλλα δευτερεύοντα στοιχεῖα αὐτοῦ.

55. ΑΝΙΣΟΤΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

55. 1. Ἄς ζητήσωμεν νὰ συγκρίνωμεν ἐκάστην πλευρὰν τριγώνου ΑΒΓ πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.

Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\left. \begin{array}{l} ΒΓ < ΑΒ + ΑΓ \\ ΑΒ < ΑΓ + ΒΓ \\ ΑΓ < ΑΒ + ΒΓ \end{array} \right\} (\S 10. 5)$$



Σχ. 120

Ἦτοι: Ἐκάστη πλευρὰ τριγώνου εἶναι μικροτέρα τοῦ ἄθροίσματος τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.

55. 2. Εἰς τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, σχ. 120, εἶναι $AB > B\Gamma > A\Gamma$.

Ἐὰς εὐρωμεν μὲ τὰ ὄργανά μας* τὴν διαφορὰν $AB - A\Gamma$, καὶ ἄς συγκρίνωμεν αὐτὴν πρὸς τὴν πλευρὰν $B\Gamma$.

Εὐρίσκομεν ὅτι: $B\Gamma > AB - A\Gamma$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι: $AB > B\Gamma - A\Gamma$ καὶ $A\Gamma > AB - B\Gamma$


Ἦτοι: Ἐκάστη πλευρὰ τριγώνου εἶναι μεγαλύτερα τῆς διαφορᾶς τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.

56. ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

56. 1. Διάκρισις τριγώνων ὡς πρὸς τὰς γωνίας

α) Ὁρθογώνιον τρίγωνον

Κατασκευάζομεν μίαν ὀρθὴν γωνίαν $\chi A\psi$. Ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς $A\chi$ λαμβάνομεν σημεῖον B καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης πλευρᾶς $A\psi$ σημεῖον Γ . Ὀρίζομεν τοι-



Σχ. 121

ουτοτρόπως τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ τὸ ὅποιον ἔχει τὴν γωνίαν A ὀρθὴν καὶ καθὼς παρατηροῦμεν, τὰς ἄλλας γωνίας ὀξείας. Διὰ τοῦτο λέγεται ὀρθογώνιον.

Ἡ ἄπέναντι τῆς ὀρθῆς γωνίας A , πλευρὰ $B\Gamma$, λέγεται ὑποτείνουσα.

β) Ὁξυγώνιον τρίγωνον

Κατασκευάζομεν μίαν ὀξείαν γωνίαν $\chi A\psi = 40^\circ$. Ἐπειτα μὲ κορυφὴν ἐν σημείον B τῆς πλευρᾶς $A\chi$ καὶ μὲ μίαν πλευρὰν τὴν ἡμιευθεῖαν BA σχηματίζομεν μίαν γωνίαν 60° , σχ. 121 β. Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς γωνίας αὐτῆς τέμνει τὴν $A\psi$ εἰς ἓν σημεῖον Γ .

Τοιοῦτοτρόπως σχηματίζεται τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, σχ. 121 β, τὸ ὅποιον, καθὼς παρατηροῦμεν, ἔχει ὅλας τὰς γωνίας αὐτοῦ ὀξείας. Διὰ τοῦτο λέγεται ὀξυγώνιον τρίγωνον.

* Θεωρητικὴ ἐξέτασις θὰ γίνῃ εἰς ἄλλην τάξιν.

γ) Ἀμβλυγώνιον τρίγωνον

Κατασκευάζομεν μίαν ἀμβλείαν γωνίαν $\chi A\psi$ καὶ σημειώνομεν ἐπὶ τῶν πλευρῶν $A\chi$, $A\psi$ αὐτῆς τὰ σημεῖα B καὶ Γ ἀντιστοίχως, σχ. 121 γ.

Τοιοιουτρόπως ὀρίζεται τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, τὸ ὁποῖον ἔχει τὴν μίαν γωνίαν αὐτοῦ ἀμβλείαν καὶ τὰς ἄλλας ὀξείας. Διὰ τοῦτο λέγεται ἀμβλυγώνιον τρίγωνον.


Ἦτοι τὰ τρίγωνα ἀναλόγως τῶν γωνιῶν των διακρίνονται εἰς ὀρθογώνια, ὀξυγώνια καὶ ἀμβλυγώνια.

56. 2. Διάκρισις ὡς πρὸς τὰς πλευρὰς

α) Ἰσόπλευρον τρίγωνον

Χαράσσομεν ἐν εὐθ. τμήμα AB καὶ ἔπειτα δύο κύκλους, τὸν ἕνα μὲ κέντρον A καὶ ἀκτίνα AB καὶ τὸν ἄλλον μὲ κέντρον B καὶ ἀκτίνα πάλιν AB , σχ. 122α. Τὸ ἐν ἀπὸ τὰ δύο σημεῖα τομῆς τῶν δύο κύκλων, τὸ σημεῖον Γ , μὲ τὰ σημεῖα A καὶ B ὀρίζει ἐν τρίγωνον $AB\Gamma$ εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι:

$$AB = A\Gamma = B\Gamma$$



Σχ. 122 (β)

Ἐκαστον τρίγωνον, τὸ ὁποῖον ἔχει καὶ τὰς τρεῖς πλευρὰς αὐτοῦ ἴσας, λέγεται ἰσόπλευρον τρίγωνον.

β) Ἰσοσκελὲς τρίγωνον

Χαράσσομεν εὐθ. τμήμα $B\Gamma = 2$ cm. Ἐπειτα γράφομεν δύο κύκλους: τὸν ἕνα μὲ κορυφὴν B καὶ ἀκτίνα 3 cm καὶ τὸν ἄλλον μὲ κορυφὴν Γ καὶ ἀκτίνα ἐπίσης 3 cm. Τὸ ἐν ἀπὸ τὰ σημεῖα τομῆς τῶν δύο κύκλων, π.χ. τὸ σημεῖον A , μὲ τὰ σημεῖα B καὶ Γ ὀρίζει τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, σχ. 122β. Τοῦτο ἔχει δύο πλευρὰς ἴσας

$$AB = A\Gamma$$

Ἐκαστον τρίγωνον τὸ ὁποῖον ἔχει δύο πλευρὰς ἴσας, λέγεται ἰσοσκελὲς τρίγωνον.

γ) Σκαληνὸν τρίγωνον


Χαράσσομεν εὐθ. τμήμα $\Gamma B = 3$ cm καὶ δύο κύκλους μὲ κέντρα Γ , B καὶ ἀκτίνας 2,5 cm καὶ 4 cm ἀντιστοίχως. Τὸ ἐν ἐκ τῶν σημείων τομῆς τῶν δύο κύκλων, π.χ. τὸ σημεῖον A , μὲ τὰ σημεῖα B καὶ Γ ὀρίζει τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, τὸ ὁποῖον ἔχει:

$$AB \neq B\Gamma, \quad AB \neq A\Gamma \quad \text{καὶ} \quad A\Gamma \neq B\Gamma$$

Ἐκαστον τρίγωνον τὸ ὁποῖον ἔχει τὰς πλευρὰς του ἀνίσους ἀνὰ δύο, λέγεται σκαληνὸν τρίγωνον.

56. 3. Ὡστε: τὰ τρίγωνα ἀναλόγως τῶν πλευρῶν των διακρίνονται εἰς ἰσόπλευρα, ἰσοσκελῆ καὶ σκαληνά.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐὰν λάβωμεν ὡς βασικὸν σύνολον Ω τῶν γεωμ. σχημάτων τοῦ ἐπιπέδου καὶ παραστήσωμεν:



Σχ. 123

Με T τὸ σύνολον τῶν τριγώνων, με T' τὸ σύνολον τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων καὶ με T'' τὸ σύνολον τῶν ἰσοπλευρῶν τριγώνων, τότε αἱ σχέσεις μεταξύ τῶν ἰσοσκελῶν, ἰσοπλευρῶν καὶ σκαληνῶν τριγώνων, ἀποδίδονται ὑπὸ τοῦ διαγράμματος τοῦ σχ. 123.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

121. Χαράξατε προσεκτικῶς τὰ 3 ὕψη ἑνὸς ὀξυγωνίου τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε;

122. Χαράξατε προσεκτικῶς τὰς 3 διαμέσους ἑνὸς ὀξυγωνίου τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε;

123. Χαράξατε προσεκτικῶς τὰς 3 διχοτόμους ἑνὸς ὀξυγωνίου τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε;

124. Σχεδιάσατε ἓν τρίγωνον $AB\Gamma$. Νὰ ἐξετάσετε ἐὰν εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ ὑπάρχουν δύο σημεῖα Δ καὶ E , τὸ Δ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ E ἐξωτερικὸν τοῦ τριγώνου, τοιαῦτα ὥστε $\Delta E \parallel AB\Gamma = \beta'$.

125. Τὰ μήκη δύο πλευρῶν τριγώνου εἶναι 5 cm καὶ 7 cm. Μεταξύ ποίων τιμῶν εὐρίσκεται τὸ μήκος τῆς τρίτης πλευρᾶς αὐτοῦ;

57. ΤΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

57. 1. Κατασκευάζομεν μίαν γωνίαν $\chi A\psi$ καὶ ἐπὶ τῶν πλευρῶν αὐτῆς λαμβάνομεν $AB = A\Gamma$. Ἐπειτα χαράσσομεν τὸ εὐθ. τμήμα $B\Gamma$, σχ. 124· τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι ἰσοσκελές.

57. 2. Ἰδιότητες

Ἄς συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ τῆς διχοτόμου $A\Delta$, σχ. 124.

Εἰς τὴν συμμετρίαν αὐτὴν παρατηροῦμεν ὅτι:

α) Τὸ σημεῖον A ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν ἑαυτόν του.

β) Αἱ πλευραὶ $A\chi$ καὶ $A\psi$ τῆς γωνίας A ἀντιστοιχοῦν μεταξύ των. ($A\chi \rightleftharpoons A\psi$). Ἐπειδὴ δὲ $AB = A\Gamma$, ἀντιστοιχοῦν μεταξύ των καὶ αἱ κορυφαὶ B καὶ Γ . ($B \rightleftharpoons \Gamma$)

Ἦτοι: α) Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ τὸ ἰσοσκελές τρίγωνον $AB\Gamma$ ἀντιστοιχεῖ εἰς ἑαυτό. Συνεπῶς ἢ εἶναι ἄξων συμμετρίας αὐτοῦ.


β) $B\Gamma \perp A\Delta$ καὶ $B\Delta = \Delta\Gamma$

γ) $\widehat{B} = \widehat{\Gamma}$

Ἵσωςτε: **Εἰς τὸ ἰσοσκελές τρίγωνον :**

α) Ἡ εὐθεῖα τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας τῶν ἴσων πλευρῶν εἶναι ἄξων συμμετρίας αὐτοῦ.

β) Αἱ παρὰ τὴν βάσιν γωνίαι εἶναι ἴσαι.



γ) Ἡ διχοτόμος, ἡ διάμεσος καὶ τὸ ὕψος πρὸς τὴν βᾶσιν ταυτίζονται.

57. 3. Τρίγωνον με ἄξονα συμμετρίας

Ἐὰν τρίγωνον $AB\Gamma$ ἔχη ἄξονα συμμετρίας διερχόμενον διὰ τῆς κορυφῆς A , τότε ἡ δίπλωσις περὶ αὐτόν:

α) Ἀφήνει ἀκίνητον τὴν κορυφὴν A (Διατί;)

β) Φέρει εἰς σύμπτωσιν τὰς κορυφὰς B καὶ Γ (Διατί;)

Συνεπῶς φέρει εἰς σύμπτωσιν καὶ τὰς πλευρὰς AB καὶ $A\Gamma$ ($AB \rightleftharpoons A\Gamma$).


Ἦτοι εἶναι:

$$AB = A\Gamma$$

Ἐὰν ἓν τρίγωνον ἔχη ἄξονα συμμετρίας εἶναι ἰσοσκελές.

57. 4. Τρίγωνον με δύο γωνίας ἴσας

Χαράξατε εὐθ. τμήμα $B\Gamma$ καὶ δύο ἴσας ὀξείας γωνίας με κορυφὰς τὰ ἄκρα αὐτοῦ. (Αἱ γωνίαι νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὸ αὐτὸ ἡμιπέπεδον ἀκμῆς $B\Gamma$ καὶ κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ σχ. 125). Παρατηροῦμεν ὅτι ὀρίζεται τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$. Με τὸν διαβήτην δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι τὸ τρίγωνον τοῦτο εἶναι ἰσοσκελές ($AB = A\Gamma$).



Σχ. 125

Εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα καταλήγομεν διὰ τῆς συμμετρίας ὡς πρὸς τὴν μεσοκάθετον ϵ τοῦ $B\Gamma$. Πράγματι ἡ δίπλωσις περὶ τὴν μεσοκάθετον ϵ φέρει εἰς σύμπτωσιν:

α) Τὰς κορυφὰς B καὶ Γ .

β) Τὰς ἴσας γωνίας B καὶ Γ (Διατί;)

Συνεπῶς φέρει εἰς σύμπτωσιν καὶ τὰς πλευρὰς $B\chi$ καὶ $\Gamma\psi$ τῶν γωνιῶν αὐτῶν.

Ἦτοι: αἱ $B\chi$ καὶ $\Gamma\psi$ εἶναι συμμετρικαὶ καὶ συναντοῦν δὲ τὸν ἄξονα ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον

A. Συνεπῶς καὶ αἱ πλευραὶ AB καὶ $A\Gamma$ εἶναι συμμετρικαὶ καὶ ἴσαι.

Ἦντοτε: Ἐὰν τρίγωνον ἔχη δύο γωνίας ἴσας εἶναι ἰσοσκελές.


$$\hat{\Gamma} = \hat{B} \Rightarrow AB = A\Gamma$$

57. 5. Ἄλλαι ιδιότητες τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου

Με διαφόρους κατασκευὰς καὶ συλλογισμοὺς δυνάμεθα νὰ ἀνακαλύψωμεν καὶ ἄλλας ιδιότητες τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου.


α) Τρίγωνον τοῦ ὁποίου μία διχοτόμος εἶναι καὶ ὕψος.

1) Κατασκευάζομεν μίαν γωνίαν $\chi A\psi$ καὶ τὴν διχοτόμον AZ αὐτῆς, σχ. 126. Ἐπὶ τῆς διχοτόμου AZ , λαμβάνομεν ἓν σημεῖον M καὶ φέρομεν τὴν κάθετον πρὸς τὴν AZ εἰς τὸ M . Ἡ κάθετος αὕτη τέμνει τὰς πλευρὰς $A\chi$, $A\psi$ εἰς τὰ σημεῖα B καὶ Γ ἀντιστοίχως.



Σχ. 126

Παρατηρούμεν ὅτι εἰς τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ ἡ AM εἶναι ὕψος καὶ διχοτόμος. Μὲ τὸν διαβήτην δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν τότε ὅτι $AB=AG$



Σχ. 127

Εἰς τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ ὀδηγούμεθα μὲ τὸν ἐξῆς συλλογισμόν.

Ἡ δίπλωσις περὶ τὴν εὐθεῖαν AZ θὰ φέρῃ εἰς σύμπτωσιν :

1) Τὰς πλευρὰς $A\chi, A\psi$ ($A\chi \longleftrightarrow A\psi$).

2) Τὰς ἡμιευθείας $MB, M\Gamma$ ($MB \longleftrightarrow M\Gamma$).

*Ἄρα θὰ φέρῃ εἰς σύμπτωσιν καὶ τὰς κορυφὰς B καὶ Γ . Εἶναι συνεπῶς $AB=AG$.

Ἔστωτε : Ἐὰν μία διχοτόμος τριγώνου εἶναι καὶ ὕψος, τὸ τρίγωνον εἶναι ἰσοσκελές.

β) Τρίγωνον τοῦ ὁποίου ἐν ὕψος εἶναι καὶ διάμεσος. Χαράσσομεν ἐν εὐθ. τμῆμα $B\Gamma$ καὶ ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου πρὸς αὐτό, λαμβάνομεν ἐν σημεῖον A , σχ. 127.

Παρατηρούμεν ὅτι τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ ἔχει τὸ τμῆμα AD διάμεσον καὶ ὕψος.

Μὲ τὸν διαβήτην δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι $AB=AG$.

Εἰς τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ ὀδηγούμεθα ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι τὸ A ἀνήκει εἰς τὴν μεσοκάθετον τοῦ $B\Gamma$ συνεπῶς ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰ ἄκρα αὐτοῦ.

Ἔστωτε : Ἐὰν ἐν ὕψος τριγώνου εἶναι καὶ διάμεσος αὐτοῦ, τότε τὸ τρίγωνον εἶναι ἰσοσκελές.

γ) Εἰς ἄλλην τάξιν θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι :

Ἐὰν μία διχοτόμος τριγώνου εἶναι καὶ διάμεσος αὐτοῦ, τότε τὸ τρίγωνον εἶναι ἰσοσκελές.

Π Ι Ν Α Ξ

Ἰδιοτήτων τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων

α) Ἐὰν τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι ἰσοσκελές μὲ ἴσας πλευρὰς τὰς AB καὶ AG , τότε :

1. Ἐχει ἄξονα συμμετρίας διερχόμενον διὰ τῆς κορυφῆς A

2. $\widehat{B} = \widehat{\Gamma}$

3. Ἡ διχοτόμος, τὸ ὕψος καὶ ἡ διάμεσος πρὸς τὴν $B\Gamma$ ταυτίζονται.

β) Ἐν τρίγωνον εἶναι ἰσοσκελές, ὅταν :

1. Ἐχῃ ἄξονα συμμετρίας.

2. Ἐχῃ δύο γωνίας ἴσας.

3. Μία διχοτόμος εἶναι καὶ διάμεσος αὐτοῦ.

4. Μία διχοτόμος εἶναι καὶ ὕψος αὐτοῦ (ποία ;)

5. Μία διάμεσος εἶναι καὶ ὕψος αὐτοῦ (ποία ;)

58. ΤΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

Ἐκ τῶν ἰδιοτήτων τῶν ἰσοσκελῶν τριγῶνων συνάγομεν ὅτι :

1. Εἰς τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον :

α) Ὑπάρχουν τρεῖς ἄξονες συμμετρίας (ποῖοι ;)

β) Αἱ τρεῖς γωνίαι αὐτοῦ εἶναι ἴσαι.


γ) Τὰ τρία ὕψη ταυτίζονται μὲ τὰς τρεῖς διαμέσους καὶ τὰς τρεῖς διχοτόμους.

2. Τὸ ἰσογώνιον τρίγωνον εἶναι καὶ ἰσόπλευρον.

59. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

59. 1. Νὰ διχοτομηθῇ τόξον AB δοθέντος κύκλου

Χαράσσομεν τὴν χορδὴν AB καὶ φέρομεν ἔπειτα τὴν ἐκ τοῦ κέντρου O κάθετον OD πρὸς αὐτήν, σχ. 128. Ἡ OD προεκτεινομένη συναντᾷ τὸ τόξον AB εἰς τὸ μέσον M αὐτοῦ. (Διατί; Εἰς τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον OAB , τὸ ὕψος OD εἶναι καὶ διχοτόμος τῆς ἐπικέντρου γωνίας $O \dots$)



Σχ. 128

59. 2. Νὰ διχοτομηθῇ δοθεῖσα γωνία.

Καθιστῶμεν τὴν γωνίαν ἐπικέντρον, σχ. 128 καὶ εὐρίσκομεν τὸ μέσον M τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς. Ἡ ἡμιευθεῖα OM εἶναι ἡ ζητούμενη διχοτόμος. (Διατί;).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

126. Νὰ συγκρίνετε τὰς γωνίας αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται ἀπὸ τὰς προεκτάσεις τῶν ἴσων πλευρῶν ἰσοσκελοῦς τριγῶνου μὲ τὴν βάσιν αὐτοῦ.

127. Νὰ κατασκευασθῇ ἰσοσκελὲς τρίγωνον $AB\Gamma$, τοῦ ὁποίου, ἡ πλευρὰ $B\Gamma$ νὰ ἔχη μῆκος 4 cm καὶ τὸ ἐπ' αὐτὴν ὕψος 3 cm.

128. Νὰ κατασκευασθῇ ἰσοσκελὲς τρίγωνον $AB\Gamma$ τοῦ ὁποίου ἡ γωνία τῶν ἴσων πλευρῶν AB καὶ AG νὰ εἶναι 45° , ἡ δὲ διχοτόμος αὐτῆς νὰ ἔχη μῆκος 4 cm.

129. Νὰ κατασκευασθῇ ἰσοσκελὲς τρίγωνον $AB\Gamma$ ($AB=AG$) τοῦ ὁποίου, $B=50^\circ$ καὶ $B\Gamma=4$ cm.

130. Χαράσατε ἕνα κύκλον καὶ μίαν χορδὴν AB αὐτοῦ. Ἐὰν M εἶναι τὸ μέσον τοῦ μικρότερου τόξου AB καὶ M' τοῦ μεγαλύτερου, νὰ δικαιολογήσετε ὅτι :

α) Τὰ τρίγωνα AMB καὶ $AM'B$ εἶναι ἰσοσκελῆ. β) Ἡ MM' εἶναι διάμετρος τοῦ κύκλου.

131. Πόσα ἰσοσκελῆ τρίγωνα δύνασθε νὰ κατασκευάσετε μὲ βάσιν δοθὲν εὐθ. τμῆμα $B\Gamma$; Παρατηρεῖτε σχετικῶς μὲ τὴν θέσιν τῆς ἄλλης κορυφῆς αὐτῶν;

132. Κατασκευάσατε δύο ἴσα ὀρθογώνια τρίγωνα (μὲ τὴν βοήθειαν διαφανοῦς) καὶ ἔπειτα σχηματίσατε μὲ αὐτὰ ἕν ἰσοσκελὲς τρίγωνον.



133. Νά χαραξάτε τήν διχοτόμον μιᾶς γωνίας $\chi\Lambda\psi$ καί ἔπειτα ἀπό ἓν ἐσωτερικόν σημεῖον τῆς γωνίας νά φέρητε μίαν εὐθείαν τέμνουσαν τὰς πλευράς αὐτῆς εἰς τρόπον ὥστε τὸ τρίγωνον, τὸ ὁποῖον ὀρίζεται νά εἶναι ἰσοσκελές.

134. Νά διαιρεθῆ δοθὲν τόξον εἰς 4 ἴσα τόξα.

60. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Σχηματίσατε τρίγωνον $ΑΒΓ$.

Ἀποκόψατε ἔπειτα τὰς γωνίας του καί σχηματίσατε τὸ ἄθροισμά των, σχ. 129α, β. Τί εὐρίσκετε;



Εἶναι: $\widehat{Α} + \widehat{Β} + \widehat{Γ} = 2$ ὀρθαί.

Ὡστε: **Τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν παντὸς τριγώνου ἰσοῦται μὲ δύο ὀρθὰς γωνίας.**

Εἰς τὸ αὐτὸ συμπέρασμα ἦτο δυνατόν νά φθάσωμεν ὡς ἑξῆς:


Ἀπὸ τὴν κορυφήν A φέρομεν εὐθείαν ϵ παράλληλον πρὸς τὴν $ΒΓ$, σχ. 130. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι:

$$\widehat{Β} = \widehat{\omega} \text{ καὶ } \widehat{Γ} = \widehat{\phi} \text{ (Διατί;)}$$

$$\text{Ἀλλὰ } (\widehat{Β} = \widehat{\omega} \text{ καὶ } \widehat{Γ} = \widehat{\phi}) \Rightarrow \widehat{Β} + \widehat{Γ} = \widehat{\omega} + \widehat{\phi}$$

$$\text{Ἐξ ἄλλου } \widehat{Α} + \widehat{\omega} + \widehat{\phi} = 2 \text{ L}$$

$$\text{Ἄρα } \widehat{Α} + \widehat{Β} + \widehat{Γ} = 2 \text{ L}$$



Σχ. 130

61. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

61. 1. Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω πρότασιν συνάγομεν ὅτι:

- α) Αἱ ὀξεῖαι γωνίαι ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι συμπληρωματικαί.
- β) Ἐν τρίγωνον δύναται νά ἔχη μίαν ὀρθὴν ἢ μίαν ἀμβλεῖαν γωνίαν αἱ ἄλλαι δύο εἶναι ὀξεῖαι.

61. 2. Ἐξωτερικὴ γωνία τριγώνου


Σχεδιάζομεν ἓν τρίγωνον $ΑΒΓ$, σχ. 131 καὶ προεκτείνομεν μίαν πλευρὰν αὐτοῦ, π.χ. τὴν $ΑΒ$, κατὰ τὴν ἡμιευθεῖαν $ΑΜ$ ἀντίθετον τῆς $ΑΒ$. Ἡ γωνία $\widehat{ΓΑΜ} = \omega$ εἶναι ἐφεξῆς παραπληρωματικὴ τῆς γωνίας A καὶ λέγεται ἐξωτερικὴ γωνία τοῦ τριγώνου $ΑΒΓ$ εἰς τὴν κορυφήν A . Κατὰ τὸν ὅρισμόν αὐτὸν τὸ τρίγωνον $ΑΒΓ$ ἔχει ἐξ (6) ἐξωτερικὰς γωνίας (Ποίας;).

Θὰ συγκρίνωμεν κατωτέρω τὴν ἐξωτερικὴν γωνίαν ω , σχ. 131, μὲ τὸ

ἄθροισμα τῶν γωνιῶν Β καὶ Γ. Ἄς φέρωμεν ἐκ τοῦ Α ἡμιευθεῖαν ΑΖ παράλληλον πρὸς τὴν ΒΓ. Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$AZ \parallel B\Gamma \Rightarrow \begin{cases} \widehat{B} = \widehat{\omega}_1 \\ \widehat{\Gamma} = \widehat{\omega}_2 \end{cases}$$

* Ἄρα $\widehat{B} + \widehat{\Gamma} = \widehat{\omega}_1 + \widehat{\omega}_2$
 ἢ $\widehat{\omega} = \widehat{B} + \widehat{\Gamma}$



Σχ. 131


Ὡστε : Ἐκάστη ἐξωτερικὴ γωνία τριγώνου ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἀπέναντι γωνιῶν αὐτοῦ.

Σημείωσις


Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω πρότασιν συμπεραίνομεν ὅτι : Ἐκάστη ἐξωτερικὴ γωνία τριγώνου εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ ἐκάστην ἀπέναντι αὐτῆς ἐσωτερικὴν.

61. 3. Ἐφαρμογαὶ εἰς τὴν κατασκευὴν γωνιῶν.


- i) Ἐὰν κατασκευάσωμεν ἓν ὀρθογώνιον καὶ ἰσοσκελὲς τρίγωνον, θὰ ἔχωμεν γωνίας 45° καὶ 135° , (σχ. 132). (Διατί;)
- ii) Ἐὰν κατασκευάσωμεν ἓν ἰσόπλευρον τρίγωνον, σχ. 133, θὰ ἔχωμεν γωνίας 60° καὶ 120° . (Διατί;)
- iii) Ἐὰν εἰς τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, σχ. 134, φέρωμεν ἓν ὕψος, π.χ. τὸ ΑΔ, θὰ ἔχωμεν γωνίας 60° , 30° καὶ 150° . (Διατί;)



Σχ. 132



Σχ. 133



Σχ. 134

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

135. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι ἰσοσκελοῦς τριγώνου, ἐὰν μία ἀπὸ τὰς ἴσας γωνίας εἶναι 52° .
136. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι ἰσοσκελοῦς τριγώνου, ἐὰν ἡ γωνία τῆς κορυφῆς τῶν ἴσων πλευρῶν εἶναι 70° .
137. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι ὀρθογωνίου τριγώνου, ὅταν ἡ διαφορά δύο ἐξ αὐτῶν εἶναι 20° . (Διακρίνατε περιπτώσεις).

138. Νά υπολογισθοῦν αἱ γωνίαι ὀρθογωνίου τριγώνου, ὅταν ἡ μία γωνία του εἶναι τριπλασία μιᾶς ἄλλης. (Δύο περιπτώσεις).

139. Εἰς τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι $A=50^\circ$, $\Gamma=55^\circ$. Νά υπολογισθοῦν αἱ ἐξωτερικαὶ γωνίαι αὐτοῦ.

140. Εἰς τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι $B=50^\circ$, $\Gamma=80^\circ$. Νά υπολογισθῆ ἡ γωνία A , καθὼς καὶ ἡ γωνία τῶν διχοτόμων τῶν γωνιῶν B καὶ Γ αὐτοῦ.


141. Δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ $A'B'\Gamma'$, ἔχουν $\widehat{A}=\widehat{A'}$ καὶ $\widehat{B}=\widehat{B'}$. Συγκρίνατε τὰς γωνίας Γ καὶ Γ' .

142. Ἐν τρίγωνον ἔχει δύο γωνίας ἴσας τὴν δὲ ἄλλην μεγαλύτεραν ἐκάστης τούτων κατὰ 30° . Νά υπολογισθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου τούτου.

62. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΚΥΡΤΟΥ* ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν τοῦ κυρτοῦ ἑξαγώνου $AB\Gamma\Delta\epsilon Z$ σχ. 135, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Ἐὰν χωρίσωμεν τὸ πολὺγώνον εἰς τρίγωνα διὰ τῶν διαγωνίων, αἱ ὁποῖαι ἄγονται ἀπὸ μίαν κορυφὴν αὐτοῦ, τότε τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν τῶν τριγώνων αὐτῶν θὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν τοῦ πολυγώνου. Φέρομεν λοιπὸν ὅλας τὰς διαγωνίους ἀπὸ τὴν κορυφὴν A . Ἦτοι τὰς διαγωνίους $A\Gamma$, $A\Delta$, AE .



Σχ. 135

Σχηματίζονται 4 τρίγωνα. Ἦτοι τόσα τρίγωνα, ὅσος ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τοῦ πολυγώνου πλὴν 2.

Συνεπῶς : τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν κυρτοῦ ἑξαγώνου = 4.2 ὀρθαί. Ἔργαζόμενοι μὲ ὅμοιον τρόπον εἰς διάφορα κυρτὰ πολυγώνων σχηματίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα.

Ἀριθμὸς πλευρῶν	Ἀριθμὸς τριγώνων	Ἄθροισμα γωνιῶν τῶν τριγώνων εἰς ὀρθὰς	Ἄθροισμα γωνιῶν πολυγώνου εἰς ὀρθὰς
4	4-2	$(4-2) \cdot 2$	4
5	5-2	$(5-2) \cdot 2$	6
6	6-2	$(6-2) \cdot 2$	8
...
n	$n-2$	$(n-2) \cdot 2$	$2 \cdot (n-2)$

Ἔστωτε : Τὸ ἄθροισμα Σ τῶν γωνιῶν κυρτοῦ πολυγώνου n πλευρῶν εἶναι ἴσον μὲ $2 \cdot (n-2)$ ὀρθὰς γωνίας.

$$\Sigma = 2 \cdot (n-2) \text{ ὀρθαί}$$

* Ἐν πολὺγώνον λέγεται κυρτὸν ὅταν ἡ εὐθεῖα ἐκάστης πλευρᾶς αὐτοῦ ἄσπῃ τὸ πολὺγώνον πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος αὐτῆς.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

142. Νά υπολογισθῆ τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς κυρτοῦ :

α) 14/γώνου, β) 16/γώνου, γ) 50/γώνου.


143. Νά εὐρεθῆ ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν ἑνὸς κυρτοῦ πολυγώνου, τοῦ ὁποῖου τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν εἶναι ἴσον μὲ 60L.

144. Ἐν κυρτὸν πολύγωνον ἔχει ἄθροισμα γωνιῶν ἴσον μὲ 10 ὀρθᾶς. Νά εὐρετε ἐκάστην τῶν γωνιῶν αὐτοῦ ἂν γνωρίζετε ὅτι αὐταὶ εἶναι ὅλαι ἴσαι.

63. ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ

Πολλὰς εἰκόνας τετραπλεύρων διακρίνομεν εἰς τὸ περιβάλλον μας, πολλὰ δὲ καὶ γνωστὰ τὰ γεωμετρικὰ στερεὰ ἔχουν ὡς ἕδρας τῶν τετράπλευρα.

Εἰς τὸ σχ. 136 ἔχομεν σχεδιάσει διάφορα εἶδη τετραπλεύρων. Τὸ (α) εἶναι



ἓν τυχὸν κυρτὸν τετράπλευρον ἑνώς τὸ (β) ἓν μὴ κυρτὸν τετράπλευρον.

Τὸ (γ), ἔχει δύο μόνον πλευρὰς παραλλήλους καὶ ὀνομάζεται **εἰς αὐτὸ τετραπέζιον**.

Τὸ (δ) ἔχει καὶ τὰ δύο ζεύγη τῶν ἀπέναντι πλευρῶν παράλληλα καὶ ὀνομάζεται **εἰς αὐτὸ παραλληλόγραμμον**.

Κατωτέρω θὰ ἐξετάσωμεν μόνον κυρτὰ τετράπλευρα.

64. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ


Χαράσσομεν δύο παραλλήλους εὐθείας, $\alpha \parallel \alpha'$ καὶ ἔπειτα ἄλλας δύο παραλλήλους, $\beta \parallel \beta'$, αἱ ὁποῖαι νὰ τέμνουν τὰς πρώτας, σχ. 137. Ὅρίζεται τότε τετράπλευρον ΑΒΓΔ, τὸ ὁποῖον ἔχει τὰς ἀπέναντι πλευρὰς παραλλήλους. Ἦτοι εἶναι **παραλληλόγραμμον**.

$$ΑΒΓΔ \text{ παραλ/μον} \iff ΑΒ \parallel \Gamma Δ \text{ καὶ } ΒΓ \parallel ΑΔ$$

65. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ

65. 1. Μὲ τὰ ὄργανά σας ἐξετάσατε :

Τὰς ἀπέναντι πλευρὰς, τὰς ἀπέναντι γωνίας, τὴν χαρακτηριστικὴν θέσιν τοῦ σημείου τομῆς τῶν διαγωνίων ἑνὸς παραλληλογράμμου. Τί παρατηρεῖτε;



Σχ. 137

65. 2. Ὡς γνωστὸν ἕκαστον σημεῖον τῆς μεσοπαρὰλληλου ϵ_1 τῶν δύο παραλλήλων εὐθειῶν $AB, \Gamma\Delta$ εἶναι κέντρον συμμετρίας τοῦ σχήματος αὐτῶν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ σημεῖα τῆς μεσοπαρὰλληλου ϵ_2 τῶν $A\Delta$ καὶ $B\Gamma$.

*Ὡς συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν τομὴν O τῶν ϵ_1 καὶ ϵ_2 , σχ. 137.

Παρατηροῦμεν ὅτι :

Ἐξ ὁμολογίας τῆς εὐθείας α εἶναι ἡ εὐθεῖα α' .

Ἐξ ὁμολογίας τῆς εὐθείας β εἶναι ἡ εὐθεῖα β' .

*Ἐξ ὁμολογίας τῆς τομῆς A τῶν α, β εἶναι ἡ τομὴ Γ τῶν α', β' .

*Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι : ὁμολογίας τοῦ B εἶναι τὸ Δ

$$A \xrightarrow{\sim} \Gamma \text{ καὶ } B \xrightarrow{\sim} \Delta$$

*Ἦτοι : α) Τὸ O εἶναι κέντρον συμμετρίας τοῦ παραλληλογράμμου.

β) Ἐκάστη διαγώνιος ἔχει τὰ ἄκρα τῆς συμμετρικά. Συνεπῶς διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου συμμετρίας καὶ διχοτομεῖται ὑπ' αὐτοῦ.

γ) Τὰ ἄκρα τῆς πλευρᾶς AB εἶναι συμμετρικά τῶν ἄκρων τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς αὐτῆς $\Gamma\Delta$. Διὰ τοῦτο $AB = \Gamma\Delta$

*Ὁμοίως συνάγομεν ὅτι καὶ $AD = B\Gamma$

δ) Ἐὰν δύο αἰ ἀπέναντι γωνία εἶναι ὁμόλογοι. (Διατί;). *Ἐὰν καὶ ἴσαι.


$$\hat{A} = \hat{\Gamma} \text{ καὶ } \hat{B} = \hat{\Delta}$$

*Ὡστε εἰς τὸ παραλληλόγραμμον :

1. Αἰ ἀπέναντι πλευραὶ εἶναι ἴσαι.
2. Αἰ ἀπέναντι γωνία εἶναι ἴσαι.
3. Ἐκάστη διαγώνιος διχοτομεῖ τὴν ἄλλην.

65. 3. Ἄλλοι τρόποι κατασκευῆς παραλληλογράμμου

α) Χαράσσομεν δύο εὐθείας ϵ_1, ϵ_2 , τεμνομένας εἰς τὸ σημεῖον O . Ἐπειτα ἐπὶ τῆς μιᾶς τούτων, π.χ. τῆς ϵ_1 , λαμβάνομεν δύο ἴσα τμήματα τὰ $OA = O\Gamma$ ἐπὶ δὲ τῆς ἄλλης, τῆς ϵ_2 , ἐπίσης δύο ἴσα μετὰξὺ των τμήματα $OB = OD$. καὶ σχηματίζομεν τὸ τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$, σχ. 138. Ἦτοι ἔν τετράπλευρον τοῦ ὁποῦ αἱ διαγώνιοι διχοτομοῦνται.



Σχ. 138

Μὲ παράλληλον μετατόπισιν διαπιστώνομεν ὅτι αἰ ἀπέναντι πλευραὶ αὐτοῦ εἶναι παράλληλοι.

*Ἦτοι : $AB \parallel \Gamma\Delta$ καὶ $B\Gamma \parallel A\Delta$.


Συνεπῶς τὸ τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ εἶναι παραλληλόγραμμον.

Εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα καταλήγομεν καὶ διὰ τῆς συμμετρίας ὡς πρὸς κέντρον τὸ O .

Πράγματι εἰς τὴν συμμετρίαν αὐτὴν παρατηροῦμεν ὅτι ἡ κορυφή Γ εἶναι ὁμόλογος τῆς κορυφῆς A καὶ ἡ κορυφή Δ τῆς κορυφῆς B . Συνεπῶς καὶ αἱ πλευραὶ AB καὶ $\Gamma\Delta$ εἶναι ὁμόλογοι ἄρα ἴσαι καὶ παράλληλοι. Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι καὶ αἱ πλευραὶ $A\Delta$ καὶ $B\Gamma$ εἶναι ἴσαι καὶ παράλληλοι.

᾽Ωστε: Ἐὰν αἱ διαγώνιοι τετραπλεύρου διχοτομοῦνται, τοῦτο εἶναι παραλληλόγραμμον.

β) Χαράσσομεν δύο εὐθείας ϵ_1, ϵ_2 παραλλήλους καὶ λαμβάνομεν ἐπ' αὐτῶν δύο ἴσα τμήματα. $AB = \Gamma\Delta$, σχ. 139. Τοιούτῳ τρόπῳ ὀρίζομεν τὸ κυρτὸν τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ τοῦ ὁποῖου δύο ἀπέναντι πλευραὶ, αἱ $AB, \Gamma\Delta$ εἶναι ἴσαι καὶ παράλληλοι.




Σχ. 139

Μὲ παράλληλον μετατόπισιν δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι καὶ αἱ ἄλλαι δύο ἀπέναντι πλευραὶ $A\Delta$ καὶ $B\Gamma$ εἶναι μεταξύ των παράλληλοι. Ἐπομένως τὸ τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ εἶναι παραλληλόγραμμον.

᾽Ωστε: Ἐὰν κυρτὸν τετράπλευρον ἔχη δύο ἀπέναντι πλευρὰς ἴσας καὶ παραλλήλους, θὰ εἶναι παραλληλόγραμμον.

Σημείωσις: Ἐν ὑλικὸν ἄρθρωτὸν παραλληλογράμμον (μοντέλλον), μὲ πλευρὰς ἀπὸ διάτρητα ἐλάσματα καὶ διαγωνίους ἀπὸ ἐλαστικὰ νήματα, σχ. 140, θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ κατανοήσωμεν τὰς ἀνωτέρω ἰδιότητες.



Σχ. 140

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


145. Ἐνὸς παραλληλογράμμου ἡ μία γωνία εἶναι 75° . Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ ἄλλαι τρεῖς γωνίαι αὐτοῦ.
146. Παραλληλογράμμον ἡ περίμετρος ἔχει μήκος 20 cm, μία δὲ πλευρὰ αὐτοῦ ἔχει μήκος 4 cm. Νὰ ὑπολογισθοῦν τὰ μήκη τῶν ἄλλων πλευρῶν.
147. Νὰ κατασκευασθῇ παραλληλόγραμμον μὲ μήκη διαγωνίων 4 cm καὶ 6 cm. Πόσας λύσεις ἔχει τὸ πρόβλημα;
148. Ἐὰν M, N εἶναι τὰ μέσα τῶν ἀπέναντι πλευρῶν $AB, \Gamma\Delta$ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$, νὰ ἐξετάσετε, ἔαν τὸ $AMND$ εἶναι παραλληλόγραμμον.
149. Χαράξτε ἐν εὐθ. τμήμα τὸ ὁποῖον νὰ διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον συμμετρίας παραλληλογράμμου καὶ νὰ περατοῦται εἰς δύο ἀπέναντι πλευρὰς αὐτοῦ. Μήπως τὸ κέντρον O τοῦ παραλληλογράμμου διχοτομεῖ τὸ τμήμα τοῦτο; Δικαιολογήσατε τὴν ἀπάντησίν σας.
150. Νὰ ὑπολογίσετε τὰς γωνίας παραλληλογράμμου, ἔαν γνωρίζετε ὅτι ἡ μία ἀπὸ αὐτὰς εἶναι διπλασία μιᾶς ἄλλης.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

66. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΝ

66. 1. Ὅρισμός

Ἐὰς κατασκευάσωμεν ἓν παραλληλόγραμμον μὲ μίαν γωνίαν ὀρθήν. Πρὸς τοῦτο κατασκευάζομεν μίαν ὀρθήν γωνίαν $\chi\Lambda\psi$ καὶ ἔπειτα φέρομεν :



Σχ. 141

καὶ Δ. Αὗται εἶναι παραπληρωματικαὶ

$$\widehat{A} + \widehat{\Delta} = 2 \text{ ὀρθαὶ (Διατί;)}$$

Ἐπειδὴ δὲ $\widehat{A} = 1$ ὀρθή θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\Delta} = 1$ ὀρθή. Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι καὶ $\widehat{B} = 1$ ὀρθή καὶ $\widehat{\Gamma} = 1$ ὀρθή.

Ὡστε : Ἐὰν ἓν παραλληλόγραμμον ἔχη μίαν γωνίαν ὀρθήν θὰ ἔχη καὶ τὰς ἄλλας γωνίας αὐτοῦ ὀρθάς.

Τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ ὁποίου αἱ γωνίαι εἶναι ὀρθαὶ λέγεται ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον.

Ὅρθογώνιον παραλ/μον \Leftrightarrow παραλ/μον μὲ ὅλας τὰς γωνίας ὀρθάς

66. 2. Ἰδιότητες

Τὸ ὀρθογώνιον ὡς παραλληλόγραμμον ἔχει ὅλας τὰς ιδιότητες αὐτοῦ. Μὲ τὰ ὄργανά μας καὶ μὲ συλλογισμοὺς δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν καὶ ἄλλας.

α) Ἄξονες συμμετρίας

Ἐὰς διπλώσωμεν τὸ ὀρθογώνιον περὶ τὴν μεσοπαράλληλον μ_1 τῶν ΑΔ καὶ ΒΓ, σχ. 141.

Ἡ κορυφή Α θὰ συμπίσῃ μὲ τὴν κορυφήν Β καὶ ἡ κορυφή Δ μὲ τὴν κορυφήν Γ. Ἦτοι εἰς τὴν $\Sigma(\mu_1)$ αἱ κορυφαὶ Α καὶ Δ εἶναι ὁμόλογοι τῶν κορυφῶν Β καὶ Γ ἀντιστοίχως. Συνεπῶς τὸ ὀρθογώνιον ΑΒΓΔ εἶναι ὁμόλογον πρὸς ἑαυτό. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ μ_1 εἶναι ἄξων συμμετρίας τοῦ ὀρθογωνίου ΑΒΓΔ.

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι καὶ ἡ μ_2 εἶναι ἄξων συμμετρίας αὐτοῦ.

β) Ίσότης διαγωνίων

Εἰς τὴν $\Sigma(\mu_1)$ ἢ εἰς τὴν $\Sigma(\mu_2)$, ἐκάστη διαγώνιος εἶναι ὁμόλογος τῆς ἄλλης. (Διατί;) *Ἦτοι αἱ διαγώνιοι εἶναι ἴσαι.

*Ὡστε: Εἰς τὸ ὀρθογώνιον :

1. Ὑπάρχουν δύο ἄξονες συμμετρίας. Εἶναι αἱ μεσοπαράλληλοι τῶν ἀπέναντι πλευρῶν αὐτοῦ.


2. Αἱ διαγώνιοι εἶναι ἴσαι.

γ) Παραλληλόγραμμον μὲ ἴσας διαγωνίους.

*Ἐπὶ δύο εὐθειῶν ϵ_1, ϵ_2 τεμνομένων εἰς τὸ σημεῖον O , λαμβάνομεν ἴσα τμήματα :
 $OA=OB=OG=OD$, σχ. 142

Τοιοῦτοτρόπως ὀρίζεται ἓν παραλληλόγραμμον $AB\Gamma\Delta$ μὲ τὰς διαγωνίους αὐτοῦ ἴσας. Μὲ τὸν γνώμονά μας διαπιστώνομεν ὅτι τὸ παραλληλόγραμμον τοῦτο εἶναι ὀρθογώνιον.

*Ὡστε : *Ἐὰν παραλληλόγραμμον ἔχῃ τὰς διαγωνίους ἴσας, εἶναι ὀρθογώνιον.



Σχ. 142

Σημείωσις

Μὲ ἓν ἄρθρωτὸν παραλληλόγραμμον μὲ διαγωνίους ἀπὸ ἐλαστικὰ νήματα, δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι, ὅταν αἱ διαγώνιοι γίνωνται ἴσαι, τότε τὸ παραλ/μον γίνετα ὀρθογώνιον.

67. ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

67. 1. Σχεδιάσατε ἓν ὀρθογώνιον τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ συγκρίνατε τὴν ὑποτείνουσαν $B\Gamma$ μὲ τὴν διάμεσον AM . Τί παρατηρεῖτε;

Εἶναι : $AM=B\Gamma/2$

*Ἡ παρατήρησις αὕτη μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὴν ἐξῆς πρότασιν, ἡ ὁποία ἰσχύει εἰς ὅλα τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα τοῦ σχεδίου ἢ τῆς γεωμετρίας.

Εἰς τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ἡ διάμεσος πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν ἰσοῦται μὲ τὸ ἡμισυ αὐτῆς.

*Ἴδου πῶς δυνάμεθα νὰ δικαιολογήσωμεν τὴν πρότασιν αὐτήν.

Εἰς τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ ($A=IL$) τοῦ σχ. 143, ἔχομεν προεκτείνει τὴν διάμεσον AM μέχρι τοῦ σημείου Δ , συμμετρικοῦ τοῦ A ὡς πρὸς τὸ μέσον M τῆς $B\Gamma$.


*Ἐὰν προσέξωμεν εἰς τὸ τετράπλευρον $AB\Delta\Gamma$, παρατηροῦμεν ὅτι :

$$BM=MG \text{ καὶ } AM=M\Delta$$

*Ἦτοι τοῦ τετραπλεύρου $AB\Delta\Gamma$ αἱ διαγώνιοι διχοτομοῦνται, εἶναι δηλαδὴ τοῦτο παραλληλόγραμμον. *Ἐπειδὴ δὲ καὶ $\hat{A}=IL$, εἶναι ὀρθογώνιον.

$$*Ἀρα : A\Delta=B\Gamma \text{ ἢ } AM=B\Gamma/2$$

Σχ. 143



67. 2. Ἐὰς κατασκευάσωμεν ἓν ἰσοσκελὲς τρίγωνον AMB καὶ ἄς προεκτείνωμεν τὴν πλευρὰν BM κατὰ τμῆμα $ΜΓ=MB$, σχ. 143.

Τοιουτοτρόπως ὀρίζεται τὸ τρίγωνον $ABΓ$, τοῦ ὁποῖου ἡ AM εἶναι διάμεσος καὶ ἰσοῦται μὲ τὸ ἥμισυ τῆς $BΓ$.

$$AM = BΓ/2 \qquad BM = ΓM$$

Μὲ τὸν γνώμονά μας εἶναι εὐκόλον νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι

$$\widehat{BAG} = 1L$$

Εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα καταλήγομεν καὶ ὡς ἑξῆς :

Προεκτείνωμεν τὴν διάμεσον AM τοῦ τριγώνου $ABΓ$ κατὰ τμῆμα $MΔ=MA$ καὶ χαράσωμεν τὰ εὐθυγρ. τμήματα $ΔΓ$ καὶ $ΔB$.

Ἐὰς προσέξωμεν τὸ τετράπλευρον $ABΔΓ$.

Εἶναι :

$$\left. \begin{array}{l} AM = MΔ \\ BM = MΓ \end{array} \right\} \text{ καὶ } AM = BΓ/2 \text{ ἢ } AΔ = BΓ$$


Ἦτοι αἱ διαγώνιοι τοῦ τετραπλεύρου $ABΔΓ$ διχοτομοῦνται καὶ εἶναι ἴσαι. Ἐὰρ εἶναι ὀρθογώνιον. Συνεπῶς $\widehat{A} = 1L$.

Ἐὰν εἰς τρίγωνον μία διάμεσος ἰσοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς πλευρᾶς τὴν ὁποῖαν διχοτομεῖ, τὸ τρίγωνον θὰ εἶναι ὀρθογώνιον μὲ ὑποτείνουσαν τὴν πλευρὰν αὐτὴν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

151. Ἐξηγήσατε πῶς διὰ τῆς διατάξεως τοῦ παραπλεύρως σχεδίου ὑπολογίζεται ἡ ἀπόστασις AB , σχ. 144;

152. Μία διαγώνιος ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου σχηματίζει μὲ μίαν πλευρὰν αὐτοῦ γωνίαν 50° . Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ ἄλλαι γωνίαι, τὰς ὁποίας σχηματίζουν αἱ διαγώνιοι μὲ τὰς πλευρὰς τοῦ ὀρθογωνίου.



Σχ. 144

153. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι τῶν διαγωνίων τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου τῆς προηγουμένης ἀσκῆσεως.

154. Τὸ κυρτὸν τετράπλευρον, τὸ ὁποῖον ἔχει διαγώνιους δύο διαμέτρους κύκλου, εἶναι ὀρθογώνιον (διατί;).


155. Νὰ χαράξετε ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον μὲ μίαν διαγώνιον 5 cm καὶ μὲ μίαν γωνίαν διαγωνίων 60° .

68. Ρ Ο Μ Β Ο Σ

68. 1. Ἐπὶ τῶν πλευρῶν γωνίας $\chi A\psi$ λαμβάνομεν ἴσα τμήματα $AB=AD$, (σχ. 145) καὶ ἐκ τῶν σημείων B, Δ φέρομεν παραλλήλους πρὸς τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας. Τοιουτοτρόπως σχηματίζεται ἓν παραλληλόγραμμον $ABΓΔ$ τὸ ὁποῖον ἔχει $AB=AD$. Ἐὰν δὲ σκεφθῶμεν ὅτι :

$$AB = ΓΔ \quad \text{καὶ} \quad AΔ = BΓ$$

εὐρίσκομεν ὅτι $AB = AΔ = ΔΓ = ΓB$



Σχ. 145

Ἦτοι : Ἐὰν ἐν παραλληλόγραμμον ἔχη δύο διαδοχικὰς πλευρὰς ἴσας ἢ ἔχη ὅλας τὰς πλευρὰς ἴσας.

Τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ ὁποῖου ὅλαι αἱ πλευραὶ εἶναι ἴσαι, λέγεται ρόμβος.

Ρόμβος \iff παραλ/μμον μὲ ὅλας τὰς πλευρὰς ἴσας

68. 2. Ἰδιότητες

Ὁ ρόμβος, ὅπως καὶ τὸ ὀρθογώνιον, ὡς παραλληλόγραμμον ἔχει ὅλας τὰς ιδιότητες αὐτοῦ. Ἐχει ὁμως καὶ ἄλλας.

Μὲ τὰ ὄργανά μας καὶ μὲ διπλώσεις περὶ τὰς εὐθείας τῶν διαγωνίων εὐρίσκομεν ὅτι :

ι) Αἱ εὐθεῖαι τῶν διαγωνίων ρόμβου εἶναι ἄξονες συμμετρίας αὐτοῦ.

ii) Αἱ διαγώνιοι ρόμβου τέμνονται καθέτως. Ἐκάστη δὲ διχοτομεῖ δύο ἀπέναντι γωνίας αὐτοῦ.

Τὰς ἀνωτέρω ιδιότητας δυνάμεθα νὰ τὰς δικαιολογήσωμεν ὡς ἑξῆς :

$AB=AD \implies$ Α κείται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου τοῦ ΒΔ.

$GB=GD \implies$ Γ κείται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου τοῦ ΒΔ.

Ἦτοι ἡ εὐθεῖα ΑΓ εἶναι μεσοκάθετος τοῦ ΒΔ, συνεπῶς καὶ ἄξων συμμετρίας αὐτοῦ.

Εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ΑΓ αἱ μὲν κορυφαὶ Α, Γ ἀντιστοιχοῦν εἰς ἑαυτὰς (Α \iff Α, Γ \iff Γ) αἱ δὲ κορυφαὶ Β, Δ πρὸς ἀλλήλας (Β \iff Δ). (Διατί;)


Συνεπῶς ἡ εὐθεῖα ΑΓ εἶναι ἄξων συμμετρίας καὶ τοῦ ρόμβου. Διὰ τοῦτο εἶναι καὶ διχοτόμος τῶν ἀπέναντι γωνιῶν Α καὶ Γ αὐτοῦ.

69. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

69. 1. Ὅρισμός

Σχήμα τετραγώνου ἔχουν αἱ ἔδραι κύβου.

Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν ἓν τετράγωνον χαράσσομεν μίαν ὀρθὴν γωνίαν $\chi\psi$ καὶ ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῆς λαμβάνομεν ἴσα τμήματα $AB=AD$, σχ. 146. Εἰς τὰ σημεῖα Β καὶ Δ χαράσσομεν καθέτους πρὸς τὰς Αχ καὶ Αψ ἀντιστοίχως. Τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ εἶναι ὀρθογώνιον καὶ ρόμβος, λέγεται δὲ τετράγωνον.



Σχ. 146


τετράγωνον \iff ὀρθογώνιον καὶ ρόμβος

69. 2. Ἰδιότητες

Τὸ τετράγωνον ὡς ὀρθογώνιον καὶ ρόμβος ἔχει ὅλας τὰς ιδιότητες τῶν δύο αὐτῶν σχημάτων. Ἦτοι ἔχει :

“Όλας τὰς πλευρὰς ἴσας καὶ τὰς διαγωνίους ἴσας, τεμνομένας διχα, καθέτως καὶ διχοτόμους τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.


Τὸ τετράγωνον ἔχει τέσσαρας ἄξονας συμμετρίας. Οἱ δύο εἶναι φορεῖς τῶν διαγωνίων (ϵ_1, ϵ_2) καὶ οἱ ἄλλοι δύο (ϵ_3, ϵ_4) εἶναι αἱ μεσοπαράλληλοι τῶν εὐθειῶν τῶν ἀπέναντι πλευρῶν αὐτοῦ.



Σχ. 147

69. 3. Παρατήρησις

Τὰς σχέσεις μεταξύ τῶν παραλληλογράμμων (Π) τῶν ὀρθογωνίων (Ο), ρόμβων (Ρ), καὶ τῶν τετραγώνων (Τ) δυνάμεθα νὰ τὰς παραστήσωμεν γραφικῶς μετὸ διάγραμμα τοῦ σχ. 148. Ἐξηγήσατε καὶ δικαιολογήσατε τὰς σχετικὰς θέσεις τῶν συνόλων αὐτῶν.



Σχ. 148

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


156. Κατασκευάσατε δύο ἴσα ἰσοσκελῆ τρίγωνα καὶ ἔπειτα μετὰ αὐτὰ ἓνα ρόμβον.
157. Μία διαγώνιος ρόμβου σχηματίζει μετὰ μίαν πλευρὰν αὐτοῦ γωνίαν 40° . Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ ρόμβου.
158. Νὰ κατασκευάσατε ρόμβον μετὰ διαγωνίους 6 cm, 8 cm.
159. Νὰ κατασκευάσατε 4 ἴσα ὀρθογώνια καὶ ἰσοσκελῆ τρίγωνα κ' ἔπειτα μετὰ αὐτὰ ἓν τετράγωνον.
160. Νὰ κατασκευάσατε ἓν τετράγωνον μετὰ περίμετρον 16 cm.
161. Ἐν τετράπλευρον, τὸ ὁποῖον ἔχει διαγωνίους δύο καθέτους διαμέτρους κύκλου, εἶναι τετράγωνον;

70. ΤΡΑΠΕΖΙΟΝ

70. 1. Ὅρισμός

Χαράσσομεν δύο εὐθεῖας παραλλήλους $\epsilon_1 \parallel \epsilon_2$ καὶ δύο ἄλλας (μὴ παραλλήλους) τὰς α καὶ β . Αὗται τέμνουσι τὰς δύο πρώτας εἰς τὰ σημεῖα Α, Δ, Β, Γ, σχ. 149.

Τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ ἔχει παραλλήλους μόνον τὰς δύο ἀπέναντι πλευρὰς αὐτοῦ ΑΒ καὶ ΓΔ· λέγεται δὲ τραπεζίον.



Σχ. 149

Γενικῶς: Ἐκαστον τετράπλευρον, τὸ ὁποῖον ἔχει τὰς δύο πλευρὰς αὐτοῦ παραλλήλους καὶ τὰς ἄλλας δύο μὴ παραλλήλους, λέγεται τραπεζίον. Αἱ δύο παράλληλοι πλευραὶ (ΑΒ \parallel ΓΔ) εἶναι αἱ βᾶσεις τοῦ τραπεζίου.

70. 2. Ίδιότητες

α) Εἰς τὸ τραπέζιον ΑΒΓΔ τοῦ σχ. 149 παρατηροῦμεν ὅτι αἱ γωνίαι αὐτοῦ Β καὶ Γ εἶναι ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ τεμνομένων ὑπὸ τῆς ΒΓ. Συνεπῶς εἶναι παραπληρωματικά. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς ἄλλας δύο γωνίας Α, Δ αὐτοῦ.

᾽Ωστε: **Εἰς τὸ τραπέζιον αἱ βάσεις σχηματίζουν μὲ ἐκάστην ἐκ τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν γωνίας παραπληρωματικάς.**

β) Ἡ ἀνωτέρω πρότασις ἰσχύει καὶ ἀντιστρόφως. Πράγματι, ἐὰν εἰς ἓν κυρτὸν τετράπλευρον ΑΒΓΔ δύο διαδοχικαὶ γωνίαι εἶναι παραπληρωματικά ($\widehat{B} + \widehat{G} = 2L$), τότε θὰ πρέπει δύο πλευραὶ τῶν γωνιῶν αὐτῶν νὰ εἶναι παράλληλοι. (Διατί;) Συνεπῶς τὸ τετράπλευρον τοῦτο θὰ εἶναι τραπέζιον ἢ παραλληλόγραμμον.

᾽Ωστε: **Ἐὰν δύο διαδοχικαὶ γωνίαι κυρτοῦ τετραπλεύρου εἶναι παραπληρωματικά τοῦτο εἶναι τραπέζιον ἢ παραλληλόγραμμον.**

γ) Καθὼς εἶδομεν εἰς τὴν § 48. 2. τὰ μέσα τῶν εὐθ. τμημάτων, τὰ ὁποῖα περατοῦνται εἰς τὰς παραλλήλους πλευρὰς ΑΒ, ΓΔ, σχ. 149 κεῖνται εἰς τὴν μεσοπαράλληλον τῶν παραλλήλων τούτων.

Ἦτοι: **Τὰ μέσα τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν τραπέζιου καὶ τὰ μέσα τῶν διαγωνίων κεῖνται ἐπὶ τῆς μεσοπαράλληλου τῶν βάσεων αὐτοῦ.**

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


162. Εἰς ἓν τραπέζιον εἶναι δυνατὸν αἱ προσκείμεναι εἰς ἐκάστην τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν αὐτοῦ γωνίαι νὰ εἶναι καὶ αἱ δύο ὀξείαι;

163. Κατασκευάσατε ἓν τραπέζιον ΑΒΓΔ, μὲ βάσεις ΑΒ, ΓΔ καὶ διχοτομήσατε τὰς γωνίας Β καὶ Γ αὐτοῦ. Νὰ ὑπολογίσετε τὰς γωνίας τῶν δύο τούτων διχοτόμων.

164. Κατασκευάσατε τραπέζιον ΑΒΓΔ, μὲ βάσεις ΑΒ, ΓΔ, ἐὰν γνωρίζετε ὅτι: ΒΓ=3 cm, ΓΔ=6 cm καὶ $\Gamma = 120^\circ$.

71. ΙΣΟΤΗΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

71. 1. Ὡς γνωστὸν, ἐὰν ἔχωμεν δύο ἴσα τρίγωνα, εἴτε μὲ ἀπλήν ὀλίσθησιν εἴτε μὲ ὀλίσθησιν καὶ ἀναστροφῆν τοῦ ἑνός, δυνάμεθα νὰ φέρωμεν αὐτὰ εἰς σύμπτωσιν. Τότε ἐκάστη πλευρὰ καὶ ἐκάστη γωνία τοῦ ἑνός ἐφαρμόζει εἰς μίαν πλευρὰν καὶ εἰς μίαν γωνίαν τοῦ ἄλλου. Ἐὰν κατὰ τὴν σύμπτωσιν αὐτὴν ἡ κορυφὴ Α συμπίπτῃ μὲ τὴν Α', ἢ Β μὲ τὴν Β' καὶ ἡ Γ μὲ τὴν Γ', σχ. 150, τότε θὰ ἔχωμεν τὰς ἐξῆς ἐξ ἰσότητος:



Σχ. 150

$$\widehat{A} = \widehat{A}'$$

$$\widehat{B} = \widehat{B}'$$

$$\widehat{C} = \widehat{C}'$$

$$BC = B'C'$$

$$AC = A'C'$$

$$AB = A'B'$$

Ἡτοι ἡ ἰσότης δύο τριγώνων ὀρίζει μεταξὺ τῶν γωνιῶν αὐτῶν μίαν ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν τοιαύτην ὥστε :

Αἱ ἀντίστοιχοι γωνίαι νὰ εἶναι ἴσαι·

ἀπέναντι δὲ ἀπὸ τὰς ἴσας γωνίας κεῖνται ἴσαι πλευραί.

71. 2. Μέχρι τοῦδε ἡ ἐξακρίβωσις τῆς ἰσότητος δύο τριγώνων ἐγένετο δι' ἐπιθέσεως αὐτῶν. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα : Μήπως, ἐκ τῆς ἰσότητος $\mu \epsilon \rho \iota \kappa \omega \nu$ στοιχείων (πλευρῶν καὶ γωνιῶν) ἑνὸς τριγώνου μὲ στοιχεῖα (πλευρὰς καὶ γωνίας) ἄλλου τριγώνου, δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν τὴν ἰσότητα τῶν τριγώνων τούτων;

Καθὼς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, ἐὰν ἐκ τῶν 6 κυρίων στοιχείων ἑνὸς τριγώνου (3 πλευραί, 3 γωνίαι) τρία κατάλληλα εἶναι ἴσα μὲ τρία στοιχεῖα ἑνὸς ἄλλου τριγώνου, τότε τὰ τρίγωνα αὐτὰ θὰ εἶναι ἴσα.

Ἡτοι καὶ τὰ λοιπὰ 3 κύρια στοιχεῖα τοῦ πρώτου τριγώνου εἶναι ἴσα μὲ τὰ 3 ἀντίστοιχα στοιχεῖα τοῦ δευτέρου τριγώνου.

72. 1ον ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ


72. 1. Δύο τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ μὲ $\widehat{A}=\widehat{A}'$, $AB=A'B'$ καὶ $A\Gamma=A'\Gamma'$.

Σχηματίζομεν ἓν τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ μίαν γωνίαν $\chi A'\psi$ ἴσην μὲ τὴν γωνίαν A αὐτοῦ.

Ἐπὶ τῶν πλευρῶν $A'\chi$, $A'\psi$ λαμβάνομεν τμήματα : $A'B'=AB$ καὶ $A'\Gamma'=A\Gamma$, σχ. 151. Ὀρίζομεν τοιοῦτοτρόπως τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ εἰς τὸ ὁποῖον ἔχομεν :

$$\widehat{A}=\widehat{A}', \quad A'B'=AB \quad \text{καὶ} \quad A'\Gamma'=A\Gamma$$

Φανταζόμεθα ὅτι τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ τίθεται ἐπὶ τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$



Σχ. 151

εἰς τρόπον ὥστε ἡ $A'B'$ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ἴσης τῆς AB καθὼς καὶ ἡ γωνία A' ἐπὶ τῆς ἴσης τῆς γωνίας A . Τότε κατ' ἀνάγκην καὶ ἡ $A'\Gamma'$ θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ἴσης τῆς $A\Gamma$ ὁπότε καὶ ἡ $B'\Gamma'$ ἐπὶ τῆς $B\Gamma$.

Συνεπῶς κατὰ τὴν τοποθέτησιν αὐτὴν τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$.

Ἔστω : Ἐὰν εἰς δύο τρίγωνα, μία γωνία τοῦ ἑνὸς ἰσοῦται μὲ μίαν γωνίαν τοῦ ἄλλου καὶ αἱ πλευραὶ τῆς μιᾶς ἐκ τῶν γωνιῶν αὐτῶν εἶναι

ἀντιστοιχῶς ἴσαι μὲ τὰς πλευρὰς τῆς ἄλλης γωνίας, τότε τὰ τρίγωνα εἶναι ἴσα.

Ἡ συμβολικῶς :

$$(\widehat{A}=\widehat{A}', AB=A'B', A\Gamma=A'\Gamma') \Rightarrow \Delta \cdot AB\Gamma = \Delta \cdot A'B'\Gamma'$$

72. 2. Παρατηρήσεις

Ἀπὸ τὴν ἰσότητα τῶν δύο ἀνωτέρω τριγώνων προκύπτει ὅτι καὶ $\widehat{B}=\widehat{B}'$, $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$ καὶ $B\Gamma=B'\Gamma'$.

Ἦτοι : Εἰς τὰ ἴσα τρίγωνα, αἱ ἴσαι γωνίαι κεῖνται ἀπέναντι ἴσων πλευρῶν καὶ αἱ ἴσαι πλευραὶ ἀπέναντι τῶν ἴσων γωνιῶν.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω : Εἶναι δυνατὸν νὰ συμπεράνωμεν τὴν ἰσότητα δύο γωνιῶν (ἢ δύο εὐθ. τμημάτων) χωρὶς ἀπ' εὐθείας σύγκρισιν αὐτῶν. Ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν ὅτι αἱ δύο αὐταὶ γωνίαι (ἢ εὐθ. τμήματα) εἶναι ἀντίστοιχα στοιχεῖα δύο ἴσων τριγώνων.

73. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἀπόστασις δύο σημείων A καὶ B, ἐὰν τὸ τμήμα AB, σχ. 152, εἶναι ἀπρόσιτον.

α) Λαμβάνομεν ἓν σημεῖον Γ, ἐκτὸς τῆς εὐθείας AB καὶ μετροῦμεν τὰς ἀποστάσεις ΓA καὶ ΓB.

β) Προεκτείνομεν τὰς ΓA καὶ ΓB κατὰ τμήματα $\Gamma A' = \Gamma A$ καὶ $\Gamma B' = \Gamma B$, σχ. 152.


γ) Τὰ τρίγωνα ABΓ καὶ A'B'Γ ἔχουν :

$\widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma}$ (ὡς κατὰ κορυφήν)

$\Gamma B = \Gamma B'$ (ἐκ κατασκευῆς)

$\Gamma A = \Gamma A'$ (ἐκ κατασκευῆς)

Ἄρα εἶναι ἴσα. Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν συνάγομεν ὅτι $AB = A'B'$. Ἐὰν συνεπῶς μετρήσωμεν τὴν A'B', θὰ ἔχωμεν καὶ τὸ μῆκος τῆς AB.



Σχ. 152

74. 2ον ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Δύο τρίγωνα ABΓ καὶ A'B'Γ' μὲ $\widehat{B}=\widehat{B}'$, $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$ καὶ $B\Gamma=B'\Gamma'$.

Σχηματίζομεν ἓν τρίγωνον ABΓ καὶ εὐθ. τμήμα B'Γ' = BΓ. Ἐπειτα εἰς τὸ αὐτὸ ἡμιεπίπεδον τῆς B'Γ' σχηματίζομεν γωνίας $B' = B$ καὶ $\Gamma' = \Gamma$, ὡς εἰς τὸ σχ. 153.

Ὅριζομεν τοιοῦτοτρόπως ἓν ἄλλο τρίγωνον A'B'Γ' μὲ $\widehat{B}'=\widehat{B}$, $\widehat{\Gamma}'=\widehat{\Gamma}$ καὶ $B'\Gamma'=B\Gamma$.

Ἄς συγκρίνωμεν τὰ δύο ἀνωτέρω τρίγωνα.

Πρὸς τοῦτο τοποθετοῦμεν τὸ τρίγωνον $A'B'Γ'$ ἐπὶ τοῦ $ABΓ$ εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐφαρμόσουν αἱ ἴσαι πλευραὶ $BΓ$, $B'Γ'$ καὶ αἱ ἴσαι γωνίαι B , B' .

Παρατηροῦμεν τότε ὅτι καὶ τὰ τρίγωνα ἐφαρμόζουν. Δυναμέθα ὁμως νὰ ἐργασθῶμεν καὶ ὡς ἑξῆς :

Νὰ τοποθετήσωμεν τὸ τρίγωνον $A'B'Γ'$ παραπλεύρως τοῦ τριγώνου $ABΓ$ εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐφαρμόσουν αἱ ἴσαι πλευραὶ $BΓ$, $B'Γ'$ ($B \equiv B'$, $Γ \equiv Γ'$) αἱ δὲ γωνίαι B' καὶ $Γ'$ νὰ γίνωνται ἐφεξῆς μετὰ τὰς ἴσας τῶν B καὶ $Γ$ ἀντιστοίχως, σχ. 153.

Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν παρατη-

ροῦμεν ὅτι ἡ $BΓ$ εἶναι κοινὴ διχοτόμος τῶν γωνιῶν ABA' καὶ $AΓA'$ (Διατί;)

Ἄς συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν $\epsilon = BΓ$ τῆς κοινῆς αὐτῆς διχοτόμου. Ἐὰν διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον περὶ τὴν ϵ , αἱ κορυφαὶ B , $Γ$ θὰ μείνουν ἀκίνητοι. Αἱ πλευραὶ τῆς γωνίας ABA' θὰ συμπίσουν (διατί;). Ἐπίσης θὰ συμπίσουν αἱ πλευραὶ τῆς γωνίας $AΓA'$.

Ἄρα καὶ ἡ τομὴ A τῶν πλευρῶν BA , $ΓA$ θὰ συμπίσῃ μετὰ τὴν τομὴν A' τῶν BA' , $ΓA'$.

Ὡστε : Ἐὰν εἰς δύο τρίγωνα, μία πλευρὰ τοῦ ἑνὸς ἰσοῦται μετὰ μίαν πλευρὰν τοῦ ἄλλου καὶ αἱ προσκείμεναι γωνίαι εἰς τὰς ἴσας πλευρὰς εἶναι ἀντιστοίχως ἴσαι, τὰ τρίγωνα εἶναι ἴσα.

$$(B\Gamma = B'\Gamma', \widehat{B} = \widehat{B'}, \widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma'}) \Rightarrow \Delta \cdot AB\Gamma = \Delta \cdot A'B'\Gamma'$$

Σημείωσις


Μὲ ἐντελῶς ἀνάλογον τρόπον ἦτο δυνατόν νὰ ἐργασθῶμεν διὰ νὰ εὐρωμεν καὶ τὸ 1ον κριτήριον ἰσότητος τριγώνων.

75. 3ον ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Δύο τρίγωνα μετὰ τὰς πλευρὰς τοῦ ἑνὸς ἀντιστοίχως ἴσας πρὸς τὰς πλευρὰς τοῦ ἄλλου.

75. 1. Σχεδιάζομεν τρίγωνον $ABΓ$ καὶ εὐθ. τμῆμα $B'Γ' = BΓ$. Ἐπειτα μετὰ κέντρον τὰ σημεῖα B' καὶ $Γ'$ καὶ ἀκτίνας BA καὶ $ΓA$ ἀντιστοίχως γράφομεν δύο κύκλους. Ἐὰν A' εἶναι τὸ ἐν σημεῖον τομῆς αὐτῶν, τότε ὀρίζεται τὸ τρίγωνον $A'B'Γ'$. Τοῦτο ἔχει ἐκάστην πλευρὰν αὐτοῦ ἴσην μετὰ μίαν πλευρὰν τοῦ τριγώνου $ABΓ$.

$$(B'\Gamma' = B\Gamma, B'A' = BA, \Gamma'A' = \Gamma A)$$



Σχ. 154

75. 2. Ἐὰς φαντασθῶμεν ὅτι τοποθετοῦμεν τὸ τρίγωνον $A'B'Γ'$ παραπλεύρως τοῦ $ABΓ$ εἰς τρόπον ὥστε, νὰ ταυτισθοῦν αἱ ἴσαι πλευραὶ $AB, A'B'$ ($A \equiv A', B \equiv B'$) αἱ δὲ γωνίαι A', B' νὰ γίνουιν ἐφεξῆς μὲ τὰς γωνίας A καὶ B ἀντιστοιχῶς, σχ. 154.

Ἀπὸ τὴν ἰσότητα $AΓ = A'Γ'$ ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ σημεῖον A κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκάθετου τοῦ τμήματος $ΓΓ'$. Ὀμοίως ἐπειδὴ $BΓ = B'Γ'$ τὸ B κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκάθετου τοῦ $ΓΓ'$.


Ἦτοι: ἡ εὐθεῖα AB εἶναι ἡ μεσοκάθετος τοῦ τμήματος $ΓΓ'$. Ἐὰν ἤδη διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον περὶ τὴν μεσοκάθετον AB , πρέπει: Τὰ σημεῖα A καὶ B νὰ μείνουιν ἀκίνητα, ἐνῶ τὸ σημεῖον $Γ$ θὰ συμπίσῃ μὲ τὸ σημεῖον $Γ'$. (Διατί;))

Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὰ τρίγωνα $ABΓ$ καὶ $A'B'Γ'$ εἶναι συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὴν AB καὶ συνεπῶς ἴσα.

Ὡστε: **Ἐὰν αἱ τρεῖς πλευραὶ ἑνὸς τριγώνου εἶναι ἀντιστοιχῶς ἴσαι μὲ τὰς πλευρὰς ἑνὸς ἄλλου τριγώνου, τότε τὰ τρίγωνα αὐτὰ εἶναι ἴσα.**

$$(AB = A'B', BΓ = B'Γ', ΓA = Γ'A') \Rightarrow \Delta \cdot ABΓ = \Delta \cdot A'B'Γ'$$

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα τῶν τριῶν κριτηρίων ἰσότητος τριγώνων.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

165. Δύο ἰσοσκελῆ τρίγωνα $ABΓ, A'B'Γ'$ ($AB = AΓ, A'B' = A'Γ'$) ἔχουιν $\hat{A} = \hat{A}'$ καὶ $AB = A'B'$. Νὰ ἐξετάσετε ἐὰν ταῦτα εἶναι ἴσα. Ἐὰν ναί, ποῖα εἶναι τὰ λοιπὰ ἴσα στοιχεῖα αὐτῶν;
166. Δύο ὀρθογώνια τρίγωνα $ABΓ, A'B'Γ'$ ($\hat{A} = \hat{A}' = 90^\circ$) ἔχουιν $AΓ = A'Γ'$ καὶ $\hat{\Gamma} = \hat{\Gamma}'$. Νὰ ἐξετάσετε ἐὰν ταῦτα εἶναι ἴσα. Ἐὰν ναί, ποῖα εἶναι τὰ λοιπὰ ἴσα στοιχεῖα αὐτῶν;
167. Νὰ συγκρίνετε τὰς διαμέσους δύο ἴσων τριγώνων.
168. Νὰ συγκρίνετε τὰ 4 τρίγωνα εἰς τὰ ὁποῖα χωρίζεται εἰς ῥόμβος ὑπὸ τῶν διαγωνίων αὐτοῦ.
169. Εἰς κυρτὸν τετράπλευρον $ABΓΔ$ εἶναι $AB = AΔ$ καὶ $ΓΔ = ΓB$. Νὰ συγκριθοῦν αἱ γωνίαι $AΔΓ$ καὶ $ABΓ$ αὐτοῦ.
170. Χαράξατε ἐν παραλληλόγραμμον καὶ συγκρίνατε τὰ δύο τρίγωνα εἰς τὰ ὁποῖα τὸ παραλ/μον χωρίζεται ὑπὸ μιᾶς διαγωνίου αὐτοῦ.

76. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ


Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τρία γενικὰ κριτήρια ἰσότητος τριγώνων, τὰ ὁποῖα ἰσχύ-

ουν φυσικά και εις τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα, ὑπάρχουν και τρία ειδικὰ κριτήρια ἰσότητος ὀρθογωνίων τριγώνων.

1ον Κριτήριο

Ἐπιπέδου ὀρθογώνια τρίγωνα με τὰς ὑποτείνουσας ἴσας και ἀνά μίαν κάθετον πλευρὰν ἴσην.

α) Σχηματίζομεν ὀρθογ. τρίγωνον $AB\Gamma$ και ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ὀρθῆς γωνίας $\chi A'\psi$ λαμβάνομεν $A'B'=AB$. Ἐπειτα με κέντρον B' και ἀκτίνα ἴσην με $B\Gamma$ γράφομεν κύκλον, ὁ ὁποῖος τέμνει τὴν πλευρὰν $A'\chi$ εἰς σημεῖον Γ' . Τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ εἶναι ὀρθογώνιον και ἔχει $A'B'=AB$, $B'\Gamma'=B\Gamma$.



Σχ. 155

β) Ἐὰν συγκρίνωμεν τὰ τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$, σχ. 155.

Πρὸς τοῦτο τοποθετοῦμεν τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ παρὰ τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ εἰς τρόπον, ὥστε νὰ ἐφαρμόσουν αἱ ἴσαι πλευραὶ $A'B'$ και AB .

Τότε ἡ $A\Gamma$ θὰ ἔλθῃ εἰς τὴν θέσιν $A'\Gamma'$, προέκτασιν τῆς πλευρᾶς $A'\Gamma'$.

(Διατί; Προσέξατε τὰς γωνίας A, A'). Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν τὰ δύο τρίγωνα σχηματίζουεν ἓν ἰσοσκελές τρίγωνον: τὸ τρίγωνον $\Gamma''B'\Gamma'$ με ἴσας πλευρὰς τὰς $B'\Gamma'$ και $B'\Gamma''$.

Ἄρα τὸ ὡς πρὸς τὴν βᾶσιν $\Gamma''\Gamma'$ ὕψος $B'A$, θὰ εἶναι και ἄξων συμμετρίας.

Συνεπῶς $\Delta \cdot A'B'\Gamma'' = \Delta \cdot A'B'\Gamma'$ ἢ $\Delta \cdot AB\Gamma = \Delta \cdot A'B'\Gamma'$

Ἐὰν δύο ὀρθογώνια τρίγωνα ἔχουν τὰς ὑποτείνουσας ἴσας και ἀνά μίαν κάθετον πλευρὰν ἴσην, εἶναι ἴσα.

$$\boxed{(\hat{A} = \hat{A}' = 1L, AB = A'B', B\Gamma = B'\Gamma') \Rightarrow \Delta \cdot AB\Gamma = \Delta \cdot A'B'\Gamma'}$$

2ον Κριτήριο

Δύο ὀρθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma, A'B'\Gamma'$ ($\hat{A} = \hat{A}' = 1L$), με $B\Gamma = B'\Gamma'$ και $\hat{B} = \hat{B}'$.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ γωνία Γ εἶναι συμπληρωματικὴ τῆς γωνίας B ,

$$\hat{B} + \hat{\Gamma} = 1L \quad \text{ἢτοι} \quad \hat{\Gamma} = 1L - \hat{B} \quad (1)$$

Ἐπίσης και ἡ γωνία Γ' εἶναι συμπληρωματικὴ τῆς γωνίας B'

$$\hat{B}' + \hat{\Gamma}' = 1L \quad \text{ἢτοι} \quad \hat{\Gamma}' = 1L - \hat{B}' \quad (2)$$

Ἀπὸ τὰς (1) και (2) ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ γωνιαὶ Γ, Γ' εἶναι ἴσαι.

Συνοπτικῶς τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ ἔχουν $B\Gamma=B'\Gamma'$, $\widehat{B}=\widehat{B}'$ καὶ $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$ καὶ διὰ τοῦτο εἶναι ἴσα. (2ον κριτ. ἰσότητος τυχόντων τριγ.).

᾽Ωστε: ᾽Εὰν δύο ὀρθογώνια τρίγωνα ἔχουν τὰς ὑποτείνουσας ἴσας καὶ ἀνὰ μίαν ὀξείαν γωνίαν ἴσην, εἶναι ἴσα.

$$\boxed{(\widehat{A}=\widehat{A}'=1L, B\Gamma=B'\Gamma', \widehat{B}=\widehat{B}') \Rightarrow \Delta \cdot AB\Gamma = \Delta \cdot A'B'\Gamma'}$$

3ον Κριτήριο

Δύο ὀρθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ ($\widehat{A}=\widehat{A}'=1L$) μὲ $AB=A'B'$ καὶ $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$.

Σκεπτόμενοι ὅπως προηγουμένως εὐρίσκομεν ὅτι τὰ τρίγωνα αὐτὰ ἔχουν καὶ τὰς γωνίας B καὶ B' ἴσας.


᾽Ητοι ἔχουν $AB=A'B'$, $\widehat{A}=\widehat{A}' (=1L)$ καὶ $\widehat{B}=\widehat{B}'$

᾽Αρα εἶναι ἴσα.

᾽Εὰν δύο ὀρθογώνια τρίγωνα ἔχουν ἀνὰ μίαν κάθετον πλευρὰν ἴσην καὶ τὰς ὀξείας γωνίας, αἱ ὁποῖαι κείνται ἀπέναντι τῶν ἴσων πλευρῶν ἴσας, θὰ εἶναι ἴσα.

$$\boxed{\widehat{A}=\widehat{A}'=1L, \widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}', AB=A'B'} \Rightarrow \Delta \cdot AB\Gamma = \Delta \cdot A'B'\Gamma'$$

Παραθέτομεν κατωτέρω συνοπτικὸν πίνακα κριτηρίων ἰσότητος ὀρθογώνιων τριγώνων.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

171. Δικαιολογήσατε ὅτι αἱ ἀποστάσεις τῶν μέσων τῶν ἴσων πλευρῶν ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἀπὸ τὴν βᾶσιν εἶναι ἴσαι.

172. Δικαιολογήσατε ὅτι τὰ ὑψη τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου πρὸς τὰς ἴσας πλευρὰς αὐτοῦ εἶναι ἴσαι.


173. Δικαιολογήσατε την εξής πρότασιν : 'Εάν δύο ύψη ἐνὸς τριγώνου εἶναι ἴσα, τότε τοῦτο εἶναι ἰσοσκελές.

174. Δικαιολογήσατε ὅτι τὰ τρία ὕψη ἰσοπλεύρου τριγώνου εἶναι ἴσα.

174. Μὲ τὴν βοήθειαν ἴσων τριγώνων δικαιολογήσατε διατί αἱ διαγώνιοι ὀρθογωνίου εἶναι ἴσαι.

77. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Τὰ κριτήρια ἰσότητος τριγώνων μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κατασκευάσωμεν γεωμετρικῶς ἐν τριγώνον, ὅταν γνωρίζωμεν τρία κατάλληλα στοιχεῖα αὐτοῦ καὶ καθορίζουν τὸ πλήθος ἢ τὴν μοναδικότητα τῶν λύσεων.



Σχ. 156

77. 1. Νὰ κατασκευασθῆ τριγώνον $AB\Gamma$, τοῦ ὁποῦοῦ δίδονται δύο πλευραὶ $AB=\gamma$, $AG=\beta$ καὶ ἡ περιεχομένη γωνία $A=\omega$.

α) Μὲ κορυφὴν ἐν σημείον A κατασκευάζομεν κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 39.2) γωνίαν ἴσην μὲ τὴν δοθεῖσαν.

β) Ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῆς γωνίας αὐτῆς λαμβάνομεν τμήματα $AB=\gamma$ καὶ $AG=\beta$, σχ. 156.

Τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι τὸ ζητούμενον. (Διατί;).

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω κατασκευῆς ἐννοοῦμεν ὅτι ἐν τριγώνον $AB\Gamma$ ὀρίζεται πλήρως, ὅταν γνωρίζωμεν τὰς πλευρὰς AB , AG καὶ τὴν γωνίαν A , ἀρκεῖ αὕτη νὰ εἶναι μικρότερα μᾶς εὐθείας γωνίας.

Ἐὰν μὲ τὰ αὐτὰ στοιχεῖα κατασκευάσωμεν ἄλλο τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ τότε τὰ δύο αὐτὰ τρίγωνα θὰ εἶναι ἴσα. (Διατί;)

77. 2. Νὰ κατασκευασθῆ τριγώνον $AB\Gamma$, τοῦ ὁποῦοῦ δίδεται ἡ μία πλευρὰ $B\Gamma=a$ καὶ αἱ δύο προσκείμεναι αὐτῆς γωνίαι B καὶ Γ .


Δεδομένα : Σχ. 157α.

Ἐπὶ εὐθείας ϵ λαμβάνομεν ἐν τμήμα $B\Gamma=a$. Ἐπειτα μὲ κορυφὰς τὰ ἄκρα B , Γ κατασκευάζομεν δύο γωνίας ἀντιστοίχως ἴσας πρὸς τὰς γωνίας ω , καὶ φ (κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ σχ. 157).

Κατασκευάζεται τοιοῦτοτρόπως τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ ζητούμενον. (Διατί;).

Ἐὰν ἐλαμβάνομεν τὰς γωνίας ω , φ πρὸς τὸ ἄλλο ἡμιεπίπεδον ὡς πρὸς τὴν $B\Gamma$, τότε θὰ εἴχομεν ἐν ἄλλο τρίγωνον κατ' ἀναστροφὴν ἴσον μὲ τὸ $AB\Gamma$.

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω κατασκευῆς ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ ὀρίζεται πλήρως ὅταν μᾶς δοθοῦν ἡ πλευρὰ $B\Gamma$ καὶ αἱ γωνίαι B, Γ αὐτοῦ, ἀρκεῖ μόνον νὰ εἶναι $\widehat{B} + \widehat{\Gamma} < 2L$.



Σχ. 157

77. 3. Νά κατασκευασθῆ τρίγωνον ἐκ τῶν τριῶν πλευρῶν αὐτοῦ
 $B\Gamma = \alpha$, $A\Gamma = \beta$, $AB = \gamma$, $\alpha > \gamma > \beta$

α) Ἐπὶ εὐθείας ϵ λαμβάνομεν τμήμα $B\Gamma = \alpha$

β) Μὲ κέντρα τὰ σημεῖα B καὶ Γ καὶ ἀκτῖνας ἴσας μὲ γ καὶ β ἀντιστοίχως, γράφομεν δύο κύκλους. Ἐὰν οἱ κύκλοι αὐτοὶ τέμνωνται εἰς δύο διαφορετικὰ σημεῖα A, A' , τότε τὰ τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ $A'B\Gamma$, σχ. 158, τὰ ὁποῖα εἶναι συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν $B\Gamma$, εἶναι λύσεις τοῦ προβλήματος.

Παρατήρησις

Εἶναι προφανές ὅτι διὰ τὸ νὰ σχηματισθοῦν τὰ τρίγωνα πρέπει οἱ δύο κύκλοι νὰ τέμνωνται. Ἦτοι πρέπει μεταξὺ τῆς διακέντρου $B\Gamma = \alpha$ καὶ τῶν ἀκτίνων β, γ νὰ ἰσχύουν αἱ σχέσεις

$$\gamma - \beta < \alpha < \beta + \gamma \quad (1) \quad (\S 38, 2)$$

Μάλιστα ἐπειδὴ $\alpha > \gamma > \beta$, θὰ εἶναι καὶ $\alpha > \gamma - \beta$

Ἦτοι αἱ συνθήκαι (1) περιορίζονται εἰς τὴν $\alpha < \beta + \gamma$

Ἴνα τρία τμήματα α, β, γ εἶναι πλευραὶ τριγώνου, πρέπει καὶ ἀρκεῖ τὸ μεγαλύτερον νὰ εἶναι μικρότερον τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο ἄλλων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

176. Κατασκευάσατε γεωμετρικῶς τρίγωνον $AB\Gamma$, ὅταν γνωρίζετε ὅτι :

1) $A = 30^\circ$, $AB = 4$ cm $A\Gamma = 2$ cm. 2) $A = 30^\circ$, $AB = A\Gamma = 4$ cm. 3) $A = 60^\circ$, $B = 45^\circ$

καὶ $AB = 4$ cm. 4) $AB = 3$ cm, $A\Gamma = 4$ cm καὶ $B\Gamma = 5$ cm.

177. Κατασκευάσατε ἰσοσκελές τρίγωνον $AB\Gamma$ μὲ βάσιν $B\Gamma$ ἴσην μὲ 5 cm καὶ μὲ ὕψος πρὸς αὐτὴν ἴσον μὲ 4 cm.

178. Κατασκευάσατε ὀρθογώνιον τρίγωνον μὲ ὑποτείνουσαν $B\Gamma = 5$ cm καὶ μὲ γωνίαν $B = 60^\circ$.

78. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥ


78. 1. Χαράσσομεν μίαν κυρτὴν γωνίαν $\chi O\psi$ καὶ τὴν διχοτόμον τῆς OZ , σχ. 161. Λαμβάνομεν ἓν σημεῖον M τῆς διχοτόμου καὶ φέρομεν τὰς ἀποστάσεις αὐτοῦ ἀπὸ τὰς πλευρὰς $O\chi, O\psi$,

$$MA \perp O\chi, \quad MB \perp O\psi$$

Θὰ συγκρίνωμεν τὰς ἀποστάσεις αὐτάς.

Ἐὰς προσέξωμεν τὰ τρίγωνα OAM καὶ OBM :

- 1) Εἶναι ὀρθογώνια $\widehat{A} = \widehat{B} = 1\text{L}$
- 2) Ἐχουν τὴν ὑποτείνουσαν OM κοινήν
- 3) Ἐχουν τὰς ὀξείας γωνίας O_1, O_2 ἴσας. (Διατί;).



"Αρα τὰ τρίγωνα εἶναι ἴσα. Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν συνάγομεν ὅτι :

$$MA = MB$$

"Ὡστε : "Ἐκαστον σημεῖον τῆς διχοτόμου γωνίας ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτῆς.

78. 2. Ἐχομεν μίαν κυρτὴν γωνίαν $\chi O \psi$ καὶ ἓν σημεῖον M , εἰς τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῆς, τὸ ὁποῖον ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας.

"Ἦτοι : $MA \perp O\chi$, $MB \perp O\psi$, καὶ $MA = MB$, σχ. 159.

Μήπως τὸ σημεῖον M κεῖται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας;

"Ἄς λάβωμεν τὰ τρίγωνα OAM καὶ OBM .

1) Εἶναι ὀρθογώνια ($\widehat{A} = \widehat{B} = 1L$). 2) Ἐχομεν τὴν ὑποτείνουσαν OM κοινὴν.

3) Μία κάθετος πλευρὰ τοῦ ἑνὸς εἶναι ἴση μὲ μίαν κάθετον πλευρὰν τοῦ ἄλλου : $MA = MB$. Ἄρα εἶναι ἴσα. Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν συνάγομεν ὅτι καὶ

$$\widehat{O}_1 = \widehat{O}_2$$

"Ἦτοι : Ἐὰν ἓν ἐσωτερικὸν σημεῖον γωνίας ἀπέχη ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτῆς, θὰ εὐρίσκειται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας.

78. 3. Αἱ ἀνωτέρω δύο προτάσεις συνοφίζονται εἰς τὴν ἀκόλουθον :

Εἰς τὸ ἐπίπεδον τὰ σημεῖα τῆς διχοτόμου μιᾶς κυρτῆς γωνίας καὶ μόνον αὐτά, ἀπέχουν ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


179. Κατασκευάσατε μίαν γωνίαν καὶ μίαν εὐθείαν ϵ τέμνουσαν τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας. Ἐπὶ τῆς εὐθείας ϵ νὰ εὐρεθῇ ἓν σημεῖον M , τὸ ὁποῖον νὰ ἀπέχη ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας.

180. Ἐὰν O εἶναι τὸ σημεῖον τομῆς τῶν διχοτόμων δύο γωνιῶν τριγώνου ἀποδείξατε ὅτι τοῦτο ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὰς τρεῖς πλευρὰς τοῦ τριγώνου.


79. ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ

79. 1. Χαράσσομεν δύο εὐθείας ϵ , ϵ' τεμνομένας εἰς τὸ σημεῖον O καὶ εὐρίσκομεν τὴν διχοτόμον OZ μιᾶς ἐκ τῶν σχηματιζομένων κυρτῶν γωνιῶν.

Ἀπὸ ἓν σημεῖον M τῆς OZ φέρομεν τὰς MA , MB καθέτους πρὸς τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας. Θὰ εἶναι τότε $MA = MB$



Σχ. 160



Σχ. 161

Συνεπῶς, ἂν μὲ κέντρον M καὶ ἀκτῖνα MA γράψωμεν κύκλον, οὗτος θὰ ἐφάπτεται καὶ τῶν δύο εὐθειῶν ϵ, ϵ' , σχ. 160.


79. 2. Πόσους κύκλους ἐφαπτομένους τῶν δύο αὐτῶν εὐθειῶν ϵ, ϵ' δύναμεθα νὰ γράψωμεν;

Εἶναι φανερόν ὅτι ὅπως εἰργάσθημεν μὲ τὸ σημεῖον M θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἐργασθῶμεν καὶ μὲ οἰονδήποτε ἄλλο σημεῖον τῆς διχοτόμου ἐκάστης ἐκ τῶν τεσσάρων κυρτῶν γωνιῶν τῶν εὐθειῶν ϵ, ϵ' , σχ. 161.

Συνεπῶς ὑπάρχουν ἄπειροι εἰς πλῆθος κύκλοι ἐφαπτόμενοι τῶν ϵ, ϵ' . Τὰ κέντρα ὅλων αὐτῶν εὐρίσκονται ἐπὶ τῶν διχοτόμων τῶν 4 γωνιῶν τὰς ὁποίας σχηματίζουν αἱ εὐθεῖαι ϵ, ϵ' .

79. 3. Εἰδικὴ περίπτωσις

Ἐὰν αἱ ϵ, ϵ' εἶναι παράλληλοι ὑπάρχουν πάλιν ἄπειροι εἰς πλῆθος κύκλοι ἐφαπτόμενοι αὐτῶν. Οὗτοι εἶναι ἴσοι καὶ ἔχουν τὰ κέντρα των ἐπὶ τῆς μεσο-παράλληλου τῶν ϵ, ϵ' .



Σχ. 162

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

181. Χαράξατε κύκλους ἐφαπτομένους τῶν πλευρῶν μιᾶς ὀρθῆς γωνίας.
182. Χαράξατε κύκλον ἐφαπτόμενον τῶν πλευρῶν ἑνὸς τριγώνου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

183. Κατασκευάσατε ἓν τετράγωνον, ἂν γνωρίζετε μίαν διαγώνιον αὐτοῦ.
184. Κατασκευάσατε ἓν ὀρθογώνιον, ἂν γνωρίζετε μίαν πλευρὰν καὶ μίαν διαγώνιον αὐτοῦ.
185. Κατασκευάσατε ἓνα ρόμβον ἂν γνωρίζετε μίαν διαγώνιον καὶ μίαν πλευρὰν αὐτοῦ.
186. Εἰς ἓν παραλ/μον $AB\Gamma\Delta$ ἡ διαγώνιος $A\Gamma$ διχοτομεῖ τὴν γωνίαν BAD . Ἐξετάσατε ἂν τὸ παραλ/μον εἶναι ρόμβος.
187. Ἐὰν M εἶναι σημεῖον τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας A ἰσοσκελοῦς τριγώνου $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) νὰ δικαιολογήσετε ὅτι:
α) Τὰ τμήματα $M\Gamma$ MB εἶναι ἴσα, β) αἱ γωνίαι ΓBM καὶ $B\Gamma M$ εἶναι ἴσαι.
188. Νὰ εὑρεθῇ τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου Π τὰ ὁποῖα εἶναι συμμετρικὰ ἐνὸς σταθεροῦ σημείου A ὡς πρὸς τὰς εὐθείας αἰτνες διέρχονται δι' ἄλλου σημείου O . Τὰ O καὶ A κείνται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου Π .
189. Νὰ δικαιολογήσετε ὅτι ἂν δύο ὕψη τριγώνου εἶναι ἴσα τοῦτο εἶναι ἰσοσκελές.
190. Δικαιολογήσατε ὅτι αἱ μεσοκάθετοι παντὸς τριγώνου διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

	Σελίς
1. Τὸ σύνολον	5
2. Συμβολισμὸς τοῦ συνόλου.	7
3. Ὑποσύνολον συνόλου.	9
4. Γραφικὴ παράστασις συνόλου	11
5. Ἴσα σύνολα	12
6. Μονοσήμαντος ἀντιστοιχία.	14
7. Ἀμφιμοноσήμαντος ἀντιστοιχία. Ἴσοδύναμα σύνολα	15
8. Τομὴ συνόλων	17
9. Ἐνωσις συνόλων	20
10. Συμπλήρωμα (ἢ συμπληρωματικὸν) συνόλου	22
11. Ζεῦγος	23

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

12. Τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν.	25
13. Ἀπαρίθμησις.	26
14. Πεπερασμένα καὶ μὴ πεπερασμένα σύνολα	26
15. Τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων τῆς Ἀριθμητικῆς	27
16. Τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμῆσεως.	28
17. Ἑλληνικὴ γραφὴ τῶν ἀριθμῶν.	30
18. Ρωμαϊκὴ γραφὴ τῶν ἀριθμῶν.	31
19. Ἡ ἔννοια τῆς ἰσότητος καὶ ἀνισότητος εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν	32
20. Τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ὡς διατεταγμένον σύνολον	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

21. Ἡ πράξις τῆς προσθέσεως.	36
22. Ἰδιότητες τῆς προσθέσεως.	37
23. Ἀθροισμα τριῶν ἢ περισσοτέρων προσθετέων	39
24. Ἡ πράξις τῆς ἀφαιρέσεως.	42
25. Ἐπίλυσις ἀπλῶν ἐξισώσεων.	45
26. Ἰδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως.	46
27. Ἀριθμητικαὶ παραστάσεις.	51
28. Πολλαπλασιασμὸς	52
29. Ἰδιότητες πολλαπλασιασμοῦ	53
30. Γινόμενον πολλῶν παραγόντων	56
31. Ἰδιότητες γινομένου πολλῶν παραγόντων	57
32. Πολλαπλάσια ἀκεραίων	58
33. Ἡ πράξις τῆς διαιρέσεως	59
24. Εἰδικαὶ περιπτώσεις διαιρέσεως	62
35. Ἡ ἀτελής διαίρεσις	63
36. Ἰδιότητες διαιρέσεως	65
37. Ἄλλαι ἀριθμητικαὶ παραστάσεις	68
38. Τεχνικὴ τῶν πράξεων εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα	70
39. Ἐκτέλεσις τῆς προσθέσεως	70
40. Ἐκτέλεσις τῆς ἀφαιρέσεως	71
41. Ἐκτέλεσις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ	72
42. Ἐκτέλεσις τῆς διαιρέσεως	74

43. Προβλήματα τῶν τεσσάρων πράξεων (πρόσθεσις—ἀφαίρεσις)	76
44. Πολλαπλασιασμός	77
45. Διαιρέσις	78

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

46. Δυνάμεις ἀκεραίων ἀριθμῶν	81
47. Ἰδιότητες τῶν δυνάμεων	83
48. Ἐπέκτασις τῆς ἐννοίας τῆς δυνάμεως διὰ $n=1$ καὶ $n=0$	84
49. Ἀξιοσημείωτοι ταυτότητες.....	86
50. Χρήσις τῶν δυνάμεων τοῦ 10 εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμῆσεως.....	87

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

51. Διαιρέται ἀκεραίου ἀριθμοῦ.	89
52. Ἰδιότητες διαιρετῶν ἀκεραίου	91
53. Κριτήρια διαιρετότητος.....	93
54. Ἀνάλυσις φυσικοῦ συνθέτου ἀριθμοῦ εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων.	96
55. Κοινὸ διαιρέται καὶ Μ.Κ.Δ. ἀκεραίων ἀριθμῶν	98
56. Ἰδιότητες τοῦ Μ.Κ.Δ.	99
57. Ἀλγόριθμος τοῦ Εὐκλείδου.....	100
58. Εὗρεσις Μ.Κ.Δ. περισσοτέρων τῶν δύο ἀκεραίων.	101
59. Εὗρεσις Μ.Κ.Δ. ἀκεραίων δι' ἀναλύσεως τούτων εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων ..	102
60. Κοινὰ πολλαπλάσια φυσικοῦ ἀριθμοῦ	103
61. Εὗρεσις τοῦ Ε.Κ.Π. δύο ἢ περισσοτέρων φυσικῶν ἀριθμῶν	104

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

62. Κλάσματα	107
63. Γινόμενον ἀκεραίου ἐπὶ κλάσμα	111
64. Ἡ σχέσηις τῆς ἰσότητος	113
65. Ἐφαρμογαὶ τῆς ἰσότητος κλασμάτων	114
66. Ὁ κλασματικὸς ἀριθμὸς ὡς πηλίκον διαιρέσεως	116
67. Ὁμώνυμα καὶ ἑτερόνυμα κλάσματα	118
68. Ἡ σχέσηις ἀνισότητος	122
69. Τὸ σύνολον τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς	125
70. Πρόσθεσις	128
71. Ἀφαίρεσις	132
72. Πολλαπλασιασμός	134
73. Διαιρέσις.....	138
74. Δυνάμεις ρητῶν.....	141
75. Σύνθετα κλάσματα	143
76. Προβλήματα ἐπιλύμενα διὰ τῶν τεσσάρων πράξεων τῶν ρητῶν ἀριθμῶν.....	145
77. Ἐπίλυσις προβλημάτων διὰ τῆς μεθόδου ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.....	148
78. Ἐπίλυσις προβλημάτων δι' ἐξισώσεων	150

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

79. Δεκαδικὰ κλάσματα καὶ δεκαδικοὶ ἀριθμοί.....	153
80. Ἰδιότητες δεκαδικῶν ἀριθμῶν	157
81. Πρόσθεσις δεκαδικῶν ἀριθμῶν	158
82. Ἀφαίρεσις δεκαδικῶν ἀριθμῶν.....	158
83. Πολλαπλασιασμός δεκαδικῶν ἀριθμῶν	159
84. Διαιρέσις δεκαδικῶν ἀριθμῶν.	160
85. Τροπὴ κλάσματος εἰς δεκαδικόν.....	162

86. Ποία ἀνάγωγα κλάσματα τρέπονται εἰς τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς	162
87. Περιοδικοί δεκαδικοί ἀριθμοί	164
88. Περί τοῦ λόγου δύο εὐθ. τμημάτων	167
89. Συμμιγεῖς ἀριθμοί	170
90. Πρόσθεσις, ἀφαίρεσις συμμιγῶν	172
91. Πολλαπλασιασμός, διαίρεσις συμμιγῶν	172

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. Φυσικά καὶ γεωμετρικά στερεά	177
2. Ἀπλᾶ γεωμετρικά στερεά	178
3. Τὰ γεωμετρικά σχήματα	179
4. Ἡ εὐθεῖα	181
5. Τὸ ἐπίπεδον	183

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

6. Ἡ ἡμιεὐθεῖα	187
7. Τὸ εὐθύγραμμον τμήμα	187
8. Ἡ τεθλασμένη γραμμὴ	188
9. Ἴσα, ἄνισα εὐθύγραμμα τμήματα	189
10. Πρόσθεσις εὐθυγράμμων τμημάτων	190
11. Ἀφαίρεσις εὐθυγράμμων τμημάτων	192
12. Γινόμενον εὐθ. τμήματος ἐπὶ φυσικὸν ἀριθμὸν	193
13. Μέτρησις εὐθυγράμμων τμημάτων	193
14. Τὸ ἡμιεπίπεδον	195
15. Ἡ γωνία	196
16. Ἴσαι ἄνισοι γωνίαι	198
17. Πρόσθεσις γωνιῶν	200
18. Ἀφαίρεσις γωνιῶν	201

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

19. Ἡ συμμετρία ὡς πρὸς εὐθείαν	203
20. Εὐθεῖαι κάθετοι. Ὁρθὴ γωνία	204
21. Ἀξιοσημείωτοι κατασκευαί	205
22. Συμμετρικὸν σχήματος ὡς πρὸς εὐθείαν	207
23. Συμμετρικά ἀπλῶν σχημάτων	208
24. Ἄξων συμμετρίας	212
25. Χαρακτηριστικὴ ἰδιότης τῆς μεσοκαθέτου	214
26. Συμμετρία μεταξὺ δύο καθέτων εὐθειῶν	215
27. Ὁξεῖαι, ἀμβλείαι γωνίαι	216
28. Συμπληρωματικαί, παραπληρωματικαί, κατὰ κορυφὴν γωνίαι	217
29. Μέτρησις γωνιῶν	218
30. Ὁ κύκλος	220
31. Ἰδιότητες διαμέτρου	221
32. Ἰσότης κύκλων, τόξων	221
33. Ἀθροισμα, διαφορά τόξων ἴσων κύκλων	223
34. Ἐπίκεντρος γωνία, ἀντίστοιχον τόξον	224

	Σελίς
35. Ίσα τόξα. Ίσαι χορδαί.....	225
36. Μέτρησις τόξων.....	225
37. Σχετικά θέσεις εϋθείας καί κύκλου.....	227
38. Σχετικά θέσεις δύο κύκλων.....	229
39. Γεωμετρικά κατασκευαί.....	231
40. Κύκλοι διερχόμενοι διά δύο σημείων.....	233
41. Ἡ συμμετρία ὡς πρὸς σημείον εἰς τὸ ἐπίπεδον Σ (κεντρικὴ συμμετρία).....	234
42. Συμμετρικὸν σχήματος ὡς πρὸς σημείον.....	235
43. Συμμετρικὰ σχημάτων τινῶν εἰς τὴν $\Sigma(\sigma)$	236
44. Κέντρον συμμετρίας σχήματος.....	239
45. Εϋθεῖαι παράλληλοι.....	240
46. Παράλληλος ἀπὸ σημείου πρὸς εϋθεῖαν.....	240
47. Εὐκλείδειον αἴτημα.....	241
48. Κέντρα συμμετρίας δύο παραλλήλων.....	241
49. Γωνία σχηματιζόμενα ὑπὸ δύο εϋθειῶν καὶ μιᾶς ἄλλης τεμνοῦσης αὐτάς.....	242
50. Γωνία σχηματιζόμενα ὑπὸ παραλλήλων καὶ μιᾶς τεμνοῦσης αὐτάς.....	243
51. Γωνίσματα παραλλήλων εϋθειῶν.....	244
52. Ἐφαρμογαί.....	244

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

53. Τὸ τρίγωνον.....	246
54. Δευτερεύοντα στοιχεῖα τριγώνου.....	247
55. Ἄνισοτικά σχέσεις μεταξὺ τῶν πλευρῶν τριγώνου.....	247
56. Εἶδη τριγῶνων.....	248
57. Τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον.....	250
58. Τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον.....	253
59. Γραφικά ἐφαρμογαί.....	253
60. Ἄθροισμα γωνιῶν τριγώνου.....	254
61. Ἐφαρμογαί.....	254
62. Ἄθροισμα γωνιῶν κυρτοῦ πολυγώνου.....	256
63. Τετράπλευρα.....	257
64. Παραλληλόγραμμα.....	257
65. Ἰδιότητες παραλληλογράμμων.....	257
66. Ὄρθογώνιον παραλληλόγραμμον.....	260
67. Μία σπουδαία ἐφαρμογή.....	261
68. Ρόμβος.....	262
69. Τετράγωνον.....	263
70. Τραπεζίον.....	264
71. Ἰσότης τριγῶνων.....	265
72. 1ον Κριτήριον ἰσότητος τριγῶνων.....	266
73. Ἐφαρμογή.....	267
74. 2ον Κριτήριον ἰσότητος τριγῶνων.....	267
75. 3ον Κριτήριον ἰσότητος τριγῶνων.....	268
76. Κριτήρια ἰσότητος ὀρθογωνίων τριγῶνων.....	269
77. Γεωμετρικά κατασκευαί τριγῶνων.....	272
78. Χαρακτηριστικὴ ἰδιότης τῆς διχοτόμου.....	273
79. Κύκλοι ἐφαπτόμενοι δύο εϋθειῶν.....	274

Τὰ αντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιοσήμον, εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

Ἐπίτιτον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον. Ὁ διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιοῶν αὐτὸ διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 7 τοῦ Νόμου 1129 τῆς 15)21 Μαρτίου 1946 (Ἐφ. Κυβ. 1946, Α' 108).



0020557194
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ Γ', 1971 (VI) - ΑΝΤΙΤΥΠΑ 127.000 - ΣΥΜΒΑΣΙΣ 2110/10.4.71
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: ΕΝΩΣΙΣ ΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ

