

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ' Γ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Ε. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1974

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

002
ΚΛΣ
ΣΤ2Β
1244

ΣΤ

89

ΣΧΒ

Πουθατζιαντζαυτζου, Ε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ



002
402
2798
7944

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΡΙΤΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΔΩΡΗΣΑΤΟ
Οργαν. Ενώ. Διοχ. βιβλίων
αδς. αριθ. εισαγ. *846* του έτους 1975

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

1. Όρισμοί — βασικαί έννοιαι

1.1. Γνωρίζομεν εκ τῆς Ἀλγέβρας τὸν ὀρισμὸν μιᾶς ἀλγεβρικῆς ἐξισώσεως ὡς πρὸς χ , $A(\chi) = B(\chi)$, ὅπου A καὶ B εἶναι συναρτήσεις μιᾶς μεταβλητῆς (ἀγνώστου) χ . Ἐὰν ἐν τοῦλάχιστον τῶν μελῶν τῆς ἀνωτέρω ἐξισώσεως, περιέχη τὴν τιμὴν μιᾶς ἢ περισσοτέρων τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων¹ εἰς τὴν θέσιν $\varphi(\chi)$, ὅπου φ τυχούσα συνάρτησις τῆς αὐτῆς πραγματικῆς μεταβλητῆς χ , τότε ἡ ἐξίσωσις αὕτη καλεῖται **τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις** ὡς πρὸς χ . Π.χ. αἱ ἐξισώσεις:

$$\eta\mu^2\chi + \sigma\upsilon\nu\chi = 2, \quad \sigma\upsilon\nu 5\chi = -\frac{1}{2}, \quad \epsilon\varphi(\sigma\upsilon\nu\chi) = \sigma\varphi(\eta\mu\chi), \quad (1)$$

$$\epsilon\varphi\chi = \chi, \quad \eta\mu^2\chi + \sigma\upsilon\nu^2\chi = 1 \quad (2)$$

εἶναι τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις.

Κάθε τόξον χ_0 , τὸ ὁποῖον ἐπαληθεύει μίαν τριγωνομετρικὴν ἐξίσωσιν, ἦτοι καθιστᾷ ταύτην ἰσότητα, καλεῖται **μερικὴ λύσις** αὐτῆς (π.χ. τὸ τόξον

$\chi_0 = \frac{2\pi}{15}$ εἶναι μία μερικὴ λύσις τῆς δευτέρας εκ τῶν ἐξισώσεων (1)). Τὸ σύνολον

τῶν μερικῶν λύσεων μιᾶς τριγωνομετρικῆς ἐξισώσεως καλεῖται **γενικὴ λύσις** ἢ ἀπλῶς **λύσις**, ἡ δὲ εὐρεσις τῆς γενικῆς λύσεως καλεῖται **ἐπίλυσις** τῆς τριγωνομετρικῆς ἐξισώσεως.

Ἐὰν κάθε τόξον χ εἶναι λύσις (μερικὴ) μιᾶς τριγωνομετρικῆς ἐξισώσεως,

¹ Λέγοντες «τριγωνομετρικαὶ συναρτήσεις», ἐννοοῦμεν ἐνταῦθα, ἐκτὸς τῶν συναρτήσεων $\eta\mu$, $\sigma\upsilon\nu$, $\epsilon\varphi$, $\sigma\varphi$ καὶ τὰς ἀντιστρόφους αὐτῶν, ὡς ὀρίζονται εἰς τὸ Κεφ. V. Ἐπίσης, ὑπενθυμίζομεν ὅτι οἱ γνωστοὶ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ $\eta\mu\chi$, $\sigma\upsilon\nu\chi$, $\epsilon\varphi\chi$ καὶ $\sigma\varphi\chi$ εἶναι ἀκριβῶς αἱ τιμαὶ τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων $\eta\mu$, $\sigma\upsilon\nu$, $\epsilon\varphi$ καὶ $\sigma\varphi$ ἀντιστοίχως εἰς τὸ σημεῖον $\chi \in \mathbb{R}$.

Ἡ ἀνεξάρτητος μεταβλητὴ (ἢ, ὡς ἄλλως λέγομεν εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν, τὸ τόξον) τῶν τοιούτων συναρτήσεων, εἶναι πραγματικὸς ἀριθμὸς. Ἐφ' ἐξῆς δέ, πάντα τὰ χρησιμοποιούμενα τόξα θὰ θεωροῦνται ὅτι ἔχουν μετρηθῆ με μονάδα τὸ ἀκτίδιον.

τότε η εξίσωσις αὕτη εἶναι τριγωνομετρικὴ ταυτότης (π.χ. ἡ τελευταία ἐκ τῶν (2)).

Εἶναι δυνατὸν ἐπίσης, οὐδὲν τόξον νὰ ἐπαληθεύη μίαν τριγωνομετρικὴν ἐξίσωσιν, ὁπότε αὕτη καλεῖται ἀδύνατος (π.χ. ἡ ἐξίσωσις $\eta\mu\chi = 2$).

Ἡ ἐπίλυσις οἰασδήποτε τριγωνομετρικῆς ἐξισώσεως στηρίζεται ἐπὶ τεσσάρων βασικῶν θεωρημάτων, τὰ ὁποῖα διατυποῦνται συντόμως ὑπὸ τῶν κάτωθι ἰσοδυναμιῶν:

$$(I) \eta\mu\chi = \eta\mu\psi \iff \chi = \rho\pi + (-1)^\rho \psi \iff \begin{cases} \chi = 2k\pi + \psi \text{ ἢ} \\ \chi = (2k+1)\pi - \psi \end{cases} \quad (k, \rho \in \mathbb{Z})$$

$$(II) \sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu\psi \iff \begin{cases} \chi = 2k\pi + \psi \text{ ἢ} \\ \chi = 2k\pi - \psi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$(III) \epsilon\phi\chi = \epsilon\phi\psi \iff \chi = k\pi + \psi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$(IV) \sigma\phi\chi = \sigma\phi\psi \iff \chi = k\pi + \psi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Ἐπιλύομεν καὶ διερευνῶμεν κατωτέρω ὠρισμένης κλασσικῆς μορφῆς τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων, εἰς τὰς ὁποῖας ἀνάγεται, ἐν γένει, κάθε ἄλλη τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις.

2. Θεμελιώδεις τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις

2.1. $\eta\mu\chi = \alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$). Πρὸς ἐπίλυσιν τῆς ἐξισώσεως ταύτης, παρατηροῦμεν, ὅτι:

α) Ἐὰν $|\alpha| > 1$ ($\iff \alpha > 1$ ἢ $\alpha < -1$), ἡ ἐξίσωσις εἶναι ἀδύνατος, διότι $|\eta\mu\chi| \leq 1$ διὰ κάθε $\chi \in \mathbb{R}$.

β) Ἐὰν $|\alpha| \leq 1$ ($\iff -1 \leq \alpha \leq 1$), τότε ἡ ἐξίσωσις ἔχει λύσιν, τὴν ὁποῖαν προσδιορίζομεν ὡς ἑξῆς:

β₁) Ἐὰν $0 \leq \alpha \leq 1$, τότε ὑπάρχει τόξον φ (εὐρισκόμενον διὰ τῶν πινάκων) μὲ

$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ καὶ τοιοῦτον, ὥστε $\eta\mu\varphi = \alpha$, ὁπότε ἡ ἐξίσωσις γράφεται:

$$\eta\mu\chi = \eta\mu\varphi \quad (1)$$

Προφανῶς τὸ φ εἶναι μίαν μερικὴν λύσιν τῆς (1). Ἐν συνεχείᾳ, χρησιμοποιοῦντες τὴν ἀνωτέρω ἰσοδυναμίαν (1), εὐρίσκομεν τὴν γενικὴν λύσιν τῆς (1), ἡ ὁποῖα εἶναι:

$$\chi = k\pi + (-1)^k \varphi \quad (k \in \mathbb{Z}) \iff \begin{cases} \chi = 2\lambda\pi + \varphi \\ \chi = (2\rho + 1)\pi - \varphi \end{cases} \quad (\lambda, \rho \in \mathbb{Z}) \quad (2)$$

Παρατηροῦμεν, μέσω τοῦ τύπου (2), ὅτι εἰς κάθε τιμὴν τοῦ ἀκεραίου k ἀντιστοιχεῖ καὶ μίαν λύσιν (μερικὴ) τῆς ἐξισώσεως (1). Ἐπὶ παραδείγματι, διὰ $k = 0$, εὐρίσκομεν τὴν μερικὴν λύσιν $\chi = \varphi$.

β₂) Ἐὰν $-1 \leq \alpha < 0$, τότε μετασχηματίζομεν ἰσοδυναμῶς τὴν πρὸς ἐπίλυσιν ἐξίσωσιν, ὡς κάτωθι:

$$\eta\mu\chi = \alpha \iff -\eta\mu\chi = -\alpha \iff \eta\mu(-\chi) = -\alpha$$

Εἰς τὴν τελευταίαν ὁμως ἐξίσωσιν εἶναι $0 < -\alpha \leq 1$ καὶ συνεπῶς, ἐὰν θεω-

ρήσωμεν άγνωστον τόξον τὸ $-\chi$, ἡ ἐξίσωσις αὐτὴ εἶναι τῆς προηγουμένης μορφῆς (περίπτωσης β_1) καὶ ἐπιλύεται ἀναλόγως.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῆ ἡ ἐξίσωσις: $\eta\mu 3\chi = -\frac{1}{2}$ καὶ νὰ εὑρεθῆ ἐκ τῶν μερικῶν λύσεων αὐτῆς, ἡ ἐλαχίστη θετικὴ.

Ἐπίλυσις: Ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις γράφεται: $\eta\mu 3\chi = \eta\mu\left(-\frac{\pi}{6}\right)$. Ἡ γενικὴ λύσις αὐτῆς δίδεται ὑπὸ τῶν τύπων:

$$\left. \begin{aligned} 3\chi_k &= 2k\pi - \frac{\pi}{6} & (k \in \mathbb{Z}) \\ 3\chi_\rho &= (2\rho + 1)\pi + \frac{\pi}{6} & (\rho \in \mathbb{Z}) \end{aligned} \right\} \iff \left\{ \begin{aligned} \chi_k &= \frac{2k\pi}{3} - \frac{\pi}{18} & (k \in \mathbb{Z}) & (1) \\ \chi_\rho &= \frac{2\rho\pi}{3} + \frac{7\pi}{18} & (\rho \in \mathbb{Z}) & (2) \end{aligned} \right.$$

Ἐξετάζομεν κατ' ἀρχὴν, ποῖα ἐκ τῶν εὑρεθεισῶν λύσεων εἶναι θετικά. Ἴνα αἱ λύσεις εἶναι θετικά, πρέπει καὶ ἀρκεῖ:

$$\left\{ \frac{2k\pi}{3} - \frac{\pi}{18} > 0 \text{ καὶ } \frac{2\rho\pi}{3} + \frac{7\pi}{18} > 0 \right\} \iff \left\{ k > \frac{1}{12} \text{ καὶ } \rho > -\frac{7}{12} \right\}$$

Ἄρα, διὰ $k = 1, 2, 3, \dots$ καὶ $\rho = 0, 1, 2, \dots$, λαμβάνομεν, ἐκ τῶν (1) καὶ (2) ἀντιστοίχως, θετικὰς λύσεις. Ἐπὶ πλέον παρατηροῦμεν, ὅτι:

$$\chi_{k+1} > \chi_k \quad \text{καὶ} \quad \chi_{\rho+1} > \chi_\rho, \quad \forall k, \rho \in \mathbb{Z}.$$

Ὅθεν, αἱ (1) καὶ (2) εἶναι αὐξουσαὶ συναρτήσεις ὡς πρὸς k καὶ ρ ἀντιστοίχως. Συνεπῶς, ἐκ τῶν μερικῶν λύσεων (1), ἡ ἐλαχίστη θετικὴ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν τιμὴν $k = 1$ καὶ εἶναι $\chi_1 = \frac{11\pi}{18}$.

Ὅμοιως, διὰ $\rho = 0$, εὐρίσκομεν τὴν ἐλαχίστην θετικὴν λύσιν ἐκ τῶν μερικῶν λύσεων (2), ἡ ὁποία εἶναι $\chi_0 = \frac{7\pi}{18}$. Ἄρα, ἡ ἐλαχίστη θετικὴ λύσις εἶναι $\frac{7\pi}{18}$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νὰ ἐπιλυθῆ ἡ ἐξίσωσις: $\eta\mu \frac{3\chi}{2} = -\frac{1}{2}$.

Ἐπίλυσις: Ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν $\eta\mu\left(\frac{-3\chi}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

Ἐπίσης, εἶναι γνωστόν, ὅτι $\eta\mu \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ καὶ συνεπῶς ἡ ἐξίσωσις γράφεται:

$\eta\mu\left(\frac{-3\chi}{2}\right) = \eta\mu \frac{\pi}{6}$. Ἡ γενικὴ λύσις αὐτῆς εἶναι:

$$-\frac{3\chi}{2} = k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (1)$$

Ἐκ τῆς (1), λύοντες ἀλγεβρικῶς ὡς πρὸς χ , εὐρίσκομεν:

$$\chi = -\frac{2\kappa\pi}{3} + (-1)^\kappa \left(-\frac{\pi}{9}\right) \quad (\kappa \in \mathbb{Z}) \iff \quad (2)$$

$$\chi = \frac{2\kappa\pi}{3} - (-1)^\kappa \frac{\pi}{9} \quad (\kappa \in \mathbb{Z}). \quad (3)$$

Παρατήρησις. Εἰς τὸν ἀνωτέρω τύπον (2) ἐτέθη κ ἀντὶ $-\kappa$, διότι, ἐὰν τὸ κ λαμβάνη ὅλας τὰς ἀκεραίας τιμὰς, τότε καὶ τὸ $-\kappa$ λαμβάνει ὅλας τὰς ἀκεραίας τιμὰς καὶ $(-1)^\kappa = (-1)^{-\kappa}$, ἄρα ὁ προκύπτων τύπος (3) εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὸν (2).

2.2. $\text{συν}\chi = \lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$). Ὅπως καὶ εἰς τὴν προηγουμένην θεμελιώδους μορφῆς τριγωνομετρικὴν ἐξίσωσιν, διακρίνομεν καὶ ἐν προκειμένῳ τὰς κάτωθι περιπτώσεις ὡς πρὸς τὴν παράμετρον λ :

α) Ἐὰν $|\lambda| > 1$, τότε ἡ ἐξίσωσις εἶναι ἀδύνατος.

β) Ἐὰν $0 \leq \lambda \leq 1$, τότε ὑπάρχει τόξον φ μὲ $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ καὶ τοιοῦτον, ὥστε $\text{συν}\varphi = \lambda$, ὁπότε ἡ ἐξίσωσις γράφεται:

$$\text{συν}\chi = \text{συν}\varphi. \quad (1)$$

Ἡ γενικὴ λύσις τῆς (1), βάσει τῆς ἰσοδυναμίας (II), εἶναι: $\chi = 2\kappa\pi \pm \varphi$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$).

γ) Ἐὰν $-1 \leq \lambda < 0$, τότε μετασχηματίζομεν τὴν ἐξίσωσιν (1) ὡς ἑξῆς:

$$\text{συν}\chi = \lambda \iff -\text{συν}\chi = -\lambda \iff \text{συν}(\pi - \chi) = -\lambda$$

Ἐχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὴν ἐξίσωσιν $\text{συν}(\pi - \chi) = -\lambda$ μὲ $0 < -\lambda \leq 1$ καὶ ἄγνωστον τόξον τὸ $\pi - \chi$ καὶ συνεπῶς μεταπίπτομεν εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν (β).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἐξίσωσις: $\text{συν}3\chi = \frac{1}{4}$.

Ἐπίλυσις: Εὐρίσκομεν ἐκ τῶν λογαριθμικῶν πινάκων τὸ ἐλάχιστον θετικὸν τόξον τ τοιοῦτον, ὥστε $\text{συν}\tau = \frac{1}{4}$. Πρὸς τοῦτο, λογαριθμίζομεν τὴν τελευταίαν ἰσότητα καὶ ἔχομεν:

$$\log \text{συν}\tau = \log \frac{1}{4} \Rightarrow \log \text{συν}\tau = -\log 4 \Rightarrow \log \text{συν}\tau = -1,39794 \Rightarrow \tau = 75^\circ 31' 21''$$

Συνεπῶς, ἡ γενικὴ λύσις τῆς δοθείσης ἐξισώσεως εἶναι:

$$3\chi = 360^\circ \kappa \pm 75^\circ 31' 21'' \iff \chi = 120^\circ \kappa \pm 25^\circ 10' 27'' \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$$

2.3. $\text{εφ}\chi = \lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$). Ἐὰν $\lambda \geq 0$, εὐρίσκομεν ἐκ τῶν πινάκων τόξον ω μὲ $\text{εφ}\omega = \lambda$ καὶ συνεπῶς ἡ ἐξίσωσις γράφεται:

$$\text{εφ}\chi = \text{εφ}\omega \quad (1)$$

Ἡ γενικὴ λύσις τῆς (1), βάσει τοῦ τύπου (III), εἶναι: $\chi = \kappa\pi + \omega$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$).

Ἐὰν $\lambda < 0$, τότε διαμορφώνομεν τὴν δοθείσαν ἐξίσωσιν ὡς ἑξῆς:

$$\text{εφ}\chi = \lambda \iff -\text{εφ}\chi = -\lambda \iff \text{εφ}(-\chi) = -\lambda \quad (-\lambda > 0).$$

Ούτω, ή πρὸς ἐπίλυσιν ἐξίσωσις $\epsilon\phi(-\chi) = -\lambda$ εἶναι τῆς προηγουμένης μορφῆς, με ἄγνωστον τόξον τὸ $-\chi$.

Καθ' ὁμοιον ἀκριβῶς τρόπον ἐπιλύεται καὶ ἡ ἐπομένη θεμελιώδης τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις:

2.4. $\sigma\phi\chi = a$ ($a \in \mathbf{R}$).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἐντὸς τοῦ ἀνοικτοῦ διαστήματος $\left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$

τόξα, τὰ ἐπαληθεύοντα τὴν ἐξίσωσιν $\epsilon\phi 2\chi = \sqrt{3}$.

Λύσις: Ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις γράφεται $\epsilon\phi 2\chi = \epsilon\phi \frac{\pi}{3}$. Ἡ γενικὴ λύσις αὐτῆς εἶναι:

$$2\chi = \kappa\pi + \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \chi = \frac{\kappa\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \quad (\kappa \in \mathbf{Z}).$$

Ἐξ ὑποθέσεως ὁμῶς ἔχομεν:

$$0 < \chi < \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow 0 < \frac{\kappa\pi}{2} + \frac{\pi}{6} < \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{6} < \frac{\kappa\pi}{2} < \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow -\frac{1}{3} < \kappa < \frac{7}{6}$$

Αἱ μόναι ἀκέραιαι τιμαὶ τοῦ κ ἐντὸς τοῦ διαστήματος $\left(-\frac{1}{3}, \frac{7}{6}\right)$ εἶναι 0

καὶ 1. Ἐν συνεχείᾳ, θέτοντες τὰς ἀκεραίας αὐτὰς τιμὰς τοῦ κ εἰς τὴν εὑρεθεῖσαν γενικὴν λύσιν τῆς ἐξισώσεως, εὐρίσκομεν ἀντιστοίχως δύο τόξα, $\chi_1 = \frac{\pi}{6}$ καὶ

$$\chi_2 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}, \text{ τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ τὰ ζητούμενα.}$$

Ἀναφέρομεν κατωτέρω ὠρισμένας θεμελιώδεις τριγωνομετρικὰς ἐξισώσεις καὶ τὰς λύσεις αὐτῶν:

$$\eta\mu\chi = 0 \Leftrightarrow \chi = \kappa\pi$$

$$\eta\mu\chi = 1 \Leftrightarrow \chi = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\eta\mu\chi = -1 \Leftrightarrow \chi = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}$$

$$\epsilon\phi\chi = 0 \Leftrightarrow \chi = \kappa\pi$$

$$\sigma\upsilon\nu\chi = 0 \Leftrightarrow \chi = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu\chi = 1 \Leftrightarrow \chi = 2\kappa\pi$$

$$\sigma\upsilon\nu\chi = -1 \Leftrightarrow \chi = (2\kappa + 1)\pi$$

$$\sigma\phi\chi = 0 \Leftrightarrow \chi = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$$

(Εἰς ὅλας τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις εἶναι $\kappa \in \mathbf{Z}$).

3. Τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις ἀναγόμεναι εἰς θεμελιώδεις

3.1. Τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις τῆς μορφῆς $f(t) = 0$, ἔνθα t τριγωνομετρικὸς ἀριθμὸς τοῦ τόξου χ καὶ $f(t)$ ἀκέραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς t .

Πρὸς ἐπίλυσιν μιᾶς τοιαύτης ἐξισώσεως ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς: Ἐπιλύομεν τὴν ὡς πρὸς t ἀλγεβρικὴν ἐξίσωσιν $f(t) = 0$ καὶ ἔστωσαν t_1, t_2, \dots, t_n αἱ

ρίζαι αυτής. Τότε, η τριγωνομετρική εξίσωση $f(t) = 0$ είναι ισοδύναμος με τὰς κάτωθι θεμελιώδεις τριγωνομετρικὰς εξισώσεις:

$$t = t_1, t = t_2, \dots, t = t_n,$$

αί ὁποῖα ἐπιλύονται εὐκόλως καί αἱ λύσεις αὐτῶν εἶναι ἡ γενική λύσις τῆς $f(t) = 0$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νά λυθῆ ἡ εξίσωση: $\eta\mu^3\chi + 2\eta\mu^2\chi - \eta\mu\chi - 2 = 0$.

Λύσις : Ἡ δοθεῖσα εξίσωση ἰσοδυναμῶς γράφεται:

$$(\eta\mu^3\chi - \eta\mu\chi) + 2(\eta\mu^2\chi - 1) = 0 \iff \eta\mu\chi(\eta\mu^2\chi - 1) + 2(\eta\mu^2\chi - 1) = 0 \iff$$

$$\iff (\eta\mu\chi + 2)(\eta\mu\chi - 1)(\eta\mu\chi + 1) = 0 \iff \begin{cases} \eta\mu\chi = -2 & (\alpha) \\ \eta\mu\chi = 1 & (\beta) \\ \eta\mu\chi = -1 & (\gamma) \end{cases}$$

Ἡ εξίσωση (α) εἶναι ἀδύνατος, αἱ λύσεις τῶν (β) καί (γ) εἶναι ἀντιστοίχως $\chi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ καί $\chi = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Παρατήρησις. Ἡ διερεύνησις μιᾶς τριγωνομετρικῆς εξίσωσης $f(t) = 0$, τῆς προηγουμένης μορφῆς, ἀνάγεται ἐν γένει εἰς τὴν διερεύνησιν τῆς ἀντιστοίχου ὡς πρὸς t ἀλγεβρικῆς εξίσωσης $f(t) = 0$, λαμβανομένων ἐπὶ πλέον ὑπ' ὄψιν τῶν ὁρίων μεταβολῆς τοῦ τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ t .

Π.χ. ἡ εξίσωση $\alpha\epsilon\phi^2\chi + \beta\epsilon\phi\chi + \gamma = 0$ ($\alpha \neq 0$) ἢ $\alpha\sigma\phi^2\chi + \beta\sigma\phi\chi + \gamma = 0$ ($\alpha \neq 0$) ἔχει πάντοτε λύσιν, ἐφ' ὅσον $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0$, ὅπου Δ ἡ διακρίνουσα τῆς δευτεροβαθμίου (ὡς πρὸς t) εξίσωσης $\alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0$. Ἡ διερεύνησις τῆς $\alpha\eta\mu^2\chi + \beta\eta\mu\chi + \gamma = 0$ ($\alpha \neq 0$) ἢ $\alpha\sigma\eta\mu^2\chi + \beta\sigma\eta\mu\chi + \gamma = 0$ ($\alpha \neq 0$) ἀνάγεται εἰς τὴν διερεύνησιν τῆς ἀντιστοίχου ἀλγεβρικῆς εξίσωσης $\alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0$ μὲ $-1 \leq t \leq 1$ (διότι ἐτέθη $\eta\mu\chi = t$ ἢ $\sigma\eta\mu\chi = t$).

Πρὸς πληρεστέραν κατανόησιν τῆς ἀνωτέρω παρατηρήσεως ἀναφέρομεν τὰ ἐπόμενα δύο παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νά ἐπιλυθῆ ἡ εξίσωση: $\alpha\eta\mu^2\chi + \beta\eta\mu\chi + \gamma = 0$, $\alpha \neq 0$. (1)

Ἐπίλυσις : Θέτοντες $\eta\mu\chi = t$, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὴν ἀλγεβρικὴν εξίσωσιν

$$f(t) = \alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0 \quad (-1 \leq t \leq 1). \quad (2)$$

Ἐστῶσαν t_1 καί t_2 αἱ ρίζαι αὐτῆς. Διὰ νὰ εἶναι αἱ ρίζαι αὗται δεκταί, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εὐρίσκωνται ἐντὸς τοῦ κλειστοῦ διαστήματος $[-1, +1]$. Ἐνδιαφερόμεθα ὅμως, νὰ εὕρωμεν ὑπὸ ποίας ἀναγκαίας καὶ ἰκανᾶς συνθήκας μεταξὺ τῶν α , β καὶ γ συμβαίνει τοῦτο. Σχετικῶς διακρίνομεν τὰς ἀκολουθοῦσας περιπτώσεις.

1) Ἡ εξίσωση (2) ἔχει **μίαν μόνον δεκτὴν ρίζαν** εἰς τὰς ἐξῆς περιπτώσεις:

1_α) Μία καὶ μόνον ρίζα τῆς (2) εὐρίσκεται ἐντὸς τοῦ ἀνοικτοῦ διαστήματος $(-1, +1)$. Πρὸς τοῦτο, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι:

$$f(+1)f(-1) < 0 \iff (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha - \beta + \gamma) < 0.$$

1_β) 'Η μία ρίζα είναι τὸ -1 καὶ ἡ ἄλλη κεῖται ἐκτὸς τοῦ διαστήματος [-1, +1].
 Τοῦτο ἰσχύει, ὅταν καὶ μόνον ὅταν:

$$\left(f(-1) = 0, \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1 \right) \Leftrightarrow \left(\alpha - \beta + \gamma = 0, \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1 \right)$$

Διότι, ἐὰν $t_1 = -1$, τότε, ἐπειδὴ καὶ $t_1 t_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$, συνάγεται $t_2 = -\frac{\gamma}{\alpha}$. Συνε-

πῶς, ἡ ρίζα $t_2 = -\frac{\gamma}{\alpha}$ εἶναι ἐκτὸς τοῦ διαστήματος [-1, +1], ἐφ' ὅσον $\left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1$.

1_γ) 'Η μία ρίζα εἶναι τὸ 1 καὶ ἡ ἄλλη κεῖται ἐκτὸς τοῦ διαστήματος [-1, +1].
 Πρὸς τοῦτο, πρέπει νὰ ἀρκεῖ νὰ εἶναι:

$$\left(f(+1) = 0, \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1 \right) \Leftrightarrow \left(\alpha + \beta + \gamma = 0, \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right| > 1 \right)$$

2) 'Η ἐξίσωσις (2) ἔχει δύο δεκτὰς ρίζας εἰς τὰς ἐξῆς περιπτώσεις:

2_α) Αἱ δύο ρίζαι τῆς (2) εὐρίσκονται ἐντὸς τοῦ διαστήματος [-1, +1]. Εἰς τὴν περιπτώσιν αὐτὴν αἱ ἀναγκαῖαι καὶ ἰκαναὶ συνθῆκαι εἶναι:

$$\left(\Delta > 0, \alpha f(-1) \geq 0, \alpha f(+1) \geq 0, -1 + \frac{\beta}{2\alpha} < 0, 1 + \frac{\beta}{2\alpha} > 0 \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0, \alpha(\alpha - \beta + \gamma) \geq 0, \alpha(\alpha + \beta + \gamma) \geq 0, -1 + \frac{\beta}{2\alpha} < 0, 1 + \frac{\beta}{2\alpha} > 0 \right)$$

2_β) 'Η ἐξίσωσις (2) ἔχει διπλὴν ρίζαν ἐντὸς τοῦ διαστήματος [-1, +1]. Πρὸς τοῦτο, πρέπει καὶ ἀρκεῖ:

$$\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0 \text{ καὶ } -1 \leq -\frac{\beta}{2\alpha} \leq +1$$

3) 'Η ἐξίσωσις (2) οὐδεμίαν ἔχει λύσιν εἰς τὰς ἐξῆς περιπτώσεις:

3_α) Αἱ ρίζαι τῆς (2) εἶναι μιγαδικαὶ $\Leftrightarrow \Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$.

3_β) Αἱ ρίζαι τῆς (2) εἶναι πραγματικαὶ καὶ κεῖνται ἐκτὸς τοῦ διαστήματος [-1, +1]. Αἱ ἀναγκαῖαι καὶ ἰκαναὶ συνθῆκαι πρὸς τοῦτο, εἶναι:

$$[\alpha f(-1) < 0, \alpha f(+1) < 0] \Leftrightarrow [\alpha(\alpha - \beta + \gamma) < 0, \alpha(\alpha + \beta + \gamma) < 0] \text{ ἢ}$$

$$\left(\Delta \geq 0, \alpha f(+1) > 0, 1 + \frac{\beta}{2\alpha} < 0 \right) \Leftrightarrow \left(\beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0, \alpha(\alpha + \beta + \gamma) > 0, 1 + \frac{\beta}{2\alpha} < 0 \right)$$

$$\left(\Delta \geq 0, \alpha f(-1) > 0, -1 + \frac{\beta}{2\alpha} > 0 \right) \Leftrightarrow \left(\beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0, \alpha(\alpha - \beta + \gamma) > 0, -1 + \frac{\beta}{2\alpha} > 0 \right)$$

Καθ' ὅμοιον ἀκριβῶς τρόπον ἐπιλύεται καὶ διερευνᾶται ἡ ἐξίσωσις
 $\alpha \text{ συν}\chi^2 + \beta \text{ συν}\chi + \gamma = 0 \quad (\alpha \neq 0)$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. Διὰ ποίας τιμὰς τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ ἡ ἐξίσωσις $\epsilon\phi\chi^2 + \lambda\epsilon\phi\chi + 1 = 0$
 ἔχει μίαν μόνον λύσιν, πληροῦσαν τὴν σχέσιν $0 < \chi < \frac{\pi}{4}$.

Λύσις: Ἐκ τῆς δεδομένης σχέσεως: $0 < \chi < \frac{\pi}{4}$ συνάγεται $\epsilon\phi 0 < \epsilon\phi\chi < \epsilon\phi \frac{\pi}{4}$ καὶ

συνεπῶς $0 < \epsilon\phi\chi < 1$. Θέτομεν $\epsilon\phi\chi = t$ καὶ ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις γράφεται :

$$\varphi(t) = t^2 + \lambda t + 1 = 0 \quad \text{μὲ } 0 < t < 1. \quad (1)$$

*Απαιτοῦμεν ἡ ἐξίσωσις (1) νὰ ἔχη μίαν μόνον δεκτὴν ρίζαν, ἥτοι, μίαν μόνον ρίζαν ἐντὸς τοῦ διαστήματος $(0, +1)$. Πρὸς τοῦτο, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι:

$$\varphi(0)\varphi(1) < 0 \iff 1 \cdot (\lambda + 2) < 0 \iff \lambda < -2.$$

*Αρα, διὰ $\lambda < -2$, ἡ ἐξίσωσις $\epsilon\phi^2\chi + \lambda\epsilon\phi\chi + 1 = 0$ ἔχει μίαν μόνον λύσιν ἐντὸς τοῦ διαστήματος $(0, \frac{\pi}{4})$.

3.2. Τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις μὲ περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἄγνωστα τόξα. Θεωροῦντες ἀλγεβρικές ἐξισώσεις περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς ἄγνωστων, εἶναι δυνατόν, νὰ ἐπεκτείνωμεν τὸν ὅρισμὸν τῆς τριγωνομετρικῆς ἐξισώσεως 1.1 καὶ εἰς τριγωνομετρικὰς ἐξισώσεις περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς ἄγνωστων τόξων. Π.χ. αἱ ἐξισώσεις

$$\eta\mu(\chi + \psi) + \eta\mu(\chi - \psi) = 2, \quad \epsilon\phi 2\chi = \epsilon\phi\psi, \quad \sigma\upsilon\nu 3\chi = \eta\mu(\psi + \frac{\pi}{4})$$

εἶναι τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις δύο ἄγνωστων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἐξίσωσις: $\eta\mu\psi = \sigma\upsilon\nu 2\chi$ (E).

*Ἐπίλυσις: Αὕτη γράφεται $\sigma\upsilon\nu(\frac{\pi}{2} - \psi) = \sigma\upsilon\nu 2\chi$ καὶ εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὰς κάτωθι δύο οἰκογενεῖας ἀλγεβρικῶν ἐξισώσεων:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\pi}{2} - \psi &= 2\kappa\pi + 2\chi, \quad \kappa \in \mathbb{Z} \\ \frac{\pi}{2} - \psi &= 2\kappa\pi - 2\chi, \quad \kappa \in \mathbb{Z} \end{aligned} \right\} \iff \left\{ \begin{aligned} \psi &= \frac{\pi}{2} - 2\chi - 2\kappa\pi & (1) \\ \psi &= \frac{\pi}{2} + 2\chi - 2\kappa\pi & (2) \end{aligned} \right. \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$$

*Ὡστε, ἡ γενικὴ λύσις τῆς (E) εἶναι:

$$\{(\chi, \psi) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \chi \in \mathbb{R}, \psi = \frac{\pi}{2} - 2\chi - 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}\} \cup$$

$$\{(\chi, \psi) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \chi \in \mathbb{R}, \psi = \frac{\pi}{2} + 2\chi - 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}\}$$

*Ἡ (1) παριστᾶ εἰς ὀρθογώνιον σύστημα ἀξόνων μίαν οἰκογένειαν παραλλήλων εὐθειῶν, ὅταν ὁ κ διατρέχη τὸ \mathbb{Z} . Ὁμοίως καὶ ἡ (2) παριστᾶ μίαν οἰκογένειαν παραλλήλων εὐθειῶν (νὰ γίνη γραφικὴ παράστασις τῶν δύο τούτων οἰκογενειῶν παραλλήλων εὐθειῶν).

3.3. Ὁμογενὴς τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις ὡς πρὸς $\eta\mu\chi$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\chi$. Οὕτω καλεῖται πᾶσα ἐξίσωσις τῆς μορφῆς $\varphi(\eta\mu\chi, \sigma\upsilon\nu\chi) = 0$, ὅπου τὸ πρῶτον μέλος αὐτῆς εἶναι ἀκέραιον ὁμογενὲς πολυώνυμον ὡς πρὸς $\eta\mu\chi$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\chi$. Π.χ. αἱ ἐξισώσεις:

$\eta\mu^2\chi + 3\sigma\upsilon\nu^2\chi - 2\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi = 0$, $\eta\mu^3\chi + \sigma\upsilon\nu^3\chi + \eta\mu^2\chi\sigma\upsilon\nu\chi - 3\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu^2\chi = 0$
 είναι όμογενείς τριγωνομετρικοί εξισώσεις.

Πρός επίλυσιν μιᾶς τοιαύτης εξίσωσης, διαιρούμεν ἐν γένει (ἐφ ὅσον τοῦ-
 το εἶναι δυνατὸν, δηλαδή $\chi \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$) ἀμφότερα τὰ μέλη αὐτῆς μὲ $\sigma\upsilon\nu^k \chi$,
 ὅπου κ ὁ βαθμὸς ὁμογενείας, ὅποτε προκύπτει ἀλγεβρική εξίσωσις ὡς πρὸς $\epsilon\phi\chi$
 καὶ συνεπιῶς μεταπίπτομεν εἰς τὴν προηγουμένην κατηγορίαν τριγωνομετρικῶν
 εξισώσεων. Δηλαδή, ἐὰν ἡ ὁμογενὴς τριγωνομετρικὴ εξίσωσις $\varphi(\eta\mu\chi, \sigma\upsilon\nu\chi) = 0$
 ἔχει βαθμὸν ὁμογενείας $\kappa \in \mathbb{N}$, τότε αὕτη γράφεται $\sigma\upsilon\nu^k \chi f(\epsilon\phi\chi) = 0$, ($\sigma\upsilon\nu\chi \neq 0$),
 ὅποτε ἔχομεν νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν εξίσωσιν $f(\epsilon\phi\chi) = 0$, ὅπου $f(\epsilon\phi\chi)$ εἶναι ἀκέ-
 ραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς $\epsilon\phi\chi$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ εξίσωσις: $\eta\mu^2\chi - (1 + \sqrt{3})\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi + \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu^2\chi = 0$

Ἐπίλυσις: Ἐὰν $\sigma\upsilon\nu\chi = 0$, ἡ δοθεῖσα εξίσωσις δίδει $\eta\mu\chi = 0$, τὸ ὅποιον
 εἶναι ἀδύνατον¹. Ἄρα, ὑποθέτοντες $\sigma\upsilon\nu\chi \neq 0$ καὶ διαιρούντες ἀμφότερα τὰ
 μέλη τῆς (1) μὲ $\sigma\upsilon\nu^2\chi$, λαμβάνομεν $\epsilon\phi^2\chi - (1 + \sqrt{3})\epsilon\phi\chi + \sqrt{3} = 0$. Αἱ ρίζαι τῆς δευ-
 τεροβαθμίου (ὡς πρὸς $\epsilon\phi\chi$) αὐτῆς εξίσώσεως εἶναι 1 καὶ 3 καὶ συνεπιῶς ἔχομεν:

$$(1) \iff \begin{cases} \epsilon\phi\chi = 1 & (2) \\ \epsilon\phi\chi = \sqrt{3} & (3) \end{cases}$$

Ἡ γενικὴ λύσις τῆς (2) εἶναι $\{\chi \in \mathbb{R} : \chi = \kappa\pi + \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}\}$, ἡ δὲ γενικὴ λύσις τῆς

(3) εἶναι $\{\chi \in \mathbb{R} : \chi = \rho\pi + \frac{\pi}{3}, \rho \in \mathbb{Z}\}$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ εξίσωσις: $\alpha\eta\mu^2\chi + \beta\sigma\upsilon\nu^2\chi + \gamma\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi = \delta$

Ἐπίλυσις: Ἡ δοθεῖσα εξίσωσις γράφεται: $\alpha\eta\mu^2\chi + \beta\sigma\upsilon\nu^2\chi + \gamma\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi = \delta$
 $\delta(\eta\mu^2\chi + \sigma\upsilon\nu^2\chi)$ καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνομεν:

$$(\alpha - \delta)\eta\mu^2\chi + (\beta - \delta)\sigma\upsilon\nu^2\chi + \gamma\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi = 0 \quad (1)$$

Ἡ εξίσωσις (1) εἶναι μία δευτεροβάθμιος ὁμογενὴς τριγωνομετρικὴ εξίσωσις.
 Πρὸς επίλυσιν ταύτης διακρίνομεν τὰς κάτωθι περιπτώσεις:

1) Ἐὰν $\alpha \neq \delta$, τότε $\sigma\upsilon\nu\chi \neq 0$, διότι, ἐὰν $\sigma\upsilon\nu\chi = 0$, ἡ εξίσωσις (1) γράφεται
 $(\alpha - \delta)\eta\mu^2\chi = 0$ καὶ ἐπειδὴ $\alpha - \delta \neq 0$, προκύπτει $\eta\mu\chi = 0$, ὅπερ ἄτοπον.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν διαιρούμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) μὲ $\sigma\upsilon\nu^2\chi$
 καὶ λαμβάνομεν τὴν εξίσωσιν:

$$(\alpha - \delta)\epsilon\phi^2\chi + \gamma\epsilon\phi\chi + \beta - \delta = 0, \quad (2)$$

ἡ ὁποία εἶναι ἀλγεβρική ὡς πρὸς $\epsilon\phi\chi$ καὶ ἔχει λύσιν, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν,
 $\gamma^2 - 4(\alpha - \delta)(\beta - \delta) \geq 0$.

¹ Τοῦτο σημαίνει, ὅτι αἱ λύσεις τῆς εξίσώσεως $\sigma\upsilon\nu\chi = 0$ δὲν εἶναι λύσεις τῆς (1) καὶ συνε-
 πιῶς, ὑποθέτοντες $\sigma\upsilon\nu\chi \neq 0$ δὲν περιορίζομεν τὰς λύσεις τῆς (1), ἤτοι δὲν ἔχομεν ἀπώλειαν ριζῶν.

2) 'Εάν $\alpha = \delta$, ή εξίσωσις (1) γράφεται:

$$(\beta - \delta)\text{συν}^2\chi + \gamma\eta\mu\chi\text{συν}\chi = 0 \iff \text{συν}\chi\{(\beta - \delta)\text{συν}\chi + \gamma\eta\mu\chi\} = 0 \iff$$

$$\begin{cases} \text{συν}\chi = 0 & (\alpha) \\ (\beta - \delta)\text{συν}\chi + \gamma\eta\mu\chi = 0 & (\beta) \end{cases}$$

'Η γενική λύσις τῆς (α) εἶναι $\chi = 2κπ \pm \frac{\pi}{2}$ ($κ \in \mathbb{Z}$)

Λύσις τῆς (β). 'Η εξίσωσις αὕτη εἶναι μία πρωτοβάθμιος ὁμογενῆς τριγωνομετρική εξίσωσις καί διακρίνομεν διὰ τὴν λύσιν αὐτῆς τὰς κάτωθι περιπτώσεις:

2_α) 'Εάν $\gamma \neq 0$, τότε $\text{συν}\chi \neq 0$, ὁπότε διαιροῦντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (β) με $\text{συν}\chi$, εὐρίσκομεν $\gamma\epsilon\phi\chi + \beta - \delta = 0$ ἢ $\epsilon\phi\chi = \frac{\delta - \beta}{\gamma}$, ἡ ὁποία ἐπιλύεται εὐκόλως.

2_β) 'Εάν $\gamma = 0$, ἡ (β) γράφεται $(\beta - \delta)\text{συν}\chi = 0$ καί ἐάν μὲν $\beta = \delta$, αὕτη εἶναι ἄοριστος, ἤτοι ἐπαληθεύεται διὰ κάθε $\chi \in \mathbb{R}$, ἐάν δὲ $\beta \neq \delta$, τότε εἶναι ἰσοδύναμος με τὴν $\text{συν}\chi = 0$, τῆς ὁποίας ἡ γενική λύσις εἶναι:

$$\chi = κπ + \frac{\pi}{2} \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$$

Παρατήρησις. 'Η προηγουμένη εξίσωσις (1) εἶναι δυνατόν νὰ ἐπιλυθῆ καί κατ' ἄλλοις τρόποι, δι' ἐφαρμογῆς τῶν τύπων ὑποβιβασμοῦ (ἢ ἀποτετραγωνισμοῦ). Βάσει τῶν τύπων τούτων, αὕτη γράφεται:

$$(\alpha - \delta)\frac{1 - \text{συν}2\chi}{2} + (\beta - \delta)\frac{1 + \text{συν}2\chi}{2} + \frac{\gamma\eta\mu2\chi}{2} = 0 \iff \gamma\eta\mu2\chi + (\beta - \alpha)\text{συν}2\chi = 2\delta - \alpha - \beta$$

'Η τελευταία εξίσωσις εἶναι μία γραμμική τριγωνομετρική εξίσωσις (διὰ τὴν ἐπίλυσιν ταύτης, πρβλ. κατωτέρω περίπτωσιν γ).

Γενικώτερον, ἔχομεν εξισώσεις τῆς μορφῆς $f(\eta\mu\chi, \text{συν}\chi) = \mu$ ($0 \neq \mu \in \mathbb{R}$), ὅπου τὸ $f(\eta\mu\chi, \text{συν}\chi)$ παριστᾷ ἀκέραιον πολυώνυμον καί ὁμογενῆς ὡς πρὸς $\eta\mu\chi$, $\text{συν}\chi$ καί βαθμοῦ ἀρτίου. 'Εάν ὁ βαθμὸς ὁμογενείας εἶναι 2ρ ($\rho \in \mathbb{N}$), τότε δυνάμεθα νὰ γράψωμεν:

$$f(\eta\mu\chi, \text{συν}\chi) = \mu \iff f(\eta\mu\chi, \text{συν}\chi) - \mu(\eta\mu^2\chi + \text{συν}^2\chi)^\rho = 0$$

'Η τελευταία ὁμογενὴς εξίσωσις εἶναι ὁμογενῆς (βαθμὸς ὁμογενείας 2ρ) καί ἐπιλύεται κατὰ τὰ γνωστά.

Π.χ. ἡ εξίσωσις $5\eta\mu^4\chi + 4\eta\mu^2\chi\text{συν}^2\chi + 7\text{συν}^4\chi = 4$ (1) ἰσοδυνάμως γράφεται:
 (1) $\iff 5\eta\mu^4\chi + 4\eta\mu^2\chi\text{συν}^2\chi + 7\text{συν}^4\chi - 4(\eta\mu^2\chi + \text{συν}^2\chi)^2 = 0 \iff \epsilon\phi^4\chi - 4\epsilon\phi^2\chi + 3 = 0$,
 ἡ ὁποία ἐπιλύεται εὐκόλως.

3.4. Γραμμική τριγωνομετρική εξίσωσις. Αὕτη εἶναι τῆς μορφῆς

$$\alpha\eta\mu\chi + \beta\text{συν}\chi = \gamma, \quad \alpha\beta\gamma \neq 0,^1$$

ἤτοι τὸ πρῶτον μέλος αὐτῆς εἶναι μία γραμμική μορφή τῶν $\eta\mu\chi$ καί $\text{συν}\chi$.

3.4.1. Λύσις τῆς $\alpha\eta\mu\chi + \beta\text{συν}\chi = \gamma$, $\alpha\beta\gamma \neq 0$. 'Επειδὴ $\frac{\beta}{\alpha} \in \mathbb{R}$, συνάγε-

¹ Εὐκόλως διαπιστοῦται ὅτι, ἐάν $\alpha\beta\gamma = 0$, ἡ γραμμική εξίσωσις λαμβάνει ἀπλουστάτην μορφήν (θεμελιώδη).

αι, ότι υπάρχει πάντοτε τόξον (εύρισκόμενον ἐκ τῶν πινάκων), τοῦ ὁποῖου ἐφαπτομένη ἰσοῦται μὲ τὸν ἀριθμὸν $\frac{\beta}{\alpha}$.

Ὡς ἐκ τούτου, πρὸς λύσιν τῆς ἐξίσωσης χρησιμοποιοῦμεν τὸν μετασχηματισμὸν $\epsilon\phi\omega = \frac{\beta}{\alpha} (M_1)$, ὅπου ω εἶναι γνωστὸν τόξον καὶ συνεπῶς ἡ ἐξίσωσις γράφεται:

$$\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma \Leftrightarrow \eta\mu\chi + \frac{\beta}{\alpha}\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\gamma}{\alpha} \Leftrightarrow \eta\mu\chi + \epsilon\phi\omega\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\gamma}{\alpha} \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\omega + \eta\mu\omega\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\gamma}{\alpha}\sigma\upsilon\nu\omega \Leftrightarrow \eta\mu(\chi + \omega) = \frac{\gamma}{\alpha}\sigma\upsilon\nu\omega \quad (E).$$

Ἡ τελευταία ὁμως ἐξίσωσις (E) εἶναι ἡ γνωστὴ θεμελιώδης ἐξίσωσις 2.1., τὴν ὁποῖαν ἐπιλύομεν κατὰ τὰ γνωστά, ἤτοι: Ἐὰν $\left| \frac{\gamma}{\alpha}\sigma\upsilon\nu\omega \right| > 1$, δὲν υπάρ-

χει οὐδὲν τόξον, τοῦ ὁποῖου τὸ συνημίτονον νὰ εἶναι $\frac{\gamma}{\alpha}\sigma\upsilon\nu\omega$ καὶ συνεπῶς ἡ ἐξίσωσις $\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma$ εἶναι ἀδύνατος. Ἡ συνθήκη δυνατότητος λύσεως

τῆς (E) εἶναι $\left| \frac{\gamma}{\alpha}\sigma\upsilon\nu\omega \right| \leq 1$, ἡ ὁποία περαιτέρω ἀναλύεται ἰσοδυνάμως ὡς

$$\text{ἐξῆς: } \left| \frac{\gamma}{\alpha}\sigma\upsilon\nu\omega \right| \leq 1 \Leftrightarrow \frac{\gamma^2}{\alpha^2}\sigma\upsilon\nu^2\omega \leq 1 \Leftrightarrow \frac{\gamma^2}{\alpha^2} \frac{1}{1 + \epsilon\phi^2\omega} \leq 1 \Leftrightarrow$$

$$\frac{\gamma^2}{\alpha^2} \frac{1}{1 + \frac{\beta^2}{\alpha^2}} \leq 1 \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2 \quad (\Sigma).$$

Ἄρα, ἡ γραμμικὴ ἐξίσωσις ἔχει λύσιν, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν, πληροῦται ἡ συνθήκη (Σ). Πληρουμένης τῆς (Σ), θέτομεν $\frac{\gamma}{\alpha}\sigma\upsilon\nu\omega = \eta\mu\theta$ (M_2), ὅπου θ γνω-

στὸν τόξον μὲ $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ καὶ ἡ (E) γράφεται:

$$\eta\mu(\chi + \omega) = \eta\mu\theta \Leftrightarrow \begin{cases} \chi + \omega = 2\kappa\pi + \theta \\ \chi + \omega = (2\rho + 1)\pi - \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \chi = 2\kappa + \theta - \omega \\ \chi = (2\rho + 1)\pi - \theta - \omega \end{cases} \quad (\kappa, \rho \in \mathbb{Z})$$

Αἱ δύο τελευταῖαι **οἰκογένειαι** τόξων ἀποτελοῦν τὴν γενικὴν λύσιν τῆς γραμμικῆς ἐξίσωσεως.

Παρατηρήσεις: 1) Πᾶσα ἐξίσωσις τῆς μορφῆς $\alpha\epsilon\phi\chi + \beta\sigma\upsilon\phi\chi = \gamma$, $\alpha\beta\gamma \neq 0$, ἀνάγεται εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῆς ἐξίσωσεως $\gamma\eta\mu\omega + (\alpha - \beta)\sigma\upsilon\nu\omega = \alpha + \beta$, ὅπου $\omega = 2\chi$ (διὰ τὴν ;).

2) Εἶδομεν ὅτι ἡ συνθήκη δυνατότητος ἐπιλύσεως τῆς $\alpha\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma$ εἶναι $\alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2$. Ἐὰν $\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$, τότε $|\eta\mu\theta| = 1$, ἐνεκα καὶ τῶν (M_1), (M_2).

Ἡ ἀνωτέρω γραμμικὴ τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις εἶναι δυνατόν νὰ ἐπιλυθῇ καὶ δι' ἄλλης μεθόδου, τὴν ὁποῖαν περιγράφομεν κατωτέρω.

3.4.2. Λύσις τῆς $\alpha\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma$, $\alpha\beta\gamma \neq 0$. Ἐκφράζομεν, μέσω γνωστῶν

τύπων, τὰ ημχ καὶ συνχ συναρτήσῃ τῆς εφ $\frac{\chi}{2}$ (οἱ τύποι οὗτοι ἰσχύουν μὲ $\chi \neq 2\kappa\pi + \pi, \kappa \in \mathbb{Z}$) καὶ ἡ ἐξίσωσις γράφεται:

$$\alpha \frac{2\varepsilon\varphi \frac{\chi}{2}}{1 + \varepsilon\varphi^2 \frac{\chi}{2}} + \beta \frac{1 - \varepsilon\varphi^2 \frac{\chi}{2}}{1 + \varepsilon\varphi^2 \frac{\chi}{2}} = \gamma \Leftrightarrow (\beta + \gamma)\varepsilon\varphi^2 \frac{\chi}{2} - 2\alpha\varepsilon\varphi \frac{\chi}{2} + \gamma - \beta = 0 \quad (1)$$

Ἐπίσης, παρατηροῦμεν, ὅτι διὰ $\chi = 2\kappa\pi + \pi$ ἡ γραμμικὴ ἐξίσωσις γράφεται: $\alpha\eta\mu(2\kappa\pi + \pi) + \beta\sigma\upsilon\nu(2\kappa\pi + \pi) = \gamma \Leftrightarrow \alpha \cdot 0 + \beta(-1) = \gamma \Leftrightarrow \beta + \gamma = 0$

Ἄρα, ἡ γραμμικὴ ἐξίσωσις δὲν δέχεται ὡς λύσεις τὰ τόξα:

$$\chi = 2\kappa\pi + \pi \quad (\kappa \in \mathbb{Z}), \quad \text{ἐφ' ὅσον } \beta + \gamma \neq 0.$$

Βάσει τῶν ἀνωτέρω διακρίνομεν τὰς ἀκολουθοῦσας περιπτώσεις:

1) Ἐὰν $\beta + \gamma \neq 0$, τότε ἡ πρὸς λύσιν ἐξίσωσις εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν (1), ἡ ὁποία εἶναι ἀλγεβρική ὡς πρὸς εφ $\frac{\chi}{2}$ καὶ ἐπιλύεται κατὰ τὰ γνωστά.

Ἡ συνθήκη δυνατότητος ἐπιλύσεως τῆς (1) εἶναι:

$$\Delta = 4\alpha^2 - 4(\gamma + \beta)(\gamma - \beta) \geq 0 \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2$$

2) Ἐὰν $\beta + \gamma = 0$, τότε ἡ γραμμικὴ ἐξίσωσις γράφεται:

$$\alpha\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\nu\chi = -\beta \Leftrightarrow \alpha\eta\mu\chi = -\beta(1 + \sigma\upsilon\nu\chi) \Leftrightarrow 2\alpha\eta\mu\frac{\chi}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2} = -2\beta\sigma\upsilon\nu^2\frac{\chi}{2} \Leftrightarrow$$

$$\sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2} \left(\alpha\eta\mu\frac{\chi}{2} + \beta\sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2} \right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2} = 0 & (1) \\ \alpha\eta\mu\frac{\chi}{2} + \beta\sigma\upsilon\nu\frac{\chi}{2} = 0 & (2) \end{cases}$$

Ἡ γενικὴ λύσις τῆς (1) εἶναι $\chi = 2\kappa\pi + \pi \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$. Ἡ (2) γράφεται εφ $\frac{\chi}{2} = \frac{-\beta}{\alpha}$ καὶ ἐπιλύεται κατὰ τὰ γνωστά. Ἐπιπλέον, ἐφ' ὅσον $\beta = -\gamma$, προκύπτει $\beta^2 = \gamma^2$, ὁπότε $\alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2$.

Παρατήρησις. Δυνάμει τῆς ἀνωτέρω ἐκτεθείσης μεθόδου ἐπιλύσεως τῆς γραμμικῆς ἐξίσωσως, συνάγεται, ὅτι τὰ ημχ καὶ συνχ ἐκφράζονται συναρτήσῃ τῆς εφ $\frac{\chi}{2}$ μόνον ἐφ' ὅσον $\beta + \gamma \neq 0$, ὁπότε καταλήγομεν εἰς τὴν ἐξίσωσιν (1). Ἐὰν δὲ $\beta + \gamma = 0$, ἀκολουθοῦμεν τὸν ἐκ τῆς περιπτώσεως 2) ἐκτεθέντα τρόπον ἐπιλύσεως τῆς γραμμικῆς ἐξίσωσως. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἐπανευρίσκομεν τὴν γνωστὴν συνθήκην δυνατότητος ἐπιλύσεως τῆς γραμμικῆς ἐξίσωσως $\alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἐξίσωσις: $\eta\mu\chi + \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu\chi = 2\lambda, \lambda \in \mathbb{Z}$.

Ἐπίλυσις: Ἡ ἐξίσωσις ἔχει λύσιν, ἐφ' ὅσον πληροῦται ἡ συνθήκη: $1^2 + (\sqrt{3})^2 \geq (2\lambda)^2$, ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν: $-1 \leq \lambda \leq 1$. Ἐκ τῆς τελευταίας σχέσεως καὶ ἐπειδὴ ὁ λ εἶναι ἀκέραιος, συνάγεται $\lambda = -1, 0, 1$.

Άρα, η δοθείσα εξίσωση έχει λύσιν, εάν και μόνον εάν, το λ είναι $-1, 0$ και 1 και θα είναι τότε ισοδύναμος με τὰς κάτωθι τρεις εξισώσεις:

$$\eta\mu\chi + \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu\chi = -2 \quad (\alpha), \quad \eta\mu\chi + \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu\chi = 0 \quad (\beta), \quad \eta\mu\chi + \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu\chi = 2 \quad (\gamma)$$

Λύσις τῆς (α). Ἡ εξίσωση (α) γράφεται:

$$\eta\mu\chi + \epsilon\phi \frac{\pi}{3} \sigma\upsilon\nu\chi = -2 \iff \eta\mu\chi + \frac{\eta\mu \frac{\pi}{3}}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3}} \sigma\upsilon\nu\chi = -2 \iff$$

$$\eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} + \eta\mu \frac{\pi}{3} \sigma\upsilon\nu\chi = -2 \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} \iff \eta\mu \left(\chi + \frac{\pi}{3} \right) = -1 \iff$$

$$\chi + \frac{\pi}{3} = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2} \iff \chi = 2\kappa\pi - \frac{5\pi}{6} \quad (\kappa \in \mathbb{Z}).$$

Λύσις τῆς (β). Ἡ (β) γράφεται: $\epsilon\phi\chi = -\sqrt{3}$ καὶ ἡ γενικὴ λύσις αὐτῆς εἶναι

$$\chi = \kappa\pi + \frac{2\pi}{3}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

Λύσις τῆς (γ). Πρὸς λύσιν ταύτης ἀκολουθοῦμεν τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς πορείαν

μὲ τὴν λύσιν τῆς (α) καὶ εὐρίσκομεν $\eta\mu \left(\chi + \frac{\pi}{3} \right) = 1$, τῆς ὁποίας ἡ γενικὴ λύ-

σις εἶναι $\chi = \kappa\pi + \frac{\pi}{6}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.

3.5. Συμμετρικὴ ἐξίσωση ὡς πρὸς $\eta\mu\chi$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\chi$. Οὕτω καλεῖται πᾶσα ἐξίσωση τῆς μορφῆς $f(\eta\mu\chi, \sigma\upsilon\nu\chi) = 0$, ὅπου $f(\eta\mu\chi, \sigma\upsilon\nu\chi)$ εἶναι συμμετρικὸν ἀκέραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς $\eta\mu\chi$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\chi$. Εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Ἀλγέβρας, ὅτι κάθε συμμετρικὸν πολυώνυμον (ἀκέραιον) ὡς πρὸς χ καὶ ψ εἶναι δυνατόν νὰ ἐκφρασθῆ συναρτήσῃ τῶν στοιχειωδῶν συμμετρικῶν παραστάσεων $\chi + \psi$ καὶ $\chi\psi$ καί, συνεπῶς, κάθε συμμετρικὴ τριγωνομετρικὴ ἐξίσωση δύναται τελικῶς νὰ λάβῃ τὴν μορφήν $f(\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi, \eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi) = 0$ (E).

Πρὸς ἐπιλύσιν τῆς ἐξισώσεως (E), ἐφαρμόζομεν τὸν μετασχηματισμὸν $\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi = t$ (M_1), ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ γράφεται:

$$\eta\mu\chi + \eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - \chi \right) = t \iff 2\eta\mu \frac{\pi}{4} \sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{4} - \chi \right) = t \iff \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{4} - \chi \right) = t \quad (M_2)$$

Ἐξ ἄλλου, ἐκ τῆς σχέσεως (M_1), ἔχομεν:

$$(\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi)^2 = t^2 \Rightarrow \eta\mu^2\chi + \sigma\upsilon\nu^2\chi + 2\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi = t^2 \Rightarrow 1 + 2\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi = t^2 \Rightarrow \eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{t^2 - 1}{2} \quad (1).$$

Βάσει τῶν (M_1) καὶ (1) ἡ ἐξίσωση (E) γράφεται $f \left(t, \frac{t^2 - 1}{2} \right) = 0$ (ε).

Αὕτη εἶναι μία ἀλγεβρικὴ ἐξίσωση ὡς πρὸς t , τὴν ὁποίαν ἐπιλύομεν καὶ εὐρίσκομεν τὸ t . Ἐν συνεχείᾳ, θέτοντες τὴν εὐρεθεῖσαν τιμὴν τοῦ t εἰς τὴν ἐξίσωσιν (M_2)

καί ἐπιλύοντες τήν θεμελιώδη ταύτην ἐξίσωσιν, προσδιορίζομεν τὸ χ . Διὰ τήν διερεύνησιν τῆς ἀλγεβρικής ἐξισώσεως (ε) θὰ πρέπει νὰ σημειωθῆ, ὅτι τὰ ὄρια μεταβολῆς τοῦ t εἶναι ἀπὸ $-\sqrt{2}$ ἕως $\sqrt{2}$, ἤτοι $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$, διότι:

$$-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) \leq 1 \iff -\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) \leq \sqrt{2} \iff -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2} \quad (M_3),$$

λόγω καὶ τῆς (M₂).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῆ ἡ ἐξίσωσις: $\alpha(\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi) + \beta\eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi = \gamma$ (1)

Ἐπίλυσις: Ἡ πρὸς λύσιν ἐξίσωσις εἶναι ἡ ἀπλουστερά μορφή συμμετρικῆς ἐξισώσεως. Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, θέτομεν $\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi = t$ καὶ ἡ ἐξίσωσις γράφεται:

$$\alpha t + \beta \frac{t^2 - 1}{2} = \gamma \iff \beta t^2 + 2\alpha t - (\beta + 2\gamma) = 0 \quad (2)$$

Συνεπῶς ἔχομεν:

$$(1) \iff \begin{cases} (2) \\ \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) = t \quad (M) \end{cases}$$

Ἐπιλύομεν τὴν δευτεροβάθμιον ἐξίσωσιν (2) καὶ εὐρίσκομεν τὸ t . Ἐν συνεχείᾳ, μέσω τῆς θεμελιώδους ἐξισώσεως (M), εὐρίσκομεν τὸ χ . Ἴνα αἱ ρίζαι τῆς ἐξισώσεως (2) εἶναι δεκταί, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ κείνται ἐντὸς τοῦ διαστήματος $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Αἱ ἰκαναὶ καὶ ἀναγκαῖαι συνθήκαι πρὸς τοῦτο εἶναι γνωσταὶ ἐκ τῆς Ἀλγέβρας (ἐπίσης, πρβλ. 3.1.).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις: $\eta\mu^3\chi + \sigma\upsilon\nu^3\chi = 1$.

Λύσις: Ἡ πρὸς λύσιν ἐξίσωσις εἶναι συμμετρική, διότι δὲν μεταβάλλεται διὰ τῆς ἀντιμεταθέσεως τῶν $\eta\mu\chi$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\chi$. Αὕτη, δυνάμει καὶ τῶν προηγουμένων, γράφεται:

$$\eta\mu^3\chi + \sigma\upsilon\nu^3\chi = 1 \iff (\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi)(\eta\mu^2\chi + \sigma\upsilon\nu^2\chi - \eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi) = 1 \iff$$

$$(\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi)(1 - \eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\chi) = 1 \iff \begin{cases} t\left(1 - \frac{t^2 - 1}{2}\right) = 1 \quad (\epsilon_1) \\ \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) = t \quad (\epsilon_2) \end{cases}$$

Κατ' ἀρχὴν ἐπιλύομεν τὴν ἀλγεβρικήν ἐξίσωσιν (ε₁). Πρὸς τοῦτο ἔχομεν:

$$t \frac{3-t^2}{2} = 1 \iff t^3 - 3t + 2 = 0 \iff (t^3 - t) - (2t - 2) = 0 \iff t(t^2 - 1) - 2(t - 1) = 0$$

$$\iff (t - 1)(t^2 + t - 2) = 0 \iff \begin{cases} t - 1 = 0 \\ t^2 + t - 2 = 0 \end{cases}$$

Δι' ἐπιλύσεως τῶν τελευταίων ἐξισώσεων εὐρίσκομεν τὰς ρίζας τῆς (ε₁), αἱ ὁποῖαι εἶναι $t_1 = 1$ (διπλῆ) καὶ $t_2 = -2$. Ἡ ρίζα -2 ἀπορρίπτεται λόγω τῆς (M₃). Ἐν συνεχείᾳ ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν ἐξίσωσιν (ε₂) τὴν δεκτὴν ρίζαν καὶ

Έχουμε προς λύσιν την εξίσωσιν $\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) = 1$. Αυτή ισοδυναμώς γράφεται:

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} &\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) = \sin\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} - \chi = 2k\pi \pm \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \\ \chi = \frac{\pi}{4} - \left(2k\pi \pm \frac{\pi}{4}\right) (k \in \mathbb{Z}) &\Leftrightarrow \begin{cases} \chi = 2k\pi \\ \chi = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

4. Τριγωνομετρική επίλυσις τῆς δευτεροβαθμίου εξίσωσης

$$a\chi^2 + \beta\chi + \gamma = 0 \quad (a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}) \quad (1)$$

4.1. Ἐπειδὴ $\chi \in \mathbb{R}$, ὑπάρχει $\omega \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ τοιοῦτον, ὥστε $\epsilon\phi\omega = \chi$ (M_1) καὶ συνεπῶς ἡ εξίσωσις (1) γράφεται:

$$\begin{aligned} (1) \Leftrightarrow a\epsilon\phi^2\omega + \beta\epsilon\phi\omega + \gamma = 0 &\Leftrightarrow \alpha \frac{\eta\mu^2\omega}{\sigma\upsilon\nu^2\omega} + \beta \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} + \gamma = 0 \Leftrightarrow \\ a\eta\mu^2\omega + \beta\eta\mu\omega\sigma\upsilon\nu\omega + \gamma\sigma\upsilon\nu^2\omega = 0 &\Leftrightarrow \alpha(1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega) + \beta\eta\mu^2\omega + \gamma(1 + \sigma\upsilon\nu^2\omega) = 0 \Leftrightarrow \\ \beta\eta\mu^2\omega + (\gamma - \alpha)\sigma\upsilon\nu^2\omega &= -(\alpha + \gamma) \quad (2) \end{aligned}$$

Οὕτως ἡ λύσις τῆς εξίσωσης (1) ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῆς εξίσωσης (2), ἡ ὁποία εἶναι τῆς μορφῆς $a\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma$ καὶ ἐπιλύεται, ὡς γνωστόν, διὰ τῆς πρώτης μεθόδου ἐπιλύσεώς της, ὡς ἐξῆς:

1) Ἐὰν $\beta \neq 0$, διαιροῦμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (2) μὲ β καὶ ἔχομεν:

$$\eta\mu^2\omega + \frac{\gamma - \alpha}{\beta} \sigma\upsilon\nu^2\omega = -\frac{\alpha + \gamma}{\beta} \quad (3)$$

Ἐν συνεχείᾳ θέτομεν $\frac{\gamma - \alpha}{\beta} = \epsilon\phi\psi$ (M_2) καὶ ἡ (3) γράφεται:

$$\eta\mu^2\omega + \epsilon\phi\psi\sigma\upsilon\nu^2\omega = -\frac{\alpha + \gamma}{\beta} \Leftrightarrow \eta\mu(2\omega + \psi) = -\frac{\alpha + \gamma}{\beta} \sigma\upsilon\nu\psi \quad (4)$$

Ἡ συνθήκη δυνατότητος ἐπιλύσεως τῆς (2), ὡς γνωστόν, εἶναι:

$$\beta^2 + (\gamma - \alpha)^2 \geq (\alpha + \gamma)^2 \Leftrightarrow \beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0.$$

Ἡ τελευταία εὑρεθεῖσα συνθήκη εἶναι ἡ γνωστὴ συνθήκη ὑπάρξεως ριζῶν (πραγματικῶν) τῆς δευτεροβαθμίου εξίσωσης (1). Πληρουμένης τῆς συνθήκης ταύτης, ἡ εξίσωσις (4) ἔχει λύσιν (διατί;), ἥτοι ὑπάρχει τόξον $\phi \in \mathbb{R}$ τοιοῦτον, ὥστε $\eta\mu\phi = -\frac{\alpha + \gamma}{\beta} \sigma\upsilon\nu\psi$ (M_3) καὶ συνεπῶς ἡ (4) γράφεται

$\eta\mu(2\omega + \psi) = \eta\mu\phi$. Αἱ λύσεις τῆς εξίσωσης ταύτης εἶναι αἱ κάτωθι οικογένειαι τόξων:

$$\omega_1 = k\pi + \frac{\phi}{2} - \frac{\psi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\omega_2 = \lambda\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2} - \frac{\psi}{2} \quad (\lambda \in \mathbb{Z})$$

Είναι $\epsilon\varphi\omega_1 = \epsilon\varphi\left(\kappa\pi + \frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2}\right) = \epsilon\varphi\left(\frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2}\right)$ και
 $\epsilon\varphi\omega_2 = \epsilon\varphi\left(\lambda\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2}\right) = \sigma\varphi\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\psi}{2}\right)$, όποτε, βάσει και τῆς (M_1) ,
 αἱ ρίζαι τῆς δευτεροβαθμίου ἐξισώσεως (1) εἶναι:

$$\chi_1 = \epsilon\varphi\left(\frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2}\right), \quad \chi_2 = \sigma\varphi\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\psi}{2}\right) \quad (5).$$

2) Ἐάν $\beta = 0$, ἡ (2) γράφεται $(\gamma - \alpha)\text{συν}2\omega = -(\alpha + \gamma)$. Διὰ τὴν λύσιν τῆς ἐξισώσεως ταύτης διακρίνομεν τὰς ἀκολουθοῦσας περιπτώσεις:

2_α) Ἐάν $\gamma - \alpha = 0$ ($\Leftrightarrow \alpha = \gamma$), τότε ἡ ἐξίσωσις εἶναι ἀδύνατος, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι καὶ $\alpha + \gamma = 0$ (διατί;).

2_β) Ἐάν $\gamma - \alpha \neq 0$ ($\Leftrightarrow \alpha \neq \gamma$), τότε ἡ ἐξίσωσις αὕτη γράφεται

$$\text{συν}2\omega = \frac{\alpha + \gamma}{\alpha - \gamma} \quad (6).$$

Ἡ συνθήκη δυνατότητος ἐπιλύσεως τῆς (6) εἶναι:

$$\left| \frac{\alpha + \gamma}{\alpha - \gamma} \right| \leq 1 \Leftrightarrow (\alpha + \gamma)^2 \leq (\alpha - \gamma)^2 \Leftrightarrow \alpha\gamma \leq 0,$$

ἦτοι ἐπανευρίσκομεν τὴν γνωστὴν ἐκ τῆς Ἀλγέβρας συνθήκην ὑπάρξεως πραγματικῶν ριζῶν, διότι μὲ $\beta = 0$ ἡ διακρίνουσα τῆς (1) εἶναι $\Delta = -4\alpha\gamma$ καὶ θὰ πρέπει $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow -4\alpha\gamma \geq 0 \Leftrightarrow \alpha\gamma \leq 0$. Πληρουμένης τῆς συνθήκης ταύτης,

ὑπάρχει τόσον $\varphi \in \mathbb{R}$ μὲ $\text{συν}\varphi = \frac{\alpha + \gamma}{\alpha - \gamma}$ καὶ συνεπῶς ἡ (6) γράφεται $\text{συν}2\omega = \text{συν}\varphi$.

Ἡ γενικὴ λύσις τῆς τελευταίας ἐξισώσεως εἶναι:

$$\{\omega \in \mathbb{R} : \omega = \kappa\pi + \frac{\varphi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}\} \cup \{\omega \in \mathbb{R} : \omega = \lambda\pi - \frac{\varphi}{2}, \lambda \in \mathbb{Z}\}.$$

Συνεπῶς, δυνάμει καὶ τῆς (M_1) , αἱ ρίζαι τῆς (1) θὰ εἶναι:

$$\chi_1 = \epsilon\varphi\frac{\varphi}{2}, \quad \chi_2 = -\epsilon\varphi\frac{\varphi}{2}.$$

Παρατηρήσεις: 1) Ὑποθέτομεν, ὅτι αἱ εὐρεθεῖσαι ρίζαι (5) εἶναι ἴσαι: τότε θὰ ἔχωμεν:

$$\epsilon\varphi\left(\frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2}\right) = \sigma\varphi\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\psi}{2}\right) \Leftrightarrow \epsilon\varphi\left(\frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2}\right) = \epsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2}\right) \Leftrightarrow$$

$$\frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2} = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2} \Leftrightarrow \varphi = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \eta\mu\varphi \in \{1, -1\} \quad (\kappa \in \mathbb{Z}).$$

Ἐκ τούτου, βάσει καὶ τῆς (M_3) , συνάγεται $\left| \frac{\alpha + \gamma}{\beta} \text{συν}\varphi \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{(\alpha + \gamma)^2}{\beta^2} \text{συν}^2\varphi = 1 \Leftrightarrow$

$$\frac{(\alpha + \gamma)^2}{\beta^2} \cdot \frac{1}{1 + \epsilon\varphi^2\psi} = 1. \text{ Ἐξ αὐτῆς καὶ τῆς } (M_2), \text{ προκύπτει:}$$

$$\frac{(\alpha + \gamma)^2}{\beta^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(\gamma - \alpha)^2}{\beta^2}} = 1 \Leftrightarrow \beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$$

ἦτοι εὐρίσκομεν τὴν γνωστὴν ἐκ τῆς Ἀλγέβρας συνθήκην ὑπάρξεως διπλῆς ρίζης.

2) Ἡ γνωστὴ ἐκ τῆς Ἀλγέβρας μέθοδος ἐπιλύσεως τῆς δευτεροβαθμίου ἐξισώσεως $\alpha\chi^2 + \beta\chi + \gamma = 0$ διαφέρει οὐσιωδῶς τῆς ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσης τριγωνομετρικῆς μεθόδου, διότι κατ' αὐτὴν δὲν ἐλήφθησαν ὑπ' ὄψιν οἱ γνωστοὶ ἀλγεβρικοὶ τύποι, οἱ ὅποιοι παρέχουν τὰς ρίζας τῆς δευτεροβαθμίου ἐξισώσεως.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) 'Επιλύσατε τὰς κάτωθι ἐξισώσεις:

$$1) \text{ συν}\left(2\chi - \frac{\pi}{3}\right) = \text{συν}\frac{5\pi}{6}$$

$$3) \text{ συν}\left(2\chi + \frac{\pi}{3}\right) = \text{συν}3\chi$$

$$5) \text{ συν}3\chi + 1 = 0$$

$$7) \text{ συν}4\chi + \text{συν}\chi = 0$$

$$9) 4\eta\mu^3\chi - 3\eta\mu\chi = \frac{1}{2}$$

$$11) 4\eta\mu^2(2\chi - 1) = 1$$

$$2) \eta\mu\left(\chi + \frac{\pi}{6}\right) = \eta\mu\left(\frac{3\pi}{4} - 2\chi\right)$$

$$4) 4\eta\mu^2\chi = 1$$

$$6) \epsilon\varphi\left(\chi + \frac{\pi}{3}\right) = -1$$

$$8) \text{ συν}\left(2\chi - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{3}$$

$$10) \text{ συν}^24\chi - \eta\mu^23\chi = 0$$

$$12) \epsilon\varphi\left(2\chi - \frac{\pi}{3}\right) = \sigma\varphi3\chi$$

2) 'Επιλύσατε τὰς κάτωθι ἐξισώσεις:

$$1) \epsilon\varphi\left(\chi + \frac{\pi}{3}\right) = 2\eta\mu\left(\chi + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$3) \epsilon\varphi\chi \epsilon\varphi2\chi = 1$$

$$5) \epsilon\varphi\left(\chi - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{3} \epsilon\varphi\left(\frac{3\pi}{4} - \chi\right)$$

$$2) \epsilon\varphi(\alpha\chi)\epsilon\varphi(\beta\chi) = -1 \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

$$4) \epsilon\varphi\left(\chi - \frac{\pi}{3}\right) = 3\sigma\varphi\left(\chi - \frac{\pi}{3}\right)$$

3) Νά ἐπιλυθῆ ἡ ὡς πρὸς χ ἐξίσωσις: $|\eta\mu\chi| = \eta\mu\alpha$ ($\eta\mu\alpha \geq 0$).

4) Νά ἐπιλυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα:

$$1) \begin{cases} \text{συν}\left(2\chi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \\ -\pi \leq \chi \leq \pi \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \epsilon\varphi\left(2\chi - \frac{\pi}{3}\right) = \sigma\varphi\chi \\ -\frac{\pi}{2} \leq \chi < \pi \end{cases}$$

5) Νά ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἐξισώσεις:

$$1) \epsilon\varphi2\chi = \epsilon\varphi\left(\psi + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$3) \eta\mu\left(\chi + \frac{\pi}{4}\right) + \text{συν}\left(\psi - \frac{\pi}{4}\right) = 0$$

$$2) \epsilon\varphi\chi\epsilon\varphi2\psi = 1$$

$$4) \text{ συν}(\chi - \psi) + 3\text{συν}(\chi + \psi) = 4$$

6) Νά ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἐξισώσεις:

$$1) 4\text{συν}^2\chi - 2(1 + \sqrt{3})\text{συν}\chi + \sqrt{3} = 0$$

$$3) 3(1 - \text{συν}\chi) = \eta\mu^2\chi$$

$$5) \eta\mu2\chi = \epsilon\varphi\chi$$

$$7) \epsilon\varphi2\chi = 3\epsilon\varphi\chi$$

$$9) 2\eta\mu\chi \eta\mu3\chi = 1$$

$$11) \text{ συν}2\chi + (1 + \sqrt{3})\eta\mu2\chi - 2\sqrt{3}\text{συν}^2\chi = 1$$

$$2) 2\eta\mu^2\chi + \sqrt{3}\eta\mu\chi - 3 = 0$$

$$4) \epsilon\varphi^2\chi + (\sqrt{3} - 1)\epsilon\varphi\chi - \sqrt{3} = 0$$

$$6) \text{ συν}2\chi - 4\text{συν}\chi - 5 = 0$$

$$8) \eta\mu2\chi = \eta\mu^3\chi$$

$$10) 5\eta\mu^2\chi - 2\text{συν}^2\chi - 3\eta\mu\chi \text{συν}\chi = 0$$

7) Νά ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἐξισώσεις:

$$1) \eta\mu\chi + \sqrt{3}\text{συν}\chi = \sqrt{2}$$

$$2) 2\eta\mu\chi + 3\text{συν}\chi = 3$$

$$3) \sqrt{3}\eta\mu2\chi + \text{συν}2\chi = 1$$

$$4) \eta\mu\frac{\chi}{2} - \text{συν}\frac{\chi}{2} = 1$$

$$5) \eta\mu\chi + \text{συν}\chi - \eta\mu\chi\text{συν}\chi = 1$$

$$6) \text{συν}\chi - \eta\mu\chi + \eta\mu\chi \text{συν}\chi = 1$$

8) Να επιλυθούν αι κάτωθι εξισώσεις:

$$1) \eta\mu 2\chi + \eta\mu 6\chi = 2\eta\mu 4\chi$$

$$3) \sigma\upsilon\nu 2\chi - \sigma\upsilon\nu 3\chi + \eta\mu 5\chi = 0$$

$$5) \eta\mu\chi + \eta\mu 2\chi + \eta\mu 3\chi = 0$$

$$7) \sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu 2\chi = 2\eta\mu\chi \eta\mu 2\chi$$

$$9) \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi 2\chi + \epsilon\phi 3\chi = 0$$

$$11) 2\eta\mu^3\chi = 3\sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu 3\chi$$

$$13) 8 \sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\sqrt{3}}{\eta\mu\chi} + \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\chi}$$

$$15) \eta\mu\chi + \eta\mu 2\chi + \eta\mu 3\chi = 4 \sigma\upsilon\nu \frac{\chi}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{3\chi}{2}$$

$$16) 1 + \eta\mu\chi + \eta\mu 2\chi + \eta\mu 3\chi = \sigma\upsilon\nu\chi - \sigma\upsilon\nu 2\chi + \sigma\upsilon\nu 3\chi$$

$$2) \eta\mu 3\chi + \sigma\upsilon\nu 3\chi = \eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi$$

$$4) \eta\mu\chi + \eta\mu 3\chi = 2\eta\mu 2\chi$$

$$6) \sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu 7\chi = \sigma\upsilon\nu 3\chi \sigma\upsilon\nu 5\chi$$

$$8) 2\sigma\upsilon\nu \frac{3\chi}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\chi}{2} = \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{4} - \chi \right)$$

$$10) 1 + \sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu 2\chi + \sigma\upsilon\nu 3\chi = 0$$

$$12) \epsilon\phi\chi = 2 \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu 2\chi - \sigma\phi 2\chi$$

$$14) 2 \sigma\upsilon\nu \frac{\chi}{3} - \eta\mu \frac{\chi}{2} = 2 \quad (\theta\acute{\epsilon}\sigma\alpha\tau\epsilon \frac{\chi}{6} = \omega)$$

9) Να επιλυθούν και διερευνηθούν αι κάτωθι εξισώσεις:

$$1) \lambda\eta\mu^2\chi - 2(\lambda - 2)\eta\mu\chi + \lambda + 2 = 0$$

$$3) (\mu - 1)\eta\mu^2\chi - 2(\mu + 2)\eta\mu\chi - 1 = 0$$

$$5) 2\sigma\upsilon\nu^2\chi - \lambda\eta\mu 2\chi = -\lambda$$

$$7) (\lambda - 1)\eta\mu\chi + (\lambda + 1)\sigma\upsilon\nu 2\chi = 2\lambda$$

$$2) \eta\mu 2\chi = \lambda\eta\mu 3\chi$$

$$4) 2\eta\mu^2\chi + 2\eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi = \lambda$$

$$6) \sigma\upsilon\nu\chi + \eta\mu\chi = \kappa \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$$

$$8) \lambda(\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi) - \eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi = 1$$

10) Διά ποίας τιμές του λ η εξίσωση $\sigma\upsilon\nu 2\chi + \lambda\eta\mu\chi + 1 = 0$ έχει δύο μόνον λύσεις εντός του διαστήματος $[0, 2\pi]$.

11) Να επιλυθῆ ἡ εξίσωση $\eta\mu 2\psi = \sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{4} - 3\chi \right)$ και νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι αἱ λύσεις αὐτῆς παρ-στοῦν δύο οἰκογενεῖς παραλλήλων εὐθειῶν (εἰς ὀρθογώνιον σύστημα ἀξόνων). Νὰ γίνῃ γρη-φικὴ παράσταση τῶν δύο τούτων οἰκογενειῶν παραλλήλων εὐθειῶν.

12) Ἐὰν $\chi \in \left(0, \frac{3\pi}{2} \right)$, νὰ ἐπιλυθῆ καὶ διερευνηθῆ ἡ εξίσωση: $\lambda\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi = 1 - 3\lambda$

13) Νὰ ἐπιλυθῆ καὶ διερευνηθῆ ἡ ὡς πρὸς χ εξίσωση: $\sigma\upsilon\nu^2\chi + \sigma\upsilon\nu^2(\alpha - \chi) = \lambda$ ($\alpha, \lambda \in \mathbb{R}$)

14) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι εξισώσεις :

$$1) \epsilon\phi(\pi\eta\mu\chi) = \sigma\phi(\pi\sigma\upsilon\nu\chi)$$

$$3) 8 \sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu 2\chi \sigma\upsilon\nu 4\chi = 1$$

$$5) \epsilon\phi \left(\frac{\pi}{4} - \chi \right) + \epsilon\phi \left(\frac{\pi}{4} + \chi \right) = \sqrt{\frac{8\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}}$$

$$7) (\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi + \epsilon\phi\chi)^3 = \eta\mu^3\chi + \sigma\upsilon\nu^3\chi + \epsilon\phi^3\chi$$

$$9) (\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi) \left(1 + \frac{2}{\eta\mu 2\chi} \right) + \epsilon\phi\chi + \sigma\phi\chi + 2 = 0$$

$$10) \eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu \frac{2\chi}{3} = 2\eta\mu^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\chi}{6} \right)$$

$$11) \eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi - \eta\mu^3 \alpha \sigma\upsilon\nu\chi - \sigma\upsilon\nu^3 \alpha \eta\mu\chi = 0$$

$$12) \eta\mu\chi + \eta\mu 2\chi + \dots + \eta\mu(n\chi) = 0$$

$$2) \eta\mu(\pi\sigma\upsilon\nu\chi) = \sigma\upsilon\nu(\pi\eta\mu\chi)$$

$$4) \eta\mu^3\chi = 4\eta\mu\chi \eta\mu 2\chi \eta\mu 4\chi$$

$$6) 8\eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu 2\chi \sigma\upsilon\nu 4\chi = 1$$

$$8) \sigma\upsilon\nu 7\chi = 2\eta\mu\chi \eta\mu 2\chi (5 - 8\sigma\upsilon\nu^2\chi)$$

15) Νὰ ἐπιλυθοῦν καὶ διερευνηθοῦν αἱ κάτωθι εξισώσεις:

$$1) \sqrt{1 + \sigma\upsilon\nu^2\chi} + \sqrt{1 + \eta\mu^2\chi} = \sqrt{\lambda}, \lambda > 0$$

$$2) (\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi + \lambda\epsilon\phi\chi)^3 = \eta\mu^3\chi + \sigma\upsilon\nu^3\chi + \lambda^3\epsilon\phi^3\chi$$

$$3) \eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi + \epsilon\phi\chi + \sigma\phi\chi + \tau\epsilon\mu\chi + \sigma\tau\epsilon\mu\chi = \lambda$$

$$4) \eta\mu^3\chi + \sigma\upsilon\nu^3\chi = \kappa, \kappa \in \mathbb{Z} \text{ (ἀποδείξάτε πρώτον, ότι: } -1 \leq \eta\mu^3\chi + \sigma\upsilon\nu^3\chi \leq 1\text{)}.$$

$$5) \lambda \sqrt{\lambda^2 \eta\mu^2\chi + 1} = \sigma\upsilon\nu\chi, \lambda > 0 \text{ και } \chi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

6) Νά εὑρεθοῦν τὰ ἐντὸς τοῦ διαστήματος $[0, 2\pi]$ τόξα, τὰ ὁποῖα ἐπαληθεύουν τὴν ἐξίσωσιν :

$$\sigma\upsilon\nu 2\chi = \sqrt{2}(\sigma\upsilon\nu^3\chi + \eta\mu^3\chi - \eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu^2\chi - \sigma\upsilon\nu\chi \eta\mu^2\chi).$$

7) Νά εὑρεθῆ ἡ ἰκανὴ καὶ ἀναγκαῖα συνθήκη, ἵνα ἡ ἐξίσωσις $\mu\sigma\upsilon\nu\chi - (2\mu + 1)\eta\mu\chi = \mu \xi\chi\eta$ δύο λύσεις χ_1, χ_2 τοιαύτας, ὥστε:

$$\alpha) |\chi_1 - \chi_2| = \frac{\pi}{2}$$

$$\beta) \chi_1 + \chi_2 = \frac{3\pi}{2}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. Βασικαὶ ἔννοιαι — ὀρισμοὶ

1.1. Ἐν σύστημα ἐξισώσεων, ἐκ τῶν ὁποίων μία τοῦλάχιστον εἶναι τριγωνομετρική, καλεῖται **τριγωνομετρικὸν σύστημα**. Ἐννοεῖται, ὅτι αἱ ἀλγεβρικοὶ ἐξισώσεις ἑνὸς τριγωνομετρικοῦ συστήματος, ἐὰν ὑπάρχουν, εἶναι ἐν γένει ἐξισώσεις ὡς πρὸς τὰ ἄγνωστα τόξα τῶν τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος τούτου.

Αἱ ἐφαρμοζόμεναι μέθοδοι διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν τριγωνομετρικῶν συστημάτων εἶναι ἐν γένει ἀνάλογοι πρὸς ἐκείνας τῶν τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων, δὲν ὑπάρχει δὲ μία γενικὴ μέθοδος διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν συστημάτων τούτων.

Κατὰ τὴν ἐπίλυσιν ἑνὸς τριγωνομετρικοῦ συστήματος, ἐπιδιώκομεν πάντοτε νὰ εὑρωμεν ἰσοδύναμον ἀλγεβρικὸν σύστημα καὶ δι' αὐτοῦ νὰ προσδιορίσωμεν τὰ ἄγνωστα τόξα.

2. Συστήματα δύο ἐξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους

Κατωτέρω ἀναφέρομεν ὀρισμένας βασικὰς κατηγορίας τριγωνομετρικῶν συστημάτων δύο ἐξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους.

2.1. Ἡ μία τῶν ἐξισώσεων εἶναι ἀλγεβρική. Τὰ βασικώτερα συστήματα τῆς κατηγορίας αὐτῆς εἶναι τὰ κάτωθι:

$$(A) \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \eta \mu \chi + \varepsilon_2 \eta \mu \psi = \beta \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \sigma \nu \chi + \varepsilon_2 \sigma \nu \psi = \beta \end{array} \right\}$$

$$(B) \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \eta \mu \chi \eta \mu \psi = \beta \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \eta \mu \chi \sigma \nu \psi = \beta \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \sigma \nu \chi \sigma \nu \psi = \beta \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{l}
 (\Gamma) \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \varepsilon \phi \chi + \varepsilon_2 \varepsilon \phi \psi = \beta \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \varepsilon \phi \chi \varepsilon \phi \psi = \beta \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \frac{\varepsilon \phi \chi}{\varepsilon \phi \psi} = \beta \end{array} \right\} \\
 (\Delta) \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \sigma \phi \chi + \varepsilon_2 \sigma \phi \psi = \beta \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \sigma \phi \chi \sigma \phi \psi = \beta \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \frac{\sigma \phi \chi}{\sigma \phi \psi} = \beta \end{array} \right\} \\
 (E) \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \frac{\eta \mu \chi}{\eta \mu \psi} = \beta \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \varepsilon_1 \psi = \alpha \\ \frac{\sigma \nu \nu \chi}{\sigma \nu \nu \psi} = \alpha \end{array} \right\}
 \end{array}$$

Εἰς ὅλα τὰ ἀνωτέρω συστήματα τὰ ε_1 καὶ ε_2 λαμβάνουν τὰς τιμὰς 1 ἢ -1 καὶ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Κατὰ τὴν λύσιν ἑνὸς ἐκάστου τῶν ἀνωτέρω συστημάτων ἐπιδιώκομεν νὰ εὐρῶμεν ἐκ τῆς δευτέρας τῶν ἐξισώσεων τὸ ἄθροισμα ἢ τὴν διαφορὰν τῶν τῶν χ καὶ ψ , ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς πρώτης ἐξισώσεως δίδεται ἡ διαφορὰ ἢ τὸ ἄθροισμα τούτων ἀντιστοίχως.

2.1.1. Ἐπίλυσις τοῦ συστήματος :
$$\left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \eta \mu \chi + \eta \mu \psi = \beta \end{array} \right. \quad (\Sigma)$$

Τὸ δοθὲν σύστημα ἰσοδυνάμως γράφεται:

$$(\Sigma) \iff \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ 2\eta \mu \frac{\chi + \psi}{2} \sigma \nu \nu \frac{\chi - \psi}{2} = \beta \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ 2\eta \mu \frac{\alpha}{2} \sigma \nu \nu \frac{\chi - \psi}{2} = \beta \end{array} \right. \quad (1)$$

Διὰ τὴν λύσιν τῆς ἐξισώσεως (1) διακρίνομεν τὰς ἐξῆς περιπτώσεις:

i) Ἐὰν $\eta \mu \frac{\alpha}{2} \neq 0$ ($\iff \alpha \neq 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$), τότε ἡ ἐξισώσις (1) γράφεται:

$\sigma \nu \nu \frac{\chi - \psi}{2} = \frac{\beta}{2\eta \mu \frac{\alpha}{2}}$, ἡ ὁποία εἶναι μία θεμελιώδης τριγωνομετρικὴ ἐξισώσις. Ἐὰν

$\left| \frac{\beta}{2\eta \mu \frac{\alpha}{2}} \right| > 1$, αὕτη εἶναι ἀδύνατος καὶ συνεπῶς τὸ σύστημα εἶναι ἀδύνατον.

Ἐὰν $\left| \frac{\beta}{2\eta \mu \frac{\alpha}{2}} \right| \leq 1$, τότε ὑπάρχει τόσον ϕ τοιοῦτον, ὥστε $\sigma \nu \nu \phi = \frac{\beta}{2\eta \mu \frac{\alpha}{2}}$ καὶ

ἡ ἐξισώσις γράφεται $\sigma \nu \nu \frac{\chi - \psi}{2} = \sigma \nu \nu \phi$. Ἡ γενικὴ λύσις ταύτης εἶναι $\chi - \psi = 4k\pi \pm 2\phi$ ($k \in \mathbb{Z}$), ὁπότε τὸ σύστημα (Σ) εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὰ ἀκόλουθα δύο ἀλγεβρικὰ συστήματα:

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \chi - \psi = 4k\pi + 2\phi \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \chi - \psi = 4k\pi - 2\phi \end{array} \right\} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Αί λύσεις τῶν συστημάτων τούτων ἀντιστοίχως εἶναι: $\left\{ \chi = 2κπ + φ + \frac{\alpha}{2}, \psi = -2κπ - φ + \frac{\alpha}{2} \right\}$ καὶ $\left\{ \chi = 2κπ - φ + \frac{\alpha}{2}, \psi = -2κπ + φ + \frac{\alpha}{2} \right\}$, ὅπου $κ \in \mathbb{Z}$ καὶ $\alpha \neq 2κπ$.

ii) Ἐὰν $\eta\mu\frac{\alpha}{2} = 0$ ($\Leftrightarrow \alpha = 2κπ, κ \in \mathbb{Z}$), τότε, ἐὰν μὲν $\beta \neq 0$, ἡ ἐξίσωσις (1) εἶναι ἀδύνατος καὶ συνεπῶς τὸ σύστημα εἶναι ἀδύνατον, ἐὰν δὲ $\beta = 0$, ἡ (1) εἶναι ἀόριστος. Ἐκ τούτου συνάγεται, ὅτι ἡ ἐξίσωσις (1) ἐπαληθεύεται διὰ κάθε ζευγὸς (χ, ψ) τῶν καὶ συνεπῶς ἡ λύσις τοῦ συστήματος εἶναι: $\chi = \theta, \psi = \alpha - \theta$ μὲ $\theta \in \mathbb{R}$ (τυχόν).

*Αναλόγως ἐπιλύονται τὰ ὑπόλοιπα συστήματα τῆς ομάδος (A).

Παρατήρησις. Ἡ συνθήκη δυνατότητος τοῦ ἀνωτέρω ἐπιλυθέντος συστήματος (Σ) εἶναι:

$$\left| \frac{\beta}{2\eta\mu\frac{\alpha}{2}} \right| \leq 1 \Leftrightarrow \beta^2 \leq 4\eta\mu^2\frac{\alpha}{2}. \text{ Τὴν συνθήκην ταύτην εὐρίσκομεν καὶ ὡς ἑξῆς: Ἐκ τῆς πρώτης}$$

τῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος (Σ) ἔχομεν $\psi = \alpha - \chi$, ὁπότε ἡ δευτέρα τῶν ἐξισώσεων γράφεται:

$$\eta\mu\chi + \eta\mu(\alpha - \chi) = \beta \Leftrightarrow \eta\mu\chi + \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\chi - \eta\mu\alpha\eta\mu\chi = \beta \Leftrightarrow$$

$$(1 - \sigma\upsilon\alpha)\eta\mu\chi + \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\chi = \beta \quad (E).$$

*Ἡ τελευταία ἐξίσωσις εἶναι τῆς μορφῆς $\alpha\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\chi = \gamma$, διὰ τὴν ὁποῖαν ἡ συνθήκη δυνατότητος εἶναι $\alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2$. Ἡ συνθήκη αὕτη διὰ τὴν (E) εἶναι:

$$(1 - \sigma\upsilon\alpha)^2 + \eta\mu^2\alpha \geq \beta^2 \Leftrightarrow 4\eta\mu^2\frac{\alpha}{2} \geq \beta^2.$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα:
$$\begin{cases} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ \eta\mu\chi - \eta\mu\psi = \frac{1}{2} \end{cases}$$

***Ἐπίλυσις:** Τὸ σύστημα τοῦτο ἰσοδυνάμως γράφεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ 2\eta\mu\frac{\chi - \psi}{2}\sigma\upsilon\upsilon\eta\frac{\chi + \psi}{2} = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ 2\eta\mu\frac{\pi}{6}\sigma\upsilon\upsilon\eta\frac{\chi + \psi}{2} = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ \sigma\upsilon\upsilon\eta\frac{\chi + \psi}{2} = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ \chi + \psi = 4κπ \pm \frac{2\pi}{3} \quad (κ \in \mathbb{Z}) \end{array} \right.$$

*Ἄρα, τὸ πρὸς ἐπίλυσιν σύστημα εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὰ κάτωθι δύο ἀλγεβρικὰ συστήματα:

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ \chi + \psi = 4κπ + \frac{2\pi}{3} \end{array} \right\} \text{ καὶ } \left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ \chi + \psi = 4κπ - \frac{2\pi}{3} \end{array} \right\},$$

τά όποια επίλυονται εύκόλως και προσδιορίζομεν τὰ άγνωστα τόξα χ και ψ .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νά επίλυθῆ τὸ σύστημα:
$$\begin{cases} \chi + \psi = 3\pi \\ \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 1 \end{cases} \quad (\Sigma)$$

Επίλυσις: Ἐχομεν:

$$(\Sigma) \Leftrightarrow \begin{cases} \psi = 3\pi - \chi \\ \eta\mu\chi + \eta\mu(3\pi - \chi) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi = 3\pi - \chi \\ \eta\mu\chi + \eta\mu\chi = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \psi = 3\pi - \chi \\ \eta\mu\chi = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi = 3\pi - \chi \\ \chi = \kappa\pi + (-1)^\kappa \frac{\pi}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi = 3\pi - \kappa\pi - (-1)^\kappa \frac{\pi}{6} \\ \chi = \kappa\pi + (-1)^\kappa \frac{\pi}{6} \end{cases} \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$$

2.1.2. Επίλυσις τοῦ συστήματος:
$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \eta\mu\chi\eta\mu\psi = \beta \end{cases} \quad (\Sigma)$$

Τὸ δοθὲν σύστημα ἰσοδυνάμως γράφεται:

$$(\Sigma) \Leftrightarrow \begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \text{συν}(\chi - \psi) - \text{συν}(\chi + \psi) = 2\beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \text{συν}(\chi - \psi) - \text{συν}\alpha = 2\beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \text{συν}(\chi - \psi) = 2\beta + \text{συν}\alpha \end{cases} \quad (1)$$

Ἐὰν $|2\beta + \text{συν}\alpha| > 1$, ἡ ἐξίσωσις (1) εἶναι ἀδύνατος και συνεπῶς τὸ σύστημα εἶναι ἀδύνατον. Ἐὰν ὁμως $|2\beta + \text{συν}\alpha| \leq 1$, τότε δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τόξον φ τοιοῦτον, ὥστε $\text{συν}\varphi = 2\beta + \text{συν}\alpha$, ὁπότε ἡ ἐξίσωσις (1) γράφεται $\text{συν}(\chi - \psi) = \text{συν}\varphi$. Ἡ γενική λύσις αὐτῆς εἶναι $\chi - \psi = 2\kappa\pi \pm \varphi$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$) και συνεπῶς τὸ σύστημα (Σ) εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὰ ἐπόμενα δύο συστήματα:

$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \chi - \psi = 2\kappa\pi + \varphi \end{cases} (\Sigma_1), \quad \begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \chi - \psi = 2\kappa\pi - \varphi \end{cases} (\Sigma_2)$$

Εὐκόλως εὔρισκομεν ὅτι αἱ λύσεις τῶν συστημάτων (Σ_1) και (Σ_2) ἀντιστοίχως εἶναι:

$$\chi = \kappa\pi + \frac{\varphi}{2} + \frac{\alpha}{2}, \psi = -\kappa\pi - \frac{\varphi}{2} + \frac{\alpha}{2} \quad \text{και} \quad \chi = \kappa\pi - \frac{\varphi}{2} + \frac{\alpha}{2}, \psi = -\kappa\pi + \frac{\varphi}{2} + \frac{\alpha}{2}.$$

Παρατήρησις. Ἡ συνθήκη δυνατότητος ἐπιλύσεως τοῦ ἀνωτέρω συστήματος δύναται νὰ λάβῃ τὴν μορφήν $-\text{συν}^2 \frac{\alpha}{2} \leq \beta \leq \eta\mu^2 \frac{\alpha}{2}$ (διατί;). . .

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἐπιλύονται και τὰ ὑπόλοιπα συστήματα τῆς ὁμάδος (B).

2.1.3. Επίλυσις τοῦ συστήματος:
$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \epsilon\varphi\chi + \epsilon\varphi\psi = \beta \quad (\chi, \psi \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}) \end{cases} \quad (\Sigma)$$

Πρὸ τῆς λύσεως τοῦ συστήματος ὑπενθυμίζομεν, ὅτι ἡ συνάρτησις ἐφαπτομένη δὲν εἶναι ὠρισμένη (δὲν ἔχει ἔννοιαν πραγματικοῦ ἀριθμοῦ) διὰ τὰ τόξα $k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ καὶ συνεπῶς θὰ πρέπει νὰ ὑποθέσωμεν $\chi, \psi \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸ πρὸς λύσιν σύστημα (Σ) μετασχηματίζεται ἰσοδυνάμως ὡς ἑξῆς:

$$(\Sigma) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \frac{\eta\mu(\chi + \psi)}{\sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi} = \beta \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi} = \beta \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \beta \sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi = \eta\mu\alpha \end{array} \right\}$$

i) Ἐὰν $\beta \neq 0$, τότε ἡ δευτέρα ἐξίσωσις τοῦ τελευταίου συστήματος γράφεται: $\sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi = \frac{\eta\mu\alpha}{\beta}$ καὶ συνεπῶς ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὸ σύστημα:

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi = \frac{\eta\mu\alpha}{\beta} \end{array} \right.,$$

τὸ ὁποῖον ἐπιλύομεν ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὸ 2.1.2.

ii) Ἐὰν $\beta = 0$, τότε ἡ δευτέρα ἐξίσωσις τοῦ δοθέντος συστήματος (Σ) μετασχηματίζεται ὡς ἑξῆς:

$$\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 0 \Leftrightarrow \epsilon\phi\chi = -\epsilon\phi\psi \Leftrightarrow \epsilon\phi\chi = \epsilon\phi(-\psi) \Leftrightarrow \chi = k\pi - \psi, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \chi + \psi = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ἄρα, ἔχομεν νὰ ἐπιλύσωμεν τὸ σύστημα: $\left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \chi + \psi = k\pi \end{array} \right. \quad (k \in \mathbb{Z})$,

τὸ ὁποῖον προφανῶς εἶναι ἀδύνατον, ἐὰν $\alpha \neq k\pi$ διὰ κάθε $k \in \mathbb{Z}$ καὶ ἀόριστον, ἐὰν $\alpha = k\pi$ δι' ἓν $k \in \mathbb{Z}$.

2.1.4. Ἐπίλυσις τοῦ συστήματος: $\left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \epsilon\phi\chi \epsilon\phi\psi = \beta \end{array} \right. \quad (\chi, \psi \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}) \quad (\Sigma)$

Ἐκ τῆς δευτέρας τῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος (Σ) λαμβάνομεν:

$\frac{\eta\mu\chi \eta\mu\psi}{\sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi} = \beta$ καὶ ἐξ αὐτῆς, ἐφ' ὅσον $\beta \neq 1$, προκύπτει:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi + \eta\mu\chi \eta\mu\psi}{\sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi - \eta\mu\chi \eta\mu\psi} = \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \Leftrightarrow \frac{\sigma\upsilon\nu(\chi - \psi)}{\sigma\upsilon\nu(\chi + \psi)} = \frac{1 + \beta}{1 - \beta}.$$

Συνεπῶς ἔχομεν:

$$(\Sigma) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \frac{\sigma\upsilon\nu(\chi - \psi)}{\sigma\upsilon\nu(\chi + \psi)} = \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \frac{\sigma\upsilon\nu(\chi - \psi)}{\sigma\upsilon\nu\alpha} = \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu(\chi - \psi) = \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \sigma\upsilon\nu\alpha \end{array} \right\}$$

Εάν $\left| \frac{1+\beta}{1-\beta} \sigmaυνα \right| > 1$, το σύστημα είναι αδύνατον. Έστω $\left| \frac{1+\beta}{1-\beta} \sigmaυνα \right| \leq 1$.

Τότε η τελευταία εξίσωση επιλύεται κατά τα γνωστά και εύρισκομεν την διαφοράν $\chi - \psi$.

Εάν $\beta = 1$, η δεύτερα των εξισώσεων του δοθέντος συστήματος (Σ) μετασχηματίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} \epsilon\phi\chi \epsilon\phi\psi = 1 &\iff \epsilon\phi\chi = \sigma\phi\psi \iff \epsilon\phi\chi = \epsilon\phi\left(\frac{\pi}{2} - \psi\right) \iff \\ \chi = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} - \psi, \kappa \in \mathbb{Z} &\iff \psi + \chi = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ούτως έχομεν να επιλύσωμεν το σύστημα:

$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \chi + \psi = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \quad (\kappa \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

Το σύστημα τούτο είναι αδύνατον, ἐφ' ὅσον $\alpha \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ διὰ κάθε $\kappa \in \mathbb{Z}$

καὶ ἔχει λύσιν, ἐφ' ὅσον $\alpha = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ δι' ἕν $\kappa \in \mathbb{Z}$. Ἡ λύσις αὕτη εἶναι: $\chi = \theta$,

$\psi = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} - \theta$ μὲ $\kappa \in \mathbb{Z}$ καὶ $\theta \in \mathbb{R}$ (τυχόν).

Τονίζομεν ἰδιαιτέρως, ὅτι εἰς τὰς λύσεις τοῦ ἀνωτέρω συστήματος (Σ) ὑπάρχει ὁ περιορισμὸς $\chi, \psi \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$. π.χ. θὰ πρέπει εἰς τὰς τελευταίας εὐρεθείσας λύσεις νὰ εἶναι $\theta \neq 0$.

2.1.5. Επίλυσις τοῦ συστήματος :
$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \frac{\epsilon\phi\chi}{\epsilon\phi\psi} = \beta \end{cases} \quad (\Sigma)$$

Ἡ δεύτερα των εξισώσεων τοῦ συστήματος (Σ) ἔχει ἔννοιαν, ἐφ' ὅσον $\chi, \psi \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ καὶ $\psi \neq \kappa\pi$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$). Ἐν συνεχείᾳ αὕτη, βάσει γνωστῆς ἰδιότητος των ἀναλογιῶν καὶ μὲ $\beta \neq \pm 1$, γράφεται:

$$\frac{\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi}{\epsilon\phi\chi - \epsilon\phi\psi} = \frac{\beta + 1}{\beta - 1} \iff \frac{\eta\mu(\chi + \psi)}{\eta\mu(\chi - \psi)} = \frac{\beta + 1}{\beta - 1} \iff (\beta + 1)\eta\mu(\chi - \psi) = (\beta - 1)\eta\mu(\chi + \psi)$$

Οὕτω, τὸ δοθὲν σύστημα εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὸ ἀκόλουθον γνωστὸν σύστημα :

$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \eta\mu(\chi - \psi) = \frac{\beta - 1}{\beta + 1} \eta\mu\alpha \end{cases}$$

Ἀπομένει νὰ ἐξετάσωμεν τὰς περιπτώσεις $\beta = 1$ καὶ $\beta = -1$. Κατ' αὐτὰς

ή δευτέρα τῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος (Σ) λαμβάνει ἀπλουστέραν μορφήν καὶ οὕτως εὐρίσκομεν ἀμέσως ἀλεγβρικήν ἐξίσωσιν τῶν χ, ψ καὶ τὸ σύστημα ἐπιλύεται εὐκόλως.

Τὰ ὑπόλοιπα συστήματα τῆς ομάδος (Γ), ὡς καὶ τὰ συστήματα τῆς ομάδος (Δ), ἐπιλύονται ἀναλόγως.

2.1.6. Ἐπίλυσις τοῦ συστήματος :

$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu\psi} = \beta \quad (\psi \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}) \end{cases} \quad (\Sigma)$$

Ἐκ τῆς δευτέρας τῶν ἐξισώσεων, ἐφ' ὅσον $\beta \neq 1$, ἔχομεν:

$$\begin{aligned} \frac{\eta\mu\chi + \eta\mu\psi}{\eta\mu\chi - \eta\mu\psi} = \frac{\beta + 1}{\beta - 1} &\iff \frac{2\eta\mu\frac{\chi + \psi}{2} \operatorname{csc}\frac{\chi - \psi}{2}}{2\eta\mu\frac{\chi - \psi}{2} \operatorname{csc}\frac{\chi + \psi}{2}} = \frac{\beta + 1}{\beta - 1} \iff \\ &\text{εφ} \frac{\chi + \psi}{2} \operatorname{csc}\frac{\chi - \psi}{2} = \frac{\beta + 1}{\beta - 1} \end{aligned}$$

Ἄρα, τὸ σύστημα (Σ) ἰσοδυνάμως γράφεται:

$$(\Sigma) \iff \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \text{εφ} \frac{\chi + \psi}{2} \operatorname{csc}\frac{\chi - \psi}{2} = \frac{\beta + 1}{\beta - 1} \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = \alpha \\ \text{εφ} \frac{\alpha}{2} \operatorname{csc}\frac{\chi - \psi}{2} = \frac{\beta + 1}{\beta - 1} \end{array} \right. \quad (1)$$

($\alpha \neq 2k\pi + \pi, k \in \mathbb{Z}$)

i) Ἐὰν $\text{εφ} \frac{\alpha}{2} \neq 0$ ($\iff \alpha = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$), τότε ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὸ ἀκόλουθον γνωστὸν σύστημα:

$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \operatorname{csc}\frac{\chi - \psi}{2} = \frac{\beta + 1}{\beta - 1} \operatorname{csc}\frac{\alpha}{2} \end{cases}$$

ii) Ἐὰν $\text{εφ} \frac{\alpha}{2} = 0$ ($\iff \alpha = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$), τότε ἡ ἐξίσωσις (1) εἶναι ἀδύνατος, ἐφ' ὅσον $\beta \neq -1$ καὶ ἀόριστος, ἐὰν $\beta = -1$, ὁπότε αἱ λύσεις εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν εἶναι: $\chi = \frac{\alpha}{2} + \frac{\theta}{2}, \psi = \frac{\alpha}{2} - \frac{\theta}{2}$ μὲ $\theta \in \mathbb{R}$ (τυχόν).

Ἐξετάζομεν ἐπὶ πλέον τὴν περίπτωσιν $\alpha = 2k\pi + \pi$, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ $\text{εφ} \frac{\alpha}{2}$ δὲν ὀρίζεται καὶ συνεπῶς δὲν δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸν ἀνωτέρω ἐκτεθέντα τρόπον διὰ τὴν λύσιν τῆς ἐξισώσεως (1). Ἐὰν λοιπὸν εἶναι $\alpha = 2k\pi + \pi, k \in \mathbb{Z}$, τότε τὸ δοθὲν σύστημα γράφεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = 2k\pi + \pi \\ \frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu(2k\pi + \pi - \chi)} = \beta \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi = 2k\pi + \pi \\ 1 = \beta \end{array} \right\} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Το τελευταῖον σύστημα εἶναι ἀδύνατον, ἐφ' ὅσον $\beta \neq 1$ καὶ ἀόριστον, ἐὰν $\beta = 1$.

Ἐάν, τέλος, ὑποθέσωμεν ὅτι $\beta = 1$, ἡ δευτέρα τῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος (Σ) λαμβάνει ἀπλουστάτην μορφήν καὶ τὸ σύστημα λύεται εὐκόλως. Καθ' ὅμοιον ἀκριβῶς τρόπον ἐπιλύονται καὶ τὰ ὑπόλοιπα συστήματα τῆς ὁμάδος (E).

2.2. Συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὰ τόξα. Τὰ κλασσικὰ συστήματα τῆς κατηγορίας ταύτης εἶναι τὰ κάτωθι:

$$\left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \alpha \\ \sigmaυν\chi \sigmaυν\psi = \beta \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\chi \eta\mu\psi = \alpha \\ \sigmaυν\chi + \sigmaυν\psi = \beta \end{array} \right\},$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\chi \eta\mu\psi = \alpha \\ \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \beta \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \sigmaυν\chi \sigmaυν\psi = \alpha \\ \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \beta \end{array} \right\} \text{ κ.λ.π.}$$

Διὰ τὴν ἐπίλυσιν ἑνὸς συμμετρικοῦ τριγωνομετρικοῦ συστήματος, ἐπιδιώκομεν νὰ μετασχηματίσωμεν τοῦτο εἰς τρόπον, ὥστε νὰ ἐμφανισθοῦν ἀγνωστοὶ τὰ τόξα $\chi + \psi$ καὶ $\chi - \psi$.

2.2.1. Ἐπίλυσις τοῦ συστήματος : $\left\{ \begin{array}{l} \sigmaυν\chi \sigmaυν\psi = \alpha \\ \eta\mu\chi \eta\mu\psi = \beta \end{array} \right\} (\Sigma)$

Τὸ δοθὲν σύστημα μετασχηματίζεται ἰσοδυνάμως ὡς ἑξῆς:

$$(\Sigma) \iff \left\{ \begin{array}{l} \sigmaυν(\chi - \psi) + \sigmaυν(\chi + \psi) = 2\alpha \\ \sigmaυν(\chi - \psi) - \sigmaυν(\chi + \psi) = 2\beta \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} \sigmaυν(\chi - \psi) = \alpha + \beta \\ \sigmaυν(\chi + \psi) = \alpha - \beta \end{array} \right\}$$

Τὸ τελευταῖον σύστημα ἔχει λύσιν, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν $|\alpha + \beta| \leq 1$ καὶ $|\alpha - \beta| \leq 1$. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ὑπάρχουν τόξα $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{R}$ μὲ $\varphi_1, \varphi_2 \in [0, \pi]$, τοιαῦτα, ὥστε $\sigmaυν\varphi_1 = \alpha + \beta$ καὶ $\sigmaυν\varphi_2 = \alpha - \beta$ καὶ συνεπῶς τὸ σύστημα γράφεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigmaυν(\chi - \psi) = \sigmaυν\varphi_1 \\ \sigmaυν(\chi + \psi) = \sigmaυν\varphi_2 \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = 2κ\pi \pm \varphi_1 \\ \chi + \psi = 2\rho\pi \pm \varphi_2 \end{array} \right\} \quad (\kappa, \rho \in \mathbb{Z})$$

Ἦτοι τὸ δοθὲν σύστημα (Σ) εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὰ κάτωθι συστήματα :

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = 2κ\pi + \varphi_1 \\ \chi + \psi = 2\rho\pi + \varphi_2 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = 2κ\pi + \varphi_1 \\ \chi + \psi = 2\rho\pi - \varphi_2 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = 2κ\pi - \varphi_1 \\ \chi + \psi = 2\rho\pi + \varphi_2 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \chi - \psi = 2κ\pi - \varphi_1 \\ \chi + \psi = 2\rho\pi - \varphi_2 \end{array} \right\}$$

Τὰ ἀνωτέρω συστήματα εἶναι ἀλγεβρικὰ καὶ ἐπιλύονται εὐκόλως.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα : $\left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 1 \\ \sigmaυν\chi \sigmaυν\psi = \frac{3}{4} \end{array} \right\} (\Sigma)$

$$\text{Λύσεις: } \text{Έχουμε: } (\Sigma) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\eta\mu \frac{\chi+\psi}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\chi-\psi}{2} = 1 \\ \sigma\upsilon\nu(\chi-\psi) + \sigma\upsilon\nu(\chi+\psi) = \frac{3}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \eta\mu \frac{\chi+\psi}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\chi-\psi}{2} = \frac{1}{2} \\ 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\chi-\psi}{2} - 1 + 1 - 2\eta\mu^2 \frac{\chi+\psi}{2} = \frac{3}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu \frac{\chi+\psi}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\chi-\psi}{2} = \frac{1}{2} \\ \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\chi-\psi}{2} - \eta\mu^2 \frac{\chi+\psi}{2} = \frac{3}{4} \end{array} \right.$$

Έν συνεχείᾳ, θέτοντες $\eta\mu \frac{\chi+\psi}{2} = \omega$ καὶ $\sigma\upsilon\nu \frac{\chi-\psi}{2} = \varphi$, ἔχομεν πρὸς ἐπιλύσιν τὸ ἀλγεβρικὸν σύστημα: $\{\omega\varphi = \frac{1}{2}, \varphi^2 - \omega^2 = \frac{3}{4}\}$. Αἱ λύσεις αὐτοῦ εἶναι $\varphi = 1, \omega = \frac{1}{2}$ καὶ $\varphi = -1, \omega = -\frac{1}{2}$, ὁπότε ἀναγόμεθα εἰς τὰ κάτωθι τριγωνομετρικὰ συστήματα:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma\upsilon\nu \frac{\chi-\psi}{2} = 1 \\ \eta\mu \frac{\chi+\psi}{2} = \frac{1}{2} \end{array} \right\} (\Sigma_1), \quad \left\{ \begin{array}{l} \sigma\upsilon\nu \frac{\chi-\psi}{2} = -1 \\ \eta\mu \frac{\chi+\psi}{2} = -\frac{1}{2} \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

Τὸ σύστημα (Σ_1) εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὰ ἀκόλουθα ἀλγεβρικὰ συστήματα:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\chi-\psi}{2} = 2\kappa\pi \\ \frac{\chi+\psi}{2} = 2\lambda\pi + \frac{\pi}{6} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\chi-\psi}{2} = 2\kappa\pi \\ \frac{\chi+\psi}{2} = 2\lambda\pi + \frac{5\pi}{6} \end{array} \right\} (\kappa, \lambda \in \mathbb{Z})$$

Ἐκ τοῦ πρώτου εὐρίσκομεν: $\chi = 2(\kappa + \lambda)\pi + \frac{\pi}{6}, \psi = 2(\lambda - \kappa)\pi + \frac{\pi}{6}$

Ἐκ τοῦ δευτέρου εὐρίσκομεν: $\chi = 2(\kappa + \lambda)\pi + \frac{5\pi}{6}, \psi = 2(\lambda - \kappa)\pi + \frac{5\pi}{6}$

Ὁμοίως ἐπιλύεται καὶ τὸ σύστημα (Σ_2) .

2.3. Ἐκ μιᾶς τοῦλάχιστον τῶν τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος προκύπτει ἀμέσως ἀλγεβρική ἐξίσωσις τῶν ἀγνώστων τόξων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα: $\left\{ \begin{array}{l} \sigma\upsilon\nu(\chi + \psi) = 1 \\ 2\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 0 \end{array} \right\} (\Sigma)$

Λύσις: Ἐκ τῆς πρώτης τῶν ἐξισώσεων τοῦ δοθέντος συστήματος (Σ) λαμβάνομεν:

$$\sigma\upsilon\nu(\chi + \psi) = \sigma\upsilon\nu 0 \Leftrightarrow \chi + \psi = 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \psi = 2\kappa\pi - \chi, \kappa \in \mathbb{Z}$$

*Αντικαθιστώντες εις την δευτέραν των εξισώσεων του (Σ), έχομεν:
 $2\eta\mu\chi + \eta\mu(2\kappa\pi - \chi) = 0 \Leftrightarrow 2\eta\mu\chi - \eta\mu\chi = 0 \Leftrightarrow \eta\mu\chi = 0 \Leftrightarrow \eta\mu\chi = 0 \Leftrightarrow$
 $\chi = \rho\pi, \rho \in \mathbb{Z}$

*Αρα, η λύσις του συστήματος είναι: $\chi = \rho\pi, \psi = 2\kappa\pi - \rho\pi (\kappa, \rho \in \mathbb{Z})$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νά λυθῆ τὸ σύστημα:
$$\begin{cases} \eta\mu\chi = \eta\mu(\psi + \frac{\pi}{4}) \\ \eta\mu(\frac{\pi}{4} - \chi) = 2\eta\mu^2\frac{\psi}{2} + \sigma\upsilon\nu(\psi + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

*Εκ τῆς πρώτης τῶν εξισώσεων εὐρίσκομεν τὰς ἀλγεβρικὰς εξισώσεις:

$$(\chi = 2\kappa\pi + \psi + \frac{\pi}{4}, \chi = 2\kappa\pi + \pi - \psi - \frac{\pi}{4}) \Leftrightarrow$$

$$(\chi = 2\kappa\pi + \psi + \frac{\pi}{4}, \chi = 2\kappa\pi - \psi + \frac{3\pi}{4}).$$

*Εξ ἄλλου, ἡ δευτέρα τῶν εξισώσεων τοῦ δοθέντος συστήματος γράφεται:
 $\eta\mu(\frac{\pi}{4} - \chi) = 1 - \sigma\upsilon\nu\psi - \eta\mu\psi$. Συνεπῶς, τὸ πρὸς ἐπίλυσιν σύστημα εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὰ κάτωθι δύο συστήματα:

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi = 2\kappa\pi + \psi + \frac{\pi}{4} \\ \eta\mu(\frac{\pi}{4} - \chi) = 1 - \sigma\upsilon\nu\psi - \eta\mu\psi \end{array} \right\} (\Sigma_1) \text{ καὶ } \left\{ \begin{array}{l} \chi = 2\kappa\pi - \psi + \frac{3\pi}{4} \\ \eta\mu(\frac{\pi}{4} - \chi) = 1 - \sigma\upsilon\nu\psi - \eta\mu\psi \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

*Ἐν συνεχείᾳ ἔχομεν:

$$(\Sigma_1) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi = 2\kappa\pi + \psi + \frac{\pi}{4} \\ \eta\mu(\frac{\pi}{4} - 2\kappa\pi - \psi - \frac{\pi}{4}) = 1 - \sigma\upsilon\nu\psi - \eta\mu\psi \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi = 2\kappa\pi + \psi + \frac{\pi}{4} \\ -\eta\mu\psi = 1 - \sigma\upsilon\nu\psi - \eta\mu\psi \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi = 2\kappa\pi + \psi + \frac{\pi}{4} \\ \sigma\upsilon\nu\psi = 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi = 2\kappa\pi + \psi + \frac{\pi}{4} \\ \psi = 2\lambda\pi \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi = 2(\kappa + \lambda)\pi + \frac{\pi}{4} \\ \psi = 2\lambda\pi \end{array} \right\} (\kappa, \lambda \in \mathbb{Z})$$

*Ἀναλόγως, ἐπιλύοντες τὸ (Σ₂) εὐρίσκομεν:
$$\left\{ \begin{array}{l} \chi = 2(\kappa - \lambda)\pi + \frac{\pi}{4} \\ \psi = 2\lambda\pi + \frac{\pi}{2} \end{array} \right\} (\kappa, \lambda \in \mathbb{Z})$$

3. Συστήματα περισσοτέρων τῶν δύο ἀγνώστων

Ἐπιλύομεν κατωτέρω ἓν χαρακτηριστικὸν σύστημα τριῶν ἀγνώστων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ σύστημα:
$$\begin{cases} \chi + \psi + \omega = \pi \\ \frac{\sigma\phi\chi}{\alpha} = \frac{\sigma\phi\psi}{\beta} = \frac{\sigma\phi\omega}{\gamma} \quad (\alpha\beta\gamma \neq 0) \quad (\Sigma) \end{cases}$$

Ἐπίλυσις: Γνωρίζομεν ὅτι, ἐὰν $\chi + \psi + \omega = \pi$, τότε $\sigma\phi\chi \sigma\phi\psi + \sigma\phi\psi \sigma\phi\omega + \sigma\phi\omega \sigma\phi\chi = 1$. Συνεπῶς ἔχομεν:

$$(\Sigma) \Leftrightarrow \begin{cases} \sigma\phi\chi \sigma\phi\psi + \sigma\phi\psi \sigma\phi\omega + \sigma\phi\omega \sigma\phi\chi = 1 & (1) \\ \chi + \psi + \omega = \pi & (2) \\ \sigma\phi\chi = \lambda\alpha & (3) \quad (\Sigma') \\ \sigma\phi\psi = \lambda\beta & (4) \\ \sigma\phi\omega = \lambda\gamma & (5) \end{cases}$$

Ἡ (1), δυνάμει τῶν (3), (4) καὶ (5), γράφεται $\lambda^2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) = 1$. Παρατηροῦμεν, ὅτι, ἐὰν μὲν $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha \leq 0$, τὸ σύστημα εἶναι ἀδύνατον, ἐὰν δὲ $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha > 0$, τότε $\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}}$. Θέτομεν

$\frac{1}{\sqrt{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}} = \lambda_1$ καὶ $\frac{-1}{\sqrt{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}} = \lambda_2$. Τὸ σύστημα (Σ') εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὰ κάτωθι δύο συστήματα:

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi + \omega = \pi \\ \sigma\phi\chi = \lambda_1\alpha \\ \sigma\phi\psi = \lambda_1\beta \\ \sigma\phi\omega = \lambda_1\gamma \end{array} \right\} (\Sigma_1) \quad \text{καὶ} \quad \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi + \omega = \pi \\ \sigma\phi\chi = \lambda_2\alpha \\ \sigma\phi\psi = \lambda_2\beta \\ \sigma\phi\omega = \lambda_2\gamma \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

Ἐστώσαν ω_1, ω_2 καὶ ω_3 τὰ τόξα τοῦ διαστήματος $(0, \pi)$ τοιαῦτα, ὥστε $\sigma\phi\omega_1 = \lambda_1\alpha$, $\sigma\phi\omega_2 = \lambda_1\beta$ καὶ $\sigma\phi\omega_3 = \lambda_1\gamma$. Τότε ἔχομεν:

$$(\Sigma_1) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi + \omega = \pi \\ \sigma\phi\chi = \sigma\phi\omega_1 \\ \sigma\phi\psi = \sigma\phi\omega_2 \\ \sigma\phi\omega = \sigma\phi\omega_3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi + \psi + \omega = \pi \\ \chi = \kappa_1\pi + \omega_1 \\ \psi = \kappa_2\pi + \omega_2 \\ \omega = \kappa_3\pi + \omega_3 \end{array} \right\} (\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3 \in \mathbb{Z})$$

Ἐκ τοῦ τελευταίου συστήματος λαμβάνομεν:

$$\chi + \psi + \omega = (\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3)\pi + \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 \Leftrightarrow \pi - (\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3)\pi = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3$$

Ἐπειδὴ ὁμως $\omega_i \in (0, \pi)$, ($i = 1, 2, 3$), συνάγεται:

$$0 < \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 < 3\pi \Leftrightarrow 0 < \pi - (\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3)\pi < 3\pi \Leftrightarrow -2 < \kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3 < 1 \Leftrightarrow (\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3) \in \{-1, 0\}$$

Ἄρα, ἡ γενικὴ λύσις τοῦ συστήματος (Σ_1) εἶναι:

$$\chi = \kappa_1\pi + \omega_1, \quad \psi = \kappa_2\pi + \omega_2, \quad \omega = \kappa_3\pi + \omega_3 \quad \text{μὲ} \quad (\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3) \in \{-1, 0\}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

18) Να επιλυθούν τα κάτωθι συστήματα :

$$\begin{array}{lll}
 1) \begin{cases} \chi + \psi = \frac{2\pi}{3} \\ \eta\mu\chi \eta\mu\psi = \frac{3}{4} \end{cases} & 2) \begin{cases} \chi + \psi = \frac{\pi}{4} \\ \eta\mu^2\chi + \eta\mu^2\psi = \frac{3 + \sqrt{3}}{4} \end{cases} & 3) \begin{cases} \chi - \psi = \frac{\pi}{6} \\ \frac{\epsilon\phi\chi}{\epsilon\phi\psi} = 3 \end{cases} \\
 4) \begin{cases} \chi + \psi = \frac{\pi}{4} \\ \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 1 \end{cases} & 5) \begin{cases} \chi - \psi = \frac{\pi}{12} \\ \epsilon\phi\chi = \sqrt{3} \epsilon\phi\psi \end{cases} & 6) \begin{cases} \chi + \psi = \frac{4\pi}{3} \\ \frac{\sigma\upsilon\nu\chi}{\sigma\upsilon\nu\psi} = -\frac{1}{2} \end{cases} \\
 7) \begin{cases} \chi + \psi = \frac{\pi}{4} \\ \sigma\phi\chi - \sigma\phi\psi = 2 \end{cases} & 8) \begin{cases} \chi + \psi = \frac{\pi}{6} \\ \eta\mu 2\chi + \eta\mu 2\psi = \frac{1}{2} \end{cases} &
 \end{array}$$

19) Να επιλυθούν τα κάτωθι συστήματα:

$$\begin{array}{ll}
 1) \begin{cases} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ \sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu\psi = 2\sqrt{6} \sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi \end{cases} & 2) \begin{cases} \chi - \psi = \frac{\pi}{3} \\ 3(\eta\mu\chi - \eta\mu\psi) + 4\eta\mu\chi \eta\mu\psi = 3 \end{cases} \\
 3) \begin{cases} \chi + 2\psi = \frac{\pi}{2} \\ 3\epsilon\phi\chi + 12\epsilon\phi\psi = 5\sqrt{3} \end{cases} &
 \end{array}$$

20) Να επιλυθούν τα κάτωθι συστήματα:

$$\begin{array}{lll}
 1) \begin{cases} 2\sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi = 1 \\ \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 2 \end{cases} & 2) \begin{cases} \eta\mu\chi \eta\mu\psi = \frac{1}{4} \\ \sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi = \frac{3}{4} \end{cases} & 3) \begin{cases} \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 2\sqrt{3} \\ \sigma\phi\chi + \sigma\phi\psi = 2\sqrt{3} \end{cases} \\
 4) \begin{cases} \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \sqrt{2} \\ \eta\mu 3\chi + \eta\mu 3\psi = \sqrt{2} \end{cases} & 5) \begin{cases} \sigma\upsilon\nu 2\chi + \sigma\upsilon\nu 2\psi = \frac{1}{2} \\ 2(\eta\mu\chi + \eta\mu\psi) = 1 + \sqrt{2} \end{cases} & 6) \begin{cases} \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 0 \\ \sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi = \frac{3}{4} \end{cases} \\
 7) \begin{cases} \eta\mu\chi - \eta\mu\psi = 1 \\ \sigma\upsilon\nu\chi \sigma\upsilon\nu\psi = -\frac{3}{4} \end{cases} & 8) \begin{cases} \eta\mu\chi \eta\mu\psi = \frac{1}{2} \\ \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 2 \end{cases} & 9) \begin{cases} \eta\mu 2\chi + \eta\mu 2\psi = 1 \\ \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 4 \end{cases} \\
 10) \begin{cases} 2\eta\mu(\chi - \psi) = 1 \\ 2\sigma\upsilon\nu(\chi + \psi) = 1 \end{cases} & 11) \begin{cases} 9\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 4 \\ 2\sigma\phi\chi + 4\sigma\phi\psi = 1 \end{cases} & 12) \begin{cases} 2\eta\mu\chi \eta\mu\psi = 1 \\ 2(\sigma\upsilon\nu 2\psi - \sigma\upsilon\nu 2\chi) = 1 \end{cases}
 \end{array}$$

21) Να επιλυθούν και διερευνηθούν τα κάτωθι συστήματα:

$$\begin{array}{lll}
 1) \begin{cases} \chi + \psi = \alpha \ (\alpha \in \mathbb{R}) \\ \eta\mu^2\chi + \eta\mu^2\psi = 1 - \sigma\upsilon\nu\alpha \end{cases} & 2) \begin{cases} \frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu\psi} = \alpha \\ \chi - \psi = \beta \end{cases} & 3) \begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \eta\mu^2\chi - \eta\mu^2\psi = \beta \end{cases} \\
 4) \begin{cases} \chi + \psi = 2\alpha \\ \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \beta(\eta\mu\chi - \eta\mu\psi) \end{cases} & 5) \begin{cases} \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 2\lambda\eta\mu\alpha \\ \sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu\psi = 2\lambda\sigma\upsilon\nu\alpha \end{cases} & 6) \begin{cases} \eta\mu\chi \eta\mu\psi = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu\psi = \beta \end{cases} \\
 7) \begin{cases} \sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu\psi = \alpha \\ \epsilon\phi \frac{\chi}{2} + \epsilon\phi \frac{\psi}{2} = \beta \end{cases} & 8) \begin{cases} \sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu\psi = 1 \\ \sigma\upsilon\nu \frac{\chi}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{\psi}{2} = \lambda \end{cases} &
 \end{array}$$

22) Νά επιλυθούν τὰ κάτωθι συστήματα:

$$1) \begin{cases} \sin\chi \eta\mu\psi + \epsilon\phi\chi \epsilon\phi\psi = 0 \\ \epsilon\phi\chi \epsilon\phi\psi = 1 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \sin\chi + \sin\psi = \sqrt{2} \\ \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 2\eta\mu(\chi + \psi) \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} \eta\mu\chi = \eta\mu\left(\psi + \frac{\pi}{4}\right) \\ \eta\mu\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) = 2\eta\mu^2\frac{\psi}{2} + \sin\left(\psi + \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} \eta\mu\chi = \sin 2\psi \\ \sin\psi = \eta\mu 2\chi \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} \left(\eta\mu\frac{\chi+\psi}{2} - \sin\frac{\chi-\psi}{2}\right)^2 = 1 - \eta\mu\chi \\ \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \frac{3}{2} \end{cases}$$

23) Νά επιλυθούν καί διερένηθούν τὰ συστήματα:

$$1) \begin{cases} \eta\mu\chi = \eta\mu(\psi + \alpha) \epsilon\phi\alpha \\ \eta\mu(\alpha - \chi) = 2\eta\mu^2\frac{\psi}{2} + \sin(\psi + 2\alpha) \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \epsilon\phi\chi = \lambda\epsilon\phi 2\psi \\ \epsilon\phi\psi = \lambda\epsilon\phi 2\chi \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} \eta\mu\psi = \lambda\eta\mu\chi \\ 2\sin\chi + \sin\psi = 1 \end{cases}$$

24) Νά επιλυθούν τὰ συστήματα:

$$1) \begin{cases} \chi + \psi + \omega = \pi \\ \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 3 \\ \epsilon\phi\psi + \epsilon\phi\omega = 4 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \sin\chi + \sin\psi = \sin\omega \\ \sin 2\chi + \sin 2\psi = \sin 2\omega \\ \sin 3\chi + \sin 3\psi = \sin 3\omega \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} \chi + \psi + \omega = \pi \\ \epsilon\phi\frac{\chi}{2} \epsilon\phi\frac{\chi}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{3} \\ \epsilon\phi\frac{\psi}{2} \epsilon\phi\frac{\omega}{2} = \sqrt{3} - \sqrt{2} \\ \chi, \psi, \omega \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} \epsilon\chi\phi + \epsilon\phi\psi + \epsilon\phi\omega = \epsilon\phi\chi \epsilon\phi\psi \epsilon\phi\omega \\ \sigma\phi\chi \sigma\phi\psi + \sigma\phi\psi \sigma\phi\omega + \sigma\phi\omega \sigma\phi\chi = 1 \\ \sin^2\chi + \sin^2\psi + \sin^2\omega - 2\sin\chi \sin\psi \sin\omega = 1 \end{cases}$$

25) Νά αποδειχθῆ ἡ ἰσοδυναμία:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin\alpha + \sin(\alpha + \chi) + \sin(\alpha + \psi) = 0 \\ \eta\mu\alpha + \eta\mu(\alpha + \chi) + \eta\mu(\alpha + \psi) = 0 \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} 1 + \sin\chi + \sin\psi = 0 \\ \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 0 \end{array} \right\} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

καί νά ἐπιλυθῆ τὸ σύστημα. Ἐάν (χ_0, ψ_0) εἶναι μία λύσις αὐτοῦ, δείξατε ὅτι τὰ πέρατα τῶν τόξων α , $\alpha + \chi_0$ καί $\alpha + \psi_0$, ἐπὶ τῆς περιφέρειᾶς τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου, ἀποτελοῦν κορυφὰς ἰσοπλεύρου τριγώνου.

26) Νά ἐπιλυθῆ τὸ σύστημα:

$$\begin{cases} \chi + \psi + \omega = \pi \\ \frac{\eta\mu\chi}{\alpha} = \frac{\eta\mu\psi}{\beta} = \frac{\eta\mu\omega}{\gamma}, \quad \alpha\beta\gamma \neq 0 \end{cases}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΑΛΟΙΦΗ

1. Ἡ ἔννοια τῆς ἀπαλοιφῆς

1.1. Ἡ ἔννοια τῆς ἀπαλοιφῆς καὶ τῆς ἀπαλειφούσης, ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς Ἀλγεβρας, ὑπάρχει εἰς παραμετρικὸν σύστημα, τοῦ ὁποῦ αἱ ἐξισώσεις εἶναι περισσότεραι τῶν ἀγνώστων.

Ἐστω ἐν τριγωνομετρικὸν παραμετρικὸν σύστημα μ ἐξισώσεων μὲν ἀγνώστων, ἐνθα $\mu > \nu$. Τὸ σύστημα τοῦτο, ὅπως καὶ εἰς τὴν Ἀλγεβραν, ἐνδέχεται νὰ ἔχη λύσιν ἢ νὰ μὴν ἔχη λύσιν. Δεχόμενοι ὅτι τὸ σύστημα ἔχει λύσιν, εὐρίσκομεν μίαν σχέσιν μεταξὺ τῶν παραμέτρων, τὴν ὁποίαν καλοῦμεν ἀπαλείφουσαν τοῦ συστήματος. Ἡ ἀπαλείφουσα, λοιπόν, ἐξ ὀρισμοῦ ἐκφράζει τὴν ἀναγκαίαν συνθήκην, ἵνα τὸ σύστημα ἔχη λύσιν. Ἡ ἐργασία δέ, διὰ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν τὴν ἀπαλείφουσαν, καλεῖται ἀπαλοιφή τῶν θεωρουμένων ἀγνώστων ἢ ἀπλῶς ἀπαλοιφή.

Κατωτέρω ἀναφέρομεν ὠρισμένα παραδείγματα ἀπαλοιφῆς.

1.1.1. Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος:
$$\begin{cases} \alpha \eta \mu \chi = \gamma \\ \beta \sigma \nu \chi = \delta \end{cases} \quad (\alpha \beta \neq 0)$$

Δεχόμεθα ὅτι τὸ σύστημα ἔχει λύσιν καὶ ἔστω $\chi = \chi_0$ μία λύσις αὐτοῦ. Τότε θὰ ἔχωμεν:

$$\begin{aligned} \alpha \eta \mu \chi_0 = \gamma \\ \beta \sigma \nu \chi_0 = \delta \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \eta \mu \chi_0 = \frac{\gamma}{\alpha} \\ \sigma \nu \chi_0 = \frac{\delta}{\beta} \end{cases} \Rightarrow \eta \mu^2 \chi_0 + \sigma \nu^2 \chi_0 = \left(\frac{\gamma}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\delta}{\beta}\right)^2 \Rightarrow \frac{\gamma^2}{\alpha^2} + \frac{\delta^2}{\beta^2} = 1$$

Ἡ τελευταία εὐρεθεῖσα σχέσηis εἶναι ἡ ζητούμενη ἀπαλείφουσα.

1.1.2. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος :
$$\begin{cases} \sigma\phi\chi (1+\eta\mu\chi) = 4\alpha \\ \sigma\phi\chi (1-\eta\mu\chi) = 4\beta \end{cases}$$

Ἐστω $\chi = \chi_0$ μία λύσις τοῦ δοθέντος συστήματος. Τότε θὰ ἔχωμεν:

$$\begin{cases} \sigma\phi\chi_0 (1+\eta\mu\chi_0) = 4\alpha \\ \sigma\phi\chi_0 (1-\eta\mu\chi_0) = 4\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma\phi\chi_0 + \sigma\upsilon\nu\chi_0 = 4\alpha \\ \sigma\phi\chi_0 - \sigma\upsilon\nu\chi_0 = 4\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma\phi\chi_0 = 2\alpha + 2\beta \\ \sigma\upsilon\nu\chi_0 = 2\alpha - 2\beta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\sigma\upsilon\nu\chi_0}{\eta\mu\chi_0} = 2\alpha + 2\beta \\ \sigma\upsilon\nu\chi_0 = 2\alpha - 2\beta \end{cases}$$

Ἐκ τῶν τελευταίων σχέσεων, ἐφ' ὅσον $\alpha^2 - \beta^2 \neq 0$, λαμβάνομεν:

$$\begin{cases} \eta\mu\chi_0 = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \\ \sigma\upsilon\nu\chi_0 = 2\alpha - 2\beta \end{cases} \Rightarrow \eta\mu^2\chi_0 + \sigma\upsilon\nu^2\chi_0 = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}\right)^2 + (2\alpha - 2\beta)^2 \Rightarrow$$

$$\left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}\right)^2 + 4(\alpha - \beta)^2 = 1,$$

ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ ζητούμενη ἀπαλείφουσα.

1.1.3. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος :

$$\begin{cases} \chi + \psi = \alpha \\ \epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = \epsilon\phi\beta \\ \sigma\phi\chi + \sigma\phi\psi = \sigma\phi\gamma \end{cases} \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R})$$

Ἐὰν (χ_0, ψ_0) εἶναι μία λύσις τοῦ δοθέντος συστήματος, τότε προκύπτει:

$$\begin{cases} \chi_0 + \psi_0 = \alpha \\ \epsilon\phi\chi_0 + \epsilon\phi\psi_0 = \epsilon\phi\beta \\ \sigma\phi\chi_0 + \sigma\phi\psi_0 = \sigma\phi\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \chi_0 + \psi_0 = \alpha \\ \frac{\eta\mu(\chi_0 + \psi_0)}{\sigma\upsilon\nu\chi_0 \sigma\upsilon\nu\psi_0} = \epsilon\phi\beta \\ \frac{\eta\mu(\chi_0 + \psi_0)}{\eta\mu\chi_0 \eta\mu\psi_0} = \sigma\phi\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \chi_0 + \psi_0 = \alpha \\ \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\chi_0 \sigma\upsilon\nu\psi_0} = \epsilon\phi\beta \\ \frac{\eta\mu\alpha}{\eta\mu\chi_0 \eta\mu\psi_0} = \sigma\phi\gamma \end{cases}$$

Ἐκ τῶν τελευταίων σχέσεων, ἐφ' ὅσον $\eta\mu\alpha \epsilon\phi\beta \sigma\phi\gamma \neq 0$, λαμβάνομεν:

$$\begin{cases} \chi_0 + \psi_0 = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu\chi_0 \sigma\upsilon\nu\psi_0 = \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \\ \eta\mu\chi_0 \eta\mu\psi_0 = \eta\mu\alpha \epsilon\phi\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \chi_0 + \psi_0 = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu\chi_0 \sigma\upsilon\nu\psi_0 - \eta\mu\chi_0 \eta\mu\psi_0 = \eta\mu\alpha \sigma\phi\beta - \eta\mu\alpha \epsilon\phi\gamma \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \chi_0 + \psi_0 = \alpha \\ \sigma\upsilon\nu(\chi_0 + \psi_0) = \eta\mu\alpha (\sigma\phi\beta - \epsilon\phi\gamma) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma\upsilon\nu\alpha = \eta\mu\alpha (\sigma\phi\beta - \epsilon\phi\gamma) \\ (\sigma\phi\beta - \epsilon\phi\gamma) \epsilon\phi\alpha = 1 \end{cases}$$

Ἡ τελευταία εὑρεθεῖσα συνθήκη εἶναι ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ δοθέντος συστήματος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

27) Νά απαλειφθῆ τὸ χ μεταξὺ τῶν κάτωθι ἐξισώσεων:

$$\begin{aligned} \alpha_1 \eta \mu \chi + \beta_1 \sigma \nu \nu \chi &= \gamma_1 \\ \alpha_2 \eta \mu \chi + \beta_2 \sigma \nu \nu \chi &= \gamma_2 \end{aligned} \quad (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \neq 0)$$

28) Νά απαλειφθῆ τὸ χ μεταξὺ τῶν κάτωθι ἐξισώσεων:

$$\begin{array}{lll} 1) \quad \begin{array}{l} \eta \mu(\chi + \alpha) = \mu \\ \eta \mu(\chi + \beta) = \nu \end{array} & 2) \quad \begin{array}{l} \eta \mu \chi + \sigma \nu \nu \chi = \alpha \\ \epsilon \varphi 2\chi + \sigma \varphi 2\chi = \beta \end{array} & 3) \quad \begin{array}{l} \sigma \varphi \chi(1 + \eta \mu \chi) = 4\alpha \\ \sigma \varphi \chi(1 - \eta \mu \chi) = 4\beta \end{array} \\ 4) \quad \begin{array}{l} \eta \mu \chi + \sigma \nu \nu \chi = \alpha \\ \eta \mu^3 \chi + \sigma \nu \nu^3 \chi = \beta \end{array} & 5) \quad \begin{array}{l} \epsilon \varphi \chi + \sigma \varphi \chi = \alpha \\ \eta \mu^2 \chi \sigma \nu \nu \chi + \sigma \nu \nu^2 \chi \eta \mu \chi = \beta \end{array} & 6) \quad \begin{array}{l} \lambda \sigma \nu \nu 2\chi = \sigma \nu \nu(\chi + \alpha) \\ \lambda \eta \mu 2\chi = 2\eta \mu(\chi + \alpha) \end{array} \\ 7) \quad \begin{array}{l} \alpha \eta \mu^2 \chi + \beta \eta \mu \chi \sigma \nu \nu \chi + \gamma \sigma \nu \nu^2 \chi = 0 \\ \alpha' \eta \mu^2 \chi + \beta' \eta \mu \chi \sigma \nu \nu \chi + \gamma' \sigma \nu \nu^2 \chi = 0 \end{array} & & (\alpha \alpha' \neq 0) \end{array}$$

29) Νά απαλειφθῆ τὸ α μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων:

$$\begin{aligned} \chi^3 \eta \mu \alpha + \psi^3 \sigma \nu \nu \alpha &= \lambda^3 \eta \mu \alpha \sigma \nu \nu \alpha \\ \chi^3 \sigma \nu \nu \alpha - \psi^3 \eta \mu \alpha &= \lambda^3 \sigma \nu \nu 2\alpha \end{aligned}$$

30) Νά απαλειφθοῦν τὰ χ καὶ ψ μεταξὺ τῶν κάτωθι ἐξισώσεων:

$$\begin{array}{l} 1) \quad \eta \mu \chi + \eta \mu \psi = \alpha, \quad \sigma \nu \nu \chi + \sigma \nu \nu \psi = \beta, \quad \chi - \psi = \gamma \\ 2) \quad \eta \mu \chi + \eta \mu \psi = \alpha, \quad \sigma \nu \nu \chi + \sigma \nu \nu \psi = \beta, \quad \epsilon \varphi \frac{\chi}{2} \epsilon \varphi \frac{\psi}{2} = \epsilon \varphi^2 \frac{\theta}{2} \\ 3) \quad \epsilon \varphi \chi + \epsilon \varphi \psi = \alpha, \quad \sigma \varphi \chi + \sigma \varphi \psi = \beta, \quad \chi + \psi = \gamma \end{array}$$

31) Ἐὰν αἱ ἐξισώσεις $\eta \mu \chi + \sqrt{3} \sigma \nu \nu \chi = 1$ καὶ $\eta \mu \chi + \sigma \nu \nu \chi = \lambda$ ἔχουν κοινὴν λύσιν, νά εὑρεθῆ τὸ λ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1. Όρισμοὶ — βασικαὶ ἔννοιαι

Ἐάν εἰς ἓν τούλάχιστον τῶν μελῶν μιᾶς ἀλγεβρικῆς ἀνισώσεως ὡς πρὸς χ περιέχωνται εἷς ἢ περισσότεροι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ χ , τότε ἡ ἀνίσωσις καλεῖται **τριγωνομετρικὴ ἀνίσωσις** ὡς πρὸς χ . Ἐν προκειμένῳ περιοριζόμεθα εἰς τριγωνομετρικὰς ἀνισώσεις ἑνὸς ἀγνώστου, γενικώτερον ὅμως, ὅπως ἀκριβῶς καὶ εἰς τὰς τριγωνομετρικὰς ἐξισώσεις, δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν καὶ τριγωνομετρικὰς ἀνισώσεις περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς ἀγνώστων.

Κάθε τόξον χ_0 , τὸ ὁποῖον ἐπαληθεύει μίαν τριγωνομετρικὴν ἀνίσωσιν ὡς πρὸς χ_0 , καλεῖται **μερικὴ λύσις** ἢ ἀπλῶς **λύσις** αὐτῆς. Τὸ σύνολον τῶν μερικῶν λύσεων μιᾶς τριγωνομετρικῆς ἀνισώσεως καλεῖται **γενικὴ λύσις** αὐτῆς.

Τὸ σύνολον τῶν λύσεων ἐντὸς τοῦ διαστήματος $[0, 2\pi]$ μιᾶς τριγωνομετρικῆς ἀνισώσεως ὡς πρὸς ἓναν ἀγνώστον, καλεῖται **εἰδικὴ λύσις** αὐτῆς.

Ἡ τριγωνομετρικὴ ἀνίσωσις, ἡ ὁποία ἐπαληθεύεται διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ τόξου (μεταβλητῆς) τὸ ὁποῖον περιέχει, καλεῖται **μόνιμος** τριγωνομετρικὴ ἀνίσωσις.

Κατωτέρω ἀναφέρομεν ὠρισμένας βασικὰς κατηγορίας τριγωνομετρικῶν ἀνισώσεων ἑνὸς ἀγνώστου.

2. Θεμελιώδεις τριγωνομετρικαὶ ἀνισώσεις

Ἡ λύσις οἰασδήποτε τριγωνομετρικῆς ἀνισώσεως ἀνάγεται κατὰ κανόνα εἰς τὰς ἀκολουθοῦσας θεμελιώδεις τριγωνομετρικὰς ἀνισώσεις:

$$\eta\mu\chi \geq \alpha, \sigma\upsilon\nu\chi \geq \alpha, \epsilon\phi\chi \geq \alpha, \sigma\phi\chi \geq \alpha \quad (\chi, \alpha \in \mathbb{R})$$

2.1. $\eta\mu\chi < \alpha$. Διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῆς ἀνισώσεως ταύτης διακρίνομεν τὰς ἑξῆς περιπτώσεις :

i) 'Εάν $\alpha \leq -1$, ή δοθείσα άνίσωσις είναι άδύνατος, διότι $\eta\mu\chi \leq -1$ διά κάθε $\chi \in \mathbb{R}$.


ii) 'Εάν $\alpha > 1$, ή άνίσωσις είναι μόνιμος τριγωνομετρική άνίσωσις, διότι $\eta\mu\chi \leq 1$ διά κάθε $\chi \in \mathbb{R}$.

iii) 'Εάν $\alpha = 1$, τότε ή άνίσωσις έπαληθεύεται διά κάθε τόξον, έξαιρουμένων τών τόξων χ , τά όποια είναι λύσεις τής έξισώσεως $\eta\mu\chi = 1$. 'Αρα, ή γενική λύσις τής άνισώσεως είναι:

$$\mathbb{R} - \{ \chi \in \mathbb{R} : \eta\mu\chi = 1 \} = \mathbb{R} - \{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \}.$$

iv) 'Εστω, τέλος, $-1 < \alpha < 1$. Είς τήν περίπτωση αυτήν διακρίνομεν τās έξής, έπί πλέον, περιπτώσεις:

α) 'Εάν $0 < \alpha < 1$, έπιλύομεν τήν άνίσωσιν γεωμετρικώς (γραφικώς) έπί τής περιφερείας του τριγωνομετρικού κύκλου. Πρός τουτο, έργαζόμεθα ως έξής: Λαμβάνομεν έπί του άξονος τών ήμιτόνων διάνυσμα \overline{OP} τοιοϋτον, ώστε $(\overline{OP}) = \alpha$ και φέρομεν κάθετον έπί τόν άξονα BB' εις τὸ P , ή όποία τέμνει τήν περιφέρεια εις τὰ σημεία M και M' (Σχ. 1). Προφανώς, κάθε τόξον χ με άρχήν A και πέρας τυχόν σημείον του τόξου $\widehat{M'B'M}$, έξαιρέσει τών άκρων M και M' , έπαληθεύει τήν άνίσωσιν $\eta\mu\chi < \alpha$ με $0 < \alpha < 1$.



Σχ. 1

'Εν συνεχεία, έπιδιώκομεν νά εύρωμεν αναλυτικώς τήν γενικήν λύσιν τής δοθείσης άνισώσεως. Πρός τουτο, εύρίσκομεν πρώτον τήν ειδικήν λύσιν και έξ αυτής προσδιορίζομεν άμέσως τήν γενικήν λύσιν, ως συνάγεται εκ τής έπομένης ισοδυναμίας:

$$\eta\mu\chi < \alpha \iff \begin{cases} \eta\mu\omega < \alpha & (1) \\ \omega \in [0, 2\pi] & (2) \\ \chi = 2k\pi + \omega, k \in \mathbb{Z} & (3) \end{cases}$$

(Είναι προφανές, ότι κάθε τόξον $\chi \in \mathbb{R}$ τίθεται υπό τήν μορφήν

$$\chi = 2k\pi + \omega \text{ με } k \in \mathbb{Z} \text{ και } \omega \in [0, 2\pi].$$

'Εκ τής άνωτέρω ισοδυναμίας, παρατηρούμεν, ότι εκ τής λύσεως τής άνισώσεως (1) είναι δυνατόν νά εύρωμεν τήν γενικήν λύσιν τής $\eta\mu\chi < \alpha$ μέσω τής (3). 'Επί πλέον, ή λύσις τής (1) με τόν περιορισμόν (2) είναι ή ειδική λύσις τής δοθείσης άνισώσεως. 'Επιλύομεν τήν άνίσωσιν (1), ήτοι εύρίσκομεν τήν ειδικήν λύσιν τής δοθείσης άνισώσεως. Πρός τουτο, έστωσαν φ και $\pi - \varphi$ τά μόνα τόξα του κλειστοϋ διαστήματος $[0, 2\pi]$ με $\eta\mu\varphi = \eta\mu(\pi - \varphi) = \alpha$ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$). Τότε τά μόνα υποδιαστήματα του διαστήματος $[0, 2\pi]$, τά όποια έπαληθεύουν τήν

άνισωσιν, είναι $(\pi - \varphi, 2\pi]$ και $[0, \varphi)$. Άρα, η ειδική λύσις είναι :

$$(\pi - \varphi, 2\pi] \cup [0, \varphi) = \{ \omega \in \mathbb{R} : \pi - \varphi < \omega \leq 2\pi \} \cup \{ \omega \in \mathbb{R} : 0 \leq \omega < \varphi \}$$

Η γενική λύσις τῆς δοθείσης άνισώσεως εύρσκεται, εάν εις τὰ ἄκρα τῶν διαστημάτων τῆς ειδικῆς λύσεως προσθέσωμεν τὸ $2\kappa\pi$ με $\kappa \in \mathbb{Z}$ (τυχόν), λόγω καὶ τῆς (3).

Ἐάν θέσωμεν $\Delta_\kappa = (2\kappa\pi + \pi - \varphi, 2\kappa\pi + 2\pi] \cup [2\kappa\pi, 2\kappa\pi + \varphi)$, τότε ἡ γενική λύσις είναι $\bigcup_{\kappa \in \mathbb{Z}} \Delta_\kappa$, ἥτοι: $\{ \chi \in \mathbb{R} : \exists \kappa \in \mathbb{Z} \text{ με } \chi \in \Delta_\kappa \}$.

β) Ἐάν $-1 < \alpha \leq 0$, ἐπιλύομεν τὴν άνισωσιν κατ' ἀνάλογον ἀκριβῶς τρόπον.

Καθ' ὅμοιον ἀκριβῶς τρόπον ἐπιλύεται ἡ άνισωσις $\eta\mu\chi > \alpha$. Ὅμοίως ἐπιλύονται καὶ αἱ άνισοεξισώσεις $\eta\mu\chi \leq \alpha$ καὶ $\eta\mu\chi \geq \alpha$, ἀρκεί εις τὰς λύσεις τῆς άνισώσεως $\eta\mu\chi < \alpha$ ἢ $\eta\mu\chi > \alpha$ νὰ ἐπισυνάψωμεν καὶ τὴν γενικὴν λύσιν τῆς ἐξισώσεως $\eta\mu\chi = \alpha$.

2.2. συνχ < α. Πρὸς λύσιν τῆς άνισώσεως ταύτης, διακρίνομεν, ὡς καὶ προηγουμένως, τὰς κάτωθι περιπτώσεις:

i) Ἐάν $\alpha \leq -1$, ἡ άνισωσις είναι ἀδύνατος.


ii) Ἐάν $\alpha > 1$, ἡ άνισωσις είναι μόνιμος τριγωνομετρικὴ άνισωσις.

iii) Ἐάν $\alpha = 1$, τότε ἡ άνισωσις ἀληθεύει διὰ κάθε τόξον, ἐξαιρέσει τῶν τόξων $\chi = 2\kappa\pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.

Συνεπῶς, ἡ γενική λύσις είναι: $\mathbb{R} - \{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z} \}$.

iv) Ἐάν $-1 < \alpha < 1$, τότε ἐπιλύομεν τὴν άνισωσιν γεωμετρικῶς. Ἐπὶ τοῦ ἄξονος

τῶν συνημιτόνων θεωροῦμεν διάνυσμα \overline{PO} τοιοῦτον, ὡστε $(\overline{OP}) = \alpha$ καὶ φέρομεν κάθετον ἐπὶ τοῦ ἄξονος AA' εἰς τὸ σημεῖον P , τέμνουσαν τὴν περιφέρειαν εἰς τὰ σημεῖα M, M' (Σχ. 2). Κάθε τόξον χ με ἀρχὴν τὸ



Σχ. 2

A καὶ πέρασ τυχόν σημεῖον τοῦ τόξου $\widehat{MA'M'}$, ἐξαιρουμένων τῶν ἄκρων M καὶ M' , ἐπαληθεύει τὴν δοθείσαν άνισωσιν.

Ἐν συνεχείᾳ, πρὸς εύρεσιν τῆς ειδικῆς λύσεως, υποθέτομεν ὅτι φ είναι τὸ τόξον ἐντὸς τοῦ διαστήματος $(0, \pi)$ με $\sin\varphi = \alpha$. Ἐρα, ἡ ειδικὴ λύσις είναι: $(\varphi, 2\pi - \varphi) = \{ \chi \in \mathbb{R} : \varphi < \chi < 2\pi - \varphi \}$.

Προσθέτοντες εις τὰ ἄκρα τοῦ διαστήματος τῆς ειδικῆς λύσεως τὸ $2\kappa\pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$ εύρσκομεν ὡς καὶ προηγουμένως τὴν γενικὴν λύσιν τῆς δοθείσης άνισώσεως.

Ἐναλόγως ἐπιλύονται αἱ: $\sin\chi > \alpha$, $\sin\chi \leq \alpha$, καὶ $\sin\chi \geq \alpha$

¹ Τὸ σύνολον $\bigcup_{\kappa \in \mathbb{Z}} \Delta_\kappa$ είναι ἡ ἔνωσις τῶν ἀπείρων διαστημάτων Δ_κ , ὅταν τὸ κ διατρέχη τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νά ἐπιλυθῆ ἡ ἀνίσωσις $\sin \chi \leq \frac{1}{2}$.

Ἐπίλυσις: Εὐρίσκομεν τὰ δύο καὶ μοναδικὰ τόξα ἐντὸς τοῦ διαστήματος $[0, 2\pi)$, τῶν ὁποίων τὸ συνημίτονον εἶναι $\frac{1}{2}$. Ταῦτα, ὡς γνωστόν, εἶναι $\frac{\pi}{3}$ καὶ $\frac{5\pi}{3}$.

Κάθε τόξον χ , τὸ ὁποῖον περατοῦται εἰς ἓν σημεῖον τοῦ τόξου $\widehat{MAM'}$, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἄκρων M καὶ M' (Σχ. 3), εἶναι λύσις τῆς ἀνισώσεως. Προφανῶς, ἡ εἰδικὴ λύσις εἶναι:

$$\left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right], \text{ ἡ δὲ γενικὴ:}$$

$$\cup_{\kappa \in \mathbb{Z}} \Delta_{\kappa}, \text{ ὅπου } \Delta_{\kappa} = \left[2\kappa\pi, 2\kappa\pi + \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[2\kappa\pi + \frac{5\pi}{3}, 2\kappa\pi + 2\pi\right].$$




Σχ. 3

Δηλαδή, ἀναλυτικῶς, κάθε τόξον χ τῆς γενικῆς λύσεως πληροῖ μία τῶν κάτωθι σχέσεων:

$$2\kappa\pi \leq \chi \leq 2\kappa\pi + \frac{\pi}{3}, \quad 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{3} \leq \chi \leq 2\kappa\pi + 2\pi \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$$

2.3. εφχ < α. Ἡ ἀνίσωσις αὕτη ἔχει πάντοτε λύσιν, ἐφ' ὅσον $\alpha \in \mathbb{R}$, τὴν ὁποίαν εὐρίσκομεν ὡς ἑξῆς: Ἐστω $\alpha > 0$ (ἐὰν $\alpha < 0$ ἐργαζόμεθα ἀναλόγως). Ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν ἐφαπτομένων λαμβάνομεν διάνυσμα \overline{AP} τοιοῦτον, ὥστε $(\overline{AP}) = \alpha$ καὶ θεωροῦμεν τὴν εὐθεῖαν τὴν διερχομένην ἐκ τῶν σημείων O καὶ P , τέμνουσαν τὴν περιφέρειαν εἰς τὰ M καὶ M' (Σχ. 4). Εἶναι ἤδη προφανές ἐκ τοῦ σχήματος, ὅτι κάθε τόξον, τὸ ὁποῖον ἔχει πέρασ τυ-



Σχ. 4

χὸν σημεῖον τοῦ τόξου $\widehat{MAB'}$ ἢ τοῦ τόξου $\widehat{BA'M'}$ (ἐξαιρουμένων τῶν ἄκρων M καὶ B' ἢ B καὶ M') ἐπαληθεύει τὴν ἀνίσωσιν.

Ἐν συνεχείᾳ, ἔστωσαν φ καὶ $\pi + \varphi$ τὰ μοναδικὰ τόξα τοῦ διαστήματος $[0, 2\pi]$ μὲ $\varepsilon\varphi = \varepsilon\varphi(\pi + \varphi) = \alpha$ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$). Τότε ἡ εἰδικὴ λύσις εἶναι:

$$\left(\frac{\pi}{2}, \pi + \varphi\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right] \cup [0, \varphi).$$

Ἡ γενικὴ λύσις ἐν προκειμένῳ εὐρίσκεται ταχύτερον, ἀρκεῖ εἰς τὰ ἄκρα τοῦ

διαστήματος $\left(\frac{\pi}{2}, \pi + \varphi\right)$ να προσθέσωμεν τὸ κπ μὲ $\kappa \in \mathbb{Z}$ (τυχόν). Ἦτοι, ἐὰν

$\Delta_\kappa = \left(\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa\pi + \pi + \varphi\right)$, αὕτη εἶναι:

$$\bigcup_{\kappa \in \mathbb{Z}} \Delta_\kappa = \left\{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = \kappa\pi + \theta, \kappa \in \mathbb{Z}, \frac{\pi}{2} < \theta < \pi + \varphi \right\}.$$

Ἀναλόγως ἐπιλύονται αἱ ἀνισώσεις $\epsilon\varphi\chi < \alpha$, $\sigma\varphi\chi < \alpha$, $\sigma\varphi\chi < \alpha$, ὡς καὶ αἱ $\epsilon\varphi\chi \geq \alpha$, $\epsilon\varphi\chi \leq \alpha$, $\sigma\varphi\chi \geq \alpha$, $\sigma\varphi\chi \leq \alpha$.

3. Τριγωνομετρικαὶ ἀνισώσεις ἀναγόμεναι εἰς τὰς θεμελιώδεις

Αἱ βασικαὶ μορφαὶ τριγωνομετρικῶν ἀνισώσεων, ὡς καὶ αἱ μέθοδοι ἐπιλύσεως αὐτῶν, εἶναι ἐν γένει ἀντίστοιχοι πρὸς ἐκείνας τῶν τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων. Οὕτως, ἡ ἐπίλυσις μιᾶς ἀνισώσεως ἀνάγεται εἰς τὴν ἐπίλυσιν θεμελιωδῶν τριγωνομετρικῶν ἀνισώσεων. Ἐπὶ παραδείγματι, ἡ ἀνίσωσις $f(\eta\mu\chi, \sigma\upsilon\nu\chi) \geq 0$, ὅπου $f(\eta\mu\chi, \sigma\upsilon\nu\chi)$ ἀκέραιον συμμετρικὸν πολυώνυμον ὡς πρὸς $\eta\mu\chi$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\chi$, εἶναι μία βασικὴ μορφή τριγωνομετρικῆς ἀνισώσεως καὶ ἐπιλύεται ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ ἀντίστοιχος συμμετρικὴ ἐξίσωσις. Ἦτοι, ὡς γνωστόν, ἔχομεν:

$$f(\eta\mu\chi, \sigma\upsilon\nu\chi) \leq 0 \iff \begin{cases} f\left(t, \frac{t^2-1}{2}\right) \leq 0 & (1) \\ t = \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) & (2) \end{cases}$$

Ἡ ἀνίσωσις (1) εἶναι μία ἀλγεβρική ἀνίσωσις ὡς πρὸς t καὶ ἐπιλύεται κατὰ τὰ γνωστά. Ἐστω $t \geq t_0$ μία λύσις αὐτῆς. Τότε, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὴν ἀνίσωσιν $\sqrt{2} \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) \leq t_0 \iff \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - \chi\right) \leq \frac{t_0}{\sqrt{2}}$, ἡ ὁποία εἶναι μία θεμελιώδης ἀνίσωσις.

Κατωτέρω ἐπιλύομεν ὠρισμένας χαρακτηριστικὰς μορφὰς τριγωνομετρικῶν ἀνισώσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἀνίσωσις: $(2\eta\mu\chi - \sqrt{3})(2\sigma\upsilon\nu\chi - 1)(\epsilon\varphi\chi - 1) < 0$.

Ἐπίλυσις: Πρὸς ἐπίλυσιν τούτης, ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν τὰ σημεῖα τῶν παραγόντων τοῦ πρώτου μέλους, ὅταν τὸ χ διατρέχη τὸ διάστημα $[0, 2\pi]$. Πρὸς τοῦτο, προσδιορίζομεν τὰς εἰδικὰς λύσεις τῶν κάτωθι θεμελιωδῶν ἀνισώσεων:

$$2\eta\mu\chi - \sqrt{3} > 0 \iff \eta\mu\chi > \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$2\sigma\upsilon\nu\chi - 1 > 0 \iff \sigma\upsilon\nu\chi > \frac{1}{2}$$

$$\epsilon\varphi\chi - 1 > 0 \iff \epsilon\varphi\chi > 1$$

Αί ειδικαί λύσεις αὐτῶν, εὐρισκόμεναι εὐκόλως κατὰ τὰ γνωστά, ἀντιστοίχως εἶναι:

$$\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right] \cup \left[0, \frac{\pi}{3}\right) \text{ καὶ } \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$$

Ἐν συνεχείᾳ, πρὸς εὕρεσιν τοῦ σημείου τοῦ πρώτου μέλους τῆς δοθείσης ἀνίσωσως, καταρτίζομεν τὸν κατωτέρω πίνακα:

χ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	2π
$2\eta\mu\chi - 3$	-	-	+	+	-	-	-	-	
$2\sigma\upsilon\eta\chi - 1$	+	+	-	-	-	-	-	+	
$\epsilon\phi\chi - 1$	-	+	+	-	-	+	-	-	
Γ	+	-	-	+	-	+	-	+	

$${}^{\circ}\text{Ἐτέθη } \Gamma = (2\eta\mu\chi - \sqrt{3})(2\sigma\upsilon\eta\chi - 1)(\epsilon\phi\chi - 1).$$

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω πίνακος παρατηροῦμεν, ὅτι ἡ εἰδικὴ λύσις τῆς δοθείσης ἀνίσωσως εἶναι:

$$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)$$

Ἀναλυτικῶς, κάθε τόξον χ τῆς εἰδικῆς λύσεως πληροῖ μία τῶν ἐπομένων σχέσεων:

$$\frac{\pi}{4} < \chi < \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{3} < \chi < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{2\pi}{3} < \chi < \frac{5\pi}{4}, \quad \frac{3\pi}{2} < \chi < \frac{5\pi}{3}$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἀνίσωσις $\eta\mu 3\chi > \frac{\sqrt{3}}{2}$ καὶ νὰ σημειωθοῦν ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου τὰ διαστήματα τῶν τόξων, ἐν τὸς τῶν ὁποίων περατοῦνται αἱ λύσεις τῆς.

Ἐπίλυσις: Θέτομεν $3\chi = \omega$ καὶ ἐπιλύομεν τὴν ἀνίσωσιν $\eta\mu\omega > \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ἡ γενικὴ λύσις ταύτης εἶναι:

$$\cup_{\kappa \in \mathbb{Z}} \Delta_{\kappa} \text{ μὲ } \Delta_{\kappa} = \left(2\kappa\pi + \frac{\pi}{3}, 2\kappa\pi + \frac{2\pi}{3}\right), \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$


Συνεπῶς, ἔχομεν:

$$2\kappa\pi + \frac{\pi}{3} < 3\chi < 2\kappa\pi + \frac{2\pi}{3} \iff 2\pi \frac{\kappa}{3} + \frac{\pi}{9} < \chi < 2\pi \frac{\kappa}{3} + \frac{2\pi}{9} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ ὁμοῦς εἶναι $\kappa = 3\rho + \upsilon$, $0 \leq \upsilon < 3$, ἡ σχέσηις (1) γράφεται:

$$2\rho\pi + \frac{2\pi\upsilon}{3} + \frac{\pi}{9} < \chi < 2\rho\pi + \frac{2\pi\upsilon}{3} + \frac{2\pi}{9} \quad (\rho \in \mathbb{Z})$$

Ἐξ αὐτῆς συνάγεται, ὅτι ἡ εἰδικὴ λύσις τῆς δοθείσης ἀνίσωσως εἶναι $\left(\frac{2\pi\nu}{3} + \frac{\pi}{9}, \frac{2\pi\nu}{3} + \frac{2\pi}{9}\right)$ ($\nu = 0, 1, 2$). Εἰς ἐκάστην τιμὴν τοῦ ἀκεραίου ν ἀντιστοιχεῖ καὶ ἓν ὑποδιάστημα τοῦ διαστήματος $[0, 2\pi]$ καὶ συνεπῶς εὐρίσκομεν



τρία ὑποδιάστημα τοῦ $[0, 2\pi]$ (Σχ.5), ἐντὸς τῶν ὁποίων περατοῦνται αἱ λύσεις τῆς ἀνίσωσως. Ταῦτα εἶναι:

$$\nu = 0 \longrightarrow \left(\frac{\pi}{9}, \frac{2\pi}{9}\right)$$

$$\nu = 1 \longrightarrow \left(\frac{7\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$$

$$\nu = 2 \longrightarrow \left(\frac{13\pi}{9}, \frac{14\pi}{9}\right)$$

Σχ. 5

3.1. Ἀνίσωσις τῆς μορφῆς: $\alpha\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\nu\chi + \gamma \geq 0$ (1)

Ἐπειδὴ ἡ ἀντίστοιχος ἐξίσωσις $\alpha\eta\mu\chi + \beta\sigma\upsilon\nu\chi + \gamma = 0$, ὡς εἶδομεν, ἐπιλύεται κατὰ δύο τρόπους, οὕτω καὶ ἡ δοθεῖσα ἀνίσωσις εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιλυθῇ κατὰ δύο τρόπους.

α' τρόπος. Ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι $\chi \neq 2\kappa\pi + \pi$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$), ἐκφράζομεν τὰ $\eta\mu\chi$, $\sigma\upsilon\nu\chi$ συναρτήσεσι τῆς $\epsilon\varphi \frac{\chi}{2}$ καὶ ἔχομεν:

$$(1) \iff \alpha \frac{2\epsilon\varphi \frac{\chi}{2}}{1 + \epsilon\varphi^2 \frac{\chi}{2}} + \beta \frac{1 - \epsilon\varphi^2 \frac{\chi}{2}}{1 + \epsilon\varphi^2 \frac{\chi}{2}} + \gamma \geq 0 \iff$$

$$(\gamma - \beta) \epsilon\varphi^2 \frac{\chi}{2} + 2\alpha \epsilon\varphi \frac{\chi}{2} + \beta + \gamma \geq 0 \quad (2)$$

Ἡ τελευταία ὁμως ἀνίσωσις (2) εἶναι δευτεροβάθμιος ὡς πρὸς $\epsilon\varphi \frac{\chi}{2}$ καὶ ἐπιλύεται εὐκόλως. Οὕτως ἡ λύσις τῆς ἀνίσωσως (1) ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν θεμελιωδῶν ἀνίσωσεων τῆς μορφῆς $\epsilon\varphi \frac{\chi}{2} \geq \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Ἐὰν $\chi = 2\kappa\pi + \pi$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$) ἡ (1) γράφεται:

$$\alpha\eta\mu(2\kappa\pi + \pi) + \beta\sigma\upsilon\nu(2\kappa\pi + \pi) + \gamma \geq 0 \iff -\beta + \gamma \geq 0 \iff \gamma \geq \beta \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$$

Ἄρα, τὰ τόξα $\chi = 2\kappa\pi + \pi$ θὰ εἶναι λύσεις τῆς ἀνίσωσως (1), ἐφ' ὅσον $\gamma \geq \beta$.

β' τρόπος. Ἡ (1) γράφεται:

$$(1) \iff \alpha\left(\eta\mu\chi + \frac{\beta}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\chi + \frac{\gamma}{\alpha}\right) \geq 0$$

Επειδή $\frac{\beta}{\alpha} \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists \omega \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ με $\epsilon\phi\omega = \frac{\beta}{\alpha}$ (M) και συνεπώς

λαμβάνομεν:

$$(1) \Leftrightarrow \alpha(\eta\mu\chi + \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} \sigma\upsilon\nu\chi + \frac{\gamma}{\alpha}) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\sigma\upsilon\nu\omega} [\eta\mu(\chi + \omega) + \frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\omega] \geq 0 \quad (2)$$

Διακρίνομεν ήδη τὰς ἐξῆς περιπτώσεις:

i) Ἐὰν $\alpha > 0$, τότε, ἐπειδὴ καὶ $\sigma\upsilon\nu\omega > 0$, ἔπεται $\frac{\alpha}{\sigma\upsilon\nu\omega} > 0$, ὁπότε ἡ (2) γράφεται: $\eta\mu(\chi + \omega) \geq -\frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\omega$, ἡ ὁποία ἀνάγεται: εἰς τὴν θεμελιώδη $\eta\mu\chi \geq \lambda$.

ii) Ἐὰν $\alpha < 0$, τότε $\frac{\alpha}{\sigma\upsilon\nu\omega} < 0$, ὁπότε ἡ (2) γράφεται: $\eta\mu(\chi + \omega) \geq -\frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\omega$, ἡ ὁποία ἀνάγεται καὶ πάλιν εἰς τὴν $\eta\mu\chi \geq \lambda$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἀνίσωσις: $\sqrt{3} \eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi - \sqrt{2} < 0$ (1)

Ἐπίλυσις: Αὕτη ἰσοδυναμῶς γράφεται:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{3} \left(\eta\mu\chi + \frac{\sqrt{3}}{3} \sigma\upsilon\nu\chi - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right) < 0 \Leftrightarrow \sqrt{3} \left(\eta\mu\chi + \epsilon\phi \frac{\pi}{6} \sigma\upsilon\nu\chi - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right) < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6}} \left[\eta\mu \left(\chi + \frac{\pi}{6} \right) - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6} \right] < 0 \Leftrightarrow 2 \left[\eta\mu \left(\chi + \frac{\pi}{6} \right) - \frac{\sqrt{2}}{2} \right] < 0 \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu \left(\chi + \frac{\pi}{6} \right) < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Θέτομεν $\chi + \frac{\pi}{6} = \omega$, ὁπότε ἔχομεν πρὸς λύσιν τὴν ἀνίσωσιν $\eta\mu\omega < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ἡ γενικὴ λύσις ταύτης εἶναι:

$$2k\pi + \frac{3\pi}{4} < \omega \leq 2k\pi + 2\pi \quad \text{καὶ} \quad 2\lambda\pi \leq \omega < 2\lambda\pi + \frac{\pi}{4} \quad (k, \lambda \in \mathbb{Z})$$

Ἐξ αὐτῶν καὶ ἐπειδὴ $\chi = \omega - \frac{\pi}{6}$ εὐρίσκομεν:

$$2k\pi + \frac{7\pi}{12} < \chi \leq 2k\pi + \frac{11\pi}{6} \quad \text{καὶ} \quad 2\lambda\pi - \frac{\pi}{6} \leq \chi < 2\lambda\pi + \frac{\pi}{12}, \quad (k, \lambda \in \mathbb{Z})$$

αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τὴν γενικὴν λύσιν τῆς (1).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

32) 'Επιλύσατε τὰς κάτωθι ἀνισώσεις:

$$\begin{array}{lll}
 1) \eta\mu\chi > \frac{\sqrt{3}}{2} & 2) \epsilon\phi\chi \geq -\sqrt{3} & 3) \sigma\upsilon\nu\chi < -\frac{1}{2} \\
 4) \eta\mu\left(\chi - \frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{2} & 5) \sigma\upsilon\nu\left(\chi - \frac{\pi}{3}\right) > \frac{1}{2} & 6) \sigma\phi\chi > 0
 \end{array}$$

33) 'Επιλύσατε τὰς ἀκολουθούς ἀνισώσεις:

$$\begin{array}{lll}
 1) \sigma\phi 3\chi > -1 & 2) \eta\mu 4\chi < -\frac{\sqrt{2}}{2} & 3) \sigma\upsilon\nu 3\chi < \frac{1}{2}
 \end{array}$$

34) Νὰ ἐπιλυθῆ ἡ ἀνίσωσις $\eta\mu 5\chi > \frac{1}{2}$ καὶ νὰ σημειωθοῦν ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου τὰ διαστήματα τῶν τόξων ἐντὸς τῶν ὁποίων περατοῦνται αἱ λύσεις της.

35) Εὔρετε τὰς εἰδικὰς λύσεις τῶν κάτωθι ἀνισώσεων:

$$\begin{array}{ll}
 1) (\eta\mu\chi - 1)(2\sigma\upsilon\nu\chi - 1)(\epsilon\phi\chi - 1) < 0 & 2) (\sigma\upsilon\nu\chi + 1)(\eta\mu\chi - 2)(\epsilon\phi\chi + \sqrt{3}) < 0 \\
 3) (2\eta\mu\chi - 1)\left(\sigma\upsilon\nu\chi + \frac{1}{2}\right)(\sigma\phi\chi - \sqrt{3}) \geq 0 & 4) (\sqrt{2}\eta\mu\chi - 1)(\epsilon\phi 2\chi - 1) \leq 0 \\
 5) (\chi - 2)\eta\mu 3\chi < 0 & 6) \chi\sigma\upsilon\nu\chi > 0.
 \end{array}$$

36) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἀνισώσεις:

$$\begin{array}{lll}
 1) 3\eta\mu\chi + 2\sigma\upsilon\nu\chi > 2 & 2) \epsilon\phi\chi + \sigma\phi\chi > 1 & 3) \sigma\upsilon\nu 2\chi > \eta\mu^2\chi - 1 \\
 4) \eta\mu 2\chi > \sigma\upsilon\nu\chi & 5) \eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi > 1 & 6) \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu^2\chi - 1 < 5\eta\mu^2\chi - 4 \\
 7) \sqrt{3 - 4\sigma\upsilon\nu^2\chi} > 1 + 3\eta\mu\chi & 8) \frac{\sigma\upsilon\nu 2\chi - 1}{\sigma\upsilon\nu 2\chi} < 1 & 9) \eta\mu^2\chi - \eta\mu 2\chi + 3\sigma\upsilon\nu^2\chi > 2 \\
 10) \frac{2\eta\mu 2\chi - 1}{\sigma\upsilon\nu 2\chi - 3\sigma\upsilon\nu\chi + 2} > 0 & 11) 3(\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi) - 5\eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi > 3 \\
 12) \frac{\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi}{\eta\mu\chi - \sigma\upsilon\nu\chi} > 1
 \end{array}$$

37) Νὰ ἐπιλυθῆ ἡ ἀνίσωσις: $\eta\mu 2\chi > \eta\mu 2\alpha$, $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{4}$.

38) Νὰ ἐπιλυθῆ καὶ διερευνηθῆ ἡ, ὡς πρὸς χ , ἐξίσωσις: $(2\sigma\upsilon\nu\phi - 1)\chi^2 - 4\chi + 2(2\sigma\upsilon\nu\phi + 1) = 0$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ ΚΥΚΛΙΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1. Όρισμοί — βασικαί έννοιαι

1.1. Έκ του όρισμοϋ του $\eta\mu\chi$ ($\chi \in \mathbb{R}$) συνάγεται, ότι τὸ ήμίτονον (συντόμως τὸ $\eta\mu$) είναι μία συνάρτησις με πεδίο όρισμοϋ τὸ \mathbb{R} καί πεδίο τιμῶν τὸ $[-1, +1]$. Είναι δηλαδή τὸ $\eta\mu$ μία πραγματική συνάρτησις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς καί ἔχει τὸν τύπον $\psi = \eta\mu\chi$. Συνεπῶς δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τὴν ἀπεικόνισιν:

$$\eta\mu : \mathbb{R} \longrightarrow [-1, +1] \quad \text{ἢ} \quad (1)$$

$$\mathbb{R} \ni \chi \xrightarrow{\eta\mu} \eta\mu(\chi) \in [-1, +1],$$

όπου ἡ τιμὴ τῆς συναρτήσεως $\eta\mu(\chi)$ εἰς τὸ τυχόν $\chi \in \mathbb{R}$ (ἢ, ὡς ἄλλως λέγομεν, ἡ εἰκὼν τοϋ τυχόντος χ διὰ τῆς $\eta\mu$) εἶναι ὁ γνωστὸς τριγωνομετρικὸς ἀριθμὸς $\eta\mu\chi$:

Παρατηροϋμεν ἐπὶ πλέον εἰς τὴν συνάρτησιν (1), ὅτι κάθε $\psi \in [-1, +1]$ δὲν εἶναι ἀντίστοιχον (εἰκὼν) ἑνὸς μόνου $\chi \in \mathbb{R}$, διότι ἡ ἐξίσωσις $\eta\mu\chi = \psi$ με $|\psi| \leq 1$ δὲν ἔχει, ὡς γνωστὸν, μίαν μόνον λύσιν. Π.χ. ἐὰν $\psi = \frac{1}{2}$, τότε ἡ γενικὴ

λύσις τῆς ἐξισώσεως $\eta\mu\chi = \frac{1}{2}$ εἶναι: $\{\chi \in \mathbb{R} : \chi = k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}$ καί

συνεπῶς κάθε $\chi = k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6}$ με $k \in \mathbb{Z}$ ἔχει ἀντίστοιχον τὸ $\frac{1}{2}$, ἥτοι:

$$\eta\mu \left\{ k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6} \right\} = \frac{1}{2} \quad \text{διὰ κάθε } k \in \mathbb{Z}.$$

*Αρα, ἡ ἀπεικόνισις $\eta\mu$ δὲν εἶναι ἀμφιμονοσήμαντος καί συνεπῶς ἡ ἀντιστοιχία

$$\eta\mu^{-1} : [-1, +1] \longrightarrow \mathbb{R},$$

ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀντίστροφος ἀντιστοιχία τῆς συναρτήσεως $\eta\mu$, δὲν εἶναι συνάρτησις, δηλαδή δὲν ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις τῆς συναρτήσεως $\eta\mu$, ὡς αὕτη ὠρίσθη.

*Εὰν ὅμως περιορίσωμεν τὴν συνάρτησιν $\eta\mu$ εἰς ἓν κατάλληλον διάστημα

(ύποδιάστημα του \mathbb{R}) π.χ. τὸ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, δηλαδή θεωρήσωμεν τὴν συνάρτησιν:

$$\eta\mu: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1, +1],$$

τότε ἡ ἀντιστοιχία:

$$\eta\mu^{-1}: [-1, +1] \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

εἶναι συνάρτησις.

Ἀποδεικνύεται γενικώτερον, ὅτι ἡ συνάρτησις $\eta\mu$ ἐντὸς τοῦ κλειστοῦ διαστήματος $\Delta_k = \left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$) εἶναι ἀμφιμονοσήμαντος¹. Πρῶ-

γματι: Ἐστώσαν $\chi_1, \chi_2 \in \Delta_k$, $\chi_i \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$, ($k \in \mathbb{Z}$, $i = 1, 2$), $\chi_i \neq k\pi - \frac{\pi}{2}$, ($k \in \mathbb{Z}$, $i = 1, 2$) καὶ $\chi_1 \neq \chi_2$. Ὑποθέτομεν $\eta\mu\chi_1 = \eta\mu\chi_2$, ὁπότε $\chi_1 = 2\rho\pi + \chi_2$ ($\rho \in \mathbb{Z}$) ἢ $\chi_1 = (2\rho + 1)\pi - \chi_2$ ($\rho \in \mathbb{Z}$) καὶ συνεπῶς ἔχομεν:

$$\chi_1 - \chi_2 = 2\rho\pi \quad (1)$$

$$\chi_1 + \chi_2 = 2\rho\pi + \pi \quad (2)$$

Ἐξ ἄλλου, ἐξ ὑποθέσεως ἔχομεν: $k\pi - \frac{\pi}{2} < \chi_1 < k\pi + \frac{\pi}{2}$ καὶ $k\pi - \frac{\pi}{2} < \chi_2 < k\pi + \frac{\pi}{2}$

$$\text{ὁπότε: } -\pi < \chi_1 - \chi_2 < \pi \quad (3)$$

$$2k\pi - \pi < \chi_1 + \chi_2 < 2k\pi + \pi \quad (4)$$

Ἐκ τῶν (1) καὶ (3) λαμβάνομεν: $-\pi < 2\rho\pi < \pi \Rightarrow -\frac{1}{2} < \rho < \frac{1}{2} \Rightarrow$

$\rho = 0 \Rightarrow \chi_1 = \chi_2$, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδύνατον, διότι ὑπετέθη $\chi_1 \neq \chi_2$. Ἐκ τῶν (2) καὶ (4) προκύπτει:

$$2k\pi - \pi < 2\rho\pi + \pi < 2k\pi + \pi \Rightarrow 2k - 1 < 2\rho + 1 < 2k + 1 \Rightarrow k - 1 < \rho < k$$

τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδύνατον. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι $\eta\mu\chi_1 \neq \eta\mu\chi_2$ καὶ συνεπῶς ἡ συνάρτησις $\eta\mu$, ἐντὸς τοῦ διαστήματος $\Delta_k \subset \mathbb{R}$, εἶναι ἀμφιμονοσήμαντος διὰ κάθε $k \in \mathbb{Z}$. Ἄρα, τῆς συναρτήσεως $\eta\mu$ περιοριζομένης εἰς τὸ διάστημα Δ_k , ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις, ἡ ὁποία συμβολίζεται μὲ **τοξ_k ημ** καὶ καλεῖται **ἀντίστροφος κυκλικὴ συνάρτησις** τῆς συναρτήσεως $\eta\mu$. Εἰδικώτερον, ἐὰν $k = 0$, τότε ἔχομεν τὴν ἀμφιμονοσήμαντον ἀπεικόνισιν:

$$\text{τοξ}_0\eta\mu: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1, +1],$$

¹ Ἐκ τῶν μαθημάτων τῆς Ἀναλύσεως (πρβλ. σελ. 15) γνωρίζομεν ὅτι μίᾳ ἀπεικόνισιν $f: A \longrightarrow B$ εἶναι ἀμφιμονοσήμαντος, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν:

$$\forall \chi_1 \in A \text{ καὶ } \forall \chi_2 \in A \text{ μὲ } \chi_1 \neq \chi_2 \Rightarrow f(\chi_1) \neq f(\chi_2).$$

διότι $\Delta_0 = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$. Τὴν συνάρτησιν τοξ₀ημ θὰ παριστῶμεν ἐφ' ἐξῆς μὲ

Τοξ ημ (τόξον ἡμίτονου), τὴν δὲ τιμὴν Τοξ ημχ αὐτῆς εἰς τὸ τυχὸν σημεῖον $\chi \in [-1, +1]$, θὰ καλοῦμεν **πρωτεύουσαν τιμὴν**. Π.χ. τὸ Τοξ ημ $\frac{1}{2}$ παριστᾶ τὸ

μοναδικὸν τόξον τοῦ διαστήματος $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$, τοῦ ὁποῖου τὸ ἡμίτονον εἶναι

$\frac{1}{2}$, δηλαδή τὸ $\frac{\pi}{6}$ (Τοξ ημ $\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$). Ὁμοίως, ἐξ ὀρισμοῦ ἔχομεν :

$$\text{Τοξ ημ} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{\pi}{3} \quad \text{καὶ} \quad \text{Τοξ ημ} 1 = \frac{\pi}{2}.$$

Διὰ τοῦ συμβόλου **τοξ ημ** παριστῶμεν τὴν ἀντίστροφον ἀντιστοιχίαν τῆς συναρτήσεως (I) καὶ συνεπῶς τὸ τοξημψ μὲ $|\psi| \leq 1$ παριστᾶ τὸ σύνολον τῶν τόξων, τῶν ὁποίων τὸ ἡμίτονον εἶναι ψ, ἥτοι τὸ σύνολον τῶν μερικῶν λύσεων τῆς ἐξισώσεως ημχ = ψ. Π.χ.

$$\text{τοξ ημ} \frac{1}{2} = \left\{ \chi \in \mathbb{R} : \eta\mu\chi = \frac{1}{2} \right\} = \left\{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

$$\text{Ὁμοίως εἶναι: τοξημ } 1 = \left\{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς συναρτήσεως τοξ_κημ συνάγεται, διὰ κάθε $k \in \mathbb{Z}$ καὶ διὰ κάθε ψ μὲ $|\psi| \leq 1$, ὅτι:

$$\alpha) \eta\mu(\text{τοξ}_{\kappa} \eta\mu\psi) = \psi$$

$$\beta) \text{Τοξ}_{\kappa} \eta\mu(-\psi) = -\text{Τοξ}_{\kappa} \eta\mu\psi$$

$$\gamma) \text{τοξ}_{\kappa} \eta\mu\psi = k\pi + (-1)^k \text{Τοξ}_{\kappa} \eta\mu\psi$$

$$\delta) \left\{ \begin{array}{l} \chi = \text{Τοξ}_{\kappa} \eta\mu\psi \\ \psi \in [-1, +1] \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\chi = \psi \\ \chi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \end{array} \right\}$$

1.2. Κατ' ἀνάλογον ἀκριβῶς τρόπον μελετᾶται τὸ πρόβλημα τῆς ὑπάρξεως ἀντιστρόφου συναρτήσεως τῆς συναρτήσεως συν (συνημίτονου) καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις αὐτῆς ἐντὸς τοῦ διαστήματος $\Delta_k = [k\pi, k\pi + \pi]$ μὲ $k \in \mathbb{Z}$ (ἀπόδειξις;). Ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις τῆς συναρτήσεως συν, περιοριζομένης ταύτης εἰς τὸ διάστημα Δ_k , συμβολίζεται μὲ **τοξ_κ συν** καὶ καλεῖται **ἀντίστροφος κυκλικὴ συνάρτησις** τῆς συναρτήσεως συν. Διὰ $k = 0$ ἔχομεν τὸ διάστημα $[0, \pi]$, ἡ ἀντιστοιχοῦσα δὲ εἰς τοῦτο συνάρτησις τοξ₀συν θὰ συμβολίζεται μὲ **Τοξ συν** (τόξον συνημίτονου). Ἡ τιμὴ Τοξ συνχ τῆς συναρτήσεως Τοξ συν εἰς τὸ τυχὸν $\chi \in [-1, +1]$ καλεῖται **πρωτεύουσα τιμὴ**. Π.χ.

$$\text{Τοξ συν} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}, \quad \text{Τοξ συν} (-1) = \pi \quad \text{καὶ} \quad \text{Τοξ συν} 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Διά του συμβόλου τοξ συν θα παριστώμεν την αντίστροφον αντίστοιχίαν τῆς συναρτήσεως συν : $\mathbb{R} \rightarrow [-1, +1]$ καὶ συνεπῶς τὸ τοξ συν ψ μὲ $|\psi| \leq 1$ εἶναι τὸ σύνολον: τοξ συν ψ = $\{ \chi \in \mathbb{R} : \text{συν} \chi = \psi \}$. Π.χ.

$$\text{Τοξ συν } \frac{1}{2} = \{ \chi \in \mathbb{R} : \text{συν} \chi = \frac{1}{2} \} =$$

$$= \{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z} \} \cup \{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z} \}$$

Ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τῆς συναρτήσεως τοξ_κ συν ἔπονται τὰ ἑξῆς:

α) $\text{συν}(\text{Τοξ}_{\kappa} \text{ συν} \psi) = \psi, \forall \kappa \in \mathbb{Z}$ καὶ $\forall \psi \in [-1, +1]$.

β) $\text{Τοξ}_{\kappa} \text{ συν}(-\psi) = \pi - \text{Τοξ}_{\kappa} \text{ συν} \psi, \forall \psi \in [-1, +1]$.

γ) $\text{τοξ}_{\kappa} \text{ συν} \psi = \kappa\pi + (-1)^{\kappa} \text{Τοξ}_{\kappa} \text{ συν} \psi + [1 - (-1)^{\kappa}] \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$ καὶ $\psi \in [-1, +1]$

δ) Ἰσχύει ἡ ἰσοδυναμία:

$$\left. \begin{array}{l} \chi = \text{Τοξ}_{\kappa} \text{ συν} \psi \\ \psi \in [-1, +1] \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{συν} \chi = \psi \\ \chi \in \left[\kappa\pi, (\kappa+1)\pi \right] \end{array} \right.$$

Παρατήρησις. Ἡ μελέτη τῆς ἀντίστροφου τῆς συναρτήσεως συν ἀνάγεται εἰς τὴν προηγουμένην, λόγῳ τῆς σχέσεως $\text{συν} \chi = \eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - \chi \right)$, θεωρουμένης εἰς τὸ διάστημα $\Delta_{\kappa} = [\kappa\pi, (\kappa+1)\pi]$ μὲ $\kappa \in \mathbb{Z}$.

1.3. Ἡ συνάρτησις εφ μὲ τύπον $\psi = \text{εφ} \chi$ εἶναι ὠρισμένη ἐν

$$\mathbb{R} - \{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z} \}$$

καὶ λαμβάνει τιμὰς ἐν \mathbb{R} . Ὡς γνωστόν, ἡ συνάρτησις αὕτη δὲν εἶναι ἀμφιμονοσήμαντος καὶ συνεπῶς δὲν ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις αὕτης. Ἀποδεικνύεται

ὅμως, ὅτι ἐντὸς τοῦ διαστήματος $\Delta_{\kappa} = \left(\kappa\pi - \frac{\pi}{2}, \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \right)$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$) ἡ συν-

άρτησις εφ εἶναι ἀμφιμονοσήμαντος ἐπὶ καὶ συνεπῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὀρισθῇ ἡ ἀντίστροφός της. Πράγματι: Ἐὰν $\chi_1, \chi_2 \in \Delta_{\kappa}$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$) μὲ $\chi_1 \neq \chi_2$ καὶ ὑποθέσωμεν $\text{εφ} \chi_1 = \text{εφ} \chi_2$, τότε $\chi_1 = \rho\pi + \chi_2$ ($\rho \in \mathbb{Z}$) καὶ ἔξ αὐτῆς ἔχομεν $\chi_1 - \chi_2 = \rho\pi$. Ἐξ ἄλλου, εἶναι:

$$\kappa\pi - \frac{\pi}{2} < \chi_1 < \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \quad (1) \quad (\kappa \in \mathbb{Z})$$

$$\kappa\pi - \frac{\pi}{2} < \chi_2 < \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \quad (2)$$

Ἐκ τῆς (2) προκύπτει:

$$-\kappa\pi + \frac{\pi}{2} > -\chi_2 > -\kappa\pi - \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\kappa\pi - \frac{\pi}{2} < -\chi_2 < -\kappa\pi + \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

Διά προσθέσεως κατά μέλη τῶν (1) καὶ (3) λαμβάνομεν: $-\pi < \chi_1 - \chi_2 < \pi$,
 ὅποτε, βάσει καὶ τῆς σχέσεως $\chi_1 - \chi_2 = \rho\pi$ ($\rho \in \mathbb{Z}$), ἔχομεν:

$$-\pi < \rho\pi < \pi \iff -1 < \rho < 1 \iff \rho = 0$$

Συνεπῶς ἡ σχέσις $\chi_1 - \chi_2 = \rho\pi$ γίνεται $\chi_1 - \chi_2 = 0 \Rightarrow \chi_1 = \chi_2$, τὸ ὁποῖον
 εἶναι ἄτοπον, διότι ὑπετέθη $\chi_1 \neq \chi_2$. Ἦτοι: $\chi_1 \neq \chi_2 \iff \varepsilon\varphi\chi_1 \neq \varepsilon\varphi\chi_2$.

Ἄρα, ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις τῆς συναρτήσεως $\varepsilon\varphi$, περιοριζομένης
 ταύτης εἰς τὸ διάστημα $\Delta_\kappa = \left(\kappa\pi - \frac{\pi}{2}, \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \right)$, ἡ ὁποία συμβολίζεται μὲ
 $\tau\omega_{\varepsilon\kappa} \varepsilon\varphi$ καὶ καλεῖται ἀντίστροφος κυκλικὴ συνάρτησις τῆς συναρτήσεως $\varepsilon\varphi$.

Εἰδικώτερον, ἂν $\kappa = 0$ τὸ διάστημα Δ_κ εἶναι $\Delta_0 = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$, ἡ δὲ

ἀντιστοιχοῦσα εἰς τοῦτο συνάρτησις $\tau\omega_0 \varepsilon\varphi$ θὰ συμβολίζεται μὲ $\text{To}\xi \varepsilon\varphi$ (τόξον
 ἑφαπτομένης). Ἡ τιμὴ $\text{To}\xi \varepsilon\varphi\chi$ τῆς συναρτήσεως $\text{To}\xi \varepsilon\varphi$ εἰς τὴν θέσιν

$\chi \in [\mathbb{R} - \{ \chi \in \mathbb{R} : \chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{2}, \lambda \in \mathbb{Z} \}]$ καλεῖται πρωτεύουσα τιμὴ. Π.χ.

$$\text{To}\xi \varepsilon\varphi 1 = \frac{\pi}{4}, \quad \text{To}\xi \varepsilon\varphi(-1) = -\frac{\pi}{4}, \quad \text{To}\xi \varepsilon\varphi\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

Καθ' ὅμοιον ἀκριβῶς τρόπον, ὀρίζεται ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις τῆς συναρ-
 τήσεως $\sigma\varphi$, περιοριζομένης ταύτης εἰς τὸ διάστημα $\Delta_\kappa = (\kappa\pi, \kappa\pi + \pi)$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.
 Δηλαδή, ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ συνάρτησις $\sigma\varphi$ εἶναι ἀμφινομοσήμαντος ἐπὶ, ἐντὸς
 τοῦ διαστήματος $\Delta_\kappa = (\kappa\pi, \kappa\pi + \pi)$ (ἀπόδειξις ;).

Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῶν συναρτήσεων $\tau\omega_{\varepsilon\kappa} \varepsilon\varphi$ καὶ $\tau\omega_{\varepsilon\kappa} \sigma\varphi$ συνάγεται:

α) $\varepsilon\varphi(\tau\omega_{\varepsilon\kappa} \varepsilon\varphi\psi) = \psi, \forall \psi \in \mathbb{R}$ καὶ $\forall \kappa \in \mathbb{Z}$

β) $\text{To}\xi \varepsilon\varphi(-\psi) = -\text{To}\xi \varepsilon\varphi\psi, \forall \psi \in \mathbb{R}$

γ) $\tau\omega_{\varepsilon\kappa} \varepsilon\varphi\psi = \kappa\pi + \text{To}\xi \varepsilon\varphi\psi, \forall \psi \in \mathbb{R}$ καὶ $\forall \kappa \in \mathbb{Z}$.

Ἐπίσης ἀποδεικνύεται εὐκόλως ὅτι:

$$\text{To}\xi \varepsilon\varphi\psi = \text{To}\xi \sigma\varphi \frac{1}{\psi}, \text{ ἂν } \psi > 0 \text{ καὶ } \text{To}\xi \varepsilon\varphi\psi = -\pi + \text{To}\xi \sigma\varphi \frac{1}{\psi}, \text{ ἂν } \psi < 0$$

Τὰ αὐτὰ ἀκριβῶς ἰσχύουν καὶ διὰ τὴν συνάρτησιν $\tau\omega_{\varepsilon\kappa} \sigma\varphi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.


1.4. Γραφικὴ παράστασις τῶν ἀντιστρόφων κυκλικῶν συναρτήσεων. Γνωρίζομεν
 ὅτι, ἂν f εἶναι μία συνάρτησις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς καὶ f^{-1} ἡ ἀντί-
 στροφος αὐτῆς, τότε τὰ διαγράμματα S_f καὶ $S_{f^{-1}}$ τῶν συναρτήσεων f καὶ f^{-1}
 ἀντιστοιχῶς εἰς ὀρθογώνιον σύστημα ἀξόνων, εἶναι συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὴν
 ἀπώτερην διχοτόμον. Τῇ βοήθειᾳ τούτου, εἶναι εὐκόλον νὰ χαράξωμεν τὰ διαγράμ-
 ματα τῶν ἀντιστρόφων κυκλικῶν συναρτήσεων, ἀρκεῖ βεβαίως νὰ γνωρίζομεν
 τὰ διαγράμματα τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων. Συγκεκριμένως, θεωροῦ-
 μεν τὴν συνάρτησιν $\text{To}\xi\eta\mu$, ὡς ὠρίσθη ἀνωτέρω. Αὕτη εἶναι ἡ ἀντίστροφος
 τῆς συναρτήσεως $\eta\mu$ ἐντὸς τοῦ διαστήματος $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ καὶ συνεπῶς, τὰ δια-

γράμματα S και S^{-1} τῶν συναρτήσεων $\eta\mu$ και $\text{To}\zeta \eta\mu$ ἀντιστοίχως (Σχ. 6) εἶναι συμμετρικά ὡς πρὸς τὴν πρώτην διχοτόμον d .


Ἐν προκειμένῳ, ὑποθέτομεν γνωστὸν τὸ διάγραμμα S (ἡμίτονοειδὴς καμπύλη) τῆς συναρτήσεως $\eta\mu$. Ἐν συνεχείᾳ, θεωροῦμεν τὴν συνάρτησιν $\text{to}\zeta\kappa \eta\mu$, $\kappa \in \mathbb{Z}$. Ἡ γραφικὴ παράστασις αὐτῆς θὰ προκύψῃ διὰ παραλλήλου μεταφορᾶς τοῦ διαγράμματος S^{-1} τῆς $\text{To}\zeta \eta\mu$ κατὰ $\kappa\pi$ ($\kappa \in \mathbb{Z}$) καὶ τοῦτο ἐνεκα τῆς σχέσεως:

$\text{to}\zeta\kappa \eta\mu\chi = \kappa\pi + \text{To}\zeta \eta\mu\chi$
 Καθ' ὅμοιον τρόπον, χαράσσονται τὰ διαγράμματα τῶν ὑπολοίπων ἀντιστρέφων κυκλικῶν συναρτήσεων.


Τὰ διαγράμματα ταῦτα δίδονται εἰς τὰ κάτωθι σχήματα (7, 8 καὶ 9):




Σχ. 6



Σχ. 7



Σχ. 8



Σχ. 9

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νά δειχθῆ ὅτι:

$$\text{Τοξ εφ } \frac{1}{2} + \text{Τοξ εφ } \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4} \quad (1)$$

Ἀπόδειξις : Θέτομεν $\text{Τοξ εφ } \frac{1}{2} = \alpha$ (I)

καὶ $\text{Τοξ εφ } \frac{1}{3} = \beta$ (II), ὁπότε $\text{εφ} \alpha = \frac{1}{2}$

καὶ $\text{εφ} \beta = \frac{1}{3}$. Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς

πρωτενούσης τιμῆς $\text{Τοξ εφ } \frac{1}{2} = \alpha$ συν-

άγεται ἀμέσως ὅτι $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Ὁ-

μοίως συνάγεται $-\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$. Ἐπει-

δή ὁμως εἶναι: $\text{εφ} 0 < \text{εφ} \alpha < \text{εφ} \frac{\pi}{4}$ καὶ $\text{εφ} 0 < \text{εφ} \beta < \text{εφ} \frac{\pi}{4}$, προκύπτει $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$

καὶ $0 < \beta < \frac{\pi}{4}$. Συνεπῶς, ἐκ τῶν (I) καὶ (II) ἔχομεν:

$$\text{εφ} \alpha = \frac{1}{2}, \quad \text{εφ} \beta = \frac{1}{3} \quad (2)$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{4}, \quad 0 < \beta < \frac{\pi}{4} \quad (3)$$

$$(1) \Leftrightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{4} \quad (4)$$

Ἐπὶ πλέον, δυνάμει καὶ τῶν σχέσεων (2), εἶναι:

$$\text{εφ}(\alpha + \beta) = \frac{\text{εφ} \alpha + \text{εφ} \beta}{1 - \text{εφ} \alpha \text{εφ} \beta} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1.$$

Ἄρα, $\alpha + \beta = k\pi + \frac{\pi}{4}$, $k \in \mathbb{Z}$. Ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ δειξῶμεν ὅτι $k = 0$, ὁπότε

προκύπτει ἡ ἀποδεικτέα σχέση (4). Ἐκ τῶν σχέσεων (3), διὰ προσθέσεως κατὰ

μέλη λαμβάνομεν $0 < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$ καὶ συνεπῶς ἔχομεν:

$$0 < k\pi + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{4} < k < \frac{1}{4} \Leftrightarrow k = 0$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Ἐὰν $\chi > 0$, $\psi > 0$ καὶ $\chi\psi < 1$, τότε ἰσχύει ἡ σχέση:

$$\text{Τοξ εφ} \chi + \text{Τοξ εφ} \psi = \text{Τοξ εφ} \frac{\chi + \psi}{1 - \chi\psi} \quad (1)$$

Ἀπόδειξις: Ἐπειδὴ $\chi\psi < 1$ καὶ $\chi + \psi > 0$, συνάγεται $\frac{\chi + \psi}{1 - \chi\psi} > 0$. Ἐν συνεχείᾳ

θέτομεν $\text{Tox} \epsilon\phi\chi = \alpha$, $\text{Tox} \epsilon\phi\psi = \beta$ καὶ $\text{Tox} \epsilon\phi \frac{\chi + \psi}{1 - \chi\psi} = \gamma$, ὁπότε ἔχομεν:

$$\epsilon\phi\alpha = \chi, \epsilon\phi\beta = \psi, \epsilon\phi\gamma = \frac{\chi + \psi}{1 - \chi\psi} \quad (2)$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < \beta < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < \gamma < \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$(1) \iff \alpha + \beta = \gamma \quad (4)$$

Ἐξ ἄλλου, βάσει καὶ τῶν (2), εἶναι: $\epsilon\phi(\alpha + \beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{1 - \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta} = \frac{\chi + \psi}{1 - \chi\psi} = \epsilon\phi\gamma$, ὁπότε $\alpha + \beta = \kappa\pi + \gamma$, $\kappa \in \mathbb{Z}$ (5). Ἀρκεῖ νὰ δείξωμεν ὅτι $\kappa = 0$, ὁπότε βάσει τῆς (5), προκύπτει ἡ ἀποδεικτέα σχέσις (4). Ἐκ τῶν (3) λαμβάνομεν

$-\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta - \gamma < \pi$. Ἐξ αὐτῆς καὶ τῆς (5) προκύπτει:

$$-\frac{\pi}{2} < \kappa\pi < \pi \iff -\frac{1}{2} < \kappa < 1 \iff \kappa = 0.$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. Νὰ ἐπιλυθῆ ἡ ἐξίσωσις: $\text{Tox} \eta\mu\chi + \text{Tox} \eta\mu\chi \sqrt{3} = \frac{\pi}{2}$ (1)

Ἐπίλυσις: Τὸ πρῶτον μέλος τῆς δοθείσης ἐξισώσεως ὀρίζεται (ἔχει ἔννοια) ἔφ' ὅσον εἶναι:

$$\left\{ \begin{array}{l} -1 \leq \chi \leq 1 \\ -1 \leq \chi\sqrt{3} \leq 1 \end{array} \right\} \iff -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \chi \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Ἐν συνεχείᾳ θέτομεν $\text{Tox} \eta\mu\chi = \alpha$ καὶ $\text{Tox} \eta\mu\chi\sqrt{3} = \beta$. Κατόπιν τούτου ἔχομεν:

$$\eta\mu\alpha = \chi, \quad \eta\mu\beta = \chi\sqrt{3} \quad (2)$$

$$-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$(1) \iff \begin{cases} \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \chi \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases} \quad (4)$$

Διακρίνομεν τὰς ἀκολουθοῦσας περιπτώσεις:

(α) Ἐὰν $\chi \leq 0$, τότε, βάσει καὶ τῶν (2), (3), προκύπτει $-\frac{\pi}{2} < \alpha \leq 0$ καὶ

$-\frac{\pi}{2} < \beta \leq 0$, ὁπότε $-\pi < \alpha + \beta \leq 0$. Ἐκ τούτου συνάγεται, ὅτι ἡ ἐξίσωσις (1) εἶναι ἀδύνατος.

β) 'Εάν $\chi > 0$, τότε, βάσει και τῶν (2), εἶναι $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ και

$$0 < \beta < \frac{\pi}{2} \left(\Leftrightarrow 0 < \frac{\pi}{2} - \beta < \frac{\pi}{2} \right).$$

*'Αρα, ἔχομεν:

$$(1) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\alpha = \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \\ 0 < \chi \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\alpha = \sigma\upsilon\nu\beta \\ 0 < \chi \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi = \sqrt{1 - 3\chi^2} \\ 0 < \chi \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4\chi^2 = 1 \\ 0 < \chi \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \chi = \frac{1}{2}.$$

Παρατήρησης. Διὰ τὴν λύσιν τῆς ἐξισώσεως (1) τοῦ ἀνωτέρω παραδείγματος, δυνάμεθα νὰ ἀκολουθήσωμεν και τὴν ἐπομένῃν μέθοδον :

Θεωροῦμεν τὴν ἐξίσωσιν $\eta\mu\alpha = \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$ (1), ἡ ὁποία εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὰς κάτωθι ἐξισώσεις:

$$\frac{\pi}{2} - \beta = \kappa\pi + (-1)^{\kappa}\alpha, \kappa \in \mathbb{Z} \quad (II)$$

*'Εκ τῶν ἐξισώσεων (II), διὰ $\kappa=0$ λαμβάνομεν τὴν ἐξίσωσιν $\frac{\pi}{2} - \beta = \alpha$ ($\Leftrightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$).

*'Εξ αὐτοῦ δὲν συνάγεται ὅτι αἱ ἐξισώσεις (1) και (4) εἶναι ἰσοδύναμοι, ἀλλὰ ἀπλῶς ὅτι κάθε λύσις τῆς (5) εἶναι και λύσις τῆς (1). *'Αρα, ἐὰν εὑρωμεν τὰς λύσεις τῆς (1) και ἐλέγξωμεν ποία ἐξ αὐτῶν εἶναι και λύσις τῆς (5), ἔχομεν ἐπιλύσει τὴν (5), ἡ ὁποία εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν (1).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4. 'Εάν $\chi > 0$, $\psi > 0$ και $\chi^2 + \psi^2 < 1$, νὰ δειχθῆ ὅτι:

$$\text{Τοξ } \eta\mu\chi + \text{Τοξ } \eta\mu\psi = \text{Τοξ } \eta\mu(\chi\sqrt{1-\psi^2} + \psi\sqrt{1-\chi^2}) \quad (1)$$

Ἀπόδειξις: 'Εκ τῆς ὑποθέσεως $\chi^2 + \psi^2 < 1$ συνάγεται ὅτι $\chi < 1$, $\psi < 1$ και $\chi\sqrt{1-\psi^2} + \psi\sqrt{1-\chi^2} < 1$, συνεπῶς τὰ μέλη τῆς (1) ὀρίζονται (ἔχουν ἔννοϊαν).

*'Εν συνεχείᾳ θέτομεν:

$$\text{Τοξ } \eta\mu\chi = \alpha, \text{ Τοξ } \eta\mu\psi = \beta \text{ και } \text{Τοξ } \eta\mu(\chi\sqrt{1-\psi^2} + \psi\sqrt{1-\chi^2}) = \gamma, \text{ ὁπότε}$$

$$\text{ἔχομεν: } \eta\mu\alpha = \chi, \eta\mu\beta = \psi, \eta\mu\gamma = \chi\sqrt{1-\psi^2} + \psi\sqrt{1-\chi^2} \quad (2)$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, 0 < \beta < \frac{\pi}{2}, 0 < \gamma < \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$(1) \Leftrightarrow \alpha + \beta = \gamma \quad (4)$$

Δυνάμει τῶν (2) λαμβάνομεν: $\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta \sigma\upsilon\nu\alpha = \eta\mu\alpha\sqrt{1-\eta\mu^2\beta} + \eta\mu\beta\sqrt{1-\eta\mu^2\alpha} = \chi\sqrt{1-\psi^2} + \psi\sqrt{1-\chi^2} = \eta\mu\gamma$. 'Εκ τῆς ἀποδείξεως σχέσεως $\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\gamma$ δὲν συνάγεται κατ' ἀνάγκην ὅτι $\alpha + \beta = \gamma$, ἥτοι ἡ ἀποδεικτέα σχέσηις (4). Θὰ πρέπει ἐπὶ πλέον νὰ δειξῶμεν ὅτι:

$0 < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$, επειδή και $0 < \gamma < \frac{\pi}{2}$, ώστε να προκύψει η ισότητα των τριγώνων $\alpha + \beta$ και γ εκ της ισότητας των ημιτόνων των. Πράγματι, εκ της $\chi^2 + \psi^2 < 1$ έχουμε :

$$\chi^2 + \psi^2 < 1 \Rightarrow \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2\beta < 1 \Rightarrow \eta\mu^2\alpha < 1 - \eta\mu^2\beta \Rightarrow \eta\mu^2\alpha < \sigma\upsilon\nu^2\beta \Rightarrow |\eta\mu\alpha| < |\sigma\upsilon\nu\beta| \Rightarrow \eta\mu\alpha < \sigma\upsilon\nu\beta \Rightarrow \eta\mu\alpha < \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right).$$

Έκ της τελευταίας σχέσεως, επειδή και $0 < \frac{\pi}{2} - \beta < \frac{\pi}{2}$, συνάγεται :

$$\alpha < \frac{\pi}{2} - \beta, \text{ \acute{o}\pi\omicron\tau\epsilon } 0 < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5. Εύρετε τὰς τιμὰς τῆς παραστάσεως :

$$\psi = \tau\omicron\varsigma \epsilon\phi(\sigma\phi\chi) + \tau\omicron\varsigma \sigma\phi(\epsilon\phi\chi).$$

Λύσις : Θέτομεν $\tau\omicron\varsigma \epsilon\phi(\sigma\phi\chi) = \alpha$ και $\tau\omicron\varsigma \sigma\phi(\epsilon\phi\chi) = \beta$, \acute{o}\pi\omicron\tau\epsilon \acute{\epsilon}\chi\omicron\mu\omicron\upsilon\mu\epsilon\upsilon\iota :

$$\epsilon\phi\alpha = \sigma\phi\chi \text{ και } \sigma\phi\beta = \epsilon\phi\chi,$$

$$\text{\texteta}\tau\omicron\iota: \epsilon\phi\alpha = \epsilon\phi\left(\frac{\pi}{2} - \chi\right) \text{ και } \sigma\phi\beta = \sigma\phi\left(\frac{\pi}{2} - \chi\right).$$

Έκ τῶν τελευταίων σχέσεων λαμβάνομεν: $\alpha = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} - \chi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$ και

$\beta = \lambda\pi + \frac{\pi}{2} - \chi$, $\lambda \in \mathbb{Z}$. Άρα, ἡ δοθεῖσα παράσταση γράφεται :

$$\psi = \alpha + \beta = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} - \chi + \lambda\pi + \frac{\pi}{2} - \chi = (\kappa + \lambda + 1)\pi - 2\chi$$

Αἱ διάφοροι λοιπὸν τιμαὶ τῆς παραστάσεως εἶναι: $\{\psi \in \mathbb{R} : \psi = \rho\pi - 2\chi, \rho \in \mathbb{Z}\}$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6. Νὰ ἐπιλυθῆ ἡ ἀνίσωσις: $2\tau\omicron\varsigma \eta\mu \frac{1}{3} + \tau\omicron\varsigma \eta\mu\chi < \frac{\pi}{2}$ (1)

Ἐπίλυσις : Τὸ πρῶτον μέλος τῆς (1) \acute{o}\rho\iota\zeta\epsilon\tau\omicron\iota, \acute{\epsilon}\phi' \acute{o}\sigma\omicron\upsilon\iota $|\chi| \leq 1$. Ἐν συνεχείᾳ θέτομεν $\tau\omicron\varsigma \eta\mu \frac{1}{3} = \alpha$ και $\tau\omicron\varsigma \eta\mu\chi = \beta$, \acute{o}\pi\omicron\tau\epsilon \acute{\epsilon}\chi\omicron\mu\omicron\upsilon\mu\epsilon\upsilon\iota :

$$\eta\mu\alpha = \frac{1}{3}, \eta\mu\beta = \chi \quad (2)$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha + \beta < \frac{\pi}{2} \\ |\chi| \leq 1 \end{cases} \quad (4)$$

$$\text{Είναι: } 0 < \alpha < \frac{\pi}{4} \Rightarrow 0 < 2\alpha < \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 > -2\alpha > -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{2} > \frac{\pi}{2} - 2\alpha > 0$$

Εκ τῆς τελευταίας, ἐπειδὴ εἶναι καὶ $-\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, συνάγεται:

$$\begin{aligned} (1) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta < \frac{\pi}{2} - 2\alpha \\ |\chi| \leq 1 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\beta < \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - 2\alpha\right) \\ |\chi| \leq 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\beta < \sigma\upsilon\nu 2\alpha \\ |\chi| \leq 1 \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\beta < 1 - 2\eta\mu^2\alpha \\ -1 \leq \chi \leq 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi < 1 - \frac{2}{9} \\ -1 \leq \chi \leq 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \chi < \frac{7}{9} \\ -1 \leq \chi \leq 1 \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow -1 \leq \chi < \frac{7}{9}. \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

39) Νὰ εὑρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν ἀκολουθῶν παραστάσεων :

1) $\text{Τοξ } \eta\mu \frac{\sqrt{3}}{2}$

2) $\eta\mu \left(\text{Τοξ } \eta\mu \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

3) $\sigma\upsilon\nu \left(\text{Τοξ } \eta\mu \frac{4}{5} \right)$

4) $\sigma\upsilon\nu \left(2 \text{Τοξ } \sigma\upsilon\nu \frac{3}{5} \right)$

5) $\text{Τοξ } \eta\mu \left(\eta\mu \frac{8\pi}{9} \right)$

6) $\epsilon\phi \left[\text{Τοξ } \sigma\upsilon\nu \left(-\frac{4}{5} \right) \right]$

7) $\text{Τοξ } \epsilon\phi \sqrt{3} + \text{Τοξ } \epsilon\phi 1$

8) $2\text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{3} + \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{7}$

40) Νὰ δειχθοῦν αἱ κάτωθι ἰσότητες :

1) $\text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{2} + \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{5} + \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$

2) $\text{Τοξ } \sigma\phi 7 + \text{Τοξ } \sigma\phi 8 + \text{Τοξ } \sigma\phi 18 = \text{Τοξ } \sigma\phi 3$

3) $\sigma\upsilon\nu \left(2 \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{7} \right) = \eta\mu \left(4 \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{3} \right)$

41) Νὰ δειχθῆ ἡ ταυτότης : $\text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{\alpha}{\alpha+1} + \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{2\alpha+1} = \frac{\pi}{4} \quad (\alpha > 0)$.

42) Εὑρετε διὰ ποίας τιμᾶς τοῦ n ἰσχύει ἡ σχέσηις : $\text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{v}{v+1} + \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1}{2v+1} = \frac{\pi}{4}$

43) Ἐὰν $\chi, \psi, \omega > 0$, νὰ δειχθῆ ὅτι:

$$\text{Τοξ } \epsilon\phi \chi + \text{Τοξ } \epsilon\phi \psi + \text{Τοξ } \epsilon\phi \omega = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \chi\psi + \psi\omega + \omega\chi = 1$$

44) Νὰ δειχθῆ ὅτι $\text{Τοξ } \epsilon\phi \chi + \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1-\chi}{1+\chi} = \frac{\pi}{4}$, ἐὰν $\chi > -1$ καὶ

$$\text{Τοξ } \epsilon\phi \chi + \text{Τοξ } \epsilon\phi \frac{1-\chi}{1+\chi} = -\frac{3\pi}{4}, \quad \text{ἐὰν } \chi < -1.$$

45) 'Εάν $\chi > 0$, $\psi > 0$ και $\chi\psi > 1$, τότε ισχύει η σχέση :

$$\text{Τοξ εφ}\chi + \text{Τοξ εφ}\psi = \pi + \text{Τοξ εφ} \frac{\chi + \psi}{1 - \chi\psi}$$

46) Δείξτε ότι : $\text{τοξ εφ}\chi + \text{τοξ εφ}\psi = \kappa\pi + \text{τοξ εφ} \frac{\chi + \psi}{1 - \chi\psi}$ ($\chi, \psi \in \mathbb{R}$ και $\kappa \in \mathbb{Z}$)

47) 'Εάν $\chi > 0$ και $\psi > 0$, δείξτε ότι: $\text{Τοξ σφ}\chi + \text{Τοξ σφ}\psi = \text{Τοξ σφ} \frac{\chi\psi - 1}{\chi + \psi}$

48) 'Εάν $\chi > 0$, $\psi > 0$ και $\text{Τοξ ημ}\chi + \text{Τοξ ημ}\psi < \frac{\pi}{2}$, τότε ισχύει η σχέση (1) του παραδείγματος

4 (Άρκει να δειχθῆ ότι : $\text{Τοξ ημ}\chi + \text{Τοξ ημ}\psi < \frac{\pi}{2} \iff \chi^2 + \psi^2 < 1$).

49) 'Εάν $\chi, \psi, \omega > 0$, να δειχθῆ ότι :

$$\text{Τοξ συν}\chi + \text{Τοξ συν}\psi + \text{Τοξ συν}\omega = \pi \iff \chi^2 + \psi^2 + \omega^2 + 2\chi\psi\omega = 1$$

50) 'Επιλύσατε τὰς κάτωθι ἐξισώσεις :

1) $\text{Τοξ εφ} \frac{3\chi}{2} + \text{Τοξ σφ} \frac{1}{\chi} = \frac{\pi}{4}$

2) $\text{Τοξ ημ}\chi + \text{Τοξ ημ}2\chi = \frac{\pi}{2}$

3) $\text{Τοξ εφ} \frac{2}{5} - \text{Τοξ εφ}\chi = \frac{\pi}{4}$

4) $\eta\mu \left(\text{Τοξ εφ} \frac{1}{2} \right) = \text{εφ}(\text{Τοξ συν}\sqrt{\chi})$

5) $\eta\mu [2 \text{Τοξ ημ}\chi] = \chi$

6) $\text{Τοξ εφ}\chi + \text{Τοξ εφ} \frac{2\chi + 1}{2\chi - 23} = \frac{\pi}{4}$

51) Προσδιορίσατε τὸν ἀκέραιον κ εἰς τρόπον, ὥστε ἡ ἐπομένη ἐξίσωσις νὰ ἔχη λύσιν :

$$\text{Τοξ εφ} \frac{\chi + 1}{\chi - 1} + \text{Τοξ εφ} \frac{\chi - 1}{\chi} = \kappa\pi + \text{Τοξ εφ}(-7)$$

52) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἀνισώσεις :

1) $\text{Τοξ συν} \frac{1}{2} > \frac{3\pi}{4}$

2) $\text{Τοξ εφ}\chi + \text{Τοξ σφ}(\chi - 1) < \frac{\pi}{2}$

3) $|\text{τοξ ημ} \frac{1}{2}| < \frac{4\pi}{3}$

53) Νὰ ἐπιλυθῆ ἡ ἀνίσωσις : $\eta\mu [\text{Τοξ σφ}(\text{συν}(\text{Τοξ εφ}\chi))] > \chi$.

54) Εὑρετε τὰς διαφόρους τιμὰς τῆς παραστάσεως $\psi = \text{συν} \left(\frac{1}{3} \text{τοξ ημ}\alpha \right)$, $0 < \alpha < 1$. 'Εν σὺν
χείρῃ, δείξτε ὅτι τὸ γινόμενον αὐτῶν ἰσοῦται μὲ $\frac{1}{16} (\alpha^2 - 1)$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ — ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ

1. Σχέσεις μεταξύ τῶν στοιχείων τυχόντος τριγώνου

1.1. Συμβολίζομεν με α, β, γ ἀντιστοίχως τὰ μήκη τῶν πλευρῶν ἑνὸς τριγώνου $ΑΒΓ$ καὶ με A, B, Γ τὰ μέτρα τῶν τριῶν γωνιῶν του. Ἐφ' ἐξῆς θὰ λέγωμεν: ἡ «πλευρὰ α » ἀντὶ τὸ «μῆκος τῆς πλευρᾶς α » ὡς καὶ ἡ «γωνία A » ἀντὶ τὸ «μέτρον τῆς γωνίας A ». Τὸ αὐτὸ βεβαίως θὰ ἰσχύη καὶ δι' ὅλα τὰ γωνιακὰ καὶ γραμμικὰ στοιχεῖα¹ τοῦ τριγώνου.

Αἱ πλευραὶ καὶ αἱ γωνίαι ἑνὸς τριγώνου εἶναι θετικοὶ ἀριθμοὶ καὶ συνδέονται, ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς Γεωμετρίας, διὰ τῶν κάτωθι σχέσεων:

$$\left. \begin{aligned} A + B + \Gamma &= \Pi \\ |\beta - \gamma| < \alpha < \beta + \gamma \\ |\gamma - \alpha| < \beta < \gamma + \alpha \\ |\alpha - \beta| < \gamma < \alpha + \beta \end{aligned} \right\} (I) \text{ (Τριγωνικὴ ἰδιότης)}$$

1.2. Θεμελιώδεις ὁμάδες τύπων. Μεταξὺ τῶν κυρίων στοιχείων ($\alpha, \beta, \gamma, A, B, \Gamma$) ἑνὸς τριγώνου $ΑΒΓ$ ὑπάρχουν, ὡς ἤδη γνωρίζομεν, διάφοροι σχέσεις (τύποι) π.χ. Νόμος τῶν ἡμιτόνων, Νόμος τῶν συνημιτόνων κ.λπ. Κατωτέρω θὰ ἀναφέρωμεν καὶ θὰ ἀποδείξωμεν τρεῖς θεμελιώδεις ὁμάδας τύπων, διὰ τῶν ὁποίων συνδέονται τὰ κύρια στοιχεῖα ἑνὸς τριγώνου.


*Ἐστῶσαν $ΑΒΓ$ τυχὸν τρίγωνον καὶ O τὸ κέντρον τῆς περιγεγραμμένης

¹ Λέγοντες «γραμμικὸν στοιχεῖον» ἑνὸς τριγώνου, ἐννοοῦμεν ἐν προκειμένῳ τὸ μῆκος οἰουδήποτε εὐθυγράμμου τμήματος, τὸ ὁποῖον ἔχει σχέσηιν μετὰ τὸ τρίγωνον. Π.χ. αἱ πλευραὶ, τὰ ὕψη, αἱ διχοτόμοι κ.λπ., ἑνὸς τριγώνου, εἶναι γραμμικὰ στοιχεῖα αὐτοῦ. Τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς τριγώνου θὰ θεωρῆται ἐφ' ἐξῆς γραμμικὸν στοιχεῖον αὐτοῦ.


περιφέρειας αὐτοῦ, ἀκτῖνος R . Φέρομεν τὴν διάμετρον $B\Delta$ (Σχ. 10 ἢ Σχ. 11). Ἐὰν

$$A < \frac{\pi}{2} \left(\text{ἢ } A > \frac{\pi}{2} \right),$$

τότε ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου $B\Gamma\Delta$ ἔχομεν $(B\Gamma) = (B\Delta)\eta\mu\Delta$ (ἢ $(B\Gamma) = B\Delta)\eta\mu(\pi - \Delta)$), ὁπότε εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις προκύπτει $\alpha = 2R\eta\mu A$, διότι εἶναι $A = \Delta$ καὶ $\eta\mu(\pi - \Delta) = \eta\mu\Delta$. Ἐπὶ πλέον, ἐὰν



Σχ. 10



Σχ. 11

$A = \frac{\pi}{2}$, διαπιστοῦται εὐκόλως ὅτι ἰσχύει καὶ πάλιν ἡ ἀποδειχθεῖσα σχέση $\alpha = 2R\eta\mu A$. Ἀναλόγως ἐργαζόμενοι, εὐρίσκομεν $\beta = 2R\eta\mu B$ καὶ $\gamma = 2R\eta\mu\Gamma$. Ἐκ τούτων, συναγεται τὸ θεώρημα τῶν ἡμιτόνων (Νόμος τῶν ἡμιτόνων):

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = 2R \quad (II)$$

Ἐχομεν, ἤδη, τὴν ἐπομένην θεμελιώδη ομάδα τύπων :

$$(A) \quad \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} \quad 1 \\ A + B + \Gamma = \pi \quad 2 \end{array}$$

Τὴν δευτέραν θεμελιώδη ομάδα τύπων ἀποτελοῦν οἱ γνωστοὶ τύποι τοῦ **θεωρήματος τῶν συνημιτόνων** (Νόμος τῶν συνημιτόνων). Ἦτοι:

$$(B) \quad \begin{array}{l} \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \text{ συν}A \quad 3 \\ \beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 2\gamma\alpha \text{ συν}B \quad 4 \\ \gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \text{ συν}\Gamma \quad 5 \end{array}$$

Εἰς τυχὸν τρίγωνον ἰσχύει $\eta\mu A = \eta\mu(B + \Gamma)$ καὶ συνεπῶς ἔχομεν:
 $\eta\mu A = \eta\mu B \text{ συν}\Gamma + \eta\mu\Gamma \text{ συν}B \iff 2R\eta\mu A = (2R\eta\mu B) \text{ συν}\Gamma + (2R\eta\mu\Gamma) \text{ συν}B \iff$
 $\alpha = \beta \text{ συν}\Gamma + \gamma \text{ συν}B$ (δυνάμει καὶ τοῦ τύπου (II)).

Διὰ κυκλικῆς δὲ ἐναλλαγῆς τῶν α, β, γ καὶ A, B, Γ λαμβάνομεν τὴν ἀκόλουθον θεμελιώδη ομάδα τύπων, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τὸ **θεώρημα τῶν προβολῶν**:

$$(Γ) \quad \begin{array}{l} \alpha = \beta \text{ συν}\Gamma + \gamma \text{ συν}B \quad 6 \\ \beta = \gamma \text{ συν}A + \alpha \text{ συν}\Gamma \quad 7 \\ \gamma = \alpha \text{ συν}B + \beta \text{ συν}A \quad 8 \end{array}$$

1.2.1. Θεώρημα. Έάν $\alpha, \beta, \gamma > 0$ καί $A, B, \Gamma \in (0, \pi)$, τότε αί άνωτέρω όμάδες τύπων (A), (B) καί (Γ) είναι ίσοδύναμοι.

Άπόδειξις: (A) \Rightarrow (B): Έκ τοῦ τύπου 2 λαμβάνομεν : $A = \pi - (B + \Gamma) \Rightarrow$
 $\eta\mu A = \eta\mu (B + \Gamma) \Rightarrow \eta\mu A = \eta\mu B \sigma\upsilon\nu\Gamma + \eta\mu\Gamma \sigma\upsilon\nu B \Rightarrow \eta\mu^2 A =$
 $\eta\mu^2 B \sigma\upsilon\nu^2\Gamma + \eta\mu^2\Gamma \sigma\upsilon\nu^2 B + 2\eta\mu B \eta\mu\Gamma \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu\Gamma \Rightarrow \eta\mu^2 A =$
 $\eta\mu^2 B (1 - \eta\mu^2\Gamma) + \eta\mu^2\Gamma (1 - \eta\mu^2 B) + 2\eta\mu B \eta\mu\Gamma \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu\Gamma \Rightarrow \eta\mu^2 A =$
 $\eta\mu^2 B - \eta\mu^2 B \eta\mu^2\Gamma + \eta\mu^2\Gamma - \eta\mu^2\Gamma \eta\mu^2 B + 2\eta\mu B \eta\mu\Gamma \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu\Gamma \Rightarrow \eta\mu^2 A =$
 $\eta\mu^2 B + \eta\mu^2\Gamma + 2\eta\mu B \eta\mu\Gamma (\sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu\Gamma - \eta\mu B \eta\mu\Gamma) \Rightarrow \eta\mu^2 A =$
 $\eta\mu^2 B + \eta\mu^2\Gamma + 2\eta\mu B \eta\mu\Gamma \sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) \Rightarrow \eta\mu^2 A = \eta\mu^2 B + \eta\mu^2\Gamma - 2\eta\mu B \eta\mu\Gamma \sigma\upsilon\nu A$
 Έκ τῆς τελευταίας, βάσει καί τῶν σχέσεων $\eta\mu B = \beta \frac{\eta\mu A}{\alpha}$, $\eta\mu\Gamma = \gamma \frac{\eta\mu A}{\alpha}$,

προκύπτει:

$$\eta\mu^2 A = \frac{\beta^2}{\alpha^2} \eta\mu^2 A + \frac{\gamma^2}{\alpha^2} \eta\mu^2 A - 2 \frac{\beta\gamma}{\alpha^2} \eta\mu^2 A \sigma\upsilon\nu A \Rightarrow \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\nu A.$$

Όμοίως άποδεικνύονται καί οί υπόλοιποι τύποι τῆς όμάδος (B).

(B) \Rightarrow (Γ): Διά προσθέσεως τῶν (3) καί (4) λαμβάνομεν:

$$\alpha^2 + \beta^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\nu A - 2\gamma\alpha \sigma\upsilon\nu B \Rightarrow$$

$$2\gamma^2 = 2\gamma (\beta \sigma\upsilon\nu A + \alpha \sigma\upsilon\nu B) \Rightarrow \gamma = \beta \sigma\upsilon\nu A + \alpha \sigma\upsilon\nu B$$

Άναλόγως προκύπτουν καί οί υπόλοιποι τύποι τῆς όμάδος (Γ).

(Γ) \Rightarrow (A): Πολλαπλασιάζομεν άμφότερα τά μέλη τῆς μὲν 6 με α , τῆς δὲ 7 με β καί ἔχομεν άντιστοιχως: $\alpha^2 = \alpha\beta \sigma\upsilon\nu\Gamma + \alpha\gamma \sigma\upsilon\nu B$, $\beta^2 = \beta\gamma \sigma\upsilon\nu A + \alpha\beta \sigma\upsilon\nu\Gamma$.

Τās τελευταίας σχέσεις άφαιροῦμεν κατὰ μέλη καί προκύπτει: $\alpha^2 - \beta^2 = \gamma(\alpha\sigma\upsilon\nu B - \beta\sigma\upsilon\nu A)$. Έξ αὐτῆς καί βάσει τῆς 8 ἔχομεν:

$$\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha\sigma\upsilon\nu B + \beta\sigma\upsilon\nu A) (\alpha\sigma\upsilon\nu B - \beta\sigma\upsilon\nu A) \Rightarrow \alpha^2 - \beta^2 = \alpha^2 \sigma\upsilon\nu^2 B - \beta^2 \sigma\upsilon\nu^2 A \Rightarrow$$

$$\alpha^2 (1 - \sigma\upsilon\nu^2 B) = \beta^2 (1 - \sigma\upsilon\nu^2 A) \Rightarrow \alpha^2 \eta\mu^2 B = \beta^2 \eta\mu^2 A \Rightarrow \alpha \eta\mu B = \beta \eta\mu A, \text{ διότι } \alpha,$$

$\beta, \eta\mu A$ καί $\eta\mu B$ θετικοί άριθμοί. Όμοίως άποδεικνύεται ὅτι: $\beta \eta\mu\Gamma = \gamma \eta\mu B$,

όπότε $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma}$.

Άπομένει νά δείξωμεν ὅτι $A + B + \Gamma = \pi$. Έκ τοῦ θεωρήματος τῶν ἡμι-

τόνων λαμβάνομεν $\beta = \frac{\alpha}{\eta\mu A} \eta\mu B$, $\gamma = \frac{\alpha}{\eta\mu A} \eta\mu\Gamma$ καί συνεπῶς, δυνάμει καί

τῆς 6, ἔχομεν:

$$\alpha = \frac{\alpha}{\eta\mu A} \eta\mu B \sigma\upsilon\nu\Gamma + \frac{\alpha}{\eta\mu A} \eta\mu\Gamma \sigma\upsilon\nu B \Rightarrow \eta\mu A = \eta\mu B \sigma\upsilon\nu\Gamma + \eta\mu\Gamma \sigma\upsilon\nu B \Rightarrow$$

$$\eta\mu A = \eta\mu(B + \Gamma).$$

Άναλόγως προκύπτει $\eta\mu B = \eta\mu(\Gamma + A)$ καί $\eta\mu\Gamma = \eta\mu(A + B)$. Έκ τῶν τελευταίων τριῶν σχέσεων ἔχομεν:

$$\left. \begin{aligned} B+\Gamma &= 2\kappa\pi + A \quad \eta \quad B+\Gamma = (2\kappa'+1)\pi - A \\ \Gamma+A &= 2\lambda\pi + B \quad \eta \quad \Gamma+A = (2\lambda'+1)\pi - B \\ A+B &= 2\mu\pi + \Gamma \quad \eta \quad A+B = (2\mu'+1)\pi - \Gamma \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{aligned} B+\Gamma-A &= 2\kappa\pi \quad \eta \quad A+B+\Gamma = (2\kappa'+1)\pi & (\kappa, \kappa' \in \mathbb{Z}) \\ \Gamma+A-B &= 2\lambda\pi \quad \eta \quad \Gamma+A+B = (2\lambda'+1)\pi & (\lambda, \lambda' \in \mathbb{Z}) \\ A+B-\Gamma &= 2\mu\pi \quad \eta \quad A+B+\Gamma = (2\mu'+1)\pi & (\mu, \mu' \in \mathbb{Z}) \end{aligned} \right.$$

Ἐπειδὴ ὁμως εἶναι $A, B, \Gamma \in (0, \pi)$ συνάγεται ὅτι $(A+B+\Gamma) \in (0, 3\pi)$ καὶ $(B+\Gamma-A), (\Gamma+A-B), (A+B-\Gamma) \in (-\pi, 2\pi)$. Συνεπῶς, παρατηροῦμεν ὅτι

Ἐὰν $B+\Gamma-A = 2\kappa\pi$, τότε εἶναι: $-\pi < 2\kappa\pi < 2\pi \Rightarrow -\frac{1}{2} < \kappa < 1 \Rightarrow \kappa = 0$

Ἐὰν $A+B+\Gamma = (2\kappa'+1)\pi$, τότε εἶναι:

$$0 < (2\kappa'+1)\pi < 3\pi \Rightarrow -\frac{1}{2} < \kappa' < 1 \Rightarrow \kappa' = 0.$$

Ἄρα, τελικῶς ἔχομεν $A+B+\Gamma = \pi$ (διατί);

Διατυποῦμεν ἤδη καὶ ἀποδεικνύομεν τὸ ἐπόμενον θεώρημα:

1.2.2. Θεώρημα. Ἐὰν οἱ θετικοὶ ἀριθμοὶ α, β, γ καὶ αἱ θετικαὶ γωνίαι A, B, Γ ἰκανοποιῦν τὰς σχέσεις τῆς ομάδος (A), τότε, ὑπάρχει ἓν καὶ μόνον ἓν τρίγωνον, μὲ πλευρὰς α, β, γ καὶ γωνίας τὰς A, B, Γ .

Ἀπόδειξις: Ἐστω τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ τοιοῦτον, ὥστε $(B'\Gamma') = \alpha$, $B' = B$ καὶ $\Gamma' = \Gamma$. Ἡ κατασκευὴ ἐνὸς τοιοῦτου τριγώνου εἶναι πάντοτε δυνατὴ, διότι $B+\Gamma = B'+\Gamma' < \pi$. Εἶναι $A'+B'+\Gamma' = \pi$, ὁπότε $A'+B+\Gamma = \pi$ καὶ συνεπῶς βάσει καὶ τῆς (2), προκύπτει $A' = A$.

Ἐπὶ πλέον, δυνάμει τοῦ θεωρήματος τῶν ἡμιτόνων διὰ τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ ἔχομεν:

$$\frac{(B'\Gamma')}{\eta\mu A'} = \frac{(\Gamma'A')}{\eta\mu B'} = \frac{(A'B')}{\eta\mu \Gamma'} \Rightarrow \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{(\Gamma'A')}{\eta\mu B} = \frac{(A'B')}{\eta\mu \Gamma}$$

Ἐκ τῆς τελευταίας, βάσει καὶ τοῦ τύπου 1, λαμβάνομεν $(\Gamma'A') = \beta$ καὶ $(A'B') = \gamma$.

Ἄρα, τὰ ἔξ στοιχεῖα $\alpha, \beta, \gamma, A, B$ καὶ Γ εἶναι στοιχεῖα τοῦ τριγώνου $A'B'\Gamma'$. Τὸ μονοσήμαντον τοῦ τριγώνου $A'B'\Gamma'$ εἶναι προφανές.

Ἀναφέρομεν κατωτέρω δύο θεωρήματα, τῶν ὁποίων αἱ ἀποδείξεις στηρίζονται εἰς τὴν ἰσοδυναμίαν τῶν θεμελιωδῶν ομάδων τύπων καὶ εἰς τὸ ἀνωτέρω θεώρημα καὶ συνεπῶς παραλείπονται.

1.2.3. Θεώρημα. Ἐὰν οἱ θετικοὶ ἀριθμοὶ α, β, γ καὶ αἱ γωνίαι A, B, Γ μὲν $A, B, \Gamma \in (0, \pi)$ πληροῦν τὰς σχέσεις τῆς ομάδος (B), τότε ὑπάρχει ἓν καὶ μόνον ἓν τρίγωνον μὲ πλευρὰς τὰς α, β, γ καὶ γωνίας τὰς A, B, Γ (ἀπόδειξις;).

1.2.4. Θεώρημα. Ἐὰν οἱ θετικοὶ ἀριθμοὶ α, β, γ καὶ αἱ γωνίαι $A, B, \Gamma \in (0, \pi)$

πληροῦν τὰς σχέσεις τῆς ομάδος (Γ), τότε ὑπάρχει ἓν καὶ μόνον ἓν τρίγωνον, μὲ πλευρὰς τὰς α, β, γ καὶ γωνίας τὰς A, B, Γ (ἀπόδειξις;).

Χρήσιμοι διὰ τὰ ἐπόμενα εἶναι καὶ οἱ ἀκόλουθοι γνωστοὶ τύποι:

1.3. Τύποι τοῦ Mollweide.

$$\frac{\alpha - \beta}{\gamma} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} = \eta\mu \frac{A - B}{2} \quad 9$$

$$\frac{\alpha + \beta}{\gamma} \eta\mu \frac{\Gamma}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{A - B}{2} \quad 10$$

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \sigma\phi \frac{\Gamma}{2} = \epsilon\phi \frac{A - B}{2} \quad 11$$

1.4. Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν ἡμίσεων γωνιῶν τριγώνου συναρτῆσαι τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

$$\eta\mu \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta\gamma}} \quad 12$$

$$\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{\beta\gamma}} \quad 13$$

$$\epsilon\phi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}} \quad 14$$

1.5. Τύποι τοῦ ἐμβαδοῦ τριγώνου.

$$E = \frac{1}{2} \beta\gamma \eta\mu A = \frac{1}{2} \gamma\alpha \eta\mu B = \frac{1}{2} \alpha\beta \eta\mu \Gamma \quad 15$$

$$E = \frac{\alpha\beta\gamma}{4R} \quad 16$$

$$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} \quad 17$$

$$E = 2R^2 \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma \quad 18$$

1.6. Ἡ ἀκτίς R συναρτῆσαι τῶν πλευρῶν τριγώνου.

$$R = \frac{\alpha\beta\gamma}{4\sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}} \quad 19$$

Παρατήρησης. Οί τύποι τοῦ θεωρήματος τῶν συνημιτόνων μετασχηματίζονται μέσῳ τῶν τύπων (15) τοῦ ἔμβαδοῦ εἰς χρήσιμους τύπους, ὡς ἐξῆς:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \cos A \Rightarrow \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 4 \left(\frac{1}{2} \beta\gamma \eta\mu A \right) \frac{\sigma\upsilon\nu A}{\eta\mu A} \Rightarrow \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 4\epsilon\sigma\phi A.$$

Ἔστω ἰσχύουν οἱ τύποι:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 4\epsilon\sigma\phi A, \quad \beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 4\epsilon\sigma\phi B, \quad \gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 4\epsilon\sigma\phi \Gamma \quad (III)^1$$

Ἐξ αὐτῶν προκύπτουν ἀμέσως καί οἱ τύποι:

$$\sigma\phi A = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{4\epsilon}, \quad \sigma\phi B = \frac{\gamma^2 + \alpha^2 - \beta^2}{4\epsilon}, \quad \sigma\phi \Gamma = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{4\epsilon} \quad (IV)$$

Διά προσθέσεως δὲ κατὰ μέλη τῶν τελευταίων τούτων τύπων, λαμβάνομεν:

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 4\epsilon(\sigma\phi A + \sigma\phi B + \sigma\phi \Gamma) \quad (V)$$


Οἱ ἀνωτέρω τύποι (III), (IV) καί (V) λύουν πολὺπλοκα προβλήματα, εἰς τὰ ὅποια ἐμφανίζονται αἱ παραστάσεις: $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$, $\sigma\phi A + \sigma\phi B + \sigma\phi \Gamma$, $\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2$ κ.λ.π.

1.7. Ὑψος τριγώνου. Ἐστω u_a τὸ ἐκ τῆς κορυφῆς A ὕψος τριγώνου ABΓ.

Ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ABD ἔχομεν:

$u_a = \gamma \eta\mu B$ (Σχ. 12) καὶ συνεπῶς, ἐπειδὴ

$\gamma = 2R \eta\mu \Gamma$, προκύπτουν οἱ τύποι:



Σχ. 12

$u_a = 2R \eta\mu \Gamma \eta\mu B$	20
$u_b = 2R \eta\mu A \eta\mu \Gamma$	21
$u_\gamma = 2R \eta\mu B \eta\mu A$	22

Διὰ τὴν ἀπόδειξιν τοῦ τύπου 20 ἐλήφθη $B, \Gamma < \frac{\pi}{2}$. ἔαν $B \geq \frac{\pi}{2}$ ἢ

$\Gamma \geq \frac{\pi}{2}$ ὁ τύπος ἰσχύει πάλιν (διατί;).

Ἐπίσης χρήσιμοι εἶναι καὶ οἱ ἀκόλουθοι γνωστοὶ ἐκ τῆς Γεωμετρίας θεμελιώδεις τύποι:


$$\alpha u_a = \beta u_b = \gamma u_\gamma = 2\epsilon \quad 23$$

1.8. Ἀκτίς τοῦ ἐγγεγραμμένου εἰς τρίγωνον κύκλου. Ἐστω ρ ἡ ἀκτίς τοῦ εἰς τρίγωνον ABΓ ἐγγεγραμμένου κύκλου O. Ἐκ τῆς Γεωμετρίας γνωρίζομεν, ὅτι $(AD) = \tau - \alpha$ (Σχ. 13), ὅπου τ εἶναι ἡ ἡμιπερίμετρος τοῦ τριγώνου ABΓ.

Ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ADO ἔχομεν $(DO) = (AD) \epsilon\phi \frac{A}{2}$ καὶ συνεπῶς

$\rho = (\tau - \alpha) \epsilon\phi \frac{A}{2}$. Ἐξ αὐτοῦ καὶ βάσει τοῦ τύπου 14 προκύπτει:

¹ Οἱ τύποι, οἱ ὅποιοι ἔχουν Λατινικὴν ἀρίθμησιν, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀπομνημονευθοῦν.



Σχ. 13

$$\rho = (\tau - \alpha) \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}} \Rightarrow$$

$$\rho = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau^2}} \Rightarrow \rho = \frac{E}{\tau}$$

Τελικῶς ἔχομεν τοὺς κάτωθι βασικούς τύπους:

$$\rho = (\tau - \alpha) \varepsilon\varphi \frac{A}{2} = (\tau - \beta) \varepsilon\varphi \frac{B}{2} = (\tau - \gamma) \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \quad 24$$

$$\rho = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}} = \frac{E}{\tau} \quad 25$$

Ἐκ τῶν 24 λαμβάνομεν:

$$\rho^3 = (\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma) \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2}$$

$$\Rightarrow (\tau\rho)^3 = \tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma) \tau^2 \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \Rightarrow$$

$$E^3 = E^2 \tau^2 \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \Rightarrow E = \tau^2 \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \Rightarrow$$

$$\tau\rho = \tau^2 \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \Rightarrow \rho = \tau \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \quad \text{VI}$$

Ἐκ τούτου δέ, προκύπτουν εὐκόλως καὶ οἱ ἐπόμενοι χρήσιμοι τύποι:

$$\tau = \rho \sigma\varphi \frac{A}{2} \sigma\varphi \frac{B}{2} \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} \quad \text{VII}$$

$$E = \tau^2 \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \quad \text{VIII}$$

$$E = \rho^2 \sigma\varphi \frac{A}{2} \sigma\varphi \frac{B}{2} \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} \quad \text{IX}$$

1.9. Ἄκτις τοῦ παρεγγεγραμμένου κύκλου τριγώνου. Ἐστώσαν O_α τὸ κέντρο τοῦ παρεγγεγραμμένου κύκλου, τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὴν πλευρὰν α τριγώνου $AB\Gamma$ καὶ ρ_α ἡ ἀκτίς αὐτοῦ (Σχ. 13). Ἐκ τῆς Γεωμετρίας γνωρίζομεν ὅτι $(AE) = \tau$ καὶ συνεπῶς ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου AEO_α ἔχομεν $\rho_\alpha = \tau \varepsilon\varphi \frac{A}{2}$. Ἀντίστοιχοι τύποι θὰ ἰσχύουν καὶ διὰ τὰς ἀκτῖνας ρ_β, ρ_γ καὶ οὕτω προκύπτουν οἱ βασικοί τύποι:

$\rho_\alpha = \tau \varepsilon \varphi \frac{A}{2}$	$\rho_\beta = \tau \varepsilon \varphi \frac{B}{2}$	$\rho_\gamma = \tau \varepsilon \varphi \frac{\Gamma}{2}$	26
--	---	---	----

Διαιρούντες κατά μέλη τους τύπους $\rho_\alpha = \tau \varepsilon \varphi \frac{A}{2}$ και $\rho = (\tau - \alpha) \varepsilon \varphi \frac{A}{2}$ προκύ-

$$\text{πτει: } \frac{\rho_\alpha}{\rho} = \frac{\tau}{\tau - \alpha} \Rightarrow \rho_\alpha = \frac{\tau \rho}{\tau - \alpha} \Rightarrow \rho_\alpha = \frac{E}{\tau - \alpha}$$

*Έχομεν λοιπόν τους βασικούς τύπους (γνωστοί και εκ τῆς Γεωμετρίας) :

$\rho_\alpha = \frac{E}{\tau - \alpha}$	$\rho_\beta = \frac{E}{\tau - \beta}$	$\rho_\gamma = \frac{E}{\tau - \gamma}$	27
---	---------------------------------------	---	----

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Διὰ κάθε τρίγωνον νὰ δειχθῆ ἡ σχέσις: $E = \sqrt{\rho \rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma}$.

***Ἀπόδειξις :** Ἐκ τῶν τύπων 27 καὶ τοῦ τύπου 25 διὰ πολλαπλασιασμοῦ κατὰ μέλη ἔχομεν :

$$\rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma \rho = \frac{E^4}{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)\tau} \Rightarrow \rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma \rho = \frac{E^4}{E^2} \Rightarrow$$

$$E^2 = \rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma \rho \Rightarrow E = \sqrt{\rho \rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma}.$$

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2. Δείξατε ὅτι εἰς κάθε τρίγωνον ἰσχύει :

$$\frac{1}{\rho_\alpha} + \frac{1}{\rho_\beta} + \frac{1}{\rho_\gamma} = \frac{1}{\nu_\alpha} + \frac{1}{\nu_\beta} + \frac{1}{\nu_\gamma} = \frac{1}{\rho}$$

***Ἀπόδειξις :** Βάσει τῶν τύπων 27 ἔχομεν :

$$\frac{1}{\rho_\alpha} + \frac{1}{\rho_\beta} + \frac{1}{\rho_\gamma} = \frac{\tau - \alpha}{E} + \frac{\tau - \beta}{E} + \frac{\tau - \gamma}{E} = \frac{3\tau - (\alpha + \beta + \gamma)}{E} =$$

$$\frac{3\tau - 2\tau}{E} = \frac{\tau}{E} = \frac{\tau}{\tau \rho} = \frac{1}{\rho}.$$

*Ἐξ ἄλλου, βάσει τῶν τύπων 23 εἶναι :


$$\frac{1}{\nu_\alpha} + \frac{1}{\nu_\beta} + \frac{1}{\nu_\gamma} = \frac{\alpha}{2E} + \frac{\beta}{2E} + \frac{\gamma}{2E} = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2E} = \frac{2\tau}{2E} = \frac{\tau}{E} = \frac{\tau}{\tau \rho} = \frac{1}{\rho}.$$

*Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ἀμέσως ἡ ἰσχύς τῆς ἀποδεικτέας σχέσεως.

Παρατήρησις. Οἱ τύποι 23 ἢ 27 ἐφαρμόζονται ἐν γένει εἰς προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται τὰ ὕψη ν_α, ν_β καὶ ν_γ ἐνὸς τριγώνου ἢ-αὶ ἀκτῖνες ρ_α, ρ_β καὶ ρ_γ τῶν παρεγγεγραμμένων κύκλων.

1.10. Ἐσωτερικὴ διχοτόμος τριγώνου. Ἐστω $(\Delta\Delta) = \delta_\alpha$ ἡ ἐσωτερικὴ διχοτόμος, ἡ ἀντιστοιχοῦσα εἰς τὴν πλευρὰν α τριγώνου ΑΒΓ . Ἐὰν E εἶναι τὸ

ἔμβαδὸν τοῦ τριγώνου ΑΒΓ καὶ E_1, E_2 τὰ ἔμβαδὰ τῶν τριγώνων ΑΒΔ, ΑΓΔ ἀντι-στοίχως, τότε ἔχομεν (Σχ. 14):



Σχ. 14

$$E = E_1 + E_2 \Rightarrow \frac{1}{2} \beta \gamma \eta \mu A = \frac{1}{2} \gamma \delta_\alpha \eta \mu \frac{A}{2} + \frac{1}{2} \beta \delta_\alpha \eta \mu \frac{A}{2} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} \beta \gamma \left(2 \eta \mu \frac{A}{2} \sigma \nu \nu \frac{A}{2} \right) = \frac{1}{2} \delta_\alpha (\beta + \gamma) \eta \mu \frac{A}{2} \Rightarrow 2 \beta \gamma \sigma \nu \nu \frac{A}{2} = (\beta + \gamma) \delta_\alpha \Rightarrow$$

$$\delta_\alpha = \frac{2 \beta \gamma}{\beta + \gamma} \sigma \nu \nu \frac{A}{2} \Rightarrow \delta_\alpha = \frac{2 \cdot 2R \eta \mu B \cdot 2R \eta \mu \Gamma}{2R \eta \mu B + 2R \eta \mu \Gamma} \sigma \nu \nu \frac{A}{2} \Rightarrow$$

$$\delta_\alpha = \frac{4R \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\eta \mu B + \eta \mu \Gamma} \sigma \nu \nu \frac{A}{2} \Rightarrow \delta_\alpha = \frac{4R \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{2 \eta \mu \frac{B + \Gamma}{2} \sigma \nu \nu \frac{B - \Gamma}{2}} \sigma \nu \nu \frac{A}{2} \Rightarrow$$

$$\delta_\alpha = \frac{2R \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\sigma \nu \nu \frac{B - \Gamma}{2}}$$

Άρα, ἔχομεν τελικῶς τοὺς κάτωθι βασικοὺς τύπους :

$\delta_\alpha = \frac{2\beta\gamma}{\beta + \gamma} \sigma \nu \nu \frac{A}{2} = \frac{2R \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\sigma \nu \nu \frac{B - \Gamma}{2}}$	28
$\delta_\beta = \frac{2\gamma\alpha}{\gamma + \alpha} \sigma \nu \nu \frac{B}{2} = \frac{2R \eta \mu \Gamma \eta \mu A}{\sigma \nu \nu \frac{\Gamma - A}{2}}$	29
$\delta_\gamma = \frac{2\alpha\beta}{\alpha + \beta} \sigma \nu \nu \frac{\Gamma}{2} = \frac{2R \eta \mu A \eta \mu B}{\sigma \nu \nu \frac{A - B}{2}}$	30

1.11. Ἐξωτερικὴ διχοτόμος τριγώνου. Ἐστω $(AE) = \Delta_a$ ἡ ἐξωτερικὴ διχοτόμος, ἢ ἀντιστοιχοῦσα εἰς τὴν πλευρὰν α . Ἐὰν μὲ E_1, E_2 παραστήσωμεν τὰ ἑμβάδα τῶν τριγώνων AGE, ABE ἀντιστοίχως, τότε θὰ εἶναι: $E = |E_1 - E_2|$ (Σχ. 14), διότι ἐὰν μὲν εἶναι $B > \Gamma$, τότε $E_1 - E_2 > 0$, ἐὰν δὲ $B < \Gamma$, τότε $E_1 - E_2 < 0$.

Ἐπὶ πλέον παρατηροῦμεν, ὅτι $\widehat{EAG} = \frac{\pi}{2} + \frac{A}{2}$ καὶ $\widehat{EAB} = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$ (διότι

$\widehat{EAB} = \frac{\pi}{2}$). Ἐν συνεχείᾳ, βάσει καὶ τῶν τύπων (15), ἔχομεν:

$$E = |E_1 - E_2| \Rightarrow \frac{1}{2} \beta \gamma \eta \mu A = \left| \frac{1}{2} \beta \Delta_a \eta \mu \left(\frac{\pi}{2} + \frac{A}{2} \right) - \frac{1}{2} \gamma \Delta_a \eta \mu \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) \right|$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \beta \gamma \cdot 2 \eta \mu \frac{A}{2} \text{ συν} \frac{A}{2} = \left| \frac{1}{2} \beta \Delta_a \text{ συν} \frac{A}{2} - \frac{1}{2} \gamma \Delta_a \text{ συν} \frac{A}{2} \right| \Rightarrow$$

$$\Delta_a = \frac{2\beta\gamma}{|\beta - \gamma|} \eta \mu \frac{A}{2} \Rightarrow \Delta_a = \frac{2 \cdot 2R \eta \mu B \cdot 2R \eta \mu \Gamma}{2R |\eta \mu B - \eta \mu \Gamma|} \eta \mu \frac{A}{2} \Rightarrow$$

$$\Delta_a = \frac{4R \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\left| 2\eta \mu \frac{B - \Gamma}{2} \text{ συν} \frac{B + \Gamma}{2} \right|} \eta \mu \frac{A}{2} \Rightarrow \Delta_a = \frac{2R \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\left| \eta \mu \frac{B - \Gamma}{2} \right| \left| \eta \mu \frac{A}{2} \right|} \eta \mu \frac{A}{2} \Rightarrow$$

$$\Delta_a = \frac{2R \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\left| \eta \mu \frac{B - \Gamma}{2} \right|} \quad (\text{διότι } \eta \mu \frac{A}{2} > 0).$$

Συνεπῶς ἔχομεν τοὺς κάτωθι βασικοὺς τύπους :

$\Delta_a = \frac{2\beta\gamma}{ \beta - \gamma } \eta \mu \frac{A}{2} = \frac{2R \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\left \eta \mu \frac{B - \Gamma}{2} \right }$	31
$\Delta_\beta = \frac{2\gamma\alpha}{ \gamma - \alpha } \eta \mu \frac{B}{2} = \frac{2R \eta \mu \Gamma \eta \mu A}{\left \eta \mu \frac{\Gamma - A}{2} \right }$	32
$\Delta_\gamma = \frac{2\alpha\beta}{ \alpha - \beta } \eta \mu \frac{\Gamma}{2} = \frac{2R \eta \mu A \eta \mu B}{\left \eta \mu \frac{A - B}{2} \right }$	33

1.12. Διάμεσος τριγώνου. Ἐστω μ_a ἡ διάμεσος, ἢ ἀντιστοιχοῦσα εἰς τὴν πλευρὰν α .

¹ Ὑποτίθεται $\beta \neq \gamma$ ($\Leftrightarrow B \neq \Gamma$), διότι ἄλλως δὲν ὀρίζεται ἡ ἐξωτερικὴ διχοτόμος.

Εάν α τριγώνου ΑΒΓ. Έκ του θεωρήματος τῶν διαμέσων ἔχομεν:

$$\beta^2 + \gamma^2 = 2\mu_a^2 + \frac{\alpha^2}{2} \Rightarrow 2(\beta^2 + \gamma^2) = 4\mu_a^2 + \alpha^2 \Rightarrow$$

$$2(\beta^2 + \gamma^2) = 4\mu_a^2 + \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \cos A \Rightarrow 4\mu_a^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 2\beta\gamma \cos A \Rightarrow$$

$$4\mu_a^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 4 \left(\frac{1}{2} \beta\gamma \eta\mu A \right) \sigma\phi A \Rightarrow 4\mu_a^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 4E \sigma\phi A.$$

Ἐπί πλέον, ἐκ τοῦ τύπου $4\mu_a^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 2\beta\gamma \cos A$, βάσει καὶ τοῦ τύπου $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \cos A$, προκύπτει: $4\mu_a^2 = \alpha^2 + 4\beta\gamma \cos A$. Οὕτως ἔχομεν τοὺς τύπους:

$$4\mu_a^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 2\beta\gamma \cos A = \beta^2 + \gamma^2 + 4E \sigma\phi A = \alpha^2 + 4\beta\gamma \cos A \quad 35$$

$$4\mu_b^2 = \gamma^2 + \alpha^2 + 2\gamma\alpha \cos B = \gamma^2 + \alpha^2 + 4E \sigma\phi B = \beta^2 + 4\gamma\alpha \cos B \quad 36$$

$$4\mu_\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta \cos \Gamma = \alpha^2 + \beta^2 + 4E \sigma\phi \Gamma = \gamma^2 + 4\alpha\beta \cos \Gamma \quad 37$$

Παρατήρησης. Ὁ τύπος $4\mu_a^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 2\beta\gamma \cos A$ εἶναι δυνατὸν, διὰ τῆς χρήσεως βοηθητικῆς γωνίας, νὰ μετασχηματισθῆ εἰς τρόπον, ὥστε νὰ εἶναι λογιστὴ διὰ τῶν λογαριθμῶν ἢ διαμέσου μ_a . Πράγματι, ὁ τύπος οὗτος γράφεται διαδοχικῶς:

$$4\mu_a^2 = (\beta^2 + \gamma^2) \left(\sin^2 \frac{A}{2} + \eta\mu^2 \frac{A}{2} \right) + 2\beta\gamma \left(\sin^2 \frac{A}{2} - \eta\mu^2 \frac{A}{2} \right) =$$

$$(\beta + \gamma)^2 \sin^2 \frac{A}{2} + (\beta - \gamma)^2 \eta\mu^2 \frac{A}{2} = (\beta + \gamma)^2 \sin^2 \frac{A}{2} \left[1 + \left(\frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma} \right)^2 \epsilon\phi^2 \frac{A}{2} \right] \Rightarrow$$

$$2\mu_a = (\beta + \gamma) \sin \frac{A}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma} \right)^2 \epsilon\phi^2 \frac{A}{2}}$$

$$\theta\epsilon\tau\omicron\upsilon\tau\epsilon\varsigma \frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma} \epsilon\phi \frac{A}{2} = \epsilon\phi\omega \left(-\frac{\pi}{2} < \omega < \frac{\pi}{2} \right), \text{ ἔχομεν:}$$

$$2\mu_a = (\beta + \gamma) \sin \frac{A}{2} \sqrt{1 + \epsilon\phi^2 \omega} \Rightarrow 2\mu_a = (\beta + \gamma) \sin \frac{A}{2} | \tau\epsilon\mu\omega |$$

$$\Rightarrow \mu_a = \frac{\beta + \gamma}{2 \sin \omega} \sin \frac{A}{2} \Rightarrow \mu_a = \frac{2R(\eta\mu B + \eta\mu \Gamma)}{2 \sin \omega} \sin \frac{A}{2} =$$

$$\frac{2R\eta\mu \frac{B + \Gamma}{2} \sin \frac{B - \Gamma}{2}}{\sin \omega} \sin \frac{A}{2} = \frac{2R \sin^2 \frac{A}{2} \sin \frac{B - \Gamma}{2}}{\sin \omega}$$

ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Νὰ ἐκφραστοῦν τὰ στοιχεῖα τ , ρ καὶ ρ_a τυχόντος τριγώνου συναρτήσῃ τῆς ἀκτίνου R καὶ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

$$\text{Λύσις: Εἶναι: } \tau = \frac{1}{2} (\alpha + \beta + \gamma) = \frac{1}{2} (2R\eta\mu A + 2R\eta\mu B + 2R\eta\mu \Gamma) \Rightarrow$$

$$\tau = R (\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma) \Rightarrow \tau = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{\Gamma}{2}.$$

Ἐκ τοῦ τύπου τούτου, βάσει καὶ τῶν τύπων 18 καὶ 25, λαμβάνομεν διὰ δοχικῶς:

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{E}{\tau} = \frac{2R^2 \eta_{\mu A} \eta_{\mu B} \eta_{\mu \Gamma}}{4R \operatorname{csc} \frac{A}{2} \operatorname{csc} \frac{B}{2} \operatorname{csc} \frac{\Gamma}{2}} = \\ &= \frac{2R^2 \left(2\eta_{\mu} \frac{A}{2} \operatorname{csc} \frac{A}{2} \right) \left(2\eta_{\mu} \frac{B}{2} \operatorname{csc} \frac{B}{2} \right) \left(2\eta_{\mu} \frac{\Gamma}{2} \operatorname{csc} \frac{\Gamma}{2} \right)}{4R \operatorname{csc} \frac{A}{2} \operatorname{csc} \frac{B}{2} \operatorname{csc} \frac{\Gamma}{2}} = \\ &= 4R \eta_{\mu} \frac{A}{2} \eta_{\mu} \frac{B}{2} \eta_{\mu} \frac{\Gamma}{2} . \end{aligned}$$

Γνωρίζομεν ὅτι $\rho_a = \tau \operatorname{ef} \frac{A}{2}$, ὁπότε ἀντικαθιστῶντες εἰς τὸν τύπον τοῦ τὸν τὴν προηγουμένως εὐρεθεῖσαν ἔκφρασιν τοῦ τ, λαμβάνομεν :

$$\rho_a = 4R \operatorname{csc} \frac{A}{2} \operatorname{csc} \frac{B}{2} \operatorname{csc} \frac{\Gamma}{2} \frac{\eta_{\mu} \frac{A}{2}}{\operatorname{csc} \frac{A}{2}} \Rightarrow \rho_a = 4R \eta_{\mu} \frac{A}{2} \operatorname{csc} \frac{B}{2} \operatorname{csc} \frac{\Gamma}{2} .$$

Ὡστε ἔχομεν τοὺς ἀκολουθοῦς χρησίμους τύπους :

$$\tau = 4R \operatorname{csc} \frac{A}{2} \operatorname{csc} \frac{B}{2} \operatorname{csc} \frac{\Gamma}{2} \quad (X)$$

$$\rho = 4R \eta_{\mu} \frac{A}{2} \eta_{\mu} \frac{B}{2} \eta_{\mu} \frac{\Gamma}{2} \quad (XI)$$

$$\rho_a = 4R \eta_{\mu} \frac{A}{2} \operatorname{csc} \frac{B}{2} \operatorname{csc} \frac{\Gamma}{2} \quad (XII)$$

1.13. Παρατήρησις. Πάντα τὰ γραμμικὰ στοιχεῖα ἑνὸς τριγώνου (πλευραὶ, ἐμβαδόν, ὕψη, διχοτόμοι, διάμεσοι, περίμετρος, ἀκτῆς ἐγγεγραμμένου κύκλου, ἀκτῆς παρεγγεγραμμένων κύκλων) ἐκφράζονται συναρτήσει τῆς ἀκτίνος R τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας καὶ τῶν γωνιῶν¹ αὐτῶν καὶ μάλιστα διὰ τύπων τοιούτων, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὸς ὁ διὰ τῶν λογαρίθμων ὑπολογισμὸς αὐτῶν. Οἱ τύποι οὗτοι εἶναι: (II), 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, (X), (XI) (XII) καὶ ὁ τελικὸς τύπος τῆς προηγουμένης παρατηρήσεως.

Ἡ ἀνωτέρω παρατήρησις ἔχει σπουδαιότατην σημασίαν διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν τριγώνων ὧς θὰ ἴδωμεν ἀμέσως εἰς τὰ ἐπόμενα.

¹ Τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν γωνιῶν. Τοῦτο δὲ θὰ ἐννοοῦμεν πάντοτε, ὅταν λαμβάνομεν ὅτι γραμμικὸν τι στοιχεῖον ἑνὸς τριγώνου ἐκφράζεται συναρτήσει τοῦ R καὶ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

55) Είς κάθε τρίγωνον νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι:

$$1) \alpha\eta\mu(B - \Gamma) + \beta\eta\mu(\Gamma - A) + \gamma\eta\mu(A - B) = 0$$

$$2) \alpha\sigma\upsilon\nu A + \beta\sigma\upsilon\nu B + \gamma\sigma\upsilon\nu\Gamma = 4R\eta\mu A \eta\mu B\eta\mu\Gamma$$

$$3) (\beta + \gamma)\sigma\upsilon\nu A + (\gamma + \alpha)\sigma\upsilon\nu B + (\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu\Gamma = 2\tau$$

$$4) \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 8R^2 (1 + \sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu\Gamma)$$

$$5) \alpha(\sigma\upsilon\nu B - \sigma\upsilon\nu\Gamma) = 2(\gamma - \beta)\sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{2}$$

$$6) (\beta - \gamma)^2 \sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{2} + (\beta + \gamma)^2 \eta\mu^2 \frac{A}{2} = \alpha^2$$

$$7) \gamma^2 = (\alpha - \beta)^2 + 4\alpha\beta\eta\mu^2 \frac{\Gamma}{2}$$

$$8) \alpha(\beta - \gamma)\sigma\varphi^2 \frac{A}{2} + \beta(\gamma - \alpha)\sigma\varphi^2 \frac{B}{2} + \gamma(\alpha - \beta)\sigma\varphi^2 \frac{\Gamma}{2} = 0$$

$$9) E = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{4\epsilon\varphi \frac{A+B-\Gamma}{2}} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2(\sigma\varphi B - \sigma\varphi A)} = \frac{\alpha^2 \eta\mu 2B + \beta^2 \eta\mu 2A}{4} \quad (B \neq A)$$

$$10) E = \frac{(\alpha^2 - \beta^2)\eta\mu A \eta\mu B}{2\eta\mu(A - B)} = \sqrt{\beta\gamma(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \quad (B \neq A)$$

$$11) E = \rho\beta\gamma\epsilon\varphi \frac{A}{2} = \frac{\rho\alpha\rho\beta\rho\gamma}{\tau} = \frac{\mu\alpha^2 + \mu\beta^2 + \mu\gamma^2}{3(\sigma\varphi A + \sigma\varphi B + \sigma\varphi\Gamma)}$$

$$12) \alpha\sigma\varphi A + \beta\sigma\varphi B + \gamma\sigma\varphi\Gamma = 2(R + \rho)$$

$$13) \eta\mu^2 \frac{A}{2} + \eta\mu^2 \frac{B}{2} + \eta\mu^2 \frac{\Gamma}{2} = 1 - \frac{\rho}{2R}$$

$$14) E = R\rho(\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu\Gamma) = \frac{1}{2} \frac{\tau^3 \sqrt{\alpha^2 \beta^2 \gamma^2 \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu\Gamma}}{\sigma\varphi \frac{A}{2} + \sigma\varphi \frac{B}{2} + \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2}}$$

$$15) E = 2R^2 \frac{u_\alpha u_\beta u_\gamma}{\alpha\beta\gamma} = \alpha \frac{\rho\beta\rho\gamma}{\rho\beta + \rho\gamma} = \frac{(\alpha + \beta)\rho\rho\gamma}{\rho + \rho\gamma}$$

$$16) u_\alpha + u_\beta + u_\gamma = \frac{\beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta}{2R}$$

$$17) \frac{\eta\mu^2 A}{u_\alpha^2} = \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} - \frac{2\sigma\upsilon\nu A}{\beta\gamma}$$

$$18) \alpha^3 \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) + \beta^3 \sigma\upsilon\nu(\Gamma - A) + \gamma^3 \sigma\upsilon\nu(A - B) = 3\alpha\beta\gamma$$

56) Ἐὰν εἰς τρίγωνον ΑΒΓ ἰσχύη ἡ σχέσις: $R \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) = \delta_\alpha \sigma\upsilon\nu \frac{B - \Gamma}{2}$, τότε τὸ τρίγωνον εἶναι ὀρθογώνιον.

57) Ἀναγκαίᾳ καὶ ἰκανῇ συνθήκῃ, ἵνα ἐν τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι ὀρθογώνιον, εἶναι:

$$\epsilon\varphi \frac{A}{2} + \epsilon\varphi \frac{B}{2} + \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} + \epsilon\varphi \frac{A}{2} \epsilon\varphi \frac{B}{2} \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = 2$$

58) Ἐὰν εἰς τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι $\mu_\alpha = \gamma$, τότε δείξατε ὅτι:

$$\epsilon\varphi \frac{A}{2} = \left(1 + \epsilon\varphi^2 \frac{A}{2}\right) \eta\mu(B - \Gamma)$$

καὶ ἀντιστρόφως.

59) Έν τριγώνων είναι ίσοσκελές, εάν ισχύη μία τῶν ἀκολουθῶν σχέσεων:

$$1) \text{ συν}^2 \frac{A}{2} = \eta\mu B \eta\mu\Gamma \quad 2) \alpha = 2\beta \text{ συν}\Gamma \quad 3) (\tau - \beta)\sigma\phi \frac{\Gamma}{2} = \tau\epsilon\phi \frac{B}{2}$$

$$4) 2\upsilon_\alpha = \alpha\sigma\phi \frac{A}{2} \quad 5) 4\tau\rho = \alpha^2 \sigma\phi \frac{A}{2} \quad 6) (\alpha + \beta)\sigma\phi \frac{\Gamma}{2} = \alpha\epsilon\phi A + \beta\epsilon\phi B$$

$$7) \frac{\alpha}{\upsilon_\alpha} + \frac{\beta}{\upsilon_\beta} + \frac{\gamma}{\upsilon_\gamma} = \sigma\phi \frac{A}{2} + 3\epsilon\phi \frac{A}{2}$$

60) Εἰς κάθε τριγώνων νά ἀποδειχθῆ ὅτι:

$$1) \delta_\alpha \text{ συν} \frac{B-\Gamma}{2} = \upsilon_\alpha \quad 2) \delta_\alpha \Delta_\alpha (\beta^2 - \gamma^2) = 4\beta\gamma E (\beta > \gamma)$$

$$3) \rho_\alpha + \rho_\beta + \rho_\gamma = 4R + \rho \quad 4) \epsilon\phi \frac{B}{2} + \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \frac{\alpha}{\rho_\alpha}$$

$$5) \epsilon\phi \frac{B}{2} \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \frac{\rho}{\rho_\alpha} \quad 6) \alpha^2 \geq 4\rho\rho_\alpha \quad 7) \rho_\alpha + \rho_\beta = 4R \text{ συν}^2 \frac{\Gamma}{2}$$

$$8) \rho_\alpha\rho_\beta + \rho_\rho\gamma = \alpha\beta \quad 9) \text{ συν}A \text{ συν}B \text{ συν}\Gamma = \frac{\tau^2 - (2R + \rho)^2}{4R^2}$$

$$10) \frac{1}{\rho_\alpha} + \frac{1}{\rho_\beta} = \frac{2}{\upsilon_\gamma} \quad 11) \upsilon_\alpha\upsilon_\beta + \upsilon_\beta\upsilon_\gamma + \upsilon_\gamma\upsilon_\alpha = \frac{2\rho\tau^2}{R}$$

$$12) \rho_\alpha\rho_\beta + \rho_\beta\rho_\gamma + \rho_\gamma\rho_\alpha = \tau^2$$

61) Έάν εἰς τριγώνων εἶναι $E = \frac{\alpha}{4} \sqrt{(\beta + \gamma)^2 - \alpha^2}$, τότε τὸ τριγώνων εἶναι ἰσοσκελές.

62) Έάν αἱ πλευραὶ ἐνὸς τριγώνων εἶναι διαδοχικοὶ ὄροι ἀρ. προόδου καὶ ἡ μεγαλύτερα γωνία εἶναι διπλασία τῆς μικρότερας γωνίας, τότε αἱ πλευραὶ του εἶναι ἀνάλογοι τῶν ἀριθμῶν 4,5,6 καὶ ἀντιστρόφως.

63) Έάν εἰς τριγώνων ἰσχύη μία τῶν ἀκολουθῶν σχέσεων, τὸ τριγώνων εἶναι ὀρθογώνων :

$$1) \eta\mu^2 A + \eta\mu^2 B + \eta\mu^2 \Gamma = 2 \quad 2) E = \tau(\tau - \alpha) \quad 3) E = \rho\rho_\alpha$$

$$4) E = \rho_\beta\rho_\gamma \quad 5) \rho_\beta + \rho_\gamma = \alpha \quad 6) \rho_\beta + \rho_\gamma = 2R$$

$$7) \epsilon\phi B + \epsilon\phi \Gamma = \frac{\alpha^2}{2E} \quad 8) \sigma\phi \frac{B}{2} = \frac{\alpha + \gamma}{\beta}$$

64) Έάν αἱ διάμεσοι μ_β καὶ μ_γ τέμνωνται καθέτως, νά δειχθῆ ὅτι :

$$1) 2(\sigma\phi B + \sigma\phi \Gamma) = \sigma\phi A \quad 2) \text{ συν}A \geq \frac{A}{5}$$

65) Δείξατε ὅτι $\upsilon_\alpha = 4\rho$, εάν καὶ μόνον εάν $3\eta\mu \frac{A}{2} = \text{συν} \frac{B-\Gamma}{2}$.

66) Ἡ ἀνγκαῖα καὶ ἰκανή συνθήκη, ἵνα ἐν τριγώνων εἶναι ὀρθογώνων εἶναι:

$$\beta\epsilon\phi \frac{B}{2} + \gamma\epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = 2(R - \rho).$$

67) Εἶναι δυνατὸν αἱ πλευραὶ ἐνὸς τριγώνων νά ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν ἢ γεωμετρικὴν πρόδον, ὅταν αἱ γωνίαὶ του εὑρίσκονται ἐν ἀριθμ. προόδω;

68) Έάν εἰς τριγώνων εἶναι $\alpha = \upsilon_\alpha$, τότε δείξατε ὅτι:

$$\frac{\gamma}{2} (\sqrt{5} - 1) \leq \beta \leq \frac{\gamma}{2} (\sqrt{5} + 1)$$

- 69) 'Εάν εις τρίγωνον ἰσχύη $R = \sqrt{\rho \rho_a}$, τότε τὸ τρίγωνον εἶναι ὀρθογώνιον καὶ ἰσοσκελές.
- 70) 'Εάν εις τρίγωνον εἶναι $\tau > 2R + \rho$, νὰ ὀρισθῇ τὸ εἶδος τοῦ τριγώνου.
- 71) Εἰς τρίγωνον εἶναι $\alpha^4 + \beta^4 = \gamma^4$, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν $2\eta\mu^2\Gamma = \epsilon\phi\Lambda\epsilon\phi\text{B}$.
- 72) 'Εάν ω, ϕ καὶ θ εἶναι ἀντιστοίχως αἱ γωνίαι τὰς ὁποίας σχηματίζει ἡ διάμεσος μ_a ὀξυγωνίου τριγώνου $\text{AB}\Gamma$ μὲ τὰς πλευράς α, β καὶ γ αὐτοῦ, τότε δείξατε ὅτι :
- α) $\sigma\phi\theta = 2\sigma\phi\text{A} + \sigma\phi\Gamma$
 β) $\sigma\phi\phi = 2\sigma\phi\text{A} + \sigma\phi\text{B}$
 γ) $2\sigma\phi\omega = |\sigma\phi\text{B} - \sigma\phi\Gamma| \left(\omega \leq \frac{\pi}{2} \right)$
 δ) $\sigma\phi\text{A} = \frac{4\mu_a^2 - \alpha^2}{4\alpha\mu_a\eta\mu\omega}$
- 73) 'Εάν O εἶναι ἐσωτερικὸν σημεῖον τριγώνου $\text{AB}\Gamma$ τοιοῦτον, ὥστε $\widehat{\text{OAB}} = \widehat{\text{OBG}} = \widehat{\text{OGA}} = \omega$, δείξατε ὅτι :
- α) $\sigma\phi\omega = \sigma\phi\text{A} + \sigma\phi\text{B} + \sigma\phi\Gamma$
 β) $\sigma\tau\epsilon\mu^2\omega = \sigma\tau\epsilon\mu^2\text{A} + \sigma\tau\epsilon\mu^2\text{B} + \sigma\tau\epsilon\mu^2\Gamma$
 γ) $\omega \leq \frac{\pi}{6}$

74) 'Εστῶσαν $\text{AB}\Gamma$ ὀξυγώνιον τρίγωνον, $\text{A}'\text{B}'\Gamma'$ τὸ ὀρθικὸν τρίγωνον αὐτοῦ, H τὸ ὀρθόκεντρον τοῦ τριγώνου $\text{AB}\Gamma$ καὶ O τὸ κέντρον τῆς περιγεγραμμένης περιφέρειας αὐτοῦ. 'Εάν OK εἶναι ἡ ἀπόστασις τοῦ O ἀπὸ τὴν πλευράν, δείξατε ὅτι :

1) $(\text{OK}) = R\sigma\upsilon\text{nA}$, ὅπου R εἶναι ἡ ἀκτίς τῆς περιγεγραμμένης περιφέρειας τοῦ τριγώνου $\text{AB}\Gamma$.

2) $(\text{HA}) = 2R\sigma\upsilon\text{nA}$

3) $(\text{HA}') = 2R\sigma\upsilon\text{nB}\sigma\upsilon\text{n}\Gamma$

4) $\text{A}' = \pi - 2\text{A}$, $\text{B}' = \pi - 2\text{B}$, $\text{G}' = \pi - 2\Gamma$ ($\text{A}', \text{B}', \text{G}'$ εἶναι αἱ γωνίαι τοῦ ὀρθικοῦ τριγώνου).

5) $(\text{B}'\Gamma') = R\eta\mu 2\text{A} = \alpha\sigma\upsilon\text{nA}$

6) $(\text{A}'\text{B}'\Gamma') = 2\text{E}\sigma\upsilon\text{nA}\sigma\upsilon\text{nB}\sigma\upsilon\text{n}\Gamma$

7) $(\text{OH})^2 = R^2(1 - 8\sigma\upsilon\text{nA}\sigma\upsilon\text{nB}\sigma\upsilon\text{n}\Gamma)$

8) $\sigma\upsilon\text{nA}\sigma\upsilon\text{nB}\sigma\upsilon\text{n}\Gamma \leq \frac{1}{8}$

Ποία ἡ μορφή τῶν ἀνωτέρω σχέσεων, ὅταν τὸ τρίγωνον εἶναι ἀμβλυγώνιον;

2. Ἐπίλυσις τριγώνων

2.1. Ὅρισμοὶ καὶ βασικαὶ ἔννοιαι. Καλεῖται ἐπίλυσις ἑνὸς τριγώνου, ὁ δι' ὑπολογισμοῦ προσδιορισμὸς τῶν ἀγνώστων κυρίων στοιχείων του, ὅταν δοθοῦν πρὸς τοῦτο ἐπαρκῆ στοιχεῖα αὐτοῦ.

Ἡ ἐπίλυσις τριγώνου εἶναι εἰς ἕκ τῶν κυριωτέρων σκοπῶν τῆς Τριγωνομετρίας καὶ τοῦτο, διότι αὕτη εἶναι ἀδύνατος διὰ τῆς Γεωμετρίας. Ἡ ἀδυναμία

αύτη τῆς Γεωμετρίας ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονός, ὅτι δὲν ὑπάρχουν σχέσεις, αἱ ὁποῖαι νὰ συνδέουν τὰ γραμμικὰ καὶ γωνιακὰ στοιχεῖα ἑνὸς τριγώνου. Τὴν δυσκολίαν ταύτην αἶρει ἡ Τριγωνομετρία διὰ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν γωνίας, τῇ βοηθείᾳ τῶν ὁποίων, καθίσταται δυνατὴ ἡ ὑπαρξὶς σχέσεων μεταξὺ τῶν γραμμικῶν στοιχείων τριγώνου καὶ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

Θὰ λέγωμεν ὅτι μία ἐπίλυσις εἶναι **δυνατὴ**, ἐφ' ὅσον ὑπάρχει τρίγωνον τοιοῦτον, ὥστε τὰ ἐκ τῆς ἐπίλυσεως εὐρισκόμενα στοιχεῖα καὶ τὰ δεδομένα στοιχεῖα εἶναι στοιχεῖα τοῦ. Ἐν ἐναντία περιπτώσει, ἡ ἐπίλυσις θὰ λέγεται **ἀδύνατος**.

Ἡ εὕρεσις τῶν ἀναγκαίων καὶ ἱκανῶν συνθηκῶν μεταξὺ τῶν δεδομένων στοιχείων διὰ τὴν ἐπίλυσιν ἑνὸς τριγώνου, ἵνα ἡ ἐπίλυσις εἶναι δυνατὴ ἢ ἀδύνατος, καλεῖται **διερεύνησις**.

Ἐφ' ἐξῆς, λέγοντες **γωνιακὴ σχέσις** ἢ **γραμμικὴ σχέσις** ἑνὸς τριγώνου, θὰ ἐννοοῦμεν κάθε τριγωνομετρικὴν ἐξίσωσιν (ἢ ἐξίσωσιν) ὡς πρὸς τὰς γωνίας Α, Β, Γ ἢ κάθε ἐξίσωσιν ὡς πρὸς τὰ γραμμικὰ στοιχεῖα τοῦ τριγώνου τούτου.

Συνεπῶς, τὰ δεδομένα πρὸς ἐπίλυσιν τριγώνου στοιχεῖα δύνανται νὰ εἶναι γραμμικὰ ἢ γωνιακὰ σχέσεις.

2.2. Παρατηρήσεις : 1) Κάθε γραμμικὴ ὁμογενὴς σχέσις ἑνὸς τριγώνου εἶναι ἰσοδύναμος μὲ μίαν γωνιακὴν σχέσιν. Τοῦτο συνάγεται ἐκ τῆς γενομένης παρατηρήσεως (1. 13), ὅτι πάντα τὰ γραμμικὰ στοιχεῖα ἑνὸς τριγώνου ἐκφράζονται συναρτήσῃ τοῦ R καὶ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ. Συνεπῶς, ἐὰν ἐκφράσωμεν τὰ γραμμικὰ στοιχεῖα τῆς γραμμικῆς ὁμογενοῦς σχέσεως συναρτήσῃ τοῦ R καὶ τῶν γωνιῶν καὶ ἀπαλείψωμεν τὸ R, θὰ προκύψῃ μίαν γωνιακὴν σχέσιν. Π.χ. Ἐκ τῆς γραμμικῆς ὁμογενοῦς σχέσεως $\alpha_a = \beta\gamma$ θὰ ἔχωμεν :

$$\alpha_a = \beta\gamma \iff (2R \eta\mu A) (2R \eta\mu B \eta\mu \Gamma) = (2R \eta\mu B) (2R \eta\mu \Gamma) \iff$$

$$4R^2 \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma = 4R^2 \eta\mu B \eta\mu \Gamma \iff \eta\mu A = 1 \iff A = \frac{\pi}{2} .$$

2) Ἐκ δύο γραμμικῶν μὴ ὁμογενῶν σχέσεων προκύπτει μίαν γωνιακὴν σχέσιν. Διότι, ἐὰν ἐκφράσωμεν τὰ γραμμικὰ στοιχεῖα τῶν δύο γραμμικῶν σχέσεων συναρτήσῃ τοῦ R καὶ τῶν γωνιῶν καὶ ἀπαλείψωμεν τὸ R μεταξὺ αὐτῶν (συνήθως διὰ διαιρέσεως κατὰ μέλη τῶν σχέσεων), θὰ προκύψῃ γωνιακὴν σχέσιν. Π.χ. ἐκ τῶν γραμμικῶν σχέσεων $\beta - \gamma = \kappa > 0$ καὶ $E = \lambda^2$, ὅπου κ, λ δεδομένοί ἀριθμοί, θὰ ἔχωμεν :

$$\beta - \gamma = \kappa \iff 2R (\eta\mu B - \eta\mu \Gamma) = \kappa \iff 4R \eta\mu \frac{B-\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B+\Gamma}{2} = \kappa \iff$$

$$4R \eta\mu \frac{B-\Gamma}{2} \eta\mu \frac{A}{2} = \kappa \iff 16R^2 \eta\mu^2 \frac{B-\Gamma}{2} \eta\mu^2 \frac{A}{2} = \kappa^2 \quad (1).$$

$$E = \lambda^2 \iff 2R^2 \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma = \lambda^2 \iff 4R^2 \eta\mu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \eta\mu B \eta\mu \Gamma = \lambda^2 \quad (2)$$

Διὰ διαιρέσεως κατὰ μέλη τῶν (1), (2) προκύπτει ἡ γωνιακὴ σχέσις :

$$\frac{4\eta\mu^2 \frac{B-\Gamma}{2} \eta\mu \frac{A}{2}}{\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \eta\mu B \eta\mu \Gamma} = \frac{\kappa^2}{\lambda^2}$$

Ἐστῶσαν τρεῖς γωνίαι Α, Β, Γ καὶ εἰς ἀριθμὸς R. Ἐκ τῆς Γεωμετρίας γνωρίζομεν, ὅτι αἱ

ϊκαναί καί ἀναγκαΐαι συνθήκαι, ἵνα ὑπάρχη τρίγωνον μὲ γωνίας τὰς Α,Β,Γ καὶ ἀκτίνα περιγεγραμμένης περιφερείας αὐτοῦ, μήκους R, εἶναι :

$$A > 0, B > 0, \Gamma > 0, A + B + \Gamma = \pi, R > 0$$

*Ἄρα, ἔχομεν τὴν ἐπομένην βασικὴν ἐπίλυσιν :

2.3 Βασικὴ ἐπίλυσις. Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν δύο γωνιῶν του καὶ τῆς ἀκτίνος τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας αὐτοῦ. Δηλαδή δίδονται: $A = \theta_1$, $B = \theta_2$, $R = \kappa$ ($\theta_1, \theta_2, \kappa$ δεδομένοι ἀριθμοί).

Πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ τριγώνου τούτου θεωροῦμεν τὸ σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} A = \theta_1 \\ B = \theta_2 \\ A + B + \Gamma = \pi \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = \theta_1 \\ B = \theta_2 \\ \Gamma = \pi - (\theta_1 + \theta_2) \end{array} \right.$$

*Ἴνα τὸ σύστημα τοῦτο ἔχη θετικὴν λύσιν πρέπει καὶ ἀρκεῖ:

$$(\theta_1 > 0, \theta_2 > 0, \pi - (\theta_1 + \theta_2) > 0) \Leftrightarrow (\theta_1 > 0, \theta_2 > 0, \theta_1 + \theta_2 < \pi)$$

*Ἄρα, αἱ συνθήκαι δυνατότητος τῆς ἐπιλύσεως εἶναι:

$$\theta_1 > 0, \theta_2 > 0, \theta_1 + \theta_2 < \pi, \kappa > 0.$$

*Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τῶν τύπων $\alpha = 2R\eta\mu A$, $\beta = 2R\eta\mu B$ καὶ $\gamma = 2R\eta\mu\Gamma$ προσδιορίζομεν τὰς πλευρὰς τοῦ τριγώνου, αἱ ὅποια θὰ εἶναι:

$$\alpha = 2\kappa \eta\mu\theta_1, \quad \beta = 2\kappa \eta\mu\theta_2, \quad \gamma = 2\kappa \eta\mu(\theta_1 + \theta_2)$$

2.4. Συμφώνως πρὸς τὰς ἀνωτέρω παρατηρήσεις, διακρίνομεν τρεῖς περιπτώσεις ἐπιλύσεων.

- α) Δίδονται δύο γωνιακαὶ σχέσεις καὶ μία γραμμικὴ μὴ ὁμογενῆς.
β) Δίδονται δύο γραμμικαὶ σχέσεις, ἐκ τῶν ὁποίων μία τοῦλάχιστον εἶναι μὴ ὁμογενῆς καὶ μία γωνιακὴ.
γ) Δίδονται τρεῖς γραμμικαὶ σχέσεις, ἐκ τῶν ὁποίων μία τοῦλάχιστον εἶναι μὴ ὁμογενῆς.

Αἱ περιπτώσεις β) καὶ γ) ἀνάγονται, δυνάμει τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων, εἰς τὴν περίπτωσιν α) (διατί;).

Πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ τριγώνου, εἰς τὴν περίπτωσιν α) παρατηροῦμεν ὅτι: Αἱ δύο δεδομένα γωνιακαὶ σχέσεις, ἐν συνδυασμῶ καὶ μὲ τὴν $A+B+\Gamma = \pi$, ἀποτελοῦν ἐν τριγωνομετρικὸν σύστημα (ἢ σύστημα) (Σ), μὲ ἀγνώστους τὰς γωνίας Α, Β καὶ Γ. Οὕτως, ἡ ἐπίλυσις τοῦ τριγώνου ἀρχίζει μὲ τὸν προσδιορισμὸν τῶν γωνιῶν ἐκ τοῦ συστήματος (Σ). Ἐὰν τὸ σύστημα τοῦτο ἔχη θετικὴν λύσιν ($A > 0, B > 0, \Gamma > 0$), τότε προσδιορίζομεν τὰς γωνίας. Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τῆς δεδομένης γραμμικῆς σχέσεως προσδιορίζομεν τὸ R, ἀφοῦ προηγουμένως ἐκφράσωμεν τὰ γραμμικὰ στοιχεῖα αὐτῆς συναρτήσῃ τοῦ R καὶ τῶν γωνιῶν Α, Β, Γ. Ἐχομεν οὕτως ἀναχθῆ εἰς τὴν βασικὴν ἐπίλυσιν.

Τονίζομεν ἰδιαίτερος, ὅτι, ἐὰν τὸ σύστημα (Σ) ἔχη θετικὴν λύσιν καὶ εἶναι $R > 0$, τότε ὑπάρχει τρίγωνον, τοιοῦτον ὥστε τὰ δεδομένα στοιχεῖα καὶ τὰ

ἐκ τῆς ἐπιλύσεως εὐρισκόμενα τοιαῦτα, νὰ εἶναι στοιχεῖα του.

Ὡστε, αἱ συνθῆκαι, ἵνα τὸ σύστημα (Σ) ἔχη θετικὴν λύσιν καὶ εἶναι $R > 0$, εἶναι αἱ συνθῆκαι δυνατότητος τῆς ἐπιλύσεως.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῆ τρίγωνον ἐκ τῶν σχέσεων :

$B - \Gamma = \omega > 0$, $\beta + \gamma = \kappa \alpha$ καὶ $\rho = \lambda$, ὅπου κ, λ, ω δεδομένοι ἀριθμοί.

Ἐπίλυσις : Τὰ δεδομένα πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ τριγώνου εἶναι : Μία γωνιακὴ σχέσηις καὶ δύο γραμμικαὶ σχέσεις, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ($\rho = \lambda$) εἶναι μὴ ὁμογενής.

Ἐκ τῆς ὁμογενοῦς σχέσεως $\beta + \gamma = \kappa \alpha$ ἔχομεν :

$$\beta + \gamma = \kappa \alpha \iff 2R (\eta\mu B + \eta\mu \Gamma) = 2\kappa R \eta\mu B \eta\mu \Gamma$$

$$4\eta\mu \frac{B+\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B-\Gamma}{2} = \kappa (2\eta\mu B \eta\mu \Gamma) \iff$$

$$4\eta\mu \frac{B+\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B-\Gamma}{2} = \kappa \{ \sigma\upsilon\nu(B-\Gamma) - \sigma\upsilon\nu(B+\Gamma) \} \quad (1)$$

*Ἄρα, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὸ σύστημα :

$$(1) \quad \left. \begin{array}{l} B-\Gamma = \omega \\ A+B+\Gamma = \pi \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} B-\Gamma = \omega \\ 4\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\omega}{2} = \kappa (\sigma\upsilon\nu\omega + \sigma\upsilon\nu A) \\ A+B+\Gamma = \pi \end{array} \right. \quad (2)$$

Ἡ ἐξίσωσις (2) ἰσοδυνάμως γράφεται :

$$(2) \iff 4\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\omega}{2} = \kappa (\sigma\upsilon\nu\omega + 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{2} - 1) \iff$$

$$2\kappa\sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{2} - 4\sigma\upsilon\nu \frac{\omega}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} + \kappa \sigma\upsilon\nu\omega - \kappa = 0 \iff$$

$$f \left(\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \right) = \kappa\sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{2} - 2\sigma\upsilon\nu \frac{\omega}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} - \kappa\eta\mu^2 \frac{\omega}{2} = 0 \quad (3)$$

Ἐξ ἄλλου εἶναι : $\Gamma > 0 \iff 2\Gamma > 0 \iff (A+B+\Gamma) - (B-\Gamma) > A \iff \pi - \omega > A$

Ἐκ ταύτης καὶ ἐπειδὴ $B-\Gamma = \omega > 0$, συνάγεται ὅτι : Ἐὰν τὸ ἀνωτέρω σύστημα ἔχη λύσιν, αὕτη θὰ εἶναι θετικὴ, τότε καὶ μόνον τότε, ὅταν :

$$0 < A < \pi - \omega < \pi \iff 0 < \frac{A}{2} < \frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2} < \frac{\pi}{2} \iff$$

$$\sigma\upsilon\nu 0 > \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} > \sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2} \right) \iff 1 > \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} > \eta\mu \frac{\omega}{2} \quad (4)$$

Συνεπῶς, αἱ ρίζαι τῆς ἐξισώσεως (3) εἶναι δεκταί, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὴν (4). Πρὸς τοῦτο, ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς Ἀλγέβρας, διακρίνομεν τὰς ἀκολουθοῦσας περιπτώσεις :

α) 'Η (3) έχει μίαν δεκτὴν ρίζαν, ἔαν καὶ μόνον ἔαν :

$$f\left(\eta\mu\frac{\omega}{2}\right) f(1) < 0 \Leftrightarrow$$

$$\left(k\eta\mu^2\frac{\omega}{2} - 2\sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} \eta\mu\frac{\omega}{2} - k\eta\mu^2\frac{\omega}{2}\right) \left(k - 2\sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} - k\eta\mu^2\frac{\omega}{2}\right) < 0 \Leftrightarrow$$

$$-2\eta\mu\frac{\omega}{2} \sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} \left(k\sigma\upsilon\nu^2\frac{\omega}{2} - 2\sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2}\right) < 0 \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu\omega \sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} \left(k\sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} - 2\right) > 0 \Leftrightarrow k\sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} - 2 > 0 \quad (5)$$

β) 'Η (3) έχει δύο δεκτὰς ρίζας, ἔαν καὶ μόνον ἔαν:

$$\Delta > 0, \alpha f\left(\eta\mu\frac{\omega}{2}\right) > 0, \alpha f(1) > 0, \eta\mu\frac{\omega}{2} + \frac{\beta}{2\alpha} < 0, 1 + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$$

'Εν συνεχείᾳ, ἐκ τῆς δεδομένης γραμμικῆς σχέσεως $\rho = \lambda$ καὶ βάσει τοῦ τύπου (XI) ἔχομεν: $\lambda = 4R\eta\mu\frac{A}{2} \eta\mu\frac{B}{2} \eta\mu\frac{\Gamma}{2}$. 'Εξ αὐτῆς εὐρίσκομεν τὸ R καὶ συνεπῶς ἔχομεν ἀναχθῆ εἰς τὴν βασικὴν ἐπίλυσιν.

'Επὶ πλεόν, ἵνα τὸ R εἶναι θετικόν, πρέπει καὶ ἀρκεῖ $\lambda > 0$. 'Εκ τῆς δεδομένης σχέσεως $\beta + \gamma = \kappa\alpha$ προκύπτει καὶ $\kappa > 0$.

$$'Η συνθήκη (5), ἐφ' ὅσον $\kappa > 0$, γράφεται: $\sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} > \frac{2}{\kappa}$$$

'Επίσης ἔχομεν: $\alpha f\left(\eta\mu\frac{\omega}{2}\right) = \kappa\left(-2\sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} \eta\mu\frac{\omega}{2}\right) = -\kappa\eta\mu\omega < 0$ (διότι $\kappa > 0$), συνεπῶς ἡ ἐξίσωσις (3) δὲν ἔχει δύο δεκτὰς ρίζας.

Τελικῶς, συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω, εὐρίσκομεν ὅτι αἱ συνθήκαι δυνατότητος τῆς ἐπιλύσεως εἶναι: $\lambda > 0, \kappa > 0, \sigma\upsilon\nu\frac{\omega}{2} > \frac{2}{\kappa}$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νὰ ἐπιλυθῆ τρίγωνον ἐκ τῶν σχέσεων: $B - \Gamma = \omega, \frac{\beta}{\gamma} = \kappa$

καὶ $\delta_a = \lambda$, ὅπου κ, λ, ω δεδομένοι ἀριθμοὶ καὶ $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$.

'Επίλυσις: Τὰ δεδομένα πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ τριγώνου εἶναι: Μία γωνιακὴ σχέσηις καὶ δύο γραμμικαὶ σχέσεις, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ($\delta_a = \lambda$) εἶναι μὴ ὁμογενῆς.

'Εκ τῆς ὁμογενοῦς σχέσεως $\frac{\beta}{\gamma} = \kappa$ προκύπτει $\kappa \neq 1$, διότι, ἔαν $\kappa = 1$, τότε $\beta = \gamma$,

ὅθεν $B = \Gamma$ καὶ συνεπῶς $B - \Gamma = 0$, ὅπερ ἄτοπον, λόγῳ τῆς δεδομένης σχέσεως

$0 < \omega < \frac{\pi}{2}$. 'Εν συνεχείᾳ, βάσει γνωστῆς ιδιότητος τῶν ἀναλογιῶν, ἔχομεν:

$$\frac{\beta}{\gamma} = \kappa \Leftrightarrow \frac{2R\eta\mu B}{2R\eta\mu\Gamma} = \kappa \Leftrightarrow \frac{\eta\mu B}{\eta\mu\Gamma} = \kappa \Leftrightarrow \frac{\eta\mu B + \eta\mu\Gamma}{\eta\mu B - \eta\mu\Gamma} = \frac{\kappa+1}{\kappa-1} \Leftrightarrow$$

$$\frac{2\eta\mu \frac{B+\Gamma}{2} \text{ συν} \frac{B-\Gamma}{2}}{2\eta\mu \frac{B-\Gamma}{2} \text{ συν} \frac{B+\Gamma}{2}} = \frac{\kappa+1}{\kappa-1} \Leftrightarrow \varepsilon\varphi \frac{B+\Gamma}{2} \sigma\varphi \frac{B-\Gamma}{2} = \frac{\kappa+1}{\kappa-1}$$

Συνεπώς, έχουμε προς επίλυσιν τὸ σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} B - \Gamma = \omega \\ A + B + \Gamma = \pi \\ \varepsilon\varphi \frac{B+\Gamma}{2} \sigma\varphi \frac{B-\Gamma}{2} = \frac{\kappa+1}{\kappa-1} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} B - \Gamma = \omega \\ A + B + \Gamma = \pi \\ \sigma\varphi \frac{A}{2} = \frac{\kappa+1}{\kappa-1} \varepsilon\varphi \frac{\omega}{2} \end{array} \right. \quad (1)$$

Ἐὰν τὸ ἀνωτέρω σύστημα ἔχη λύσιν, αὕτη εἶναι θετική, ὅταν καὶ μόνον ὅταν (ὡς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα):

$$0 < \frac{A}{2} < \frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2} < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \sigma\varphi \frac{A}{2} > \sigma\varphi \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2} \right) \Leftrightarrow \sigma\varphi \frac{A}{2} > \varepsilon\varphi \frac{\omega}{2}$$

Ἐπομένως, ἡ ἔξισσις (1) ἔχει δεκτὴν λύσιν, ὅταν καὶ μόνον ὅταν:

$$\frac{\kappa+1}{\kappa-1} \varepsilon\varphi \frac{\omega}{2} > \varepsilon\varphi \frac{\omega}{2} \Leftrightarrow \frac{\kappa+1}{\kappa-1} > 1 \Leftrightarrow \kappa > 1$$

Ἐπὶ πλέον, ἐκ τῆς γραμμικῆς σχέσεως $\delta_a = \lambda$ ἔχομεν: $\frac{2R\eta\mu B \eta\mu\Gamma}{\text{συν} \frac{B-\Gamma}{2}} = \lambda$ καὶ

ἐξ αὐτῆς εὐρίσκομεν τὸ $R = \frac{\lambda \text{ συν} \frac{B-\Gamma}{2}}{2\eta\mu B \eta\mu\Gamma}$. Οὕτω, καταλήγομεν εἰς τὴν βασικὴν ἐπίλυσιν.

Ἡ ἔξισσις (1) ἐπιλύεται ὡς ἑξῆς: Ἐπειδὴ $\frac{\kappa+1}{\kappa-1} \varepsilon\varphi \frac{\omega}{2} > 0$, ὑπάρχει τόξον θ (εὐρισκόμενον λογαριθμικῶς) μὲ $0 < \theta < \pi$ τοιοῦτον, ὥστε $\sigma\varphi \frac{\theta}{2} = \frac{\kappa+1}{\kappa-1} \varepsilon\varphi \frac{\omega}{2}$ καὶ συνεπῶς ἡ (1) γράφεται $\sigma\varphi \frac{A}{2} = \sigma\varphi \frac{\theta}{2}$. Ἡ λύσις αὐτῆς, ἐπειδὴ $0 < A < \pi$, εἶναι $A = \theta$. Εὐρέθη οὕτως ἡ γωνία A καὶ συνεπῶς τὸ ἀνωτέρω σύστημα ἐπιλύεται εὐκόλως. Πρὸς ὀλοκλήρωσιν τῆς διερευνήσεως τῆς ἐπιλύσεως, παρατηροῦμεν ὅτι: $R > 0 \Leftrightarrow \lambda > 0$.

Ἔστω, αἱ συνθήκαι δυνατότητος τῆς ἐπιλύσεως εἶναι: $\lambda > 0, \kappa > 1$.

2.5. Κλασσικαὶ ἐπιλύσεις. Ἐὰν τὰ δεδομένα πρὸς ἐπίλυσιν ἑνὸς τριγώνου εἶναι κύρια στοιχεῖα τοῦ τριγώνου τούτου, τότε λέγομεν ὅτι ἡ ἐπίλυσις εἶναι κλασσικὴ ἐπίλυσις.

2.5.1. Νά επιλυθῆ τρίγωνον ἐκ τῶν : $A = \theta_1$, $B = \theta_2$, $a = \kappa$. Πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ τριγώνου τούτου, ὡς ἀνεφέραμεν καὶ εἰς τὰς γενικὰς περιπτώσεις, θεωροῦμεν τὸ σύστημα :

$$\left. \begin{array}{l} A = \theta_1 \\ B = \theta_2 \\ A + B + \Gamma = \pi \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = \theta_1 \\ B = \theta_2 \\ \Gamma = \pi - (\theta_1 + \theta_2) \end{array} \right.$$

Τὸ σύστημα τοῦτο ἔχει θετικὴν λύσιν, ἐὰν καὶ μόνον ἑάν: $\theta_1 > 0$, $\theta_2 > 0$, $\theta_1 + \theta_2 < \pi$. Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τῆς γραμμικῆς σχέσεως $a = \kappa$ ἔχομεν: $\kappa = 2R \eta\mu\theta_1 \Rightarrow$

$R = \frac{\kappa}{2\eta\mu\theta_1}$. Ἐχομεν ἤδη γνωστὰ τὰ στοιχεῖα A, B, Γ, R καὶ συνεπῶς, προχωροῦμεν κατὰ τὰ γνωστὰ ἐκ τῆς βασικῆς ἐπιλύσεως. Ἐπὶ πλέον εἶναι: $R > 0 \Leftrightarrow$

$\frac{\kappa}{2\eta\mu\theta_1} > 0 \Leftrightarrow \kappa > 0$, ἐπομένως αἱ συνθήκαι δυνατότητος τῆς ἐπιλύσεως εἶναι: $\theta_1 > 0$, $\theta_2 > 0$, $\theta_1 + \theta_2 < \pi$, $\kappa > 0$.

2.5.2. Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον ἐκ τῶν : $\beta = \kappa$, $\gamma = \lambda$, $A = \theta$. Ὑποθέτομεν $\kappa > 0$, $\lambda > 0$ καὶ $0 < \theta < \pi$, διότι, ἐν ἐναντία περιπτώσει, εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπίλυσις. Οἱ τεθέντες περιορισμοὶ θὰ εὐρίσκοντο βεβαίως καὶ ἐκ τῆς συνήθους διαδικασίας τῆς διερευνήσεως τῆς ἐπιλύσεως.

Ἐν συνεχείᾳ, ὑποθέτομεν $\beta > \gamma$ ($\Leftrightarrow \kappa > \lambda$), ὁπότε, βάσει καὶ τοῦ τύπου II, ἔχομεν τὸ σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} A = \theta \\ A + B + \Gamma = \pi \\ \epsilon\phi \frac{B - \Gamma}{2} = \frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma} \sigma\phi \frac{A}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = \theta \\ A + B + \Gamma = \pi \\ \epsilon\phi \frac{B - \Gamma}{2} = \frac{\kappa - \lambda}{\kappa + \lambda} \sigma\phi \frac{\theta}{2} \end{array} \right. \quad (1)$$

Ἐπειδὴ ὅμως εἶναι $0 < A < \pi$ καὶ $\kappa > \lambda$ ($\kappa, \lambda > 0$), συνάγεται $\frac{\kappa - \lambda}{\kappa + \lambda} \sigma\phi \frac{\theta}{2} > 0$.

Ἐπιλύομεν τὴν ἐξίσωσιν (1) πρὸς εὔρεσιν τῆς διαφορᾶς $B - \Gamma$. Πρὸς τοῦτο ἔστω γωνία φ μὲ $0 < \frac{\varphi}{2} < \frac{\pi}{2}$ τοιαύτη, ὥστε $\epsilon\phi \frac{\varphi}{2} = \frac{\kappa - \lambda}{\kappa + \lambda} \sigma\phi \frac{\theta}{2}$, ὁπότε ἡ ἐξίσωσις (1) γράφεται:

$$\epsilon\phi \frac{B - \Gamma}{2} = \epsilon\phi \frac{\varphi}{2} \Leftrightarrow \frac{B - \Gamma}{2} = \frac{\varphi}{2} \Leftrightarrow B - \Gamma = \varphi.$$

Συνεπῶς, τὸ ἀνωτέρω σύστημα εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὸ σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} A = \theta \\ A + B + \Gamma = \pi \\ B - \Gamma = \varphi \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = \theta \\ B = \frac{\pi}{2} + \frac{\varphi}{2} - \frac{\theta}{2} \\ \Gamma = \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\theta}{2} \end{array} \right.$$

Ἡ εὐρεθεῖσα λύσις τοῦ συστήματος εἶναι θετική. Πράγματι, ἐπειδὴ $0 < \theta < \pi \Rightarrow 0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} > 0 \Rightarrow B = \frac{\pi}{2} + \frac{\varphi}{2} - \frac{\theta}{2} > 0$. Ἐξ ἄλλου, ἐπειδὴ $\frac{\kappa - \lambda}{\kappa + \lambda} < 1$, ἐκ τῆς σχέσεως $\varepsilon\varphi \frac{\varphi}{2} = \frac{\kappa - \lambda}{\kappa + \lambda} \sigma\varphi \frac{\theta}{2}$ συνάγεται: $\varepsilon\varphi \frac{\varphi}{2} < \sigma\varphi \frac{\theta}{2} \Rightarrow \varepsilon\varphi \frac{\varphi}{2} < \varepsilon\varphi \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) \Rightarrow \frac{\varphi}{2} < \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\theta}{2} > 0 \Rightarrow \Gamma = \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\theta}{2} > 0$.

Ἄρα, τὸ σύστημα ἔχει πάντοτε θετικὴν λύσιν (μῖαν) καὶ συνεπῶς ἡ ἐπίλυσις εἶναι πάντοτε δυνατὴ. Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τῆς $\alpha = \kappa$ ἔχομεν $2R \eta\mu\theta = \kappa$ καὶ ἐξ αὐτῆς εὐρίσκομεν τὸ $R = \frac{\kappa}{2\eta\mu\theta} > 0$. Οὕτως ἔχομεν ἀναχθῆ εἰς τὴν βασικὴν ἐπίλυσιν.

Ἐὰν $\beta < \gamma$ ($\Leftrightarrow \kappa < \lambda$), ἐργαζόμεθα ἀναλόγως. Ἐὰν ὁμως $\beta = \gamma$ ($\Leftrightarrow \kappa = \lambda$), τότε ἡ ἐπίλυσις εἶναι ἀπλουστάτη, διότι $B = \Gamma = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$.

2.5.3. Νὰ ἐπιλυθῆ τρίγωνον ἐκ τῶν πλευρῶν του. Τὰ δεδομένα πρὸς ἐπίλυσιν εἶναι: $\alpha = \kappa$, $\beta = \lambda$, $\gamma = \mu$, ὅπου κ, λ, μ δεδομένοι θετικοὶ ἀριθμοί. Ἐν προκειμένῳ, οἱ πλέον κατάλληλοι τύποι, εἶναι οἱ τύποι 14. Συνεπῶς, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὸ σύστημα:

$$\varepsilon\varphi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-\lambda)(s-\mu)}{s(s-\kappa)}}, \quad \varepsilon\varphi \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-\mu)(s-\kappa)}{s(s-\lambda)}},$$

$$\varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{(s-\kappa)(s-\lambda)}{s(s-\mu)}} \quad \text{ὅπου } 2s = \kappa + \lambda + \mu.$$

Εἶναι γνωστὸν ὅτι: $\frac{(s-\lambda)(s-\mu)}{s(s-\kappa)} > 0 \Leftrightarrow |\lambda - \mu| < \kappa < \lambda + \mu$ (1)

Ἐὰν εἶναι $\frac{(s-\lambda)(s-\mu)}{s(s-\kappa)} > 0$, τότε ὑπάρχει τόξον θ_1 (εὐρισκόμενον λογαριθμικῶς) μὲ $0 < \theta_1 < \pi$ τοιοῦτον, ὥστε $\varepsilon\varphi \frac{\theta_1}{2} = \sqrt{\frac{(s-\lambda)(s-\mu)}{s(s-\kappa)}}$, ὁπότε ἡ πρώτη τῶν ἐξισώσεων τοῦ ἀνωτέρω συστήματος γράφεται $\varepsilon\varphi \frac{A}{2} = \varepsilon\varphi \frac{\theta_1}{2}$. Ἡ ἐξίσωσις αὕτη ἔχει μίαν μόνον λύσιν ἐντὸς τοῦ διαστήματος $(0, \pi)$, ἡ ὁποία εἶναι $A = \theta_1$. Ἄρα, αἱ ἱκαναὶ καὶ ἀναγκαῖαι συνθήκαι, ἵνα τὸ σύστημα ἔχη μίαν μόνον λύσιν ἐντὸς τοῦ διαστήματος $(0, \pi)$, εἶναι:

$$|\lambda - \mu| < \kappa < \lambda + \mu, \quad |\mu - \kappa| < \lambda < \mu + \kappa, \quad |\kappa - \lambda| < \mu < \kappa + \lambda \quad (\Sigma)$$

Ἐστω $(A = \theta_1, B = \theta_2, \Gamma = \theta_3)$ ἡ λύσις αὐτῆ. Ἡ ἐπίλυσις θὰ εἶναι δυνατή, ἐφ' ὅσον $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi$. Τοῦτο ὅμως ἰσχύει, διότι : Ἄφ' ἑνὸς γνωρίζομεν ὅτι :

$$\kappa^2 = \lambda^2 + \mu^2 - 2\lambda\mu \cos\theta_1 \iff \epsilon\phi \frac{\theta_1}{2} = \sqrt{\frac{(s-\lambda)(s-\mu)}{s(s-\kappa)}}$$

Ἄφ' ἑτέρου οἱ ἀριθμοὶ κ, λ, μ καὶ $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ πληροῦν τὰς ὑποθέσεις τοῦ θεωρήματος 1.2.3. καὶ συνεπῶς εἶναι στοιχεῖα ἑνὸς τριγώνου. Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τῆς $\kappa = 2R \eta\mu\theta_1$ εὐρίσκομεν τὸ R καὶ συνεπῶς ἀναγόμεθα εἰς τὴν βασικὴν ἐπίλυσιν. Αἱ συνθήκαι δυνατότητος τῆς ἐπιλύσεως εἶναι αἱ (Σ) .

Παρατήρησις 1. Ἡ σχέσις $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi$ δύναται νὰ ἀποδειχθῇ καὶ ὡς ἑξῆς:

$$\text{Εἶναι: } \epsilon\phi \frac{\theta_1}{2} \epsilon\phi \frac{\theta_2}{2} + \epsilon\phi \frac{\theta_2}{2} \epsilon\phi \frac{\theta_3}{2} + \epsilon\phi \frac{\theta_3}{2} \epsilon\phi \frac{\theta_1}{2} =$$

$$= \sqrt{\frac{(s-\lambda)(s-\kappa)(s-\mu)^2}{s^2(s-\kappa)(s-\mu)}} + \sqrt{\frac{(s-\kappa)^2(s-\lambda)(s-\mu)}{s^2(s-\lambda)(s-\mu)}} + \sqrt{\frac{(s-\lambda)^2(s-\kappa)(s-\mu)}{s^2(s-\mu)(s-\kappa)}} = 1$$

Ἐξ αὐτοῦ ὡς γνωστὸν ἢ μεταξὺ τῶν θ_1, θ_2 καὶ θ_3 σχέσις εἶναι $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 2\rho\pi + \pi$, $\rho \in \mathbb{Z}$. Ἐπειδὴ ὅμως $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in (0, \pi)$, προκύπτει : $0 < \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 < 3\pi$ καὶ συνεπῶς ἔχομεν :

$$0 < 2\rho\pi + \pi < 3\pi \iff -\pi < 2\rho\pi < 2\pi \iff -\frac{1}{2} < \rho < 1 \iff \rho = 0 \iff \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi.$$

Παρατήρησις 2. Ἐφ' ἑξῆς, πρὸ τῆς ἐπιλύσεως ἑνὸς τριγώνου θὰ θέτωμεν ὠρισμένους προφανεῖς περιορισμοὺς διὰ τὰς πλευρὰς (ἢ τὰ γραμμικὰ στοιχεῖα γενικῶς) καὶ τὰς γωνίας αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι ὡς γνωστὸν εἶναι: $A, B, \Gamma \in (0, \pi)$, $\kappa > 0$ διὰ κάθε γραμμικὸν στοιχεῖον κ τοῦ τριγώνου.

2.5.4. Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν : $\alpha = \kappa, \beta = \lambda, A = \theta$.

Περιορισμοί: $\kappa > 0, \lambda > 0$ καὶ $0 < \theta < \pi$. Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τῶν δύο γραμμικῶν σχέσεων ἔχομεν:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{2R \eta\mu B}{2R \eta\mu A} \iff \frac{\lambda}{\kappa} = \frac{\eta\mu B}{\eta\mu \theta} \iff \eta\mu B = \frac{\lambda}{\kappa} \eta\mu \theta.$$

Συνεπῶς, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὸ σύστημα :

$$\begin{cases} A = \theta \\ A + B + \Gamma = \pi \\ \eta\mu B = \frac{\lambda}{\kappa} \eta\mu \theta \end{cases} \quad (1)$$

Ἐπιλύομεν καὶ διερευνοῦμεν τὴν (1). Πρὸς τοῦτο, διακρίνομεν τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

α) Ἐὰν $\frac{\lambda}{\kappa} \eta\mu \theta > 1$, τότε ἡ (1) εἶναι ἀδύνατος καὶ συνεπῶς ἡ ἐπίλυσις εἶναι ἀδύνατος.

β) Ἐὰν $\frac{\lambda}{\kappa} \eta\mu \theta \leq 1$, τότε ἡ (1) ἔχει λύσιν, τὴν ὁποῖαν εὐρίσκομεν ὡς ἑξῆς: Ἐστω

φ τὸ τόξον μὲ $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ καὶ τοιοῦτον, ὥστε $\eta\mu\varphi = \frac{\lambda}{\kappa}$ $\eta\mu\theta$. Συνεπῶς, ἡ ἐξίσωσις (1) γράφεται $\eta\mu B = \eta\mu\varphi$. Ἡ ἐξίσωσις αὕτη, ἔχει δύο λύσεις ἐντὸς τοῦ διαστήματος $(0, \pi)$, αἱ ὁποῖαι εἶναι : $B = \varphi$, $B = \pi - \varphi$. Ἐξ αὐτῶν, βάσει καὶ τῶν δύο πρώτων ἐξισώσεων τοῦ ἀνωτέρω συστήματος, προκύπτει : $\Gamma = \pi - \theta - \varphi$, $\Gamma = \varphi - \theta$. Ἄρα, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὰ συστήματα :

$$\left. \begin{array}{l} A = \theta \\ B = \varphi \\ \Gamma = \pi - \theta - \varphi \end{array} \right\} (\Sigma_1) \qquad \left. \begin{array}{l} A = \theta \\ B = \pi - \varphi \\ \Gamma = \varphi - \theta \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

Ἐξετάζομεν ὑπὸ ποίας συνθήκας τὰ ἀνωτέρω συστήματα ἔχουν θετικὴν λύσιν. Πρὸς τοῦτο, διακρίνομεν τὰς ἀκολουθοῦσας περιπτώσεις :

β_1) Ἐὰν $\theta \geq \frac{\pi}{2}$ ($\Leftrightarrow \pi - \theta \leq \frac{\pi}{2}$), τότε $\varphi - \theta \leq 0$ ($\Leftrightarrow \Gamma \leq 0$) καὶ συνεπῶς τὸ σύστημα (Σ_2) εἶναι ἀδύνατον, ἥτοι δὲν ἔχει θετικὴν λύσιν. Τὸ σύστημα (Σ_1) ἔχει θετικὴν λύσιν, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν : $\Gamma > 0 \Leftrightarrow \pi - \theta - \varphi > 0 \Leftrightarrow \pi - \theta > \varphi \Leftrightarrow \eta\mu(\pi - \theta) > \eta\mu\varphi \Leftrightarrow \eta\mu\theta > \eta\mu\varphi \Leftrightarrow \eta\mu\theta > \frac{\lambda}{\kappa} \eta\mu\theta \Leftrightarrow \kappa > \lambda$.

β_2) Ἐὰν $\theta < \frac{\pi}{2}$, τότε $\pi - \theta - \varphi > 0$ καὶ συνεπῶς, τὸ σύστημα (Σ_1) ἔχει θετικὴν λύσιν. Τὸ σύστημα (Σ_2) ἔχει θετικὴν λύσιν, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν : $\Gamma = \varphi - \theta > 0 \Leftrightarrow \varphi > \theta \Leftrightarrow \eta\mu\varphi > \eta\mu\theta \Leftrightarrow \frac{\lambda}{\kappa} \eta\mu\theta > \eta\mu\theta \Leftrightarrow \lambda > \kappa$.

Συνοψίζοντες τὰ ἀνωτέρω, ἔχομεν τὸν κάτωθι πίνακα.

$\alpha < \beta$ $\eta\mu A$		οὐδεμία λύσις
$\alpha > \beta$ $\eta\mu A$	$\left\{ \begin{array}{l} A < \frac{\pi}{2} \\ A \geq \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \alpha < \beta \text{ δύο λύσεις} \\ \alpha \geq \beta \text{ μία λύσις} \\ \alpha \leq \beta \text{ οὐδεμία λύσις} \\ \alpha > \beta \text{ μία λύσις} \end{array} \right\}$
	$\left\{ \begin{array}{l} A < \frac{\pi}{2} \\ A \geq \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{μία λύσις} \\ \text{οὐδεμία λύσις} \end{array} \right\}$

2.6. Ειδικώτερον, εάν τὸ πρὸς ἐπίλυσιν τρίγωνον εἶναι ὀρθογώνιον (θὰ συμβολίζωμεν πάντοτε τὴν ὀρθὴν γωνίαν μὲ A), τότε, λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν ὅτι $A = \frac{\pi}{2}$ ($\Rightarrow B + \Gamma = \frac{\pi}{2}$), τὸ ἀνωτέρω σύστημα (Σ) (2.4) θὰ εἶναι ἐν τριγωνομετρικὸν σύστημα (ἢ σύστημα) τῶν ὀξείων γωνιῶν B, Γ καὶ ἡ ἐπίλυσις τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου θὰ εἶναι δυνατὴ, εάν καὶ μόνον εάν, ὑπάρχη θετικὴ λύσις ($B > 0, \Gamma > 0$).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῇ ὀρθογώνιον τρίγωνον ἐκ τῶν: $\alpha = \kappa, \rho = \lambda$.

Ἐπίλυσις: Οἱ ἀρχικοὶ περιορισμοὶ εἶναι: $\kappa > 0, \lambda > 0$. Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τῶν δύο δεδομένων γραμμικῶν σχέσεων καὶ βάσει τοῦ τύπου (XI) ἔχομεν:

$$\begin{aligned} \frac{\rho}{\alpha} &= \frac{4R \eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}}{2R \eta\mu A} \iff \frac{\lambda}{\kappa} = \frac{2\eta\mu \frac{\pi}{4} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}}{\eta\mu \frac{\pi}{2}} \iff \\ \frac{\lambda}{\kappa} &= \sqrt{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2} \iff 2\eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2} = \frac{2\lambda}{\kappa\sqrt{2}} \iff \\ \text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} - \text{συν} \frac{B+\Gamma}{2} &= \frac{\lambda\sqrt{2}}{\kappa} \iff \text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} - \text{συν} \frac{\pi}{4} = \frac{\lambda\sqrt{2}}{\kappa} \iff \\ \text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} &= \frac{\lambda\sqrt{2}}{\kappa} + \frac{\sqrt{2}}{2} \iff \text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} = \frac{\sqrt{2}(2\lambda + \kappa)}{2\kappa} \end{aligned}$$

*Ἄρα, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὸ σύστημα:

$$\begin{cases} B + \Gamma = \frac{\pi}{2} \\ \text{συν} \frac{B - \Gamma}{2} = \frac{\sqrt{2}(2\lambda + \kappa)}{2\kappa} \end{cases} \quad (1)$$

Ἐάν τὸ σύστημα τοῦτο ἔχη λύσιν, αὕτη θὰ εἶναι θετικὴ, εάν καὶ μόνον εάν:

$$\begin{aligned} 0 \leq |B - \Gamma| < \frac{\pi}{2} &\iff 0 \leq \left| \frac{B - \Gamma}{2} \right| < \frac{\pi}{4} \iff \\ \text{συν} 0 \geq \text{συν} \frac{B - \Gamma}{2} > \text{συν} \frac{\pi}{4} &\iff 1 \geq \text{συν} \frac{B - \Gamma}{2} > \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2). \end{aligned}$$

Συνεπῶς, ἡ ἐξίσωσις (1) ἔχει λύσιν, ὅταν καὶ μόνον ὅταν:

$$1 \geq \frac{\sqrt{2}(2\lambda + \kappa)}{2\kappa} > \frac{\sqrt{2}}{2} \iff \frac{\sqrt{2}(2\lambda + \kappa)}{2\kappa} \leq 1 \iff \lambda \leq \frac{\kappa(\sqrt{2}-1)}{2} \quad (3).$$

Πληρουμένης τῆς συνθήκης (3), ἡ ἐξίσωσις (1) θὰ ἔχη λύσιν καὶ συνεπῶς εὐρίσκομεν τὴν διαφορὰν $B-\Gamma$, ὅποτε εὐκόλως εὐρίσκομεν τὰς ὀξείας γωνίας B καὶ Γ .

Αἱ συνθῆκαι δυνατότητος τῆς ἐπιλύσεως εἶναι:

$$\kappa > 0, \lambda > 0, \lambda \leq \frac{\kappa(\sqrt{2}-1)}{2}.$$

Ἐὰν $\lambda = \frac{(\kappa\sqrt{2}-1)}{2}$, τὸ τρίγωνον θὰ εἶναι ἰσοσκελές (διατί;).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νὰ ἐπιλυθῇ ὀρθογώνιον τρίγωνον ἐκ τῶν:

$$\alpha = \kappa, \delta_\beta \delta_\gamma = \lambda^2 \quad (\kappa, \lambda \in \mathbb{R}).$$

Ἐπίλυσις: Ὁ ἀρχικός περιορισμός εἶναι: $\kappa > 0$. Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τῶν δύο δεδομένων μὴ ὁμογενῶν γραμμικῶν σχέσεων δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν μίαν γωνιακὴν σχέσιν. Πράγματι, ἀφ' ἐνὸς ἔχομεν:

$$\begin{aligned} \delta_\beta \delta_\gamma &= \frac{\gamma}{\text{συν} \frac{B}{2}} \cdot \frac{\beta}{\text{συν} \frac{\Gamma}{2}} \Leftrightarrow \lambda^2 = \frac{4R^2 \eta\mu\Gamma \eta\mu B}{\text{συν} \frac{B}{2} \text{συν} \frac{\Gamma}{2}} \Leftrightarrow \\ \lambda^2 &= 16R^2 \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2} \quad (1) \end{aligned}$$

Ἄφ' ἑτέρου, εἶναι: $\alpha = 2R \Leftrightarrow \kappa = 2R \Leftrightarrow \kappa^2 = 4R^2 \quad (2)$

Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) λαμβάνομεν:

$$\begin{aligned} \lambda^2 &= 4\kappa^2 \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2} \Leftrightarrow \lambda^2 = 2\kappa^2 \left[\text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} - \text{συν} \frac{B+\Gamma}{2} \right] \Leftrightarrow \\ \lambda^2 &= 2\kappa^2 \left[\text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \Leftrightarrow \text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} = \frac{\lambda^2}{2\kappa^2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Συνεπῶς, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὸ σύστημα:

$$\begin{cases} B + \Gamma = \frac{\pi}{2} & (3) \\ \text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} = \frac{\lambda^2}{2\kappa^2} + \frac{\sqrt{2}}{2} & (4) \end{cases}$$

Ἐὰν τὸ σύστημα τοῦτο ἔχη λύσιν, αὕτη θὰ εἶναι θετικὴ, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν:

$$0 \leq |B-\Gamma| < \pi - A \Leftrightarrow 0 \leq |B-\Gamma| < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 0 \leq \left| \frac{B-\Gamma}{2} \right| < \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow$$

$$\text{συν} 0 \geq \text{συν} \left| \frac{B-\Gamma}{2} \right| > \text{συν} \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow 1 \geq \text{συν} \frac{B-\Gamma}{2} > \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (5)$$

*Αρα, ίνα ή εξίσωσις (4) έχη δεκτήν λύσιν, πρέπει και άρκει:

$$1 \geq \frac{\lambda^2}{2\kappa^2} + \frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{\sqrt{2}}{2} \iff \frac{\lambda^2}{2\kappa^2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 1 \iff \frac{\lambda^2}{\kappa^2} \leq 2 - \sqrt{2} \quad (6)$$

Πληρουμένης τής συνθήκης (6), ή εξίσωσις (4) έχει λύσιν, όποτε εξ αύτής εύρισκομεν τήν διαφοράν Β-Γ και συνεπώς προχωροϋμεν κατά τά γνωστά.

Τελικώς, αί συνθήκαι δυνατότητος τής επίλυσεως είναι:

$$\kappa > 0, \frac{\lambda^2}{\kappa^2} \leq 2 - \sqrt{2}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

75) Νά επιλυθή τρίγωνον εκ τών κάτωθι στοιχείων:

1) $B = \frac{\pi}{9}, \Gamma = \frac{2\pi}{5}, \alpha = 180$

2) $\beta = 20, \gamma = 10, \Gamma = \frac{\pi}{3}$

3) $\alpha = 1, \beta = \sqrt{3} + 1, A = \frac{\pi}{12}$

4) $\gamma = 4, A = 2\Gamma, \text{ συν}\Gamma = \frac{\sqrt{3}}{2}$

5) $\beta = 2, \gamma = \sqrt{2}, \Gamma = \frac{\pi}{6}$

6) $\beta = 2, \gamma = \sqrt{3}, \Gamma = \frac{\pi}{3}$

7) $\alpha = 2\beta, \Gamma = \frac{\pi}{3}, E = 2\sqrt{3}$

8) $\alpha, R, A = 2\Gamma$

9) $\alpha, \beta - \gamma = \lambda, B = 2\Gamma$

10) $\alpha, A, \frac{\beta}{\gamma} = \lambda$

76) Νά επιλυθή τρίγωνον εκ τών κάτωθι στοιχείων:

1) α, A, τ

2) $\alpha, \beta, \beta - \gamma = \lambda$

3) α, A, E

4) $\alpha, u_\alpha, B = 2\Gamma$

5) α, A, μ_α

6) $A, \beta + \gamma = \lambda, u_\alpha = \alpha$

7) $A, u_\alpha, \beta + \gamma = 2\alpha$

8) $\alpha, \tau, B = 2\Gamma$

9) $\alpha, A, \beta^2 + \gamma^2 = \lambda^2$

77) Νά επιλυθή όρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ ($A = \frac{\pi}{2}$) εκ τών έπομένων στοιχείων:

1) α, ρ

2) u_α, μ_β

3) $B, \beta + \gamma = \kappa$

4) u_α, μ_α

5) ρ, B

6) α, δ_β

7) τ, R

8) $2\tau, u_\alpha$

9) $B, \alpha + u_\alpha = \lambda$

78) Νά επιλυθή τρίγωνον εκ τών άκολουθων στοιχείων:

1) $\alpha, B - \Gamma = \omega, \frac{\epsilon\phi B}{\epsilon\phi \Gamma} = \lambda$

2) $\alpha, E = \lambda^2, \epsilon\phi \frac{B}{2} + \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \nu$

3) $\alpha, A, \beta - \gamma + u_\alpha = \lambda$

4) $\alpha, A, u_\beta + u_\gamma = \mu$

5) $\alpha, \mu_\alpha, B - \Gamma = \omega > 0$

6) $\alpha, \frac{u_\alpha}{\rho\beta} = \lambda, B = 2\Gamma$

7) $\rho_\alpha, \rho_\beta, \rho_\gamma$

8) $u_\alpha, u_\beta, u_\gamma$

9) $A, \beta + \gamma = \lambda, u_\alpha + \rho_\alpha = \kappa$

79) Νά ύπολογισθοϋν αί τρεις πλευραι ένός τριγώνου, έάν γνωρίζωμεν, ότι τά μήκη αύτών είναι τρεις διαδοχικοί άκέραιοι άριθμοι και ότι ή μεγαλυτέρα γωνία είναι διπλασία τής μικροτέρας.

80) Εἰς ὀρθογώνιον τρίγωνον δίδονται τὰ τμήματα μ καὶ ν , εἰς τὰ ὁποῖα διαιρεῖται ἡ ὑποτείνουσα ὑπὸ τῆς διχοτόμου δ_a . Νὰ ὑπολογισθοῦν τὰ στοιχεῖα $\alpha, \beta, \gamma, \delta_a$ καὶ u_a .

81) Αἱ πλευραὶ α, β, γ ἑνὸς τριγώνου ἀποτελοῦν ἀριθ. πρόοδον. Ἐὰν δίδεται ἡ γωνία A , νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ ἄλλαι γωνίαι.

82) Εἰς τρίγωνον δίδονται τὰ στοιχεῖα R, ρ καὶ $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 8R^2$. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ πλευραὶ τοῦ τριγώνου.

83) Ἐὰν εἰς τρίγωνον εἶναι $\sigma\phi A = 2$ καὶ $\sigma\phi B = 3$, νὰ ὑπολογισθῇ ἡ γωνία Γ (ἄνευ πινάκων).

84) Νὰ ἐκφρασθῇ, συναρτήσει τῶν πλευρῶν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$, ἡ ἐφαπτομένη τῆς γωνίας, τῶν διαμέσων μ_β καὶ μ_γ .

85) Αἱ πλευραὶ τριγώνου ἀποτελοῦν ἀριθ. πρόοδον, ἡ δὲ διαφορὰ τῆς μικροτέρας γωνίας αὐτοῦ ἀπὸ τὴν μεγαλυτέραν εἶναι $\frac{\pi}{2}$. Νὰ δεიχθῇ ὅτι αἱ πλευραὶ τοῦ τριγώνου εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς: $\sqrt{7}-1, \sqrt{7}, \sqrt{7}+1$.

86) Ἐὰν εἰς τρίγωνον εἶναι $\Gamma = \frac{\pi}{3}$, τότε νὰ δειχθῇ ὅτι:

$$\frac{1}{\alpha + \gamma} + \frac{1}{\beta + \gamma} = \frac{3}{2\tau}$$

87) Ἐὰν εἰς τρίγωνον εἶναι $E = \frac{4}{3}$, $\beta^2 + \gamma^2 = \frac{20}{3}$ καὶ $\epsilon\phi B \epsilon\phi \Gamma = 4$, τότε νὰ ὑπολογισθοῦν τὰ α καὶ $\epsilon\phi A$.

88) Ἐὰν εἰς ὀρθογώνιον τρίγωνον ἰσχύη $\beta(\beta + 2\gamma) > \gamma^2$, νὰ δειχθῇ ὅτι $B > \frac{\pi}{8}$.

89) Εἰς ὀρθογώνιον τρίγωνον δίδεται ἡ ὀξεῖα γωνία ω τῆς διαμέσου μ_β μετὰ τῆς ὑποτείνουσας α . Ζητοῦνται:

1) Νὰ ὀρισθοῦν αἱ γωνίαι B καὶ Γ .

2) Εὐρίσκομεν δύο τιμὰς διὰ τὴν γωνίαν B , τὰς B_1 καὶ B_2 . Νὰ δειχθῇ ὅτι:

$$B_1 + B_2 = \frac{\pi}{2} + \omega.$$

90) Νὰ ἐπιλυθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν $\alpha, u_a, \epsilon\phi \frac{B}{2}, \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \mu$.

91) Ἐὰν αἱ πλευραὶ τριγώνου εἶναι ἀνάλογοι τῶν ἀριθμῶν $\sqrt{6}, \sqrt{3}$ καὶ 1 , ὑπολογίσατε τὰ ἡμίτονα καὶ συνημίτονα τῶν γωνιῶν αὐτοῦ. Ἐπίσης, δεῖξατε ὅτι $A - B = \frac{\pi}{2}$ καὶ ὅτι ἡ διάμεσος μ_a εἶναι κάθετος εἰς τὴν πλευρὰν γ .

92) Θεωροῦμεν τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ ὑποῦμεν καθέτους, ἐπὶ τὴν AB εἰς τὸ A , ἐπὶ τὴν $B\Gamma$ εἰς τὸ B καὶ ἐπὶ τὴν AG εἰς τὸ G . Ἐὰν E' εἶναι τὸ ἔμβαδὸν τοῦ τριγώνου, τοῦ σχηματιζομένου ὑπὸ τῶν καθέτων τούτων, τότε:

$$\frac{E'}{E} = (\sigma\phi A + \sigma\phi B + \sigma\phi \Gamma)^2$$

93) *Εάν ω, φ και θ είναι αί γωνίαί αί σχηματιζόμεναι υπό τῶν πλευρῶν προσανατολισμένου παραπλευροῦ τριγώνου καί ἐνὸς ἄξονος, νὰ δειχθῆ ὅτι:

$$(\eta\mu\omega \eta\mu\varphi \eta\mu\theta)^2 + (\sigma\upsilon\nu\omega \sigma\upsilon\nu\varphi \sigma\upsilon\nu\theta)^2 = \frac{1}{16}$$

94) Θεωροῦμεν κανονικὴν πυραμίδα ν παραπλευρῶν ἐδρῶν, τῆς ὁποίας ἡ παράπλευρος ἀκμὴ εἶναι α καὶ ἡ γωνία τῆς κορυφῆς ἐκάστης ἐδρας 2φ . Νὰ ὑπολογισθοῦν συναρτήσῃ τῶν α καὶ φ :

- 1) Τὸ ὄλικόν ἐμβαδόν,
- 2) Ὁ ὄγκος τῆς πυραμίδος,
- 3) ἡ ἀκτίς τῆς περιγεγραμμένης σφαίρας καὶ
- 4) ἡ ἀκτίς τῆς ἐγγεγραμμένης σφαίρας.

95) *Ἐστω R ἡ ἀκτίς τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας τῆς βάσεως $AB\Gamma$ τρισορθογωνίου εἰς τὸ O τετραέδρου $OAB\Gamma$. Ἐάν ω_1, ω_2 καὶ ω_3 εἶναι ἀντιστοίχως αἱ διέδροι γωνίαί $B\Gamma, \Gamma A$ καὶ AB , δείξατε ὅτι:


α) $V = \frac{4}{3} R^3 \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma \sqrt{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma}$, ὅπου R εἶναι ὁ ὄγκος τοῦ τετραέδρου.

β) $\sigma\upsilon\nu\omega_3 = \sqrt{\sigma\varphi A \sigma\varphi B}$

γ) $\sigma\upsilon\nu^2\omega_1 + \sigma\upsilon\nu^2\omega_2 + \sigma\upsilon\nu^2\omega_3 = 1$

3. Τετράπλευρον

3.1. **Κυρτὸν τετράπλευρον.** Αἱ γωνίαί A, B, Γ, Δ καὶ αἱ πλευραὶ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ἐνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου (Σχ. 15) χαρακτηρίζονται, ὅπως καὶ εἰς τὸ τρίγωνον, ὡς **κύρια** στοιχεῖα τοῦ τετραπλεύρου.



Σχ. 15

Αἱ διαγώνιοι δ_1 καὶ δ_2 , τὸ ἐμβαδὸν E , ἡ περίμετρος $2s$, ἡ γωνία ω τῶν διαγώνιων, ὡς καὶ κάθε ἄλλο στοιχεῖον (γραμμικὸν ἢ γωνιακόν), τὸ ὁποῖον συνδέεται μὲ τὸ κυρτὸν τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$, καλοῦνται **δευτερεύοντα** στοιχεῖα τοῦ τετραπλεύρου.

3.1.1. **Σχέσεις μεταξύ τῶν στοιχείων κυρτοῦ τετραπλεύρου.** Ἀναφέρομεν κατωτέρω ὠρισμένας βασικὰς σχέσεις μεταξύ τῶν στοιχείων ἐνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου.

3.2.1. **Γωνίαί πλευρῶν καὶ διαγώνιων.** Ἀναχωροῦντες ἐκ τῆς προφανοῦς σχέ-

σεως $\frac{(A\Delta)}{(A\Gamma)} \cdot \frac{(A\Gamma)}{(AB)} \cdot \frac{(AB)}{(A\Delta)} = 1$ καὶ βάσει τοῦ θεωρήματος τῶν ἡμιτόνων, αὐρίσκομεν ἀμέσως τὸν τύπον:

$$\frac{\eta\mu\Gamma_2}{\eta\mu\Delta} \cdot \frac{\eta\mu B}{\eta\mu\Gamma_1} \cdot \frac{\eta\mu\Delta_2}{\eta\mu B_1} = 1$$



Έργαζόμενοι ἀναλόγως, καταλήγουμεν εἰς τοὺς τύπους:

$$\frac{\eta\mu\Gamma_2}{\eta\mu\Delta} \cdot \frac{\eta\mu B}{\eta\mu\Gamma_1} \cdot \frac{\eta\mu\Delta_2}{\eta\mu B_1} = 1, \quad \frac{\eta\mu\Delta_2}{\eta\mu A} \cdot \frac{\eta\mu\Gamma}{\eta\mu\Delta_1} \cdot \frac{\eta\mu A_2}{\eta\mu\Gamma_1} = 1, \quad 1$$

$$\frac{\eta\mu A_2}{\eta\mu B} \cdot \frac{\eta\mu\Delta}{\eta\mu A_1} \cdot \frac{\eta\mu B_2}{\eta\mu\Delta_1} = 1, \quad \frac{\eta\mu B_2}{\eta\mu\Gamma} \cdot \frac{\eta\mu A}{\eta\mu B_1} \cdot \frac{\eta\mu\Gamma_2}{\eta\mu A_1} = 1$$

Ὅμοίως ἐκ τῆς σχέσεως $\frac{AB}{B\Gamma} \cdot \frac{B\Gamma}{\Gamma\Delta} \cdot \frac{\Gamma\Delta}{\Delta A} \cdot \frac{\Delta A}{AB} = 1$, εὐρίσκομεν τὸν τύπον:

$$\eta\mu A_1 \eta\mu B_1 \eta\mu\Gamma_1 \eta\mu\Delta_1 = \eta\mu A_2 \eta\mu B_2 \eta\mu\Gamma_2 \eta\mu\Delta_2 \quad 2$$

3.1.3. Ἐμβαδόν. Διαδοχικῶς ἔχομεν (Σχ. 15):

$$E = (AOB) + (BO\Gamma) + (\Gamma O\Delta) + (AO\Delta) \Rightarrow E = \frac{1}{2} (AO) (BO) \eta\mu\omega +$$

$$+ \frac{1}{2} (BO) (\Gamma O) \eta\mu\omega + \frac{1}{2} (\Gamma O) (\Delta O) \eta\mu\omega + \frac{1}{2} (\Delta O) (AO) \eta\mu\omega \Rightarrow$$

$$E = \frac{1}{2} [(AO) + (O\Gamma)] [(BO) + (O\Delta)] \eta\mu\omega \Rightarrow E = \frac{1}{2} (A\Gamma) (B\Delta) \eta\mu\omega.$$

Συνεπῶς, λαμβάνομεν τὸν τύπον:

$$E = \frac{1}{2} \delta_1 \delta_2 \eta\mu\omega \quad 3$$

3.1.4. Πλευραί, διαγώνιοι καὶ γωνία τῶν διαγώνιων. Ἐστω Z τὸ σημεῖον τῆς μῆς τῶν πλευρῶν β καὶ δ κυρτοῦ τετραπλεύρου (Σχ. 16). Δυνάμει τοῦ θέματος τῶν συνημιτόνων, ἔχομεν:

$$\alpha^2 = (OA)^2 + (OB)^2 + 2(OA)(OB) \text{ συν}\omega$$

$$\beta^2 = (OB)^2 + (O\Gamma)^2 - 2(OB)(O\Gamma) \text{ συν}\omega$$


$$\gamma^2 = (O\Delta)^2 + (O\Gamma)^2 + 2(O\Delta)(O\Gamma) \text{ συν}\omega$$

$$\delta^2 = (OA)^2 + (O\Delta)^2 - 2(OA)(O\Delta) \text{ συν}\omega$$

Ἐξ αὐτῶν λαμβάνομεν:

$$\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2 - \delta^2 = 2[(OA)(OB) + (OB)(O\Gamma) + (O\Gamma)(O\Delta) + (O\Delta)(OA)] \text{ συν}\omega =$$

$$(\alpha^2 + \gamma^2) - (\beta^2 + \delta^2) = 2\delta_1 \delta_2 \text{ συν}\omega \quad 4$$



Σχ. 16

Ομοίως έχουμε: $\delta_1^2 = (AZ)^2 + (Z\Gamma)^2 - 2(AZ)(Z\Gamma) \text{ συν}\varphi$,
 $\delta_2^2 = (ZB)^2 + (Z\Delta)^2 - 2(ZB)(Z\Delta) \text{ συν}\varphi$, $\alpha^2 = (ZB)^2 + (ZA)^2 - 2(ZB)(ZA) \text{ συν}\varphi$
 και $\gamma^2 = (Z\Delta)^2 + (Z\Gamma)^2 - 2(Z\Delta)(Z\Gamma) \text{ συν}\varphi$.

Έκ τούτων και βάσει τῶν σχέσεων $(ZA) = (Z\Delta) + (\Delta A)$,
 $(ZB) = (Z\Gamma) + (\Gamma B)$, προκύπτει ὁ τύπος:

$$\boxed{(\delta_1^2 + \delta_2^2) - (\alpha^2 + \gamma^2) = 2\beta\delta \text{ συν}\varphi} \quad 5$$

3.1.5. Ἐμβαδὸν συναρτήσῃ περιμέτρου καὶ γωνιῶν. Ἐκ τῶν τύπων (4) καὶ (5) προκύπτει ἀμέσως ὁ τύπος:

$$\boxed{E = \frac{1}{4} (\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2 - \delta^2) \epsilon\varphi\omega} \quad 6$$

Ἐξ ἄλλου, εἶναι: $E = (\Delta AB) + (\Delta \Gamma B) = \frac{1}{2} \alpha\delta \eta\mu A + \frac{1}{2} \beta\gamma \eta\mu \Gamma \Rightarrow$

$$4E = 2\alpha\delta \eta\mu A + 2\beta\gamma \eta\mu \Gamma \quad (1)$$

Ἐπίσης, ἔχομεν: $\delta_2^2 = \alpha^2 + \delta^2 - 2\alpha\delta \text{ συν}A$ καὶ $\delta_2^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \text{ συν}\Gamma$.

Ἐξ αὐτῶν δὲ συνάγεται: $\alpha^2 + \delta^2 - 2\alpha\delta \text{ συν}A = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \text{ συν}\Gamma \Rightarrow$
 $\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2 = 2\alpha\delta \text{ συν}A - 2\beta\gamma \text{ συν}\Gamma \quad (2).$


Ἐψοῦμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῶν (1), (2) εἰς τὸ τετράγωνον καὶ προσθέ-
 τομεν κατὰ μέλη, ὅποτε προκύπτει:

$$\begin{aligned} 16E^2 + (\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2)^2 &= (2\alpha\delta \eta\mu A + 2\beta\gamma \eta\mu \Gamma)^2 + (2\alpha\delta \text{ συν}A - 2\beta\gamma \text{ συν}\Gamma)^2 \Rightarrow \\ 16E^2 + (\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2)^2 &= 4\alpha^2\delta^2 + 4\beta^2\gamma^2 - 8\alpha\beta\gamma\delta \text{ συν}(A + \Gamma) \Rightarrow \\ 16E^2 + (\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2)^2 &= (2\alpha\delta + 2\beta\gamma)^2 - 8\alpha\beta\gamma\delta [1 + \text{συν}(A + \Gamma)] \Rightarrow \\ 16E^2 + (\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2)^2 &= (2\alpha\delta + 2\beta\gamma)^2 - 16\alpha\beta\gamma\delta \text{ συν}^2 \frac{A + \Gamma}{2} \Rightarrow \\ 16E^2 &= (2\alpha\delta + 2\beta\gamma)^2 - (\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2)^2 - 16\alpha\beta\gamma\delta \text{ συν}^2 \frac{A + \Gamma}{2} \Rightarrow \\ 16E^2 &= [(\alpha + \delta)^2 - (\beta - \gamma)^2] [(\beta + \gamma)^2 - (\alpha - \delta)^2] - 16\alpha\beta\gamma\delta \text{ συν}^2 \frac{A + \Gamma}{2} \Rightarrow \\ 16E^2 &= 16(s - \alpha)(s - \beta)(s - \gamma)(s - \delta) - 16\alpha\beta\gamma\delta \text{ συν}^2 \frac{A + \Gamma}{2} \\ &\quad (2s = \alpha + \beta + \gamma + \delta) \end{aligned}$$

Ούτως εϋρίσκομεν τὸν τύπον:

$$E = \sqrt{(s-\alpha)(s-\beta)(s-\gamma)(s-\delta) - \alpha\beta\gamma\delta \operatorname{cun}^2 \frac{A+\Gamma}{2}}$$

3.2. Κυρτὸν τετράπλευρον ἔγγραψιμον εἰς κύκλον. Ἐστω τὸ ἐγγεγραμμένον εἰς κύκλον τετράπλευρον ΑΒΓΔ (Σχ. 17). Γνωρίζομεν ὅτι $B + \Delta = \pi$, ὁπότε $\operatorname{cun} B = -\operatorname{cun} \Delta$. Ἐξ ἄλλου, ἐκ τῶν τριγῶνων ΑΒΓ καὶ ΑΓΔ, δυνάμει καὶ τοῦ θεωρήματος τῶν cun ημιτόνων, λαμβάνομεν:



Σχ. 17

$$\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \operatorname{cun} B = \gamma^2 + \delta^2 - 2\gamma\delta \operatorname{cun} B \Rightarrow$$

$$\operatorname{cun} B = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2}{2(\alpha\beta + \gamma\delta)} \quad (1)$$

Ἐκ τῆς (1), δυνάμει καὶ τῶν τύπων

$$\eta\mu \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{1 - \operatorname{cun} B}{2}}, \quad \operatorname{cun} \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{1 + \operatorname{cun} B}{2}},$$

λαμβάνομεν:

$$\eta\mu \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-\alpha)(s-\beta)}{\alpha\beta + \gamma\delta}}, \quad \operatorname{cun} \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-\gamma)(s-\delta)}{\alpha\beta + \gamma\delta}}.$$

Ἐξ αὐτῶν δὲ προκύπτει: $\operatorname{εφ} \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-\alpha)(s-\beta)}{(s-\gamma)(s-\delta)}}$ ($2s = \alpha + \beta + \gamma + \delta$)

Ὡστε, ἔχομεν τοὺς ἐπομένους βασικούς τύπους:

$$\eta\mu \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-\alpha)(s-\beta)}{\alpha\beta + \gamma\delta}}, \quad \operatorname{cun} \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-\gamma)(s-\delta)}{\alpha\beta + \gamma\delta}},$$

$$\operatorname{εφ} \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-\alpha)(s-\beta)}{(s-\gamma)(s-\delta)}}$$

Εἶναι $A + \Gamma = \pi$, ὁπότε $\operatorname{cun} \frac{A+\Gamma}{2} = 0$. Ἄρα, ἐκ τοῦ τύπου 7 λαμβάνομεν:

$$E = \sqrt{(s-\alpha)(s-\beta)(s-\gamma)(s-\delta)}$$

9

Αί διαγώνιοι δ_1 και δ_2 τοῦ ἐγγεγραμμένου τετραπλεύρου ΑΒΓΔ (Σχ. 17) ὑπολογίζονται συναρτήσει τῶν πλευρῶν του ὡς ἑξῆς:

Εἰς τὸν τύπον $\delta_1^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \text{ συν } B$, ἀντικαθιστῶμεν τὴν προηγουμένως εὑρεθεῖσαν τιμὴν τοῦ $\text{συν} B$ (3.2), ὁπότε μετὰ τὰς πράξεις, εὑρίσκομεν:

$$\delta_1^2 = \frac{(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\delta + \beta\gamma)}{\alpha\beta + \gamma\delta}. \quad \text{"Ὡστε:}$$

$$\delta_1 = \sqrt{\frac{(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\delta + \beta\gamma)}{\alpha\beta + \gamma\delta}}, \quad \delta_2 = \sqrt{\frac{(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\beta + \gamma\delta)}{\alpha\delta + \beta\gamma}} \quad 10$$

Ἐκ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ (Σχ. 17) λαμβάνομεν:

$$\delta_1 = 2R\eta\mu B \Rightarrow \delta_1 = 4R\eta\mu B \frac{B}{2} \text{ συν } \frac{B}{2},$$

ὁπότε, δυνάμει καὶ τῶν τύπων 8, 10, προκύπτει:

$$R = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{(\alpha\beta + \gamma\delta)(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\delta + \beta\gamma)}{(s-\alpha)(s-\beta)(s-\gamma)(s-\delta)}} \\ = \frac{1}{4E} \sqrt{(\alpha\beta + \gamma\delta)(\alpha\gamma + \beta\delta)(\alpha\delta + \beta\gamma)} \quad 11$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

96) Εἰς κυρτὸν τετράπλευρον ΑΒΓΔ νὰ δειχθοῦν αἱ σχέσεις:

$$\alpha) \frac{\eta\mu A}{\eta\mu \Gamma} = \frac{\eta\mu B_1 \eta\mu A_1}{\eta\mu B_2 \eta\mu \Gamma_2} = \frac{\eta\mu \Delta_2 \eta\mu A_2}{\eta\mu \Delta_1 \eta\mu \Gamma_1} \quad \beta) \frac{\eta\mu A \eta\mu B}{\eta\mu \Gamma \eta\mu \Delta} = \frac{\eta\mu A_2 \eta\mu B_1}{\eta\mu \Gamma_2 \eta\mu \Delta_1}$$

97) Κυρτοῦ τετραπλεύρου δίδονται αἱ πλευραὶ α, β, γ καὶ αἱ γωνίαι Β, Γ. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ γωνίαι Α, Δ καὶ ἡ πλευρὰ δ.

98) Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἔμβαδὸν τετραπλεύρου, τοῦ ὁποῖου αἱ πλευραὶ εἶναι 3, 4, 5, 6 καὶ αἱ δύο ἀπέναντι γωνίαι ἔχουν ἄθροισμα π .

99) Ἐὰν τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ εἶναι περιγράψιμον εἰς κύκλον, τότε $E = \sqrt{\alpha\beta\gamma\delta} \eta\mu \frac{B+\Delta}{2}$.

100) Νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι εἰς περιγεγραμμένον περὶ κύκλου τετράπλευρον ΑΒΓΔ εἶναι:

$$\alpha\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} = \gamma\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \eta\mu \frac{\Delta}{2}.$$

101) Δίδεται τραπέζιον ΑΒΓΔ. Ἐὰν $\widehat{ΒΑΓ} = \chi$ καὶ $\widehat{ΑΒΔ} = \psi$, δείξατε ὅτι:

$$\alpha) \sigma\phi\chi - \sigma\phi\psi = \sigma\phi A - \sigma\phi B \quad \beta) \frac{\delta_1}{\delta_2} = \frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu\psi}$$

102) Ἐὰν τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ εἶναι ἑγγράφιστον καὶ περιγράφιστον εἰς κύκλον, νὰ δεიχθῆ ὅτι:

$$\alpha) \epsilon\phi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\beta\gamma}{\alpha\delta}} \quad \beta) E = \alpha\beta \epsilon\phi \frac{B}{2} \quad \gamma) \sigma\upsilon\nu A = \frac{\alpha\delta - \beta\gamma}{\alpha\delta + \beta\gamma}$$

$$\delta) \epsilon\phi^2 \frac{\omega}{2} = \frac{\beta\delta}{\alpha\gamma} \quad \epsilon) \eta\mu\omega = \frac{2\sqrt{\alpha\beta\gamma\delta}}{\alpha\gamma + \beta\delta} \quad (\omega \text{ εἶναι ἡ γωνία τῶν διαγωνίων})$$

103) Εἰς πᾶν ἑγγράφιστον τετράπλευρον ἰσχύει: $\epsilon\phi \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{(s-\beta)(s-\delta)}{(s-\alpha)(s-\gamma)}}$, ὅπου ω εἶναι ἡ γωνία τῶν διαγωνίων τοῦ τετραπλεύρου.

4. Ἐπίλυσις τετραπλεύρου

4.1. Αἱ διαγώνιοι ἑνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου ΑΒΓΔ χωρίζουν τοῦτο εἰς τὰ τέσσαρα τρίγωνα ΑΒΓ, ΒΓΔ, ΓΔΑ καὶ ΔΑΒ, τὰ ὁποῖα καλοῦνται **μερικὰ τρίγωνα**. Διὰ τῶν τριγώνων τούτων διευκολύνεται οὐχὶ μόνον ἡ ἐν γένει σπουδὴ τοῦ τετραπλεύρου, ὡς ἤδη εἴπομεν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπίλυσις αὐτοῦ. Καλεῖται **ἐπίλυσις** ἑνὸς τετραπλεύρου ὁ δι' ὑπολογισμοῦ προσδιορισμὸς τῶν ἀγνώστων κυρίων στοιχείων του, ὅταν δοθοῦν πρὸς τοῦτο ἑπαρκῆ στοιχεῖα αὐτοῦ. Συνήθως, ἡ ἐπίλυσις ἑνὸς τετραπλεύρου ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἐπιλύσεως τῶν μερικῶν τριγώνων αὐτοῦ.

Γενικῶς ὁμως, ὁ τρόπος ἐπιλύσεως ἑνὸς τετραπλεύρου ποικίλει ἀναλόγως τῶν δεδομένων πρὸς ἐπίλυσιν στοιχείων αὐτοῦ. Δηλαδή, ὑπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας, ἐκ τῶν δεδομένων διὰ τὴν ἐπίλυσιν στοιχείων τοῦ τετραπλεύρου, οὐδὲν ἐκ τῶν μερικῶν τριγώνων αὐτοῦ ἐπιλύεται.

Οἱ χρησιμοποιούμενοι ἐν γένει τύποι διὰ τὴν ἐπίλυσιν ἑνὸς τετραπλεύρου δὲν ἐκλέγονται μόνον μεταξὺ τῶν τύπων αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν τοιοῦτων τοῦ τριγώνου.

Πρὸς πληρεστέραν κατανόησιν τῶν ἀνωτέρω, παραθέτομεν τὰ ἀκόλουθα παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Νὰ ἐπιλυθῆ κυρτὸν τετράπλευρον ΑΒΓΔ ἐκ τῶν στοιχείων A_1, B_1, β, γ καὶ δ_2 (Σχ. 18).


Ἐπίλυσις: Ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ τριγώνου ΒΓΔ ὑπολογίζομεν τὰς γωνίας B_2, Γ καὶ Δ. Συνεπῶς, ἡ γωνία $B = B_1 + B_2$ ὑπολογίζεται.

Ἐξ ἄλλου ἔχομεν: $A_2 + B + \Gamma_1 = \pi \Rightarrow (A - A_1) + B + (\Gamma - \Gamma_2) = \pi \Rightarrow A - \Gamma_2 = \pi + A_1 - (B + \Gamma)$ (1)

Ἐκ τοῦ τελευταίου τῶν τύπων 1, προκύπτει :

$$\eta\mu A \eta\mu\Gamma_2 = \frac{\eta\mu B_1 \eta\mu\Gamma \eta\mu A_1}{\eta\mu B_2} \quad (2)$$

Αἱ (1), (2) ἀποτελοῦν ἓν ἀπλοῦν τριγωνομετρικὸν σύστημα, ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ὁποίου προσδιορίζομεν τὰς γωνίας A καὶ Γ_2 . Συνεπῶς, ἔχομεν προσδιορισθεὶς τὰς γωνίας $\Delta = 2\pi - (A + B + \Gamma)$ καὶ $\Delta_2 = \Delta - \Delta_1$. Ἀκολουθῶς, δι' ἐπιλύσεως τῶν μερικῶν τριγώνων ABΓ καὶ AΒΔ ὑπολογίζομεν τὰ λοιπὰ κύρια στοιχεῖα τοῦ τετραπλεύρου.



Σχ. 18

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Νὰ ἐπιλυθῆ κυρτὸν τετράπλευρον ἐκ τῶν στοιχείων α, A_1, A_2, B_2 καὶ Δ_1 .

Ἐπίλυσις : Προφανῶς (Σχ. 18), ἐκ τῶν σχέσεων

$A = A_1 + A_2$ καὶ $\Gamma = \pi - (B_2 + \Delta_1)$, προσδιορίζομεν τὰς γωνίας A καὶ Γ , ὁπότε ἔχομεν: $B + \Delta = 2\pi - (A + \Gamma)$ (1)

Ἐν συνεχείᾳ, ἐκ τοῦ δευτέρου τῶν τύπων 1, λαμβάνομεν:

$$\frac{\eta\mu B}{\eta\mu\Delta} = \frac{\eta\mu A_2 \eta\mu B_2}{\eta\mu A_1 \eta\mu\Delta_1} \quad (2)$$

Ἐπιλύομεν τὸ σύστημα τῶν ἐξισώσεων (1), (2) καὶ προσδιορίζομεν τὰς γωνίας B καὶ Δ . Μετὰ ταῦτα, δι' ἐπιλύσεως τῶν μερικῶν τριγώνων προσδιορίζομεν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τοῦ τετραπλεύρου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. Νὰ ἐπιλυθῆ κυρτὸν τετράπλευρον ἐκ τῶν πλευρῶν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ καὶ τοῦ ἔμβαδου $E = \kappa^2$.

Ἐπίλυσις : Ἐκ τῶν μερικῶν τριγώνων ΔAB καὶ ΔGB (Σχ. 15), βάσει καὶ τοῦ θεωρήματος τῶν συνημιτόνων, ἔχομεν:

$$\left. \begin{aligned} \delta_2^2 &= \alpha^2 + \delta^2 - 2\alpha\delta \text{ συν}A \\ \delta_2^2 &= \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \text{ συν}\Gamma \end{aligned} \right\} \Rightarrow \alpha\delta \text{ συν}A - \beta\gamma \text{ συν}\Gamma = \frac{\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2}{2} \quad (1)$$

Πρὸς εὐκολίαν, θέτομεν $\frac{\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2}{2} = \lambda^2$, ὁπότε ἡ (1) γράφεται:

$$\alpha\delta \text{ συν}A - \beta\gamma \text{ συν}\Gamma = \lambda^2.$$

Ἐπίσης εἶναι: $E = (\Delta AB) + (\Delta GB) \Rightarrow \kappa^2 = \frac{1}{2} \alpha\delta \eta\mu A + \frac{1}{2} \beta\gamma \eta\mu\Gamma \Rightarrow$
 $\alpha\delta \eta\mu A + \beta\gamma \eta\mu\Gamma = 2\kappa^2.$

Οὕτως ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν, διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῶν γωνιῶν Α καὶ Γ, τὸ ἐπόμενο σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha\delta \text{ συν}Α - \beta\gamma \text{ συν}Γ = \lambda^2 \\ \alpha\delta \eta\muΑ + \beta\gamma \eta\muΓ = 2\kappa^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta\gamma \text{ συν}Γ = \alpha\delta \text{ συν}Α - \lambda^2 \quad (2) \\ \beta\gamma \eta\muΓ = 2\kappa^2 - \alpha\delta \eta\muΑ \quad (3) \end{array} \right.$$

Ἐκ τῶν (2) καὶ (3) προκύπτει:

$$(\beta\gamma)^2 (\text{συν}^2Γ + \eta\mu^2Γ) = (\alpha\delta \text{ συν}Α - \lambda^2)^2 + (2\kappa^2 - \alpha\delta \eta\muΑ)^2 \Leftrightarrow \\ 4\kappa^2\alpha\delta \eta\muΑ + 2\lambda^2\alpha\delta \text{ συν}Α = \alpha^2\delta^2 + \lambda^4 + 4\kappa^4 - \beta^2\gamma^2$$

Δι' ἐπιλύσεως τῆς τελευταίας ἐξισώσεως, ἡ ὁποία εἶναι τῆς μορφῆς: $\alpha \eta\mu\chi + \beta \text{ συν}\chi = \gamma$, εὐρίσκομεν τὴν γωνίαν Α. Ἐν συνεχείᾳ ἐπιλύομεν τὸ τρίγωνον ΔΑΒ, τοῦ ὁποίου γνωρίζομεν δύο πλευρὰς α, δ καὶ τὴν περιεχομένην γωνίαν Α. Ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ τριγώνου τούτου εὐρίσκομεν τὴν δ₂ καὶ τὰς Β₁, Δ₂. Τέλος, ἐπιλύομεν τὸ τρίγωνον ΔΓΒ καὶ εὐρίσκομεν τὰς γωνίας Δ₁, Β₂, Γ καὶ συνεπῶς, προσδιορίζομεν τὰς γωνίας τοῦ τετραπλεύρου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4. Νὰ ἐπιλυθῆ κυρτὸν τετράπλευρον ἐκ τῶν πλευρῶν α, β, γ, δ καὶ τοῦ ἔμβαδοῦ Ε = κ².

Ἐπίλυσις: Ἐκ τῶν μερικῶν τριγώνων ΔΑΒ καὶ ΔΓΒ (Σχ. 15), βάσει καὶ τοῦ θεωρήματος τῶν συνημιτόνων, ἔχομεν:

$$\left. \begin{array}{l} \delta_2^2 = \alpha^2 + \delta^2 - 2\alpha\delta \text{ συν}Α \\ \delta_2^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \text{ συν}Γ \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha\delta \text{ συν}Α - \beta\gamma \text{ συν}Γ = \frac{\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2}{2} \quad (1)$$

Θέτομεν $\frac{\alpha^2 + \delta^2 - \beta^2 - \gamma^2}{2} = \lambda^2$, ὅποτε ἡ (1) γράφεται:

$$\alpha\delta \text{ συν}Α - \beta\gamma \text{ συν}Γ = \lambda^2 \quad (2)$$

Προφανῶς εἶναι: $E = (\Delta AB) + (\Delta GB) \Rightarrow \kappa^2 = \frac{1}{2} \alpha\delta \eta\muΑ + \frac{1}{2} \beta\gamma \eta\muΓ \Rightarrow$

$$\alpha\delta \eta\muΑ + \beta\gamma \eta\muΓ = 2\kappa^2 \quad (3)$$

Οὕτω, λόγῳ τῶν (2) καὶ (3), ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὸ τριγωνομετρικὸν σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha\delta \text{ συν}Α - \beta\gamma \text{ συν}Γ = \lambda^2 \\ \alpha\delta \eta\muΑ + \beta\gamma \eta\muΓ = 2\kappa^2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta\gamma \text{ συν}Γ = \alpha\delta \text{ συν}Α - \lambda^2 \quad (4) \\ \beta\gamma \eta\muΓ = 2\kappa^2 - \alpha\delta \eta\muΑ \quad (5) \end{array} \right.$$

Ἐκ τῶν (4) καὶ (5) λαμβάνομεν:

$$(\beta\gamma)^2 (\text{συν}^2Γ + \eta\mu^2Γ) = (\alpha\delta \text{ συν}Α - \lambda^2)^2 + (2\kappa^2 - \alpha\delta \eta\muΑ)^2 \Rightarrow \\ (4\kappa^2\alpha\delta) \eta\muΑ + (2\lambda^2\alpha\delta) \text{ συν}Α = \alpha^2\delta^2 + \lambda^4 + 4\kappa^4 - \beta^2\gamma^2$$

Δι' ἐπιλύσεως τῆς τελευταίας ἐξισώσεως, ἡ ὁποία εἶναι τῆς μορφῆς $\alpha \eta\mu\chi + \beta \text{ συν}\chi = \gamma$, εὐρίσκομεν τὴν γωνίαν Α. Ἐν συνεχείᾳ ἐπιλύομεν τὸ τρίγωνον ΔΑΒ, τοῦ ὁποίου γνωρίζομεν τὰς δύο πλευρὰς α, δ καὶ τὴν γωνίαν Α.

Ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ τριγώνου τούτου εὐρίσκομεν τὴν δ₂ καὶ τὰς Β₁, Δ₂. Τέλος, ἐπιλύομεν τὸ τρίγωνον ΔΓΒ καὶ εὐρίσκομεν τὰς γωνίας Δ₁, Β₂, Γ₂ καὶ συνεπῶς, προσδιορίζομεν τὰς γωνίας τοῦ τετραπλεύρου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 104) Νά ἐπιλυθῆ κυρτὸν τετράπλευρον ΑΒΓΔ ἐκ τῶν στοιχείων $\delta_1, A_1, B_1, \Gamma_1$ καὶ Γ_2 .
- 105) Νά ἐπιλυθῆ κυρτὸν τετράπλευρον ἐγγράψιμον εἰς κύκλον, τοῦ ὁποῦ διδόνται αἱ πλευραὶ του.
- 106) Νά εὔρεθῶν αἱ γωνίαι κυρτοῦ τετραπλεύρου ΑΒΓΔ, τοῦ ὁποῦ διδόνται αἱ γωνίαι A_1, B_1, B_2 καὶ Δ_1 .
- 107) Νά ἐπιλυθῆ κυρτὸν τετράπλευρον ἐκ τῶν πλευρῶν του καὶ μιᾶς γωνίας του.
- 108) Νά ἐπιλυθῆ τραπέζιον, τοῦ ὁποῦ διδόνται αἱ διαγώνιοι δ_1, δ_2 καὶ αἱ γωνίαι του.
- 109) Νά ἐπιλυθῆ παραλληλόγραμμον, τοῦ ὁποῦ διδόνται :
Ε(ἐμβαδόν), $2s$ (περίμετρος) καὶ μία διαγώνιος δ .
- 110) Ἐάν κυρτοῦ τετραπλεύρου ΑΒΓΔ ἐγγεγραμμένου εἰς κύκλον, αἱ πλευραὶ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ εἶναι ἀνάλογοι τῶν ἀριθμῶν 5, 6, 7, 9 καὶ τὸ ἐμβαδὸν $E = 100$, τότε νά εὔρεθῶν αἱ πλευραὶ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀκτίς τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου.
- 111) Νά ὑπολογισθῶν αἱ διαγώνιοι τραπέζιου, τοῦ ὁποῦ γνωρίζομεν τὰς πλευράς.
- 112) Νά ἐπιλυθῆ παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ ἐκ τῶν:

$$2s, \quad \frac{\delta_1}{\delta_2} = \lambda, \quad \omega \text{ (γωνία διαγωνίων)}$$
- 113) Νά ἐπιλυθῆ τετράπλευρον, ἐγγράψιμον καὶ περιγράψιμον εἰς κύκλον, ἐκ τῆς πλευρᾶς α καὶ τῶν γωνιῶν Α, Β αὐτοῦ.
- 114) Κυρτὸν τετράπλευρον εἶναι περιγεγραμμένον εἰς κύκλον ἀκτίος R. Νά εὔρεθῶν αἱ γωνίαι αὐτοῦ, ἐάν γνωρίζομεν τὰς πλευράς α, β καὶ γ . Ἐν συνεχείᾳ, εὔρετε ὑπὸ ποίαν συνθήκην ἔχει λύσιν τὸ πρόβλημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΣΕΙΡΑΙ

1. Όρισμοί — βασικαί έννοιαι

1.1. Ὑπενθυμίζομεν ἐν πρώτοις τὸν ὄρισμὸν μιᾶς σειρᾶς. Ἐστω $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, \dots$ μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν. Θεωροῦμεν ἐπίσης τὴν ἀκολουθίαν $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_n, \dots$ ἔνθα:

$$\sigma_1 = \alpha_1$$

$$\sigma_2 = \alpha_1 + \alpha_2$$

$$\sigma_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

.....
.....

$$\sigma_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

Ἡ οὕτως ὀριζομένη ἀκολουθία $\sigma_n | n = 1, 2, \dots$, ἐκ τῆς ἀκολουθίας $\alpha_n | n = 1, 2, \dots$, καλεῖται «ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἄθροισμάτων» ἢ συνηθέστερον **σειρὰ** καὶ τὴν συμβολίζομεν μὲ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$. Οἱ ἀριθμοὶ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, \dots$ καλοῦνται **ὄροι** τῆς σειρᾶς, ὁ δὲ ἀριθμὸς α_n ($n \in \mathbb{N}$) ὀνομάζεται **νιοστὸς** ὄρος τῆς σειρᾶς. Τὸ ὄριον τῆς ἀκολουθίας $\sigma_n | n = 1, 2, \dots$ τῶν μερικῶν ἄθροισμάτων καλεῖται **ἄθροισμα** τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$. Δηλαδή, ἐὰν

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = \alpha \in \mathbb{R},$$

τότε λέγομεν ὅτι τὸ ἄθροισμα τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ εἶναι ὁ ἀριθμὸς α καὶ γράφομεν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \alpha$.

Εἰδικώτερον, ἐὰν οἱ ὄροι μιᾶς σειρᾶς περιέχουν τριγωνομετρικοὺς ἀρθμούς, τότε ἡ σειρὰ καλεῖται **τριγωνομετρικὴ σειρὰ**.

Παρατηροῦμεν, ὅτι διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἄθροισμα μιᾶς σειρᾶς πρέπει πρῶτον νὰ εὑρωμεν τὸ μερικὸν ἄθροισμα (δηλαδή τὸ ἄθροισμα τῶν n πρώτων ὄρων

της) καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ὄριον αὐτοῦ. Τονίζομεν, ὅτι εἰς τὰς περισσοτέρας περιπτώσεις σειρῶν, τὸ μερικὸν ἄθροισμα σ_n δὲν ὑπολογίζεται καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα τῆς σειρᾶς. Μὲ τὰς περιπτώσεις ταύτας δὲν πρόκειται νὰ ἀσχοληθῶμεν.

Διατυποῦμεν καὶ ἀποδεικνύομεν κατωτέρω, μίαν χρήσιμον πρότασιν διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ μερικοῦ ἄθροίσματος ὠρισμένων σειρῶν.

1.2. Πρότασις. Ἐὰν ὁ νιοστός ὅρος a_n μιᾶς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} a_n$ τίθεται ὑπὸ τὴν μορφήν $a_n = f(v) - f(v+1)$ (1), διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$, τότε τὸ μερικὸν ἄθροισμα σ_n δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου $\sigma_n = f(1) - f(v+1)$ (2). Ἐὰν δὲ $a_n = f(v+1) - f(v)$, τότε $\sigma_n = f(v+1) - f(1)$.

Ἀπόδειξις: Ἡ ἀπόδειξις πραγματοποιεῖται διὰ τῆς τελείας ἐπαγωγῆς. Ἐὰν $v=1$, τότε, ἀφ' ἑνὸς εἶναι $\sigma_1 = a_1$, ἀφ' ἑτέρου αἱ (1) καὶ (2) γράφονται: $a_1 = f(1) - f(2)$ καὶ $\sigma_1 = f(1) - f(2)$. Ἄρα, ἐπειδὴ καὶ $\sigma_1 = a_1$, συνάγεται ὅτι διὰ $v=1$ ἡ πρότασις ἰσχύει. Ἐν συνεχείᾳ, δεχόμεθα ὅτι ἡ πρότασις ἰσχύει διὰ $v=k$, ἥτοι ἰσχύει: $\sigma_k = f(1) - f(k)$ (3)

Ἐξ ἄλλου εἶναι: $\sigma_{k+1} = \sigma_k + a_{k+1}$ (4) καὶ $a_{k+1} = f(k+1) - f(k+2)$ (5)

Διὰ προσθέσεως τῶν (3) καὶ (5) κατὰ μέλη προκύπτει:

$$\sigma_k + a_{k+1} = f(1) - f(k+2),$$

ὁπότε, δυνάμει καὶ τῆς (4), λαμβάνομεν: $\sigma_{k+1} = f(1) - f(k+2)$, δηλαδή ἡ πρότασις ἰσχύει διὰ $v=k+1$ καὶ συνεπῶς ἡ πρότασις ἀπεδείχθη.

Ἀναλόγως ἀποδεικνύεται καὶ ἡ δευτέρα περίπτωση.

Κατωτέρω, θὰ περιορισθῶμεν εἰς μερικὰ παραδείγματα καὶ ἀσκήσεις τριγωνομετρικῶν σειρῶν ἐιδικῆς μορφῆς, εἰς τὰς ὁποίας καὶ τὸ μερικὸν ἄθροισμα καὶ τὸ ὄριον αὐτοῦ ὑπολογίζονται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Ἐὰν $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right)$, τότε νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῆς σειρᾶς:

$$\eta\mu\alpha + 2\eta\mu^2\alpha + 4\eta\mu^3\alpha + \dots + 2^{v-1}\eta\mu^v\alpha + \dots$$

Λύσις: Οἱ ὅροι τῆς δοθείσης σειρᾶς εἶναι ὅροι φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου καὶ συνεπῶς ἔχομεν:

$$\sigma_n = \frac{(2\eta\mu\alpha)^n - 1}{2\eta\mu\alpha - 1} \eta\mu\alpha \iff \sigma_n = \frac{\eta\mu\alpha}{2\eta\mu\alpha - 1} (2\eta\mu\alpha)^n + \frac{\eta\mu\alpha}{1 - 2\eta\mu\alpha} \quad (1)$$

Ἐξ ὑποθέσεως ἔχομεν: $0 < \alpha < \frac{\pi}{6} \iff 0 < \eta\mu\alpha < \frac{1}{2} \iff 0 < 2\eta\mu\alpha < 1$

$$\text{Συνεπῶς: } \lim_{v \rightarrow +\infty} (2\eta\mu\alpha)^v = 0 \quad (2)$$

Ἐπίσης, ἐκ τῆς (1) προκύπτει: $\lim_{v \rightarrow +\infty} \sigma_n = \frac{\eta\mu\alpha}{2\eta\mu\alpha - 1} \lim_{v \rightarrow +\infty} (2\eta\mu\alpha)^v + \frac{\eta\mu\alpha}{1 - 2\eta\mu\alpha}$,

όπότε, λόγω και της (2), έχουμε:

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} \sigma_v = \frac{\eta\mu\alpha}{1 - 2\eta\mu\alpha} \Rightarrow \sum_{v=1}^{\infty} 2^{v-1} \eta\mu^v \alpha = \frac{\eta\mu\alpha}{1 - 2\eta\mu\alpha}, \text{ δηλαδή το άθροισμα της}$$

σειράς είναι $\frac{\eta\mu\alpha}{1 - 2\eta\mu\alpha}$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Να εύρεθῆ τὸ ἄθροισμα τῆς σειράς: $\sum_{v=1}^{\infty} \eta\mu \frac{\pi}{2^{v+2}} \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{2^{v+2}}$

Λύσις : Ἔχομεν: $\alpha_v = \eta\mu \frac{\pi}{2^{v+2}} \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{2^{v+2}} \Leftrightarrow$

$$2\alpha_v \Rightarrow 2 \eta\mu \frac{\pi}{2^{v+2}} \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{2^{v+2}} \Leftrightarrow 2\alpha_v = \eta\mu \frac{\pi}{2^v} - \eta\mu \frac{\pi}{2^{v+1}} \Leftrightarrow$$

$$\alpha_v = \frac{1}{2} \eta\mu \frac{\pi}{2^v} - \frac{1}{2} \eta\mu \frac{\pi}{2^{v+1}}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι: $\alpha_v = f(v) - f(v+1)$, ὅπου $f(v) = \frac{1}{2} \eta\mu \frac{\pi}{2^v}$.

Συνεπῶς, βάσει τῆς ἀνωτέρω προτάσεως, θὰ εἶναι:

$$\sigma_v = f(1) - f(v+1) = \frac{1}{2} \eta\mu \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \eta\mu \frac{\pi}{2^{v+1}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \eta\mu \frac{\pi}{2^{v+1}}$$

Εἶναι: $\lim_{v \rightarrow +\infty} \sigma_v = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \lim_{v \rightarrow +\infty} \eta\mu \frac{\pi}{2^{v+1}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{2}$

Ἄρα, τὸ ἄθροισμα τῆς σειράς εἶναι $\frac{1}{2}$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. Να εύρεθῆ τὸ ἄθροισμα τῆς σειράς: $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{2^v} \epsilon\phi \frac{\alpha}{2^v}$.

Λύσις : Ἀποδεικνύεται εὐκόλως ἡ ταυτότης: $\epsilon\phi\chi = \sigma\phi\chi - 2\sigma\phi 2\chi \quad (1)$

Ἐκ τῆς (1), διὰ $\chi = \frac{\alpha}{2^v}$, ἔχομεν: $\epsilon\phi \frac{\alpha}{2^v} = \sigma\phi \frac{\alpha}{2^v} - 2\sigma\phi \frac{\alpha}{2^{v-1}} \Leftrightarrow$

$$\frac{1}{2^v} \epsilon\phi \frac{\alpha}{2^v} = \frac{1}{2} \sigma\phi \frac{\alpha}{2^v} - \frac{1}{2^{v-1}} \sigma\phi \frac{\alpha}{2^{v-1}}.$$

Ἐπομένως:

$$\alpha_v = \frac{1}{2^v} \epsilon\phi \frac{\alpha}{2^v} = \frac{1}{2^v} \sigma\phi \frac{\alpha}{2^v} - \frac{1}{2^{v-1}} \sigma\phi \frac{\alpha}{2^{v-1}} = f(v+1) - f(v),$$

$$\text{ὅπου } f(v) = \frac{1}{2^{v-1}} \sigma\phi \frac{\alpha}{2^{v-1}}.$$

*Άρα, βάσει τῆς ἀποδειχθείσης προτάσεως 1.2, θὰ εἶναι:

$$\begin{aligned} \sigma_v &= f(v+1) - f(1) = \frac{1}{2^v} \sigma\phi \frac{\alpha}{2^v} - \frac{1}{2^0} \sigma\phi \frac{\alpha}{2^0} = \frac{1}{2^v} \sigma\phi \frac{\alpha}{2^v} - \sigma\phi\alpha = \\ &= \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2^v} \cdot \frac{1}{\eta\mu \frac{\alpha}{2^v}} - \sigma\phi\alpha = \frac{1}{\alpha} \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2^v} \cdot \frac{\alpha}{\eta\mu \frac{\alpha}{2^v}} - \sigma\phi\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Εἶναι: } \lim_{v \rightarrow +\infty} \sigma_v &= \frac{1}{\alpha} \lim_{v \rightarrow +\infty} \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2^v} \cdot \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\alpha}{\eta\mu \frac{\alpha}{2^v}} - \sigma\phi\alpha = \\ &= \frac{1}{\alpha} \sigma\upsilon\nu 0 \cdot 1 - \sigma\phi\alpha = \frac{1}{\alpha} - \sigma\phi\alpha \end{aligned}$$

(εἶναι γνωστὸν ὅτι: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\chi}{\eta\mu\chi} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu\chi}{\chi} = 1$ καὶ $\lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\alpha}{2^v} = 0$).

*Άρα, τὸ ἄθροισμα τῆς σειρᾶς εἶναι $\frac{1}{\alpha} - \sigma\phi\alpha$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4. Ἐὰν $\alpha > 0$, νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῆς σειρᾶς:

$$\sum_{v=1}^{\infty} \text{Τοξ εφ} \frac{\alpha}{1+v(v+1)\alpha^2}$$

Λύσις: Ἀποδεικνύεται εὐκόλως ὅτι (σχετικῶς πρβλ. κεφ. V παράδειγμα 2):

$$\text{Ἐὰν } \chi, \psi > 0 \Rightarrow \text{Τοξ εφ}\chi - \text{Τοξ εφ}\psi = \text{Τοξ εφ} \frac{\chi - \psi}{1 + \chi\psi} \quad (1)$$

Εἶναι: νὰ $\alpha > 0$ καὶ $(v+1)\alpha > 0$, $\forall v \in \mathbb{N}$, διότι $\alpha > 0$. Ἐπομένως, ἐκ τῆς (1), διὰ $\chi = (v+1)\alpha$ καὶ $\psi = \alpha$, λαμβάνομεν:

$$\text{Τοξ εφ}(v+1)\alpha - \text{Τοξ εφ}\alpha = \text{Τοξ εφ} \frac{(v+1)\alpha - \alpha}{1 + v(v+1)\alpha^2} \iff$$

$$\text{Τοξ εφ}(v+1)\alpha - \text{Τοξ εφ}\alpha = \text{Τοξ εφ} \frac{\alpha}{1 + v(v+1)\alpha^2} \quad (2)$$

Ὁ νιοστὸς ὄρος τῆς σειρᾶς εἶναι:

$$\alpha_v = \text{Τοξ εφ} \frac{\alpha}{1 + v(v+1)\alpha^2} = \text{Τοξ εφ}(v+1)\alpha - \text{Τοξ εφ}\alpha = f(v+1) - f(v),$$

ὅπου $f(v) = \text{Τοξ εφ}\alpha$.

Ἐπομένως: $\sigma_v = f(v+1) - f(1) = \text{Τοξ εφ}(v+1)\alpha - \text{Τοξ εφ}\alpha$, ὁπότε, βάσει τῆς (1), ἔχομεν:

$$\sigma_v = \text{Τοξ εφ} \frac{(v+1)\alpha - \alpha}{1 + (v+1)\alpha^2} = \text{Τοξ εφ} \frac{v\alpha}{v\alpha^2 + 1 + \alpha^2} = \text{Τοξ εφ} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \frac{1}{v}}$$

$$\begin{aligned} \text{Είναι: } \lim_{v \rightarrow +\infty} \sigma_v &= \lim_{v \rightarrow +\infty} \text{Τοξ εφ} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \frac{1+\alpha^2}{v}} = \text{Τοξ εφ} \left(\lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \frac{1+\alpha^2}{v}} \right) = \\ &= \text{Τοξ εφ} \frac{\alpha}{\alpha^2 + 0} = \text{Τοξ εφ} \frac{1}{\alpha}. \end{aligned}$$

Άρα, το άθροισμα της σειράς είναι $\text{Τοξ εφ} \frac{1}{\alpha}$, δηλαδή:

$$\sum_{v=1}^{\infty} \text{Τοξ εφ} \frac{\alpha}{1+v(v+1)\alpha^2} = \text{Τοξ εφ} \frac{1}{\alpha}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

115) Νά εύρεθῆ τὸ ἄθροισμα τῆς σειράς $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{4^v \text{ συν} \frac{\alpha}{2^v}}$.

116) Νά εύρεθῆ τὸ ἄθροισμα τῆς σειράς $\sum_{v=1}^{\infty} \text{Τοξ σφ} (1 + v + v^2)$.

(Υπόδειξις: Ἐάν $\chi > \psi > 0 \Rightarrow \text{Τόξ σφ}\psi - \text{Τόξ σφ}\chi = \text{Τόξ σφ} \frac{\chi\psi + 1}{\chi - \psi}$)

117) Νά δειχθῆ ὅτι τὸ ἄθροισμα τῆς σειράς $\sum_{v=1}^{\infty} \eta_{\mu} \frac{\alpha}{3^v} \text{ τεμ} \frac{\alpha}{3^{v-1}}$ εἶναι 0.

118) Νά εύρεθοῦν τὰ ἄθροίσματα τῶν κάτωθι σειρῶν :

α) $\sum_{v=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^v} \text{ εφ} \frac{\alpha}{2^v} \right)^2$

β) $\sum_{v=1}^{\infty} \text{εφ} \frac{\alpha}{2^v} \text{ τεμ} \frac{\alpha}{2^{v-1}}$

γ) $\sum_{v=1}^{\infty} 2^{v-1} \text{ εφ}^2 \frac{\alpha}{2^v} \text{ εφ} \frac{\alpha}{2^v}$

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Βασικαί έννοιαι — Όρισμοί	σελ.	5
Θεμελιώδεις τριγωνομετρικαί εξισώσεις	»	6
2.1. Έπίλυσις τής τριγωνομετρικής εξίσωσης $\eta\mu\chi = \alpha$	»	6
» » » » $\sigma\upsilon\nu\chi = \lambda$	»	8
2.3. » » » » $\sigma\phi\chi = \lambda$	»	8
2.4. » » » » $\sigma\phi\chi = \alpha$	»	9
Τριγωνομετρικαί εξισώσεις αναγόμεναι εις θεμελιώδεις	»	9
3.1. Τριγωνομετρικαί εξισώσεις τής μορφής $\varphi(\tau) = 0$ ($\tau =$ τριγ. άριθ. τόξου χ)	»	9
3.2. Τριγωνομετρικαί εξισώσεις με περισσότερα του ένός άγνωστα τόξα	»	12
3.3. Όμογενείς τριγ. εξισώσεις ως προς $\eta\mu\chi$ και $\sigma\upsilon\nu\chi$	»	12
3.4. Γραμμική τριγωνομετρική εξίσωσις	»	14
3.5. Συμμετρική τριγ. εξίσωσις ως προς $\eta\mu\chi$ και $\sigma\upsilon\nu\chi$	»	17
Τριγωνομετρική επίλυσις τής β-βαθμίου εξίσωσης $a\chi^2 + b\chi + \gamma = 0$	»	19
Άσκήσεις	»	21

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Βασικαί έννοιαι — Όρισμοί	»	24
Συστήματα δύο εξισώσεων με δύο άγνωστους	»	24
Συστήματα με μίαν εκ των δύο εξισώσεων άλγεβρικήν	»	24
2.2. Συστήματα συμμετρικά ως προς τὰ τόξα	»	31
2.3. Τριγωνομετρικά συστήματα εκ μιάς τριγωνομετρικής εξίσωσης των όποιων, προκύπτει άμέσως άλγεβρική εξίσωσις των άγνωστων τόξων	»	32
Τριγ. συστήματα περισσοτέρων των δύο άγνωστων	»	34
Άσκήσεις	»	35

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΑΛΟΙΦΗ

Έ έννοια τής άπαλοιφής — Άπαλείφουσα	σελ.	37
Άσκήσεις	»	39

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

Όρισμοί — Βασικαί έννοιαι	»	40
2. Θεμελιώδεις τριγωνομετρικαί άνισώσεις	»	40
3. Τριγ. άνισώσεις αναγόμεναι εις τας θεμελιώδεις	»	44
Άσκήσεις	»	48

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ ΚΥΚΛΙΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Όρισμοί — Βασικαί έννοιαι	»	49
1.1. Έ συνάρτησις τοξημ	»	49
1.2. Έ συνάρτησις τοξσιν	»	51
1.3. Αι συνάρτησεις τοξεφ και τοξσφ	»	52
1.4. Γραφικαί παραστάσεις των άντιστρόφων κυκλικών συναρτήσεων	»	53
Άσκήσεις	»	59

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ — ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ

Σχέσεις μεταξύ των στοιχείων τυχόντος τριγώνου	»	61
1.1. Τριγωνική Ίδιότης	»	61
1.2. Θεμελιώδεις ομάδες τύπων	»	61
1.3. Τύποι του Mollweide	»	65
1.4. Τριγωνομετρικοί άριθμοί των ήμισιων γωνιών τριγώνου συναρτήσαι των πλευρών αυτού	»	65

1.5.	Τύποι τοῦ ἔμβαδοῦ τριγώνου	σελ.
1.6.	Ἡ ἄκτις R (τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου) συναρτήσῃ τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου	»
1.7.	Ἦψος Τριγώνου	»
1.8.	Ἡ ἄκτις ρ τοῦ ἐγγεγραμμένου εἰς τρίγωνον κύκλου	»
1.9.	Ἡ ἄκτις τοῦ παρεγγεγραμμένου κύκλου τριγώνου	»
1.10.	Ἐσωτερικὴ διχοτόμος τριγώνου	»
1.11.	Ἐξωτερικὴ διχοτόμος τριγώνου	»
1.12.	Διάμεσος τριγώνου	»
1.13.	Ἀξιοσημείωτος παρατήρησις Ἀσκήσεις	»
2.	Ἐπίλυσις Τριγώνου	»
2.1.	Ὅρισμοὶ καὶ βασικαὶ ἔννοιαι	»
2.2.	Παρατηρήσεις	»
2.3.	Βασικὴ ἐπίλυσις	»
2.4.	Περιπτώσεις ἐπιλύσεων (Τριγώνου)	»
2.5.	Κλασσικαὶ ἐπιλύσεις	»
2.6.	Ἐπίλυσις ὀρθογωνίου τριγώνου Ἀσκήσεις	»
3.	Τὸ τετράπλευρον	»
3.1.	Κυρτὸν τετράπλευρον	»
3.2.	Κυρτὸν τετράπλευρον ἐγγράψιμον εἰς κύκλον Ἀσκήσεις	»
4.	Ἐπίλυσις τετραπλεύρου Ἀσκήσεις	»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΣΕΙΡΑΙ

1.	Ὅρισμοὶ — Βασικαὶ ἔννοιαι — Παραδείγματα	»
	Ἀσκήσεις	»



0020557335
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ Ε' - (III) ΑΝΤΙΤΥΠΑ 27.000 - ΣΥΜΒΑΣΙΣ 2402 / 18 - 3 - 74

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΛΕΞΙΑ ΙΩ. ΚΑΜΠΑΝΑΣ Α. Ε.

